

# IO. GORRAEI PARISIENSIS,

## DEFINITIONVM MEDICARVM LIBRI XXIII,

*literis Græcis distincti.*

AB

AVTHORE ANTE OBITVM RE-  
cogniti, magnaue accessione adaucti, & nunc denuo  
ad publicam rei literariæ utilita-  
tem editi.

*Adiectus in calce Latinogræcus INDEX copiosissimus.*




FRANCOFVRTI,  
Typis Wecheliani apud Claudium

Marnium, & heredes Ioannis Aubrij.

M. DCI.

*Cum Privilegio S. Cæsareæ Maiestatis ad sexennium.*









# FRANCISCO MOMMORANCIO EQVI

TI TORQVATO, GALLIÆ

MARESCHALLO, INSVLÆQVE

*Francicæ præfecto, Ioann. Gortius*

*S. P. D.*



**V**T SANITATEM nulli magis tueri cupiunt  
laudantque, aut medicinam maiore in pretio  
habent quam qui periculose diuque ægrota-  
runt, sic tantis bellorum periculis nuper de-  
functi, & recenti adhuc memoria miseriarum  
in quibus versari sumus, nemo est, opinor, cui  
pacis ista qua fruimur trāquillitas non sit per-  
iucunda. Bellum quidem illud per initia plu-  
rimis dulce videri potuit, aliis pro religione  
putoq; Dei cultu digladiari maxime pium esse iudicantibus, aliis inde  
furandi, latrocinandi, & in miserorum fortunas atque possessiones in-  
uolādi occasionem nactis, multis vero, quod minimo negotio ipsum  
confici posse existimarent, ante victoriam triumphantibus. Verum v-  
bi compertum est nulla re minus quam eo bello controuersias de reli-  
gione exortas dirimi, sed totum potius quorūdam ambitione confla-  
tum fuisse, vbi vltro & citro omnia agi, rapi, cadesque fieri quisq; sen-  
sit, atque ita acie dimicatum est, vt adhuc incertum sit vtri victoriam  
reportarint: tantum omnes cepit eius fastidium, vt nihil iam sit tam  
miserum, tetrum, detestabile, nihil maiori contentione velis, vt ita di-  
cam, remisque fugiatur. Mirum quidem dictu est quam sit in eo ab o-  
mnibus tumultuatum, non plebeiis modo & imperitorum vulgo, sed  
potissimum ab iis quorum officium erat temerarios insanæ multitu-  
dinis motus autoritate, sapiētia rationeque componere, nec illos et-  
iam qui ad beneuolentiæ charitatem ceteros erudire & inuitare debe-  
bant, continere se potuisse, quin ad ista tam nefaria faces admouerent,  
classicum apud plebem & principes canerent, atque in modum lucti-  
ficæ Alectus plurimorum sinus anguibus & viperis replerent. Sed nūc  
clament seditiosi homines & turbulenti, querantur, vociferentur o-  
mnia pessum ire, religionem non modo pace quam colimus corrup-  
pi, verum ex animis etiam excidere & aboleri: non tamen efficient vt


bellum pro aris, focis & penatibus de integro adornetur. Ineūda alia instaurandæ religionis ratio, quæ Christianos magis deceat quam bellū, quos præceptis filii Dei institutos pacē & amicitiam potius amplecti oportuit. Sicut enim ferro religio bona doceri, inq; animis & sensibus nostris imprimi nō potest, ita neque deprauata ex iis tolli aut corrigi. Imo vero cum sola in nobis inferendę confirmandæq; religionis ratio verbi diuini & Euangelii prædicatione constet, eaq; gemina existat, vna subtilis, ambitiosa, spinosa, quam plerique ante hæc tempora in suggestis scholisq; inanissime coluerunt: altera pacatior atq; inelaborata, qua Christus eiusq; Apostoli lumen rebus diuinis atq; humanis adhibuerunt: prius illud dicendi genus altum & magnificum, ab his neglectum, parum admodum ad eam rem efficax & accommodatum videtur, quod simplex & humilis oratio demonstratioq; veritatis esse debeat. Hæc magis quam ferrum aciem animorum nostrorū veritatis splendore perstringit, reluctātes Deo pertrahit, & fide deuincit sanctissima. Hac freti duce Apostoli totū orbem peruagati incredibili omnium assensu & approbatione salutem per Christum nūtiarunt atq; persuaferunt. Valeant igitur seditiosa hominum consilia qui nisi bellum nil in ore habent, & nata de religione dissidia acerbioribus dissidiis componi posse putant. Pugnandum pro illa quidem acriter ab omnibus est, totisq; viribus in id certamē incumbendū; quod tamen non armis sed lenitate atque simplicitate prædicationis iniri oportet. Α γαβη δ' ἐπιστὰς βροτῶν, vt poeta quidam non obscurus dixit, in qua vis locum non habet, sed omnia administrantur sapientia. Itaque mentem longe optimam Deus Opt. Maxim. iniecit reginæ prudentissimæ & nobilissimis Gallici regni principibus, qui tantos bellorum tumultus execrati omne studium, industriam & conatus ad pacem conuerterunt. Ac primum quidem decretis edictisq; pacificatoriis ita omniū animos ad concordiam & mutuam beneuolentiam reuocarunt, deinde vero tantam adhibuerunt diligentiam vt ea vbique rata, sancta inuiolataq; essent, vt non tam cito quisque arma sumpsisse quam deposuisse, nullaue iam amicitiarum dissociatio præcessisse sed pax perpetua tota Gallia fuisse videatur. Cum enim sanctissime Deum colere permulti cuperent, neque vana cæremonia & superstitione, quæ fusa per Christianos oppressit omnium fere animos, atque hominum imbecillitatem occupauit, adstringi se vllō modo pateretur, mortemq; sceleri & flagitio anteponendam censerent, facta edicto potestate vt deinceps maiorum more & ritu quem optimum iudicarunt, Deum colere liceat: æquissimum certe fuit ab armis quæ pro tutanda vita & libertate sumpta prædicabant, discedere. Iustum quidem vix quicquam esse potest, multoque minus ab omnibus probari, quod tanta vis bellorum tamque dura necessitas expresserit: at tamen quoniam pax vel iniusta vtilior est quam iustissimum bellum in ciuib; ferendū est æquis animis, atque in eo acquiescendum donec



nec Deus pietate & sanctitate nostra placatus, quid maxime probandum sit ostenderit, & docuerit religionem à superstitione distinguere. Laudanda igitur reginæ & principum virorum virtus quæ in eo decreto ferendo enituit egregia, & magnitudo animi tanta, ut reuera supra sexum & homines putanda sit Deoque tribuenda. Cuius quidem gloriæ clarissime Mommoranci illi te consortem & socium habent, partemque non minimam tibi vendicas, qui & ante pacis huius faciendæ consiliarius atque administer extitisti, & nunc te propugnato rem factæ & vindicem habeamus. Incredibile quidem est & valde gloriosum inter ciues, quorum opiniones tam variæ tamque inter se dissidentes erant, eam primum conciliare & coagmentare potuisse: verum ex quo ea facta constitutaque est tam firmam & constantem perseuerasse, ut nulli ad hunc usque diem tumultus, nulla temeritas aut seditiosæ cōciones eam labefactarint, omnem fidem laudemque excedit. Accum multi quidem sint & domi & militiæ præclari viri, qui vna sedulo in id incumbant, ne vlla perditorum hominum iniuria violari possit, tu certe, quod bona aliorum venia dixerim, maxime, qui eam prouinciā obtines atque administras, in qua vrbs vnica multarum instar est prouinciārum. Quid enim cum Parisiorum Lutetia comparandum, siue hominum turbam, siue plurimorum opes, dignitates, & summos quos gerunt magistratus estimemus? Hinc quidem maxima tantæ vrbs in pace continendæ difficultas, quod alii propter imperitiā indociles, rerumque nouarum cupidi, alii diuitiis audaciores ut plurimum reddantur, multos autem dignitates atque magistratus arrogantiores, atque ad detrectanda aliorum imperia ferociores efficere soleant. Veruntamen in eius administratione tu eam adhibuisti moderationem, feroces animos comprimendo, exulceratos superiorum bellorū iniuriis deliniendo, seditiones motusque vrbi nepharie molientes deterrendo, deque religione diuersa sentientes meliorum temporum, quibus mens vna, sensus cultusque Dei omnibus vnus futurus sit, expectatione consolando: ut in te viri illius Virgiliani imago verissime reluceat, qui pietate grauis & meritis, coorta magno in populo seditione cōspectus dictis animos regit & pectora demulcet. Quā in re mihi videnis nobilissimo monumento consecrasse memoriā nominis tui, qui antea militiæ forisque nobilis, istud domi pacisque studiis comparatum decus atque ornamentum amplissimo laudum tuarum cumulo adiunxeris. Perspecta quidem iam pridem fuerat Henrico regi mirifica ingenii tui & virtutis indoles, cum te illius ergo sibi assumpsit & cooptrauit generum: nunc vero tot rebus egregie factis atque pacatissima prouincia vrbeque, in cuius salute vniuersæ Galliæ salus continetur, spem omnē de te conceptam opinionemque superasti. Quamobrem tibi quidem Rex totaque Gallia permultum, singuli autem omnia tibi debemus, quod tuo consilio, prudentia & æquitate non modo domi suæ, unde haud ita pridē plurimi exulabant,

quisque pacatus viuit, & bonis quibus erat spoliatus, fruitur, sed otio etiam securi abundamus. Quo tanto beneficio obligati, cum certatim pro eo. referre tibi gratias & publice & priuatim debeamus, ego quidem, etsi me tātum tibi debere existimo quantum persolvere difficile est, pacis tamen, tranquillitatis & otii mei, quod Dei primum benignitate, deinde tua vigilantia nactus sum & teneo, fructum nisi tibi dedicem, valde ingratus esse mihi videar. Is autem liber iste est, quem à multis annis inchoatum, ad finem nouissimis perduximus. Cum enim ita medicinæ operam ab ipsis studiorum meorū primordiis dederim, vt omnium quæ legebam commētarios conscriberem, & quæ sparsim de re quacunque prodebantur simul colligerem, tandem cōsiliū cepi, ne mihi soli labor ille profuisset, omnia in hoc volumen componere, in quo omnium quæ ad artem medicam pertinet naturæ, differentiæ, proprietates ita explicantur, vt ipsum non dubitauerim Definitiones medicas inscribere. Rarum quidē istud in medicina scribendi genus, & à paucissimis, idq; negligenter, ex cultum fuit, & propterea apud multos, vt opinor, gratiosius, aut etiam fructuosius futurum. Quod munus illustrissimo tuo nomini nuncupatum ita habeto, vt nō ipsum modo, verum eius etiam authorem, & si quid in eo industria, officii, fideiq; est, tibi consecratum deuotumque esse existimes. Vale. Parisiis 1564. Cal. Aug.

EIDEM





# FRANCISCO MOMMO- RANCIO EQVITI TORQVATO, GALLIÆ MARESCHALLO, INSVLÆ

que Francicæ Præfecto, IOAN. GORRÆVS  
iunior S. P. D.



*ET SI* ex aliorum præclare factis gloriari nobis non liceat, & quæ ipsi non fecimus, vix ea nostra vocanda sint, Dux illustrissime: tamen sit nescio quo modo ut liberi in parentum virtute & laude glorientur, ac, veluti paterna ad ipsos attineat gloria, eam hereditario quodam iure sibi vindicare, ac pro viribus inuiolatam conservare soleant. Hinc certe factum est ut istud Definitionum medicarum opus (ex quo quantum de arte medica apud omnes illius author benemeritus sit, aliis relinquo prædicandum) ad me quodammodo pertinere puta-

tauerim, atq; pro hereditatis paternæ non minima parte semper habuerim. Nec id quidem iudicio meo immerito. Si enim ea vulgo optabilior est & eligitur, cuius cum copioso & uberrimo fructu, perpetua sibi suisq; futura est ac sine lite possessio: an non optimo iure istam in eodem gradu reposuerimus, utpote quam Gorraei perpetuo atque cum laude possessori sunt, & quæ insuper non ipsis solum, verum etiam toti Reipublicæ, magna cum ubertate & nunquam perituros fructus est allatura? Quamobrem, quia, ut dici solet, non minori cum laude parva tuemur quam nova acquirimus, patre vita functo nihil mihi porius fuit quam ut relicta nobis hereditas optime excolta fructus suos quibus debet persolveret. Protinusq; huic studio incubui, ut opus istud quod iam à quibusdam annis in bibliopolarum officinis desiderari audieram, non solum denuo typis excuderetur, sed etiam ab authore ipso emendatum & recognitum, multisq; additionib. locupletatum in lucem ederetur. In quo ipsum authoris αὐτόγραφον omnino sequutus sum, nihilq; nisi ab ipso profectum & elaboratum inserui. Quoniam vero non solum opus hoc, sed etiam omnem authoris operam & industriam iam dudum tibi deuotam & dicatam fuisse scio, hæc iterum sub tuo nomine illustrissimo in apertum protulimus, grati erga te animi monimentum perpetuum ob innumera beneficia tum publica tum priuata, quibus liberi non patris nomine solum, sed etiam ipsi suo, se tibi deuinctissimos sentiant: ac ego potissimum inter ceteros, quem sub patrocinio tuo aliquando suscepisti: tum etiam ut omnem eorum operam ac industriam omniaq; studia tibi uni dicata & consecrata esse intelligas. Hoc igitur nostrum munus æquo animo suscipias velim: & ut patrem amasti, ita etiam liberos ama. Vale. Parisiis 1578. Idibus August.



*Indefinitum ne quid libro esset in isto,  
illum etiam pingi placuit qui cetera pinxit.*

A. WECHELVS TYPOGR.





# I O. G O R R A E I P A R I S I E N S I S Definitionum medicarum

T O A.



*Βερίστος* simpliciter, vel *ἀβρότονον*. Est terebra chirurgica supra cuius mucronem circulus quidam latus parum extans circumcurrit. Hic prohibet ne terebra, dum agitur, altius descendat quam par sit, &

subiectas partes violet. Nam quod mergi non possit, hoc est, tota in cauitatem subiectam descendere, ab argumento *ἀβρότονον* dicitur, quasi immeribilis. per metaphoram. Eam Chirurgi, quo minus usquam aberrēt, rupto potissimum pericranio adhibent, eo-que non admodum quidem perrupto & imbecillo, sed firmiore, ut terebra ipsius circumactum & appressionem ferre possit. Quamobrem complures id genus preparatas habent ad omnem caluarie crassitudinem, sicut declarat Galenus extremo libro sexto de morbis curandis.

*Ἀβρότονον*, ἢ

*Ἀβρότονον*. herba est duorum generum. Fœmina, quæ montanum abrotonum est, quadam arboris specie fruticat, foliis albicantibus, & circum ramulos absinthii Seriphii modo minutim incisus floribus referta est, in fastigio comantibus auri fulgore corymbis. Si æstare nata est, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu. Alterum mas vocatur, quod campestre abrotonum est, samentosum, gracilibus ramulis ut absinthium. Vtrumque immortali coma viret, atque ut frigore, sic sole nimio, propter infirmitatem suam, læditur. Tertio ordine calefacit & siccatur, digerit etiam & incidit, sed *κακοήμαρον* est, hoc est, stomacho ingratum. Nicandri interpres scripsit *ἀβρότονον* sic dictum esse, quod conspectu tenerum molle ac delicatum habeatur: aut quod difficile halitum prospirer.

*Ἀβρότονος οἶνος*. id est, vinum ex abrotono factum in musti amphoram injectis abrotoni

tusi cribratique vnciis centum, linteo colligatis auctore Dioscoride. Columella autem lib. 12. cap. 35. Abrotoni pondo libram in musti sextariis quatuor decoquit usque ad quartas, reliquum quod erit id frigidum addit in musti Aminæi urnam. Dicitur similiter *ἀβρότονον μύρον*, *ἀβρότονον ἔλαιον*, quemadmodum & *ἀβρότονος οἶνος*.

*Ἀβρόδης*. sic dici à nonnullis τὸ σπέρματι, Dioscorides auctor est.

*Ἀργόν* significat apud Hippocratem idem quod idoneum, certum, stabile, verum, & perpetuum, ut auctor est Galenus comment. 2. in lib. de fracturis. Idem vero etiam testatum reliquit in comment. lib. 2. de articulis, *ἀργόν* apud veteres id omne dici solere, quod in suo genere primum est.

*Ἀραβία*. *ὑάκινθος*, ἢ *σπυγίς*, ἢ *αἰσάρις* auctore Hesychio.

*Ἀραρόχον*. est lignum nostro orbi tantum nomine cognitum, quum, ut scribit Dioscorides, ex Arabia atque India aduehatur, thiyæ ligno simile, varium punctis & maculosum, odoratum, adstringens & subamarum. Cute verius quam cortice vestitur, aliquantulum versicolore. Colorem aloes videtur æmulari: vnde, ut arbitror, Aetius *ἑυκαρόλον* appellauit, quem sequuta officinarum turba lignum aloes nunc vocat. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. verum nunquam odoratius est, quam ubi marcidum computruit. Sunt autem eius genera quatuor, *ινδικόν*, *σαπφικόν* ex vrbe Sappho, *απεινόν*, *ιζρόν*. Omnia ex calcaciunt, ventrem sistunt, & *εὐσμάχα* sunt. Annotant quidam à recentioribus medicis vocari *ἑυκαρόλον*.

*Ἀγανθόν*. Agaricū. Est fungus albus, odoratus, antidotis efficax, in suramis arboribus præsertim glandiferis nascens, nocte relucens: hoc enim signo in tenebris decerpitur. Dioscorides scripsit in arborum caudicibus nasci quadam putrilagine, sed esse qui putent

esse radicem stirpis cuiusdam similem laser-  
pitio, textu raro ac soluto, & superficie mi-  
nus compacta. Duo sunt eius genera: scemi-  
na; quæ præfertur, recto venarum discursu  
& pectinum modo diuisiones habens. mas  
rotundus est, vndique compactior & spissi-  
or. vtrique gustus in initio dulcis, mox cum  
diffundi per os coeperit, amarus. Constat  
substantia aerea & terrestri calore extenua-  
ta. Vim autem habet digerendi, excalfacien-  
di, crassa incidendi, & soluendi iecinoris ob-  
structiones. Purgat pituitam & bilem, sed  
non acute, vt ait Aetius. Verum stomacho  
incommodum est, eo quod leue sit & in ipso  
supernatet. Gignitur in Sarmatiæ regione  
quæ Agaria dicitur, indeque nomen accepit.  
Ex ipso Agarico emplastrum fit egregium  
ocultos abscessus & omnem humiditatem  
resorbens, cuius descriptio habetur apud Ae-  
tium lib. 15. cap. 19.

*Αγριοκίς.* est frutex cum radice sua, è quo suc-  
cus distillat quem Ammoniacum seu gut-  
tam appellant.

*Αγριοκοιλία.* est vasorum in temporibus vel frō-  
te dissectio. Raduntur primum pili si qui  
efficiunt, mox aqua calida fouetur locus, vel  
cervix modice deligatur, vt sursum feratur  
sanguis & vasa intumescant, quæ vbi iam o-  
culis patent, id atramento notatur quod dis-  
secandum est, cutisque ab vtraque rite parte  
tum sinistræ manus chirurgi digitis, tum mi-  
nistri leuatur. deinde superficialia sectio in  
ipsam notam secundum longitudinem vasis  
inducitur, rursusque paulatim subiacentes  
cuti membranæ dissecantur, donec vas ipsum  
nudum apparuerit. Tunc hamulis eleua-  
tum & à membranis vicinis separatum du-  
plici filo, aut lino crudo, aut alio quodam  
valido per acuta transmissio diductoque sus-  
penditur: postea vas medio inter vtrumque  
filum spatio in rectum scalpello diuiditur.  
Cumque sanguinis quantum satis est ex eo  
manarit, vtroque extremo, filis iam ante  
transmissis, arte deligatur, ipsumque medi-  
um exciditur: postea vero linamenta iniice-  
re, hapsum lanæ ex aqua frigida imponere,  
& deligare conuenit, sequenti die vino & o-  
leo irrigare, tertia vero soluere, & moderata  
perfusionem facta linamenta ex aqua mulla  
indere, donec & fila & quod ex ipso vase ex-  
cisum fuerat, deciderint. Adhibetur hæc dis-  
secandi ratio hemicranicis & iis quibus oculo-  
li perpetuo illactyuant, aut quorum oculos  
lōgus aut etiam acutus dolor ex calida acri-  
que fluxione infestat. In his enim omnes  
medici & *αγριοκοιλίου* commendauerunt.

*Αγριοκίς.* dicuntur apud Hippocratem partes  
capitis alii, vulgo spicas vocant.

*Αγριος.* conceptaculum. Habetur hoc nomen  
apud Hippocratem lib. 6. *ἢ ἐπιδημιῶν*, & si-  
gnificat vterum, quanquam, vt inquit Gale-  
nus, eo nomine vterum designare non sapit  
Hippocratis phrasim.

*Αγριαίος ἄρτος.* gregarius & cibarius panis. Vide  
*ἄρτος*.

*Αγριος.* vide in dictione *ἀγριος*.

*Αγριοκίς.* herba est fruticosa, palmi longitudi-  
ne, simplex & humilis, vmbellam gerens in  
qua flos aureus in modum ampullæ emicat  
minor helichryso. Origano similis est, nec  
adhuc in seculi nostri notitiam peruenit. Sic  
dicta est, quod flos eius diutissime in sua co-  
loris specie conseruetur, nec fenescat.

*Αγριοκίς.* est lapidis species adstringente & dis-  
cussoria facultate præditi, sutoribus olim  
noti Galeni tempore, quo illi, vt ait libro 6.  
*ἢ κατὰ τόπους*, ad expolienda muliebria cal-  
ciamenta vtebantur.

*Αγριοκίς.* barbarum nomen est & ab Aetio pri-  
mum vsurparum in libello de alimentorum  
facultatibus quem ad Michaellem Regem  
conscripsit, quo ille *πλω σικώδης*, id est, cucu-  
merem appellat.

*Αγριοκίς.* pars colli, vt ait Hesychius, per quam  
facillime quis suffocatur. Dicuntur etiam *ἀγ-  
ριοκίς* hamuli seu fibulæ, quibus vulnere  
labra longe à se diffita coniunguntur: quod  
opus *ἀγριοκίς* appellatur.

*Αγριοκίς.* est in poplite, cubito, digitis, aut aliis et-  
iam partibus articuli contractio & curuatura,  
ab humoribus infarctis & nervorum qua-  
dam tensione proueniens. Nam & Corne-  
lius Celsus lib. 5. cap. 18. in malagmate Eu-  
tyclei cicatrice contractos articulos *πὲς ἀγριο-  
κίς* interpretatur: & Aetius lib. 12. cap. 42.  
describens varia *πρὸς ἀγριοκίς* *μαλὰ γράματα*, *ἀγ-  
ριοκίς* exponit *πὲς ἢ ἄρδων κατὰ χεῖρας*, id est, ar-  
ticulos stupore occupatos contractosque.  
Dicitur & *ἀγριοκίς* Paulo Æginetæ. Huic  
contraria affectio *ὀρθοκλον* nominatur. Sunt  
etiam quibus placet *ἀγριοκίς* poplitem signi-  
ficare, qui & *καμπὴ* & *ἰγρήν* seu *ἰγρὸς* appella-  
tur.

*Αγριοκίς.* significat apud Hippocratem *ἀγ-  
ριοκίς* *ἔχον*, hoc est anfulatum, siue anfulam  
vel anulum habens: dictum est autem de  
curtu.

*Αγριοκίς.* est vitium in oculis in quo palpe-  
bræ vel inter se, vel cum alba aut nigra oculo-  
li parte concreverunt & coherent. In causa  
vltus est negligenter & imperite curatum.  
Sanescendo enim, quod diduci potuit & de-  
buit, agglutinatur. Sed quod vnica dictione  
dixit Cornelius Celsus, duabus explicari po-  
test, *ἀγριοκίς* *πὲς βλεφάρων*, vt vocauit Aetius,  
qui & *πρὸς βλεφάρων* id vitii appellauit  
lib. 7. cap. 66. quo loco eius curationem  
persequitur.

*Αγριοκίς.* est vitium linguz, aut congeni-  
tum, membranis inferioribus, quæ linguam  
vinciunt, duriusculis & breuioribus à natu-  
ra productis: aut agnatum, id est, accidenta-  
rium, cum vltus sub lingua cicatricem duri-  
orem contraxit. Hi magna cum difficultate  
loqui possunt, atque ob id à quibusdam *αγ-  
ριοκίς* cognominati sunt: sed maxime qui-  
bus à natura id vitii inest, qui primum qui-  
dem tarde verba exerunt, sed vbi loqui co-  
eperint, sine offendiculo & festinanter lo-  
quuntur. impingunt tamen in difficultum  
vocabu-



vocalorum pronuntiatione, ut in quibus i aut l aut c occurrunt. Hi sola manu curari possunt, sicut explicat Aetius lib. 8. cap. 38. Malum hoc filii vulgariter nuncupatur, eo- que vinciri linguam putant, & p̄ter natu- ram id adnatum sub lingua esse, quod tamē falso existimant. Neq; enim morbus hic in incommodatione numeri partium posi- tus est, sed vel in membranarū naturali bre- vitate, vel in sicca earundem intemperie, vel in obstructione, quæ, perinde ac in neruorū distentionibus, membranas ipsas contra- hunt, & linguam prohibent explicari.

*Αγυλίστιον*. est instrumentum chirurgicum, quo tollitur *η αλωασις* & *γλωσσις*, & membra- næ quæ linguam vinciunt & contrahunt re- scinduntur.

*Αγυλίστις*. idem quod *η αγυλις*: de qua supra.

*Αγυλεις*. significat hominis pudendum apud E- picharmum, ut scribit Hesychius.

*Αγυροειδης*. est in scoptulo utroque, & inferiore eius parte *αποφύσις* exigua & acuta. Sic dicta est quod ad similitudinem anchoræ facta esse videatur. Eadem vero & *καρκαρινιδης* & *σηματιδης* ab Anatomicis appel- latur, quod eius pars extrema velut cornicis rostrum foras promineat, quodque *η* Canticæ Græcorum literæ similitudi- nem gerat.

*Αγορρομυλον*. significat apud Hippocratem idem quod *αγυροσπον*, hoc est, specium siue specil- lum hamatum, quo medici vulnera & vlce- rapertentant.

*Αγυρην*. Latinis cubitus vel cubitum dicitur. est autem locus ubi brachii ossa coniun- guntur. Alii definiunt *αγυρην* esse *αποφύ- σιν* maioris ossis quod *πυξ* appellatur. Ga- lenus comment. primo *εἰς τὸ πρὸς ἀγυρην* scribit cubiti eminentiam *αγυρην* à Græcis dici, & alio nomine *αλέκτρατον* vocari. Idem quo- que ait Hippocratem definire *αγυρην* id esse cui innititur. Gaza apud Aristotelem libr. 1. cap. 15. de histor. animal. *αγυρην* la- certum vertit: quo loco Aristoteles *αγυρην* intelligit eam totius brachii partem, quæ ab humero est ad cubitum, quam partem Ga- lenus aliquando *βραχίονα* vocavit, eodem cum toto membro nomine. Celsus autem humerum: vide *χελ*.

*Αγυρὴν γλυκὺς*. dicitur *αλφειον* teste Dioscoride, fortasse quod cubiti modo in terram se in- flectit, ut scribit Virg. Marcellus.

*Αγυρία*, nullius medicamenti nomen est au- thore Galeno lib. 1. de Antidotis, theriacis compositionem ab Andromacho descri- ptam interpretanti, sed illi thuris epithe- ton videtur esse. Verum si diligentius An- dromachi senioris theriace expendatur, & conferatur cum theriace descripta ab An- dromacho iuniore, cum hic piper album ad- dat, quod in illo diserte non exprimitur, at- que in reliquis tamen omnibus consenti- ant, merito aliquis existimauerit eo nomine piper album ab Andromacho seniore signi- ficari, atque ab eo fortasse sic dictum fuisse

à splendore & nitore quo prædictum est. Id enim *αγυρία* proprie significat. Quam et- iam rationem sequuntur Philo in sui Philo- nii descriptione piper album *παρὰ δὲ ἀγυ- ρίον*, hoc est igneum splendens, ænigmatice appellavit, sicut ipse Galenus lib. 9. *ηὲ κατὰ πᾶν* interpretatur.

*Αγυρία καὶ*

*Αγυρίς*. dicuntur grana, quibus allii caput cō- pactum est: alliorum capita, seu nuclei.

*Αγυρίς*. idem est quod *κατὰ γυναικα* apud Hippocra- tem, qui tamen raro *αγυρίς*, sæpe *κατὰ γυναικα* di- cit. Vnde factum est, ut permulti librum Hip- pocratis defraçturis, non ita nominatum fuisse ab Hippocrate contendant.

*Αγυρίς*. vitex. frutex est sic dictus, quod castita- tem conservet ijs quibus estur, aut bibitur, aut substernitur. Quamobrem in Thesmo- phoriis mulieres quibus sua castitas curæ erat, foliis eius cubitus sibi sternebant, ut author est Dioscorides. Idem alio nomine *αγυρίς* dicitur, propter virgarum eius inui- ctam fere flexibilitatem ad vincendum aptis- simam. Latini viticem ob id appellant, alii salicem Amerinam, vel piper agreste, ut pro- didit Dioscorides. *κατὰ τὴν ἀγυρὴν* Aesculapium *αγυρίων* dictum ferunt, quod, ut scribit Cæli- us, simulacrum eius ex vitice excisum con- formatumque esset. Est & quibusdam *αγυρίς* thāmni cognomen, nimirum à virtu- tis similitudine, quod venetem coherceat ut vitex.

*Αγυρίς*. idem quod *αγυρίς*, hoc est vitex, de quo supra. Causa est quod *αγυρίς* veneri aduerse- tur, & genituram extinguat, quæ *γυνή* vel *γυνὴς* dicitur. Nam & *αγυρίς* à castitate sic di- ctus est.

*Αγοραῖος ἀγυρίς*. forensis & venaliter panis: vide *ἀγυρίς*.

*Αγυρίς*. significat volam manus & cubitum, sed propter *αγυρίς* cubitum, *καὶ δὲ αγυρίς* volam signi- ficare author est Hesychius: verum non to- tus cubitus sic dicitur, sed pars eius inferior, sicut superior *ἐπιπυξ* nuncupatur. Ratio nominis est *κατὰ τὴν ἀγυρὴν*, *ὡς αἰεὶ ἐφ' ἡμᾶς αὐτῆς* *ἐπαγυρῆται*. hoc est, Dicitur ab *αγέδο*, quod semper ad nos ipsos aliquid adducamus.

*Αγυρία*. species est scabiei, quæ cito serpit & exul- cerationem prurientem concitat, certoque anni tempore reuertitur, asperior omnibus aliis & curatū difficilior, quamobrem *αγυρία*, id est fera, appellari meruit.

*Αγυρία*. sic dicta fuit à quibusdam *η ἐλθὼν*, ut ha- betur apud Dioscoridem.

*Αγυρία* siue *αεία*, apud Theophrastum arbor est sempiternæ frondis, inter robur & ilicem media, quam Theodorus Gaza latine aqui- folium reddidit.

*Αγυρίανδρον*. spina sylvestris, quæ densis sævit a- culeis.

*Αγυρίανδρος*. siue diuisis nominibus *αγυρία* *αὐτο- λος*, vitis sylvestris. Latini labruscam dicunt, propterea quod in marginibus terræ ceu la- bris quibusdam nascatur: duūm est gene- rum, unum, quod vuas ad maturitatem non

perducit, sed ad florē tantum, quī Græcis *οἰσίν* dicitur, promouet. Alterum, quod v-  
uas perficit paruis acinis, duorum etiam ge-  
nerum, albi & nigri. Folia, caules, & clauicu-  
la quibus repunt, vim habent cultæ viti si-  
mitem.

*Αἰχμαῖον*. dicitur ἢ *βρυονία*, vt ait Helychius.

*Αἰχμαῖα*. oleaster. Est syluestris olea, cui matē-  
ries perpetua, spissa, crispa, teredinem non  
sentiens. Hanc alio nomine Græci *κόκκω* ap-  
pellant, alij Aethiopicam oleam. Eius folia  
adstringunt, sed presertim earum succus af-  
fuso vino exceptus siccatuſque.

*Αἰχμαῖον*. idem quod ἢ *βνέος βόνιον*, quam  
& *κέντιον* appellant, vt habetur apud Pau-  
lum lib. 3. cap. 77.

*Αἰχμαῖον*. dicitur a quibusdam ἢ *καλὸν λαγνὸν*,  
vt habetur apud Dioscoridem.

*Αἰχμαῖα*. mala syluestria. Hæc vernis simi-  
lia esse & adstringere Dioscorides prodi-  
dit.

*Αἰχμαῖον*. dicitur ἢ *αἰσος* herba, quæ alio no-  
mine *αἰσος* nuncupatur.

*Αἰχμαῖον*. origanum syluestre, alij *πέντικον* ἢ  
*εὐκαλόν*; alij *καλλιόν* appellant. Folius est onga-  
ni, ramis tenuibus, semipedalibus, in quibus  
ymbella anethi insunt, flores candidi, ra-  
dix tenuis & inutilis. Folia floresque eius  
cum vino potui valent contra venenatorum  
morsus.

*Αἰχμαῖον*. Est genus quoddam oleæ syluestris, vt  
scribit Helychius.

*Αἰχμαῖον*. significat apud Hippocratem monta-  
num & syluestre.

*Αἰχμαῖον*. gramen. Est herba quæ geniculatis ra-  
mulis per terram serpit, radicesque ab ijs ge-  
niculatas dulcesque emittit. folia habet du-  
ra, & vt arundinis parua, lata, atq; in tenui-  
tate cacuminata. bubus iumentisque pabu-  
lariū, vnde *αἰχμαῖον* quidā appellauere. Grami-  
n officinis nomen seruauit, rura & olitores  
dentem canis appellant. Radix eius decocta  
in vino torminibus, yrinę difficultatibus, vl-  
ceribus vesicę medetur, calculos frangit. Se-  
men vehemētius yrinam mouet, aluium vo-  
mitionesque sistit. Est & arundinaceū gra-  
men priore multo maius, quod *καλαμὸν αἰχμαῖον*  
dicitur. Est etiam gramen aculeatum, quod  
*καρπὸν ποῖος* & *δακτύλος*, a Latinis crus galli vo-  
catur: de quibus vide suis locis.

*Αἰχμαῖον*. a quibusdam dicitur ἢ *αἰχμαῖον*,  
siue vitis alba, vt habetur apud Dioscori-  
dem.

*Αἰχμαῖον*. significat apud Hippocratem *αἰχμαῖον*,  
hoc est irabecillitatem, & infirmitudinē,  
sicut Galenus annotauit in explicatione vo-  
cum Hippocratis.

*Αἰχμαῖον*. est abscessus & collectio humoris lē-  
ti, & melliant pulcritudinis similis, inter maio-  
rem oculi angulum & nates. Hic tunica vt  
plurimum continetur, nec infert dolorem,  
subiro autem accipit incrementum. Idem  
abscessus si rumpatur exulcereturque, non  
amplius *αἰχμαῖον* dicitur, sed mutat nomē, &  
vocatur *αἰχμαῖον* auctore Paulo.

*Αἰχμαῖον* idem quod *αἰχμαῖον* apud Hippocra-  
tem, id est qui suffocatur.

*Αἰχμαῖον*. anchusa. herba est cuius quatuor sunt  
species & nomina: prima *ἀνκυσία*, altera *ἀνκυσ-  
ία*, tertia *ἀνκυσία*, quarta *ἀνκυσία*, quarta  
quæ, ppter nomen caret, sed generis sui no-  
mine *αἰχμαῖον* dicitur. Habet *ἀνκυσία* folia la-  
tiuscula similia, in acumen fastigiata, hirsuta,  
aspera, nigricantia, numerosa, circum radicē  
quoquo versus per terram sparsa, spinosa-  
que: radicem crassitudine digitali, & colo-  
re per ætatem sanguineo, quo non alius fu-  
cus melior, adeo vt *αἰχμαῖον*, verbum  
Græcis *αἰχμαῖον* sineari significet. dicitur  
etiam ἢ *ἀνκυσία*, alio nomine *καλὸν*, auctore  
Dioscoride. Radix eius adstringendi vim  
habet, & desiccandi: proinde valet ad alui  
profluium. *ἀνκυσία* autem, siue *ἀνκυσία*,  
solo folio differt a præcedente, quod ei bre-  
uius est, & minus amplum, cætero similis &  
scabritia foliorum & tenuitate caulium,  
quibus in summis florem purpureū ad pu-  
nicum vergentem gestat. Radices habet  
oblongas, rubras, & per messem sanguine-  
as. *ἀνκυσία* vero longioribus est, quam lactu-  
ca folijs, asperioribus, latioribusque, a capi-  
te ad radicem recidentibus, caule longo, re-  
cto, hirsuto, in quo multa adnascuntur hir-  
suta, & magnitudine fere cubitali, in quibus  
flos peruius purpureusque est. radicem ha-  
bet rubentem. Adstringit efficacius quam  
reliquæ, & erysipelatis conuenit. Quarta  
vero anchusæ species aliis breuior, simillima  
est secundæ, nisi quod minus & puniceum  
semen habet. estque tota amarior, & ob id  
lumbriticis dicata. Dicta videtur *αἰχμαῖον*,  
quod habeat vim strangulatoriam & suffo-  
cationam.

*Αἰχμαῖον*. apud Hippocratem lib. 1. *αἰχμαῖον*,  
significat aeris ambientis constitutionem,  
vt annotauit Galenus.

*Αἰχμαῖον*. Hyoscyamus, auctore Helychio.

*Αἰχμαῖον* ὡς ὕδωρ frigidissima aqua, vt interpreta-  
tur Paulus Aegineta lib. 2. cap. 30. Aetius  
lib. 5. loquens *αἰχμαῖον* ὡς ὕδωρ *αἰχμαῖον*,  
hoc est, de erysipelatosis affectibus, qui cir-  
cum viscera sunt, scribit in morbi ipsius vi-  
gore vtendum esse frigida *αἰχμαῖον*. sic au-  
tem, inquit, dicere solemus, cum simul & fri-  
gidissimam & plurimam aquam in potu da-  
mus. Idem ait Galenus lib. *αἰχμαῖον*. Tra-  
ctum id videtur ab athletis, qui post exerci-  
tationem aquam & affatam & frigidissimam  
bibere solebant.

*Αἰχμαῖον*. est gemma pellucida, candidi coloris,  
genita ex succo non multum dissimili ei ex  
quo fit crystallus, sed validius frigore den-  
sato minusque claro, atque ob id iride &  
crystallo obscurior & durior. Sic dicitur  
quod nec ferro nec igni domari possit, sed  
contra cuncta fere atterat. Nam & ada-  
mantis ruptis fragmentis in ferrum inclusis  
sculptores durissimam quamque gemmam  
perfacile excāuant. Attamen tam singul-  
ris tamque indomita huius lapidis duritia  
calido



calido hirci leonifue calore ita mollescit, ut rumpi queat, & liquido plumbo in ardentibus fornacibus ita incalciscit, ut dissoluatur. Idem verò vim magnetis hebetat, adeo ut iuxta ferrum positus, id magnetem ad se trahere non patiat, aut si iam traxerit, ipse contra retrahat. Dicitur adamas venena deprehendere, & irrita facere, & lymphationes etiam, si credimus, abigere. Quinetiam pauitantium animos, ut aiunt, à vano metu liberat, eamque ob causam anachitem à quibusdam vocatum voluunt.

*A' δαδανι.* significat apud Hippocratem morderi cum pruritu.

*A' δάρην.* est falsilago quædam seu spuma falsuginosa concreta, & velut gelata, in humidis & palustribus locis per siccitates proueniens, atque ipsis arundinibus & cremis adhærescens. Colorem habet qualem flos Asii lapidis. Tota vero forma similis est halcyonio molli & foraminibus pleno, ut palustre halcyonium videri possit. Nasctur in Cappadocia, ut scribit Dioscorides. Acerrimum est & calidissimum medicamentum, adeo ut nullius per se usus in medicina sit: sed cum aliis permistum, quæ vim eius frangunt, extrinsecus corpori admoventi potest. Variè scribitur, ut video, *αδάρην* Dioscoridi, *αδάρην* & *αδάρην* Galeno. Dicitur alio nomine *καλαμύχρος*, id est, calami seu arundinis lanugo, propterea quod in arundinibus cretat lanuginis modo inueniatur. Aetius lib. 3. cap. 180. *αδάρην* *δράκωνος*, *λεμνίτης*, inquit, *καλαμύχρον αδάρην*, hoc est, quæ vocatur adarce: nec dubium est sic dictam quod *καλαμύχρος*, id est in lacubus, nascatur. Sunt autem qui *αδάρην* ab Hippocrate lib. de vlceribus *δράκωνος* dici putent, quod ea plurima in lacu Orchomenio nasci dicatur. Quam male *αδάρην* senserit Plinius, lib. 16, cap. 36, multi ante nos deprehenderunt.

*A' δελφίζεν.* Hippocrates usurpare consuevit, ut lib. *αδάρην*, de iis quæ inter se similia sunt & communicant & cognationem habent, vel eodem tendunt & commiscuntur, maximam rerum similitudinem & cognationem eo nomine designans. Nihil enim similius, nihil cognatiùs, quam fratres inter se videntur.

*A' δελφίζια.* fraternitas, cognatio, communitas, similitudo apud Hippocratem lib. *αδάρην*, hoc est, *συνγενείας καὶ οὐκ αὐταντίας*.

*A' δολα.* sunt medicamenta mordacitatis & acrimonie expertia, quæ alio nomine etiam *απαρα* vocantur. Sic autem dicuntur non modo quod non mordeant partes quibus admoventur, sed etiam quod eas à morfu & acrimonie vindicent, quomodo etiam *αφρον*, & *αφλέγματι* intelliguntur. Illa Celsus Latine lenia appellauit. Est autem ab huiusmodi facultate collyriorum genus vnum *αδάρην* vocatum duorum apud veteres generum. Aliud enim totum emplasticum est, terrea substantia constans, calidi & frigidi medium, vel modice in alterum inclinans,

ut quod constat Samia terra, pompholyge & eius cinere lotis, spodio, plumbo, vito ac loto, amylo, cerussa lora, oui candido, lacte, gummi, tragacantha. Alterum vero exiguum mordacitatis est particeps, quod mista habeat quædam modice adstringentia, ut rosas, thus, (quorum illæ parum adstringunt, hoc parum extergit, concoquit & dolores mitigat) crocum & myrrham. Sunt autem collyriorum, *αδάρην* permultæ differentie: *αδάρην* *αδάρην*, siue *αδάρην* *αδάρην*, de quibus suo loco dicetur.

*A' δολα* dicuntur ab Empiricis, quæ sensibus quidem usurpari & cognosci possunt, sed nondum tamen apparuerunt, ut ait Galenus lib. de sectis.

*A' δολα*, *ενος*, glandula. Est pars corporis simplex, spongiæ modo mollis, rara & friabilis. Alii definiunt *αδάρην* esse carnem in se conuolutam, & ut interpretatur Hesychius, *αδάρην* *αδάρην*. Est autem glandularum genus geminum, sicut & vius. Quædam enim densiores sunt & sicciores, carentque sensu & motu, & mediis sublimium valorum diuisionibus interferuntur, veluti stabilimenta quædam, ne illa per amplas capacitates delata, suisque solis membranis inunita, motibus violentis, tanquam rami à truncis diuellerentur. Huius generis sunt conarium, thymus, & quæ in collo, axillis, omento, mesarzo & inguinibus sunt. Aliæ vero raræ sunt & humidæ, & humore quodam albo viscosoque plenæ, quo vicinas partes humectant & irrigant, ut quæ sunt in mesenterio, intestina, quæ in faucibus & sub larynge, fauces & asperam arteriam. Hæ venas, arterias, & nervos habent, suntque aliis primi generis robustiores, nec tam facile, ut illæ fluxionibus tentantur. In earum numero etiam testes à Galeno censentur, ut & à nonnullis renes, ab aliis cerebrum ipsum, quia molle sit & friabile.

*A' δολα*, hoc est *αδάρην*, negligenter & sine cura. *δολα* enim *βυλλω* & *βρίνιμα* significat.

*A' δολα*, *αδάρην*, est glandulosum corpus ad vesicæ cœuicem situm, in quod vasa semen deferentia inferuntur, priusquam semen in meatum penis emittant. Hic autem *δολα*, vnicus est, & paulo supra cœuicem vesicæ positus totam ipsam amplectitur. Vsum hunc eo loci habet, ut & vasa omnia quæ feruntur in vesicæ corpus fulciat, & vasa seminisque meatum humiditate sua lubricum efficiat. Nomen hoc illi primum ab Herophilo inditum fuisse Galenus auctor est lib. 14. de vsu partium.

*A' δολα*, herba est fere pedalis, folia habens mollissima, parua, in summo incisuris diuisa sicut coriandri, effigie filicis, & cauliculos ex quibus ea prodeunt admodum tenues, nigricantes, palmum altos, radicem autem superuacuam & tam paruam, ut possit nulla existimari, nec caulem nec florem nec semen ferentem. Perpetuo viret, nec folia in eo moriuntur. Nomen ab euentu duxit,

quod folium eius perfusum aqua nō madescat, sicco semper simile. Nam *diuina* madescere est. Siccat & extenuat, in calore autem & frigore temperatum est. Diuersas habet appellationes tum Græcas tum Latinas: Gaza capillum Veneris interpretatus est: aliis cincinnalis, aliis terræ capillus, aliis supercilium terræ vocatur. Hallucinatur officinæ quæ diuersum longe ab adianto capillum Veneris ostendit: cum idem esse bonarum literarum studiosis euidentius sit, quam ut debeat demonstrari. Duo eius genera Theophrastus statuit, candidius & nigrum: quorum hoc, quia valet ad frangendum calculum, potius quam quod in saxis nasceretur, à Latinis saxifragum appellari credidit Plinius.

*Διαιρυσία*. symptoma est ex densitate spiramentorum natū, cum minus quam iustum sit excrementi per cutem effluit. Eius meminit Galenus lib. 11. methodi medendi.

*Διαιρυσία*. colici medicamenti nomen est, quod Galenus lib. 9. *τὸ διαιρυσίαν*, dicit constare his. Sisonis, feminis hyoscyami, pipertis albi, singulorum drach. xl. sacci papauertis drach. xx. croci drach. vj. opobalsami drach. iij. melle exceptis. Nomen id habere videtur, quod ad omnem inflammationem efficax sit.

*Διαιρυσία*. sic dicitur à quibusdam *διαιρυσία*, id est *διαιρυσία*, ut habetur apud Dioscoridem: non dubium quin à noxa & dolore, quem tangentibus excitat.

*Διαιρυσία*. vinū non defæcatum, vel per faccum non percolatum. Id quod fieri solet in vinis conditis ad saporem, vel in alijs ad reprimendam eorum vehementiam.

*Διαιρυσία*. dicuntur medicamenta, quæ sitim obrepere prohibent, quæque sitim sedant siue bibantur, siue delingantur, siue ore contineantur. siue *διαιρυσία*, quæ famem, quanquā etiam simpliciter quæ sitim non inferunt, *διαιρυσία* dici possunt. Ac quoniam præcipua sitis causa siccitas est, patet ea quæ sitim compescunt humida esse oportere: quib. si præterea frigiditas accedat, longe efficacius sitim extinguere valeant. Illa enim humiditatem diutius conseruat, nec eam, sicut calor, absumit. Pleraque tamen etiam calida ad sitim sedandā faciunt, ut glycyrrhiza, & piper in quibusdam, si ore contineantur: illa quod humidi lentique succi sit, hoc quia pituitam ex capite in os & fauces proliciat. Idem possunt etiam potiones frigidae & eclegmata, quæ plurima describuntur à Galeno lib. 11. *τὸ διαιρυσίαν*: ex quibus vnum mox inferemus à facultate eiusmodi *διαιρυσία* appellatum.

*Διαιρυσία*. Plinius scribit fruticem esse spinosum in Nisyro & Rhodiorum insulis, quem alii *ειρυσία*, alii *διαιρυσία*, alii *διαιρυσία* appellant.

*Διαιρυσία*. palma Ægypti. Est arbor magna, non recta, sed contorta, viridis, odore mali coronici, folio simili myrto, fructu capparidis, ad mandendum quidem inutuli, sed grato odo-

re, nullo intrus ligno. Huius fructus qui paulo ante maturitatem collectus est, *μυρσάριον* dicitur: qui vero maturus est & nigricans, *ειρυσία*. Theophrastus arborem hanc à fructu *βάλανος*, quasi glande, appellauit. Vocatur autem *διαιρυσία*, quod fructus eius ante maturitatem decerptus, si gustetur, sitim arceat: vel quod ex huius fructu humidior acerbo & adstringere expresso potus sit sitim extinguens, ut Solinus auctor est, qualis nobis ex pyris, pomis, & sorbis conficitur.

*Διαιρυσία*. dicitur à quibusdam *διαιρυσία*, auctoribus Theophrasto, Dioscoride, & Plinio, quod dulcis radice succo sitis famelique sedetur. Vnde & hydropicis eam multa dedere, ne sitirent.

*Διαιρυσία*. catapoti nomen ab Asclepiade compositi hunc in modum. Seminis cucumeris latui drach. viij. feminis portulacæ drach. viij. tragacanthæ drach. iij. dissolue tragacantham eorumque tridorum recentium candido, & adde alijs optime tritis, omnibusque mistis catapota forma, quæ in umbra sicces. vnum sub lingua teneri iube, & liquorem inde solum delingi. Refert Galenus lib. 8. *τὸ διαιρυσίαν*.

*Διαιρυσία*. arbor est syluestris non procera, similis vnedoni, folio tatum minore, cortice nec scabro, nec squamoso, sed qui circumruptas videri possit, tam tristis est aspectu, fert fructum arbuti nō dissimilem, viret perpetuo cacumine, cum tamen inferiora folia decidant: in montibus frequens nascitur.

*Διαιρυσία*. describitur ab Aetio libr. 13. facit ad colicos, stomachicos, hæmopticos & dysentericos, pluribusque alijs doctibus insignita est, quas eo loco Aetius recenset.

*Διαιρυσία*. sic dicitur à bellij arboris lactyma, non Arabica quidem, quæ præstantissima est, sed Indica, quæ inquinata est, nigra, gradioribus glebis & conuoluta in offas, vnde illi *τὸ διαιρυσίαν* nomen.

*Διαιρυσία*. amplius pulsus. Est qui secundum arteriæ latitudinem & profunditatem auctus est. Differentia est pulsus sumpta à sola distantia. Est autem ei contrarius *εὐρύς*, id est, gracilis pulsus.

*Διαιρυσία*. vini factiij genus est. In musti sextarios viginti additur aquæ dimidium. Feruet donec excoquatur aquæ mensura. Datur ægtis quib. vini noxa timetur. Est enim invalidum ac sine viribus, vnde & illi nomen. Verum Dioscorides parem musti & aquæ mensuram miscet, tum lento igni leuiter decoquit, donec aqua tota consumatur: cumque refrigerit, id in picatum dolium fundit.

*Διαιρυσία*. est abrotoni genus, quod in turbini- bus cadorum aut testa viuiradiæ comprehendit: in quem modum Adonidis hortos pangebant. Eius flos *αἰρυσίαν* dicitur, quod is nō nisi spirante vento vel cōcutiente panditur.

*Διαιρυσία*. dulcis vini genas est, sic dictū quasi semper mustum sit. Apparatur hunc in modum. Musto in doliā condito protinus è lacu mergunt in aqua cados, donec bruma transe-

transeat, vt multo consuetudo quædam fiat  
alendi. Multi namque solus feruor è multo  
vinum facit.

*A. ægæ.* semperuiuū, sedum. Herba est, cu-  
ius tres habentur apud Dioscoridem diffe-  
rentiæ. Maius, minus, & tertium, quod Græ-  
cis *αἰσώριον αἰγίαι*, Latinis illecebram dici  
idem Dioscorides author est. Maius descri-  
bitur caule cubiti altitudinem excedente,  
crassitudine pollicis, pingui, virenti, vallis  
lactariæ (quæ *γαλατίας πύμανος* dicitur) mo-  
do infecto, foliis pinguibus, carnosis, pollicis  
magnitudine, linguæ similib. in cacumine,  
aliis in terram conuexis, aliis in capite stan-  
tibus, ita vt inuicem compacta suo ambitu  
cinctuque effigiem oculi imitentur: vnde  
& *ὀφθαλμίου*, & *βροχίου*, Latinis oculis di-  
ctus est. Minus autem caules habet ab vna  
radice multos, exilia folia, rotunda, pingua,  
mucronata, caulem in medio emicantē pal-  
mi altitudine ferentem vmbellam & florē  
herbacæum atque tenuem. Hæc duo sedi  
genera refrigerant tertio ordine, siccant et-  
iam & modice adstringunt. Tertium autem  
sedi genus folius est putillis, crassioribus, hir-  
sutis, portulacæ proximis. Vim habet excal-  
factoriam, acrem, & exulcerantem.

*A. ægæ.* dicitur à quibusdam *αἰσώριον*, siue se-  
dū maius, quod perpetuū virenti fronde sit.

*A. ægæ.* dicitur à quibusdam *αἰσώριον*, siue se-  
dū maius, ab aureo perpetuoque seminis  
colore.

*A. ægæ.* dicitur à quibusdam *αἰσώριον*, auctore  
Dioscoride: forte ea quæ cæruleū florē gerit.

*A. ægæ.* mel ærium, quod nunc manna di-  
citur, de quo vide in dictione *σπορῶν*.

*A. ægæ.* est lapis interdum candidus, alias gallæ  
colore, aliquando subrutilis, magnitudine  
fere mali. Perfici vel Punici, in vtero, quasi  
prægnans, arenam aut lapidem continēs so-  
nantem dum quatitur. Asiunt quidam etiā  
terram nonnunquam in eo contineri, cum-  
que *γαλῶν* dici. in qua sententia est Plinius,  
qui eodem in acutis ponit. Nā quum ma-  
teria & reliquis omnib. inter se similes exi-  
stant, hoc solo discrimine differunt. Dicitur  
*αἰσώριον* à colore aquilæ candicante cauda, vt  
refert Plinius, vel quod in earum nidis repe-  
riatur. Dicitur grauidis continere partus cum  
lubricæ sunt vuluæ & parum tenaces, fini-  
stro brachio adalligatus: idem vero facilē  
partum efficere, si feminibus alligetur. quā-  
tamen vim solis nido direptis inesse Plinius  
scribit. Omnes æritæ exsiccant, quidam in-  
super adstringunt, *γαλῶν* ea purgat, quæ ob-  
fcurant oculos.

*A. ægæ.* dicitur apud Hippocratem pars recti  
in sublime erecta, & vt Galenus interpreta-  
tur, illud quod triangulari figurā supra testū  
eleuatum est.

*A. ægæ.* dicitur à Galeno os quod à cunei  
forma alio nomine *σπληνῶδες* appellatur de  
quo vide suo loco.

*A. ægæ.*

*A. ægæ.* est propago vna ex venæ canx su-

terioris trunco exorients parte dextra, & o-  
cto costis inferioribus inserta. Eam sub cor-  
de oriri semper à se obseruatum fuisse Gale-  
nus prodidit, ca. 2. l. 5. de locis affectis, & ter  
initio lib. 2. *αἰσώριον*, & extremo lib.  
3. de vsu partium, in iis videlicet corporibus  
in quibus thorax longior erat. Nostro vero  
seculo propter thoracis breuitatē supra cor  
& pericardion exoritur, ad quintam plerū-  
que thoracis vertebrā. Capiunt ex ea nutri-  
mentum tum costæ octo inferiores, tum ea-  
rum spatia, iisque propinqua dorsi medulla  
& thoracis membrana, & qui spinæ eo loco  
inseruiunt muscoli, eiusque rei gratia in octo  
pluresue ramulos funditur. Accum natura  
omneis venas geminas creauerit, vnam de-  
xtram, alteram sinistram, hæc dextra tātum  
est, eamque ob causam *αἰσώριον* à Græcis & vul-  
go ab anatomicis vena sine pari dicta est. Ve-  
rum natura ne sinistrum latus alimento suo  
defraudaret, in id interdum insignem ramū  
mixtur, qui perinde in sinistrum, atque ipsa  
azygos in dextrum, sese explicat.

*A. ægæ.* vide *αἰσώριον*.

*A. ægæ.* Est corpus simplex calidum & humi-  
dum. Vnum est ex mundi elementis, ex quo  
non modo omnia componuntur, verum et-  
iam conseruantur. Siquidē non modo cor-  
pori nostro circumfusum, sed inspiratus etiā  
magnam vim habet ad tuendā, vel corrū-  
pendam sanitatem. Optimus enim eam cō-  
seruat, vitiosus corrumpit. Is autem optimus  
est, qui prorsus sit purus, cuiusmodi est qui  
neque stagnorum, neque paludum halitu,  
neque maligna profundī cuiusdam specus  
exhalatione infectus est. Malus autem qui  
ex cloaca in quam magnæ virbis aut exerci-  
tus sordes conuehuntur, vinum contrahit.  
Malus quoque, qui ex animalium aut ole-  
rum putredine, aut fimo coinquinatus est,  
quique ob stagnum aut flumen vicinum  
nebulosus redditur, quique etiam celsis  
vndique montibus cauo in loco conclusus  
nullis flatibus agitur. Hic enim suffoeans  
putrisque est, ei nimirum similis, qui in do-  
mibus quibusdam clausus est, in quibus ob  
putredinem, quia non diffiantur, plurimus  
fusus colligitur. Est autem omnis eiusmodi  
aer omnibus ætatibus noxius, vt contra, qui  
omnino purus est, omnibus ætatibus salu-  
bris. Reliquæ vero aeris differentiæ, quæ  
ex calore, frigore, siccitate, atque humidi-  
tate habentur, non eodem modo in omni-  
bus hominibus se habent, sed corporibus  
quæ optimo temperamento sunt, etiam aer  
optime temperatus, saluberrimus est: in  
quibus vero aliqua qualitas exuperat, iis vti-  
lissimus ille censendus, in quo maxime con-  
traria qualitas excedit, vt frigidus calidæ, ca-  
lidus frigidæ, humidus siccus, sicciori ve-  
ro quam par sit, tanto humidior, quanto sic-  
citas modum excedit. Eas omnes qualita-  
tes aer admittit pro aquarum, regionum, &  
aliarum rerum, quæ ipsum circumstant, dif-  
ferentiis, à quibus plerumque in contrarias



naturæ suæ qualitates alteratur. Per se enim calidus humidusque est. humidus quidem simpliciter & κατ' ἑξῆς, siue absolute, calidus vero non item; quod ea qualitas igne præpollat.

**Αντιδότης** est Antidotus quam describit Galenus lib. 8. *τὸν κατὰ μέρος*, hepaticis commoda, nephriticis & ictericis. Recipit hæc. Croci drach. ij. cinnamomi drach. j. nardi drach. ij. cassiæ, myrrhæ, iunci odorati, singulorum drach. j. Excipiuntur melle Artico. Mouet sudorem copiosum data fabæ Græcæ magnitudine.

Est & eiusdem nominis Antidotus alia quam Paulus libr. 7. ad Oribasium refert, præcedentem quidem omnem materiam, sed pondere inæquali complectens, & præterea opium. quam ille scribit dolorem lenire & pleuriticis conuenire, & veluti Philonium exhiberi.

Est etiam *ἀντιδότης* collyriū *ἀδινερόν*, quod describitur ab Aetio lib. 7. cap. *ὅτι τὸν ἀδινερόν καὶ λευκὸν καλεῖται*. hoc est, de morfus expertibus & albis collyriis.

**Ἀφύστα**, idē quod *παρεῖται καὶ διορίζεται*, id est, remittitur & resoluitur, apud Hippocratem.

**Ἀθήρημα** est tumor concolor, doloris expertus, in quo aliquid pulcullæ, quæ *ἀθήρη* vocatur, simile tunica quadam membranosa clauditur, cum quo simul aliquando lapidosa quædam duraque corpuscula & alia instar sulphuris ramenta reperiuntur. Interdum vero veluti mansa gallinarum officula. Aliquando vero quasi pilos crassissimo humori implicitos inuenisse se Leonidas prodidit. Philoxenus vero reperta à se animalia intra humorem condita, culicibus aut exiguis muscis similia. Est autem *ἀθήρημα* oblongum, eminens, durumque, quod ut digitis non facile cedit propter humoris crassitiam, sic ubi cesserit, haud prompte reuertitur, quibus quidem notis distinguitur *ἀθήρη* & *μυρμηκίδος*, quæ rotundior, humilior, laticior, molliorque est, & facilius ut digitis cedit, sic postea recurrit.

**Ἀθήρα** est emplastrum laudatum ab Asclepiade, descriptum ab Oribasio, Aetio, & Paulo. Recipit autem Cadmæ drach. xx. æris vsti, malicorii, gallarum, aristolochiæ longæ & rotundæ, salis ammoniaci squamæ æris, nitri, aluminis scissi, aluminis rotundi, iridis, misyos, atramenti sutorii, chalcitidis, zruginis, aloes, myrrhæ, thuris, ammoniaci thymiamatis, galbani, singulorum drach. xxx. ceræ, picis, singulorum drach. c. vel ut alii habent, eo colophoniz drach. cccc. olei sexuncem. Hoc quidem modo apud Oribasium habetur. Asclepiades autem habet aloes drach. xi. myrrhæ drach. xi. & ammoniaci thymiamatis drach. xvi. Arida ad solem æstiuum aliquot diebus teruntur. deinde ea quæ liquari possunt liquefacta adiiciuntur & vniuntur. Magna vi pollet in capitis & neruorum vulneribus:

& à Paulo libr. 4. inter *ἐμπόματα* censebatur.

**Ἀθήρη**, ut inquit Galenus, significat apud Hippocratem, & quod in hordeo acutum est ut in lib. 2. de morbis, & eius partis summæ quæ in cuspidē sagittæ *παρὰ*, hoc est barba, appellatur, ut lib. 5. *τὸ Ἀθήρημα*.

**Ἀθήρημα** nomen est collyrii ad multa oculorum vitia perutilis apud Scribonium Largum, cuius compositio sic habet. Pompholygis lotæ \* P. vii. æris vsti \* P. vii. croci \* P. i. iij. myrrhæ \* P. i. iij. nardi \* P. vi. semis & victoriati. (vel ut Marcellus habet lib. 8. nardi spicæ \* P. i. & pondus victoriati lapidis hæmatitis \* P. i. & victoriati piperis albi grana decem. opii \* P. aur. victoriati (vel ut Marcellus habet eodem loco) opii \* P. i. & pondus vnius victoriati commis \* P. x. Teritur vino Chio.

*ἀθήρημα παρὰ* est collyrium apud Galenum libr. 4. *τὸν κατὰ μέρος*, sed à præcedenti omnino diuersum. Ex quo apparet *ἀθήρημα* nomen plerisque collyriis commune fuisse, sicut & *ἀδινερόν*.

**Ἀθήρη**, athera, vel athara, ut legitur apud Plinium libr. 22. cap. 25. Est pulculla liquidior & sorbilis, ex tritico zeauemolitis inque tenuissimum pollinem redactis confecta, infantibus conueniens. Est autem sorbitio ex zeæ tenuissime, sicut scripsit Dioscorides, molita, quasi liquida pulculla, cataplasmatibus efficax. Vox quidem hæc Græcis recepta, quam tamen Plinius Ægyptiam esse dixit. Ab ea *ἀθήρημα* nomen videntur accepisse, propterea quod in his quiddam pulcullæ huic simile contineatur.

**Ἀθλητικὴ ἔξη**, athletica habitudo. Dicebatur olim carnosa, plena & robusta. Talis enim erat athletarum. Eam autem non natura, sed summo studio comparabant & arte, quam *γυμναστικὴ* appellarunt. Huius enim finis fuit, ita curare corpora, ut multa solidaque carne & sanguinis tenacis atque optimi copia abundarent. Neque enim vires tantum, sed etiam molem pondusque corpori adiuungere conabantur, ut hac etiam ratione aduersarium prosternerent: id quod fiebat multo tum cibo tum exercitio. Cibus autem erat, qui non facile diffunderetur & dissiparetur, sed valentis prorsus materię hoc est, crassus & viscosus, ut bubulæ & suillæ carnes, panis ex caseo, & illa, ut ait Galenus, publice laudata similago, & quæ ex ea fiunt bellaria, quæ ille lib. 5. saniti tuendæ scripsit ab athletis studio preparari, his ad ea quæ moliuntur apta. Panis eorum peculiari vocabulo coliphium olim dictus est, *κατὰ τὸν καὶ τὸν*, hoc est, à membrorum firmitudine. Sumebatur autem ab illis cibis nullo ordine, nullaque lege, ut sic facilius assuefcerent omnia aduersa ferre. Itaque & crapulæ & somno intempestiue indulgebant, in puluere & cæcæno volutabantur, & ad omnia honesta naturæ munia inutiles, Epeo Homericō quāsimilimi euadere nitebātur. Qui his

his artibus talem corporis habitum comparauerant, athletæ præstantissimi habebantur, ipsaque habitudo corporis *ἀλγιστά* dicebatur. Factum tamen est postea, ut eo quoque nomine omnis corpulenta & firma habitudo vocaretur, etiam in iis qui athleticam non excercerent. Inde apud Plautum pugilice, pancratice, atque athleticè valere, pro optime & firmissime: & apud Celsum libr. 4. cap. 6. athleticus victus pro valido & ad vires firmandas accommodato usurpatur, quemadmodum Budens in Pandect. annotauit. Cæterum athleticam illam habitudinem Hippocrates censet non esse secundum naturam, & ea meliorem esse salubrem. Namque propter vasorum plenitudinem proxima periculo est. Itaque neutra potius quam simpliciter salubris dici debet, propter imminens periculum, nisi *υπερβολή* protinus soluitur: alias, ut scribit Galenus comment. in aphor. 3. lib. 1. inculpabilis est, quod athletæ & bonis abundant humoribus, & vires habeant robustas. Eorum quoque sanguinem optimū esse, idem lib. de atra bile prodidit.

*Ἐμπειρία*. vocabulum est empiricæ sectæ proprium, de quo vide in dictione *ἐμπειρία*.

*Ἀπρίον*. quod adstrictum est, & in seipsum contractum. Contrarium est distracto atque disperso.

*Ἀΐον*. ὁ μὲν μύδιον, apud Hippocratem.

*Ἀΐον*. vnguentum populneum, quod ex vua quæ fructus eius est & *βρίον* dicitur, verno tempore conficitur, cum plurimum gravis est prægnansque resina. Est & nomen *ἑλίου φαρμάκου*, cuius descriptionem explicat Paulus lib. 7. cap. 19.

*Ἀΐον*. populus. Arbor est duum generum. vnum *ἄγριον*, alterum *ἀΐον* simpliciter dicitur. Vtrumque procerum, sine flore ligno æque candido, folio bicolore, crepitante, in iuuentia quidem circinaræ rotunditatis, in senectâ vero anguloso, inferne herbae, superne candidæ, pleno lanugine, quæ ut iulus euolat. Discrimen hoc est, quod nigrae populi caudex procerior læuiorque sit, albæ læuis & carnosus, nigrae etiam magis scaber, foliumque angustius quam albæ. Ad hæc nigra sterilis prorsus est, alba fert vvas, quas *βρίον* vocant, vnguentis aptas.

*Ἀΐον*. est nomē collyrii, quo fluxiones commode sisti possunt, quod genus *πικρὸν* appellant. Descriptio habetur apud Aetium.

*Ἀΐον*. à quibusdam dicitur *ἰσχυρὸν*, auctore Dioscor. quod capris grata sit pabulo.

*Ἀΐον*. est apostema inter maiore oculi angulū & nares ruptū atq; exulceratū (antequam enim disruptū exulceretur, *ἄρχον* vocatur auctore Paulo) quod aliquando neglectum paruum fistulā aperit, per quam pituita assidue distillat, idque assidue male habet oculum. nonnunquam etiā exeso ossē vsque ad nares penetrat, atque interdum naturā carcinomatis induit. Intentz in eo venæ & recutiatæ sunt, color pallet, cutis dura est, &

leni tactu irritatur, inflammationemque in eas partes quæ coniunctæ sunt, euocat, ipsique oculo propter viciniam frequenter damnum accersit per naturale paruum foramen quod in angulo habetur, ut scripto prodidit Aetius. Ex his eos qui quasi carcinoma habet curare periculosum est, eos vero quibus ad nares tedit, superuacuum. neq; enim sanescunt. at quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio, quæ quanto angulo propius id foramen est, tanto difficilior est, quoniam per angustum est, in quo versari manus possit. Dicitur & abscessus is *ἀΐον*.

Est & *ἀΐον* auenæ genus vnum quod specialiter Latini festucam appellant: ea autem herba est, quæ non nisi post annum ex semine suo gignitur. folio est tritici sed molliore, summo in capite semina binatè naue rubra habet, ex quibus aristæ capillamenti modo prætenues prodeunt. Spica illi ante messem decidit, ita ut spicilegi tempore spica ipsa inanis & orba grano, vanescensque culmus, quasi festuca reperiatur: vnde inditum illi à Latinis festucæ nomen fuisse verisimile est: eamque ob id Virgilius poeta sterilem auenam appellasse videtur frugum pestes enumerans hoc versu:

*Infelix liliū & sterile dominans auena.*

Sic autem fortasse dicta est Græcis, quod illita cum farina herba *ἰσχυρὸν* oculorum vitio medetur. vide *βρίον*.

Est & *ἀΐον*, auctore Plinio arboris glandiferæ species, quæ fert panos arentes, muscoso villo canos, non in eorricæ modo, sed & ex ramis dependentes cubitali magnitudine, odoratos.

*Ἀΐον* dicitur apud Hippocratem in oculis albicans cicatrix, ut in Prothetico: & albescerent humores concreti, ut in Coacis prædictionibus.

*Ἀΐον*. sic dictum est antiquis scenum Græcum, quod proprie *πικρὸν* appellatur. scilicet à siliquarum figura, quas similes habet corniculis caprinis vel etiam bubulis. vnde & *βρίον* quoq; à Theophrasto cognominatur. Idem & Galenus annotauit in explicatione vocum Hippocratis.

*Ἀΐον*. genus collyrii. vide *Ἀΐον*.

*Ἀΐον*. *ἔλαιον*. Ægyptium oleum. dicitur apud Hippocratem id quod veteres cicinū vocant: at vero *Ἀΐον* *ἔλαιον* hoc est, Ægyptium oleum album, significat id quod ex liliis compositum est, atque alio nomine *κρίνον* & *σύνιον*, id est liliaceum & susinū, appellatur.

*Ἀΐον*. *μύρον λευκόν*. Ægyptium vnguentum album. dicitur apud Hippocratem vnguentum quod & *μυρδάνιον* appellatum est, compositum ex liliis & aromatibus, quamobrem vnguentum non oleum nuncupatur. Idem vero & *κρόμμυρον* & *σύνιον* *μύρον* vocatur. Eo antiquitus mulieres utebantur, nimium cutis candorem occulere volentes. Appellabant autem & alio nomine *πικρὸν*, ut auctor est Pausanias.

*Αιγυπτιακή μύκη*. dicitur apud Hippocratem vnguentum quod ex floribus Ægyptiæ spinæ constabat. appellatum est & *μετρίων*.

*Αιγυπία*. nomen est medicamenti stomachici, quod habetur apud Paulum libr. 7. cap. 14. Est & pessi nomen, cuius compositionem Paulus explicat libr. 7. cap. 24. Est etiam emplastrum cephalicum Andromachi, quod describitur ab Aetio lib. 15.

*Αιγυπιακή πυρίτις*. Ægyptium alumen, quod & *οξύς* & *πυρίτις* appellatur.

*Αιγυπιακή*. dictum est *πυρίτις*, auctore Dioscoride, forte à feminis soliditate & duritia.

*Αἰδύς*. penis, membrum virile, quod alio nomine etiam *καλός* dicitur, ut scribit Galenus. Est pars viri exorta ex ossium pubis ligamentis nata, primum concubitus organum. Fir ex duobus ligamentis, raris sanguine crasso & nigro plenis, tactu ex quilito præditis, ex ossium pubis commissura prope totis prodeuntibus, superne vnitris, inferne distantibus, quantum poro vretico perficiendo, cum cute & membrana carnosa sufficiat, donec in glandem, penis finem, definant. Venas habet atque arterias tum magnas tum multas ab illis prodeuntes, quæ os sacrum præteruehuntur, nervos autem tum à sextæ coniugationis ramis, qui ad costarum radices descendunt, tum ab infima spinali medulla.

*Αἶς*. significat apud Hippocratem aliquando *ἡ ἰσχύς*, id est, donec, sicut & apud plerosque veterum.

*Αἰδύλας*. sunt, auctore Galeno, in summa cute circuli quidam rubentes, iis similes qui ab igne excitantur. sic dicti sunt *ἀπὸ τῆς αἰδύς*. Sunt qui scribant per *αἰδύλας*, quibus suffragatur auctor explicationis vocum Hippocratis.

*Αἰδύλας δὲ*. Galenus *αἰδύλας αἰδύλας* interpretatur.

*Αἰδύς*. apud Hippocratem dicitur *ἄνθραξ*, hoc est, fumus & fuligo.

*Αἰδύλας δὲ*. à quibusdam dicta est *ἡ ἀχρυσία*, id est, oleaster, sicut habetur apud Dioscoridem.

*Αἰδύλας*. aliquando dicitur absolute apud Hippocr. Tunc autem debet subintelligi *κόμην*.

*Αἰδύλας*. herba est foliis verbasco similibus, perquam hirsutis densisq; in orbē circa imam radicem sparsis, caule quadrangulo, aspero, crasso, arcto aut apiastro simili, multis alis concano. Fert semen erui magnitudine, in singulis conceptaculis geminum. Radices habet ab eodem cespite numerosas, longas, crassas, & gustu glutinosas, quæ siccæ nigrescunt, itaq; durantur, ut cornu possint videri.

*Αἰδύλας*. vide paulo ante *αἰδύλας*.

*Αἰδύλας*. est sugillatio in oculis, ex plaga aut ictu effuso sub contusum locum sanguine. Sic quidem Archigenes definiuit, qui etiam idem malum *καταρραγία* appellauit. Sic dicitur quasi *αἶμα ἐν ὀφθαλμῷ*: etiam si in omnia corporis parte nasci diciq; possit. Siquidem Dioscorides etiam cruorem per adipē spar-

sum *αἰμάλαν* nuncupauit, scribens libr. 2. capite de hircino & ouillo seuo: *αἰμάλαν δὲ λυγρὸν ὕδωρ ὀφθαλμῶν, ἀχρὺς αἰμάλαν δὲ καταρραγίαν*. Hoc est, tere paulatim aqua affundens, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur. Galenus etiam *αἰμάλαν* γράσας annotauit *αἰμάλαν* vocari rubentes quosdam in cute circulos, qui alio nomine *αἰδύλας* dicuntur.

*Αἷμα*. sanguis. Duobus modis intelligitur: interdum sincerus & solus, ab aliisque humoribus secretus, interdum vero, & quidem frequentius, ceteros humores secum complexus, qualis fere aperta vena vel arteria excernitur, & dicitur omnes corporis partes gignere & nutrire, sanguineas scilicet, nullius interuentu, sed primo & per se, spermaticas vero intercedente semine. Inest in eo sanguine pituita dulcis & semicocta, quæ postea concoctione in sanguinem transit: inest & bilis pallida aut flaua, sed naturalis & benigna portio, ac etiam humoris melancholici, ut constet partibus omnibus temperamento maxime variis & quantitate. Sanguinis enim sinceri portio plurima deinde pituita & succi melancholici, bilis paucissima. Ex hoc sanguine, tanquam ex penu, singula partes trahunt alimentum familiare, hoc est aliæ magis sanguineum, aliæ pituitosius, aliæ biliosius, aliæ magis terreum & melancholicum. Est autem sanguinis quidem materia chylus à ventriculo concoctus, causa autem effectrix tum natiuus calor, tum ipsa propria iecinoris caro, quam *πατέρισμα* veteres medici appellauit. Quem enim chylum ventriculus & venæ mesaraicæ præpararunt, iecur postea in sinum suum admittit, & in substantiam suam conuertere enititur, sibi que prorsus similem reddere (hic enim vnus est omnium actionum naturalium scopus) non modo colore, sed etiam substantia. Quæ quidem ubi ad mediocritatem est consequutus, tunc sanguis vere est, inter chylum & ipsum iecinoris parenchyma medius. Est igitur sanguis vere effectrix causa iecinoris caro, sicut seminis testes, & lactis glandulæ in mammis reconditæ: sed non ea quidem nuda & sola, omni que ope destituta, verum calore nativo prædita, quem omnium actionum naturalium auctorem esse Hippocrates asseuerat. Hic autem cum temperatus sit & modice humidus, plerique putauerunt sanguinem quoque ab eo genitum, calidum humidumque esse oportere. Hippocrates tamen sanguinem calidum natura non esse existimauit, quod in mortuo animali calorem non retineat, cum tamen alii humores temperamentum proprium etiam post mortem retineant. Est enim pituita semper frigida humida, bilis flaua calida sicca humor melancholicus frigidus siccus. Ex quo apparet in viuo animali mistum aliquid esse sanguini, cuius occasione calidus sit. Est aut id spiritus triplex, naturalis, vitalis, & animalis, & in



eo spiritui cū vehiculo & pabulo calor. Quamobrem sanguis, spiritus calorque natiuus simul moueri solent, nunc foris intro; vt initio accessiōnū, verecundie, per somnū, metum, microrēm: nunc intrus foras in augmento & statu accessiōnū, verecundie, vigiliis, gaudio, aestu, balneo, & id genus aliis: vnde fit, vt animalia sanguinea exanguibus sint calidiora, & partes corporis nostri quāto plus habent sanguinis, tanto plus habeāt & caloris. Hæc quidē cum sit præcipua sanguinis generandi causa, permulta tamen alia concurrunt, à quibus copiosior, purior, faciliusq; vel cōtra prouenit: in primis quidem partium à quibus gignitur puritas aut impuritas, alimenti natura & quantitas, & naturarū p̄prietates quædam. Cæterum sanguis optimus & pulcherrimus, multum rubet, præsertim in venis. Nam ab arteriis fluens flauior est, vt & calidior, cum in ventis sit temperatior. Dulcis præterea est, vt qui fiat à calore tepurato, & crassi ac tenuis medias. Est autem fibrarum plenus, *μακρὸς* vocat, à quarum frigiditate ipsam coagulari scribunt Hippocrates libr. de carnibus, & Aristoteles libr. de histor. animal. vel hoc argumentum, quod cui sanguini sunt hæ fibræ vel ademptæ, vel à natura negate, (vt damiarum, ceruorum & camelorum sanguini) sanguis ille nunquam à frigido concresecet, cum tamen hepatis carni sanguinis fontis, vt & pulmonum, lienis, atq; renum fibræ nullæ sint, nec vllus è cæteris humoribus extra corpus concresecat. quo vno maxime indicio excretionibus melancholici humoris à sanguine crasso & nigro discernuntur.

*Αἷμα δράκοντος*, sanguis draconis. vide. *υδροβαρ*.

*Αἷμα φλεβοειδές*. Eo nomine, inquit Galenus in interpretatione vocum Hippocratis, Dioscorides existimauit significari suppresiones supertumescens sanguinis. Alii vero intelligunt eo nomine plenas sanguine & tumescens venas.

*Αἷμα πηλὸν ἢ αἷμα πύον* *δυσεντερίας*. Sanguinea siue cruenta dysenteria. Vna est dysenteria differentia, in qua sanguis multus sincerusque excernitur: quā in re à reliquis differt, in quibus varia excrementa, biliosa, melancholica, & saniosa vacuantur. Galenus comment. 4. *εἰς τὸ πηλὸν αἶθρον* annotauit eam non proprie dysenteriam esse, vt quæ sæpe citra intestinorum exulcerationem accidat ob iecinoris imbecillitatem, aut intestinorum venis præ sanguinis copia fariscentibus.

*Αἷμα πέπλος*, lapis est saturato colore niger & cinabarin referens, glebæ fere semper figura, sed aliquādo vuarum modo effotmatus, ex ramentis saxi rubri terræve, sicut & schistus lapis, concretus. Fit enim ex sedimine quod aqua abrasit à saxis terrisque rubris, vel hoc argumento, quod ubicunque *αἷμα πύον* aut *μακρὸς* reperiuntur, ibidem sint saxa rubra & terra eiusdem coloris: quomodo in Sinopide rubrica hæmautem reperi Dioscorides scribit atque ideo vel affriētus

ad cotem, vel in pila tritus succum remittit, vt & lapides omnes, qui eandem habent originis rationem. Quia vero is sanguineus ab hæmarite redditur, sic propterea dictum plerique volunt, inter quos est Acrius libr. 2. At Galenus quod lapis ipse sanguinei coloris sit, ita recte dictum putat Theophrastum sequutus: alii verò à propria vi nomen accepisse, quod sanguinem profluentem sistat. Adstringit enim & exsiccat, simulque calefacit atque extenuat. quibus facultatibus præditus multorum morborum præstātissimum remedium est, siue succus eius cotē exprimat, siue ipse vstus in puluerem vertatur. Vrendi autem rationem Dioscorides L. 5. prodidit. Fit ex eo collyrium, quod *αἷμα πύον* appellatur, conueniens aspretudini oculorum. describitur autem à Galeho libr. 4. *τὸ πύον*.

*Αἷμα δασύρον*, sic dicitur quod fœnō Græco ab radice statim subnascitur, singulari caule, nec multum dissimili consurgens, verum multo breuiore.

*Αἷμα κερχρον*, significat apud Hippocratem quicquid in sanguinis profluvio inducit eam rursus cupi ditatem, quam medici *κέρχρον* appellant. Est autem morsus quidam subasper irritans in aspera arteria. Erotianus vero dicit apud Hippocratem significare ea, quæ simul sanguinolenta sint & sicca. *κέρχρον* enim appellasse Atticos *τὸ ξηρόν*. Hesiychius autem *αἷμα δρυς* simpliciter exponit *ἡ χροῦς*.

*Αἷμα ῥαγία*, sanguinis profluvium. Est sanguinis è vena vel arteria vacuatio, interdum critica, vt plurimum verò symptomatica. Ea autem tribus de causis contingere potest, tunica earum diuisa, aut resecato earum ore per *αἰσθημύον*, aut transcolatus siue transmissus per *δυσπύον*. Diuiditur tunica vulnere, contusione, ruptione, erosione: *αἰσθημύον* accidit propter tum vasis imbecillitatem, tū sanguinis qui ad os eius impetu ruat copiam, adhæc acrem quampiam, quæ illi extrinsecus incidat qualitatem. *δυσπύον* ex tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine verò tenuato oritur: accidere præterea interim potest & ex gurgulium vasorum ore adaperto. Cæterum à partibus fere omnibus profluere sanguis potest, naribus, ore, thorace, pulmone, ventriculo, iecinore, intestinis, & hæmorrhoidibus: atque earum partium *ἢ αἷμα ῥαγία* dicitur, à quibus ille profluit. Verum apud Hippocratem cum simpliciter *αἷμα ῥαγία* dicitur non addito partis nomine quæ sanguinem fundit, id modo sanguinis profluvium intelligitur quod è naribus manat, vt annotauit Galen. comm. 1. *τὸ δασύρον*. Cum autem *τὸν αἷμα ῥαγία* nomine omne sanguinis profluvium intelligi possit, eo tamen proprie dicitur quod confertim fit, *καὶ τὸ πύον*, quod apud Hippocr. significat *αἶθρον ῥαγία* hoc est, impetu & confertim prodire, vt Galenus *ἐν ταῖς γλώσσαις* explicauit.

*Αἷμα ῥοις*, duo significat. scilicet ipsum sanguinis effluuium per venas quæ in ano sunt, vt

scribit Galenus lib. de atra bile, ubi ait symptomati hæmorrhoidis nomen impositum: tum venam ipsam, quæ in ano est, dilatatam, sanguinemque fundentem atræ bili mixtū. Sunt autem huius duæ summæ differentiæ. Alia cæca est, alia aperta. Cæca dicitur tum quæ intra laret, nec videri potest, tum quæ conuier, nec sanguinem vllum remittit, vt licet ex Paulo intelligere lib. 3. cap. 59. Similiter aperta duobus modis dici potest, vel quæ visu conspicua est, & tumet extra sedem, vel quæ sanguinem certis circuibus fundit, quamuis in alto posita sit, & oculis non subiecta. Cæca ingentes dolores excitat. Aperta vt, si moderate quidem fluat, plerisque morbos curat & imminentes arceat, sic nimium sanguinem excernens cachexiam, hydropem, aliosque graues morbos parit. Sunt vero & aliæ τῶν αἱμορροΐδων, differentiæ, quas definitionum medicarum author recenset. Differunt enim inter se magnitudine, numero, figura, quod basim vel angustam vel latam habeant: loco, quod alix in ano, alix in sphinctere consistant: ad hæc more, quod alix mites, alix vero malignæ sint. Vnde autem hæ venæ prodeant, an à caua vena, an ab altera quam portam appellant, video apud anatomix professores controuersum esse. eorum tamen melior pars in eam sententiam inclinat, vt venæ portæ rami sint, nec ad cauam pertineant. Ac quamuis eæ solæ venæ quæ in ano sunt sanguinem effundentes, αἱμορροΐδες proprie appellentur, attamen ad earum similitudinem etiam venæ quædam circa vteros mulierum sanguinem profundentes eodem nomine à medicis dicuntur. Easdem enim fere habet quas & aliæ differentias, & paria symptomata inducere solent. Consistit autem illæ aut in osculo vteri, aut in collo, aut in ipso vtero, aut, quod raro accidit, in pudendo: easque si non tactu, certe per dioptram licet intueri. Et illæ quoque sua incommoda, sicut & superiores, habent.

**Αἱμοδία.** dentium stupor. Sunt autem qui non simpliciter stuporem dentium, sed stuporem dentium à visu aut auditu excitatum interpretentur. cum videlicet ea, à quibus hi duo sensus abhorrent, percipiuntur: veluti cum limarum aut serræ attritus exauditur. Verum Galenus definit αἱμοδία esse affectum ori soli, nec tamen toti, sed dentibus gingiuisque accidentem ab acidis & acerbis cibis. eum oratione quidem explicare impossibile est, sed cum quis eiusmodi cibos manducauit, vt iis dentes & gingiux male afficiantur, affectum hunc in eo & omnibus similem esse credimus, qualem in nobis ipsis experimur. Sunt autem qui τῆς αἱμοδίας nomine omnem simpliciter dolorem dentium intelligant.

**Αἱμοδία.** dicitur apud Hippocratem qui est ab Æno ciuitate Thraciæ. eundem vero & αἱμοπικόν aliquando vocat.

**Αἱμοδία.** significat apud Hippocratem τὸ πᾶν

ῥεῖν & πλανᾶν, hoc est, quasi vagari & errare.

**Αἰσ.** lolium. herba est hordei effigie, folio angusto, pingui, & hispido, semine exili, in cortice aculeato, flore subpurpureo. Nascitur ex tritico & hordeo, corruptis vligine seminibus, aut imbre nimio dilutis. Calfacit & siccat tertio fere ordine. Fecit ex eo emplastrum nigrum Heras, valens ad fistulas, & aliarum inguinumque abscessus. refertur ab Aetio lib. 15. cap. de emplastris emollientibus & discussoriis. Inde deductum est αἰσῶν ἄλευρον, siue αἰσῶν ἄλευρον, hoc est, loliacea farina, apud Hippocratem.

**Αἰσχομυθὴν** significat apud Hippocratem οἷς τῶν βλαστημάτων, αἰσχρὸν & ἀσχηρὸν ἀσχημάτων μνημονεύειν, id est, turpium impiarumque rerum meminisse, sicut interpretatur Galenus comment. eis τὸ ἀσχηρὸν.

**Αἴτια.** Causa. Multiplex semper habita est apud philosophos & in varias species digesta. De quibus tamen omnibus non est hic agendum, nisi quatenus earum cognitio distinctioque medicinæ conducit. Maxime quidem communis, & ab omnibus recepta causarum diuisio est secundum quatuor hæc genera, materiam, formam, efficiens & finem: à quibus causa omnis materialis, formalis, efficiens, & finalis dicitur. Materia quidem siue subiectum (neque enim refert vtro modo appelles. sola enim ratione distinguuntur, re ipsa eadem sunt) humanum corpus est: forma, quandiu quidem homo sanus est, probum temperamentum: cum vero ægrotat, ipsa morbi species in materiam siue subiectum impressa: vt calor præter naturam, formalis causa febris est. Efficiens autem, humor à quo morbus excitatur, aut intemperies, aut aliqua omnino incommodationis solutæue continuitatis efficiens causa: finis vero in morbis, actio læsa. Interrogantibus enim nobis, quænam sint febris tertianæ causæ, responderi potest, hepar quidē causam esse, tanquam subiectum, vel calorem acriorem, vt formam, vel bilis putredinem, vt efficientem, vel hominis agri interitum, tanquam finem, ad quem morbi omnes, nisi curentur, spectant. Veruntamen duæ potissimum considerantur, non à medicis modo, sed etiam à vulgo: efficiens & finis, sed maxime quidem efficiens à medicis, apud quos tam late patet, vt reliquis generali quadam significatione complectatur, & quæ de causis scripserunt, omnia promodum ad eam referantur. Ea namque sola videtur corpus immutare, & ex sano ægrum reddere. Definitur esse à qua aliquid fit, vel (vt scribit Aristor) quæ primum mouet. Nos latius vsurpantes causam efficientem esse dicimus, non solum à qua primo fit motus, sed simpliciter omnem, quæ rei efficiendæ præbet operam, siue primo & per se, siue, secundo & per accidens, siue vrinstrumentum, sicut videtur sentire Galenus lib. 1.

lib. 1. loc. affect. Verbi gratia: iecinoris facultas causa est effectrix sanguinis. similiter & calor natus causa est eiusdem efficiens, quamvis natura eo videatur uti tanquam instrumento in omnibus muniis obeundis. Cæterum huius generis causarum materiã, inquit Galenus, iuniorum medicorum probatissimi quatuor generibus complexi sunt, eamque distinxerunt in sumenda, facienda, educenda, & foris incidentia. His enim causarum generibus non modo custodia sanitatis perficitur, verum morbi etiã omnes generatione acceptam ferunt. Ac sumendorũ quidem nomine cibus, potio, & si quid medicamentorum intro sumitur, atque ipse etiam aer inspiratus intelligitur: faciendorum vero, frictio, ambulatio, vectio, equitatio, denique motus omnis: præterea somnus, vigilia, & venus: educendorum vero, omnia quæ in corpore continentur, quacunque ex parte ferantur. Ex foris incidentibus primus est circumdatus nobis aer, deinde quæcunque lauantium vnguentiumque cuti propinquant. His enim omnibus alteratur immutaturque corpus, vel ad bonam vel ad aduersam valetudinem. Verum eadem causarum genera dilucidius mihi videntur distinxisse, qui omnes in externas aut internas diuiserunt. Est autem externa, quæ extra corpus posita, ipsum bene maleue afficit. Hanc & euidentem appellat, quod omnis prope oculis conspicua sit, aut alio aliquo sensu pateat: Græci *αἰσθητὴν* sine *κατὰ φύσιν αἰτίαν*, aliquando *αἰσθητὴν* appellant. Eas medici in duo genera partiuntur, necessarias & non necessarias. Necessariarum quidem sunt, quæ extrinsecus occurrentes necessario nobis ferendæ sunt, quod nec eas fugere & declinare, nec sine iis viuere liceat, ut in yniuersum aer, cibus, potus, motus, quies, quæ excernuntur, quæ retinentur, & plurimarum animi affectiones. Nō necessariarum vero, quas vitare possumus, & si ne quibus vita potest seruari, ut hic aer, hic cibus, hic potus, equitatio, ambulatio, somnus post meridiem, hic vel ille animi affectus: ad hæc omnia quæ casu aut fortuna contingunt. Interna vero causa dicitur, quæ intra corpus posita ipsum bene vel male afficit. Afficit & in obscuro posita, & morbos continens causa dicitur, à Græcis autē *αἰσθητὴν*. Huius generis est humor redundans vel deficiens, probus aut vitiosus, qualitates similiter modum seruantes vel excedentes. adhæc robur aut imbecillitas singularum partium: Sunt autem earum causarum duo genera. Vnã est generis sui nomine dicta *αἰσθητὴν*, altera vero continēs & proxima, quã Gal. indifferenter vel *αἰσθητὴν*, vel *αἰσθητὴν* scribit appellari posse. Est autē *αἰσθητὴν* quæ cum sit intra corpus, nō tamen primo per se, siue immediate alicuius causa est, sed alia causa intercedente. Continens vero causa est, ex qua primo & immediate aliquid fit. Sunt tamē qui hanc postre-

mam internæ causæ diuisionē in antecedentē & continentē, nugas esse putent, dicentes omnem internā causam simplicē esse, neque vllam continētē propriamq; dici debere. In quo tamen, pace eorum, bonaq; venia dixerim errare mihi videntur. Nam quemadmodū in rebus externis vnus eiusdemque operis possunt esse plures causæ sese mutuo consequentes, sic & in interno corpore. Id quod exemplo plurium calculorum, quorū primus ab homine motus mouet secundum, secundus tertium atque ita deinceps, Gal. in l. de sympt. differ. aperte declarauit, & multis aliis rebus iudicare licet. Ignis enim rarior intra tormentum bellicum accensus pilam æneam summa violētia impellit, hæc muros & arcem prostermit, quorū ruina melior firmiorque præsidii pars opprimitur, proinde reliqui arcē hosti dedūt. Obsessionis quidē finis (quē & effectū dicere possumus) deditio est. Huius proxima continensque causa (licet mihi, arbitror, hanc hypothesin fingere) militū qui arcē tueantur paucitas, paucitatis autē, ruina arcis quæ maximam militū partem oppressit, ruinæ vero, ictus quo pila ænea arcem verberauit, ictus autē causa fuit ignis intra tormētum spatiis nimium angustis conclusus. Hæc quidē deditiois causæ fuerunt, nec tamē omnes primo & per se, sed, ut ita dicam, mediatæ. Sic intra corpus res habet. Exempli gratia: crassus & viscosus humor obstructionē inducit, obstructio perspirationem cohibet, cohibita transpiratio putredinē excitar, putredo calorem præter naturā, hoc est, febrē accēdit. Ex hac hypothesi sunt febris causæ quatuor ordine sese consequentes: è quib. proxima & coniuncta febris causa putredo est, prima autē & maxime remota, crassus & viscosus humor. oēs tamen internæ sunt. Itaque ut inter eas discrimen esset, veteres medici proximam causam continentem vocarunt, reliquas vero antecedentes, internas tamen & ipsas. Magna enim reuera inter eas differētia est. Nō est igitur insectandus Auicennas, si coniunctam continentemq; causam à reliquis antecedentibus distinxerit. In hoc enim & rationem & Galenum authorem securus est, qui similiter eas distinxit cap. 5. l. 1. de sympt. causis, agens de iis quæ in sensu tactus consistunt. Torporis, inquit, causa est vita desens, & succorum crassorum vel lentorum abundantia, quam internam esse nō est dubiū: continens vero, siue aliter eā appellare places, est talis quispiam in nervo affectus, cuius occasione à principio ad ipsum virtus transmitti prohibetur. Idem explicans aphorif. 30. lib. 7. Fiunt, inquit, alui excrementa spumosa spirituoso humore ex capite ad ventriculū defluēte: fiunt & vasis, quæ ad ipsum perueniunt, illum effundentibus, fieri potest aliquādo & id ab ipso ventriculo, vnam habēs causam continentem, quomodo cūq; excernatur aut fiat, antecedentes vero plures. Est autem huius pituitæ continēs causa flatu-



sus spiritus, dū humori commiscetur, vehementē habens motū & inæqualem, ita vt & ipse disrumpatur, & pituita frangat in multas ac paruas partes. Talis vero motus ipsius causa est, & propria natura, & caloris nonnūquam multitudo. Verum nullibi euidentius quam in libris de causis pulsuum. quas cum statuat triplices, externas, internas, & continentes: externas quidem hyemem, æstatē, cibum, potum, motum, quietem & similes: internas vero humorum crassitiem, copiam, acrimoniam: continentes vero, facultatem vitalem, usum & instrumentum: manifesto continentes causas siue coniunctas, & coherentes ab internis differre demonstrauit. Ex his ergo apparet triplices esse causas, euidentes, antecedentes, & continentes, quæ & ipsæ in antecedentium genere continentur. Nec est tamen necesse omnes in omnibus rebus haberi, cum sæpe vnus rei vna vel gemina tantum causa sit. Galenus in Arte parua omnes causas in tria genera partitus est, salubres, insalubres: & neutras: salubres rursus diuidens in conseruatrices atque in effectrices sanitatis. Insalubres sunt morborum causæ, & ex eorū numero quæ præter naturam habentur. Diuiduntur & causæ aliter in duas differentias, vt alia per se, alia per accidens dicatur. per se quidem cum propria & infra facultate, nulliusque interuentu aliquid efficit. per accidens vero, quando non propria & ingenua vi, sed alio interueniente. vt aqua frigida corpori affusa per se & proxime refrigerat, per accidens autem calefacit, densata scilicet cute, & intus coherceto calore natiuo, & vires maiores colligente. Similiter scammonium per se corpus calefacit, sed quia bilem calidā expurgat, per accidens refrigerat. Est & alia causarum diuisio in tria genera, in eam per quam res fit, in eam sine qua non est, in eam per quam melius est. Ea per quam res est, primaria & principalis dicitur, atque eadem cum ipsa rei forma videtur esse, per quam, vt ait Aristoteles, vnumquodq; est id quod est, & agit id quod agit. Præcipua quidem ignis actio est ea quæ sunt eiusdem generis congregare, & separare quæ sunt genere diuersa: cuius actionis triplices sunt, de quibus nunc dicimus, causæ. Ac primaria quidem per quam id ipsum agit, eius calor est à quo, vt à præcipua vi, ignis simpliciter calidus dicitur: secunda vero causa, sine qua congregatio similium & separatio dissimilium non fieret, est ignis & eorum corporum contactus ad omnem actionem necessarius: tertia vero per quam melius actio illa perficitur, est ignis siccitas, raritas & tenuitas. Sic enim & quæ congregantur & quæ separantur, melius suis finibus terminantur, ipseque ignis altius penetrans, & in minimas portiones diuisus, in mixtionis intima subit, & omnia quæ congreganda segregandaue sunt, contingit. Sic quidem se habent omnes fere causarū differentię. qui plures desiderat, legat Aristote-

lem lib. 2. physic. Non est autem prætermittendum omnem causam ad aliquid dici, vt ait Galenus, scilicet ad effectum suum comparatam. Siquidem idem potest & causa & effectus dici, diuersis tantum rationibus. Prohibita transpiratio effectus est obstructionis: eadem vero causa est putredinis. Ex quo patet omnem causam in comparatione ad suum effectum dici.

*Αἰσθητικὴ*. pars est medicina quæ causarum differentias & vires expendit. Cum autem causæ duplices sint, vt docuit Galen. salubres & insalubres, quarum illæ ad tuendam sanitatem, hæ ad morbum gignendum plurimum habent momenti, non est dubium ambarū cognitionem ad eam medicinæ partem spectare, sed earum maxime à quibus morbi prodeunt: quam ob causam etiam à quibusdam *παθητικὴ* pars eadem dicta fuit. Eam in totum neglexerūt olim methodici, sed maximi semper fecere dogmatici Hippocratis vestigiis insistentes.

*Αἰσθλιον*. sic quondam apud Eboenses dictum est granum Gnidium.

*Αἰών. ὁ βίος*. apud Hippocratem.

*Αἰώνιος*. sic dictum est à quibusdam *τὸ αἰεῖσθαι*, hoc est, sedum maius, quod fronde sempiternum sit, & perpetuo vireat.

*Αἰσθησις*. gestatio. Est corporis exercitatio ex motu statuque composita. Nam cum alia omnes exercitationes corporis motione obeantur, sola gestatio ex motu & quiete mixta videtur esse, quod permultæ corporis partes nullo per eā videatur motu exagitari, cū tñ totum corpus ab eo manifeste moueatur à quo gestatur. Quo fit vt hoc exercitationis genus utilissimum lenissimumque sit, nullā corpori lassitudinem inducens, nec tamē minus comouens magnis exercitiis. Ea calor natiuus, vt & reliquis ventilatur & excitatur, dissipatur superflua, corporis habitus robustior euadit, omnisque ad obeundas actiones stupor excutitur. Cum autem multis modis gestari corpus possit, hi præcipui sunt: primus in lecto, eoque, vel pensili, vel rotis subnixo: secundus in lectica, siue in ea homo desideat, siue decumbat: tertius in curru: quartus in nauis, qui omnium vehementissimus est, & mutationes plurimas maximasque inducit. Præterea species est *ἡ αἰσθησις* Escilatio Latinis dicta: hoc est pensilis quædam gestatio & agitatio corporis: quæ per lusum veteres utebatur feris Latinis, in memoriam & imaginem vitæ humanæ, in qua altissima interdum in infimum deiciuntur, infima in altum efferruntur & euehuntur. Siquidem homines eo lusus genere impositi transuerso rigore arboris suspensio iactabantur, alternis in sublime epecti & depressi. Est etiam equitatio, quædam species gestationis, verum minus propria, quoniam equitantes non equi modo, sed suo etiam motu manifesto exercitari videntur. Cæterum quibus corporibus affectionibusque singulæ gestationis species conueniant, Actius lib. 3. cap. 6. explicauit.

*Ἀκαίροι πόροι.* dicuntur ab Hippocrate dolores, quos praesens eo temporis corporis dispositio non potest ferre, vt annotat Galen. comment. *εἰς τὸ πᾶσι διατῆς ὄζων.*

*Ἀκακάλις.* semen est fruticis in Aegypto nascentis, fructui tamaricis simile. nomen habere dicitur à nymphea Acacali. Vt autem scribit Hesychius, *ἀκακάλις* est flos narcissi.

*Ἀκακία.* est spina fruticosa, magnitudine arboris, non recta, florem gerens candidum, & semen lupino simile in folliculis. tota excepto caudice aculeata est. Nasitur in Aegypto triplex, alba, nigra, & viridis. Acaciae fructum Galen. lib. 1. *ἢ ἡ ἕψ τῶν πύς, καὶ ἐπὶ τῇ ἀκακίᾳ* appellari scribit, hoc est, filiquas spinæ, ad differentiam opinor filiquarum arboris ceratoniae, quæ simpliciter *καρὶ πα* appellantur. Ex semine succus cū sponte, tum vi & compressu manat, qui siccat in umbra, & ex maturo semine niger, ex viridi subrufus euadit: optimus est prorsus leuis & modice rubes. Dicitur & ille *ἀγκία*, arboris suæ nomine. Est autem testibus Oribasio & Aetio *ἀκακία* arbor eadem cum spina Aegyptia, nisi quod acacia etiam alibi quam in Aegypto nascitur. Acacia adstringit, acerbæ & frigida est secundo gradu, sicca autem tertio. Verum quæ in officinis hodie acacia ostenditur, non est illa veterū, sed ex bacculis prunorum agrestium coctis succus expressus tessellatim cōfectus insolutusque, quem pro vera acacia minimo errore usurpamus.

*Ἀκακίφη.* vrtica, herba est genere duplex. Vna sylvestris, quam fœminam vocant, asperior, latioribus nigrioribusque foliis, semine lini sed minore. Altera non æque aspera, minuto semine. vtrique semen copiosum est & nigrum. Sylvestris rursus plures sunt differentiae. Quæ cania dicitur, acrior est & caule mordaci & fimbriatis foliis: quæ vero odorem fundit, Herculana nominatur: quæ innoxia est morfu carens, anonium vocatur. Omnes tenuium partium sunt, & sine morfu deficcant. Sunt qui dictam velint ab acrimonia & vstione, quod ἡ καλὴ ἀφὴν habeat. Aliter etiam *κρίδι* appellatur, *ὅθεν τὸ κρίδι*, quod mordere significat.

*Ἀκανθα ἢ Ἀκανθος.* herba est foliis lactucæ, multo latioribus & longioribus, erucæ modo diuisis, pinguibus, læuibus, nigricantibus. Caulem habet binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope verticem ex interuallis circumdatū foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus, semen oblongum, luteū, caput thyrsi specie: radices glutinosas, longas, rubentes, muscosas. Nasitur in hortis petrosis & riguis. Non esset in aculeatarum censu, nisi foliorum extrema per caulem in spinulas occalescerent. Hunc alii *πυκνὸν ὄζον*, alii *μελάμυλλον* vocant. Ea videtur esse quæ in officinis brancha vrsina dicitur, Vim habet discutiendi & siccandi.

Cæterum ab acanthi similitudine tota etiam vertebrarum spinalis medullæ compa-

ges *ἀκανθα* dicta est, nec modo ipsa tota, sed singuli etiam vertebrarum processus in corporis posteriora exerti, & aculeo spinæque non dissimiles. Est & *ἀκανθα* peculiari nomine dicta pars ea τῆς κνήμης, quam proprie *ἀπὸ κνήμων* appellant, anterior scilicet tibiæ angulus, quia multum acutus sit.

*Ἀκανθα ἀρχία.* ἢ *ἀκανθος ἀρχεός.* Acanthus sylvestris. Est plāta scolymo similis, eiusdem cum superiore generis (hæc enim sylvestris, illa satiuæ est) sed breuior & magis aculeata. Vires satiuæ consimiles habet.

*Ἀκανθα λευκή.* spina alba. Est frutex aculeatus, pruni magnitudine, cortice ligni candido, molli folio & chamæleonis albi simili, angustiore cadioreque, subhirsuto, spinis infesto, flore albo odorato, acinis cum pubescunt viridibus, deinde per maturitatem rubris, myrti specie, ligneo intus nucleo. hos vulgo senellas vocant, deturbando calculo efficaces. Radix eius siccat, & modice adstringit: semen tenue est & calidum.

*Ἀκανθα Διγυθία* siue *Ἀ' ἐρβινὸν.* frutex est, qui, vt ait Dioscor. spinæ albæ similis esse creditur. valde siccat & astringit. vnde & sanguinem & alias defluxiones retinet.

*Ἀκανθινὸν.* dicitur lacryma helxines herbæ iucundi saporis, quæ in huius summo vertice continetur. hanc non simpliciter *ἀκανθινὸν*, sed *μαστίχην ἀκανθινὸν* Plinius appellat lib. 2 1. cap. 16.

*Ἀκανθίων.* herba est similis albæ spinæ, foliis minoribus, per ambitum aculeatis & lanugine araneosa obductis, qua collecta depexaque vestes bombycinis similes texuntur. Diminutionis forma dicitur quasi spinula. Est enim albæ quidem spinæ proxima, sed vt dictum est, minoribus multo foliis.

*Ἀκανθίς.* dicitur à quibusdam ἢ *ἀκανθα Διγυθία*, vt habetur apud Dioscoridem.

*Ἀκανθίαν.* terrestris erinaceus dictus est à Sorano, vt scribit Gal. 1. 1. *ἢ ἡ ἕψ τῶν πύς.* propterea quod *ἀκανθαίς*, id est, spinis armatus sit.

*Ἀκανθος.* idem quod ἡ *ἀκανθα*, de qua supra.

*Ἀκανός.* herba est spinosa, brevis, latioribus quam eryngii aculeis, capite magno, chamæleoni albo simili, eadem fere cum acino herba, nisi quod acinos ocimastrum est. id est, sylvestris ocimi genus. *ἀκανός* eryngio quibusdā, inter quos Aetius est, contribuitur. Proxime accedit ad eam, quæ vulgo Gallorum calcatrepa nominatur.

*Ἀκαπνον.* à quibusdam dicitur τὸ σάμψνον, vt habetur apud Dioscoridem. Sed & *ἀκαπνα* Græci vocant omnia ligna arida.

*Ἀκαρνη.* herba est cui spina est pro folio, vt inquit Theophrastus, cneco similis vrbano, colore tantum rufo, pingui succo. videtur genus quoddam esse atractylidis.

*Ἀκατέστητον.* inconstans contrarium τῆς κατέστητον. dicitur de anno & eius temporibus: Hippocrate.

*Ἀκατέστητος πυρετός.* dicitur ab Hippocrate febris in qua nihil est κατέστητος, id est, firmum certumque, nec vnam exquisitè formā seruat,





nemo dubitabit frigidum humidumque esse: quibus tamen qualitatibus non tam delecteretur, quam vi totius sue substantiæ. Nomen habet quod vel Aconis, qui Periandynorum pagus est in Ponto, vel in cantibus, quas Græci ἀκόντας dicunt, plurimum proveniat. Pandectarum author unum aconiti genus idem facit cum napello apud Arabas celebri: sed falso, cum potius videatur hellebori nigri species esse. vide de eo suo loco.

**Ἀκόντιον.** idem quod ἀκόνταρον, id est, nulla calce oblitum, & non picatum. Nam Dioscorides de fuligine resinæ agens, ἀκόντιον, τῷ τῷ ἀκόντιον, exponit: & quod habetur apud eundem lib. 2. de cantharidibus, ἀκόντιον, Plinius sic vertit, Conduntur in vase fictili non picato. etiamsi κοία calcem non picem significet.

**Ἀκνιος.** dicitur à quibusdam ἀκνός, ut habetur apud Dioscoridem.

**Ἀκνίς.** est gemma guttis aureis stellata nitro similis pumicola, ita dicta, quod cum ea oleū subferuefactum perunctis lassitudinem, si credimus, inquit Plinius, soluat.

**Ἀκνία.** dicitur proprie medicamentum, quod omnem lassitudinem ex multo & vehementi corporis motu exortam illitu leuat. Hæc prima fuit τῷ ἀκνίᾳ significatio. Sed vsus paulatim nomen id extendit etiam ad medicamenta similem sortita compositionem, quamvis aliis, quam tollendæ lassitudini, commodis inseruiant. Neque enim ad eam tantum, sed ad dolorem etiam veterem in alto corpore delitescentem, vel ad motum sensumque difficilem, vel ad tensionem scirrholque componuntur. Adhibentur & iis, inquit Oribasius, qui cum pinguedine corpori inducere molliantur, nihil tamen cibis, potibus, perfusionibus, balneis, aliisque id genus remediis proficiunt. Quæ omnia ut ἀκνία recte dici possint, satis est si humida sint consistentia & τῷ ἀκνίᾳ simili. Ea autem media est inter σκληρίματα, & liquida cerata, tanto illis crassior, quanto his liquidior est. Sunt autem τῷ ἀκνίᾳ fere omnia facultate duplicia, alia calefacientia, alia emollientia. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, semine rorismarini, & similibus constant, valentque ad nervorum vitia, & perfrictiones magnas, quæ vix villo calore superari possunt. Quæ emolliunt, durities, scirrhos, & infractos articulorum sinus discutiunt, atque morbis adhibentur diutinis. Additur vero ab Oribasio tertia τῷ ἀκνίᾳ differentia, eorum videlicet, quæ cutim scarificant. Caterum miscentur aliquando calefacientia emollientibus, illinunturque commodissime diuturnis affectibus, quique ægre elidi possunt, & quibus sinapismus congruit. Miscentur & vnguenta quædam ad solam odoris suavitatem, & μυρωδία appellantur, eiusdem tamen cum acopis generis & facultatis, & nihilo illis præstantiora, præter odoris gratiam.

**Ἀκνός.** à quibusdā ἡ ἀκνός dicitur auth. Plin.

**Ἀκρόν.** herba est caule & foliis & lanugine spinosa mordax & cui spina pro folio est, auctore Theophrasto, similis cneco urbano, colore flavo, succo pingui, similima τῇ ἀκρόν, si cadidior esset, & decerpta cute sanguineum cruorem funderet.

**Ἀκρόν,** vel ἡ ἀκρόν, herba est indidis folio, sed angustiore, & radicibus non dissimilibus, verum implicatis, nec in rectum tendentibus, sed summo cespite obliquis, geniculis distinctis, albi cantibus, gustu acribus, & odore non ingratis. Calfacit & siccat ordine tertio. Hic vere est doctissimorum iudicio χαλαρός ὁ ἀκρόν, aliis vero potius galanga maior est siue crassior: cum tamen illa eiusdem plane generis cum minori videatur.

**Ἀκρόν.** apud Hippocratem πληρομένον, hoc est, repleta, ut exponit Galenus.

**Ἀκρόν.** dicuntur quæ ebrietatem fieri ventant, vel iam factam discutiunt. alio nomine ἐμύδων appellantur, de quibus ante dictum est.

**Ἀκρόν.** apud Hippocratem, τὰ ἀκρόν, hoc est, summa & extrema.

**Ἀκρόν διαχωρήματα ἐμύδων.** dicuntur apud Hippocratem deiectiones & vomitus, vnius tantum vacui humoris speciem habentes & aliis humoribus impermixti, sicut Galenus interpretatur comm. eis τὰ ἀκρόν. Maxime tamen ea quæ exquisitæ & sincere biliola sunt, hoc nomine vocare solet, sicut annotavit idem Galenus comment. in librum primum τῷ ὁδημῶν. Cum vero apud Hippocratem ἀκρόν, σίξ, legitur, nequaquâ de rubente sanguine distillante, sed de nigro semper intelligitur, ut scribit etiam Galenus comment. 1. & 3. τῷ ὁδημῶν.

**Ἀκρόν.** est imbecillitas vniusque partis, sed proprie dicitur vitium stomachi non continentis quæ sumpserit.

**Ἀκρόν.** idem quod τὸ ἐμύδων. Latine mulsum.

**Ἀκρόν.** hoc est, ἀκρόν ἐμύδων, hoc est, summa vespera, id est, prima & incipiente: apud Hippocratem & Nicandrum.

**Ἀκρόν.** idem quod ἀκρόν.

**Ἀκρόν.** qui bilem meram congerit, apud Hippocratem.

**Ἀκρόν.** dicitur à Galeno quicquid in suo genere legitimum est & exquisitum, numerisque omnibus absolutum: ut ἀκρόν τριτῶν, febris tertiana, quæ veræ exquisitæque tertianæ notas omnes habet. quod tale non est, ὡς Galenus appellat.

**Ἀκρόν.** duo significat apud Hippocratem & medicos, σθένος τῆς κεφαλῆς, hoc est, nullam omnino crisim, aut δυσκρίσιαν ἢ μορβὸν κεφαλῆς, id est, difficilem malamque crisim: ut annotat Galenus comment. 2. in lib. 1. τῷ ὁδημῶν.

**Ἀκρόν.** dicitur apud Hippocratem lib. de hebdomadæ, quasi ἀδύκρον, hoc est, immensum infinitumque spatium. loquitur autem de eo quod est extra mundum, vel infinito

velinani, quod cogitatione informari non potest.

*Ἀκροβυστία*. idem quod *ἀκροποδιά*.

*Ἀκρόφυα*. dicuntur fructus omnes arbori, sed proprie quæ lignosum putamen habent, ut malum, Panicum, castaneæ, pistacia, auelanzæ, iuglandes: quod genus appellatione nucum apud Latinos continetur. eoque *ἄκρο φυτόν* differre dicuntur, quod hæc exterius lignosi nihil habeant, ut pyra, mala, Damascena, pruna.

*Ἀκρομήριον*. sic dicitur pars media umbilici.

*Ἀκρότατος*. in summa parte affectus, apud Hippocratem lib. *περὶ ὁσμῶν*. Apud eundem etiam in Prothetico *καρκίνος ἀκρότατος* dicuntur, qui videntur in summa cute seu superficie corporis. quibus oppositi sunt *οἱ κρῖνοι* siue *ἰσχυροὶ καρκίνοι*.

*Ἀκρόπλοα*. significant apud Hippocr. ea, quæ superne & tanquam in summo nauigant & innatant.

*Ἀκροποδιά*. præputium. cutis quæ glandem integrit: dicitur & simplici vocabulo *πόδη*. Verum ut habetur apud Iulium Pollucem, *ἀκροποδιά*, siue *ἀκροπόδιον*, non totum præputium significat, sed eam modo præputii cuticulæ partem quæ prominet, & vrinæ meatum integrit. Cui etiam astipulatur Rufus, definiens *ἀκροπόδιον*, *τὸ ἔξω τῆς πόδης*: id est, præputii extremum.

*Ἀκρότατος*. dicitur apud Hippocratem, quod in superficie mutatum est.

*Ἀκρότατος*. dicitur à quibusdam *βρόμος* herba, siue auena.

*Ἀκρόχρ.* dicitur ab Hippocrate totum id quod à cubito ad extremam vsq; digitorum aciem est, *χρῖν* enim ab eodem nuncupatur quicquid à scapulis ad extremos vsque digitos habetur, quod in brachium, cubitum & extremam manum diuiditur.

*Ἀκροχλιαρόν τετιόν*, *ἀκρος χλιαρόν*. id est, summe tepidum, apud Hippocratem *περὶ διαίτης ὁξέων*. Est autem summæ tepidum quod inter frigidum calidumq; exquisite medium est.

*Ἀκροχρόδιον*. est verruca dolens quæ sub cute coit durior & paulo asperior, callosa & plerumq; teres, coloris eiusdem, infra tenuis, ad cutem latior, fabæ fere magnitudine, pueros maxime infestans. Vis vna tantum eodem tempore nascitur, sed fere plures, eaque nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem concitant: sunt quæ etiam in pus vertantur. Dicitur hoc nomine propterea quod, ut ait Aetius, similis sit vertice suo resectæ chordæ secundum extremitatem, vel sicut existimat Celsus, quod in imo vsque adeo sit angusta, ut pendere videatur. Tota enim foras prominet, adeo ut excisa nullam radiculam relinquat. Vnde & verruca pensilis à nonnullis Latine vertitur, quod basian gustiore prædita videatur pendere, summæ chordæ similis. In eo differt *ἀπὸ τῆς μύρμινας*, quod cum utrumque vitium cutis ex-

crescentia sit, in tuberculi modum, hæc tamen præterquam quod similem formicæ mordentis sensum inducit, basim etiam habear latiore, & nigro colore prædita sit, atque, vbi à chirurgo tollitur, sanguinē fundat copiosiore quam eius magnitudo ferre videatur.

*Ἀκρόφυον*. significat apud Hippocratem nudū, quasi *τὸ ὄν ἔστι ἀπὸ φύλης*. id est, summa in parte tenue, vel nudum.

*Ἀκρόμυον*. est omoplazæ in superiori eius finē in rectum tendens *ἀπόφυσις*, per quam scapula ipsa clauiculæ copulatur. In hunc usum à natura producta est, quo & firmior ea copula esset, quàm veluti vallum quoddam sic *ἀπόφυσις* illa contegit, simulque prohiberet, ne sursum brachii caput excideret. Definitur etiam à Galeno in libro *περὶ ἀρθρῶν*, spina in dorso omoplazæ (quæ ipsam omnium maxime facit inæqualem & gibbam) elata, progressa, dilatataque. Item omoplazæ *ἀκρόμυον* vocatur, quia ipsa clauī committitur. Aliis *ἀκρόμυον* dicitur os cartilagineum clauem cum omoplata connectens, ligamentis membranosis ab ipso exortis. Quod quidem plerique hominis proprium esse asserunt, inque hominibus solis deprehendi, alioque nomine *κατακλιθεῖσα* appellant. Id primis annis cartilago est, deinde vero ætatis aut temperamenti siccioris occasione in os degenerat. quo fit ut acromium ipsum Hippocrati os, Galeno cartilago dicatur. Quidam anatores periti definiunt *ἀκρόμυον* esse *τὴν συνέχου* summi humeri cum clauicula, ut memoriæ prædidit Galenus in lib. de ossibus.

*Ἀκρωτίς*. dicitur lingua ab Hippocrate lib. 7. *περὶ ὁσμῶν*, tanquam sua ipsius extrema non informans, hoc est, inarticulata propter motus difficultatem, ut annotat Galenus in explicatione vocum Hippocratis.

*Ἀκρωτήρια*. dicuntur proprie maiores & extremæ corporis partes. Eo nomine Aristoteles appellat extremam partem digitorum sub vnguibus latentem, & extremam partem ossium.

*Ἀκρωτεία*. est extremarum corporis partium, videlicet manuum, aut pedum, vel putrescentium, vel quarum ossa petierunt, per ferrā dissectio. Namq; vbi summæ partes, ut manus, aut pes, compuituerunt, vel earum ossa contabuerunt siue ab externa causa disrupta, siue ab interno affectu putrescentia, quoniam inutilia redduntur, & noxam vicinis primum partibus, deinde vniuerso corpori inferunt, necesse est eos ferrula præcidere. Verum prius necesse est corpora ossibus circumdata diuidere. Quia in re si quando metus est ab immodico sanguinis profusio, recte consulit Leonides non omnia primum corpora secanda, nisi ex toto putredine contabuerint, sed eam solum partem, vbi nec plures neque grandiores esse venas aut arterias existimamus: quas tunc deuitare oportet, deinde os protinus ferrā præcindendum, & panniculus lineus partibus lectis circumpo-

componendus, ne ferrâ per ipsâ tracta dolores exciret. Atque tunc reliqua parte vasîq; excisis ferramenta cadentia vasî inficienda, sanguinîque profluvio suppresso, linamentis infertis & cōuenienti deligantur adhibita, medicamentis vtendum quæ pus moueant.

**Αμπία.** legitur apud Plinium, & describitur ab eo grani foliorum odore, caulibus anisigenicularis, semine nigro vt hederæ, bacis mollibus. Sic dicta videtur quasi sambucea, id est, τῆ ἀκτῆ similis. Potest ea esse quæ Gallis dicitur hyebulum, quod est longe humilius sambuco, magisque herbaceo generi assignandum.

**Αμπύ.** sambucus. frutex est duorum generum. Vnum arborefcit, surculos habens arundini similes, rotundos, cauos, albescentes, proceros, & fere sine nodis: folia autem iuglandis tria vel quatuor ex interuallis circa ramos excurrentia, odore graui, incisuris pluribus. In ramis siue caulibus umbellas fert floris albi, mox acinos terebintho similes, ex nigro purpureos, racemosos, succo plenos vinoîsq;. Radicēs agit tellure summa, nec multas nec grâdes. Alterum autē genus est herbæ quam arbori similis, & breuius, humi iacens, caule quadrangulo, geniculato, densis articulis, foliis amygdalæ, per ambitū sedis, longioribus ramis & graneolentibus, quæ per interualla ex singulis geniculis pennata exeunt. Umbellam in summo fert sambuco similem, floresq; similiter & fructum. Græci vocant χαμαίαν αμπύ, & Latini peculiari nomīne ebulum. Vtrumque genus refrigerantis est, & siccantis facultatis.

**Αμπύ.** dicitur à quibusdam τῆ βοῦνι, vt habetur apud Dioscoridem.

**Αμπύ.** acinus siue fructus sambuci.

**Αμπύ.** glans ilicis. ἡ τῆ ὀπίου καρπῆς, vt ait Hesyehius. nam βάλανος, siue glans, proprie robori apud Græcos & Latinos tribuitur.

**Αμπύ.** dicitur à quibusdam τῆ ἀλυσμα, vt habetur apud Dioscoridem.

**Αλβάστρον.** est vasculum ex læui & lubrica materia efformatum, seruandis odoribus maxime conueniens, quod vt plurimum ex solidissimo & frigidissimo lapide conficere-tur. Id quia propter læuorem suam non facile posset teneri manibus, sed dilaberetur, hoc nomen sortitum est ἀλβῆς, στερεοῦ μο- εἶν, ὅτι λεβαίν.

**Αλβάστριν.** est species marmoris, sic dicti quod ex eo ἀλβάστρα vascula maxime conficerentur: neque enim lapidis quem alabastrum vocant, id primum nomen fuit, sed quoniam ex eo alabastra fierent, inde vocari cœptus est: cum prius, vt scribit Dioscorides, ὀνίξ diceretur. Vim habet in medicina: namque vltus alabastrites si resina vel pice excipitur, duritias discutit: si cera, ventriculi dolores mitigat, siue his ginginas reprimat cum sale fossili grauitates oris & dentium extenuat.

**Αλβάστρινος λίθος.** ἢ Αλβάστρινος, est lapis subniger & flauus, vt inquit Actius, sed qui ramen

magis ad purpureū inclinat. Pellacet quasi segmentis quibusdam aut fissuris discrimi-natus. Trinus pilos nigros efficit.

**Αλβία φθίσις.** dicitur apud Hippocratem libr. de locis in homine, corruptio, tanquam cæca & inuisibilis.

**Αλβός, πυφός.** id est, cæcus, apud Hippocratem.

**Αλβύπιν.** dicitur à Theocrito τῆ ἐξυλάτῃσιν ab effectu, quoniam aluum exinaniat. Attici enim ἀλβύπιν inanitiones appellant.

**Αλβύπιν.** significat apud Hippocratem eum qui sit ex Alaptis. Sunt autem Alapz oppidum Thraciæ.

**Αλβύπιν.** dicuntur apud Hippocratem tum facinorosi homines, qui talia perpetrant ob quæ cruciari mereantur: dum dæmones ipsi eorum vindices.

**Αλβύπιν.** medicamentum ex sale cōfectum, purgandi vim habens. Constat vt plurimum magna salis portione, semine apii, spica nardi, aniso, sulphio, pulegio, petroselino, pipere, cumino, zingibere, ad scammonia, vel epithymo, vel lathyridibus pro specie vacuandi humoris. Vtus eius est aut cum cibis, sicut salis, aut mane etiam aliquo liquore dilutus ieiunis certa mensura exhiberi potest. Huius cōfectionis formulas aliquor habent Paulus libr. 7. cap. 5. & Actius libr. 3. cap. 108.

**Αλβύπιν.** dicuntur sæpe apud Hippocratem τῆ νοσήματι, hoc est morbi. & ἀλβύπιν similiter ægrotare, & ex morbo pati.

**Αλβύπιν.** significat apud Hippocratem idem quod θερμαίνω, id est, calefacere.

**Αλβύπιν.** vnguenti nomen est sic temperatū, vt in oleo liquores tantū aliqui aut etiam adipēs vel medullæ remissæ sint, & inde exactā olei spissitudinem acquirat. Id genus etiam simplici vocabulo μύρον appellatur. Si vero cera aut resina aut aliquid eiusmodi addatur, vt medicamentum ipsum crassitudine τῆς ἀλβύπιν simile euadat, composito nomine μύρον αλβύπιν nuncupatur.

**Αλβύπιν ὕδωρ.** dicitur apud Hippocratem aqua conferto imbre collecta. ἀλβύπιν enim idem quod confectum congregatum.

**Αλβύπιν.** apud Hippocratem oleum vel adeps.

**Αλβύπιν.** lapis est, qui in ventriculo & iecino-re galli gallinacei aliquando reperitur. Habet vt plurimum figuram lupini, magnitudinem eiusdem aut fabæ. colorem modo in cinereo candidum, modo fuscum, sed dilutum: interdum vero crystallina specie est, sed coloris obscuri, fibræque interdum habet subrubras.

**Αλβύπινος.** cristæ. Herba est folio gallinacæ cristæ simili, caule tenui, & semine nigro in siliquis. A solo Plinio sic describitur, à reliquis veteribus silentio prætermissa.

**Αλβύπινος ἔμφυτος.** Alexandrinum emplastrum viride ad extrahendum. Recipit aluminis scissilis p. vii. salis ammoniaci p. vii. squamæ aris p. xvi. myrrhæ, thuris, singulorum p. xvi. ceræ p. cl. resinæ Colophoniz aut pineæ p. cc.



olei heminam, aceti sextarium. Refertur à Corn. Celfo lib. 5. cap. 19.

*Ἀλεξήριον βασιλικὸν καλούμενον.* est flicum collyrium magnæ aduersus cicatrices atq; albugines vtilitatis. Constat croco, spica Celtica, & terra ampelicide. Refertur ab Aetio lib. 7.

*Ἀλεξήριον.* est antidotus & amuletum fascinationū & veneni cuiuscunq; siue intro sumpti, siue morfu infusi. Placuit tamen quibusdam, vt ait Galenus, ea tantum *ἀλεξήριον* nuncupari, quæ venenatarum bestiarū ictibus medentur eoq; differre *ἀπὸ τοῦ ἀλεξήριασμα*. Sed hoc discrimen nihili Galenus æstimat. Ego potius id inter ea, si quid differant, interesse crediderim, q̃ *τὸ ἀλεξήριον* intro sumitur, *ἀλεξήριον* foris imponitur, non veneni modo causa, verum etiā depellendæ fascinationis, vt quæ collo appenduntur. Verum apud Hippocratem *ἀλεξήριον* simpliciter significat *πρωήγµα*, id est, remedium *ἀλεξήριον* enim idē quod *πρωήγµα*.

*Ἀλεξήριον* proprie dicitur medicamentum quod deleteriis pharmacis medetur non extrinsecus quidem corpori impositum, vt quod *ἀλεξήριον* nominatur, sed intro sumptum. Quæ tamen duo vocabula sunt qui confundant, nec putent differre. Dicuntur *ἀπὸ τοῦ ἀλέξεν*, quod à veneni noxa vendicent. quomodo & amuleta Latinis ab amolendo.

*Ἀλέοις.* apud Hippocratem *ἀθροισίς*, id est, collectio & congregatio. vnde *ὕδωρ ἀλέοις* aqua dicitur ab eodem conferto imbri collecta.

*Ἀλέουσι, ἀθροίσουσιν.* apud Hippocratem.

*Ἀλευρον.* vide *ἀλεψις*.

*Ἀλέως, ἀθρόως.* apud Hippocratem confertim & cumulatim.

*Ἀλν.* idē quod *ἀλνν*, de qua postea.

*Ἀλννον ἔλασιν.* idē est quod *τὸ ἀμυγδαλέον ἔλασιν*, vt scribit Aetius lib. 7. cap. 69.

*Ἀλνς, εὐς.* condensus, confertus, coaceruatus. vox frequentissima apud Hippocratem.

*Ἀλνθῶσις, πηλυνσι.* hoc est, decipiant, apud Hippocratem.

*Ἀλθαία.* ibiscus. Genus est sylvestris maluæ, habet folia grandiora, & vt cyclaminus, rotunda, lanuginosa, florem rosaceum, canlē binum cubitorum, radicem lentam, viscosam & intus candidam. Vis eius discutit, laxat, inflammationem abigit, lenit & phymata coequit. Radix autem, & semen reliqua quidem intensa habet, verum exterit etiā vitilignes abstergitq; præcipue autem semen calculos confringit. In summa valet ad plaurima, sicut Dioscorides prodidit. estque eius vsus in medicina tantus, vt inde nomen habuerit, quod inter primas sit velis, & pluribus polleat remediis, ob quæ à quibusdam etiā *ἀρκευαία* dicitur. *ἄλνς* enim remediū & *ἀλθαίον* mederi significat. Ex ea emplastrum Poletēs faciebat eximii vsus, quod refertur ab Aetio lib. 15. cap. de emplastris emollientibus & discussoriis.

*Ἀλθῆν, ὑγιαίνειν.* id est, curare & sanare, apud Hip-

poctatem. dicitur & *ἀλθῆν*.

*Ἀλθῆς, ἰασίς.* sanatio, apud Hippocratem.

*Ἀλνπκόν.* est emplastri nomen, quod duplex habetur apud Aetium lib. 15. cap. de emplastris discussoriis & attractoriis.

*Ἀλνκαβος.* est solani genus hoc priuatim nomine donatum, quod est frutex surculosus verius quam herba, foliis solano sarioo similibus sed latioribus, caule postquam increuit, prono & inclinato in terram. semine in folliculis rotundis ad speciem vesicarium (vnde & *φυσάλις* siue vesicaria nominatur, etiā si Plinius scripserit sic dictam quoniam ad vesicæ calculos valeat) orbiculato, singulari quale cerasium, rubenti & leni, & acinis vinarum simili. flore hederaceo, sanguineo, radice cum siccescit, albicante. Officinæ alcaquengi vocant. Scripsit etiā Dioscorides halicacabi nomine alterum solanum *μακρόν* nuncupari. Verum halicacabus & vesicaria vera est quæ à nobis descripta est, vt inquit Galenus. Vim habet hortensis solani, sed cibus inutilis est. regium morbum purgat semine poro, & vrinam pellit. Fit ex eo pastillus ad omnem eminentiam, rimas pudēdi, condylomata, verrucas & alia multa perutilis: quem describit Aetius libro 14. cap. 3.

*Ἀλννς.* est frutex similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus, sepimento vallari idoneus. Duobus modis scribitur, modo nude, mirabili, vt ait Solinus, effectu, quod admorsa ea fames interdium nulla sentiatur, ab apriuatua particula, & *λννς*, quasi famē arceat. eius enim folia decocta in cibos admittuntur. modo cum aspirationis nota, quoniam inaritimum olus sit: & eam ob causam *ἀλννς*, à salifugine, dicitur Aetio. Valet radix eius ad conuulsa, rupta, tormina, drachmæ pondere in aqua mulsa pota, & lactis similiter vbertatem facit.

*Ἀλννς* etiā à quibusdam vocari *τὸ ἄρπυιον*. Dioscorides author est, forte quod *τὸ ἄρπυιον* & foliis & radice edendo sit, & famem cohibeat.

*Ἀλνπρον.* est succi cuiusdam concreti species, acris, subamari, salsi, rari, tenuis, leuis, & aeris, qui facillime in puluerem solui potest, & ignem concipere, inq; flammam mutari. Ex eo tormentarius puluis ad excutiendos globos ferreos apparatus. Conficitur vel ex terra quadam, qualis est in Saxoniz campis, in acervos condita & sarmentis contecta quo facilius putrescat vel ex eo veluti flora & polline, quem tum in cellis vinariis, tum in locis opacis gypsati maxime parietes exundant. Vbiq; fere salpetrum appellatur. Abstergit & vires non valde à nitro diffidentes possidet, etiā si ab amaro & vero illo nitro multum differat.

*Ἀλνπρῆς.* sunt medicamenta, vt ait Celsus, quæ truentis protinus vulneribus iniiciuntur, quæ *ἰνγµα* Græcis vocantur. Hæc enim reprimunt inflammationem, nisi magna vis eam cogit, atq; illius quoque impetum minuat,

hauriunt, tum glutinant vulnera quæ id patiuntur, & cicatricem iisdem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoque *ἀλκήματα* nominantur, *ἀλκή* πέντε καὶ αὐτὸς ἐν ἑκαστῷ: hoc est, à pinguitudine, & à priuatiua particula. Dicuntur ab Aetio *ἀλκήματα* ab eadem origine L. 13. c. 126.

*Ἄλς*, significat ἀρόον, hoc est, vniuersum & cumulatè, sicut Galenus interpretatur comment. eis τὸ περιήκον.

*Ἄλμα*, est herba cui folia sunt plantaginis, sed angustiora, & in terram reflexa, caulis tenuis, simplex, & rudis fistulæ instar, cubito maior, capitibus thyrsi, flos albus, tenuis & aliquatenus pallidus, radices tenues, vt verrari nigri, acres, odoratæ, modicè pingues. A quibusdam *δαμασκόνη*, ab omnibus plantago aquatica vocatur. Sistit aluum & tormina: tumores illita mitigat, estq; optimum leporis marini, ranarum rubetarum, & opij alexipharmacum.

*Ἄλς*, sic à quibusdam dictam fuisse *ἡλὸς ἐλξήλως*, Dioscorides author est.

*Ἀλφειος* arbor est glandifera, cortice & caudice crassissimo, & plerūque canato fungosoque. Sola corde carere dicitur. nec alia putrescit in eo genere, etiam cum vivit. Pessima carboni & materiæ breui putrescit, iccirco ædificiis damnatur. Sic dicitur quasi falsi cortex, amara enim esse perhibetur.

*Ἄλκαρ βουθήμια*, id est, remedium apud Hippocratem.

*Ἀλκία*, est species sylvestris malux, cuius folia verbenacæ similia sunt, eoque modo quæ illa diuisa, caules autem terni aut quaterni, cortice canabino vestiti, flos paruus, rosæ similis, radices albæ, obliquæ, quinque aut sex, cubitales. vulgo bismalua sylvestris dicitur. vsus radicis alceæ ex vino vel ex aqua dysentericis, aluo citæ, ruptis, conuulsis. *Ἀλκία* etiam dicitur à quibusdam τὸ ἀλσος, vt habetur apud Dioscoridem capite περὶ ἀλσος.

*Ἀλκιδίδος*, est secunda species anchusæ, quæ & alio nomine *ὀνοχλέος* dicitur. Sic vocatam putant quod ea Alcibiades ad formæ venustatem vt solitus esset. Vide in dictione *ὀνοχλέος*.

*Ἀλκίδιον*, idem quo *ἔχον*, autore Nicandro in Theriacis. sic autem dictum est ab Alcibio eius inuentore, qui cum à vipera ictus fuisset, eius herbæ succo remedium adeptus est.

*Ἀλυνόνιον*, est spuma maris concreta admissis sordibus tenuissimis. Id ex auibus quas Græci *ἀλυνόνες*, Latini Halcedones vocant, hac de causa nomē inuenit, quod ex eo mari innatante nidos fingunt & construunt, Eius, vt Dioscoridi & Galeno placuit, quinque sunt genera. Primum est figura spongiæ simile, sed spissum & graue, quod putidos olet pisces, & copiosum in littoribus inuenitur: alterū figura longiuscula, foraminibus plenum, læue, odore algæ simile: tertium ad vermiculi figuram propius accedit,

& ad purpuræ colorem, sed est molle: id Milesium nominant: quartum lanis pinguitudine sordidis est simile, foraminibus plenum, læue: quintum quia leue, simile fungi videtur esse, intris quia asperum, pumicis: quod acre est, sed odore caret. Plurimum, vt Dioscorides scribit, in Besbico Propontidis insula nascitur: atque id patrio nomine *ἐλὸς ἄχλω*, id est, maris spumam, appellant. Hoc nomen nunc omne halcyonium obinet, excepto subrotundo, quod ex figura pilæ marinæ solemus nominare. Vltimum genus non modo, vt reliqua, abstergit, & per halitum digerit, sed quoniam calidissimum cutē corrodit & pilos absument. Theophrastus halcyonium pumicem esse scribit. Primum & secundum quia exterunt & inducunt leuorem, iis mulieres cōtra lentigines, impetigines, lepras, vitiligines, nigredines, vultusque & reliqui corporis maculas vtuntur: tertium vtile vrinæ angustis & arenis in vesica concrementibus, & renum doloribus, & aquis cutem subcuntibus. Crematur in fornace cum sale cōiectum in fictile crudum, donec fictile coctum fuerit: lauitur autem Cadmiæ modo.

*Ἀμνησίδης*. Est tunica foetus, inter chorion & amnion mediā, tenuis, infirma & angusta, foetum tantum medium ambiens. Vna est è tribus illis membranarum foetus inuoluentibus, sed tenuis & infirma, vt quæ gignatur ex ferrositate & muliebri semine, imbecillo & pauco. Angusta autem est, fasciæque modo infantem cingit: neq; enim eum totum cōprehendit, sed à mucronata cartilagine ad ilia vsq; tantum extenditur, & ab vno vteri cornu ad alterū vsq; porrigitur. Duabus autem tunicis constat, quarum vna chorio, altera amnio adhæret. Inter eas vrina foetus continetur: vrachus enim à vesicæ fundo in partem eius ampliorem inseritur, vrinamque ibi effundit, ipse postea per allantoidem tunicam diffusus, inq; eam degenerans. Commodū enim naturæ visum est vrinam illam tam acrem vt nares allantoidem secantium feriat, eisque horrorem inducat, longius à foetu in huius membranæ spacium abducere. Sic dicta est quod *ἀμνησιν*, hoc est farcimini, similis sit. Quod non ita intelligendum est, quasi re aliqua plena sit concisis carnibus simili, quibus intestina farciri solent (est enim allantoides inanis potius quam plena, præsertim quæ amnio inhæret, nisi si quando magna vrinæ copia sit, quæ cornibus allantoidis iam repletis in partē eius ampliorem regurgitet) sed quod intestino cuidam similis videatur, ex quo farcimina fieri consuevere. Est enim figura longa, angusta, rotunda, extremis partibus in vteri cornua subeuntibus, paulatim gracilescens, donec in mucronem desinat.

*Ἀμογρόν*, *ἀμοφρονήσις*, hoc est desipiens, apud Hippocr. quasi *ἀλλὰ γινώσκων* *ὡς* *τὰ* *ὄντα*. id est, alia percipiens quam quæ sunt. Idem etiam ab Hippocr. *ἀμοφρονήσις* dicitur.

*Ἀλλοιοποιεῖται. τρεῖς πταὶ πινύλαος.* hoc est, vertitur varie: apud Hippocratem.

*Ἀλλοίωσις.* alteratio. Est immutatio eius quæ præfuit qualitatis in contrariam qualitatem, ut, cum aliquid ex frigido calidum, aut ex austero dulce fit. Quod si alteratio motus est, motus autem omnis in ipso fieri esse suum obtinet, pater interea dum noua qualitas inducitur, alterationem esse: posteaquã vero inducta est, & in subiecto corpore remanet, non amplius alterationem, sed *ἀσθένει*, hoc est, affectum siue affectionem, nuncupari. Alteratur enim is qui nigrescit, vel qui calescit: alteratus vero est qui iam nigrescens est, vel incaluit. Itaque alteratio, generatio est qualitatis. Nec vero si depositionem vel mutationem eius, quod prius fuit, dicas, id pugnet cum eo quod nunc dixi, alterationem generationem esse qualitatis, cum ambo in idem recidunt. Nam & quæ prior in corpore qualitas fuit, mutatur, & nunc noua gignitur. Verum quoties cuiuspiã, quod substantia non sit, generationem esse dicimus, non idem eo sermone significamus, sicut cum absolute generationem proferimus. Nam quæ absolute generatio nominatur, via est in substantiam: quæ vero huius vel illius generatio dicitur, via est in illius (ut ita loquar) entiam siue substantiam. Neque enim aliud est alteratio, quam rei affecta assimilatio ad efficientem. Nam quicquid agit, nititur id in quod agit sibi assimilare, siue à primis qualitibus, siue à secundis ipse motus fiat. Siquidem ab his qualitatum differentis duplices in genere alterationes Gal. constituit, alias específicas, quæ proprie & primario dicuntur alterationes, alias vero quæ contrahunt, vel contendunt, vel quomodo liber aliter afficiunt corporis nostri particulas, quæ sane potius per abusionem quam proprie & primum alterationes nuncupantur. Ac specificæ quidem alterationes dicuntur, quæ ex specie aliam speciem inducunt, ut cum ex pane, præsana, lente, sanguis, pituita, bilis flaua, & atra, atque ex his postea adeps, os, neruus, caro, arteria, vena, generatur, nutriuntur, & augentur. Siquidem dum in uentre venis que cibis concoquitur, easque quas exposui mutationes perpetitur, tota sua substantia alteratur, veteremque naturam exuit, in aliam transiens speciem. Itaque non modo cibi concoctio, siue in ventriculo siue in venis & iecinore fiat, sed & assimilatio & nutritio species sunt alterationis, non etiam generatio, quam verius constare ex alteratione formationeque, quam alterationem esse dixerimus. At vero omnes eiusmodi in aliam essentia speciem alterationes mutationesque non aliunde quã à caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate proficiuntur, citra quas nihil potest ex specie in speciem commutari. Atque hac ratione & primæ & elementariæ & specificæ qualitates appellantur. Quæ autem ab aliis contingunt alterationes, veluti quæ se-

cando, aut contundendo, aut segregata coarctando perficiuntur, nihil profus ex propria natura in aliam conuertunt, propterea quod à secundis qualitatibus multo infirmioribus proficiuntur.

*Ἀλλοιοποιὶ δυνάμις.* Alteratrix facultas. Est facultas naturalis attractu alimentum parti quæ alitur assimilans. Siquidem demonstrauit Galen. in qualibet parte quatuor generatim esse facultates, quarum prima attractrix est, quæ peculiare parti succos & appetit & attrahit: alteram deinde esse alteratricem eius alimenti quod attractum est, eoque in opere alimentum mox futurum apponi, agglutinari, assimilari: atque huic alias duas postea deferuire, vnam quæ alimentum retineat, donec concoctio nutritioque perfecta sit, alteram vero quæ expellat quod per concoctionem tanquam inutile seceram est. Itaque alteratrices facultates in omni animalis genere tot membratim erunt, quot habet in se elementares particulas alterandi facultate præditas. Habet enim vnaquæque particula similis suam vim alteratricem, quæ ex menstruo matris sanguine eam particulam generauit. Dicitur autem ea generaliter quidem alteratrix, siue concoctrix, membratim vero assimilatrix & nutritoria. quæ quidem vigente valenteque nutritio cuiusque partis optime procedit, infirma vero atque afflicta in atrophiam necessario incurritur. Porro alteratrix facultas ab insito cuiuslibet parti temperamento opus suum peragit: ac calida quidem humorem biliosum atque melancholicum gignit, frigida vero aquosum & pituitosum.

*Ἀλλοκόπων ἀσφαδὲς καὶ ἀγνωστὸν.* obscurum & incognitum, apud Hippocratem.

*Ἀλλοφάσων.* verbum est non admodum vsitatum sed tamen vsurpatum ab Hippocrate. Significat autem vel *ᾤδεσθαι*, id est, delirare, vel *μετέστην ἐαυτὸν ὁ ἀσφαδὲς*, id est, corporis inquietudine vexari. dicitur *ὅτι τὸ ἀλλοφάσων ἄλλα*. nam qui delirant, varia & aliena, nec inter se coherentia loquuntur, vel, ut plerique volunt, *ὅτι τὸ μεταβάλλειν ἄλλοτε εἰς ἄλλο γῆμα τὸ φάν.* Id est, quod oculos in alias subinde figuras conuertant: id quod etiam delirantium proprium est. Annorauit Galenus committere in Prognosticum.

*Ἀλλοφάσωντες. ᾤδεσταινόντες. ᾤδεσθρονόντες.* hoc est, delirantes, apud Hipp. Dicuntur & ab eodem *ἀλλοφρονήσαντες, & ἀγνωστοί.*

*Ἀλμάδες.* dicuntur proprie oliuæ muria condita, sicut *καλυμβάδες*, quæ in oleo suo puræ innatant: quæ tamen nomina Græci persæpe confundunt.

*Ἀλμη.* muria non aliud est quam aqua falsa. Diuersis tamē modis temperari potest. ex qua varietate tres summe eius differentia emergunt. Prima est muria multum diluta, ut in quam caleus etiam mollior demergitur, & in quam sal coniectus adhuc liquefit. ea dicitur *ὠμωτέρη* & *γλυκεῖα*, & Latine cruda, ut habetur apud Columellam. Secunda est sic tempera-



temperata, vt nec sal iniectus amplius liquefieri, nec caesus aut ouum demergi possint. hanc vocatur *αλμη εύρανη*, & muria matura à Columella. Tertia est tam salis, vt salis permultum, aquæ minimum in ea sit. vocatur à Græcis *σενός αλμυρά* & *αλμυρά*: hoc est, valde amara & crudior. Videtur esse ea, quam Celsus aliquot locis muriam duram appellat. Omnis muria effectus salis præbet, abstergit, ficit, dyfente rieis infunditur, atque ad fortis aquæ marinæ vsum præstat.

*Αλμυρά*, *αλμυρά*, est nitri species, quæ sua sponte ex terra efflorescit, & extra terram reperitur, vel in conuallibus & campis, vel in lacu. Eo per ætatem canescunt conualles apud Medos, vt Plinius scribit. Sic autem dicitur partim ex sapore quæ habet subsalsum, partim ex eo quod è terra erumpit. Vide *νιτρον*.

*Αλμυρίς* dicitur ab Aetio *αλμυρίς*, quia salsum holus sit & maritimum, de quo vide suo loco. est & *αλμυρίς* cuiusdam generis brassicæ nomen, vt tradit Athenæus, quæ ganæx nata præmatum sibi vendicauit.

*Αλμυράδης πυρετός*, salis siue saluginosa febris. Est differentia febris apud Hippocrat. lib. 6. *αλμυράδης*. vnde autem hæc sumpta sit, non liquido apparet. Potest quidem ita dici à sapore humorum in quibus febris acceditur, accedente propinquissimo, salisq; vocari febris, quæ à salis pituita nascitur, qualis est causus hybernus Hippocrati lib. 3. *αλμυράδης*. Sed cum Galenus locum hunc enarrans dicat ab Hippocrate tactus notas, non gustus differentias explicari debet, eo quod æthere, salis febris vocari, quæ salis modo cutem ægri, aut manum medici pruritu magno mordeat. Id quod accedit dum fuliginosa & multum vsta excrementa per corporis habitum & cutem feruntur, vt in prius causis docetur à Galeno.

*Αλμυρά*, herba est foliis scillæ similibus, pinguibus, crassis, modicè latis, rotundis & retrorsus repandis. Illa vtrinque sunt ex obliquo spinosa, & longioribus intervallis striata, breuius, curta, atq; in spinulas retusas truncasq; desinunt. Caulem habet non dissimilem antherico, in quo, flos albus, & semine asphodelo simile. Radix ei vna est, ceu palus in terram adactus. Odorem emittit grauem, gustuq; amarissima est. Succum fundit quicodem cum planta sua nomine *αλμυρά* dicitur. Vnum arenosum, qui purissimi fœx est, & ab officinis caballinum dicitur, forte quia veterinariis medicamentis conuenit: alterum vero iecinoris modo coactum, quem succotrinum illæ appellant.

Aloe modicè calfacit, spissat, densat, alui soluit, & bilem detrahit. Efficacior em esse, si pora ea sumat cibus, Plinius affirmat. Paulus mane tradendam præcipit, noxæ taxans eos qui vesperi propinant, aut secundum cibum.

*Αλμυρά*, sic à quibusdam dicitur *αλμυρά*, vt habetur apud Dioscor. forte propter radicis amaritudinem, propter quam etiam *Αλμυρά* ab aliis vocata est.

*Αλμυρά*, est medicina ad ventrem soluendum: aloen habens, nec eam quidem solam, sed pluribus aliis medicamentis admixtam. Eiusmodi compositiones multas describit Aetius ex Oribasio & Philagrio lib. 3. c. 101. & sequentibus vsque ad cap. 107. Est autem hoc nomen à recentioribus medicis usurpatum.

*Αλμυρά*, flos salis, quid sit non satis certum est. Dioscorides scribit eum flumine Nilo desfluere, & lacubus tamen quibusdam innatare: crocei coloris esse, & odore ingrato, ceu gari: interdum longo magis virus olere, gustuque mordaciorē & pinguius lentum esse. Verum Georgius Agricola hunc non flore salis, sed florem maris appellat, & hunc quidem humidum, pinguem, croceum, nihilq; aliud quam semen balnearum esse dicit: illum vero tanquam fauillam tenuissimum, leuissimum, & candidissimum esse. Quid tamen vtrumq; sit, non definit.

*Αλμυρά*, salis spuma. Est spumosi maris lanugo siue ramentum, in exilibus petris inuentum, vt scribit Dioscorides. Nam cum mare feruet æstu, spumas agit, easq; ad littora & scopulos appellit, hæc autem abscissæ & in illis depositæ atque exsiccantur, nonnullis in locis in salē conuertuntur, quem Plinius spumam vocat. Nec tamen vere spuma dici potest, sed vel sicca maris spuma, vel etiam rectius salē marina spuma genitus dicitur. Est autem natui salis species ad mare genitus, quomodo etiam in fontibus vel in fluuiis quibusdam sponte naturæ nascitur.

Dicitur & *αλμυρά* patrio nomine in Proponide genus vnum Alcyonii, vt ait Dioscorides. Id quia leue est, simile fungi videtur esse, intus, quia asperum, pumicis. acre est, sed odore vacat. Nunc tamen hoc nomine omne alcyonium indifferenter appellatur, excepto subrotundo, quod ex figura pilam marinam mercatores vocant.

*Αλμυρά*, sal, quid sit notum est. Omnis aut natura gignitur, aut factitius est. Qui per se nascitur, reperitur in terra, vel extra terram ille vel caditur in montibus, vel è terra effoditur, vel sub arenis inuenitur. hic aut in fonte, aut in fluuiio, aut in lacu nascitur, summa aqua calore solis siccata & in salē conuerfa. Sed & in mari sal quidam sponte prouenit tenuis, circum scopulos concrefcens, quem *αλμυρά* nominant, de quo proxime diximus. Qui aut factitius est, vel ex aquis marinis, vel ex salis fontanis aut putealibus excoquitur, vel conficitur ex sui generis lixiuio. Cæterum sales omnes adstringunt, extenuant, repurgant, reprimunt, extenuant, siccant, & crustas vrendo inducunt, alii magis, alii minus: fossilis nanque magis adstringit, quod partes habeat crassiores, vt quæ affusa aqua minime liquecant. Omnes præterea exedentia atque excrefcencia compescunt. Clysteribus vtiliter miscentur, viresque multas & maximas possident, quas scripto Dioscorides explicauit. Cum

autem plures sint salis differentiarum præter supradictas, eas consequenter exponam, quæ frequentius legentibus occurrunt, & habentur in usu.

*Ammianus*. arenarius. Sub arenis inter Ægyptū & Arabiam, in regione Cyrenaica, in liuentib. Aphricæ locis inuenitur, ut auctor est Plinius. qui omnis cum *ammoniacis* dici possit, Cyrenaicus tamen id nomen pro suo vindicauit. Species est salis sponte nascentis, qui inter omnes maxime laudatur, si modo findi facile possit, & in recta segmenta diduci.

*Asclepias*. nomen est salis mixti & compositi ex hyssopi triente, pulegii quadrante, cumini sextante, ammij vncia vna, salis torrefacti vncii triginta contusis & cribratis. Quidam origani sextantem adiciunt. Aetius spicæ nardi vnciam vnā semper addidit, & hyeme præterea piperis vnciam vnā. Valer ad concoctionē alimenti, soluit obstructions venarum mēlaraicarum, pituitam ē thorace expurgat, visum acuit, sed maxime facit ad capitis leuitatem, si quis eo assidue vtatur.

*Hierosolymus*. condimentarius. fiebat mistis sali quibusdam aromatis, & seminibus odoriferis, siue ad sanitatis vsum, siue ad voluptatem, quo magis cibus saperet.

*Onocrotus*. theriacus. Salis compositio est ex viperis, quæ ad hunc modum fiebat. In vas fictile luto etiam extrinsecus oblitum viperæ quatuor viarū coniiciuntur. super eas iniicitur salis ammoniaci vel communis modius Italicus, hoc est, libræ viginti. postea superadduntur pastilli hoc modo apparatus. Radicis gentianæ libra vna semis, aristolochiæ rotundæ libra vna semis, comæ centaurii minoris, seminis cardamomi, marubii, singulorum vnciæ sex, scordii montani, xpi, chamædryos, seminis rutæ hortensis, singulorum libra vna. hæc modice contrusa melle Attico vniuntur, & in pastillos efformantur. Eorum selibra in ollam vacuam vnā cum viperis iniicitur, reliquum sali superadditur vnā cum quinq; scillis teneris & recentibus minutim concisis: ac tandem fictili ignis subiicitur. Sic autem debet obrutari, ut tribus quatuorue foraminibus operculum ipsius pertusum sit, per quæ vbi vapor non iam crassus & turbidus, sed tenuis potius flammula effertur videbitur, certum erit indicium perfectæ vstionis. Martianus præter pastillos alterum etiam salis modium Italicum, hoc est, alteras salis libras viginti, addit. Olla ab igne exempta, eam tota die nocteque refrigerato. deinde apertos exemptosque carbonēs diligenter rundo, & cum hisce misturis incerno. Seminibus rutæ sylvestris, hyssopi, singulorum vnciæ nouē. seminis fœniculi, nardi Gallicæ, stachyos, singulorum vnciæ sex. petroselini Macedonici vnciæ quatuor. summitatum origani, summitatum thymi, singulorum vnciæ nouem. vix amomi, homini seminis tor-

refacti, singulorum vnciæ tres. baccarum niperi, piperis albi, piperis nigri, fœniculi, singulorum libræ duæ. radicis aserptiti vnciæ decem. seminis coriandri, zinziberis, seminis vel radicis farytii, pulegii, fœnelis, seminis tordylimontani, menthæ, singulorum vnciæ sex. cassiæ fistulæ vnc. x. cinamomi vnc. vna. Hæc omnia contrusa cribrantur & miscentur, deinde vitreis vasculis reponuntur loco sicco, quibus vti ante diem quadragesimum non oportet. Ego vero, inquit Galenus lib. ad Pisonem, vipers non vto, sed pastillos theriacos sumo, qui quatuor vipers capiant hoc est, ut ait Marrianus, pastillorum siccorum sextantem fere & vnciæ dimidium, atque eis ammisceo, quæ cum viperis cremantur, vt vstione, quam habet, amarulentiam deponant: atque hoc modo longe præstantissimos sales theriacos conficio. Valent maxime ad curandos affectus qui summa in cute oriuntur, leucas, lepras, impetigines, phthiriasin, mouent namque sudorem copiosum, quo omnia excrementa sub cute latentia expelluntur.

*Iamblichus*. Iamblichi. Est salis compositi genus, hunc in modum. Salis ammoniaci libra vna, salis Cappadocici vnc. v. piperis vnc. lxx. zinziberis vnc. lxx. seminis cnicī scrupuli xvi. seminis erucæ scrupuli xvi. ammij scrupuli xvi. hyssopi scrup. xvi. sulphurii scrup. vnus. cacuminum thymi, phylli, seminis apii, petroselini, singulorum scrupuli xvi. origani vnc. vna. contrahuntur atque cribrantur. Dimidium cochlearium ieiunis cum onis sorbilibus, aut cum aliquo liquore exhiberi potest: nec est hoc salis genere quicquam efficacius ad concoquendos crudos humores. ventrem etiam citramolestiam parum mouet.

*Indicus*. Indicus. Definitor à Paulo Aegineta, *χρεια μὲν εὐαριστοῦ ὑγρῶς καὶ ὑγρῶς ἀνὴρ, καὶ οὐ μὲν ὑγρῶς*. Hoc est, colore quidem & consistētia similis sali communi, sed gustu melles. Hic ergo non aliud est quā saccharum, quod etiam Dioscorides sali comparauit. Neque enim concretione modo sali similis est, sed & candore, & friabilitate, & eliquatione, si humido diluatur.

*Kabapmus*. purgatorius. Hic sal non vnus est, sed multiplex. alius enim purgandæ bili, alius pituitæ conuenit, alius denique ad alios morbos præparatur. Aliquot eius descriptiones habentur apud Aetium libri tertii cap. 108.

*Poleis*. Poleis. est salis confectio, quæ recipit salis splendidissimi drach. cxlxxx. floris chamæmeli aridi & contrusi, conyæ tenuis, calaminthæ montanæ, radicis eryngii montani, origani, sulphurii, piperis, singulorum vnc. lxx. omnia contrahuntur & cribrantur. Hoc salis genus ventrem emollit, pituitam à capite dissoluit, & neruorum distentionibus per commodum est.

Ex sale emplastrum fit, quod *σάλας* appellatur à Scribonio Largo: idque duplex, album

album & nigrum. Hoc recipit salis marini; cerussa, olei veteris paria pondera: coquitur cum oleo cerussa, donec coeant, poltea sal admiscetur: illud salis marini & cerussa recipit pondo libram: olei autem veteris triplex adicitur. Facit ad omnem duritiem, & diutinum dolorem, & ducit sudores, idē vlcera vetera & callosa renouat, & facilius aliis medicamentis, quā hoc pollicentur, cogit cicatricem ducere.

**A<sup>anem</sup>.** herba est minoribus quam helixne foliis, nec tantum hirsutis, similibus muscolum auribus (vnde Græci *μυρσός*, Itali muris auriculam vocant) cauliculis tetetibus; articulosis, e quorumgeniculis exiles ramuli procedunt, flore paruo, candido, foris herbaceo. Nascitur in lucis, vnde illi nomē *ἀνέμω* enim lucum significat. Refrigerat & humectat, ideoque ad feruentes inflammationes conuenit.

**A<sup>anion</sup>.** dicitur ab Hippocr. quam plerique alii *ἀνών* appellant. Est autem anxietas quædam, non ægris modo; verum etiam sanis accidens: his quidem nulla vniquam in re quiescentibus, sed subinde res nouas agentibus; vt quos prætiniis cuiusque rei fastidium capiat, illis vero nullum accubitum perferentibus, sed modo hoc interdum illo habitu varie iacentibus, & cunctis aliis in rebus anxius & morosus. Prouenit hoc ab ore ventriculi certo quodam humoris vitio infecto, qui multus quidem non est, nec in ipso ventriculi spatio innatat, sed ipsius tunicis impactus est. Dicitur *ἀνώνιον* & *ἀνών*, quod significat languere præ consilii inopia, & errabunda atque incerta mente affici, angique animo, interdum etiam oberrare, & temere expariari, & apud Galen. *δυσπραγία*, vt annotauit Budæus.

**A<sup>anion</sup>.** salum. Est terreum, graue, & calidum; amaro proximum, sed minus quam hoc siccatum extenuatumque. hinc digerit, extenuat, deferget: illinc astringit & densat, vtroque siccat, & corpora à putrilagine vindicat. Ac quia alia aliis magis sunt salsa, parer vires etiam iis inæquales esse, atque in genere etiam salis eum qui durior, densior terrestriorque sit, qualis fere est vniuersus fossilis, minus calidum esse, minusque tenuium partium: qui vero facile rumpatur laxusque sit, tenuiorem simul & calidiorem esse: in quo genere est & subamarus, mediā quodammodo naturam inter salē durum & aphronitrum obtinens.

**A<sup>anion</sup>.** est turbith candidum, secundū Actuariū. alterum enim turpeton, siue turbith, est pityusæ radix, quæ officinis dicitur esula. Actius lib. i. 2. cap. de medicamentis purgantibus ad arthritidem accommodatis, *ἀνώνιον* interpretatur chamelzam. Non est autem dubium quin Actuarius sic *ἀνώνιον* appelleret: de quo mox.

**A<sup>anion</sup>.** herba est furculosa, subrubens gracilibus ramulis, foliis tenuibus, flore molli, leui, & copioso, radice simili betæ, tenui, referta

acrisucco, semine epithymi. Radix eius linguam vehementer mordet, & accendit caput. Actuarius *ἀνώνιον* vocat, hoc est, turbith candidum. Semē eius atram bilem expurgat: qua vacuata quoniam in ceror animi discutitur, herba ipsa nomē inde videtur accepisse, verum intestina leuiter exulcerat.

**A<sup>anion</sup>.** inquietudo summa, cum æger nullo loco consistere & quiescere potest, sed subinde decubitus mutat, vt scribit Galenus comment. *ἐπὶ τῇ μεγίστῃ*. idem est quod *ἀνώνιον*, de qua supra. Erosianus *ἀνώνιον* exponit *ἀνέμων*, *ἀνέμων*.

**A<sup>anion</sup>.** herba est fruticosa, vnicaulis, subaspera, foliis rotundis, fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadamtenus latum. Sic dicta censetur, quod demorsos à cane rabido minime in furorem agipatur in edulio contusa, vt scripto prodidit Aetius in curatione morsus canis rabidi: quam eodem etiam loco *ἀνέμων* atque *νεγκαν* dicit appellari. Plinius *ἀνώνιον* esse putat, quam officinæ rubiam minorem appellant: Ruellius arbitraturs propius accedere ad eam quam rusticam cannabim vocant herbarii. Siccandi, discutiendi, abstergendique vires habet, renū meatūs aperit, & ephelidem exterit.

**A<sup>anion</sup>.** non solum sic dicuntur apud Hippocr. ex hordeis farinæ; sed & ex aliis leguminibus. Siquidem libr. i. de morbis mulierum *ἀρίστη πνεύμα*, hoc est, farinæ triticeæ, dicuntur. & libro 2. de morbis maiore mentio sit lentium & eruorum siccatorum. Omnis ergo grani mediocri magnitudine moliti fragmenta, *ἀρίστη* vocantur. Nam maiora fragmenta *κρίμα*, hoc est, crassiores farinæ, minora autem *ἀρίστη*, hoc est, tenuiores farinæ, nominantur. Ac quoniam ex iis farinis polenta efficitur, eam Græci eodem nomine *ἀρίστη* appellant. Fiebāt autem, vt scribit Galen. lib. i. de aliment. laudatissima ex recenter hordeo mediocriter fricto; quāquam & ex aliis etiam pararetur. Eam quidam, vt idem refert, sapa & vino dulci mulsoque mistis, nonnunquam sola etiam aqua conspersam, æstate duabus tribusue ante balneum horis per sanitatem olim bibebant sentiebantque sitim eo potu leuari. Sed tamen cum vino austero pota ventrem desiccabat. Quædam etiam gentes pro pane ea utebantur, & mediocriter quidem alimentum corporibus præstabat.

**A<sup>anion</sup>.** differentia est fracturæ ossis in multas tenues partes comminuti, farinæ instar à quā similitudine nomen illi inditum est. Vide *κρίμα*.

**A<sup>anion</sup>.** quāquam Græcorum vulgo quamlibet farinam significat, Hipocrates tamen & medici proprie sic appellant hordei tosti siue fricti farinam, quæ Latinis polenta dicitur: quæ si liquore quopiam subacta est, ab eodem Hippocrate *μαίη* appellatur.

**A<sup>anion</sup>.** vitiligo. Est vitiosa macula & fæda in



corporis cute apparens, & ex malo corporis habitu excitata, sed sine manifesta cutis asperitate, sine squamis, sine exulceratione. His enim notis à pсора, lichene, & lepra, ceterisque huius generis tumoribus distinguitur. Dicitur ex eo quod colore cutis immutetur. immutare enim apud veteres *αλφειν* dicebatur. Est autem *αλφειν* non totius quidē carnis affectio, sicut cancer & elephas, sed summæ modo carnis, cutisque ab improbo sanguine alias pituitoso, alias autem melancholico proueniens, qui cum probe adhæreat affectæ parti, non tamen illi assimilari potest. Eius tres species sunt: *αλφειν*, *μειμα*, *λευκον*. *Αλφειν*, quod generis sui nomen retinet, vocatur ubi color albus est, fere subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur. interdum vero latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit, summam tantum cutem afficit, eaque veluti squamis quibusdam respersa est. oritur ex pituitoso sanguine. *Μειμα* colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis, ut qui ab atro humore excitetur. *Λευκον* habet quiddam simile alphi, sed magis albida est & altius descendit, ut maximam etiam partem subiectæ carnis occupet. Prouenit a pituita lenta & viscosa, quæ cum propter naturam suam, tum ob imbecillitatem partis affectæ nequit carni assimilari & rubra eadere: itaque & qui in capili sunt, albi euadunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt, sed in aliis celerius in aliis tardius. *Αλφειν* & *μειμα* in quibusdam variis temporibus & oriuntur & desinunt, & curationem non difficillimam recipiunt: *λευκον* quem occupauit, non facile dimittit, præsertim si locus ante pilosus, glaber eualerit. tunc enim vix unquam sanescit, ac si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet aut acupungi. si sanguis exit, quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest.

*Αλφειν* dicitur muscoli dorsi inferiores dorsum mouētes, ad lumbos sit, qui aliis etiam nominibus *σπιναι* & *σπονδυλικοί* appellantur.

*Ανομιαν* est capitis affectus, quo capilli toto capite primum extenuantur, deinde decidunt propter redundantis humoris malignitatem. Sola figura differt ab ophiassi: utrumque enim malū à vitioso humore excitatur, à quo capilli facile corrumpuntur. hic autem vel pituitosus, vel biliosus, vel æter esse potest, id quod capillus nudata cutis ostendit. Dicunt simile quiddam vulpibus accidere, æque inde *ανομιαν* dicitur. Sunt tamen qui à proprietate urinae animalis hoc nomen sumptum velint: namque ubi vulpis lotium affusum fuerit, dicitur è vestigio infructuosum effici locum, ardescētibz herbis, nec succrescentibus nouis. Celsus morbum hunc aream appellat.

*Αλοπίπης*. herba est tota specie similis tritico, sed folio, ut vult Theoph. latiore. spinosa ut plantago, verum hirsutior & lanuginosior, florem non, ut illa, particulatim edens, sed per totam spicam frumenti modo sparsum. Nomen inde habet, quod non dissimilis sit vulpium caudis. Sunt qui vulgo virgam pastoris appellari contendunt: alii id esse quod rura caudatum frumentum dicunt.

*Αλως*. sic dicitur indidis circulus, oculi candido proximus: limbus pupillæ, nebuloso circa solem aut lunam circulo persimilis.

*Αμαλινος*, huc

*Αμαλινος* *πασillus*. est nomen pastilli qui recipit seminis apii, anisi, singulorum drach. vi. comæ abinthii drach. i. i. i. myrrhæ, piperis, opii, castorei, singulorum drach. ii. annamomi drach. vi. aqua subiguntur, & rediguntur in pastillos, quorum ad summum drachma vna exhibetur. facit ad vehementes stomachi subuersiones & vomitus, ubi serosi humores in ventriculi tunicas recepti sunt. Scribit autem Galenus se myrrham non miscere, propter vim eius medicamento-sam, cuiusque loco piperis duplum adicere, ut in vniuersum piperis drach. i. i. i. sint. Datur ex vino diluto aut ex aqua.

*Αμαλινος* 2. verbum est Hippocrati familiare, significans idem quod *απαρτεται* & *αμαλινος*, hoc est, offuscat & obfuscatur, velut in secundo de morbis mulierum.

*Αμαλινος* apud Hippocratem idem quod *αμαλινος*, id est, molliter, vel moderate. significat & facile apud eundem, ut lib. i. & 2. de morbis.

*Αμαλινος* est meiophi genus auctore Gal. apud Hippocratem, plurimum nascentis in Italia. idemque dicit esse cum eo quod Dioscoridi *στυμνιδες* dicitur, quamuis sunt, inquit, qui *αμαλινος* & *στυμνιδες* dicant poma esse syluestria atque exigua. Verum Pamphilus *στυμνιδες* pyri genus arbitratur, quod *αμαλινος* quidam vocant, alii *στυμνιδες* frequentem in Ionia & biseram, fructu pyri, sed sui generis prædulci, & hinc nucleis ac prælato pyris.

*Αμαλινος* dicitur vitis aut vuz genus: auctore Helichio.

*Αμαλινος* species fungi, si recte coquatur in innocens, ut ait Gal. Huic inter fungos secundum bonitatis locum Paulus assignat.

*Αμαλινος* sic dicitur à quibusdam *αμαλινος*, hoc est, gramen, quod iugo carpentisq. seruientia iumenta eo passim vescantur, sicut habetur apud Dioscoridem.

*Αμαλινος* idem quod *αμαλινος* auctoribus Dioscoride & Plinio. Verum secundum Galen. & Aetium *αμαλινος* est, quod etiam Dioscorides *αμαλινος* scribit appellari. Ex quo patet geminam esse *αμαλινος* significationem, & interdum *αμαλινος*, interdum *αμαλινος* dici.

*Αμαλινος* *πασillus*. Amaracinum unguentum. Id fiebat olim in Cyzico longe præstantissimum ex omphacino & balanino oleo spissamentis ex xyllobalsamo, iunco odorato, & cala-

calamo factis, conditisque amaraci, costis, amomi, nardi, casia, carpobalsami, & myrrhæ odoribus. Aliqui, quo præciosius esset, cinnamomum addebant. Mel autem & vinum etiam adhibebatur, hoc in vasorum ilitationem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Non est dubium sic dictum esse ab amaraco, quod idem prorsus cum sampsocho est, etiamsi sampsochinum ab amaracino distinxerit Dioscorides. Id enim non ob id factum est, quod diuersas esse herbas iudicaret, sed propter varietatem regionum hoc vnguentum temperantium. Nam sampsochinum dicebatur quod ubique fere ex sampsocho apparabatur: amaracinum vero proprie quod in Cyzico fiebat, ubi *ἡ ἀμαράκη* vernacula lingua *ἀμαράκη* vocatum fuisse Dioscorides auctor est. Itaque quamuis etiam id sampsochinum recte vocari posset, patriam tamen illi nomenclaturam Dioscorides tribuit. Præter odoris gratiam vim quoque habet rarefaciendi & discutiendi, & cæcas hæmorrhoidas aperiendi, ut à Galeno scriptum est.

*Ἀμαράντος*. Amarantus. herba est radice fulua, bulbosa, ferulaceo caule, pedali altitudine, foliis ocymo longioribus, spica purpurea vtriusque quam flore, inodora. Sic dicitur quia non marcescit. decerptis enim asseguatur, & cum defecere cuncti flores, madefactum aqua reuiuiscit, & collectum furnique tempore siccaturum recoditur ad coronarios hyemis usus, nec nitorem gratiamque coloris amittit. Siluit de eo priuatim Dioscorides. Gal. heliochrysi nomine exprimit. Dicitur etiam à quibusdam hoc nomine *ἡ χυσομένη*, ut auctor est Dioscorides. Sic dicitur etiam *τὸ ἐλὶ χυσομένη*, quod alii *χυσομένη* appellant, ut idem scripto testatus est.

*Ἀμαρυγία*. hoc nomine quidam oculos, quidam supercilia intelligunt.

*Ἀμαύρωσις*. est absolutum visus impedimentum nullo manifesto affectu in oculo apparente, sed pupilla plane pura atque incolumis. Quibusdam vitium hoc paulatim conflatur, aliis confertim accidit, ut minimum aut nihil prorsus videant. Si paulatim *ἀμαύρωσις* conflata est, causas habet easdem quas etiam *ἡ ἀμβλυωσις*: si vero repente vnoque impetu incidit, in causa est nerui visui obstructio, à crassis & viscosis humoribus subito illapsis, aut eiusdem nerui resolutio. habet & plures alias latentes & internas causas, habet etiam externas: ut frequentis cruditates, crapulas, insolationem, capitis inuersionem atque ardorem aut refrigerationem, aut multam lectionem à cibo, aut balnei usum post cibum, vomitiones, & concubitus immoderatos in pestiuiosque, spiritus violentam cohibitionem, à quibus omnibus caput valde repletur. Hæc quidem atque his similia si minora imbecillioraque sint, *ἀμβλυωσις*: si vero & magnitudo & vehementia ipsis accesserit, *ἀμαύρωσις* efficiunt. Sunt enim hi duo affectus ab iisdem causis,

& sola maioris minorisque ratione ad inuicem differunt.

*Ἀμβρα*. Ambarum. nomen est barbarum, sed tamen à quibusdam recentioribus Græcis usurpatum. Est odoramenti genus, de quo variae sunt sententiae. Alii tradunt in maris profundo, veluti fungum, con crescere & procellis in littus eici, aut deuorari à pisce quodam, in cuius corpore postea reperitur. Alii putant ipsum è fontibus quibusdam scaturire, bituminis modo aut sulphuris. Tria eius produntur genera, fuluum, subalbidum, atrum. Calfacit & siccatur. Cerebrum & cor olfactu roboratur: senibus & natura frigidis opem mirifice præstat.

*Ἀμβλῖν*. dicitur à Galeno in comment. 1. *ἡς τὸ πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν* totum id lignum, quod ab Hippocrate, eodem loco describitur, quinos vel quaternos digitos latum, crassum vero binos aut minus, longum cubitos duos vel paulo breuius, quod ab altero extremo rotundum sit, angustum & tenue, in summo autem capitulum habeat rotundum ac modice cauum quod parum ab una parte extet. Quo tamen loco Hippocrate non totum quidem id lignum, sicut Galen. sed eius extremo superimpositum capitulum rotundum ac leuiter cauum *ἀμβλῖν* appellat, videlicet quia simile sit labro, quod Græci *ἀμβλῖν* nuncupant. Vtitur ea spartha siue ligno Hippocrate ad reponendum humeri caput quod exciderit. Sunt qui crepidinem interpretentur. Idem Galen. in interpretatione vocum Hippocr. *ἀμβλῖν* explicat *ὁφθαλμὸν ἐκ τῆς ἀνάστασις*, hoc est, altiore eminentiam.

*Ἀμβλυωσις*. Est hebetudo visus, sine manifesto oculi affectu. Siquidem nullo in tuncis oculi vitio apparente, nec pupilla ampliore aut adstrictiore, aut aliud quicquam, quod videri queat, perpessa, visio tamen obscurior fit. Ex quo patet vitium internum esse & altius reconditum, aut in alteratione quadam spirituum, humorum tunicarumque consistere. Id quod pluribus de causis modisque fieri potest, ut crassitie, penuria & imbecillitate spiritus visui, corrugatione & densitate tunice, obstructione à crasso & viscoso humore alicubi impacto, cuiusmodi sæpe contingunt ex longo morbo, mœrore magno, & senectute, aliisque præterea causis omnibus, à quibus *τὸ ἀμαύρωσις* oriri annotauimus. Sunt enim communes vtriusque affectionis causæ, eo tantum differentes, quod *τῆς ἀμβλυωσις* causæ imbecilliores quæ alterius habeantur.

*Ἀμβλυωσις*. significat apud Hippocratem tum abortum, *ὅθεν τὸ ἀμβλῖν*, hoc est, abortire, tum affectum oculi, quem *ἀμβλυωσις* diximus appellari.

*Ἀμβλυωσις*. dicuntur apud Hippocratem obtusius siue obscurius videntia.

*Ἀμβλαμα*.

*Ἀμβλασις*. Abortus. Est immatura & violenta fetus excretio. Siquidem uterus vel humo-

rum pondere quos supra vires continet, oppressus, vel demorsus humore in eum effuso, ruptis iis in quibus continebatur membranis, vel propter fortium putrem & saniosum irritatus, aut alia de causa extra ipsum posita vexatus, ut febre vehementi, alui profluvio, sanguinis immodica vacuatione, saltu, clamore, ira, tristitia, timore, victu parciore, aut medicamentis abortuum prouocantibus, fortium immaturum, ante legitimum pariendi tempus, cogitur emittere, & corrumpere. Ex quo quidem Hippocr. vsitato vocabulo *ἀπορροή* solet appellare, ut annotat Galenus.

*Ἀμβλαπία*, dicuntur medicamenta quæ abortum mouent, quæ & *φθόρα*.

*Ἀμβροσία*, frutex est tenuis & pusillus, ramosus, trium fere palmorum, foliis paruis circa imum caulem, rursus similibus. In ramulis semina quasi racemuli dependent, qui nunquam florem pariunt, odore suauis & vinoso: quæ de causa *βίβρος* à quibusdam dicta est, & à rusticis vinosa herba appellatur. dicitur etiam ab aliis *ἀπὸ μίαιας*. Sed & *ἀμβροσία* dici à quibusdam *τὸ αἰεῖσθαι* siue sedum maius Dioscorides author est, à foliorum immortalitate, quod semper vireat. Quibusdam etiam *ἀμβροσία* dicitur alterum genus *τῆς ἀπὸ μίαιας*, ut ait Ruellius. *Ἀμβροσία* etiam à Cappadocibus vocari botryn Dioscorides author est.

*Ἀμβροσία* etiam nomen est malagmatis contra febres efficacis, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 18. à quo non dissimilis multum est *ἡ ἀμβροσία ἡ πλάσματος* apud Actium lib. 14. cap. 2. Est & antidoti nomen quam Zopyrus Ptolemæo regi composuit, cuius descriptio habetur apud Corn. Celsum lib. 5. cap. 23. Est & potionis nomen quæ se uti ad phrasisicos Galenus scribit cap. 3. lib. 7. *ἡ κατὰ τὸν πύλον*, & lib. 4. de locis affectis.

*Ἀμύσσω*, sunt medicamenta quibus cauetur vel discutitur ebrietas. Id quod agunt vel siccando ventriculum, vel os illius adstringendo & corroborando, vel sublatos è vino vapores repellendo, refrigerando, densando, vel eos cerebrum iam occupantes digerendo, & per cranii suturas euocando. Ideoque ex iis alia ante potum præsumuntur, alia iam contracta ebrietate conueniunt. Ventriculum siccant, adstringit, & confirmat absinthii potus ante cibum: item myrti floris, & myrtæ, & rursus tritorum ex aqua, ut refert Galen. ex Archigene lib. 2. *ἡ κατὰ τὸν πύλον*. Adhuc amara amygdala, quibus seminis quinisue ante cibum deuoratis, quidam medicus, ut refert Plutarchus, apud Drusum Tiberii Cæsaris filium, nemini concessit in bibendi certamine. Fumos vini repellunt, restringunt & densant frigida post epulas epta, uti & cruda brassica & lactuca: eos autem è capite euocant atque digerunt florum amethysti herbæ odor, corona è cicco, vel ex ramulis iungæ, aliaque permulta quæ

vapores calefaciunt, extenuant & desiccant, & præterea calorem natium languentem & vino propemodum obrutum sepultumque excitant. Hic enim reuocatus illam temulentæ mentis caliginem, quam cruditas inuexit, facillime discutit. Dicuntur etiam *ἀμύσσω*: de quo supra.

*Ἀμύσσω*, herbæ nomen est & gemmæ, quas ita appellatas esse quidam volunt, quod aduersus ebrietatem pollere & temulentie aduersari arbitrentur. Quod ut verum quidem sit, utraque tamen à colore id nomen sibi potuit adscriuisse. Ac de gemma quidem satis conuenit: est enim purpurei coloris: Amethysti autem herbæ folium meracioris vini colorem æmularur.

*Ἀμύσσω*, sic dicta est à quibusdam *ἡ ἐλξίμη*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Ἀμύσσω*, hoc est, imbecillum & infirmum: apud Hippocratem.

*Ἀμύσσω*, dicitur à nonnullis *τὸ αἰεῖσθαι*, siue sedum maius.

*Ἀμύσσω*, apud Hippocr. *ἀφαιρῶν καὶ λαμβάνων*, hoc est, auferens & accipiens.

*Ἀμύσσω*, dicitur ab Hippoc. *αὐτὸ τὸ καλὸν πνεῦμα, ἐκ πρὸς μέντοι, μετὰ τοῦ*, hoc est, quodammodo, aliqua ex parte mediocriter.

*Ἀμύσσω*, est lapis fossilis, plerumque albus, sed interdum cinereus, vel rufus, vel ferreus, pexis mulierum crinibus assimilis, qui eo scisso intus apparent. Is in ignem coniectus nec absumitur, nec inquinatur, sed splendidior etiam euadit, eamque ob causam *ἀμύσσω* dictum esse quidam volunt. sunt ex cothryallides, quæ lucernis inditæ non extinguuntur, quamdiu aliquod olei superest: unde ipsum *ἀμύσσω* quidam appellarunt. Manibus netur, pectitur, textitur, ut linum, ideoque à quibusdam Græcorum *λίον ἀμύσσω*, à Plinio linum vitium vocatur, & ex eo telæ fiunt, quæ ignibus iniectæ ardent quidem, sed flammis inuictæ splendent inde magis exeunt quam possent aquis. Non valde differt ab alumine scisso, nisi quod hoc adstringit, ille parum pungit linguam, minime vero adstringit.

*Ἀμύσσω*, *αἶνος*, Aminzum vinum, quod in Amnæo Italiz oppido in Campania nascitur. Id duplex apud Galenum legitur fuisse lib. 12. methodi medendi, videlicet Aminzum Neapolitanum, & Aminzum Siculum: illud sic dictum, quod in locis Neapoli vicinis gignereetur (erat autem aquosæ substantiæ) hoc vero, quod ea Campaniz ora, quæ Siciliam respicit, proueniret austerum quidem illud & mediocriter album crassumque, & ob id ad digestionem per corpus minime idoneum, sed cum inueterasset stomacho vtile. Id vini genus Virgilius in Georgicis firmissimum appellauit. In eius inopia factitium Aminzum apparabatur sicut ex Didymo refert Constantinus Cæsar lib. de agricultura 8. cap. 21.

*Ἀμύσσω*, Est nodus fasciarum, cum ambobus capitibus implicata inter se vincuntur, vel alterum scinditur



scinditur, vel tertio, cum extrinsecus ad continendum addicitur id quod *κατάλημμα* appellatur. Annotat Gal. commentar. 2. *ἐν τῷ κατὰ τὴν ἐξέσιν*.

*Ἀμυγδαλέλαιον*. nodus Herculeus. laquei genus est, valens vbi æqualiter partes aliquas intendere consilium est. Describitur ab Oribasio lib. de laqueis.

*Ἀμμύ*. notum est etiam officinis, semen exile, multo minus cumino, origanum respiciens. A Romanis cuminum Alexandrinum dicitur à quibusdam Æthiopicum, ab aliis vt Hippoc. regium. vis ei ex calfactoria, feruēs & exsiccans.

*Ἀμμων*. minium. Duplex est. Vnum nativum, compactum, lapidisq; modo solidum, quod Plinius nunc venam minii, nunc minium appellat: Vitruvius *αἰθρα* dici scribit: Theophrastus *καλὸν*, vt & Plinius lapidem, appellat. Est autem, vt ait Vitruvius, gleba prunæ similis subrufo colore, habens circa se rubrum pulverem. Quæ cum foditur, ex plagis ferrameatorum crebras emittit lacrymas argenti viui, quæ à fossoribus statim colliguntur. Plinius ab eius vomica liquorem æternum profluere scripsit, qui argentum viuum appelleretur. Est enim vena minii argento viuo plena, adeo vt cum ea lauatur, protinus atque humore perfusa est, pars eius in argentum viuum mutetur: quod tamen postea siccatur tritumque, ad pristinum colorem redit. Alterum vero minii genus factitium est, ex ea ipsa minii vena, quam *αἰθρα* diximus appellari, lota, trita, cribroque secreta & excocta. Sic enim optimum purissimumque *ἄμμων* fit: sic dictum quasi arenula, non atrum iam vt *αἰθρα*, sed rubrum, magno in pretio apud veteres habitum, quo non solum pictores vsi sunt, sed etiam Romani, qui eo & Iouis faciem festis diebus, & triumphantium corpora illinebant. Sed nunc fieri desit, quod Chymistæ cinnabarin in eius locum substituerunt ex argento viuo & sulphure concinnatum: adeo vt quidam minium & cinnabarin eadem esse crediderint.

*Ἀμμοχρυσία*. remedii genus exsiccando corpori idoneum, eo super arenam decumbente, & arena desuper aggesta. Oporteret autem eam calientissimam esse, & marinam, si eius copia adsit. Fluviiatilis enim humectior est. Est autem & sal ad eam rem quam arena efficacior, præstatq; in eo tenui substrato decumbere. Oporteret autem eum non minus tribus palmis altum esse. alioqui vis eius facile diffunditur. Pōest eadem quæ & *ἡλυσίς*, id est, insolatio, de qua suo loco. Vide Orbasium lib. 10. cap. 8. collect. medic.

*Ἀμμοσταχὸν*. succus est ferulæ (quam cum radice sua *αἰγασυρίδα* Dioscorides tradit appellari) in Libya nascentis, qui resinæ aut gummi modo in arenas distillat, & concretus inter eas inuenitur. Eius genera duo sunt. Vnum maxime coloratum, ligni & arenarum expers, thuri simile, minutis glebis, densum si-

ne sordibus, odore castorei, gustu amaro. id à fragmentis in quæ diuiditur nuncupatur *Σραυὼν* siue *Σραυσίμα*, quasi frustum aut friatura. Alterum autem est lapidosius & terrosius plenumq; calculis, quod *φύσμα*, quasi commixtionem, nominant. *ἀμμοσταχὸν* Latinis guta appellatur. Sunt qui *ἀμμοσταχὸν* *θυρία* vocare malint, quod inter odōrimenta sit, atque ad odorem vaporetur. Nec vero ē *ἀμμοσταχὸν* nomine succus hic siue gutta sola intelligitur, verum salis etiam speciei eodem designatur nomine. Sed sal quidem hammoniacus dicitur, quod sub arenis concreseat & inueniatur: succus autem hic, quia in arenosa Libya ad templum Iouis Hammonis reperitur. quo tamen nomine non modo succus ille dicitur qui in Libya ad Hammonem distillat, verum is etiam, qui in Libya ad Cirenem nascitur. Huic enim duplex naturale solum Dioscorides tribuit. Est autem hammoniacum præditum maxima emolliendi facultate, adeo vt scirrhotophosq; discutiat. Præterea calfacit & attrahit, lichnemq; drachmæ pondere haustum absumere dicitur.

*Ἀμμόνιον καλόν*. est collyrium maximæ commoditatis in multis oculorum morbis, quod alio nomine *ὀφθαλμίων* appellatur. Refertur ab Aetio lib. 7. inter *τὰ ναρόνια καὶ τὰ δοῦπια καλόν*.

*Ἀμνίος*. est membrana fœtû proxima, ipsum totum à vertice ad imos pedes inuoluens. Inter eam fœtumque excrementi vtrumq; genus, quod ex singulis partibus per concoctionem secedit, sudor videlicet & quæ proprio nomine caret veluti sordes colligitur, inque ea apparet sub aquæ specie, quod in aquam eiusmodi excrementa frigida membranae contactu facile resoluantur. Est autem is humor, siue sudor sit, siue vrina, siue aliud quippiā vrinæ affine, albus & sine fœtore, atque tam miris & innoxius, vt fœtus cutem, quam continenter tangit, nullo modo violet. Multus autem, toto quo geritur fœtus tempore, colligitur, triplo scilicet quā vrina copiosior, eamque membranam præterea permultum distendit. Quamobrem ne rumperetur, simulque perferre posset fœtus validiores motus artuumque iactationes, facta est à natura tenuis quidem, sed crassior & robustior *τῇ ἀλυσίδι*. Sicut autem ea totum fœrum inuoluit, ita vndique à chorio comprehenditur, totaq; illi annexa est, nisi qua parte Alantoides, longa & angusta membrana, intercedit. Siquidem *ὡς τὸ ἀμνίον*. Galeno visum est.

*Ἀμνίον*. legitur à quibusdam apud Hippocratem *ἐν τῷ κατὰ τὴν ἐξέσιν*, comment. 3. significat, sicut Dioscorides aliquando interpretatus est, idem quod mediocris. verum Galenus eo loco non *ἀμνίον*, sed *ἀλλοίον* legit.

*Ἀμύργα*. amurca. Est expressæ oliuæ sidens recrementum. Calfacit & siccatur secundo ordine, eoque intenso: hæc enim ratione vlcerata in ficcis quidem corporibus curat, in aliis

autem intendit imitatque. Transtulit autem Hippocrates etiam τῆς αἰσχροῦς nomen ad iecinoris vitiosos humores, aphor. 45. lib. 7. eo significans crudam iecinoris putrilaginem, ut eo loco Galenus annotauit.

**Ἀμπέλης γῆ.** est terra duriuscula, nigra, piceæ longos carbones referens, assulatim scissilis, æquabili splendore, quæ detrita accepto oleo statim eliquescit. Ea autem non videtur aliud esse quam birumen fossile, seu carbo fossilis. Plinius eam bitumini simillimam scribit, Posidonius bituminosam appellat. Quia vero talis est, accenditur & ardet Galen. eam non tam terram esse dicit, quam ad lapidis naturam accedere. Dioscorid. inter terræ species recenset, nec dubium quin hic molliorem, ille duriorē viderit. Dicitur alio nomine φαρμακίης. Vtrumque autem ab eadem forte causa inditum est. Valet enim contra innascentes vitibus vermes, quos κίρας vocant, gemmasque earum erodentes. Vim dissipandi, siccandi & refrigerandi habet ad κακὸν ἐλάφρον additur, estq; tingendis capillis idonea.

**Ἀμπελοεὶκη.** vitis alba. Est vitis species radicem habens prægrandem, raphani similitudine, ex qua caules asparago similes exeunt, longi & exilibus internodiis geniculati, in altum scandentes, seque fruticibus capreolis suis innectentes. folia habet pampinosa, fructum rubentem dependentem in racemis. Tota satiuæ viti similis est foliis, sarmentis, pampinis, nisi hirsutiora essent. Alio nomine à Græcis βουονία dicitur, quo etiam omnes officinæ & herbarii appellant. Vulgus colubrinam vocat. Eius germina vinam mouent, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida: vnde fit ut lienes etiam potu consumat.

**Ἀμπελοπέσσον.** est herba caulem habens bicubitalem, folia porracea, sed angustiora, florem candidum, radicem bulbosam. Prouenit in vinetis, vnde à natalibus ἀμπελοπέσσον, quasi vitigineum porrum nominatur. Gal. agreste porrum esse prodidit. Stomacho inimicum est, acerrimum calidissimumq; in summo ordine. quamobrem etiam exulcerat, inciditque, & viscerum meatus recludit.

**Ἀμπέλος.** vitis, quæ & ἄμπλος οἰνοφόρος, hoc est, vitis vinifera, appellatur. Est frutex multiplici cortice cinctus, qui radice speciem gerat, caudice contorto, flagellis longe lateque vagantibus, sarmentis lata fronde lasciuientibus, longis pediculis pendente, nervosa corticosaque. Flos fructum ambit lanuginosus, vua compluribus acinis aceruata seminibus tunica clausis. carnosa ei medulla, frequentes pampini, quibus suopre ingenio caduca colligetur. Plura eius esse genera, & totidem quot soli affirmantur. Vitis racemi & germina abstergendi facultate pollent & nonnulli adstringens habent: folia refrigerant & adstringunt, ideoq; stomachi ardori, dysenterici, & sanguinis excreationi medentur. Vide οἶνος.

**Ἀμπέλος ἀγρία.** duplicem habet apud Græcos significationem. Nunc enim vim sylvestrem significat, viti satiuæ congenerem, habitu tantum diuersam, ut quæ sola confitionis priuatione à reliquo vitium genere differat. Hæc peculiari nomine à Latinis labrusca dicitur, quod in marginibus terre cœnlabris quibusdam nascatur. Sunt autem duo eius genera. Alterum quod vuas ad maturitatem non perducit, sed ad florem tantum, quem οἰνοφῶν vocant, promouet: alterum quod vuas perficit paruis acinis, duorum etiam generum, albi & nigri. Significat vero ἄμπλος ἀγρία & herbam palmites longos ex se mittentem, lignosos, alperos, rimoso cortice, folia autem solano hortensi similia, sed latiora longioraque, florem vero crinitum, muscosum, & fructum exiguis vuis similem (à quo vitis nomen accepit, licet alterius à vite generis sit, sola viticularum & racemosi fructus, quem profert, similitudine inter vites numerata) qui ubi maturus est, rubet, rotunda acinorum facie. Eius radici vis ex-calfactoria & acris est, ut ad vsum psilothri veniat.

**Ἀμπέλος μέλαινα.** vitis nigra. Est vitis species caules habens & folia hederæ, (in quo à vite candida, quæ ἀμπελοεὶκη dicitur, discrepat) vel verius similaci similia maiora tamen, fructum racemosum in vuis dependentem, qui per initia viridis est, postea nigricat, eoque à vitis albæ fructu differt: radicē vero foris atram, inus buxci coloris. Propinquas arbores clauiculis suis comprehendit & scandit. Hanc alio nomine Græci βουονία, sicut & vim albam, Latini autem vnam taminiam appellant, auctore Dioscoride. Potest eadem quæ & ἡ ἀμπελοεὶκη, sed inefficacius.

**Ἀμπέλος Χερωνία.** eadem est quæ & ἄμπλος μέλαινα. Sic autem dicta est, quod Chironiis viceribus & in gangrænam transeuntibus remedio sit. quæ ratione non ἡ μέλαινα modo, verum ἡ λευκὴ ἄμπλος etiam dici χερωνία potest, quod authoribus Dioscoride & Galeno veritrique eadem sit facultas.

**Ἀμπώλις.** verbum est ab Hippocr. usurpatum, significans idem quod ἡ ἀνέπισις. Proprie quidem est reciprocatio aquæ cum post exundationem aqua ad mare reuertitur & littora destituit, ita ut mare eam quodammodo rebibere videatur: Latini ætus recessum, vel maris reciprocationem dicere possunt. Hippocr. autem eam vocem ad corporis humores transtulit, itaque appellauit πῶς εἰς βάρους μεταστῆναι τῷ ὕδατι, hoc est, humoris reuocationem ab externis partibus ad internas.

**Ἀμυγδαλῆ.** amygdalus. Arbor est singulari radice, prægrandi & alte defixa, caudice procecto, summam compluribus ramis brachiato, foliis salici similibus, prælongis, flore foliato, candido, & in quibusdam sabroso, succo pingui turgens, & lacrymam plorans, quæ statim concrevit in gummi. fert nuces quæ à multis amygdalæ nuces, & Græcæ

inuces dicuntur, gemino protectas operimento, pulvinati primum calycis, mox lignei putaminis, cui solidus subest nucleus, acriore etiam obductus callo. Harum duo sunt genera, vnum amarum, alterum dulce. Vocatam à Græcis *ἀμυγδαλίω* Herodianus Alexandrinus prodidit; quod post viride putamen, alterum quod subest, multis scateat rimosis, scarificationibus, quas Græci *ἀμυχῆς* appellant. Est enim *ἀμυχή ἔλας ὀπταλόν*, hoc est, vlcus superficiale, vt interpretatur Hefychius. Habent autem amygdala quæ amara sunt, extenuandi vim, viscosos crassosque humores altius hærentes enellant, & cutis vitia abstergunt, & ipsa similiter arbor: dulcia vero moderato calore prædita sunt.

*Αμυγδαλοειδής*, dicitur à quibusdam primum genus eirhymalli, qui proprie *χαρμυδίας* dicitur, vt habetur apud Dioscoridem.

*Αμυδρός σπυγμῆς*, languidus pulsus. Est, vt ait Paulus, pulsus differetia sumpta à robore vitalis virtutis, cū pulsus languide & debiliter digitos tangētis ferit, & à tactu potius eueritur: cuius causa est pulsifica facultas valde imbecilla. Vide *σφοδρὸς σπυγμῆς*.

*Αμυγδαλῶνος φάρμακον*, nomen est medicamenti compositi, quod Paulus inter emplastra, Actius inter malagmata recenset. Describitur autem ab iis impari quidem simplicium tum numero tum pondere, ita tamen vt vnum illud *Αμυγδαλῶνος φάρμακον* ab illis descriptum esse videatur, valens ad præcordiorum tensionem, articulos contractos conuulsosque, ad digerendum, discutiendū, & extrahendum. Sed & eo Paulus vtitur li. 4. cap. 32. ad scirrhus aliosq; dueros tumores emolliendos.

*Αμύλοι*, nomen est medicamenti compositi ex omni quidem tritico ac siligine, sed potissimum trimestri. Compositionis autem ratio hæc est. Purgatur trimestre triticum & madescit aqua dulci quinquies in die mutata, & si quidem fieri potest, nocte. Cum tenerescere inceperit, aqua sensim & sine agitatione effunditur, ne quid simulcum ea cremoris effluat. Vbi vero molliissimum euasisse videbitur, mutata aqua pedibus calcari debet, atque rursus infusa teri, tum demum enatantes ibi furfures eximendi, reliquumq; percolandum, & quamprimum in tegulis nouis sub ardentissimo sole siccandum, ne si paulisper madidum relinquantur, acorem contrahat. Vim habet refrigerandi mediocriter & siccandi. Valet ad sanguinis excreationes, lenitque faucium vitia. Fit vero & ex *ζεῆ ἀμύλου*, vno alteroue die macerata & elota, & manibus, vt in confectioe panis sit, subacta pressaque, & feruentissimo in sole, vt ante retulimus, exsiccata. Verum id vt in reliqua vita vtilissimum fuerit, nullius tamen est in medicina vltus. Dicitur *ἀμύλον* quod *χαλῆς μύλου*, id est, sine mola pareretur. Officinis hodie amygdum dicitur.

*Αμύλοι* significat apud Hippocratem *ἀσπράς*, hoc est, confertum & simul, quasi *ἀπὸ τῶν μύλων τῆς χέλης*.

*Αμύχῆς ἔλας ὀπταλόν*, vt interpretatur Hefychius. *Αμυγδαλῶνος φάρμακον*, similis τῆς ἀμυγδαλῆς: in quo cutis veluti carpta ac vellicata tanquam vnguibus videtur: apud Hippocr.

*Αμυγδαλῶνος πυρετός*, quotidiana febris. Est febris à pituita putrescente excitata, quotidie nouas cum refrigeratione accessiones habens. Putrescit autem illa per hanc febrem cum in minoribus venis & reliquo corporis habitu, tum maxime in ventriculo, qui fere semper in eo febris genere afficitur. Ac quia frigidus is humor est, nō rigorem, non horrorem, sed refrigerationem inducit, qui in naturis plus æquo pituitosis, hyeme, & hyemi similibus constitutionibus, atq; senibus ægre admodum à calore superatur. Sed nec vbi ille incaluit, valde exurit aut acris est, neque respirationem crebriorem efficit, aut sitim molestam accersit. Est enim hæc febris minime sicculosa. Scatet namque per eam vtplurimum ventriculus pituitoso humore, frigido, pallido, crudo, & aquoso, qui partim vomitu, partim alui deiectionibus reicitur. Qua de causa etiam accidit, vt pulsus non multum inæquales, veloces atque vehementes in agris hac febre laborantibus deprehendantur. Sudor nullus fere primis diebus est, sed progressu febris, humorē magis incalescente & attenuato, exoritur. Huius aut febris quotidie accessiones fiunt, quod ita ferat humoris natura, & horas vt plurimum decem & octo detinent. Eam ob rem *ἀμυγδαλῶνος* dicta fuit: est enim amborū, diei noctisque, particeps. Raro autem inter duas accessiones integritas, quam *ἀσπρεΐαν* appellant deprehenditur.

*Αμυγδαλῶνος*, à quibusdam dicitur *ἡ ἀλῆς*, vt habetur apud Dioscoridem.

*Αμυγδαλῶνος σπυγμῆς*, Est tunica oculi semicircularis, in posteriore eius parte sita, non membrana quidem, vt cætera, sed mollis & mutorinarium similis, producta ex ipsa nervi optici substantia dilatata, mollioreque redita qua oculum pertingit. Eam si totam exemptam coacerues & colligas, cerebrum tibi apparebit, vel aliquid etiam cerebro mollius. Quidam tunicæ nomine ob id eam non dignantur. Galen. tamen lib. 7. placit. Hippocr. & Plat. tunicam appellauit. Non est autem integra, nec totum oculum inuoluit, sed vitreum humorem, cui contigua est, à posteriori tantum parte circundat, nec vltra mediā oculi partem progreditur. Sic dicta est à retis similitudine; quod Græcis *ἀμυγδαλῶνος* dicitur, non quod plexum eius referat, cum vndique sibi continua sit, sed quoniam eius formam, quæ dimidiati globi tantum est, gerat, quodque, vt illud ab vno baculo dependet, ita hæc ab optico nervo, à quo originem ducit, tanquam à suo manubrio pendere videatur, multis venis & arterijs intertexta.

*Ἀμφιδέξια*. apud Hippocr. τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερά. hoc est, tonsillæ. & partes iis vicinæ.

*Ἀμφιδέξιος*. vocatur ab Hippo. rate mulier quæ utraque manū tanquam dextra vitur, quasi utrinque dextra. talis est & apud poetam *ἀμφιδέξιος*. Sic & Hipponax dixit: *ἀμφιδέξιος γδ εἰμὶ, καὶ ἐχ' ἰμὸν παῖδα*. hoc est, *ἀμφιδέξιος* enim sum, nec delinquo. Huic opponitur *ἀμφαρίστος*. Errant qui interpretantur *ἀμφιδέξιος* eam quæ in dextra vteri parte concepta gestataque fuerit.

*Ἀμφίδεν*. apud Hippocr. extremitas oris vuluæ rotunda & labris cucurbitæ similis. sic dicta per metaphorā à mulierum armillis, quæ etiam *ἀμφίδεια* vocantur à circulari figura.

*Ἀμφικαυῖς*. montanum hordeum, quod etiam *εὔστα* dicitur. Comici *ἀμφικαυῖν* vocat etiam τὸ γλαυκὸν μέλιον, teste Eustathio.

*Ἀμφιμήτερον σημεῖον*. Dicitur ab Hippocrate signum quod affectionum vuluæ significatiuum est, lib. 2. τὸ ὅτι δημιῶν.

*Ἀμφορέας*. amphora. Est liquoris tantum mensura, apud Romanos quidem urnas duas capiens, siue sextarios octo & quadraginta (quæ alio nomine dicta est quadrantal, à figura quadrata. erat enim pedis quadrati & cubica) apud Atticos vero capaciōr, ut quæ præterea urnam contineret. Dicta est ab Atticis peculiari nomine *μετρητής*: quod nomen si quando sine adiuncto occurrit apud Græcos authores, Atticam Amphoram intelligere oportet. Cum enim de Italica siue Romana agitur, quæ non paulo minor est, *ιταλικὴ* adiungunt. Quemadmodum Latini contra Metretam Atticam dicunt, ut à Romana distinguant, quam simplici amphoræ vocabulo designant. Dicitur & ab aliis pari modo vsuque *κεφύμων*, à Latinis autem cædus. Vide *μετρητής*.

*Ἀμυγδάλος*. frutex est idem fere cum amomo, nisi ea minus venosa, durior, & flore organi esset, sine odore & sine fructu. Ex ea adulteratur amomum.

*Ἀμυγδαλός*. frutex est pusillus, palmi fere altitudine, vite quidem alba minor, sed foliis illi similis, venosus, odoratus ramulis duriusculis, colore sufflauo, baccis inter se racematim coherentibus in modum vugæ flore purpureo & æmulo candidæ violæ. Indicæ viticulæ genus est è ligno se conuoluens in vnae modum. Calfacit & siccat perinde atque acorus.

*Ἀμύς*. quodammodo, aliqua ex parte, mediocriter. Dicitur & *ἀμύ* apud Hippocr.

*Ἀνάβασις*. significat idē quod ὀπίσθοσι siue αὐχνοῖς, id est, augmentum siue incrementum tam morbi totius quam singularū accessionum. vidē αὐχνοῖς.

*Ἀνάβασις* etiam dicitur caucum, & ab aliis hippuris siue equisetum, authore Plinio.

*Ἀνάβασις πυρετός*, qui & *ἐπικαμαρτός*, id est, increfcent, dicitur, est secūda febris synocha differentia, quæ à principio vsque ad finem cri-

simque paulatim angetur, & veluti affurgit, ut ait Galen. lib. 2. de differentiis febrium.

*Ἀναβροχμήδης*. est genus curationis chirurgicæ conueniens palis palpebrarum vel reflexis oculum versus, vel longitudine sua oculum infestantibus. Fit autem ad hunc modum. Acus ab interna palpebræ parte transmittitur ad externam, immisso prius in acus foramen utroque extremo tenuissimi alicuius filitum demum palpebræ pilo infestante & noxio immisso in reliquam mediamque filii partem quæ hiat diductaque est, veluti laqueus quidam infestū palpebræ pilum comprehendat: apprehenso autem eo traicienda penitus est acus per palpebram, simulque palpebræ pilus adducendus, ut per extimam palpebræ superficiem exeat, vlcereque postea consolidato non amplius in oculum feratur. Id genus curationis latine dici potest infibulatio per acum vel illaqueatio. Dicitur enim *ἀπὸ τοῦ βρόχου*, id est, à laqueo. Qui Paulum viderunt, male interpretati sunt euulsionem, cum tali curandi genere pilus non euellatur.

*Ἀνέβρωσις*, erosio, quæ & *ἀνέβρωσις* dicitur.

*Ἀναγallis*. est frutex parvus non altior palmo, tenet, foliis in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, in terra iacentibus, ad helixinæ folia accedentibus, semine rotundo, flore alias phœniceo, alias cæruleo. Duo eius genera statuuntur, flore tantum distantia. Nam quæ cæruleo flore est, fœmina dicitur, inas quæ phœniceo. Vulgo morsus gallinæ appellatur. Vtraque valde abstergit, subcalida est & attrahit. Succus naribus instillatus caput purgat.

*Ἀνάγυρις*. frutex est arborefcent, per quam graui odore si commoueatur, foliis virgisque viticis, flore brassicæ. semen gerit in corniculis oblongis, simile renibus, variū, subrotundum, solidum, quod durefcit vna maturrescente. Humi iacet anagyris malæ modo, vnde & malua terrestris à quibusdam nuncupatur. Calfacit & discutit semen, tenuius est, & vomitum ciēt.

*Ἀνάδενδραξ*. vitis arbutiua, quæ & *ἀνδενδρίτις* appellatur.

*Ἀνάδενδρομάλαχμ*. vocatur à Gal. ἡ ἀνδράχμ, quasi arborea siue arborefcent malua.

*Ἀνάδιπλωσις*. reduplicatio. Est in accessione febrili horroris per longiora interualla ingeminatio. dicitur & *ἐπιδόλησις*. fit hoc symptoma in febribus præsertim semitertianis, in quibus ter ut plurimum vel quater etiam repetit. In causa est humoris inæqualitas, qui cum partim *πικρὸς* aerisque sit, partim vero *φλεγματώδης*, putrescens inæquales etiam motus habet. Sunt autem eius interualla, ut dictum est, longiora. Nam qui brevioribus interuallis excitatur, non dicitur proprie *Ἀνάδιπλωσις*, sed *ἀνὰ μίαν* πρὸς καὶ φρεσίν *ἀνὰ μίαν*, hoc est inæqualis & horrificus motus: cuiusmodi accidit per febres quas Hippocrates lib. 1. τὸ ὅτι δημιῶν appellat *φρεσίν*, ut comment. 1. Galenus annotauit.

*Ἀναγνώμα*.



**Αἰσθησις**. significat apud Hippoc. μεταστροφὴς  
μετὰ δὲ αἰσθησίν, hoc est, sententiam mutare, &  
vetera de discensentem noua discere.

**Αἰσθησις**. digestio seu distributio alimenti, cum  
à ventriculo in venas transit. dicitur & ἡ δὲ  
σκι, nisi quod hanc quidā interpretatur trans-  
lationem alimenti à venis maioribus in sim-  
plicia & pene inuisibilia vasa, quati traditio-  
nem vel porrectionem dicas.

**Αἰσθησις**. dicuntur apud Hippocratem  
αἰσθησις, id est, febricitantes: sicut in-  
terpretatur Galen. comm. αἰσθησις.

**Αἰσθησις**. dicitur à αἰσθησίν, Græcorum vulgo, vt  
Aetius author est.

**Αἰσθησις**. dici solet ab Hippocrate humo-  
rum qui pleuritidem excitant, per sputa  
euacuatio, vt annotauit Galenus in aphor. 8. lib. 5.

**Αἰσθησις**. repurgans medicamen-  
tum. Vide αἰσθησις.

**Αἰσθησις**. id est, αἰσθησις, reminiscen-  
ti, apud Hippocratem lib. 1. Epidemion, vt  
annotauit Galenus.

**Αἰσθησις**. herbarum nomen, quæ à terra etiam  
euulsâ viuunt, vt ait Hesychius. menunt & e-  
ius Plinius lib. 24. cap. 17.

**Αἰσθησις**. significat apud Hippocratem αἰσθησις  
hoc est, in superiorem partem: vt ἡσθησις  
in inferiorem.

**Αἰσθησις**.

**Αἰσθησις**. arbor est Indica, fructu auicula: cor-  
culo non dissimili, unde nomen putatur in-  
ditum rubente intus cruore, quo veluti san-  
guine fœcet. Tertia classe ex calcitrant & relin-  
cat. Dicitur ad in memoriam quam maxime  
conferre. Duplex habetur apud Paulum si-  
αἰσθησις confectio, quarum vtramque ἡ  
αἰσθησις dicit appellari, numerosiore quidem  
materia & ponderibus valde differentibus  
ab ea quam Meues describit, sed viribus non  
multum dispar.

**Αἰσθησις**. hoc est, resiliunt, apud Hippocra-  
tem.

**Αἰσθησις**. idem quod ἡσθησις, vt saepe  
apud Galenum legitur, dicitur etiam ἡσθησις  
quæ verba factitia quibusdam vi-  
dentur esse à sono, qui fit inter gargarizan-  
dum. Paulus lib. 3. cap. 5. αἰσθησις, ἡσθησις, ἡ  
αἰσθησις, id est, tunde, cribra, misce, &  
in sole gargarizato. Idem cap. 18. eiusdem  
libri, αἰσθησις, ἡσθησις, αἰσθησις, ἡσθησις.  
hoc est, auxiliatur etiam gargarizatio per a-  
cria facta.

**Αἰσθησις**. agglutinamenta. Sunt medica-  
menta quæ in affectibus oculorum frōti ag-  
glutinantur, ex iis composita quæ obstruen-  
di, opplendi, glutinandi, adstringendi, refri-  
gerandi, aut siccandi facultatem possident.  
cuiusmodi sunt farina, pollen, manna, terra  
Samia, myrrha, coehleæ, acacia, opium cum  
candido oui liquore. Adhibentur cum flu-  
xio per exteriora fertur. Cum enim per ve-  
nas arteriasque intra caluariam conditas de-  
currit humor, ea nullo vsu applicantur. Au-  
thor Paulus lib. 7. cap. 16.

**Αἰσθησις**. intermissio, dilatio, apud Hippocr.

**Αἰσθησις**. à quibusdam dicitur ἡσθησις, an-  
thoræ Diolcor. qui etiam ἡσθησις sic dici  
prodidit.

**Αἰσθησις**. hoc est caute vel apte ad cu-  
stodiendum. apud Hippocr.

**Αἰσθησις**. significat apud Hippocr. quod non a-  
lur nec augetur.

**Αἰσθησις**.

**Αἰσθησις**. renutritio. Est pars artis medicinæ  
in naturalem habitum restituens eos qui à  
morbo conualescunt. Ea quodammodo  
media est inter tuendæ sanitatis rationem, &  
curandi methodum. Siquidem conualescen-  
tibus nec vlla præter naturam causa aut affe-  
ctio superest, nec tamen tam firma adhuc  
constantique sanitas, quin multa quoridie  
incidant, de quibus merito querantur, quæ-  
que dubiam adhuc & quasi vacillantem va-  
letudinem facillime euerant. Itaque in illis  
non modo præsentem statum conseruare  
oportet propriis & ἡσθησις, præceptis, verum  
vitia etiam quæ læuissimam ob causam e-  
mergunt, emendare: quod opus est & ἡσθησις,  
à qua hoc vno tantum videtur dis-  
ferre, quod hæc magnis excellibus à natu-  
rali habitu medeatur, αἰσθησις vero parua  
vitia corrigat. Eius autem dux maximæ sunt  
partes, vt ait Galenus, Alimenta & Exerci-  
tatio: illa quidē quæ robur quod deest sup-  
pleant, quodque vacuatum essetque diffi-  
parum resarciant: hæc vero vt euacuet pur-  
getque humorem & concoquat excremen-  
ta. Quibus addi etiam debet eorum absti-  
nentia quæ sanitatem offendunt, alior, æ-  
stus, lassitudo, cruditas, ebrietas, vigilæ, tri-  
stitia, ira, & reliqui animi affectus.

**Αἰσθησις**. significat etiam apud Hippo-  
cratem membri alicuius suspensionem, vel-  
uti brachii, quod, si læsum est, vbi deligatum  
erit, collocatur in mitella, quæ à cubito ad  
manum excipiens ipsum sustineat. Quod  
aut in brachio αἰσθησις est, id in cute ἡσθησις  
apud eundem dicitur, vt annotauit Galenus  
comment. 3. αἰσθησις, ἡσθησις.

**Αἰσθησις**. insulsum, non salsum, apud Hippo-  
cratem.

**Αἰσθησις**. est ratio quæ ab euidentiori ob-  
scuræ cognitionem adfert. Ea fit ex compa-  
ratione & perceptione causarum iuuanti-  
um per similitudines. Sic namque quod iu-  
uare solet, αἰσθησις colligitur, quando cau-  
sa quidem occulta est, nec vlla eius habetur  
obseruatio, sed affectus quam simillimus ex-  
calibus est. Quia enim causa ignoratur, nec  
potest propterea colligi per indicationem  
quod remedium possit conducere, nulla-  
que adhuc facta est obseruatio, cogimur ad  
simile intuentes, transgredi ad simile. Itaque  
αἰσθησις per transitum ad simile fit. Eo  
namque videntes, à similibus ad similia trans-  
imus, aliter tamen quam Empirici, qui à si-  
mili transitum ab auxiliis ad auxilia, aut ab  
affectibus ad affectus fieri affirmant, vt do-  
cet Galenus in lib. ad Thrasibulum. Est au-

tem *αἰσθητικὴς* ratiocinatio Dogmaticorum propria, sicut *ἐμπειρικὴς* Empiricorum. Hi namque euidentibus, illi ratione magis nituntur. Atque ut illi inter se, sic eorum etiam rationes differunt. Est enim Empirica ratio euidentium rerum, Dogmatica vero occultarum.

*Ἀσάλπις* idem apud Hippocratem, quod *αἰσθητικὴς*, hoc est, salis expertus. Erotianus exponit *Ἀσάλπις* apud Hippocratem *τὸ μακρὸν ὁ αἰσθητικὸς*, quomodo Helychius quoque hanc vocem accipi testatur, deriuans *ἀσπὶς τῆς ἀλμυρῆς*. Galenus autem *τὸ ὁρῶν ὁ αἰσθητικὸς*, hoc est salis expertus & salugine nulla præditum: sicut & testatur Suidas.

*Ἀναζαῖς*, quartum genus rumicis, quod *ἄναζα* dicitur.

*Ἀνάταν* ē contrariū. ut, *ἀνάταν αἰμορραγῆν* dicitur is, cui in magno liene maleque affecto sanguis ē nare dextra profluit. Namque *Ἀνάταν* Hippocrates opponit *πλάττην*, ut auctor est Galenus comment. *εἰς τὸ ἀσπῆρον*.

*Ἀναπνοῖα*, significat apud Hippocratem pus aliqua in parte collectum digeri atque ducti, sicut annotauit Galenus comment. 2. *εἰς τὸ ἀσπῆρον*.

*Ἀναπνοῖα*, respiratio. Est aeris inspiratio atque exspiratio. Motus est ex duobus motibus contrariis compositus, & gemina inter eos quiete, ad eundem prorsus modum, quo & pulsus. Eorum vno aer in pulmonem trahitur, thorace dilatato: altero ex pulmone redit, eodem subsidente & compresso. ille *τὸ ἐξσπῆν*, hic *τὸ συναπῆν* proportionē respondet, nō aliter quam tota respiratio cum ipso pulsu magna similitudine conuenit. Cum enim vnus eiusdemque vsus causa respiratio & pulsus dati sint animantibus, æquum fuit similibus vtrumque perfici partibus, paribusque instrumentis pares similesque actiones absolui. Sunt autem in eum finem vsūque à natura comparata, ut calor cordis perpetuò aeris attractu ventiletur, purusque conseruetur. Id quod pulsus quidem arteriarum dilatione compressionēque facile præstat: quæ, cum se expandunt, omni ex parte per corporis spiracula aerem ambientem attrahunt: cum vero confidunt, sumida & halitūosa excrementa ex humorum & spirituum vitione nata expellunt: respiratio vero, aeris inspiratu expiratuque. Nam quia maior est cordis flamma quam ut possit arteriarum pulsū temperari, aliam præstandi refrigerii rationem natura per respirationem machinata est, ut flagrate & æstuante corde animalis facultas thoracem & diaphragma vicissim attolleret atque deprimeret. Sic enim fit, ut dilatato thorace pulmones vna attollantur diducanturque, & aerem proximum folliis instar intra se pertrahant, depresso autem eundem simul summittantur, aeremque antea attractum cumque eo fuliginem omnem exprimant. His igitur alternis motibus duobus, inspiratio-

ne expirationeque respiratio peragitur. Inspiratio totum pulmonem aere implet, qui cordi nō tantum refrigerium, verum etiam nutrimentum præbet, in pulmone primum elaboratus, deinde in sinistram cordis ventriculū transmissus, mistusque sanguinis vapor qui ex dextro ventriculo suggeritur, & demum vi cordis insita conuersus in vitalem spiritum. Ac quoniam, ut in cibis & potibus, sic etiam in spiritibus nihil tam simile est nutriendo corpori quod non multa in se contineat superflua, & ad alendum inepta, quicquid fumosi excrementi post eiusmodi spiritus cōcoctionem genitum est, id omne ē sinistro cordis ventriculo per eius systolen in asperas arterias depulsū tandem expiratione reiecitur. Hic quidem respirationis vsus est, à pulsu vsu nulla in re differens, nisi quod illa ab animali facultate, hic à vitali manat: hic vno tenore continuus perseuerat, neque arbitrii nostri est, illa vero cum homini libet, cessat, & in nostra potestate posita videtur, siue eam crebriore aut rariorem, velociorem aut tardiorē, maiorem aut minorem facere volumus. Verumtamen eam in totum cohibere non possumus, sed omnes ad eam perinde atque ad vrinæ & stercoris excretionem necessitate quadā naturæ impellimur. Quo fit ut libera & voluntaria absolute dici non possit, sicut ambulatio & locutio, quod nobis inuitis facultas animalis ad respirationem compellatur, & necessitati potius quam voluntati obtemperare cogatur. Nec tamen propterea inter voluntarios motus referenda non est. Est enim solius facultatis animalis opus, idque musculorum beneficio. vnde & à voluntate arbitrioque nostro fieri recte dici potest, non eo quidem prorsus libero, sed si dicere licet, coacto. Mouens enim illa & voluntaria facultas ardoris & æstus in corde accensi magnitudine percita atque stimulara, per musculos thoracem, simulque consequitione quadam pulmones distendit, quo aere impleantur, rursumque contrahit, quo eundem postea excludant. Ac si parua quidem liberaque respiratio fieri debet, solum diaphragma sufficit: sin autem maior fieri, præter ipsum thoracem, etiam musculi concurrunt: quorum alii inspirationem, alii expirationem adiuvant, sicut suis locis dicitur. Quod si maxima respiratione opus est, accedunt etiam qui in epigastrio siti sunt musculi: estque ille summus in edenda respiratione naturæ conatus.

*Ἀναπνοῖα*. Idem quod *τὸ ἀναπνῆναι*.

*Ἀναπνοῖα*, per nares rediens, apud Hippocratem. Sunt tamen qui diuidant, scribentes *ἀναπνοῖα*, hoc est, per cutem.

*Ἀναστροφή*, vel diuinus nominibus, *τὸ ἀναστροφή*, species est hydropis, in quo aqua per vniuersam carnem diffusa est. Vide *ὑδρόπικον*.

*Ἀναστροφή*, resolutio corporis in sua elementa. Gall. de sympt. causis videtur *ἀναστροφή*, *ἀναστροφή*, & *ἀναστροφή* idem existimare.

*Ἀναστροφή*.

**A<sub>naspeus</sub>.** est osculi vene aut arterie apertio, ex qua sequitur sanguinis profluvium. Ab eiusmodi causa plerumque per nares & anum, aliquando vero à pulmonibus & ventriculo sanguis reicitur. Sunt autem & *anaspeus* tres in uniuersum cause. Vna vasis imbecillitas, præ qua ne minimum quidem sanguinis ad ipsum ruentis impetum potest sustinere: altera sanguinis, qui eius osculum impetit, copia: tertia acris aut quomodolibet maligna, quæ vasis ori extrinsecus incidit, qualitas, sicut docuit Galen. lib. 5. meth. med.

**A<sub>naspeus</sub>.** est medicamentum quod ora venarum & arteriarum aperiendi vim habet, calidum, acre, mordax, crassarum partium & terrenum, vt cyclaminus alium, porrum. huic oppositum est *anaspeus*.

**A<sub>naspeus</sub>.** apud medicos vsurpatur in iis quæ coquuntur & è liquidis crassiora euadunt: & significat densare in spissareque. dicitur & *anaspeus*. vnde *anaspeus* ab Hippocr. appellantur *φύματα καὶ σκληρίαι*, hoc est tubercula & durities, vt Galen. *de tñ* *γὰρ τὴν ἐκ τῆς ἐκ* interpretatur.

**A<sub>naspeus</sub>.** est corporis præcipue humani dissectio, per quam cuiusque partis substantia, magnitudo, figura, situs, connexio, & vsus intelliguntur.

**A<sub>naspeus</sub>.** significat frictionem, non eam tantum, sicut nonnulli existimarunt, quæ ab inferiori parte sursum procedit: quod *naspeus* frictionem, *ai* sursum significet, sed uniuersum frictionis genus. Id quod ex multis Hippocr. locis perspicuum esse potest, vt annotat Gal. comm. 1. *eis τὸ ἀπὸ ἀφθον.* & comment. 3. *eis τὸ κατὰ τὴν ἐκ.* Neque enim refert *ai* *naspeus* dicas an *naspeus*, etiam si *ai* *naspeus* nomen apud veteres vsitatus sit quam *naspeus*. vt scripsit Gal. lib. 2. sanitatis tuendæ Vide *naspeus*.

**A<sub>naspeus</sub>.** sine voce sunt tamē qui apud Hippoc. interpretati sunt *alōgus*, id est temere, vt annotat Gal. comment. *eis τὸ ἀεὶ ἀλόγως*. Idem in explicatione vocum Hippoc. scribit *ai* *naspeus* ab eo dici *τὸ ἀεὶ ἀλόγως*, hoc est, qui bene & apte verba facere nequit: *αἴφρον* autem, qui omnino vocem emittere non potest. In tertio *τὸ ὁμιλητὴν* vtrumque deinceps de Pythione dictum est.

**A<sub>naspeus</sub>.** sic dicitur desluuium pilorum in superciliis, sicut *φασκίρως* in capite. Gaza salitium vocat, sed tātisper, inquit. dum melius vocabulum inuenerit.

**A<sub>naspeus</sub>.** dicuntur apud medicos *ai* *naspeus*, id est, qui sanguinem ex infernis partibus sublatum per os reiciunt, quasi cum *ai* *naspeus*, hoc est, sursum ferentes. Frequens hæc dictio est apud Galenum, Dioscoridem, & Aetium. Idem Galen. *de τῶν γλῶτταις* scribit *ai* *naspeus* apud Hippocratem significare interdum sublingulare respirantem, vt in primo de morbis minore. dicitur *ai* *naspeus* & de pueris, qui postquam flere desierunt, in nares retrahunt spiritum, & tunc significat i-

dem quod spiritum duplici respiratione intro ferri.

**A<sub>naspeus</sub>.** vociferatio. Est vehemens exclamation, pectus & vocis organa exercens, inque iis calorem natium excitans, corporis solidas partes corroborans, excrementa attenuans & repurgans. Hæc fere ei succedunt commoda itaque anhelosis, & ætæ cervice spirantibus, tabidis, purulentisque conuenientissima est, ac veteribus pectoris & dorsi doloribus, raucitati que, quam humiditas excitauit, medetur. adhuc febribus quartanis. lennum enim & concretum humorem dissipat, & ventriculi humiditatem, quam priuatim quartana solet inducere, expellit. Caterum qui eo exercitationis genere vti cupit, aluum prius exonerare, deinde infernas partes sensim fricare, postea deambulare & moderate primum loqui, mox paulatim vocem intendere, postremo vociferari & exclamare debet. Sic plurimo aere inspirato pectus distenditur, corporis meatus aperiuntur, toraq; corporis moles intenditur. inde spura multa prodeunt, pituitosa vacuantur, calor accenditur. Verū diligenter cauere oportet, ne crudi aut corrupti humores in corpore redundant, neue caput infirmum sit, aut male affectum, ne tanta vocis contentione repleatur vaporibus & offendantur. Ea quidem ex Antyllo omnes fere posteriores medici decerpserunt: permulta vero etiam alia Oribasius lib. 6. collectorum medicinalium.

**A<sub>naspeus</sub>.** ructare apud Hippocr. hoc est, *ai* *naspeus*, *τὸ κατὰ τὸ ἐκ*, *ai* *naspeus*, *τὸ κατὰ τὸ ἐκ*. Ructus enim sit, eius materia humoreque per chylum, hoc est pectus, in os sublati. Annotat Nicandri interpres in *Alexipharmacæ*.

**A<sub>naspeus</sub>.** apud Hippocr. significat nudare, & vinculum fractæ alicui particule detrahere, vt annotat Gal. comment. 2. *eis τὸ ἀπὸ ἀγμῶν*.

**A<sub>naspeus</sub>.** dicitur à nonnullis *τὸ κατὰ τὸ ἐκ*, hoc est ea pars manus quæ post cauiam eius partem ante metacarpiū iacet.

**A<sub>naspeus</sub>.** portulaca herba est daum generum. Vna in hortis emicat, cauliculis teretibus, in altum erectis, lente vergentibus in puniceum, foliis pinguibus, a tergo candidis, gustu subfalso, semine nigro, in herbacæis calycibus collecto: altera sua sponte in vitibus nascitur, & ternis quaternisque coliculis in terra sessilibus serpit, cultaque latius euagatur folio carnoso, verum turbinatio, cetera priori confimilis. Vulgus Gallicum has tam porcellinam tum porpieriū appellat. Refrigerat tertio abscessu, humectat secundo. quamobrem causo laborantes ventriculo imposita iuuat, & fluxiones repellit. lentore suo stuporem ex acidis contractum corrigit, ob adstrictionem vero & intestinorum torminibus & alui profluuiis medetur. Est autem & alia quædam ascitia portulacæ species quam *ai* *naspeus* *ai* *naspeus*

appellant, sed eiusdem cum *πῆ δειξίω*, id est, sedo, generis. est enim tertia eius species. Dicitur & hoc nomine à quibusdam *ἢ πεπλῖς* siue *πέπλον*, ut vocauit Hippocrates.

*Ἀνδροσύμω*, dicitur apud Hippocr. Per viros generis successio.

*Ἀνδρόσαιμον*, frutex est hyperico similis, gracilib. festuicis, rubentibus ramis, foliis effigie quidem rutæ, sed duplo triploque maioribus, & cum teruntur, succo sanguineo manantibus complures alas habet in cacumine, utrinque expansas pinnatasq; circa quas flores pusilli, lutei, & in calyculis semen veluti nigri papaueris, lineis distinctum. Eius semen purgat, folia desiccant. Galen. *ἢ ανδρόσαιμον* duplex statuit: vnum, *ἀσχυρον* siue *ἀσχυρὸς* (nā reuera *ἢ ανδρόσαιμον* differt *ἀπὸ τοῦ ἀσχυροῦ*, etiam si multa habeat *πῆ δειξίω* simillima) alterum *Διονυσιακὸν* est: quorum tamen utriq; pares vires tribuit. Dicitur *ανδρόσαιμον* quod eius folia confricata digitis similem humano sanguini liquorem remittant. Vocatur etiā à quibusdam hyperici flos luteus leucoio similis, qui digitis attritus, sanguineū succum remittit: quā ex causa *ανδρόσαιμον* cognominatur.

*Ἀνδρόσαιμος* etiam à quibusdam dicta est *ἢ ἀνδρακίς*, authore Diosc. quod vbi adoleuit, si ramulus vel folium ab ea auellatur, profluit è vulnere cruentus humor: eamque ob causam etiam *φόρος* à Theophrasto dicta est.

*Ἀνδρόσαικίς*, est herba alba, amara, sine foliis, folliculos in capitulis continens, & in iis semē. Nascitur in maritimis Histia. Acris est, discurit, exsiccat, & suo semine vrinam hydropicis mouet. Podagris vtiliter illinitur. Viris remedia suo nomine pollicetur, quasi *ἀνδρὶ αἰὲς φέρουσι*, hoc est, homini remedium adferens.

*Ἀνδράνιον*, siue *Ἀνδρανὸς προχέαιος*, nomen est pastilli ab Androne medico compositi, quem Paulus inter vehementia medicamenta recenset, & *πῆ ἀνδρακί* imponit lib. 4. c. 25. Eodem etiam vitur & ad herpetem eiusdem lib. cap. 20. Constat his, ut ipse scribit, Squama æris drach. x. i. æris vlti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rase, thuris, singulorum drach. v. i. i. Excipienda sunt vino sufficienti. Describitur & à Corn. Celso *Ἀνδράνιον*, pari quidē facultate, sed diuersa paulo materia. Ait enim ex his constare, Aluminē scissili, squama æris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy, quæ per se contrita mistaque, rursus pulatim adiecto vino austero teruntur, donec his mellis crassitudo sit. Aerius *Ἀνδράνιον* pastillū describit lib. 14. multum ab his differentem, & materia & ponderibus.

*Ἀνιθέαιον*, tussiendo expuit, apud Hippocratem.

*Ἀνελήματα*, *οἱ ὀρόφοι*, hoc est, tormina apud Hippocratem.

*Ἀνελιδωσι*, id est, sursum verterint & conuoluerint, apud Hippocr.

*Ἀνερυσίασι*, euulsi fuerint, apud Hippocratem.

*Ἀνέμοσφορος*, dicitur à quibusdam *ἢ βύσσιον*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Ἀνέμυται*, *πνευματώδεις*, hoc est, inflatur, apud Hippocratem.

*Ἀνέμων*, herba est duplex: vna syluestris, altera in cultis nascitur. Sed & huius plures species, aut enim phœniceum florem habet, aut candidum, aut lacteum, folia coriandro similia, sed tenuioribus prope terram incisuris. Cauliculi exiles & lanuginosi, super quos flores exeunt ut papaueris, & in medio capitula coloris nigri aut cærulei. Radix oleæ magnitudine est, aut paulo etiam grandior, & geniculis quibusdam distinguitur. Syluestri vero amplitudo per omnia maior est, folia latiora durioraque capit. oblongius, flos puniceus, tenuia & multa radicum capillamenta. flos nunquam se aperit, nisi vento spirante, vnde & nomen accepit. Ob eandem etiā causam flos adonii herbæ, quæ abrotoni genus est, *ανέμων* dicitur. Vim habet acrem, absterforiam, attractoriam, anastomoticam, pituitam euocat, lepras tollit apposita, & lac in mammas prolicat. Ex ea emplastrum fit quod *δὲ ἀνέμωνος* dicitur, emolliens, discutiens, contrahens, siccans, ac dolorem mitigans. Describitur ab Actio lib. 15. ca. de emplastris cruentorum vulnorum glutinatoris.

*Ἀνέος*, significat apud Hippocratem tum mutum, tum mente perculsum.

*Ἀνέουπον ἀδυσίσιον*, hoc est, incontusorum, apud Hippocratem.

*Ἀνέσις*, remissio, idem quod *ἢ ἀβασμὸς*.

*Ἀνέσπασμύνα*, hoc est, perturbata, apud Hippocratem, dicitur autem de vrinis.

*Ἀνέρυσια*, est tumor tactu blandus, cedensque digitis, à sanguine & spiritu ab arteria aut vena profusus excitatus. Profunditur autem sanguis ille duobus modis: ab interna quidem causa, vase per *ἀνέσπασμύνα* adaperito, ab externa vero, vase intus rupto, cute integra manente: id quod accidit in gutture (vnde *ἐρρύχλη* oritur) in pectore, in inguinibus, in articulis, tum propter vehementem spiritus compressionem, quo distenta vasa disrumpuntur, tum propter fortiorem motum, vel vase vna cum superposita cute diuiso, siue casu, siue chirurgi venam secantis imperitia, vbi pro vena arteriam vulnerarit. Nam si, antequam arteria coalescat, aut cicatricem admittat, vel carne contegatur, exterior cutis cicatricem duxerit, *ανέρυσια* vitari nō potest. Sanguis enim & spiritus paulatim excreti sub cute colliguntur, tumoremque illic excitant interdum magnum, alias paruum, pro spatii in quod exciderint amplitudine, sed eiusdem cum reliqua cute coloris, & nullo cum dolore. Mollis ille est, & spongiz instar latus, ceditque digitis, quorum appensione facile intro se recipit, maxime in mento, atque vbi sine vulnere *ανέρυσια* constiterit. Nam quod vulnere, & cute postea coalescente factum est, non perinde molle



de molle est quoniam plus in eo sanguinis quam spiritus affusum sit, qui in grumos coe-  
 ens tumorem digito minus cedentem red-  
 dit: qui tamen si intra vas etiam videatur re-  
 uerti, nec strepitum nec sonum edit, quem-  
 admodum illud quod per arteria anasto-  
 mosin prodiit, in quo plurimum spirituosus  
 sanguinis inest. Hoc enim discrimine duæ  
 illæ *αινωποσκαρπας* causæ distinguuntur. Cui &  
 alia accedit differentia, quod narum ex ana-  
 stomosi prolixius profundiusque sit: quod  
 autem à vulnerato vase est, magis rotundū  
 sit, & minus alte descendat. Ceterum quum  
*αινωποσκα* omne non nisi difficillimam cura-  
 tionem admittat, nullam prorsus recipere  
 dicuntur quæ gutturi & capiti obuenerint.  
 Siquidem per sectionem sanguis affarim e-  
 rumpit, & vna vitalis spiritus, vt æger sæpe  
 in medicorum manibus deficiat. Dicitur  
*αινωποσκα* *ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἐν ῥιναίᾳ*, non autem *ἀπὸ  
 τοῦ νεύρου* & a priuatiua particula, sicut quidam  
 male existimauerunt, vertentes Latine ener-  
 uationem.

*Αἰνίδιον ἔλαιον*. anethium oleum. Est ole-  
 um ex anetho confectum, quod in dupli-  
 ci vase coquendum esse Galenus consulit  
 lib. 4. sanitatis tuendæ. Tale autem calidum  
 est in primo gradu & vere anodynum, ra-  
 refaciens, discutiens, dissoluens & euac-  
 uans.

*Αἰνίδιον οἶνος*. vinum anethinum siue ex anetho  
 factitium, anethi maturi, recentis, tribra-  
 tique drach. 12. in linteolo colligatis, & in  
 musti amphoram demersis. Somnificum  
 hoc est, monet urinam, & cibos concoquit.

*Αἰνίδιον*. anethum. frutex est sesquicubitali pro-  
 ceritate, multicaulis, ramosus; exilitate folii  
 in staminis prope modum extenuata, luteo-  
 lo flosculo, semine lato & quasi foliato, ra-  
 dice lignosa, neque adeo prolixa, neque  
 multis subnixa fibris, umbella fœniculi, cui  
 cognatum genus videri potest. Calfacit se-  
 cundo ordine inteso, siccatur initio secundi  
 ordinis. Somnum conciliat.

*Αἰνίδιος ἀνὺ ἀνίας*. illæsus & carens molestia, a-  
 pud Hippocr.

*Αἰνίδιον*. non diuiso in minuta, sed ex farina  
 crassioribus partibus composito, apud Hip-  
 pocratem.

*Αἰνίδιον*. pars auriculæ opposita τῇ ἐνῆ. Cum  
 ergo *ἐνὲ* in auricula dicatur extrema eius o-  
 ra, *αἰνίδιον* erit ea auriculæ portio media, quæ  
 extat, & cavitatem eius attollit. Est autem  
 in medio τῆς αἰνίδιος cauum, quod *κέντρον* vo-  
 cant.

*Αἰνίδιον*. dicitur à nonnullis *ἰσμάριον*, auctore  
 Hesychio.

*Αἰνίδιον*. herba est topiaria, trium generum, pal-  
 mi altitudine, surculosa, cauliculis exilibus,  
 foliis angustis & minutis, luteo semine, ca-  
 pitellis primum virentibus, mox luteis, quæ  
 per ambitum circundantur flosculis vel me-  
 linis, vel candidis, vel purpureis. Nam solo  
 flore tria eius genera distinguuntur, tamen si  
 eum qui colossinus est, foliorum fruticisque

amplitudine masculinum esse volunt, atque  
 proprie *ἰσμάριον* appellari. Vulgo camomilla  
 dicitur. Calfacit & siccatur primo ordine: præ-  
 terea facultatē tenni, discussoria; laxanti &  
 odorata consistat.

*Αἰνίδιον*. à quibusdam dicitur *ἰσμάριον*, vt  
 habetur apud Dioscor.

*Αἰνίδιον* ἢ

*Αἰνίδιον*. apud Theophr. appellatur *ἰσμάριον*.

*Αἰνίδιον*. pars est faciei in qua barba nascitur &  
 quasi efflorescit. dicitur enim *αἰνίδιον τῆς ἐν ἡμῶν  
 τῶν τῶν πηγῶν*. potest dici mandibula infe-  
 rior. Suidas dicit eam esse partem quæ men-  
 to subest, carnosam videlicet, & quæ *λεκανία*  
 dicitur alio nomine. Idem vero etiam inter-  
 pretatur *πυλὸν ἡμῶν*.

*Αἰνίδιον*. dicitur caulis siue scapus asphodeli,  
 qui cubitalis & sæpe binum cubitorum est:  
 à Latinis albucum vocatur. Sunt qui dicant  
*αἰνίδιον* herbam esse, quam manibus velli vt  
 linum necesse sit, quod meti non queat: de-  
 que ea factum esse prouerbiū *αἰνίδιον ὁρ-  
 εῖσιν*. Hesychius non *αἰνίδιον*, sed *αἰνίδιον* di-  
 cit.

*Αἰνίδιον*. arista: pars scilicet in spica prima sum-  
 maque: summum, vt vertit Erasmus, spica-  
 rum fastigium.

*Αἰνίδιον*. est flos canna quæ calamus phragmites  
 dicitur, qui in lanuginem pappum vocatam  
 euadit. Hunc maxime vitandum esse mo-  
 net Galen. quod si in aures forte incidat, ad-  
 eo tenaciter adhæreat, vt auelli non possit,  
 & sæpe surditatem inuehat.

*Αἰνίδιον*. est genus aridi medicamenti ex me-  
 tallicis præsertim compositi, quæ & florido  
 colore sunt, & eundem medicamento ma-  
 gna ex parte inducunt. Eiusmodi multa  
 medicamenta à Scribonio Largo ad gingi-  
 varum fluorem; à Galen. ad dentium dolo-  
 rem & oris vlcera, à Celso etiam lib. 6. cap.  
 11. & à Paulo Ægineta describuntur. In  
 quibus etsi pleraque præter metallica con-  
 tinentur, metallica tamen eorum pars ma-  
 xima sunt, vt chalcitis, alumen scissile, & præ-  
 ticipue sandaracha, quam in omnibus An-  
 theris admistam inuenies. Et ab ea forte *αἰ-  
 νίδιον* dici potuit. siquidem τὸ αἰνίδιον Hesy-  
 chius *πῶς συνδραμεῖον* interpretatur. Itaque  
 putare τὸ αἰνίδιον à floribus rosarum dictam  
 esse, sicut putauit Manardus, vanum est.  
 Pleraque enim eiusmodi compositiones  
 videre licet, in quibus nihil rosarum habe-  
 tur, neque à quoquam partem vllam ro-  
 sæ *αἰνίδιον* dictam esse reperies. Sunt autem  
 omnes αἰνίδιον aridæ, & instar pulueris vl-  
 ceribus siccandis olim aspergebantur, non  
 huiusmodi quæ in ore essent, sed aliarum et-  
 iam partium, & dentium doloribus, & oeu-  
 lorum fluxionibus. Aliquando vero melle,  
 vel vino, vel mulso excipiebantur, miscēba-  
 tur, & illinebantur, vt docet Galen. lib. 7.  
 methodi medendi, de vlcere oris curatio-  
 ne differens. Nectamen inde colligi potest  
 structuram earum non siccam fuisse. Gemi-  
 nus enim erat τῇ αἰνίδιον usus modo siccari.

modo tum aliquo liquore mistarum, cum tamen sicca semper specie constructeretur & sicca reponerentur.

*Αἴθρως ἑρυθρός.* hoc est, valde rubens apud Hippocratem in Proreth. Galeno interprete. Et apud eundem lib. 6. *ἡ ὀπίσθια αἴθρως ἡ ὀπίσθια*, spuma rubra & subcruenta dicuntur.

*Αἴθρως ὀίνος.* dicitur ab Hippoc. vinum vel quod proprie *αἴθρως ὀίνος*, hoc est, florulentum dicitur, vel quod ex floribus ad suauitatem conditum est: quomodo & ipse *καυκῶνα αἴθρως* dixit lib. 2. de morbis.

*Αἴθρως ἑλαιον.* oleum liliaceum apud Hippocrat. quod & fusinum vocatur.

*Αἴθρως μύρον.* Vnguentum apud Hippocratem, quod & fusinum & liliaceum vocatur, differtque ab oleo liliaceo varia aromatum mistura.

*Αἴθρως χαλκός.* vide *χαλκός αἴθρως*.

*Αἴθρως λίθος.* lapis *αἴθρως*: sic dictus quod extincti carbonis speciem referat.

*Αἴθρως ὀφθαλμῶν.* apud Paulum sic dicitur *ὁ αἴθρως ὀφθαλμῶν*, qui alias oculi bulbo, alias palpebrae accidit. Alii simpliciter *αἴθρως* vocant.

*Αἴθρως carbūculus.* Est vlcus crustosum à sanguine in atram bilem conuerso & inferuescente excitatum, & à pustula ambustis consimile, vel sine hac etiam incipiens. Inter initia qui hoc malo laborant, particulam omnino scabunt, vnde pustulae nunc plures nunc vna erumpunt, milii seminis modo exiles, quibus ruptis crusta superinducitur, velut à candenti ferro, modo cinerea, interdum nigra, simulque cum ima radice adhærens & quodammodo affixa, non sine rosione: reliqua autem caro circumposita magno feruore prædita est & nigrescit, atque instar bituminis & picis resplendet: id quod exquisite atræ bilis indicium est. febris longe vehementior quam ab igne facro excitatur. Cæterum qui *αἴθρως* iuxta carnem consistunt, citò abolentur: qui vero membranas nervosque occupant, diutius permanent, luemque subiectis corporibus impertiunt. Nam qui in capite consistunt, collum, cernicem, pectus, brachia aut alas in consensum adducunt: qui vero sunt in pudendis, crura inguinaque simul afficiunt: alique vero partes etiam suppurantur, & dolorem sentiunt maiorem quam præ ratione exigui affectus.

*Αἴθρως* dicitur minii vena, siue gleba ex qua minium conficitur, ferreo vel magis subrufo colore, habens circa se rubrum puluerem. Cum foditur, vt ait Vitruuius, ex plagis ferramentorum crebras emittit lacrymas argenti viui, quæ à fossoribus statim colliguntur. Significat enim *αἴθρως* gemmæ genus nobilissimæ, quam Plinius carbunculum vulgus à rubore & fulgore præstanti Rubinum vocat. vt scribit Georg. Agricola. Vide *ἀμμύων*.

*Αἴθρως λιθώδης ἡ ὀρυκτός.* carbo lapideus siue fos-

silis. non videtur aliud esse quam *ἡ ἀμμύων*, siue *φάρμακός*, siue fossile bitumen. eruitur enim è terra niger & exiguis piceæ, carbonibus similis, quales se ex Cœlesyria plurimos apportasse Gal. memoria prodidit.

*Αἴθρως ἑρίωνος.* herba. Eadem erat, inquit Plinius, quæ & scandix, si tenuiora folia & odoratio- ra haberet.

*Αἴθρως ῥαπύριος.* sic dicta est à Pythagora μάδρα- goras, cuius radicem hominis effigiem repræsentare falso creditum est.

*Αἴθρως ὁ ἄνθρωπος.* Quid sit, notum ex philosophis qui accuratissime cum sunt contēplati. Nominis ratio multiplex traditur, alii *δὴ τὸ ἐκαστὸν ἔχει φωνὴν* quod articulata voce utitur: alii *ἀπὸ τῆς ἀνθρώπου τοῦ λόγου*, ἀπὸ ὅπου, quod alia animalia nihil animadvertant nec considerent. Alii *ἀπὸ τῆς ἀνθρώπου τοῦ ὄρου*, alii vero *ἀπὸ τῆς ἀνθρώπου τοῦ ὄρου*, quod vultus ad fide- ra erectos tollat.

*Αἴθρως.* nomen est cerati quod vlcera vetera & maligna oborta in tibiis solum per se adhibitur ad cicatricem perducit. Recipit autem sandycis lib. i. olei dulcis lib. i. i. coquuntur donec non amplius inquinant. Refertur ab Aetio lib. i. 5.

*Αἴθρως ἡ*

*Αἴθρως.* herba est duum generum. vna foliis & ramis lenticulæ similis, palmi altitudine, ramis rectis. foliis mollibus, radice tenui, oblonga saluginosis & apricis nascente, gustu subaslo. Altera est chamæpity similis ramos & folia, sed asperior, hirsutior, breuior: flore purpureo, odoris admodum grauis, radice erratici intybi. Vtraque vlcera perficcat, sed hæc quam illa efficacius abstergit, & tenuior est. quare etiam comitialibus competit.

*Αἴθρως.* dicitur à quibusdam *ἡ ἀλυστή*, auctore Dioscoride.

*Αἴθρως.* est nomen emplastri quod ad Critonē auctorem refertur. Describitur à Gal. lib. i. *ἡ ἄλυστή*, & ab Aetio lib. i. 5. diuersis modis. sic dictum est quasi inexuperabile, & à curatione nunquam aberrans.

*Αἴθρως.* etiam à quibusdam dicitur *τὸ ἀνθρώπου*, vt habetur apud Diosc. communi omnibus aliis (vt ait Virg. Marcellus) quæ cibi appetentiam faciunt, appellatione.

*Αἴθρως ὀίνος.* vinum ex aniso factitium: quo modo & ex anetho conficitur, vt supra retulimus. sedat dysuriam, & visceribus commodum putatur, vt refert Constantinus Cæsar lib. 8. cap. 4.

*Αἴθρως.* herba est Græcis, Latinis & Gallis anisi nomina cognita, caule, folio, flore, muscario feniculo par, nisi quod multo minor est. Calfacit & siccat tertio ordine: hinc vrinam mouet & flatus discutit.

*Αἴθρως ἀνισόρρυθμος.* Est pulsus inequalis in vna arteriæ pulsatione vnaque arteriæ parte, qui continuus manet, neque transit à celeritate in tarditatem nec contra.

*Αἴθρως ἀμεντία.* ἀπορροια. Est ratiocinatriceis functionis abolitio & veluti paralytis. Fit à causis

canis omnibus cerebrum impense refrigerantibus; & ab ipsa etiam naturali conformatione cerebri imbecilliorē. Differt ἀπὸ τῆς μερᾶς, quod hæc diminutio tantum fit illius facultatis, nec canas habeat tam vehementes. Differt quoque ἀπὸ τῆς ἀσθενείας, quæ non abolitio quidem est & deperditio rationis, potenter, sed deprauata tantum motio.

**Ανομομερῆ.** partes dissimilares, siue dissimiles. Definuntur ab Aristotele esse partes, quæ cum ex simplicibus componantur, in alias partes dissimiles, non in similes diuiduntur. Veluti manus in manus non potest diuidi, neque facies in facies, sed manus in ea quæ ab ipsa diuersæ sunt naturæ & nominis. Dicuntur autem aliis nominibus ἐτερογενῆς ἢ ἐτερογενῆς, ἢ ἐτερογενῆς, seu μέρη, id est, alterius generis & instrumentales: de quibus vide suo loco.

**Ανομομερῆ.** significat apud Hippocr. remolli-  
tūm. vt explicat Gal. ἐν ταῖς γυναικίαις.

**Ανορεξία.** inappetentia, ἀντίαν ἀποροφῆ, hoc est, ciborum auersio, vt ait Paulus lib. 3. cap. 37. fit à contrariis causis, à quibus appetitus excitatur, quod vel perierit sensus suctionis venarum, vel quod nulla amplius fiat exu-  
ctio, vel quod corpori nulla accidat vacuatio. Fit etiam sæpe vel ab immodico ventris & intestinorum profluuiō, vel ob biliosi humoris, tenacis, acris; & porracæ delationem in ventriculum, vel pharvacii potionem; vel immodicam sanguinis detractionem; vel, quæ maxima inappetentiæ causa est, propter caliditatem, quæ solidas corporis partes laxando exoluit, & ad attractionem imbecilliores reddit.

**Ανταχμία.** est succinum, vel lapis alterius coloris bituminosus, qui cum vritur myrrham redolet, vt scribit Georgius Agricola.

**Αντράς.** lapis qui proprio nomine ἀντράς appellatur.

**Αντράς.** sunt glandulæ duæ valde fungosæ & spongiosæ, paulo supralaryngem sitæ, & vtroque in latere singulæ; saluam copiosam continentes quæ & aspera arteria & stomachus & tota ipsa oris amplitudo humectatur. Eadem alio nomine παρτίδια appellantur. multi tonsillas, & fauces venterunt: multi quatuor enumerant; binas quidem ad linguæ radicem, vtrinque singulas; binas vero penitiores; quas Pollux μύλα vocari tradit. vulgus amygdalas nuncupat. Significant autem Αντράς non modo glandulas ipsas, sed etiam earum morbum. Nam sicut οἱ ἀδένες indurati χυρῆδες nuncupantur, sic etiam τὰ παρτίδια, hoc est, tonsillæ, vel inflammationes, vel supra naturale modum auctæ, vel quasi desiccatae, cibi potusque & spiritus iter impediētes, è regione vtrinque sibi inuicem oppositæ (vnde nomen habent) Αντράς dicuntur, vt scribit Paulus lib. 6. cap. 30. Sunt autem qui distinguant inter ἀντράδες & παρτίδια, vocantes propriè ἀντράδες inflammationem ipsarum tonsillarum, παρτίδια vero inflammationem earum quæ

prope tonsillas sunt, partium. At Celsus ἀντράδες tonsillas quæ post inflammationes induræ, à Græcis vocari scribit.

**Αντράς.** dicta sunt à veteribus medicamenta, quæ non extrinsecus quidem imposita; sed intra corpus assumpta affectibus medentur, & grauissimis casibus auxilio sunt, vt quæ, sicut ait Cornel. Celsus, recte quidem dentur collisis corporibus vel per ictus; vel vbi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium; interiorumque partium doloribus; sed maxime aduersus venena, vel per morsus, vel per cibos, vel per poriones nostris corporibus inserta. Est enim triplex ista eorum differentia à Galen. prodita, quod alia lethalium medicamentorum gratia offeruntur, alia valent aduersus bestias virus eiuculantes: alia verò morbis ex prauo vitu contractis opitulantur. Sunt autem nonnulla ad hos omnes vsus accommodata, inter quæ theriace primas tenet. Cæterum hæc est communis omnium antidotōn forma, primum medicamenta teruntur, deinde cum melle subiguntur, donec in vnitatem coeant.

**Ανταρτίδια.** sic dicitur cauum illud quod sub pectore est, carneum, molleque ad os ventris: Vocatur etiam σπέρη. Rufus cauitatem eam pectoris, quæ est ad clauiculas, tradit ab Homero dici λευκαίλιω, à medicis vero ἀνταρτίδια καὶ σπέρη.

**Αντικνήμιον.** dicitur ab anatomicis anterior & nuda tibiarum portio & sola fere cute contacta, in quam muscutorum tibiæ mouentium tendines inferuntur. Galen. comment. 2. εἰς τὸ πρὸς ἀκμὴν scribit ἀντικνήμιον esse tibiæ mediam & anteriorem partem, quæ minime carnosa est, & per vniversam tibiæ à summo ad imum in longitudinem fertur, atque in his qui graciles sunt, conspicitur. Sic autem dicta est, vt plerique volunt, quod contraria sit partī tibiæ insigniori, quam Gal. γαστροκνήμιον, Latini suram appellant: vel, vt ego iudico, quod sit veluti frons τῆς κνήμης. Eadem verò pars, quia multum acuta est, etiam à quibusdam ἀκμήν vocatur. Gaza apud Aristot. ἀντικνήμιον cream vertit: Celsus tibiæ appellat.

**Αντικνήμιον.** significat apud Hippo. τὴν διὰ τὴν κορυφὴν ἀντρείον, hoc est, renixum eum qui coarctatus fit aut remō.

**Αντιπυρετον.** dicitur à quibusdam ὁ ἐκλεβορός, quod in Anticyra gignatur: à quibusdam vero σιταμῆδες τὸ μέγα, vt habetur apud Dioscor.

**Αντιλόειον.** dicitur pars illa exigua in auricula, quæ infimæ auriculæ, quam λοβὸν appellant, superposita est. Rufus scribit ἀντιλόειον vocari τὸ τῆς ἐκτὸς τῆς οὐχὶ τοῦ ὅτι ἐκτὸς, hoc est extremum & perbreuem finem partis eius auriculæ, quam ἐκτὸς appellant. Vt autem nomen ipsum indicat, ἀντιλόειον oppositum est τῷ λοβῷ.

**Αντίμηλον.** sic dicitur à quibusdam ὁ μαυροσφάγας, vt habetur apud Dioscoridem.

**Αἰνία.** est species corallii nigri, secundum Dioscor. arboris figura, magisque ramosi, & vires eadem quas & corallium habentis. Adstringit enim & refrigerat mediocriter. Georgius Agricola scribit non aliud videri, quam hæmatitem nigrum.

**Αἰρίππον.** herba est caule & foliis anagallidi similis, ideoque sylvestris anagallis vocata. Semen habet vituli narium simile: vnde & nomen indicum fuit. Alii *αἰρίππον* appellant. Vires habet mixtas. discutit enim & refrigerat. Galen. *αἰρίππος γλυκύς* scribit ab Hippocr. eo nomine appellari herbam, quæ *βίττα* & *λύχνης ἀγρία* vocatur. Dictum est & eo nomine *αἰρίππον*, sicut habetur apud Dioscoridem.

**Αἰσίοδος.** dicitur allium prægrande, quod & allium vlpicum appellatur.

**Αἰσίοδος.** reuulsio. Est humoris fluentis attractio in partem contrariam. Adhibetur proprie humori fluenti, vt eius cursum in oppositum reuocet. Qui enim parti ægræ iam impactus est, is deriuari, non reuelli dicitur, quod non nisi per propinquas affectas sed partes vacuari possit. Reuulsio autem in partem fit contrariam, & longe ab affecta distantem, vt ab inferiori ad superiorem, à dextera ad sinistram, ab anteriore ad posteriorem, ab interna ad externam, & è contrario. Tot enim sunt positionum contrariarum differentiarum, à quibus solis reuelli indicatio peti debet. Quanquam præterea alia quædam ea in respectare oportet, non quod reuulsionis substantiam constituent, sed faciliorem certe & tutiorem reuulsionem efficiat. Eas sunt meatuum ductuumque aptitudo per quos ab vna parte in aliam humor transferri possit, & partium nobilitas vel ignobilitas, sensibilitas aut insensibilitas, robur aut imbecillitas. Siquidem à parte nobili ad ignobilem, à sensibili ad insensibilem, non aut. è contrario transferendus humor est: aut si de iis partes ambigant, ab imbecilla perpetuo in robustam. Sunt autem reuulsoria præsidia quamplurima, vt vincula quidem artuum, cum humores in thoracem & ventrem feruntur vomitus, vbi inferiora petunt: acres clysteres, si vomitus infestent: vrina, sudores alique deiectiones, siue ad superiora, siue ad inferiora humorum impetus feratur. Item cucurbitula mammis apposita, si menstrua immoderate profluant, eademque affixa hypochondriis, si sanguis è naribus effluuium sistendum est. Ad hæc acria medicamenta artubus illita, si humores ad caput & viscera decumbant, sicut se factitalle Oribasius prodidit, qui cruri, in quod humor confluerat, adhibito repellente medicamento, eoq; ita deligato vt ab infima eius parte cepta deligatio perpetuo arctior ad inguina usque procederet: alteri medicamentum calidum & attrahens illenit, itaque fluxionem commutauit, & in alterum crus transfudit, Timocratis cuiusdam exemplum se-

quutus, qui, cum iuuenis quidam non mediocrem pondus ex agro in urbem dextra manu tulisset, & ingentem in ea tumorem ob id concitasset, suasisse fertur, vt pari pondere sinistra gestato, tantumdem itineris conficeret. ita enim fore, vt, quemadmodum euentus demonstrauit, dextræ manus tumor euanesceret.

**Αἰσίοδος.** dicuntur medicamenta quæ eadem cum *αἰσίοδος*, quod & *αἰσίοδος* dicitur, facultate pollent: quæque in spodii penuria in eius locum substitui possunt. de quibus Dioscorides lib. 5. agens de pompholyge cuius species spodium est.

**Αἰσίοδος.** dorsum, quod tamen proprio nomine *αἰσίοδος* vocant. de quo vide suo loco. sic autem à quibusdam dictum est, quod *αἰσίοδος*, hoc est. pectori, oppositum sit.

**Αἰσίοδος.** est pars crassior *αἰσίοδος*, opposita *αἰσίοδος*. Sic quidem eam definit Rufus. Ergo cum *αἰσίοδος* dicatur eminentia auriculæ vergens ad tempora, & posita ex aduerso *αἰσίοδος*, patet *αἰσίοδος* dici eam partem *αἰσίοδος* quæ crassior est, & è regione *αἰσίοδος*, aduersa in parte posita est.

**Αἰσίοδος.** renitens. Species est duri. de qua vide in dictione *Συμπεπ.*

**Αἰσίοδος.** pollex. Est digitus primus à carpo siue brachiali incipiens, eiq; per diarthrosim infertus, reliquis quatuor digitis multo inferior, & illius non recta, sed ex obliquo oppositus. Sic à Græcis videtur dictus, vt scribit Galenus, quod solus ipse tantum valeat polleatque quantum reliqui quatuor. Latine premanus dici possit. Siquidem manus actiones omnes per eum habet firmiores, eo solo tantum roboris præbente, quantum reliqui digiti simul iuncti: easque omnes æque cessare & aboleri necesse est, siue ipse solus, siue alii desint. itaque à pollendo etiam pollicem Latini appellauere. Sunt autem qui *αἰσίοδος* dictum velint, quod cæteris digitis oppositus sit, ex aduerso situs. Dicitur & *αἰσίοδος* propter magnitudinem seu præstantiam.

**Αἰσίοδος.** nomen est malagmatis valde adstringentis cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7.

**Αἰσίοδος.** Est medicamentum mediocriter calidum, dolorem delinies. Eiusmodi quidem est quod proprie *αἰσίοδος* dicitur, calore scilicet ita temperatum, vt calori nostro nativo quam simillimum sit, vel saltem intra primum ordinem exalfaciat. Tale namq; esse oportet, vt demulceat delineatq; quodammodo exasperatas corporis nostri partes, dulciq; sensu, quæ mouet, earum veluti tristitiam molestumque sensum aboleat. Itaque proxime ad naturam *αἰσίοδος*, hoc est, dulcis, accedit, de quo suo loco dicemus. Sed & tenuium partium esse conuenit, nihilque habere adstrictionis, vt vna pariter euacuet, digerat, rarefaciat, extenuet, concoquat, atque æquabile reddat quicquid in partibus dolore veratis humorum est actum, aut lento-



**Ἀνάλογος σπινθίς.** inæqualis pulsus. Est pulsus in quo vel nullæ vel non omnes pulsuum differentiæ pares manent. Si nullæ simpliciter & absolute inæqualis est: si non omnes, idem quatenus quidem non omnes, secundum quid inæqualis, quatenus vero aliqua pares manent, æqualis secundum quid dici potest. Nam absolute æqualem pulsuum dicas & inæqualem, an aliquo in genere, multum refert. quod absolute inæqualis, neque magnitudinem, neque velocitatem, neque aliam ullam differentiam parem seruet; illi vero qui in vna aut pluribus tantum inæqualis est, atque in cæteris paritatem seruat, non simpliciter, sed certa aliqua differentia aut pluribus inæqualis dicatur, cum in reliquis æqualitatem retineat. Fit autem pulsus simpliciter inæqualis duobus modis, vno quidem in pluribus pulsationibus imparibus & inæqualibus, altero vero in vna pulsatione. Ille *αὐστημάτιδος* dicitur, estque cognitu multo facilius, species autem habet *διπλασίου, τριπλασίου, τετραπλασίου, ἑξαπλασίου, ὀκταπλασίου, ἑκαπλάσιου, ὡς ἑκαπλάσιον*. Qui vero in vna pulsatione seu diastole inæqualis

*A* *Septem*. dicitur apud Hippocrat. pars pulmonis utrinque suspensa, & separata, ut in libr. de morbis maiore. Eandem tamen aliquando *Septem* vocatam fuisse, scriptum est à Dioscor.

**Ἀπάρμα** vocatur à iunioribus, vt scribit Galen. commen. 3. *ἢ κατ' ἰσχυρῶς*, quod ab Hippocrate *ἀπάρμα* dicitur. Est autem fractura totius ossis secundum ipsius crassitiem, iuxta ipsum articulum, ita vt plurimum ossa ab inuicem disiungantur. Idem Galen. lib. 6. meth. med. scribit *ἡ ἀπάρματος* nomen solis medicis proprium esse, & plebi inusitatum. Solere autem ita nominari, quoties ossis finis, qua parte maxime cum alio committitur, abruptus est.

**Ἀπαλῶν**. significat proprie vacuare, deinde, quod ad vacationem consequitur, subsidere & mollius effici, vt annotat Galen. comment. *ἡς τὸ ἀεὶ ῥητικόν*.

**Ἀπάλιν φάρμακον**. lenē & mite medicamentum, quale ex oui luteo & rosaceo cerato confici potest, & oculorum inflammationibus adhibetur, aut sedandis aliarum partium doloribus.

**Ἀπάλιν κολύριον**. Idem quod *ἀπάλιν*, lenē & mite collyrium. vide *ἀπάλιν*.

**Ἀπαρχὴ οἶνου**. dicitur vinum cui aqua marina admixta non est, vt ait Galenus lib. 12. methodi medendi. Id autem vinum generosum omnino erat, quoniam solis imbecillibus vinis marina solebat misceri, quæ *θαλάσσια* & *πικρασμένη* propterea vocabantur. de quibus vide suo loco.

**Ἀπαρχώσις**. idem est apud Hippocratem quod *ἡ ἀπαρχώσις*, vt annotat Galen. comment. 2. *ἡς τὸ ἀεὶ ἀπαρχώσις*.

**Ἀταρῆ**. herba est ramosa, quadrangula, asperis, foliis, in orbem per intervalla circumpositis, vt in rubia, flore candido, semine albo, duro, torundo, concavo, umbilici effigie, à qua *ὀμυδαλόκαρπον* etiam dici putatur Dioscoridi. Alii *φιλοῦρρον* appellant, quia velut amici solent, commeantium laciniis obhaereat. Officinæ aspergulam, rura Gallica grætonem vocant. **Ἀταρῆ** quoque dicitur à quibusdam *τὸ ἀρκύν*, id est, personata, vt auctor est Dioscorides.

**Ἀταρῆ** apud Atticos & Hippoc. significat idem quod *ἀτηρισιμύς*, id est, perfecte exquisitè & absolute, vt interpretatur Gal. comment. 2. *ἡς τὸ ἀεὶ διατῆς ὀξείας*.

**Ἀταρῆς**. idem quod *ἀταρῆ* apud Hippoc.

**Ἀπεχῶν**. extulsiuit. habetur hoc verbum apud Hippoc. lib. 5. *ἢ ἐπὶ δυνάμει*, sicut legat Dioscor. cum tamen eodem loco omnes fere legant *ἀπεχῶν*, vt scribit Gal. *ἢ τὸ ἐκχῶν* ἢ *ῥωτῶν*.

**Ἀπερὶς αἵματος**. apud Hippoc. insuerus, vt interpretatur Galenus comment. *ἡς τὸ ἀεὶ διατῆς ὀξείας*.

**Ἀπεισπνέως**. dicitur auctore Galen. lib. 2. *ἢ κατ' ἰσχυρῶς*, vleus quod non est magnum, nec vlli grauiori noxæ coniunctum, hoc est, quod nec vitiosi humoris influxu impetitur, nec fordudum, nec inflammatum est, nec in circumposita carne intemperiem vllam habet. Sic dicitur *ἀπὸ τῆς ἀπεισπνέως*, quæ apud Græcos afflictionem, periculum & eladem significat.

**Ἀπεισπνέως**. dicuntur alimēta quæ minimum habent excrementi, vt syluestrium animalium caro, & eorum quæ siccioribus locis victitant. Eius generis & colla & caudæ & alia animalium censentur. Opposita sunt *τῆς ἀπεισπνέως*.

**Ἀπέρων** *τὸ πᾶν ἀπέρων*, id est, perit, vt interpretatur Galenus comment. 4. *ἡς τὸ ἀεὶ διατῆς ὀξείας*.

**Ἀπέρων**. *ἀπέρων*, apud Hippoc. exclusus sit.

**Ἀπυρρῶν** *τὸν ἰσχυρῶς*. Rectum intestinum. Est intestinum crassum, ordine à ventriculo sextum, & ab ano primum, nullis gyris, sed recta in anum descendens. Eius ora inferior à musculis in orbem circumfusus *σφιγκτηρ*, hoc est, constringitur, (vnde & *σφιγκτηρ* dicta est) vt intus detineat excrementum, vetetque ne præpropere effluat. Postea vero quam plurimum congestum graue animali esse cœperit, tunc foras agi sinit, nec reluctatur septo transuerso & musculis abdominalis excrementa foras propellentibus. Id intestinum vulgus longanionem vocat, Hippocr. *αρχῶς*, hoc est, principium vel princeps appellauit: eiusque duas partes constituit: *σφιγμένον*, hoc est, adstrictum, qua parte musculus *σφιγκτηρ* collocatus est: & *χαλαρόν*, id est, laxum, qua latius est, nec villo musculo comprimitur.

**Ἀπψία**. symptoma est alteratricis facultatis, quando cibum omnino non concoquit. Proprie enim significat abolitam concoctionem, absolutamq; cruditatem alimentis nulla sui parte in chylum mutato alteratoque. Id quod euenit ventriculi facultate coctrice laxa, extremeque imbecilla, & plane victa, tum propter insignem aliquam intemperiem actiuarum qualitarum, aut longiorem passiuarum, (humida enim intemperies ventriculi, vt in hydropse: & sicca, vt in senectute & tæbe, non nisi longo tempore concoctionem abolent) tum propter morbum aliquem ventriculi organicum, vt erysipelas, plegmionem, & scirrhum, siue is simplex sit, siue cum intemperie coniunctus, tum propter tantam alimenti copiam, vt eam ventriculus ferendo coquendoque non sit. Ac quanquam *Ἀπψία* sic proprie dicatur, aliquando tamen concoctionis deprauationem, significat, per quam alimenta in alienam qualitatem mutantur. Sed maior quidem perspicuitas foret, si sola concoctionis priuatio abolitioq; *Ἀπψία* vocaretur, *δυσπψία* autem ea quæ deprauata est. Verum, vt Plato ait, multi res ipsas non cognoscentes aliis nullum omnino nomen imposuerunt, aliis vero inepta nomina indiderunt.

**Ἀπψίς**. blandum & mite apud Hippoc. quodque, cum sumitur, nullam inducit molestiam. Contrarium est *τὸ ἀπψίον*, sicut annotat Gal. comment. *ἡς τὸ ἀεὶ διατῆς ὀξείας*.

**Ἀπύρμα**. est species fracturæ cranii à recentioribus introducta, quam definiunt esse fracturam caluatæ, in parte ei quæ percussa

cussa est contraria factam. Soranus enim, cuius scripta de vulneribus capitis adhuc extant, voluit sicut in vitro, ita in caluaria ictu vnius partis, non eam modo quæ icta est, sed etiam contrariam findi posse. Quam tamen sententiam Paulus non probat, existimans fieri non posse, ut pars ictui opposita findatur, nec iudicans idem in hominis caluaria fieri, quod illi in vitreis vasculis euenire docent. Illa siquidem, quia vacua sint, aduersa in parte frangi prodidit: caluariam autem hominis vadique plenam & alioqui validam existere. Eorum autem errori causam hanc fuisse tradit, quod cum pluribus locis caput percussum fuerit, & vna tantum parte plaga sese prodatur ostendatq; in contraria autem nullum plagæ vestigium relictum sit, in ea tamen paulo post abscessus oritur; qui incisus rimam fracturamque patefaciat. Nos quidem Paulo facile subscribimus, præsertim cum eidem Galenus fauere videatur, qui libro nono de usu partium prodidit caluariam non factam fuisse solidam & sine futuris, ne percussa vna parte magna ossis portio violaretur, quod omnino futurum esset, si solida fuisset. Efficiunt igitur futuræ, ut ictus vna in parte acceptus, alteram quæ ultra futuram est non violat, sed noxa terminetur ad ipsam futuram. Qui fracturæ istam speciem inuexerunt, ἀπὸ τοῦ αἵματος nuncupare. Illa enim aeris, a quo sonus fit, repperussio, causa est cur in aduersa ictus parte vitrea vasa confringantur. Aliubi tamen ἀπὸ τοῦ αἵματος, alibi ἀπὸ τοῦ πνεύματος dici reperias, sed librariorum, ut iudicio, errore. Neque enim ἀπὸ τοῦ αἵματος aut ἀπὸ τοῦ πνεύματος id significat, sed est alia fracturæ ossis species, de qua vide in dictione ἀπὸ τοῦ αἵματος.

Α πικρὴ συνικλίσθη, cōclusus est, apud Hippoc. idem namq; claudere significat.

Α πικρὴ, proprie pyrum significat. Sed & hoc nōmine herba quædam dicitur ramulos duos sue tres iuncos spargens, tenues, rubentes, qui paulum se attollunt, foliis rursus longioribus atque angustioribus, semine paruo, radice hastula regis, pyrorum specie turbinata, tantum rotundiore, succosa, habet extra cortices nigros, intra candidum corpus. Dicitur ἀπὸ τοῦ πυρὸς herba hæc a pyri similitudine quod in radícula extrema dependet. Α πικρὴ, sic dicitur a quibusdam ἀπὸ τοῦ πυρὸς & ἰσχυρῶς.

Α πικρὴ οἶνος, vinum ex pyris factitium quæ ἀπὸ τοῦ πυρὸς appellantur. Fit ad eundem modum, inquit Dioscorides, quo vinum cydonites, sed pyra non magnopere matura esse oportet. adstringendi facultatem habet.

Α πικρὴ οἶνος, a quibusdam dicitur τὸ ἀλυσθῆναι, ut habetur apud Dioscoridem.

Α πικρὴ. Est resolutio instrumentorum quibus respiratio efficitur, sic autem a symptōmate dicta est, quod eam resolutionem spirandi priuatio consequatur. Quod tamen non ita accipi debet, quasi spiratio in totum abolita

si (neq; enim manere posset vita) sed quod tam exigua sit, ut sensibus nulla deprehendatur, quemadmodum accidit in vteri strangulatu, apoplexia, & lethargo.

Α πικρὴ, dicitur fructus τῆς βατάνης, qui & βάτanos, siue βάνος appellatur, Gallice framboscia.

Α πικρὴ οἶνος, idem quod γλυκύοινος.

Α πικρὴ, fecunda apud Hippocr. quidam tamē ἀγρία, hoc est infecunda, interpretantur, ut scribit Galen. in linguis Hippocratis.

Α πικρὴ οἶνος, sunt medicamenta lacrymas mouentia, & postea expresso vacuatoq; oculo rem humore superfluo, ipsas etiam supprementia, & oculos exiccantia. Latine dici possunt delacrymatia. Nam & Columella & Plinius delacrymare & delacrymationem ea significatione dicunt.

Α πικρὴ οἶνος, est ratio curandi corpora post exercitationem, humectando & emolliendo solidas partes, quæq; in meatibus continentur, euaporando. Peragitur ea potissimum per frictionem. Latine recuratoriam vocare licet.

Α πικρὴ οἶνος, est finis perfectæ exercitationis. Est autem ea genere duplex. altera quidem exercitationis ceu pars, altera vero eius ceu species. Quæ ceu pars exercitationis est, definitur a Galeno. Postrema pars exercitationis probe peractæ. Ea duplici consilio suscipitur, tum ut excrementa quæcunque ex calfacta & extenuata per exercitationem in corpore adhuc manent, profuse eiciantur; tum ut corpus a lassitudine tutum reddat.

Porro excrementa eiciuntur frictionibus cuique corpori convenientibus, quæ per alios administrantur, simulque ipsarum quæ fricantur partium tensione & spiritus cohibitione. Lassitudo vero tollitur tum frictione tum vnctione ex oleo. Sic enim & solidæ partes emolliuntur, & quæ in meatibus hæserunt resoluntur in vaporem. Tollitur vero aliquando & balneo, cuius vis ἐν τῇ ἀποθεραπείᾳ non est minima. Est autē frictio huius apotheraπiæ præcipua pars, eamque ob causam recentioribus gymnastarum, ut ait Galenus, vocatur apotheraπia ea frictionum portio, quæ post exercitationem adhibetur. Verum apotheraπia quæ exercitationis ceu species est, vel in ipsa media exercitatione adhibetur, vel post absolutam exercitationem. In media quidem exercitatione, quo vitari possint obstructions. Siquidem inter ipsam exercitationem, spiritus cohibitionem, interponunt opprimi gymnastæ, atque etiam frictionem, simul hominem, cum lassitudo incipit, recreantes, simul cutis meatus paulatim expurgantes, quo videlicet perspirabile, simulque purum corpus ad subsequentes labores sit, cum alioqui verendum sit, ne si nihil tale gymnasta prouiderit, obstruat potius meatus quam expurget. Peracta vero exercitatione apotheraπia etiam ceu species exercitationis adhiberi potest, in qua motus sint quantitate mediocres, & qualitate tardiores his qui

in ipsa exercitatione fiebant, idque cum frequentius interposita quiesce, qua utique fricare hominem oportet pluribus simul contrahantibus, quo nec refrigerat pars vlla, & ocysissime excrementa digerantur. In hoc igitur differre inter se videntur *αἱ ἀποθεραπεῖαι*, quod ea quæ cetera pars exercitationis est, frictiones motusque alios moderatos habeat & remissos, qui in apothetrapia exercitatione multo sunt vehementiores, adeo ut ipsa non tam exercitationis remedium, quam exercitatio esse videatur. Quamquam autem *τῆς ἀποθεραπείας* nomen proprie dicatur de ea curandiratione quæ post exercitationem adhibetur, conuenit tamē & omni quæ quamlibet lassitudinem tollit, viresque reparat quacunque tandem ex causa dissolutas. Id quod patet ex Gal. in libris sanituenda, qui Veneri non minus quam exercitationi apothetrapiam suam præscribit.

*Ἀποθήμια*. idem quod *πίσμα* siue *ἐκπίσμα*. interdum quidem expressæ rei recrementum, quod & *μάγμα* appellatur, aliquando vero succum ipsum ab aliqua re expressum, adeo ut in hac ambiguitate rei ipsius usum intueri oporteat.

*Ἀποθραυσίς*, est detractio partis ossis disrumpita superficie, sic ut quod aufertur supernatet. Dicitur alio nomine *ἀπαστή*. Differentia vna est fracturæ ossis, quæ κατ' ἀποθραυσιν κατὰ μακρὸν dicitur. De qua vide *κατὰ μακρὸν*.

*Ἀπίον*, insipidum. Id dicitur quod nulla insigni qualitate præditum est. Subfrigidum est & gustu aquosum. Nam & inter aquas ea maxime commendatur quæ ἀπίος est, & omnis qualitatibus expers.

*Ἀποκριμένος καὶ χειρισμένος*, separatus, apud Hippocratem.

*Ἀπὸ κλάμα*, dicitur apud Hippocri. ossum abruptio, quæ prope articulum, per totam ossis crassitudinem fit, ita ut fracti ossis partes plurimum à se inuicem distent. Recentiores medici *ἀπὸ κλάμα* nuncupant, auctore Gal. comment. 3. *εἰς τὴν κατ' ἀπὸ κλάμα*.

*Ἀπυρρῆν*, significat apud Hippocratem. præcipue quidem abradere, aliquando vero corrumpere & extenuare.

*Ἀπικυρῶν*, concha excipere, aut in concham testamue reponere.

*Ἀποκρίνη*, species est fracturæ ossis, quam supra *ἀποθραυσιν* diximus appellari.

*Ἀποκρίνη*, vide in dictione *ἀπὸ κλάμα*.

*Ἀποκρατὴν*, coercere, retinere: ut apud Dioscor. de symphyto, καὶ ἐν περικύλῳ ἀποκρατὴν κατὰ πλάσιν μιν. hoc est, enterocelas illitu cohibet. & apud Aetium lib. 9. cap. 33. τὸ χολῶδες μετὰ τὴν ἐξορισμὸν ἀποκρατὴν μιν μετὰ τοῦ βλάπτει. hoc est, biliosum, postquam coaceruatum fuerit, retentum maxime offendit. Dicitur in eadem significatione *ἀποκρατὴν* à Galeno.

*Ἀποκρίνη δύναμις*, expultrix facultas. Est facultas naturalis qua singulæ partes superuacua excernunt. Nam cum cibo corpus alreficque oporteat, nec talis prorsus haberi-

possit, qui nihil omnino habeat dissimile nostræ substantiæ, ideo gigni excrementa necesse est, & vim aliquam nobis inesse, quæ ea à probo alimento secreta expellat. Ea inest singulis partibus, eiusque causa meatus cuique conuenientes natura molita est, per quos ea commodè deduci possint atque vacuari. Virtus autem natura in eam rem fibrarum seu villorum transuersorum ministerio. Per eos enim expellit, sicut per rectos attrahit. Est autem facultas hæc, in corpore bene habente, ordine quarta suoque munere post concoctricem fungitur. Primum enim attrahit alimentum oportet, deinde retineri, atque ita concoqui: tum demum, si quid superfluum est, excerni. Est enim ea naturalis vacuatio, quæ concoctioni succedit, eoque distinguitur à symptomatica siue morbosa, per quam crudorum vacuatio fieri solet. Sed quoniam quoad concoctionem fit, tandiu etiam retineri alimentum necesse est, & æquali omnino tempore retentricis concoctricisque actio durat, videtur sæpe numero expultrix tam coniuncta esse retentrici, ut vna alteri cedat. Quandiu enim retineri aliquid opus est, non excitatur ad actionem expellendi vis: & ubi retinendi facultas ab opere cessat, protinus mouetur expultrix: contraque ubi expultrix ad opus præritatur, mox retentrix cedit, & ab opere desistit. Quæ enim earum debilior est, alteri cedit robustiori. Quamquam autem ipse excrementorum proventus, satis per se sit ad excitandam eam facultatem tanquam alienorum expultricem, sæpe tamen etiam in sanis corporibus & secundum naturam se habentibus eorum copia aut acrimonia aut etiam dolore commouetur. Nam in eum usum bilem flauam natura excernit per intestina, ut ea inde irritata facilius stercorea deiciant. Verum eam acrimonia in excretionibus naturalibus mediocrem omnino esse oportet. Vbi enim viget vehementius, symptomaticas potius excretiones concitat. Facultas *ἀποκρίνη* dicitur etiam à Gal. *μεγιστὴν* lib. 3. facult. natur. Dicitur & *ἡ ἀποκρίνη*, quod bonum à malo separare videatur, ut apparet ex eodem in lib. de symptomatum differentiis, ubi symptomatica functionis naturalis persequitur. de qua tamen vide suo loco.

*Ἀποκρίνη φάρμακα*, Repellentia siue repellantia medicamenta. Sic dicuntur quæ in altum occurrentes sibi humores repellunt. Contraria sunt attrahentibus, ut quæ ex alto vehementius euocent. Itaque cum attrahentibus essentia sit calida & tenuium partium repellentibus frigida est, & crassarum partium. Attrahit enim perpetuo calidum, & repellit frigidum. Verum quod cum caliditate coniunctam habet partium tenuitatem, attrahit vehementius: quod vero cum frigiditate partium crassitatem, cuiusmodi est, adstringens, id maiorem vim propellendi habet. Est autem ab actionis vehementia *τῆς ἀποκρίνης* nomen impostum.



impositum. Itaque proprie ea repellunt quæ adstringunt, quanquam non ea quidem solum, sed etiam quæ sine adstrictione refrigerant, ut scribit Gal. lib. 14. meth. med.

**A** *πικρὸν*. est frutex virgis constans, graueolentibus, lentis virilium modo, fractu ferre inuictis, folio hederæ; molliore tamen & per extremum acutius, lento, graui odore, luteo liquore pleno. Siliquas gerit, ceu fabarum, folliculari specie, digiti longitudine protensas, in quibus semen est album, durum, paruum. Folia eius cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, pantheras enecant in cibo data: atque ab his animalibus peculiariter habent nomina, sed valde vsitato apud Latinos nomine brassica canina appellatur, sicut à Galeno *καὶ οὐρά μὲν*. Dicitur sicca esse citra siccitatem, & propterea emplastri modo impositam discutiendi vim habere. verum non minus homini malefica & exitialis, quam reliquis animalibus est.

**A** *πικραμμύνη καὶ κίαια*, id est, *ἐπεχόμενα*. alui suppressæ apud Hippocr. dicuntur in Prorethico. & eodem in libro *πικραμμύνησι θύον*, dicuntur *οἱ αἰσθητικοί*, ut plerique interpretantur, quasi à cibo seclusi. Nonnulli vero eos intelligunt quibus aluus adstricta est, de quibus etiam eandem vocem vsurpasse Hippocr. videretur *ἐν τῇ αἰσθητικῇ ὁρίαν*. Author Galen. comment. *αἰσθητικὸν*. Participium hoc est à themate *καταμύβατα*, frequens apud Hippocratem. Exponitur tamen diuersis modis. Bacchius enim exponit *πληρὴς ὄντος*. Epicles autem, *ἔστιν ἡ μύνησις*. Annotauit idem & Erotianus.

**A** *πικρὸς οὐρου*, dicitur *ἡ ὁπίσθεν οὐρου*, id est vrinæ suppressio, interprete Galeno in comment. *αἰσθητικῇ*.

**A** *πικρὸς ὅς φλέβων*. apud Hippocratem, venarum repletio & copia, ut interpretatur Gal. comment. 4. *αἰσθητικῇ*.

**A** *πικρὸν*. à Syris dicitur *ὁ κινδὺς κίκας*, qui thymelæ semen est, ut habetur apud Dioscor. sicut ab aliis *κίκας*: cuius ipse rationem hanc adfert, quod frutex qui illum producit, similis sit naturâ sariuo lino.

**A** *πικρὸν*. est potio dulcis, fauis multa aqua dilutis incoctisque. Curam omnem eius conficiendi hanc breuiter esse dixit Galen. ut nec fauis admodum sit vitiosus, coquaturque bene in fontana aqua, quæ & pura sit, & dulcis. Oportet enim, inquit, expresso à fauis melle cætenus in aqua coquere, quoad nulla inde spuma existat. Verum paulo exquisitius hunc in modum compositionem eius Actius explicauit. A fauis, inquit, candidis & pellucido melle plenius melmanibus exprimitur, optima fontis aqua permiscetur. Si mel quod distinctum manauit, crassius apparebit, quæternæ aquæ partes ad mellis singulas adiciuntur: sin liquidius profluxit, ternæ. Paulus tamen sine discrimine ternas aquæ partes & dimidiam miscet. Si aridiores sunt faui, dissecantur, & manibus subacti distringuntur. Hæc in olla noua in qua prius inferbue-

rit aqua, ut qualitas terrestris eluatur, igni lucido nec fumoso decoquuntur, deterfa iungitur spuma vel cæra quæ summam enatat. Vbi nihil amplius erit spumæ, & octaua aut septima circiter pars modicioris absumpta fuerit, reliqua refrigerati perfecte finitur. Die sequenti tollitur quod supra innatat. Reliquum reponitur in vâs testaceum, & reconditur in cella vinaria. Galenus annotauit comm. 3. *αἰσθητικῇ*, ab Hippocrate & plerisque aliis *πικρὸν* alio nomine vocari *ἐχόναν* siue *ἐχοναν*, & fieri à quibusdam ex melle & aceto, ab aliis vero ex fauis & aceto simul incoctis. Huius enim duplicem facit differentiam. Alterum, inquit, dulce est, alterum magis acidum est. Atque id rursus geminum est, aut enim ex melle constat & aceto, aut ex fauis & aceto. Nos, inquit Galenus, ex fauis conficimus, acetum melli adicientes, postea incoquentes, donec eorum qualitates in unitatem coierint, atque aceti vis frangatur. De apomelite, hæc fere medici prodiderunt, extergendi & incidendi vi præditum esse, biliola per aluû ducere, vrinam mouere, sed tamen calidis & ficcis naturis aduersari, morbis etiam calidis & præcordiorum inflammationibus sitim non sedare, imò vero augere. Dandum autem esse ante sorbitiones, quod à cibo noceat. Medium autem apomeli esse inter mulsam & oxymeli Galen. lib. 8. meth. med. prodidit.

**A** *πικρὸν*, idem quod *ἀμαμνὴς*, de quo supra.

**A** *πικρὸν*, hoc est protedens labra compressum, ut interpretatur Galenus in explicatione vocum Hippocratis.

**A** *πικρὰ*. dicuntur medicamenta quæ dolorem & lassitudinem leuant, quæ propriis nominibus *αἰσθητικὰ* & *αἰσθητικὰ* appellantur, de quibus suis locis.

**A** *πικρὸν*, *καὶ ἐπισπινδαν*, apud Hippocr.

**A** *πικρὸν*, est nervosum quid, tenue & latum, ex musculo exorietis. Nervus quidem non est, sed corpus inter ligamentum atque nervum naturâ medium, latum semper & aliquando tam tenue ut membrana videri posset, nisi fibris quibusdam intercurrentibus ab ea distingueretur. E musculo ducit originem, vel potius, ut quibusdam anatomes peritis visum est, extremitas est musculi (in eam enim musculus definit) alibi magis minus nervosa. Has enim duas differentias faciunt *καὶ ἐπισπινδαν*, hanc *αἰσθητικὰ*, illam *καὶ ἐπισπινδαν* appellantes. Dicit etiam eo nomine ab Hippocr. *πικρὸν*, hoc est redinem, scribit Galen. comment. 2. *αἰσθητικῇ*.

**A** *πικρὸν*. vocatur ab Hippocrate pars quælibet corporis quæ in extremitate tenuatur, sicut brachium iuxta brachiale, & crus iuxta pedem, ut annotat Galen. comment. *αἰσθητικῇ*.

**A** *πικρὸν*, tamenta, quæ ab intestinis per *αἰσθητικὰ* abraduntur humoris acrimonia, quæ strigmenta quidam appellant.

**Aπώμιαι.** verbum est apud Hippocr. interdum quidem actiue significationis, vt libr. 1. de morbis mulierum, interdum passiuę, vt in lib. de natura humana significat autem expellere vel expelli.

**Aπώμιαις.** id est, expulsio: apud Hippocr. *ἀπὸ τῆς ἀπώμιαις*.

**Aπώμια.** est obstructio principis communis neruorum, sensum motumque omnibus corporis partibus repente adimens, & principes actiones offendens. Eius repentina quidem accessio significat humorem plane frigidum, crassum aut viscosum replere & obstruere præcipuos cerebri ventriculos, non autem propter totius eius substantię intemperiem excitari. Est enim vitiosus humor sola eius causa, in cerebro citra putredinem citraque febrem consistens, pituitosus præsertim, aliquando vero & melancholicus, de quo scripsit in aphorismis Hippocr. Apoplexias maxime excitari a quadagesimo anno vsque ad sexagesimum. Hic humor non modo principes cerebri ventriculos affatim implet, sed cerebri etiam corpus imbuit, vt nullus vel perexiguus spiritus animalis in neruos subeat. Qua quidem in re *ἀπὸ τῆς ὁπλῆς* differt, in qua non abolitus sed deprauatus tantum facultatis animalis motus est, atque similiter *ἀπὸ τῆς ἡμιπλῆς*, siue *ἀσθενίας*, quæ nõ toto cerebro obstrueto, sed altera tantum eius parte gignuntur. Cæterum quamuis in apoplexia motum omnem perire dixerimus, seruat tamen necessario aliqua ex parte respiratio, in quam totis viribus natura enititur, omnesque suos conatus intendit, verum difficulter admodum procedit, tantoq; difficilius, quanto obstructio maior existit. quo vno argumento periculi magnitudinem intelligimus, & a cæro atque catalepsi discernimus, in quibus libera solet esse respiratio. Senes maxime tentantur apoplexia, idq; per hyemen: sed & iuniores aliquando, qui cibo & vino immodice indulgentes cerebrum assiduis cruditatibus frigidius & imbecillius reddiderunt. Non facile seruantur qui in hunc morbum inciderint, cum sit & natura magnus & valde acutus, aut si bonã aliqua fortuna eos periculo subtraxerit, longis tamen morbis conflantur & languent, vel toto corpore, vel aliqua omnino parte resoluti, aut etiam mente capti. Sed fere fit vt sublata apoplexia dimidii corporis resolutio succedat, quam Græci *ἡμιπλῆς* siue *ἀσθενίας* vocauerunt. Sic quidem habet vniuersalis apoplexia, totum corpus sensu motuque priuans. Cui similis affectio si vnã aliquam partem occupet, illius partis *ἀπώμια* dicitur. Scripsit enim Hippocr. *ἀπώμια αὐτῆς τῆς κεφαλῆς ἢ τοῦ ποδὸς*, hoc est sensu motuque carens illi crus euaserat.

**Aπώμια.** hoc est, porrigit: apud Hippocr. *ἀπὸ τῆς ἀπώμιας*. quo tamen in loco varie ab interpretibus exponitur, vt ibi annotat Galen. comment. 1.

**Aπώμια.** id est, extinctus, apud Hippocratem.

**Aπώμια.** fastidium ciborum & inappetentia, sed vt aliquid tamen assumatur. Galen. apud Hippocr. Aphor. 17. libr. 4. interpretatur. *ἀπὸ τῆς ἀπώμιας*. Hæc in eo differt *ἀπὸ τῆς ἀσθενίας*, quod hæc abstinencia sit a cibo in totum, & voluntaria sit, non autem, vt illa, morbi alicuius symptoma.

**Aπώμια.** dicuntur apud Hippoc. ea quæ fastidium cibi, & inappetentiam faciunt.

**Aπώμια.** dicuntur ab Hippocr. *ἀπὸ τῆς ἀπώμιας*, id est, inappetentes & quæ oblatos cibos propter morbum fastidiunt. Qui autem appetentia carentes, sani tamen eos non sumunt, *ἀσθενίας* Græci appellant, vt author est Galen. comment. in librum primum *τῆς ἡμιπλῆς*.

**Aπώμια.** est species vna fracturæ cranii, quam tertiam constituit Galenus, cum ipsum finditur, osque rumpitur, & a reliquo osse discedit, sic vt in eo teli vestigium relinquatur. Hoc leui telo fit & acuto, quod interdum summam partem, interdum altè os diuidit, nonnunquam ita vt testam resoluat, perinde ac si fascia ligni fragmentum abscindatur, præsertim si fractus a latere fuerit. Ideoque a quadam similitudine *ἀπὸ τῆς ἀπώμιας* iuniores appellatur: siquidem *ἀπὸ τῆς ἀπώμιας* significat.

**Aπώμια.**

**Aπώμια.** quid sit aperte Galenus declarat. lib. 2. ad Glauconem, dicens sic vocari eum affectum, quando humores aliqui, qui prius in aliqua parte molesti erant, ea relicta in alteram transeunt.

**Aπώμια.** significat apud Hippoc. in acutum fingi siue in acutam figuram duci, vt annotat Galen. comment. 2. *ἀπὸ τῆς ἀπώμιας*.

**Aπώμια.** dicitur omnis solutio continui quæ organicis partibus accidit: sic enim vnico vocabulo appellatur, quod nullum in similibus est, in quibus continui diuisiones diuersa nomina sortiuntur, vt scribit Gal. in li. de constitut. artis medicæ. Idem autem initio lib. 4. meth. med. dicit *ἀπώμια* significare continui solutionem, quæ ligamenti accidit vt *πῆγμα* & *θλάσμα*, quæ in valis musculisque ex violento ictu vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitatur. Hippocrætes autem *ἀπώμια* appellat cum abruptis iis quæ ossa inter se connectunt, ipsa quæ prius iungebantur, plurimum ab inuicem dehiscunt. sicut annotat Gal. comment. 3. *ἀπὸ τῆς ἀπώμιας*.

**Aπώμια.** est spongiæ vel siccæ, vel aqua perfrusæ affectio. Eam scripsit Archigenes adhiberi, cum in reliquis corporis partibus, tum in facie, in illis quidem ad detergendum, vel sordes adhærentes, vel saniem, vel sanguinem, vel pus, vel ipsa etiam medicamentâ, vel ad sedandos dolores, quos morsus aut pruritus excitat: in hac autem, vt renouemus & suscitemus languescētes spiritus, velut in animi defectibus contingit, quibus opitulamurestate quidem affusa frigida,

frigida, hyeme autem egelida, perinde atque per vigorem ingentis caufi, in quo non modo facie, verum etiam pectus per spongiam perfundendum esse Archigenes præcipit, secus ac in principio aut incremento accelfionis: in eo enim non per spongiam, sed per odoramenta ægri refocillari solent.

**Αἰσθήμα**, abscessus. Idem quod **ἰσθήμα**. Verum quibusdam locis Hippocrates appellat **ἰσθήμα**, vnius morbi in alterum μεταστροφήν, id est transitionem, quam etiam medici μεταστροφήν vocant. Idem vero etiam **ἰσθήμα**, hoc est, vacationem quæ per effluxum fit, vt lib. 1. **ἰσθήμα**, sicut in comm. annotat Galenus.

**Αἰσθήμα**. Latinis dicitur abscessus, vt ait Celsus. Est autem tumor omnis, qui digeri non potuit, in suppurationem conuersus, non tam perfecte quidem vt pus iam factum sit, sed vt vitari non possit. Nanque vbi perfectum est, non simpliciter **ἰσθήμα**, sed **πυμμή**, hoc est coctum, appellatur à medicis. Dicitur **ἰσθήμα**, vt scribit Galen. ad Glauconem, **ἰσθήμα** **ἰσθήμα**, quod abscedere significat. Partes enim quæ humorem præter naturam in se recepere, resoluuntur à se inuicem, & quæ prius contigua erant, disperantur. Nascitur fere omne **ἰσθήμα** ex phlegmone siue vera sit, siue **ἰσθήμα**, vel ex erysipellate phlegmonode. Verum tamen vt Gal. ait, aliquando etiam consistit nullo eiusmodi affectu præcedente. Nam, statim, inquit, ab initio vel humor aliquis superuacuum, vel spiritus vaporosus aut ipsa in parte, quæ affecta est, genitus, aut alicunde decumbens, sicut accidit **ἰσθήμα**, colligitur certo in loco, qui putrescens vicina tandem corpora excoriat atque ab inuicem dirimit, atque vt alias specie alius est, sic aliquando vtorum tum humorum tum solidorum corporum figuras exprimit. Atque inde duæ summæ **ἰσθήμα** differentie defumuntur. Alia enim simpliciter **ἰσθήμα** sunt, & tunica carent: alia tunicam habent, in qua corporum quorundam species & formæ continentur, instar lapidum, arenarum, testarum, lignorum, carbonum, luti, fecis, auræ, & multorum aliorum, quæ in tres diduci species solent, **ἰσθήμα**, **ἰσθήμα**, & **ἰσθήμα**. Signa omnium communia sunt igneus loci feruor, tumor eminens ruberque magis solito & durus cum dolore punctorio, pulsus, & grauitate, vt aliquid ex ipsa parte pendere videatur. Paulus Ægineta lib. 4. diffinit **ἰσθήμα** esse carniū siue carnosarum partium, musculorum, venarum, & arteriarum corruptionem atque immutationem. Nec vero prætermittendum est, quod, sicut **ἰσθήμα** aut alio tumori **ἰσθήμα**, ita **ἰσθήμα** **ἰσθήμα**, hoc est sinus, succedit. Quādiu enim humor in medio carnosarum partium spatio consistit & putrescit, nec pars ipsa affecta aperta est, Græcis **ἰσθήμα** dicitur, id est abscedere, ipsumque vitium **ἰσθήμα** nominatur: verum si qua aperiatur, vt hu-

mor qui intus continetur exitum habeat, vitium non iam amplius **ἰσθήμα**, sed **ἰσθήμα**, hoc est sinus, appellatur, vt annotauit Gal. comment. 2. **ἰσθήμα** **ἰσθήμα**. Cæterum **ἰσθήμα** nomen Hippocr. usurpat non modo in abscessibus eiusmodi, de quibus modo diximus, sed etiam in fracturis, in quibus quæ fracta sunt **ἰσθήμα**, hoc est, ad inuicem discedunt, merito affectus ipse **ἰσθήμα** vocatur. Sed Gal. non **ἰσθήμα**, sed **ἰσθήμα** to nomine **ἰσθήμα**, id est, continui solutionem appellat.

**Αἰσθήμα**. Id est, firmamenta, videtur Hippocr. appellare quæcunque sine vinculo ægre parti vniuersæ superdantur, aut à sinistra vel dextra parte, aut à superiori vel inferiori, sicut annotat Gal. comment. 3. **ἰσθήμα** **ἰσθήμα**.

**Αἰσθήμα**. abrafa, siue abrasiones. Sic dicitur solutæ continuatis species fere superficialia, abrafa scilicet cute & interdum suspensa & nigrescente. Gallicum vulgus cutis deflo- rationes appellat.

**Αἰσθήμα**. idem quod **ἰσθήμα**, siue **ἰσθήμα**. id est, scarificatio: vide in dictione **ἰσθήμα**.

**Αἰσθήμα**. proprie dicuntur amuleta, quæ appensa alligataque incantamenta magica & venenorum insidias arcent, aut inefficaces reddunt. Pertinent autem etiam hæc ad medicinam, vt testatur Gal. nec sunt à ratione aliena, vt **ἰσθήμα** ab Archigene prodita, & à Galeno explosa damnataque.

**Αἰσθήμα**. apud Hippocr. significat abortum, quem Attici **ἰσθήμα** appellant, vt annotat Gal. comment. 1. in lib. 6. **ἰσθήμα**.

**Αἰσθήμα**. **ἰσθήμα**, id est scarificatio, apud Hippocr. lib. 1. de morbis.

**Αἰσθήμα**. **ἰσθήμα**. apud Hippocr. exiccat, indurat, sceletum facit.

**Αἰσθήμα**. palpitant, saluunt, pulsant, lib. 2. de morbis apud Hippocratem.

**Αἰσθήμα**. Fæculæta colatura, apud Hippocr. quæ & **ἰσθήμα** dicitur.

**Αἰσθήμα**. Sunt medicamenta quæ vel gargarizata, vel commanducata, vel palato illita pituitam à capite in os eliciunt. Sunt autem omnia eiusmodi calide & acris facultatis, per quam pituitam partim eliquantia, partim attrahentia, partim etiam facultatem, quæ in cerebro est, alieni expultricem irritantia, actionem suam perficiunt. Fertur autem stillatque eo pacto pituita cum à toto cerebro, tum maxime ex prioribus eius ventriculis in eam cauitatem, quam ab usu **ἰσθήμα**, quasi infundibulum appellant: atque inde per palatum in os decedit atque excernitur.

**Αἰσθήμα**. Est pars ossis extuberans. In hoc enim differt, **ἰσθήμα**, quod hæc veluti quiddam sit ossi adnatum, nec tamen sit ossis cui adnatum est portio: **ἰσθήμα** vero pars sit totius ossis productior & eminentior, nihilque à reliquo osse differens, quam quod tuberculi seu gibbi instar ex osse procedit. Ea

autē in quibusdam ossibus simplex est, vt in radio: in aliis multiplex, vt in vtraque parte brachii, cubiti, femoris, tibiae, in gena inferna, sphenoidē, occipite, osse frons, temporū, omoplati, & vertebri omnibus. Vtus autē varius est, alibi ad tutandas articulorū insertiones, alibi ad firmanda capita musculorū, vel ad munimentū neruorum & reliquorū vasorum, vt docuit Gal. Qui Græca in Latinum verterūt, *ἀσπὴν* processum, excessum, explantationem, additamentum subinde interpretantur. Dicitur & alio nomine in quibusdam ossibus *ἱερὸς*.

*Ἀτρυμα*. vide in dictione *ἀτρυμα*.

*Ἀτρυμα*. Zopissæ genus est, quod fit de resina à naniibus resina vna cum cera. Aetius resinam vna cum cera à naniibus abram interpretatur. Quidam vero resinam ē picea intelligunt. Ossalius hoc modo præparat: Picis aridæ libram vnā, picis liquidæ, cere, singulorum vncias quatuor, resinæ pinus vncias sex. Omnia liquata & excolata in peluim aquæ marinæ vel communis plenam consiciuntur, & manibus, pastilli in modum, subiguntur. Magnam habet vim emolliendi.

*Ἀσπὴν*. apud Hippoc. lib. 6. *ἢ ὀσπὴν*, *ἢ ὀσπὴν*. hoc est, pedere, sicut explicat Gal. comment. 3.

*Ἀσπὴν*. tentari & lædi, apud Hippocr. vnde apud eundem *ἢ ἄσπὴν* *ἢ ὀσπὴν* significat mentis læsionem & offensam, vt annotauit. Gal. comment. 3. *ἢ ἄσπὴν* *ἢ ὀσπὴν*.

*Ἀσπὴν* *ἢ ὀσπὴν* dicitur apud Hippoc. hordeum integrum, siue in integras farinas diuisum, siue imperfecte fractum, & à quo pars futu-  
tea secreta non est, vt explicat Galen. *ἢ ὀσπὴν*.

*Ἀσπὴν* *ἢ ὀσπὴν*: est pleuritis, in qua nihil spuitur, sed tussis inanis est & sicca. Id accidit, q̃ humores crassi & lenti pulmonis fibris cartilaginosis, quas *βρόγχους* appellant, firmiter impacti sint.

*Ἀσπὴν*. vacuitas à febre. Dicitur id temporis interuallum quod est inter duas accessiones vacuum liberumque à febre. A Celso integritas Latine dicitur.

*Ἀσπὴν*. Est alterum genus mali punici, cui lignosus nucleus nō est, sed candidior est natura, & blandiores acini, minusque amari, distincti membranis. dicitur *ἢ ὀσπὴν*, quod nucleum lignosum significat.

*Ἀσπὴν*. significat apud Hippocr. specillum quod acumen non habet, hoc est, *ἢ ὀσπὴν*, siue auricularium specillum.

*Ἀσπὴν*. ignem non expertum, non vstum. Dicitur & Plinio hoc nomine alumen viuum.

*Ἀσπὴν*. lapis Arabicus. Est marmor albu, maculoso ebori simile: sic dicitur quod reperitur in Arabia. Is lapis tritus illitu hæmorrhoides exiccat, cinisque eius dentifricio optimus est.

*Ἀσπὴν*. herbe nomen est ad cubiti altitudinem assurgens. tenues spargit ramos, & ex vtroque latere folia, seu lepidii, sed molliora

& candidiora. In casumine vero sambuci vimbellam gerit, candidos flores habentem.

A quibusdam *ἀσπὴν* etiam dicitur.

*Ἀσπὴν*. apud Hippocratem multis in locis significat motum & perturbationem quæ in quauis parte oboritur, sed maxime in ventriculo & cibis diuersarum qualitatum, vt annotat. Gal. in comment. *ἢ ὀσπὴν*. Significat autem proprie motum & palpitationem cordis ex gymnasticis exercitiis, & cordis pulsū. Erotianus tradit dici *ἢ ὀσπὴν* *ἢ ὀσπὴν*.

*Ἀσπὴν*. rarum. Proprie quidem dicitur quod meatus, quos Græci *πόροι* vocat, magnos per totū obtinet: sicut ē diuerso Densum, quod eosdem paruos. At per metaphoram siue abusum, siue quocunq; alio genere appellasse libet, de laxo coactoque hæc ipsa vocabula dici audias. hæc enim ratione & aerē & ignem raros dicimus, aquā & terram densas: scilicet ad elementa ipsa translatis appellationibus, quæ tamen & vnita sunt, & ex similibus natura partibus constant. nec vllis eiusmodi meatis obinent. Rarum ergo est, cuius partes spatii inanibus interceptæ sunt. Inane autem id appello, quod aere plenum sit. Id autem corpus spatii multis distinctū facilius quam spissum accenditur, etiam si, quod ad caliditatis & frigiditatis attinet temperiē, similiter illis sit affectū. Nam qui in iis spatiis continetur aer, cum sit ad patiedum promptissimus, primo statim ignis occurſu accenditur atque inflammatur, vna vero secū corpus vniuersum accendit, vnāquāq; eius partem nimirum occupans.

*Ἀσπὴν*. significauit apud veteres, vt scripsit Rufus, ventrem & vniuersa intestina. quanquā Helychius tenuia tantum intestina interpretatus sit. Pro intestinis vsurpasse videtur Nicander in Theriacis, loquens de viperæ foribus: — *ἢ ὀσπὴν* *ἢ ὀσπὴν*, *ἢ ὀσπὴν*. hoc est, — per intestina parentis Rosa aluo emergunt in lucem matre carentes. Inde nunc etiam *ἢ ὀσπὴν* appellatur, quod idem est atque *ἢ ὀσπὴν*.

*Ἀσπὴν*. pulsus rarus. quando quietis tempus inter diastolen & systolen medium longum est: vel cuius media quies longo durat tempore. oppositus est *ἢ ὀσπὴν*, sumptaque est hæc differentia à tempore quietis, seu à quantitate temporis quietis. Proprius est imbecillæ facultatis, vsusque deficientis.

*Ἀσπὴν*. est spiritus qui longo tempore trahitur, apud Hippocr. lib. 1. *ἢ ὀσπὴν*. Accidit mente capitis, qui quodammodo obliui respirare, tam raras respiraciones efficiunt.

*Ἀσπὴν*. dicuntur quibus libera corporis transpiratio est. Alio nomine *ἢ ὀσπὴν* appellantur. Nomen inditum à corporis raritate, quæ plurimum valet ad transpirandum.

*Ἀσπὴν*. relaxantia medicamenta. Sic dicuntur quæ meatus cutis aperiunt. Eiusmodi



Eiusmodi autem calida sint oportet & tenuum partium, minimeque deficcantia, quod aliter substantiam nec diffundere, nec laxare possint. Ad hoc autem consequuntur, ut & pori dilatentur. Id quod præstare nequeunt tum valde calida, tum multum exiccantia: illa quidem, quod actia sunt atque horrores moueant, hæc autem quia sensilia corpora colligunt, quorum neutrum sine dolore fieri potest. At quæ citra molestiam exalfaciunt, ea sola omnium sunt rarefacientia. Siquidem rarefactio dilatioque voluptatis, non etiâ doloris opus est. Vt enim dolor comprimit, ita voluptas expandit. Contraria iis sunt *πεπρωμένη*, hoc est, cōdensantia de quibus suo loco agitur. Differunt *αἰσθητικὰ*, quod hæc vasorum oscula, illa cutis meatus aperiunt, & præterea propria substantia, ut docet Gal. lib. 5. simpl. medic.

*Ἀγχιόδια*, planta est Egypto peculiaris & cibus idonea, nec folium, nec herbam ullam aut quicquam aliud simile supra terram habes, sed geminum & utraque parte fructum ferens: ex quo etiam *αμφιγάρτος* cognominata fuit. Similis est *ἡ ἀγχιόδια*.

*Ἀγχιός*, idem quod *ἄγχιος* apud Hippocr. Galenus in *ταῖς γλῶσσαις* scribit ab eo sic vocari triticâ leguminâ, & *ἄγχιον* legumen esse.

*Ἀγχιός*, ut Theophrasto placet, in lente exit, res scabra & dura. Galeni patet agriculturæ studiosus, cum per senectam ruri degeret, inuenit *ἄγχιον* quodam degenerationis argumētum durum atque rotundum innascenti, cibo tamen damnatum. Eius semen Galenus tradit cicerculæ proximum eamque reliqua facie tam æmulari, ut multi idem esse genus existiment, cum & vsu & viribus cōsentiant. Hesychius interpretatur *ἡ ἄγχιον*, *ἡ ἀγχιόν* *ἡ ἄγχιον* hoc est, legumen aliquod, quod & *ἀγχιόν* appellant: cum quo etiâ Gal. comment. lib. 1. de alimentis ex quorundam sententiâ scribit *ἄγχιον* esse agreste quiddam, rotundum ac durum, eruo minus, quod inter Cereales fructus reperitur, & abiici solet. Dicit autem fieri ex fabis degenerantibus, non aliter quam *ἀγχιόν* ex hordeo, *ἡ ἄγχιον* ex eruo, degenerante proueniunt.

*Ἀγχιόδια*, planta est quæ nec folium, nec herbam ullam, nec quicquam aliud simile supra terram habet, sed fructum in radice fert, non ea quidem quæ cariosa est, & simplex altius infigitur, sed fibris quas per summa cespitum agit. Sic dicitur quia *ἡ ἄγχιον* similis sit.

*Ἀγχιόδια*, est tunica humoris crystallini, semicircularis tantum, ipsum dimidium ab anteriori duntaxat parte ambiens. Nulla enim parte posteriorem crystallini humoris sedem contingit, sed ab anteriore humoris ipsi crystallino proxima est tenuis & admodum pellucida & venulis intertextâ, aranearum telæ non dissimilis, unde nomen accepit. Præterea substantia non multum à cornu aliena est firmitate, duritie, tenuitate, leuitate, perspicuitate: nec tamen *μεγέθυς*

illi nomen est, sed alteri tunicæ, de quâ vide suo loco. vide etiam *ἡ ἀγχιόδια*. Legitur vero & in lib. Defin. Med. *ἀγχιόδια* *ἡ ἀγχιόδια*, hoc est pulsus araneæ speciem referens, hoc est parvus, & qui brevis aurtæ impulsu mouetur.

*Ἀγχιόν* apud Hippocratem lib. de articulis est calceamenti genus, quod arte pedem vniuersum & exquisitè usque ad talos completitur, ut annotat Gal. comment. 4. in quidam librum. Idem in *ταῖς γλῶσσαις* explicat *ἀγχιόν*, *ἡ ἀγχιόν* *ἡ ἀγχιόν*, hoc est, calceos altos & profundos.

*Ἀγχιόν*

*Ἀγχιόν*. Est oculi vlcusculum, quod in iridis circulo nascitur, partem quidem aliquam candidi, partem vero etiam nigri comprehendens. Id extra quidem iridem rubicundum, intra vero candidum apparet. Per ipsum tunica vniuersa aliquando prociat, si profundius sordidiusque euaserit.

*Ἀγχιόν*, herba est similis papaueri sylvestri, foliis anemonæ diuisis, florem habens puniceum, caput caulo papaueris quod rheas dicitur, duntaxat longiore, superius partibus fuso in maiorem latitudinem, radicem rotundam, succum colore croceo, sapore acrem. Sic videtur dicta quod argema & nubesculas expurgat. Apud Helych. & Galen. scriptum *Ἀγχιόν*, penultima breui.

*Ἀγχιόν*, apud Hippocratem libro de fracturis, significat durum & insuauē, quod nihil cedat, ut auctor est Gal. comment. 2. in eundem librum.

*Ἀγχιόν*, serpentis nomen apud Hippocratem.

*Ἀγχιόν*, argilla: terra est candida: unde & nomen habet, & creta figuraris appellatur.

*Ἀγχιόν*, dicitur à nonnullis *ἡ ἀγχιόν*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Ἀγχιόν*, species vna est lithargyri, siue spume argenti, sic dicta vel à materia, quod ex argento, hoc est mistura plumbi & argenti, fieret, ut scribit Plinius, vel à colore tantum, quod instat argenti candida esset, ut ait Dioscorides, etiam si forte argenti nihil haberet: siquidem eam quæ ex argento cōficeretur tradit *ἡ ἀγχιόν* appellati: potest enim illi color candidus citrà argenti immixtionem induci à coctura non vehementi, veluti quæ maiorem vim ignium passa est, fuluum auri colorem contrahit, atque ab eo *ἡ ἀγχιόν* nuncupatur: vel eo modo quem scriptum prodidit Dioscorides, docens ex eo manifeste argyritidi colorem album arte potius cōciliari, quàm argenti mistura. Vide *ἡ ἀγχιόν*.

*Ἀγχιόν*, argentea terra: Est quæ ex argenti metallis sumitur, non habens quidem per se totam immixtum argentum, sed paruas argentæ portiones, paruis sui particulis immixtas.

*Ἀγχιόν*, species est edulii à lacte cōfecti, ut habetur apud Galen. *ἡ ἀγχιόν*, *ἡ ἀγχιόν*.

*Ἀγχιόν*, dicitur apud Hippocr. sordes quædam & impunitas. Apud Helych. est *Ἀγχιόν*. Apud

eundem itemq; apud Erorianum, est etiam *Ἀππῶς* eadem significatione. vnde *Ἀππῶς* *τοῖς ἰσχυρίσιν*, id est, sordare vel sordere.

*Ἀππῶς* nomen est *ἁπλῶς* ab Andromacho cōpositi ad rimas & cōdylomata. Refertur ab Actio lib. 14. cap. 3.

*Ἀππῶς* significat apud Hippocr. id quod articulis quadrat & conuenit.

*Ἀππῶς* articularis morbus. Est articuli tumor dolorificus, quem fluxio in eum decumbēs excitauit. Aliqui inflammationem esse definiunt, sed male, quod aliquando plus cōdematis aut alterius tumoris sit quam phlegmones, pro humoris varietate; ex quo fit vt multiplex sit arthritidis tumor, variaque adiuncta habeat symptomata. Si nanq; sanguis in vitio est, calor & rubor adest, propria tumorem *ῥευματισμῶν* symptomata: si pituita, cōdematosus apparet, citra ruborem & calorem: ita si bilis alterutra tumorem creauit, sua quamq; symptomata cōmitatur, sicut cēlēberrimi medici accuratissime distinxerūt. Nec est quod quisquam obiciat sanguinem non posse videri materiam arthritidis, quod in articulo collectus phlegmonem non excitet, quā in pus vnquam cōuerteri visa sit. Neque enim necesse est omnem sanguinis affluxum phlegmonem concitare, nisi in muscūlum aut carnem fiat, nec potest effusus sanguis in pus mutari, nisi loci calore suppuratio iuuetur. Id quod in articulo membranoso, exanguis, frigido contingere non potest. Quamobrem nulla arthritidis proprie phlegmone dici potest, sed aliqua merito tumor phlegmonodes cēteri, propter multorum symptomatum concursum, quē sunt veris phlegmonis peculiaris. Vanum quoq; est putare a pituita non fieri arthritidem, quod per cachexias pituitosus humor decubens in crura non efficiat arthritidem. Nisi enim intra ipsum articulum humor descenderit, quantumuis per vnuerſam carnē partēq; cōcūpōsitās diffusus sit, arthritidis non erit. Patet ergo tum ex iis, tū ex ipso nomine etymio, ipsum articulum, quod Græci *ἄρθρον* vocant, arthritidis sedem esse, quē primū & per se in eo morbi genere laboret. Quo tamen nomine non ipsum modo ossis, quod inseritur, caput, nec alterius ossis *κεφάλαιον* intelligo, sed & ligamenta & membranas & tendones, & quicquid ad articuli structurā firmitatemq; natura comparauit. Siquidem per arthritidas eā partes non sunt a morbo immunes, cum etiam in longius distitis, vt musculos cutemq;, affectionis labes perueniat. Id quod vel magnitudine fluxionis cōtingit, quē in loco proprie affecto cōtineri non potest vel maiore externarum quā internarū partiū imbecillitate. Quod facile quis intelligeret, si duas esse causas ōnis arthritidis secum reputauet, articuli imbecillitatem, & superfluum humorem. Ac imbecillitas quidem vel vitio erit, vitz contracta est, vt per immoderatos labores, frigus vehemens immodicam viderem, quzq; natu-

ralem articulorum compagem relaxant: vel natiua est, atq; congenita, qualis esse solet iis qui parentibus articulari morbo obnoxiiis nati sunt, aut articulos eorumq; spatia laxiora habent, proindeque humorem aduentitium prompte admittūt, qui altera arthritidis causa existit. Sed vnde humor ille sit, & qua via ad articulum male affectum perueniat, a quibuscūq; in dubium reuocari video. Nec tamen illis assentior, qui omnem eum humorem a capite ferri putant, & sub cute per summa corporis in extremas partes influere. Primum enim quis concedat a solo pectore fluxionem fieri, cum apud medicos receptum sit & axiomatis fidem habeat, robustas partes excrementa sua in debiliores deponere? Hæc aut depositio transmissioq; fluxionis species quēdam est. Deinde vero si demus (quod certe verissimum est) maximam fluxionum partem a cerebro descendere, quid opus est insuetum quoddam iter comminisci, spretis iis vasīs, quibus cū canalibus, fluxus & refluxus humorum natura fieri consuevere? Verisimilius mihi quidem videtur humorem in articulos non modo secundum membranas neruōsq; defluere, sed per venas etiam perque arterias, per quas alimentum ad omnes partes peruenit, non minus vitiosi succi quam boni capaces; & plerūq; eo referas, quem in articulos eius copia aut mala qualitate irritari deponunt, si eum a se illi repellere non queunt. Ex iis patet arthritidis duas esse causas, articuli imbecillitatē & vitiosum humorem, esseq; ambarum concursum in gignenda arthritide necessarium, quod neutra seorsim arthritidem creare valeat. Quare nō omnis articulorum dolor *ἄππῶς* dici potest; veluti qui per siccas tēporū cōstitutiones humiditate articulorū cōsumpta aliquando exoritur: patetq; Hippocr. *ἀππῶδες* nomine abusus aphoris 16. lib. 3. vbi scribit eā per siccitates fieri. Est enim necessarius affluxus humoris ad morbi articularis generationem, alioqui difficilis quidem articuli motus, atq; forte dolor propter siccitatem futurus est qui tamen *ἄππῶς* non erit, nisi quis omnem articulorū dolorem ita velit appellare. Ipse namq; Hippoc. lib. 2. *ῥευματισμῶν* eos qui per famem leguminib; vescibatur, genuū quidō dolore perpellos fuisse prodidit, quos tamē *ἄππῶδες* nō vocauit. Hic igitur humor si in aliquem articū decūbat, seque; in eius spatia, ligamēta, tendines ita insinuet, vt eorum distentionē & calorem præter naturam cōcepto dolorem pariat, eius articuli morbū gignit qui ab affecta parte nomen accipit vt in pedes decubēs, *ἰσχυρῶν*, in manus *χευρῶν*, in coxam *ἰσχυρῶν*. Si vero in multos simul articulos incidat, tunc verē & proprie *ἄππῶς* nuncupatur. Medicorum tamen veterum plerique non tam de nominibus solliciti *ἄππῶς* etiam interdum vocant vnus modo articuli affectionem, qualis ante exposita est.

**Articulus.** Est naturalis ossium συνάρτησις, ut definit Gal. lib. de Ossibus. vel, est ossium coniunctio ad motum comparata. Verum ab Hippocrate ἄρθρον fere semper nuncupatur alterius coherentium ossium finis rotundis in ossis propinqui cavitatem insertus: definiturque ἄρθρον esse ossis caput, sine, ossis processus, qui in alterius ossis cavitatem inseritur. Id enim os quod inseritur, ἄρθρον, cavitatem autem quod recipit, ὑπολήνη vel ὑλήνη ab Hippocrate dicitur, ut annotavit Gal. comment. 2. in librum de fracturis.

**Articulus est διαρθρωτός,** in qua ossis cavitatem articulum excipiens superficialis est, caputque quod in eam inseritur, humile atque depressum. Eius exempla plurima habentur in corpore, ut in occipite cum prima colli vertebra. ingena inferna cum osse lithoide. in radio, cum carpo. in astragalo cum scaphoide. in digitis pedum cum pedio. in digitis manuum cum metacarpo. in costis cum vertebra earumque apophyseis transversis. & in clavicula cum pectore: cuius motus quantum sit exiguus atque obscurus, potius tamen ad diarthrosim quam ad synarthrosim referri debet, ut quibusdam anaromēs peritis viris placuit: quia non sit necesse in omni diarthrosi motionem æque validam evidenterque esse, sed in ea quoque, ut & in aliis rerum differentiis, aliquot sit secundum magis & minus discrimen.

**Æla,** siue ἀρχία, apud Theophrastum, arbor est perpetua frondis, inter robur & ilicem media: quam Theodorus Latine aquifolium reddidit.

**Ælimon.** dicitur apud Hippocratem mulier quæ cito prægnans est.

**Æmcaplânios** nomen est emplastri, quo Paulus parotidas iam induratas emollit. lib. 3. cap. 23. Describitur ab eodem libr. 7. cap. 17. & plenissime à Gal. lib. 1. ἄρτιον ἢ ἄρτιον.

**Ælis**

**Ælisarion.** Est herba pusilla, eiusdem fere cum arboris generis, radice acri, bulbosa, & oliæ magnitudine. verum ut arbor acrior est, sic eo minor est: ut non ab re dubitauerit Barbarus in Plinianis castigationibus, num hæc herba ælis ab Hippocrate dicta sit diminutiva forma, quasi aron paruum. Est autem ælis apud Hippocratem non tantum herba, sed & instrumenti cuiusdam nomen.

**Ælisarion.** dicitur à quibusdam ἡ ἀλσάρια, ab effectus præstantia conduplicato nomine. Id enim duo nomina significat ex quibus hoc nomen factum est.

**Ælaxia.** herba est trium generum. Rotunda, quæ femina dicitur, tuberibus radicum rari modo orbicularis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, foliis hederæ subrotundis, cum acrimonia odoratis & mollibus, floribus candidis pilei similitudine, in quibus quod rubrum est graviter olet: malum terræ à Latinis dicitur. Altera longa est, mascula vocata, nonnullis ἀκρωτής, radice longiore, procerioribus foliis,

exilibus ramulis & dodratalibus, flore purpureo, graue virus olenre, qui dehiscens in pyri similitudinem turbatur. Tertia longa etiam est, κλημάτης dicta, quasi sarmentaria, ramulos habens tenues, folia subrotunda, sed o minori similia, florem rutaceum, radices longissimæ tenuitatis, crassum atq; odoratum corticem. Est & quæ πολλοχία vocatur quarti generis, tenuior quam proxime dicta, densis radicum capillamentis (quam ob id πολυρρίζον cognominant) iunci plenioris crassitudine. Est autem omnis ἀεισελοχία calida, tenuis, abstergens, amara & subacris, ad medicinas vtilissima. Sed rotunda tenuior & in omnibus efficacior est: κλημάτης odorata quidem, sed imbecillior: longa vero media harum est, sed non minus calida quam rotunda. Nominatur à Græcis ἡ ἀεισελοχία, quia sit ἡ λοχίσις ἀείσι, hoc est, parturientibus optima & salubris. vel ab inuentore, ut Cicero scripsit. Ex duabus aristoteliis emplastrum fit celebre, quod à Galeno describitur lib. 5. ἡ κτ' ἡ πτ'.

**Ælaxia.** Nomen est emplastri emollientis, quod constat picis libris quatuor, apochymatis libris duabus, ceræ libra una, opopanax vicia una, aceti hemina.

**Ælisarion.** herba est palustris, latis foliis, ut personæ loco esse possint: adeoque etiam Latini personatam appellant. Sunt autem eius folia cucurbitæ similia, sed maiora, duriora, nigriora, & hirsutiora. caulis subcandidus, quanquam etiam interdum nullus reperitur: radix magna, intus candida, foris nigra. officinæ lappam maiorem appellant. vires habet discutiendi, siccandi & adstringendi. A platisq; ἀρτίον scribitur.

**Ælisarion,** siue

**ἀρκευθος.** Juniperus. Arbor est duorum generum. Altera maior est, altera minor. utraque cortice est membraneo, & qui sponte rumpitur, materie fulvâ, odorata, ex qua manat liquor thuris odorem atque colorem æmulans: coma viret perpetua, sine flore, cartuleis baccis: in summa penè cedro similis est tum effigie tum natura, nisi quod iunipero folium simplicius ac mollius affligatur, cedro autem acutum, spinosum, durum. Juniperus baccam gerit quæ eodem cum sua arbore nomine ἀρκευθος & ἀρκευθίς appellatur, nigram, rotundam, gustu adstringentem, acerbam, ingustabilem. ea modice calefacit & adstringit. Concrefcit & in iunipero humor ad lacrymæ modum, qui calore duratus coit in gummi quod Vernix dicitur, calfaciens & exiccans secundo excessu, & non nihil amaritudinis habens.

**Ærction.** arction, alii potius arcturum vocant: Latini personatam appellant. herba est similis verbalco foliis, nisi quod hirsutiora rotundioraque sunt, radice tenera, dulci albaque, canle molli, longo, semine cumini parvo. Vis eius est tenuis, siccans, & mediocriter adstringens. Herbari lappam minorem vocant.

**Ἄρμα, ἴνις**

**Ἀρμαπιν.** est collyrium *παραμαλινόν*, id est, ad asperitatem palpebrarū efficac: habet. n. exterforiam vim. Descriptionem eius habent Galenus, Aetius, Paulus, Scribonius candē. Recipit aut̄ aris vsti, corticis thuris arboris, guttē Ammoniāci, gummi, singulorū partes æquales. Sunt verō qui æruginis rasæ quartam singulorū portionē adiciāt. Sic dicitur, quia ex quatuor rebus, vt quadrigia equis, constat, & ceteres effectus habet. Eo Prolemaum regem vsum esse omnes prodidere. Verū & huius nominis alię duę cōpositiōes habentur apud Aetiū, ex pluribus medicamentis cōfectæ, sed cōsimilis fere facultatis.

**Ἀρμενία ἑσπῆς.** Armenia gleba. Est terra quæ ex Armenia confini Cappadociæ affertur, pallido colore, spissior & grauior Samio astere, minutūque ærea, specie lapidis, sed mollis, & friabilis. Prædita est vi maxima siccadi, ideoque torminibus, profluuiis ventris, sanguinis reiectioni, distillationibus, oris vlcērib, tabi, & pestilentiz medetur.

**Ἀρμενία ἡ Ἀρμενιανὰ.** sunt mala ex genere Persicorum, sed Persicis præstantiora, vt quæ nec cōrumpantur, nec acescant in ventriculo veluti Persica, de quibus Gal. multa li. 2. de alim. facult. A Latinis præcōcia propriē dicuntur. Galli abricotz appellant.

**Ἀρμενιον, Ἀρμενιανόν, ἡ**

**Ἀρμενιος λίθος.** est lapis læuis & cæruleus, non calculosus, vt qui arena adulteratur, & qui facile teri potest. Multa cū *λίανθῳ* similia habet, differt tamē ab eo, primum loco in quo gignitur. (hic enim ex Armenia, vt nomen indicat, deferretur hic multis in locis inuenitur) præterea sapore, quod *λίανθος* multo sit acrior magisq; adstringens, vt crustas etiam ignis modo inducat. Sed & lapidi Armenio vis est purgandi melancholicum humorem, ceterque vomitus. Eo pietores vtuntur, quā obrem ab Aetio appellatur *ἀρμενιανόν τῷ πῖ* *ζωγράφον*, hoc est, pietorum Armeniacum.

**Ἀρμιν.** significat apud Hippocr. futuram capitis quæ à reliquis *ῥαφῇ* dicitur. Significat etiā *πῶς αὐτὸν ἡρμαιώσιν*, teste Erotiano: qui ipsam *ῥαφῇ τῷ ἡρμῷ* deriuatum ait. Helychio vero *ἄρμιν* est non solum *συνωδός, σάματος ἀρμυγή*, commissura, corporis compages, sed etiam *ἥχος τῶν ἐκείθεν*.

**Ἀρμιν.** apud Hippocratem, statim. Est autem vox Dorica.

**Ἀρμιν** dicitur spatium quod est inter dentes, seu caro inter dentes media. Poll.

**Ἀρμινία.** species est *συναρθρώσεως*. Est autē ossium cōpositio secundum lineam simplicem & rectam, non autem, vt in futura, anfractuosa, ossa coniungens. Eo modo omnia genæ superioris ossa, & pars occipitis infima, & ossa nasi, carpi, tarsi, secum connectuntur. Galad finem comment. 3. *αἱ τὸ κατ' ἰσχυρίον* scribit capitis ossa, vbi serantur, propriē dici *ἀρμινίας*, sed transla to vocabulo *ῥαφῇ* appellari. Caluariz enim ossa, ait, inter se *ἡρμῶσαι*, id est, committuntur: atq; iccirco ipsorum

contactus καὶ ἀρμυγίαν committi merito dicuntur, verum à similitudine eorum quæ fiuntur, *ῥαφῇ* nuncupantur.

**Ἀρμυνία.** est medicamenti nomen in cataportia coacti, & perutilis ad sistendas destillationes. habetur autem apud Gal. lib. 7. *ῥαφῇ* *ῥαφῇ*.

**Ἀρμυνία.** est medicamentum *αἰσώδων βήχων*, hoc est ad tussim comparatum doloris, expers. cuius descriptio est apud Aetium lib. 8. Est etiam *ἀρμυνία* emplastri nomen quod describitur ab Aetio.

**Ἀρμυν.** barbarum nomen est, significans odoramenti genus quoddam.

**Ἀρμυν.** plātago. quali agnina herba. Sunt enim plātagnis folia linguæ pecorum similia. ob quam causam etiam *περσέων* appellatur.

**Ἀρμυν.** herba plantago dicta Latinis. Ratio nominis est, quod plantagnis folia agninae linguæ similima sint.

**Ἀρμυν.** authore Plinio genus est bulbi nascentis in Aegypto, scillæ proximum magnitudine, foliis lapathi, caule recto, dnum cubitorum, baculi crassitudine, radice mollioris nature, quæ edatur & cruda. Est autem Dioscoridi *ἄρμυν* herba quæ folia emittit dracunculi, sed minora & paucioribus respersa maculis, quā quidam pedem vituli, alii serpentariam minorem, alii sacerdotis virile, officinæ iatrum appellant.

**Ἀρμυν.** dicitur à quibusdā *τὸ ἡλεκτῆρον* siue succinum, quod affricu calefactum paleas, & res alias leues ad se trahat, & retineat.

**Ἀρμυν.** species est herbæ, quam *φύλλον* peculiari vocabulo appellat, vt author est Theophrastus lib. 9. de plantarū historia, & Dioscorides lib. 3. quæ pro fructu ferat racemosum quiddam deflorentibus oleis non dissimile. Ruelius vero etiam *ἑκστατογόνος* speciem facit *τὸ ἀρμυν.* Non est dubium sic vocari, quod potum masculi sexus facere partus prodatur, vt scripsit Crateus.

**Ἀρμυν.** suppressio menstruum apud Hippocratem.

**Ἀρρυθμὸς σπυγμός.** pulsus arrhythmus. Dicitur & *κατ' ἄρρυθμους*. Est pulsus differentia in qua non omni quidem rhythmo pulsus carer (siquidem hoc fieri non potest) sed malo rhythmo ferit, nec rhythmum seruat proprium ætati, nature, parti anni, & reliquis quæ pulsus peculiare habent: contrarius est *ἡμυρhythμῳ*, qui rhythmum seruat cuiusq; propriū. Sunt autē tres *ἄρρυθμοι* differentiz, *ῥαφῇ* *ἄρρυθμος*, *ἑπερῶρhythμους*, *ἐκρhythμους*, prout scilicet plus minusve rhythmus seruatur. Qui enim parū recedit à suo rhythmo, sed eum seruat, qui nature, ætati, parti anni, loci, & reliquorum proprius est, *ῥαφῇ* *ἄρρυθμος* vocatur: qui vero plus abest à suo, & remotioris alicuius nature, ætatis, & reliquorum rhythmum habet, *ἑπερῶρhythμους*: qui vero tam longe abest, vt nullius omnino rhythmum retineat, *ἐκρhythμους* nuncupatur. de quibus vide suis locis.

**Ἀρρηνιόν.** dicitur ab Hippoc. Artico morte *τὸ ἀρρηνιόν*.



**A'ρριπνιόν.** auripigmentum. Est succus quidam intra terram concretus, sandarachæ affinis: in iisdem enim metallis ambo fere semper nascuntur, & uterque vim ignis expertus esse & quodammodo vltus videtur. Pingue quidam etiam uterque habet, sed magis auripigmentum quam sandaracha. Sunt autem auripigmenti duo genera. vnum naturale, alterum factitium. Naturum triplex est, vñ auri colore, quod multis tenuibus crustis squamarum compactis constat, & finditur vt lapis specularis, & omnium habetur præstantissimum, si impermixtum fuerit: alterum magis aureo colore micat, sed pulueris modo solutum est, & secundum bonitatis locum tenet: tertium colore accedit ad sandaracham, & simile est glebæ, sed reliquis duobus vilius. Factitii duo genera sunt, quorum vtrumque quidem splendet, sed alterum album est, venis subluteis aut subrubris distinctum: alterum vero luteum, venis nigris, subrufis, plus minusve luteis maculolum. Vtrumque ex crustis auripigmenti fossilis conficitur, quibus tantundem salis fossilis adiectum sit. Hæc trita in duobus fistilibus vasis, patellarum instar latis, nec admodum profundis, intus plumbo illitis, foris luto obruratis, coquuntur vsq; dum totum auripigmentum in sublime sublatum superiori vasi adhaferit: deinde iterum ac sæpius teritur, & coquitur donec candidum fiat. Auripigmento sapor acris est, adstringit, erodit, crustas cum vehementi vredine & violento morfu excitat. Vtuntur eo pictores & bibliopola etiam in pingendis librorum frontibus, à quo pingendi vsu non est dubium Latinos illi nomen indidisse.

**A'ρρορρόνον.** Idem quod **A'ρρενορρόνον.** de quo supra. **A'ρρῶν.** mandragoras albus, qui & mas dicitur: vt legitur apud Dioscor.

**A'ρτίβη.** nomen est mensuræ Ægyptiæ, septem modios continentis.

**A'ρτιμιδίων.** à quibusdā dicitur **ὁ δὲ ἄρτιμος**, vt habetur apud Dioscoridem.

**A'ρτιμισία.** artemisia. Est herba ramosa in maritimis magna ex parte nascens, absinthii modo fruticosa, maioribus & pinguioribus foliis ramisque. Huius duo genera sunt, vnum habitius foliis virgisque latioribus: alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente, qui æstate erumpit. Sunt vero qui in mediterraneis herbulam nasci tradant tenuibus cirris, simplici paruoque admodum caule, flore copioso, cerei vel flauī coloris, exili, odoratorem superiore, quam **ἀρτιμισία** **μυρὸν λευκόν**, id est vnicaulem, cognominat, ad differentiam superioris, quæ cognomento **πολύκλωνος** appellatur. Ruellius author est tria apud nos inueniri artemisiæ genera. vnum absinthii modo fruticosum, maioribus foliis pinguiusque, subter cæsiis, super ex nigro virelcentibus, crebro resectis, plusquam cubitali altitudine, flore albo, tenui, odorato, semine rotundo & racemoso, eamque à Gallis armoisiā vocari: alterum la-

tioribus foliis tenerioribusque, non fere a lib quā maritimis nascere, & marinā cognominari: tertium simplici caule consurgere, foliis minutim scissis, colore suppalido, flore luteo, odore non ingrato, gustu amaro, & vulgo arthanasiā dici, non cōsentiente tamen Matthiolo, qui hallucinatū hac in re credit Ruellium. Præter hæc haberi etiam aliud artemisiæ genus, quæ minutis & tenuibus foliis circa riuiolos aggeresque, item frumētaceis agris, floribus & foliis odore sampluchi referentibus, vulgo diuī Ioannis herba nominetur. Multi & **ἀρτιμοσία** dictā putant ab Artemide, quoniā priuatim medeatur sceminarū morbis, quib⁹ Artemis, hoc est Diana, præest, menses, secundas, ferusq; trahens, & præter hæc eiusdē partis præclusionibus inflammationibusq; opē ferēs. Vim habet secundum ordinem calefaciendi, siccandi in primo, & tenui substantia prædita est, eoq; renum calculos cōminuit. Sic etiā **βόρρα** dictā fuisse à Cappadocibus, Dioscorides author est.

**A'ρτιμόν.** dicitur à quibusdā altera & **ἀρτιμόνης** species, quæ & Artemonia dicitur & Arfella, vt habetur apud Dioscoridem.

**A'ρτιγόνιον.** collyrii nomē est, quo Galenus scribit Bassum sodalem suū vsū fuisse ad multa oculorum vitia. Describitur ab eo lib. 4. **τῷ χ' τὸ πρῶτον.**

**A'ρτεία.** arteria. De pluribus hoc nomen dicitur. vsurpatum autē primum est, vt ait Galenus, de fistula siue canna quæ ex ore in pulmones descendit, à qua ad pulsátiles venas, quæ prius æque atque aliæ omnes, venæ appellabantur, & **ἀρτείας** nomen translātū est: quæ tamen vt ab illa distingueretur, **ἀρτεία** simpliciter, vel **ἀρτεία λεύκη**, id est leues, dictæ sunt illa autē cum adiuncto **ἀρτεία τραχεία**, hoc est, arteria aspera, propterea quod ex partibus cartilaginosis, quæ **βρόγχια** appellantur, duris & asperis magna ex parte constituta sit. Antiquis tamen tam Græcis quam Latinis & **ἀρτείας** nomen in venis illis pulsatilibus serius receptū fuit: quippe qui longo tempore tum arterias tum venas, illi **τῷ φλεβῶν**, hi autem venarū nomine cōprehenderint. Est autem **ἡ ἀρτεία**, vas membraneum, teres & cauum, dupliciq; cōpactum tunica, quo vitalis spiritus & tenuissimus calidissimusque sanguis per corpus vniuersum pulsu distribuitur. Aulus Gellius lib. 8. cap. 10. ante Galeni ætatem sic definiuit: esse conceptaculum spiritus naturalis misti confusiq; cum sanguine, in quo plus spiritus est, minus sanguinis. Quam ob causam **ἡ ἀρτεία** dici potuit, **ὅθεν τὸ ἄερα πρῶτον**, id est, quod aerem siue spiritum conferuet atq; contineat: qui quoniam magno calore præditus est & valde subtilis, magna; vi arteriā in qua cōclusus est, impellit, geminā tunicam sortita est, quarū exterior fibris plurimis rectis & aliquot obliquis intertexta, crassitiem firmitatemq; tunicæ venarū parem habet: interior vero quintuplo fere durior, firmitior, crassiorque est (vnde à quibusdā **χονδρώδης**, quasi

cartilaginis æmula nuncupatur) & fibras quamplurimas, easque tantum transuerfas habet, quibus sanguinem vitalemque spiritum à corde attractum in membra citissime transmittat. Nec vero sanguinis spiritusque tantum causa tam robustam arteriam natura perfecit, verum etiam quod eam assidue constringi dilatarique pulsando oporteat. Prodit ex sinistro cordis ventriculo per basim mediam, & mox egressa pericardium in ramos duos diuiditur inæquales, quorum vnus sursum, alter deorsum fertur. Qui ascēdit, minor est, à quo vtrinque duo fureuli magni prodeunt, quorum vnus tendit in brachium, alter (καρπιδίον vocant) secundum iugulum cerebrum petit. Qui autem descēdit, maior est. Is circa quintam thoracis vertebra reflectitur, & spinali medullæ iniunxus, secundum eius longitudinem descendit in crura, in duas partes perinde atque vena caua diuisus. Cæterum vterque magnæ arteriæ ramus mediis itineribus perinuitas emittit propagines in singulis corporis partibus venis fere semper coniugatas.

Αρτηρία ἀποπληξιακή, siue καρπιδίον, siue καρπιδίον. Sunt tanti duo arteriæ magnæ, qui sub clauicula diuisi iuxta asperam arteriam, vna cum vena iugulari in caput feruntur. Diuiduntur aut & hi in duas partes, vnam externam, quæ minor est, alteram vero internam, quæ maior. Hæc sparsis quâ plurimis ramusculis in fauces, laryngē & linguam, craniū subit, emittēs etiam propagines quasdam in nasum, oculum & crassiorem meningem. Reliqua autē eius portio in osse sphenoidē, inter ἀποπληξιακήν & ἀρτηρίαν, retium in modū sibi incumbētiū variegata complicata, facit ἀρτηρία διχρηστική, hoc est plexum retiformē; deinde in tenuem meningem & membranam χορδοειδῆ dictam varia distributionē assumit. Sic aut à veteribus medicis eiusmodi arteriæ dictæ sunt, quod vinculo exceptæ apoplexiam, carum, & lethargum inducant.

Αρτηρία μεγάλη, arteria magna. Dicitur ea quæ oritur à sinistro sinu cordis. Ac quamuis omnes ab eadem origine sint, ea tamen sola magna appellatur quæ in ipso corporis trūco, inter iugulum & os sacrum continetur, sicut & magna vena. Dicitur ab Aristotele αἰσθη. de qua suo loco.

Αρτηρία σφαιρική, arteria coronalis. Dicitur arteriæ magnæ ramus, qui venæ coniunctus, quæ ob id σφαιρική quoque appellatur, superficiem cordis coronæ modo ambit.

Αρτηρία τραχεία, arteria aspera. Hæc sola quondam dicebatur arteria, quod aerem contineret: postea vero ad læuium differētiā aspera dicta est, propter substantiæ inæqualitatem. Est autē velut canalis quidā magnus, quo aer in pulmonem inuehitur, qui caudicis instar secundum cervicis longitudinem ex faucibus, deorsum recta protēus frequentes ramos per pulmonem diffundit: laryngē, cartilaginibus, & membranis constat. Cartilagine autem Græcam Cliteram re-

ferunt, quæ ob id dicuntur σφαιρική, à quibus arteria ipsa aspera & inæqualis euadit. Earum pars crassior foras vergit, tenuior & finis vterque intro, quæ œsophagum tangit, ne cibo deglutiēdo officiant. Hæc membrana, perinde atque ossa, vestiuntur, & ab ea tum per suos fines secum, tum per sua latera vicinis cartilaginibus colligantur. Tota vero arteria tunicis duabus integitur, intus quidem densa & dura, fibris vbiq; rectis contexta, cum tunica oris & œsophagi interiore continua, & obliquo pingui humore perpetuo madida: foris vero molli & tenui, nervos recurrentes colligante. Larynx vero asperæ arteriæ principium vocatur, faucibus continuum & tribus constans cartilaginibus, de quo vide suo loco.

Αρτηρία φλεβώδης, arteria venosa. Est vas ex sinistro cordis ventriculo exoriente, ore rotundo & admodum parenti, quod in ipso fere ortu in duos ramos diuiditur. Eorum dexter sub basi cordis productus & in cordis inuolucrum subiectus, in dextrum pulmonem multifidus spargitur, sinister vero in sinistram pulmonis partem multis propaginibus inseritur. Ambo pleni sunt aeris, quem à pulmonibus in cor transferunt. Itaque ab usu, quem cum reliquis arteriis communem habet, arteriæ nomen inditum est: à substantia autem, quia venæ corpus & tunicam habet, venosa appellatur.

Αρτηρία, dicitur à recentioribus medicis, vt ait Galen. τὸ ἄρτηρίας τραχείας φάρμακον, hoc est arteriæ asperæ medicamentum, non addito vel τὸ ἀντίδότης nomine, vel alio quopiam, quanquam nō proprie ipsius asperæ arteriæ medela sit ἡ ἀρτηρία, sed eius præsertim membrana, quæ extremis ipsius musculis, atque adeo toti ipsi arteriæ interius obducitur. Nā quæ illi quouis modo affectu medentur, ἀρτηρία ἐκ κοινῆς appellatione dicuntur. Afficitur autem hæc membrana vel nimia humiditate, vel asperitate, vel exulceratione, vel inflammatione, sicut aliquādo per magnas vociferationes accidit. Itaque pro affectionū diuersitate, nō est dubiū quin τὸ ἀρτηρία ἔστω multiplex genus sit & variis medicamentis constet. Quæ tamen omnia in tres summas differentias Gal. redegit lib. 7. τὸ ἄρτηρίας, quarū prima, ipso authore, omnis acrimoniæ experta, & meatus exacte obturat, leuigans asperitates, constans fere his, tragacantha, gummi, altere Samio, amylo. Eiusdem generis est & ex alica tragoque probe decoctis sorbitio: item lac, dulciarii panes, oua sorbilia, nuxes pineæ madefactæ, sesama, & sapa, quæ σίκερον atque ἐψύμα appellatur. Altera huic contraria est, non parum habens mordacis acrimoniæ, partem etiam sanam exasperans, cuius materia est mel, resina rebinthina, amygdalæ amaræ, brassica, porri cocti, farina erui, homini semē, iridis radix & panacis. Media autem inter eas est lenis & citra acrimoniam exergentis facultatis, vt quæ constat passo rhexeo, butyro, sorbitione

tione ex amygdalis, forbitione item lactis & mellis simul diutius incoctis, adiecto amylo, aut filigine si amyllum deest. Sed de his apud Gal. lib. 7. τὸν καὶ τὸν, & apud Aetium lib. 8. multo plura legi discique possunt.

Ἀρτηριακὸν πῆλος. idem quod βραχὺς, id est raucitas, ut scribit Paulus lib. 3. cap. 28.

Ἀρτηριακός, βραχὺς. raucus. Est enim raucitas proprius asperæ arteriæ affectus.

Ἀρτηριότομία. arteriæ dissectio. Est remedii genus quod arteria secta adhibetur. Id in longis oculorum defluxionibus; maximis doloribus, ut hemicranicis & veteri cephalalgia, vertiginosis, oculorum staphylomatis & procidentibus, & gravibus reliqui corporis morbis commodissime vsurpatur. Ac quum permultæ sint arteriæ in toto corpore, nullibi tamen commodius quam in capite secantur, idque duobus locis, in temporibus & post aures. Sequitur & Gal. in manu inter indicem & pollicem, somnio admonitus. Nec alibi quidem sectam fuisse arteriam ad sanitatis usum apud medicos animaduertes. Vitatur enim quantum fieri potest arteriæ sectio, præsertim si maior existeret, quoniam haud temere sanguinis inde profluvium sistitur, ac ut res optime cadat, ad cicatricem perducta diuisione, tamen aneurysmatis periculum vix prohiberi potest. Quocirca non nisi in magnis morbis atque doloribus, & in quibus varia auxiliorum genera tentata nihil profuerunt, arteria secanda suscipitur, nec ijs quidem sine discrimine omnibus, sed quos calidus, tenuis & spirituosus sanguis excitauit. Huius autem hoc unum & maxime euidentis signum est, quod dolor quidam pungens sentitur certo quodam in loco, tãquam in affecti loci centro fixus, qui sensim expanditur, & in partes centruin circumstantes cum tensionis sensu vndiq; diffunditur: sic enim commode proxima arteria inciditur, si modo parua fuerit. In manu quidem, illa quæ inter indicem pollicemque sita est, ad veteres iecinoris & diaphragmatis dolores: in temporibus autem, sistendis fluxionibus calidi & spirituosus humoris dilabentis in oculos: post aures vero, aduersus scotomiam & longos capitis dolores, quos tenuis pariter & spirituosus humor facit. Caterum arteria aliquando phlébotomo ut vena aperitur, interdum candenti ferro aduritur, interdum totâ transuersim scinditur. Sed priore quidem modo sanguinis spirituosus vacationem tantum molimur, reliquis autem non eam solum, verum viam quoque fluenti humori intercludimus, ne de cætero hac possit deferri. Cum autem dissectio arteriarum omnium communis sit, ubicunque eæ sitæ sint, eius tamen modo secandæ rationem quæ post aures est, Aetius lib. 7. & Paulus lib. 6. ex Seueri commentarijs explicarunt.

Ἀρτηριακὸς φλέξ. arterialis vena. Est vas quod à dextro cordis ventriculo exoritur, sanguinem ab eo elaboratum, in pulmonem de-

fert, in duos truncos scissum, quorum dexter in dextros pulmonis lobos, sinister in sinistros, infinitis propemodum sectionibus digeritur. Hoc quia sanguinem continens vena munere fungitur, Venam: quoniam vero tunicam, velut arteria, valde densam habet, Arterialem siue ut alii loquuntur Arteriosam anatomici nuncupant.

Ἀρτία. dicuntur ab Hippoc. τὰ ἀντοχέια, hoc est paruo tempore viuencia.

Ἀρτίοι. appellantur à Galeno οἱ ἑλαστοί, à panis exigui figurâ. Sed καὶ ἐλαστοί dicuntur ij qui viperæ carnibus cum pane mistis coctisque præparantur, quos & ἡμεμενούς vocant. Viperæ carnes repurgatæ in aqua elixantur, dum prorsus coctæ sint, inditur autem statim in aquam anethum. Post coctionem spinæ à carne separantur, ipsæque caro pani sicco ad læuorem trito miscetur, qui purissimus sit, & probe coctus cum modico salis & fermenti: deinde exigui panes formantur, qui in loco calido & sicco exsiccantur, atque ita ad usum reponuntur. Author Gal. lib. 1. r. de simpl. medic.

Ἀρτίομα. omni ex parte plana & æqualia, apud Hippocratem.

Ἀρτίος. apud Hippocr. idem quod ἀπαρτί, quo etiam vocabulo Hippocrat. usus est. Significabat autem illis temporibus idem quod perfecte, cumulate & sufficienter, ut Galen. annotauit.

Ἀρτίς. Panis. Est cibus ex frumentaceis molitis, aqua maceratis coctisque apparatus. Eius plures habentur differentiæ, pro materiæ diuersitate & cocturæ modo, quibus sua nomina dedit antiquitas. Nos ex his præcipua ex Athenæi Sympotiacis excerptimus, multa consulto prætereûtes quæ vel ex ipso erymo protinus intelliguntur, vel rarissime apud authores occurrunt.

Ἀγλαῖος. gregarius & cibarius Latinis dictus, cuius Cicero Thusc. 3. meminit de Prolemæo scribens, Cui quum peragranti Ægyptum comitibus non consequitis cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane iucundius. idem etiam ἀγοραίος, id est forensis & venalicius, dicitur. Galli grossum panem, & panem bisum appellant.

Ἀζυμὸς. qui fermento caret. Hic ægre conequitur & tarde subit in venas, easque obstruit. Alio nomine δαδαῖος appellatur à Nicandro ὁ καὶ γλυκῆς, ut tradit Athenæus lib. 3. Hesychius pro eo δαδὸν habet.

αἰσθητικὸς λιδο

αἰσθητικός. qui ex omnibus farinæ suæ partibus citra vllam detractionem constar, inter fursuraceum & similagineum medius. fursure tantum leuiter succreto fit. Fieri autem solet, ut Galenus ait, quoties triticum generosum non est: generosum autem vocatur quod similaginis plus habet quam fursuris.

Ἀχρῶδης. acerosus, qui etiam paleas habet, vel solis fere paleis constar, quæ Græci ἀχρῶς dicunt.

*μυῖς*, qui ex polline factus est, quem infirmissimum esse Corn. Celsus scripto prodidit: minus enim alit, spiritum creat, nec ægre membratim digeritur: sicatus tamē oppler, atque difficiliter in corpus permeat.

*σιεφός*, idem forte qui & *ναυτικός* appellatur.

*σιμυῖς* siue.

*σιμπος*, qui bis ignem expertus est. Delicatus fuisse traditur: quia vero ad aquam intercutem cibo utilis existimatur, coniectari licet pro biscocto capiendum esse.

*ιζαῖς*, craticularis, siue in craticula coctus, olim sub finem cœnæ conuiujs apponi solitus & intingi passo vsque ad ebrietatem legitimam. Hic & inuoluebatur, atque ita ut calebat intortus Athenis maxime placebat. Coniectura colligi licet id genus panificii quod à tenuitate & candore nebulas fere vocamus, *νῦν ιζαῖς* veteribus fuisse.

*ζυμῖς*, fermentatus, cui modicum fermenti inditum est. Hic & *νῆδος* dicitur, quāquam *νῆδος* plerisque placet & genus sit.

*κρίβανῖς*, *ἡ κριβανῖς*, quod enim *κρίβανον* Græcorū vulgus, Attici *κρίβανον* appellāt. Varro textuaceus vocatur, quod in textu calido coqueretur. Textum autem Latini quod Græci *κρίβανον* dixere. Hic panis reliquis longē viribus præstat, & sanitatis vsu præferatur, si eius coquendæ rationem spectemus. Nam si bono frumento constar, probum creat succum, stomacho per placet, ac facile concoquitur ad distributionem promptus, quando neque ventrem coercet, neque firmat, neque spiritu distendit.

*κρίσνος*, hordeaceus, fragilior est & parum nutrit.

*νῆδος*, idem quod *ζυμῖς*.

*ναυτικός*, nauticus, dicitur qui vetus est & ficans, fortasse biscoctus qui *σιεφός* dicitur.

*ἔξυλεπῖς*, acidus, cui exiguum aceti affusum est. Ventrem sistit, idque magis, quo plus habet aceti. Hunc Galen. libr. 8. meth. med. & post eum Aetius lib. 5. febre diaria laborantibus exhibent, quibus venter profuit.

*πιτυῖς* siue

*πιτυράδης*, fursuraceus, qui fursures vniuersos capit, quos *πίτυρα καὶ ἀφαίρημα* Græci vocant, Latini autem canicas & apludas: unde canicaceus panis fursureus est Pacuuius.

*πιπυμένος*, elotus, parum alimenti præstat, sicut & amyllum, ut author est Paulus Æginet. lib. 1.

*ρῦπαρος*, sordidus, parum nutrit, sed magis per aluum descendit. Hunc aliqui eundem existimant cum *πῦ συγκομις*: Paulus tamen utrumque separat.

*σεμιδαῖς*, similagineus, hoc est, qui sola similagine constar. Secundum bonitatis locum habet apud Paulum.

*σιλγῖς*, filigineus. Huic primam laudem in alendo Paulus assignat: est enim firmissima omnium filigo, deinde simila, ut tradit Celsus.

*συγκομις*, confusaneus, qui castratus non est, sed omnia simul tulit, fursures, vtriculos & similes. Hic idem esse cum *πῦ αὐτοπύριον* videtur. Tertium illi bonitatis locum Paulus tribuit, sicut & Corn. Celsus.

*χοδρίς*, ex alica siue zea factus. Hic stomacho grauis esse perhibetur & concoctu difficilis, ut, qui eo vtantur, non diu fruantur prospera valetudine.

*Ἀρυταρνοειδής*, Est una è tribus laryngis cartilaginibus mobilis & in angustum valde transitum definens. Os eius superius illis vasorum osculis respondet, quibus aqua lauaturis affunditur, cuiusmodi vasa Græci *ἀρυτάρνας* appellant. Author Gal. lib. 7. de vsu partium. vide *ἀρυτή*.

*Ἀρχαῖον ἐμπλαστρον*, Est emplastrum *λεπρόν*, hoc est de genere lenium, quod ad authorē Archagathum refertur, capitque misyos cocti, æris vsti, singulorum p. \* I I I I. cerussæ coctæ p. \* V I I I. resinæ terebinthinæ p. \* x. spumæ argenti p. \* VI. Author Celsus libr. 5. cap. 19.

*Ἀρχή*, principium. Dicuntur, inquit Aristoteles, principia, quæ cum non sint ex alijs neque ex alterutris, ex ipsis tamen omnia fiunt. Ea omnium rerum naturalium gemina sunt, materia & forma: eaque ab elementis distinguere manifestum est, quod hæc etiam principijs illis consent, quoque principia minime corporea sint, neque seorsim possint subsistere: elementa autem tunc corporea sunt, tum per se solaque consistunt. Sed cum eiusmodi sint quæ physici considerant principia, hoc est, incorporea, omniumque simplicissima, medici paulo latius eorum nomē extendunt, principia appellantes quæ materiæ formæque rationem in nobis obtinēt, quamvis & hæc corporea sint, & per se consistere videantur. Sic semen & sanguinem menstruum principia corporis nostri statuunt, quod hic ceu materia quædam sit, illud autem velut opifex quidam formam partibus omnibus præstat. Ex quo apparet nec similes nec dissimiles corporis nostri partes principia recte vocari posse, quod nullæ alijs eiusdem generis subiectæ sint, ceu materia formæ, sed omnes in suo genere corpus integrum æque constituent. Quoniam autem eiusmodi de quibus ante dictum est principia & ordine & tempore præcedunt ea quorum principia sunt, factum est ut omnium rerum initia, & à quibus singule incipiunt, earum principia dicantur. Inde namque ad ipsos morbos translata vox est, in quibus principium dicitur pars ea morbi, quæ in singulis tempore & ordine prima est. Eius differentiam medici triplicem faciunt, sed omnem tamen à sensibili functionum læsione auspicantur. Non enim protinus atque quis aut de lassitudine aut de capitis dolore, aut de fastidio queritur, censendum est enim morbo laborare, donec corporis sui continuitatem quodammodo dissolutam esse sentiat, seque in tantum opprimi, ut iam



non sufficit obeundis muneribus suis, sed in lecto decumbere cogatur. Ac primo quidem proprieque principium dicitur punctū illud temporis in quo cœpit quis ægrotare. Id indiuisibile est & momentaneum, sineque vlla latitudine. Aliera significatione principium vocatur quod latitudinē habet, atque aliquo vel horarum vel etiā dierum spacio, pro morbi breuitate vel longitudine, definitum est. Id autē vltimum tertio die circumscribi solet. Verum ea circumscriptio inartificialis est, atque ideo à vulgo potius quam à medicis principij nomen ea significatione vsurpatur. At vero tertium significatū artificiosum plane est & medicum. Habet enim latitudinem coctionis signis definitam, si ab humore morbus est, aut symptomatum intensione & acerbitate sola, si cum intemperies sine humorē excitauit, aut aliquando vtrisque, si morbus compositus est. Ita que febris principium esse dicitur, quandiu humor in quo febris, crudus est. Cum enim coctionis signa quædā apparere incipiunt, principium definit, & morbus augeri incipit. Huius autem coctionis signa in vasis quidem ex urinis, in vetriculo autem ex deiectionibus sumenda sunt, sicut & eius quæ in respiratorij instrumentis fit, ex spūto. Sic phlegmones principium est, quando pars sanguine impletur: ophthalmia, cū humor copiosus, tenuis, incoctus defluit: viceris, quādiu sanies aquosa, tenuis & incocta maneat: catarrhi à cerebro per palatum & nares, cum humor multus, aquosus, tenuis, acer stillat. Similiter autem aliorum morborum qui consistunt in intemperie simplici, cōposita, sola, cum humore, totius, partis, æquali aut inæquali principia, signis cuique propriis distinguī debent. Vt autem hæc totius morbi principia sunt, sic & singulæ accessiones sua habent principia, quæ non dissimili modo atque illa vniuersalia distinguere definireque oportet.

**Albus**, à quibusdam dicitur *ἄμπελοειδής*, id est viris alba, authoribus Dioscoride & Plinio.

*Archigenis varians.* Archigenis collyrium. va-  
ler ad oculorum albugines, quas etiam v-  
na illitione discutit. Facit & mirifice ad  
veterem ophthalmiam. Describitur ab Ae-  
tio libr. 7. cap. de remediis cicatricum & al-  
buginum.

*Αἷμα*. anus. podex. *ἰσπε*. sedes. Significat &  
*ἀπὸς* intestinum rectum (quod *ἀντισυμπί-*  
*πτον* vſitato nomine dicitur). *ἰσπε* ἢ *δενὸν ἀπ-*  
*χευαί* τῶν *ὀρίων*, id est, quod origo sit intesti-  
norum, siue primum ex intestinis locum  
occupet, si ab infernis numerare placet. ve-  
rum alii *ἀπὸς* apud Galenum princeps ver-  
tunt, vt ille qui libellum de dissectione vul-  
uit transſulit in Latinum: quasi id inter o-  
mnia intestina maxime insigne sit. Vide *ἀ-*  
*ντισυμπίπτον*.

**Ajōmātē.** dicuntur certarum herbarum fructus odoris & saporis admodum grati, quo-

rum vsus est vel ad calfaciendum ventricu-  
lum (sunt enim omnia aromata calida) vel  
ad appetentiam excitandam, vel ad ducen-  
dos menses, vel ad pleraque alia, nisi capitis  
grauitatem, vt scripto prodidit Hippocra-  
tes, inducerent. Sunt autem ex his præci-  
pua, spica nardi, amomum, calamus aroma-  
ticus, iris iadanum, malabathrifolium, sty-  
rax, bdellium, opobalsamum, carpobalsa-  
mum, xylobalsamum, cinnamomum, nux  
myrtefica, zinziber.

*Apopulium eriodict.* Habetur apud Actium libr.  
13. ex descriptione Galli, quam scribit vale-  
re ad inveteratas oris ventriculi affectiones,  
& hepaticis prodesse.

A<sup>1</sup> <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>14</sup> <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>34</sup> <sup>35</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>38</sup> <sup>39</sup> <sup>40</sup> <sup>41</sup> <sup>42</sup> <sup>43</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> <sup>46</sup> <sup>47</sup> <sup>48</sup> <sup>49</sup> <sup>50</sup> <sup>51</sup> <sup>52</sup> <sup>53</sup> <sup>54</sup> <sup>55</sup> <sup>56</sup> <sup>57</sup> <sup>58</sup> <sup>59</sup> <sup>60</sup> <sup>61</sup> <sup>62</sup> <sup>63</sup> <sup>64</sup> <sup>65</sup> <sup>66</sup> <sup>67</sup> <sup>68</sup> <sup>69</sup> <sup>70</sup> <sup>71</sup> <sup>72</sup> <sup>73</sup> <sup>74</sup> <sup>75</sup> <sup>76</sup> <sup>77</sup> <sup>78</sup> <sup>79</sup> <sup>80</sup> <sup>81</sup> <sup>82</sup> <sup>83</sup> <sup>84</sup> <sup>85</sup> <sup>86</sup> <sup>87</sup> <sup>88</sup> <sup>89</sup> <sup>90</sup> <sup>91</sup> <sup>92</sup> <sup>93</sup> <sup>94</sup> <sup>95</sup> <sup>96</sup> <sup>97</sup> <sup>98</sup> <sup>99</sup> <sup>100</sup> <sup>101</sup> <sup>102</sup> <sup>103</sup> <sup>104</sup> <sup>105</sup> <sup>106</sup> <sup>107</sup> <sup>108</sup> <sup>109</sup> <sup>110</sup> <sup>111</sup> <sup>112</sup> <sup>113</sup> <sup>114</sup> <sup>115</sup> <sup>116</sup> <sup>117</sup> <sup>118</sup> <sup>119</sup> <sup>120</sup> <sup>121</sup> <sup>122</sup> <sup>123</sup> <sup>124</sup> <sup>125</sup> <sup>126</sup> <sup>127</sup> <sup>128</sup> <sup>129</sup> <sup>130</sup> <sup>131</sup> <sup>132</sup> <sup>133</sup> <sup>134</sup> <sup>135</sup> <sup>136</sup> <sup>137</sup> <sup>138</sup> <sup>139</sup> <sup>140</sup> <sup>141</sup> <sup>142</sup> <sup>143</sup> <sup>144</sup> <sup>145</sup> <sup>146</sup> <sup>147</sup> <sup>148</sup> <sup>149</sup> <sup>150</sup> <sup>151</sup> <sup>152</sup> <sup>153</sup> <sup>154</sup> <sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup> <sup>158</sup> <sup>159</sup> <sup>160</sup> <sup>161</sup> <sup>162</sup> <sup>163</sup> <sup>164</sup> <sup>165</sup> <sup>166</sup> <sup>167</sup> <sup>168</sup> <sup>169</sup> <sup>170</sup> <sup>171</sup> <sup>172</sup> <sup>173</sup> <sup>174</sup> <sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> <sup>178</sup> <sup>179</sup> <sup>180</sup> <sup>181</sup> <sup>182</sup> <sup>183</sup> <sup>184</sup> <sup>185</sup> <sup>186</sup> <sup>187</sup> <sup>188</sup> <sup>189</sup> <sup>190</sup> <sup>191</sup> <sup>192</sup> <sup>193</sup> <sup>194</sup> <sup>195</sup> <sup>196</sup> <sup>197</sup> <sup>198</sup> <sup>199</sup> <sup>200</sup> <sup>201</sup> <sup>202</sup> <sup>203</sup> <sup>204</sup> <sup>205</sup> <sup>206</sup> <sup>207</sup> <sup>208</sup> <sup>209</sup> <sup>210</sup> <sup>211</sup> <sup>212</sup> <sup>213</sup> <sup>214</sup> <sup>215</sup> <sup>216</sup> <sup>217</sup> <sup>218</sup> <sup>219</sup> <sup>220</sup> <sup>221</sup> <sup>222</sup> <sup>223</sup> <sup>224</sup> <sup>225</sup> <sup>226</sup> <sup>227</sup> <sup>228</sup> <sup>229</sup> <sup>230</sup> <sup>231</sup> <sup>232</sup> <sup>233</sup> <sup>234</sup> <sup>235</sup> <sup>236</sup> <sup>237</sup> <sup>238</sup> <sup>239</sup> <sup>240</sup> <sup>241</sup> <sup>242</sup> <sup>243</sup> <sup>244</sup> <sup>245</sup> <sup>246</sup> <sup>247</sup> <sup>248</sup> <sup>249</sup> <sup>250</sup> <sup>251</sup> <sup>252</sup> <sup>253</sup> <sup>254</sup> <sup>255</sup> <sup>256</sup> <sup>257</sup> <sup>258</sup> <sup>259</sup> <sup>260</sup> <sup>261</sup> <sup>262</sup> <sup>263</sup> <sup>264</sup> <sup>265</sup> <sup>266</sup> <sup>267</sup> <sup>268</sup> <sup>269</sup> <sup>270</sup> <sup>271</sup> <sup>272</sup> <sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup> <sup>276</sup> <sup>277</sup> <sup>278</sup> <sup>279</sup> <sup>280</sup> <sup>281</sup> <sup>282</sup> <sup>283</sup> <sup>284</sup> <sup>285</sup> <sup>286</sup> <sup>287</sup> <sup>288</sup> <sup>289</sup> <sup>290</sup> <sup>291</sup> <sup>292</sup> <sup>293</sup> <sup>294</sup> <sup>295</sup> <sup>296</sup> <sup>297</sup> <sup>298</sup> <sup>299</sup> <sup>300</sup> <sup>301</sup> <sup>302</sup> <sup>303</sup> <sup>304</sup> <sup>305</sup> <sup>306</sup> <sup>307</sup> <sup>308</sup> <sup>309</sup> <sup>310</sup> <sup>311</sup> <sup>312</sup> <sup>313</sup> <sup>314</sup> <sup>315</sup> <sup>316</sup> <sup>317</sup> <sup>318</sup> <sup>319</sup> <sup>320</sup> <sup>321</sup> <sup>322</sup> <sup>323</sup> <sup>324</sup> <sup>325</sup> <sup>326</sup> <sup>327</sup> <sup>328</sup> <sup>329</sup> <sup>330</sup> <sup>331</sup> <sup>332</sup> <sup>333</sup> <sup>334</sup> <sup>335</sup> <sup>336</sup> <sup>337</sup> <sup>338</sup> <sup>339</sup> <sup>340</sup> <sup>341</sup> <sup>342</sup> <sup>343</sup> <sup>344</sup> <sup>345</sup> <sup>346</sup> <sup>347</sup> <sup>348</sup> <sup>349</sup> <sup>350</sup> <sup>351</sup> <sup>352</sup> <sup>353</sup> <sup>354</sup> <sup>355</sup> <sup>356</sup> <sup>357</sup> <sup>358</sup> <sup>359</sup> <sup>360</sup> <sup>361</sup> <sup>362</sup> <sup>363</sup> <sup>364</sup> <sup>365</sup> <sup>366</sup> <sup>367</sup> <sup>368</sup> <sup>369</sup> <sup>370</sup> <sup>371</sup> <sup>372</sup> <sup>373</sup> <sup>374</sup> <sup>375</sup> <sup>376</sup> <sup>377</sup> <sup>378</sup> <sup>379</sup> <sup>380</sup> <sup>381</sup> <sup>382</sup> <sup>383</sup> <sup>384</sup> <sup>385</sup> <sup>386</sup> <sup>387</sup> <sup>388</sup> <sup>389</sup> <sup>390</sup> <sup>391</sup> <sup>392</sup> <sup>393</sup> <sup>394</sup> <sup>395</sup> <sup>396</sup> <sup>397</sup> <sup>398</sup> <sup>399</sup> <sup>400</sup> <sup>401</sup> <sup>402</sup> <sup>403</sup> <sup>404</sup> <sup>405</sup> <sup>406</sup> <sup>407</sup> <sup>408</sup> <sup>409</sup> <sup>410</sup> <sup>411</sup> <sup>412</sup> <sup>413</sup> <sup>414</sup> <sup>415</sup> <sup>416</sup> <sup>417</sup> <sup>418</sup> <sup>419</sup> <sup>420</sup> <sup>421</sup> <sup>422</sup> <sup>423</sup> <sup>424</sup> <sup>425</sup> <sup>426</sup> <sup>427</sup> <sup>428</sup> <sup>429</sup> <sup>430</sup> <sup>431</sup> <sup>432</sup> <sup>433</sup> <sup>434</sup> <sup>435</sup> <sup>436</sup> <sup>437</sup> <sup>438</sup> <sup>439</sup> <sup>440</sup> <sup>441</sup> <sup>442</sup> <sup>443</sup> <sup>444</sup> <sup>445</sup> <sup>446</sup> <sup>447</sup> <sup>448</sup> <sup>449</sup> <sup>450</sup> <sup>451</sup> <sup>452</sup> <sup>453</sup> <sup>454</sup> <sup>455</sup> <sup>456</sup> <sup>457</sup> <sup>458</sup> <sup>459</sup> <sup>460</sup> <sup>461</sup> <sup>462</sup> <sup>463</sup> <sup>464</sup> <sup>465</sup> <sup>466</sup> <

*Asphaltum*. est gemma ex bitumine conflata in lapidis modum, quæ myrrham colore & odore refert, unde nomen reperit, ob id etiam reginis frequentata. In Arabia traditur gigni, & in Egypto circa Pisas.

*Aponia*. sic dictum est à quibusdam primum  
mispiligenus à Dioscor. descriptum.

*A'cau'is.* apud Hippoc. significat idem quod *a'ni'as*, ut interpretatur Galen. in comment. *a'ca'is* significat *a'ni'as*. Sic *a'ca'is*.

**Nardus.** perpenſa. Herba eſt nardi vi prædita, & ideo à plariſque nardus ſylueſtris dicta. foliis hederæ, ſed minoribus & rotundiori- bus, flore inter folia iuxta radicē erumpen- te, purpureo, bene olente, cythino hyoſcyami ſimili in quo ſemē acinoſum, angularis cati- culis, ſubſperis ac ſolutis. Radices multas habet geniculatas, rēnues, obliquas, ſimiles graminī, odoratas. Sic Græcis vocari qui- dam aſſerunt, vt author eſt Plinius, quōni- am in coronis non addatur, quaſi manu- libus ſcopis, quæ odoris gratia geſtantur, mi- nime ſolita ſit inferi. *ἡ τὴν ἀνθεμίωνος καὶ τὸν σκῆ- πον*, quo nomine ſcopæ ſignificantur. Tā o- lim Galli bacchar vocabant, nunc ſyllaba- rum metatheſi cabaret dicitur.

*A. opus opusculi*, dicuntur ab Hippocrate hi qui  
lenta & obscura cataphora correpti deli-  
rant, perinde ac si *duyoyatou* dixisset, hoc est,  
cognitu difficiles non plebeis modo, sed et-  
iam medicorum plurimis. Author Galen.  
comment. in prorrheticum.

**A**quæ inextinctus. vñ *unā aquæ*, calx inextincta ac viua. sæpe tamen substantiue dicitur, & simpliciter prolatum calcem ipsam significat. sic enim *קל* *עליו* dicitur quæ viua est, non addito *א* *מימי* nomine, quomodo simpliciter *קל* *עליו* *א* *מימי* dicimus sine addito.

**A**crium incoctum. Sic enim veteres vocare co-  
sueverant quod postea medici **acrim** dixe-  
runt: arque in ea significatione intelligen-  
dum est quod scribitur ab Hippocrate de li-  
enteria lib. *αὐτὸν τὸν πόνον, ὃν οἱ αἰσθητοὶ ἀποκα-  
λεῖται ἀκρίμ, ἀκρίμ τὸν πόνον, ὃν οἱ αἰσθητοὶ ἀποκα-  
λεῖται ἀκρίμ, ἀκρίμ τὸν πόνον, ὃν οἱ αἰσθητοὶ ἀποκα-  
λεῖται ἀκρίμ*. hoc est,  
cibi excernuntur incocti humidi: dolor nō  
mouetur, extenuatur tamen corpus. Id au-  
tem profectum esse videtur ab opinione

Empedoclis, qui concoctionem ciborum putrefactione fieri contendebat, quod alimenta in ventriculo saporis odorisque gratiam amitterent.

**A<sup>sthma</sup>.** est obstructio pulmonis frequentem & difficilem sine febre respirationem inducens, qualem hi habent qui velociter cucurrerunt. Quo quidem affectu qui laborant, quoniam suffocationis metu recto pectore & ceruice spirare coguntur, *asthma* appellantur. eandemque ob causam recto tere thorace in lecto decumbunt. Minus est enim quod inspirant quam pro vsu respirationis, quamvis thorax plurimum ipsis dilatetur. Ex quo perspicuum est, intras pulmones præter naturam coarctari: id quod ægri ipsi non obscure percipiunt. Ac cum pluribus de causis coarctatio talis contingat, istæ duæ causæ videntur asthmaticos facere, scilicet humoris crassi & lentæ copia infarcti in bronchia pulmonis, aut crudum aliquod tuberculum in pulmonibus genitum. Ac cum multæ sint spirandi difficultates, eam solum consuevit Hippocr. *asthma* appellare (vt autor est Gal. comment. aphor. 46. libr. 6.) in qua multum creber anhelitus est, cum tamen Hippocr. posteriores medici affectionem quamcunque pectoris ditituram, simpliciter *asthma* nuncuparint, suoque tempore respirationem quæ in cursu & vehementi exercitatione fit, *asthma* vulgo vocari solitam esse scribat. Cæterum morbus hic nomen habet à symptomate: neque enim anhelatio ipsa morbus est, sed morbi symptoma. Namque fistularum & cavitatum pulmonis angustia, ipse morbus est. Similiter & *itis* *optimalis*, nomen à symptomate est.

**A<sup>luis</sup> lapis.** Aluis lapis. Est lapis colore pumicis vel topi candido, venis in profundo, luteis, laxis, levis, mollis, friabilis. In eius superficie insidet quiddam simile tenuissimo pollini, qui parietibus molendinorum inheret, quod Aliz petrae florem appellant: qui partim albus est, partim similis pumici in luteum vergenti, linguæque ad motus mordet eam leniter, & gustatum fædine commouet. Dioscorides *aluis*, hoc est fæluginæ, appellat, eamque Gal. libr. 9. simpl. medic. conijcit oriri ex rore marino, qui primum in lapide insideat, deinde à sole siccetur, vt hoc modo & lapidis & maris naturæ particeps sit. Ipsum autem lapidem quidam ex Cadmia partim constare credunt, quod carnem consumat, & corpora defunctorum, vt testatur Plinius, condita in eo absumi constet intra quadragesimum diem, exceptis dentibus. Quamobrem alio nomine à quibusdam *asthma*, dictus est, quanquam Plinius sarcophagum atque Añum separare videatur. Vis est lapidi siccandi, digerendi, humentes carnes liquefaciendi, erodendi, sed tamen ad hæc omnia magis efficax flos eius est, qui cum talis sit, attamen non vehementer mordet nec adstringit, sed est partium

inter omnia terrestria tenuissimum. Dicitur Aluis, vt quidam volunt, quod in Asia nascatur, & simplici scribitur: alii vero geminato scribunt, vt ait Gal. ab Affo oppido in quo nascitur, quod Plinius Troadi, alii Myliæ adscribunt.

**A<sup>sthenia</sup>.** est cibum fastidire & inappetentem esse. significat etiam simpliciter abstinere à cibo, & vt inedia. Annotat autem Galen. *asthenia* aliquando idem significare quod *asthenia*, id est, ciborum fastidio laborantes: vide *asthenia*.

**A<sup>scarides</sup>.** ascarides. Sunt tenues quidam lumbrici, vermibus affimiles, qui in parte potissimum inferiore crassi intestini gignuntur, & in extremo longanone, atque sphincteris initio consistunt, vehementem pruritus ijs in locis excitantes. In pueris maxime gignuntur propter ingluuiem & cruditates. Plurimi etiam apparent in iumentis male cibum concoquentibus: id quod excrementorum fæore deprehenditur.

**A<sup>lbus</sup>.** sic dictum est à quibusdam helleborum album, vt habetur apud Dioscoridem.

**A<sup>sthenia</sup>.** species est hydropis in quo humoris aquosi siue serosi copia cum paucissimo spiritu in membrana abdominis interiore, inter peritonæum & intestina, continetur, & veluti in vtre quodam (vnde nomen habet) conclusa est. Præcipua eius causa frigiditas est, eaque maior quam quæ *asthenia* excitare solet, in qua flatuosus aer plurimus, humor vero exiguus est. vide *asthenia*.

**A<sup>sthenia</sup> Exilis.** pastillus Asclepiadæ, cômôdus dysentericis, vide Aetium lib. 9.

**A<sup>sthenia</sup> xip.** nomen est cerati podagrici, quod describitur ab Aetio lib. 12.

**A<sup>sthenia</sup>.** herba hederæ similis: vnde *asthenia* & *asthenia* dicta est, nascitur in montibus, radice numerosa, tenui, odorata, flore graueolenti, semine securidacæ, cuius tamen nullum se periculum fecisse Gal. prodidit.

**A<sup>sthenia</sup>.** collyrium est, quod habet, papaueris lacrymæ. \* II. sagapeni, opopanax, singulorum p. \* III. æruginis p. \* IIII. camini p. \* VIII. piperis p. \* II. Cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum p. \* VI. causas cicatrices probe explet. Author Cor. Celsus, lib. 6. cap. 6.

**A<sup>sthenia</sup>.** species vna panacis, quam sic dictam volunt, quod Esculapius filiam Panaciam nominauerit.

**A<sup>sthenia</sup> Exilis.** pastilli nomen, cuius descriptio habetur apud Aetium lib. 14.

**A<sup>sthenia</sup>.** nomen est smeigmatis aridi, cuius compositio describitur à Paulo Aegineta libr. 7. cap. 3.

Est & nomen collyrii quod describitur à Gal. lib. 4. *asthenia*, à quo non valde discrepat collyrium quod à Scribonio Largo describitur, quod dicit ab aliis *asthenia*, ab aliis *asthenia*, ab aliis *asthenia* nuncupari. Habetur & apud Marcellum medicum, ex quo forte Scribonii descriptio emendari potest.



**Astragalus** nomen est multorum medicamentorum. sic enim dicitur pastillus quidam, quem geminum reperio: vnum quidem apud Galen. lib. 7. *ἄστρον ἰσχυρὸν* describitur imo ex Andromacho, maximi, ut refert, in medicina vsus, præsertim ad sistendum dolorem: alterum vero apud Paulum lib. 7.

Dicitur & eo nomine stomachicum quoddam medicamentum, quod & duplex habetur apud Galen. lib. 8. *ἄστρον ἰσχυρὸν*, vbi dicuntur *ἀστρον σιμαχίδης* & *ἀστρον αἰνίου*, descriptus & ipse ab Aetio lib. 9. cap. *ἀστρον ἰσχυρὸν*.

Item collyrii nomen est quod varium invenitur, cuius generis est *ἀστρον ἰσχυρὸν* duobus modis descriptus ab Aetio & Paulo, & *ἀστρον αἰνίου*, diuersus apud Gal. lib. 4. *ἄστρον ἰσχυρὸν*, & apud Aetium lib. 7.

*ἀστρον* etiam dicitur terra Samia, ut scribit Corn. Celsus in collyrio Philetis, sed frequenter cum adiectione, ut *ἀστρον ἰσχυρὸν* apud Galen. in lib. simp. medic. vel *ἄστρον*, ut apud Paulum & Aetium in descriptione præcedentium collyriorum, à qua terra collyrius (eam namque recipiunt) inditum nomen esse credere si & pastilli & stomachica medicamenta eo nomine donata, quorum supra mentionem fecimus, eam similiter admitterent. Vide *ἀστρον ἰσχυρὸν*.

**Astragalus** est herba cauliculo lignoso, florem in cacumine habes purpureum vel luteum, & in ambitu diuisum anthemidis modo capitulum, folia quæ caulem ambiunt stellæ modo radiata, oblonga, hirsuta. Nascitur inter petras solo aspero. Astellæ similitudine, *ἀστρον*, quod autem in Atheniensi agro optima & frequens nasceretur, *Astragalus* cognominata est. Eadem ab vsu *βουβώνιον*, & à Romanis inguinalis dicitur, quoniam doloris inguinum præsentaneum remedium est. Multi credunt esse eam herbam quæ vulgo aspergula minor vocatur. Est & alius aster, ut scribit Ruellius, nunc vulgo stella dictus, folio fere vitis, seu malæ potius erraticæ, ad radicem maiore, pluribus sed minoribus incisuris. florem fert in modum stellæ, in luteo viridè, pusillum & herbæ suæ similem. hanc ille scribit ad herniam puerorum commendari, quia adstringit, sed sibi compertum non esse quænam veteribus fuerit.

*Astragalus* scribit Hefychius sic vocari *πλὴν ἰσχυρὸν*, hoc est hæræ radicem.

*Astragalus* dicitur à quibusdam *ἀστρον*, quam aliqui *ἰσχυρὸν* appellant, ut habetur apud Galen. lib. 1. *ἄστρον ἰσχυρὸν*, vbi recenset medicamenta quæ Soranus ad alopecias conscripsit. Sic autem dicta videtur, quod radice sua referat astragalum: quemadmodum & *ῥαφάνιον* dicta est à similitudine *ῥαφάνι*. Habet enim astragalus radicem *ῥαφάνιο* similem, ut propterea recte *ῥαφάνιον* atque *ἀστρον ἰσχυρὸν* eadem esse existimetur.

**Astragalus** talus. Est ossiculum prope quadratum, intra infimos tibie & suræ processus comprehensum. Sic autem comprehenditur, ut neque videri neque tangi possit. Cõ-

stat quatuor lateribus, dextro, sinistro, anteriore & posteriore, à quibus ipsum *ἀστρον* quidam vocarunt, quamvis Oribasius & Rufus partem eius superiorem ita appellent. Est autem pars ea superior in medio caua, utrinque superciliofa, trochleæ subsimilis, rotunda magis: inferior autem valde est inæqualis: ter namque gibbosa, bis cauata est: utraq; autem cartilagine incrustatur. Hefychius interpretatur *ἀστρον ἰσχυρὸν* *πὸν σπῆνδύλον*, *καὶ τὸν ὑπερκατὰ τὸν σκέλον*, hoc est vertebra, & partem cruri subiecta, eam scilicet qua pueri ludunt, à qua non cubi tesseræ genus illud ludi dictum est, sed tali, quibus Ganymedem & Cupidinem Apollonius finxit in cælo colludentes, & Polycletus pueros duos nudos, qui *ἀστρον ἰσχυρὸν* appellati sunt. Est etiam *ἀστρον ἰσχυρὸν* frutex parvus brevisque per terram sparsus, ramo & folio ciceris, flore purpureo paruo, radice rotunda, *ῥαφάνι* modo prælonga, quæ adnatas alias appendices habet nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Huc cicerulam esse diceres nisi radix tanta subesset: proinde rura Gallica montanum vel rusticum cicer nominant: à Latinis talus, glandula & ficus terræ dicitur, non est dubium *ἀστρον ἰσχυρὸν* nomen illi inditum fuisse propter radicem rotundam duramque, & ob id animalium talo similem. Adstringit & flicat.

*Astragalus* frutex est parvus, foliis & ramis ciceri similis, flore purpureo paruo, radice rotunda, *ῥαφάνι* modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Sic quidem Diosc. astragalum depinxit, multo aliter quam Plinius lib. 26. cap. 8. Adstringit & non instrenue desiccatur.

*Astragalus* gemma quæ & *ἀστρον* dicitur, de qua vide suo loco.

*Astragalus*, seu *Astragalus*, syderatus. sydere afflatus & percussus. *ἀστρον ἰσχυρὸν*.

*Astragalus*, syderato, *σπῆνδύλον*, siue *σπῆνδύλον*.

*Astragalus* dicitur à Pythagoricis lactucæ genus rotundum ac minimæ radicis & laus foliis. à Pythagora quidam *ἰσχυρὸν* appellatum scribunt, quod veneri refragetur.

*Astragalus* herba quæ à Romanis ferus oculus dicitur, auctore Plinio.

*Astragalus* plenum, quod non est contractum nec concidit.

*Astragalus*, siue

*Astragalus*, secundum Archigenem trifolii genus est maiore folio quo vtuntur coronarii. Dioscorides tamē scripsit simpliciter sic vocatum fuisse *ῥαφάνιον*, hoc est trifolium.

*Astragalus* sic à quibusdam dicitur proprio nomine postrema e lumborum vertebri.

**Astragalus** bitumen. Est pinguis & oleosus succus plurima ærea & ignea substantia temperatus, levis & flammam promptissime concipiens. Duum generum est, vnum liquidum, alterum fossile. Liquidum ceus puma quæ-



ma quædam est aquis innatans, præsertim in mari mortuo, in quo optimum colligitur, cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque ponderosum ac validum odorem vibret. Id molle quidem est dum innatat, postea vero reficcatum picæ sicca durius evadit. Innatat vero & fontibus quibusdam tam crassum, ut limus possit videri: & sæpe quidem in ipso vase diu asservatum, per se inspissatur, vel coquitur in cacabis æneis aut ferreis. quod cum sit, solet quidem accendi, sed lineo panno aquis madido restringitur. Fossile vero siccum è terra eruitur, lapidum aut carbonum modo nigrum, splendensque picis instat. Sunt autem bituminum variaz admodum differentiaz, & multa earum nomina, quod variū multis in regionibus proveniat. Hinc etiam factum est, ut de eo plurimi diuersa scripserint. Nam liquidum quidē alii *λαιον*, quia olei simile sit propter pinguitudinem: alii quod effluat è saxis, *πικρέλαιον* appellantur. alii, ut in Babylone, *νάφθα*, alii *καφουρα*, ut quibusdam placent alii *πικροσφοδον*. fossile vero alii *καράτιν*, alii *σμιμβράμιον* & *θράκιον λίθον*, alii *αἰθρακα ὀρυκτόν*, id est fossile carbonem, alii *ἀμπελίδινα γῆν* siue *φάρμακινδα*, alii vero *πλεκτόν*, id est succinum. de quibus vide suis locis. Cæterum omne bitumen in tertio ordine calidum & siccum est, atque tenuissimum: ideoque ignem facillime concipit, nec facile refingitur: præterea vero in medicina discutiendi, glutinandi & emolliendi vires habet. Estque ceratis atque malagmatibus conficiendis aptissimū, & emplastris, quæ tum Barbara, tum *ἰαμα* siue cruenta appellantur.

*Ἀπράεαρος*. apud Atticos dicitur ὁ ἀπράεαρος, de quo vide suo loco. significat etiam *φάρυγξ* ἢ *βρόγχον*, id est guttur faucesque, ut scriptum est apud Hesychium.

*Ἀσπιδέλις*. hastula regia. herba est foliis porro similibus, scapo læui florem gerente cacuminibus: *αἰθιων* vocant. radices longæ, rotundæ, gladiis similes, gustu acri. Eius præcipue radix est extergentis & digerentis facultatis, præsertim vero vitz cinis, proindeque alopecias sanat. Officinæ aphroditum vocant.

*Ἀσπυζία*. Est priuatio siue defectio pulsus in toto animali. Cum enim nulla usquam arteria videtur moueri, atque hoc per totum animal accidit, proprie *ασπυζία* dicitur. neque enim vni parti competit. Quæ tamen, si rem ad veritatem exigas, in corpus vitium nunquam incidit, in quo vna cum arterijs cor nunquam moueri desinit, verum sæpe tam exilis est, à contrariis naturæ causis, aut tam occultus, propter multa corpora arterijs obiecta, ut deprehendi omnino non possit, sicut in mulieribus hystericis. Quod si in quibusdam partibus arteriæ moueri videantur, in aliis vero immobiles sint, iam non *ασπυζία* erit, sed differentiaz species in longitudine pulsus, ut annotant Galen. lib. 1. de prælag. expulsibus.

*Ἀποδός*. nomen est compositi medicamenti ad podagram vtilis, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 11.

*Ἀπὸ τοῦ σπινθῆρος*. inordinatus pulsus. Est pulsus inæqualis in pluribus pulsationibus magnitudine, velocitate, frequentia, vehementia, aut aliter imparibus, nullam prorsus circuitus formam retinens. Huic contrarius est ordinatus: qui, quoniam omnes inæquales sunt, in eo differunt, quod hic paritatem certis circuitibus tueatur, ille confusus vnde quaque sit. Sed cum ordinatus & absolute & secundum quid dicatur, inordinatus tamen ex toto seu absolute tantum dicitur, ut qui nullum prorsus circuituum ordinem conseruet, sed præter paritatis corruptionem, ordinem quoque periodorum similiter inæqualium corrumpit. Ab eisdem causis inducitur à quibus & inæqualitas, sed semper firma fixaque est ordinatis, instabilis autem & non fixa inordinatis. Itaque cum & ordo & æqualitas admodum amica sint naturæ, patet magnā esse in inordinato pulsū naturæ offensam, quod in eo ambo sint deprauata: in ordinato vero qui inæqualis est, alterum.

*Ἀπριμύς*. prunus arbor. Huius meminit Nicander inter cerussæ alexipharmacā. quem locū, vti & reliqua omnia, Dioscorides prosa oratione reddens, videtur prunum transulisse.

*Ἀπνὴς θραυὶ*. audax apud Hippocrat. sicut interpretatur Gal. com. eis τὸ ἀπνὴς πικρὸν.

*Ἀπὸ γαμμα*. dicuntur apud Hippoc. dura, & quæ magna cum difficultate concoquuntur: ut *ἀπὸ γαμῶν ὕδωρ*, aqua indomita & incoctilis: quanquam proprie de leguminibus dici consueuerit.

*Ἀπὸ τῶν ἡ*

*Ἀπὸ τῆς*. est vltima colli vertebra, dorso scilicet proxima. Sic dicta est tum quod reliquos colli articulos sustineat, tum quod ferendis oneribus potissimum laboreat. Sunt tamen qui commutato ordine primam vertebra sic vocari putent.

*Ἀπὸ πιν*. medicamentum quod sterilitatem affert, & concipiendi facultatem adimit.

*Ἀπὸ μύς*. sic dictum fuisse à quibusdam helleborum album habetur apud Dioscor. vbi tamen *ἐλεμῶν* legendum arbitror, quod Hipp. non alio fere nomine appellat helleborū ipsum, præcipueq; nigrum.

*Ἀπὸ πιν*. infirmum, imbecillum. Scribonius Largus in descriptione hieræ scribit *ἀπὸ πιν* dici vitium stomachi, quod cum siccitate & ardore eius, & irrequiebili inextinguibilique siti consistit. Sic autem vocari ait, quod exciet omnem stomachi humorem.

*Ἀπὸ πιν*. dicitur à nonnullis τὸ βόινον, ut habetur apud Dioscor.

*Ἀπὸ πιν*. significat apud Hippocr. non modofusum, sed lignum etiam sagittæ.

*Ἀπὸ πιν*. herba est spinosa, duum generum. vna est cnico similis, à plerisque *ἀγρία νίκη* dicta, ut author est Hesych. atque ab offici-

nis etiam sylvestris cartamus dicitur. Altera hirsuta est, & carduus benedictus ab officinis omnibus & vulgo nominatur. Dicta est hoc nomine, quoniam eius scapo longo lauique rusticæ mulieres sibi fufos conficiunt. Facultatem habet desiccandi & modice digerendi.

**Ἀτρίπλεξ.** atriplex. herba est quæ radice vna coheret in altum descendente, non glabra, sed fibris quibusdam capillara, caulem fundens ramis brachiarum, quibus foliatum seminen & obductum cortice promitur, racematim congestum, colore in luteum elanguescente & auri æmulo, ex quo alio nomine χρυσάλευρον, id est aureum olus, appellari Dioscor. scripsit, etiam si Plinius seorsum de vtroque differuit, tãquam χρυσάλευρον prorsus ab attriplice dissideat. Hoc olus ordine primo frigidum, & secundo humidum esse Gal. testatur, repentem itaque sortiri calorem & aqueum: minimeque terrenum perinde vt malua, & ventrem similiter permeare ob lubricitatem. Est autem atriplex duum generum, vna hortensis, altera sylvestris: illa humidior frigidiorque, hæc sponte nascens, & ab hortensi non nisi natalibus differens. Certum est nec eadem esse atriplicem cum spinachiis nostris, nec tamen multum ab ijs dissidere.

**Ἀτρησία.** dicuntur tam viri quam mulieres quibus anus aut genitalia perforata non sunt, siue id ex natura sit, siue ex morbo acciderit, carne vel membrana supercrescente & meatum obstruente.

**Ἀτροφία.** est tabis species, inquit Celsus, in qua corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subeuntibus summa macies oritur: vel, est nutritionis defectus ex quo corpus emaciatur. Symptoma est fuctionis naturalis, alimentum male trahentis, vel retinentis, vel concoquentis, vel superflua male expellētis: vnde sequitur nutritio debilis, & à perfecta assimilatione deficiēs. Ea autem accidit aliquando corpori vniuerso, interdum vero vni tantum particulæ. Itaq; quicquid nutrimentum non sentit, necesse est vel vnius facultatis vitio id patiatur, vel plurium. Nam siue minus quam par sit trahatur alimentum, siue non trahatur prorsus, siue perperam trahatur, atrophia succedit: similiter si retētrix facultas male contineat alimentum, quantumvis probe attractum, atrophiam inducet. Quod si facultatibus ijs legitime suo munere functis, vis concoctrix τῇ ἀπιπλῆξ laboraret, quacunque id ex causa fiat, corpus similiter ali desinet, fietque atrophia, vel saltem ἡ κακὴ τροφία, atque inde κακοχρμία, alimentum corrupto versoque in alienam qualitatē. Postremo vero expultrix male munere suo fungens accersit atrophiam, aliquando parcius quam deceat expellens superflua, alias autem immoderatus. Si namq; parcius excrementa propellantur, mox corpus totum vel pars aliqua excrementis varijs redunda-

bit, à quib. vasorum obstructions factæ nō alimentis modo & calori natiuo influenti à cordē viam præcludent, vt fit in ischiade, sed naturali etiam partium temperie vitata, calidam & siccam intemperiem inducent, ex qua alimentum prodire necesse est biliosum, acre, tenue, non facile parti adhærescēs quæ nutriri debet, & mox per cutem euanescent. Quod si immoderatus expultrix facultas agat, idque vel propter vim retētricem grauata, vel propter excrementorum copiam aut acrimoniam, vel propter propriam sui ipsius imbecillitatem, per quam id etiam quod vtile est profundit per aluum, vrinam, sudores aut alio quouis modo, tandem alimentum probi materię quæ defectu corpus cibum non sentiet & ἀτρησία et adet, sicut Gal. visum est in lib. de caus. sympt. vbi à morbis inductam maciem τῇ ἀτρησίᾳ nomine comprehendit. Sed magnis quidem & acutis morbis velociter, mitioribus autem & diuturnis sensim succedit. Quæ autem causæ atrophiam in toto corpore, eadem in singulis partibus eam inuehere possunt, sed maxime in oculo. vnde ἀτρησία dicitur affectus oculi, quo totus oculus minor, humilior, obscuriorque redditur. Talis autem maxime euadit ex vehemēti capitis dolore, & per febres acutas, ad hæc incisione & perforatione caluariæ, sed maxime ex ipsius oculi siccitate. Differt autem eius ἀτρησία ab eiusdem φθίσει, quod hæc pupillam solam angustiozem, obscuriozem & rugosiozem efficit, illa vero oculum vniuersum.

**Ἀτρησία.** dicuntur, vt ait Plinius lib. 22. cap. 25. qui cibum non sentiunt, id est qui non aluntur. Idem vero lib. 28. cap. 9. ἀτρησίοις interpretatur eos qui ab imbecillitate vires recolligunt. Sic enim de lacte scribit, Et bibitur ab imbecillitate vires recolligentibus, quos ἀτρησίοις vocant.

**Ἀπλός.** nomen est emplastri quod habet Squamarum aris p. \* vi. fuliginis p. \* xv. ammoniaci tantundem, resinæ terebinthinæ liquidæ p. \* xxv. seui taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium. Recenset & Gal. lib. 1. πρὸς τὴν ἑλὴν aliud Attalicum emplastrum, quod thus & piper continet, ab hoc diuersum.

**Ἀνὰκω.** nomen est antidoti ad stomachicos & cibum fastidientes, cholericos, celiacos & dysentericos utilis: cuius compositio habetur apud Galenum lib. septimo πρὸς κατὰ τὸν τοῦ.

**Ἀνασκη.** dicitur auctore Galeno in stirpibus, quod in animalibus ὄφρας. fit enim vtrumq; ab immodica siccitate.

**Ἀνασκη.** morbus quidam desiccans sic ab Hippocrate nuncupatus. quidam legunt ἀνασκη.

**Ἀνίσκη.** gemma quæ & Callais siue Calais alio nomine dicitur.

**Ἀνίσκηρον φάρμακον.** dicitur medicamentum quod eadem die, qua adhibitum est, medetur aut iuuat. Eius generis duo habentur apud Galenum libro 9. τῶν κατὰ τὸν τοῦ ad lienis affectus.

Erab Aetio libr. 10. describitur *φαιμας*, quidam Asclepiadae *αἰμας* ad splenem scirrhosum.

*Αἰμας φαιμας*. eadem ratione qua & *αἰμας* pos dictum. quod scilicet eadem hora medetur.

*Αἰμα* sine

*Αἰμας*. auctio. augmentum, incrementum. Est partium corporis solidarum ampliatio in longum, latum, & profundum. Est actio seu opus naturae, ab eius facultate auctrice profectum, quam nulla ars imitari potest, quod sit solius naturae proprium munus. Eius autem materia quae eiusmodi incrementum perficit, humidum est primigenium quod & radicale appellant, singulis corporibus ab ipsis naturae primordiis insitum. ex quo ut vnum quodque primum existit, ita postea augetur. quod quia, non aliter quam calor natiuus, pabulo indiget quo conferuetur, ideo corporis incrementum sine alimento magnum esse nequit. Breui namque humidum illud naturae exarescat necesse est, nisi subinde humore aduentitio instaretur. Est igitur ijs quae augentur necessaria nutritio, quod nihil tam sit illi aduersum quam siccitas, sicut e contrario aliis naturae functionibus obeundis nihil magis est contrarium humiditate. Siquidem ad incrementum cuiusque corporis necesse est id ipsum distendi in tres dimensiones, continuitate sua seruata minimeque diuisa. Ergo quod augetur, humidum sit oportet, non siccum; quoniam sicca corpora minime sequacia sunt, nec facile extendi possint. Solius autem naturae opus est corpus, quod continuitate suam & speciem quam prius habuit vniuersam seruet, in omnem partem extendere. Itaque si humidorum corporum auctio est, patet eam non esse in animantium corporibus perpetuam, sed tamdiu fieri, quandiu corpora humida fuerint, hoc est, ab eo tempore quo animal editum in lucem est, usque ad aetatis vigorem. Eo namque toto tempore auctrix virtus dominatur, habetque auxiliatrices & veluti ministras alteratricem atque nutricem. Inclinate autem aetate, quoque propius ad senectutem corpus accedit, cessat ab opere, propter partium solidarum siccitatem. Siquidem primum intra vterum alteratrix & formatrix facultas componendo fingendoque foetui praecellunt, & primas partes sustinent, postea vero ubi perfectam magnitudinem corpus adeptum est, alteratrici atque nutrici inferuiunt. Est enim formatricis, seu generatricis facultatis opus congruam speciem formamque fingere & perficere, auctricis vero in omnem partem proferre quae perfectam formam habent genitaeque sunt. Quippe augetur id quod est, gignitur id quod non est. Sunt autem solidae corporis partes quae augentur, arteriae, venae, nervi, ossa, cartilagineae, membranae, ligamenta, tunicae, & si quae praeterea eiusmodi sunt particulae elementares,

similares, & simplices dictae, non etiam caro, adeps aut humor. quae quamuis supra modum increuerint, ut in athletico habitu cernere est; veram tamen auctorem non admittunt, de qua in praesentiarum agimus.

Est & *αἰμας* tempus morbi medium inter eius principium & statum, quo morbus ipse ingrauescit, quod aliis nominibus *αἰμας* & *βηδων* appellatur. Id non est facile in vniuersum definire: siquidem singuli morbi suum habent, ijque ceteris manifestius, quos humor excitauit. Nam in eo quae crudus & putris humor parit, veluti in febre putrida, obscura eiusdem concoctio ut principio finem adfert, ita augmenti initium est: eadem vero ubi manifesta esse coeperit, augmenti finis est, & status initium. Similiter in phlegmone quando sanguinis influxus cessat, & sanguis putrere incipit, & calor accendi, & pars multum distendi, augmentum phlegmones est, donec pus manifestum appareat. Sic in omni distillatione, quando humor minor & crassior influere incipit, augmenti initium est. Itaque in crudis morbis totum id tempus quo ab obscura concoctione ad manifestam morbus progreditur, augmentum dicitur. Hoc enim tempore symptomata ingrauescunt, & accessiones, quas fere omnes eiusmodi morbi habent, non modo anticipant, sed longiores etiam & vehementiores & maligniores euadunt. Neque enim, ut scribit Gal. sola anticipatio augmenti signum est, ut quae ob morbi proprietatem saepe contingat, sed plusquam proportio exigit anticipare, adiuncta simul longitudine & vehementia: vide *καρπός*.

*Αἰμας*. austerum. Id dicitur quod modice adstringit. Sola enim adstringendi imbecillitate differunt austerum ab acerbis, quae *στυφνέ* appellantur. Cum enim adstringens commune genus sit acerbis & austeris, acerbum magis, austerum minus adstringit. Itaque praeter adstrictionis ratione licet & de singulorum substantia iudicare: cum enim adstringens facultate frigidum sit & terrenum, perspicuum est austerum; quoniam minus adstringit, minus etiam terrena frigidaque esse. Plus enim aquei humoris habent quam acerbis. ex quo plerique definiunt austerum nihil aliud esse quam acerbum humore exolutum. id quod etiam sensu licet iudicare. Acerba enim sentiuntur stipare, contrahere, & contractam nostri partem ex omni parte atque aequaliter introsum pellere, nec tamen ipsa intro ferri, & se in corpus nostrum insinuare: austerum vero etiam in profundum subire videntur, atque ideo asperum quandam & inaequalem mouere sensum, tanquam resistentia & humorem omnem corporum sensibilem depascentia. Sunt autem in austerorum genere, alumen, malicorium, cytini, galla, praesertim quae matura est (siquidem immatura magis acerbis quam austeris est) praeterea fructus plurimi, quorum alii natura

tales sunt, ut malum, pyrum, punicum: ali-  
vero propterea quod nondum maturi sunt.  
In illis enim per initia acerbitas prepollet,  
deinde austeritas, postea dulcedo sentitur.

*Aurum*: dicitur apud Hippocratem, vinum huius anni, quasi *aurum*, sicut & idem *vinum* appellatur, quasi *aurum*, hoc est *aurum*.

*Air depurum, airmmum.* id est quod per se moue-  
sintur, apud Hippocr. lib. *de iis quæ ad*

**Airquam.** spontaneum. Id dicimus non quod sine causa fit, sed quod causa nostra non fit.

Explicat Gal comment. 5. aphor. 14.

Αὐτοπυρέκτις

~~A~~ *Arizupos* *apros*: panis est, vt ait Celsus, cui nihil  
furfuris ademptum est. Galen. lib. 2. de ali-

ment. panem *αὐτοῦ* πυρὸς dici prodidit, quod  
*αὐτὸς ὁ πυρὶς*, id est ipsum triticum totū, nulla

sui parte ablata in panificium cedit, atque ex  
omnibus farinæ suæ partibus, citra ullam

indetractationem constat, furfure tantum leni-  
ter succreto, sic vt inter furfuraceum & si-

milagineum mediū sit. Fieri autē solet, ut  
ipse scribit, quoties triticum generosum nō

est. generosum autem vocari, quod simi-  
-75-  
-80-  
-85-  
-90-  
-95-  
-100-  
-105-  
-110-  
-115-  
-120-  
-125-  
-130-  
-135-  
-140-  
-145-  
-150-  
-155-  
-160-  
-165-  
-170-  
-175-  
-180-  
-185-  
-190-  
-195-  
-200-  
-205-  
-210-  
-215-  
-220-  
-225-  
-230-  
-235-  
-240-  
-245-  
-250-  
-255-  
-260-  
-265-  
-270-  
-275-  
-280-  
-285-  
-290-  
-295-  
-300-  
-305-  
-310-  
-315-  
-320-  
-325-  
-330-  
-335-  
-340-  
-345-  
-350-  
-355-  
-360-  
-365-  
-370-  
-375-  
-380-  
-385-  
-390-  
-395-  
-400-  
-405-  
-410-  
-415-  
-420-  
-425-  
-430-  
-435-  
-440-  
-445-  
-450-  
-455-  
-460-  
-465-  
-470-  
-475-  
-480-  
-485-  
-490-  
-495-  
-500-  
-505-  
-510-  
-515-  
-520-  
-525-  
-530-  
-535-  
-540-  
-545-  
-550-  
-555-  
-560-  
-565-  
-570-  
-575-  
-580-  
-585-  
-590-  
-595-  
-600-  
-605-  
-610-  
-615-  
-620-  
-625-  
-630-  
-635-  
-640-  
-645-  
-650-  
-655-  
-660-  
-665-  
-670-  
-675-  
-680-  
-685-  
-690-  
-695-  
-700-  
-705-  
-710-  
-715-  
-720-  
-725-  
-730-  
-735-  
-740-  
-745-  
-750-  
-755-  
-760-  
-765-  
-770-  
-775-  
-780-  
-785-  
-790-  
-795-  
-800-  
-805-  
-810-  
-815-  
-820-  
-825-  
-830-  
-835-  
-840-  
-845-  
-850-  
-855-  
-860-  
-865-  
-870-  
-875-  
-880-  
-885-  
-890-  
-895-  
-900-  
-905-  
-910-  
-915-  
-920-  
-925-  
-930-  
-935-  
-940-  
-945-  
-950-  
-955-  
-960-  
-965-  
-970-  
-975-  
-980-  
-985-  
-990-  
-995-  
-1000-  
-1005-  
-1010-  
-1015-  
-1020-  
-1025-  
-1030-  
-1035-  
-1040-  
-1045-  
-1050-  
-1055-  
-1060-  
-1065-  
-1070-  
-1075-  
-1080-  
-1085-  
-1090-  
-1095-  
-1100-  
-1105-  
-1110-  
-1115-  
-1120-  
-1125-  
-1130-  
-1135-  
-1140-  
-1145-  
-1150-  
-1155-  
-1160-  
-1165-  
-1170-  
-1175-  
-1180-  
-1185-  
-1190-  
-1195-  
-1200-  
-1205-  
-1210-  
-1215-  
-1220-  
-1225-  
-1230-  
-1235-  
-1240-  
-1245-  
-1250-  
-1255-  
-1260-  
-1265-  
-1270-  
-1275-  
-1280-  
-1285-  
-1290-  
-1295-  
-1300-  
-1305-  
-1310-  
-1315-  
-1320-  
-1325-  
-1330-  
-1335-  
-1340-  
-1345-  
-1350-  
-1355-  
-1360-  
-1365-  
-1370-  
-1375-  
-1380-  
-1385-  
-1390-  
-1395-  
-1400-  
-1405-  
-1410-  
-1415-  
-1420-  
-1425-  
-1430-  
-1435-  
-1440-  
-1445-  
-1450-  
-1455-  
-1460-  
-1465-  
-1470-  
-1475-  
-1480-  
-1485-  
-1490-  
-1495-  
-1500-  
-1505-  
-1510-  
-1515-  
-1520-  
-1525-  
-1530-  
-1535-  
-1540-  
-1545-  
-1550-  
-1555-  
-1560-  
-1565-  
-1570-  
-1575-  
-1580-  
-1585-  
-1590-  
-1595-  
-1600-  
-1605-  
-1610-  
-1615-  
-1620-  
-1625-  
-1630-  
-1635-  
-1640-  
-1645-  
-1650-  
-1655-  
-1660-  
-1665-  
-1670-  
-1675-  
-1680-  
-1685-  
-1690-  
-1695-  
-1700-  
-1705-  
-1710-  
-1715-  
-1720-  
-1725-  
-1730-  
-1735-  
-1740-  
-1745-  
-1750-  
-1755-  
-1760-  
-1765-  
-1770-  
-1775-  
-1780-  
-1785-  
-1790-  
-1795-  
-1800-  
-1805-  
-1810-  
-1815-  
-1820-  
-1825-  
-1830-  
-1835-  
-1840-  
-1845-  
-1850-  
-1855-  
-1860-  
-1865-  
-1870-  
-1875-  
-1880-  
-1885-  
-1890-  
-1895-  
-1900-  
-1905-  
-1910-  
-1915-  
-1920-  
-1925-  
-1930-  
-1935-  
-1940-  
-1945-  
-1950-  
-1955-  
-1960-  
-1965-  
-1970-  
-1975-  
-1980-  
-1985-  
-1990-  
-1995-  
-2000-  
-2005-  
-2010-  
-2015-  
-2020-  
-2025-  
-2030-  
-2035-  
-2040-  
-2045-  
-2050-  
-2055-  
-2060-  
-2065-  
-2070-  
-2075-  
-2080-  
-2085-  
-2090-  
-2095-  
-2100-  
-2105-  
-2110-  
-2115-  
-2120-  
-2125-  
-2130-  
-2135-  
-2140-  
-2145-  
-2150-  
-2155-  
-2160-  
-2165-  
-2170-  
-2175-  
-2180-  
-2185-  
-2190-  
-2195-  
-2200-  
-2205-  
-2210-  
-2215-  
-2220-  
-2225-  
-2230-  
-2235-  
-2240-  
-2245-  
-2250-  
-2255-  
-2260-  
-2265-  
-2270-  
-2275-  
-2280-  
-2285-  
-2290-  
-2295-  
-2300-  
-2305-  
-2310-  
-2315-  
-2320-  
-2325-  
-2330-  
-2335-  
-2340-  
-2345-  
-2350-  
-2355-  
-2360-  
-2365-  
-2370-  
-2375-  
-2380-  
-2385-  
-2390-  
-2395-  
-2400-  
-2405-  
-2410-  
-2415-  
-2420-  
-2425-  
-2430-  
-2435-  
-2440-

*Aixus*. squalor. Proprie significat temporis  
constitutionem extreme siccam, Hippocr.  
tamen abusus est quodammodo eo nomine  
lib. 1. τὴν ἐνδύμωσιν, ubi eam aeris constitu-  
tionem quæ plus quidem æquo sicca fuit,  
nectamen absolute, non valde vitato no-  
mine *aixus* appellavit, vt annotat Galenus  
comment. in eundem librum.

*A. pharyngæa*. dicitur tertium genus alicz grandif-  
-simum, ut ait Plinius. vide *Yordæus*.

Aphace. herba est nascens in arvis, folio  
tenui, paulo altior lenticula, & maiores fili-

quas ferens, in quibus terna aut quaterna  
semina sunt nigriora & minora lenticula.

Omnibus nōris videtur consentire cum ea  
quam rura nostra vocant agrestem viciam.

Galen, aphaces feminum figuram dixit non esse rotundam veluti fabarum, sed aliquan-

telatiorē, quē modo lentium. & hanc v-  
na cum iſſis ſiliquis atque integra planta à

rusticis reponi, vt brutis pecudibus sint pabulo, & vt per famem etiam hominum ali-

monia interuariant: verum non insuauia modo esse, sed concocta etiam difficilia, atque

alium inhibere & succum melancholicum  
gignere. Est autem aphace sicca in tertio



libro 9. *τὸ κατὰ νότον*, quo se vsuū testatur, quodque idem est, paucis admodum variantibus, cum pastillo qui ab Aetio & Paulo *σῆς φωνῶν* appellatur, propterea quod subere constat.

*Α' φασγῆς*. is dicitur qui *αφ' αὐτῆς* paritur.

*Α' φασγῆς*. dicuntur *οἱ μαστῖνες αἱ θηλάι*, ut ait Hesychius, hoc est vbera & mammae.

*Α' φασγῆς* apud Hippocr. significat *τὸ ἀποπύμα*, id est stercus, ut annotat Galenus comment. *ἐπὶ τῷ διατῆσι οὐκ ἔστιν.*

*Α' φασματῶς*. Est sententia quæ omnes rei proprietates breuissimis verbis complectitur. Est autem ea scribendi ratio & ad primam institutionem, & ad illa quæ quis didicit retinenda, & quorum oblitus fuerit, postea in memoriam reuocanda maxime utilis, iisque valde conueniens qui breui tempore longam artem docere cupiunt. Summa enim rerum capita, atque in paucis verbis vim maximam continet, ita tamē ut in pluribus singulorū aphorismorum fidem probari satis sit.

*Α' φασματῶς*. occasio. Dicitur solet ab Hippocrate & ab omnibus fere antiquis medicis, omnis materia rei *ἀφ' ἧς ὁρμὴ γίνεσθαι*, hoc est, à qua motus initium fit ad sequentes actiones, siue pecuniæ, siue aliud quiddam quod possides, siue potentia quædam sit, siue locus, siue fides, siue actio, siue causa, siue, ut vno verbo complectar, aliud quid vis. Suat tamen qui existimauerint ab Hippocrate *ἀφορμῶς* dici, locos prius affectos, ex quibus alii postea afficiuntur, idque ex ijs dictis Hippocratis ostendi quæ habentur lib. 6. *τῶν ἐπιδημιῶν*, in hunc modum, *τὰς ἀφορμὰς ὅθεν ἔρχεται καὶ μὲν, καὶ ἔστιν.* hoc est, occasiones vnde ægrotare cœpit, considerandæ. quæ tamen significatio cum particulare quid designet, sub illa vniuersali facile continebitur. Nam & historici & philosophi *ἀφορμὰς* dixerunt hominum actiones, quod de illis etiam disputandi occasionem præbeant. similiter & eo loco Hippocrates *ἀφορμῶν* appellauit, vnde cumque morbus initium duxerit. Nec morbi tantum ea vox conuenit, sed omnibus etiam omnium hominum actionibus, sicut Galenus annotauit comment. 3. in lib. 6. *τῶν ἐπιδημιῶν.*

*Α' φασγῆς*. desipit, non est mentis compos, apud Hippocratem.

*Α' φρόνα*. spuma lactis, siue lac spumofum, hoc est tantopere agitatū; ut totum in spumā versum sit, remedium aduersus calidam vetriculi intemperiem præstantissimum, & inter laudatos cibos à Romanis habitum. ut inquit Gal. lib. 7. Methodi.

*Α' φροδισιῶς*. dicitur *τὸ ἀπορον*. Apuleius Latine veneniam reddidit.

*Α' φροδισιῶν καὶ εἰδῶν*. nomen est trochisci apud Galenum lib. 7. *τῶν κατὰ νότον* utilis ad hæmoptoicos, coeliacos, dysentericos, & eos qui stomachi fluxionibus laborant. describitur & à Paulo Aegineta lib. 7. cap. 12.

*Α' φροδισιῶν*. nomē est aridi medicamenti, quod

constat thure, squama aris, malo Punico, amylo, cernsa pari pondere inter se mixtis. Eo Paulus vitur ad implenda cana vlcera quæ pura sunt, lib. 4. cap. 40.

*αφροδισιῶν* etiam collyrii nomē est, quod describitur à Galeno lib. 4. *τῶν κατὰ νότον*, & ad Philotam authorem refertur.

*Α' φροδισιῶν*. emplastrum est ad multa cōmodum, quod geminum ab Aetio describitur lib. 15.

*Α' φροδισιῶν λουτρῶν*. sic dictus est à quibusdam *δισυλας*, ut habetur apud Dioscor.

*Α' φρόλιθρον*. aphrolitrum, hoc est spuma litri. medicamentum est metallicum exiccatoriū, instar triticeæ farinæ album solutumque & molle, tantum differēs ab aphronitro, quantum hoc à sale distat: est enim aphronitrum medium aphrolitri atque salis. Itaque quauis aphrolitrum vim habeat detergendi, & digerendi, quæ ex eius amaritudine, quam solam fere insignem possidet, manifesto deprehenditur, vim tamen contrahendi, vti sal, non habet.

*Α' φρόν*. emplastrum est cephalicum apud Aetiū lib. 15. quod alio nomine Barbarum Heræ Cappadocis inscribitur. Est autem ad multa efficacissimum.

*Α' φρόνισον*. aphronitrum. Species est nitri quod in speluncis nascitur & colligitur molle, laxum, candidius, atque similis spumæ, compactum tamen congelatumque, non autem in farinæ modum solutum, sicut *τὸ ἀφρόνισον*. In speluncarum cameris vel pendens, stitiarum instar, concrecit, vel excidens liquidum adhuc in terram deferretur, ijs, quas dixi qualitatibus præditum. ex quibus apparet *αφρόνισον* multo esse tenuius *πύργω*. Prægnantibus enim, ut ait Plinius, sed nondum parientibus nitarijs, spuma colligitur, estque ob tenuitatem suam *τὸ ἀφρόνισον* præuius & in summum emergens, simulque concrecens humor. Huiusmodi quidem est natium *αφρόνισον*. Præterea vero quoddam factitium est nitri genus, præsertim in Ægypto ex Nili aquis, quæ nitrosæ sunt, in nitriarum infusis. Hæ sunt ad Naucraticum, Nitrias & Memphim. In his, velut in salinis quod tenuissimum leuissimumque est spumæ modo supernatat, & colligitur, atque distinctis separatisque vocabulis *αφρός νίτρου*, id est spuma nitri, proprie appellatur. Neque enim idem est *αφρόνισον* & *αφρός νίτρου*. Illud enim nitri genus fossile est, hic vero nitrum factitium, quamuis Dioscorides utrūque sub nomine *αφρός* *τῷ νίτρω* videatur comprehendere, solaque bonitate alterum ab altero discernere, primas Lydio, quod *αφρόνισον* est, ex Philadelphia Lydiæ oriundum: secundas Ægyptio, quod est *αφρός* *τῷ νίτρω*, tribuens. Est autem *αφρόνισον* subuiliū partium, amarum & abstergens: desiccatur ut sal, sed vim adstringendi non habet, ut scripsit Galenus lib. secundo. *τῶν κατὰ νότον*. vide *νίτρου*. *Α' φρόν*. Spumam Latini vocant. Est substantia aerea, aquea, tenuis, alba & rara. Habet autē

plurimum aerem, & humore siue aqua copiosiore, quo alba est, tenuis atque rara. Est autē huius duplex generatio. vel enim à modico calore nascitur, vt in biliosis & ijs qui vehemēter igne calefiunt: vel in ijs quae flatu agitantur humidis. Horum primum caliditatis exuperantis nota est: secundum vero, instrumentorum angustiam & flatuosi spiritus interclusi, viamque handquaquam liberam habentis, agitationem denotat. Ab hisce autem duabus causis, frigore scilicet & calore, spumam oriri, indicio sunt tum venti in aquis ipsis spumam concitantes, tum effervescentes ea quae est in lebe te caliditas. Ceterum Galenus comment. in eum aphorism. Qui strangulantur ac dissoluntur, nondum vero mortui sunt; nō referuntur quib⁹ spuma circa os fuerit: scribit, spumae generationem ex duarum substantiarum mistione confici: altera spirituosā, altera humida. fieri autem earum mistionem anbabus in multas partes perfractis, multisque mutuo complexu paruis ampullis ab ipsis effectis. Cum vero tenacem habuerit is qui perfringitur humer consistentiam, quo spiritum complectente ampullas contingit generari: non facile dissolubilis, sed stabilis spuma perficitur, qualis maxime currentibus equis, vel apris ira percitis, circa os aggregatur. Ambarum vero substantiarum contractum ac mistionem facit nonnunquam quidem motus violentus vel virtusque; vel alterius tantum, nonnunquam vero & fortis calor. Sic quidem tutius est dicere spumam duabus de causis generari: in mari quidem impetuosus ventis agitato, ob impulsioneis vehementiam: in lebetibus vero effervescentibus, ob vim caloris. Sic & in corporibus animalium cum adsunt ex morbo comitiali conuulsionēs, vehemētia motuum solēt spumam generare, in apris vero calor, in curribus autem equorum, vtraque causa vigorem habet. Nam cum non continue per respiraciones aer intro atque extra feratur, saliuā in ipsis extenuatur, & aliquid etiam ex pulmone instar vaporis effertur, quod saliuę miscetur ac circumplicatur: vnde factam spumam substantiam augeri cōtingit. Non prodiū autem spuma ex ventriculo, sed ex pulmone atque cerebro. Sanguis enim qui ē pulmone educitur, spumofus est, similis visceri: spuma autem quae vna cum sanguine educitur, subito simul & cum eussi educitur. Ex cerebro autem prodire spumam, testis est Hippocrates aphor. 30. libri septimi, quo scribit, quibus in alui profusis excrementa spumosa sunt, ijs ex capite pituitam defluere. Quanquam fiant aliquando alui excrementa spumosa spirituoso humore ex capite ad ventericulum defluente, vel vasis quae ad ipsum perueniunt, illam effluentibus.

Α' φροστέλλω. lapis est quem aliqui σελωίδω appellat, quod imaginem Lunae repraesentet, velut in speculo. ob quod etiam ab

Aetio *σφαγῆς* dicitur & σφραγῆς, corrupto vocabulo quasi specularium. vt apud Galenum est, creditur comitiali morbo vexatos iuare.

Α' φροσκόπον. est alii prægrandis genus, sic dictum quod eo tito in oleo & aceto mirum in modum excrescat spuma. dicitur & αἰν-σκόπον.

Α' φρούτω. spumantia, bullas excitantia, apud Hippocr.

Α' φρούτης μήκων. spumofum papauer, quod & Herculeum appellatur. Quidam vero etiā τὸν πέπλον hoc nomine appellant, vt scripsit Galenus.

Α' φύει. ἀπολευκίρε. id est dealbatur, & colorem aphyæ habet, apud Hippocr.

Α' φυάδες. quod aphyæ colore simile est, apud Hippocr.

Α' φυος ἢ Α' φυαος, Expers flatuum, seu Non generans flatus: item Flatus discutiens.

Α' φωνία. vocis priuatio. Est paralytis instrumentorum quibus vox fingitur. Fit vel læsis organis vocis, quae sunt guttur & muscoli ipsū mouentes atque nerui, ij præsertim quos recurrentes vocant, vel ipso principio neruorum affecto. Sed & omnes fere dissecandi professores, in vtroque latere vnum esse neruum soporariis arteriis inhaerescētem existimant. quem si laqueo intercipias aut disseces, animal cōfestim mutum reddetur, vt libello de neruorum dissectione à Galeno scriptum est. Ceterum ob quas causas contingat ἡ ἀφωνία, multis verbis Galen. lib. 4. de locis affectis explicauit.

Α' φωνος. mutus: communi quidem significatione is dicitur, qui vocem edere non potest, quacunque tandem de causa id contingat. Verum Hippocrates ἐκ τῆς ἀφωνίας, hoc est vocis priuatione, tanquam notissimo symptomate nominat innuitque illos, qui ne alium quidem motum vllum ἢ κατὰ σωμαί-προν, hoc est eorum quae ex voluntate fiunt, retinent, nec quicquam omnino sentiunt, sed iacent eodem modo quo apoplectici, si ne sensu pariter & motu. Est enim vox actionum omnium præcipua, quae ἐκ τῆς σωμαί-πρας proficiuntur, ex cuius nexa voluit Hippocrat. κατ' ἐξολὴν reliquarum quoque actionum quae fiunt κατὰ σωμαί-προν offensionem significari. Sed offensis quidem ijs non semper sensus perit. quamobrem scriptum ab eo est, ἀφώνους αἰσθανομένους συμβαίνει γινέσθαι, hoc est, voce priuari aliquando sentiunt. Interdum vero sensus vna cum motu aboletur, quo mali genere laborantes ἀποπληκτικὸς καὶ καρουμένους appellant. dicitur enim καρὸς proprie toto in corpore repentina sensus atque motus priuatio. De his qui hoc modo ἀφωνοι euaserunt, cum multa scripta sunt apud Hippocratem, tū maxime aphor. 5. lib. 5. & aphor. 1. lib. 6. & aphor. 5. 8. lib. 7. vt in eorum commentariis Galen. annotauit.

Α' χείρων καλοῦμεν. duplex habetur apud Aetium, vtrumque ἐλεκηρὸν, & de genere collyriorum

niorum *ἄχαιος*. Est & aliud *ἄχαιος* apud Galen. lib. 4. *ἄχαιος* ex Asclepiade perinde atque quæ habentur apud Aetium *αἰσίων*. valet enim ad sistendam fluxionem, constans adstringentibus & refrigerantibus. Veruntamen *ἄχαιος* non est, quia erices fructum non recipiat, cuius locos has habet.

Sunt & alia duo *ἄχαιος* *καλὴ*, ex genere *ἄχαιος* *καλὴ*, quorum vnum habetur apud Celsum lib. 6. quod verius inter collyria *ἄχαιος* & *καλὴ* censeretur. Namque inflammationibus oculorum protinus medetur, & multam continet acaciam. Alterum ad Antiochum refertur, & describitur à Marcello lib. 8.

Est & *ἄχαιος* antidoti nomen quam describit Aetius lib. 13. cap. 109. & Marcellus similiter, qui mox ubi ea exhibita sit, mercedem ab ægro petendam consulit. Namque multi, inquit, qui cito curati sunt, ingrati extiterunt, ideoque antidotus ipsa *ἄχαιος*, quasi sine gratia, nuncupatur. Recipit autem, Cassia, myrrha, piperis albi, piperis nigri, castorii, galbani, styraçis, croci, costi, opii, spicæ nardi, singulorum par pondus, mellis quantum satis est. Datur magnitudine fabæ, facit ad omnia diuturni temporis purulentia in thorace, & ad hepaticos cum aqua multa, & ad colicos eodem modo, ad splenicos cum aceto mulso.

*Ἀχάμης*. est gemma quæ ex Sicilia fluuio elusdem nominis, apud quem primum reperta, nomen inuenit, varia non solum coloribus, sed etiam rerum imaginibus quas representat, non ab artifice aliquo depictas, sed ab ipsa natura formatas: ita enim discuntur venæ & maculæ, ut modopalumbum expriment, quam *φασαχάμης* appellant: modo cornu, quæ *κρηχάμης*: modo arbutulam vnâ, duas, pluresue, ut interdum nemus appareat, quam *δενδραχάμης*: nunc vero effeda, flumina, volucrum quoque species & iumentorum atque etiam hominum: quo sane modo in achate Pyrrhi regis Epirotarum no- uem Musæ & Apollo citharam tenens spectabantur, non arte, sed sponte naturæ, ita discurrentibus, ut scribit Plinius, maculis, ut Musis quoque singulis sua redderentur insignia. Id genus achatas maxime fert India. Color illis est aut niger, aut fuscus, aut cinereus, aut similis corallio, limitum floribus, pelli hianæ, pelli leonis, pelli pantheræ. illam *λεόντιον* & *λεοντίδιον*, hanc *παρδαλιον* vocant. Per eos vero colores, potissimum qui primi dicti sunt, interdum venæ albæ transeunt, *λευκαχάμης* vocant: interdum sanguineæ, quam *αιμαχάμης*: alias fardæ modo rubentes, quam *σφραχάμης* nuncupant. Quamquam vero è Sicilia fluuio nomen dicuntur accepisse, attamen in multis etiam aliis regionibus reperiuntur, ut annotauit Plinius. Nomen apud Gallos retinet, qui eam vnus literæ immutatione, agathe appellat. Ex achate, eo præsertim qui *λέων* appella-

tur, fit emplastrum quod *ἄχαιος* appellatur, efficax aduersus ictus ferarum venenatarum, tumores duos, liuores & strumas diffundit, concoquit, suppurat & rumpit abscessus. Describitur ab Aetio lib. 15.

*Ἀχέρως*, n. genus est fruticis syluestris, exigui alimentum & prauum succi: ut habetur apud Gal. lib. 2. de aliment. facult.

*Ἀχέρως*. dicitur populus nigra, ut author est Aristoteles: secundum Paulaniam vero candida, enim etiam interpres Homeri ad stipulatur duobus locis, Iliados. 5. & 11. exponens *Ἀχέρως*, quam tamen alios fagi speciem censere scribit. Idem *Ἀχέρως* scribit appellari, quod ex Acheronte inferorum fluuio Hercules post Cerberi victoriam reuertens, eam reportarit.

*Ἀχίμεις*, ab Hippocrate, &

*Ἀχίμεις*, à Theophrasto, dicitur hordei genus cui spica folio per quam proxima est, amplitudinis & crassitudinis maioris, ab Achille quodam sic nuncupatum, quem agricolam fuisse dicunt, ut annotat Gal. in *ταῖς γνάσταις*.

*Ἀχίμεις*. mazæ genus quæ ex hordeo, cui *Ἀχίμεις* nomen est, constare dicitur.

*Ἀχίλλης*. Achillea. Herba est fruticosa, scapos habens dodranteales aut maiores ad fulorum effigiem, & circa eos folia pusilla, incisurus præcincta densis, ex obliquo, segmentis coriandro non dissimilibus, subalio gustu, subfuluo colore, odore multo nec insuauis, sed medicato, umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. Species quarta sideritidis dici potest. nam & eam *Ἀχίλλης* *οἰδητική* Dioscorides dicit appellari. Dicta autem est *Ἀχίλλης* quoniam inuenerit eam Achilles discipulus Chironis, quæ vulneribus mederetur. Facultatis est adstrictoriæ. Dioscorides à Latinis quibusdam supercilium terræ dici testatur, & ab aliis millefolium, quod nomen etiam Galli videntur retinuisse, quod *ἄχαιος*.

*Ἀχίλλης*. genus spōgiarum tenue densumque, ex quo penicilli commode fiunt, sic dictum quod eo Achilles in curandis vulneribus quondam vti solitus sit.

*Ἀχίς*. est superficialis & tenuis exulceratio, totum fere nigrum oculi comprehendens, aeri caliginoso assimilis & coloris cærulei Gal. in libello qui introductio seu medicus. appellatur, nō diffinit esse exulcerationem, sed cicatriculam à superficiali exulceratione contractam. Non est dubium affectum hunc dictum esse *ἄχαιος*, quæ aeris *ἡλυστι*, id est turbationem, significat, cum medium inter nubem & nebulam habet crassamentum, ita ut quam nebula quidem magis cōcreuerit, minus vero quam nubes, ut exponit Gal. comment. 2. in lib. 1. pro-rhet. *Ἀχίς* Latini interpretes caliginē reddunt.

*Ἀχίς*. est argenti spumæ tenuissima quædam portio, ut annotat Galenus libr. 1. *ἄχαιος*.

*Ἀχίς*. pyrafter seu pyrus syluestris. Arbor est

ramosa furculosaque, caudice rimoso & hilco fere cortice, folio circinato, floribus foliatis, fructu quoque turbinato, sed cum primis acerbo & gustu adstringente. Pyrum eius non nisi tardissime maturefcit. magis autem quā reliqua pyra adstringit & delicat *ῥυχνή*, dicitur à Theophrasto.

A<sup>χρ.</sup> species est *ῥεσάρας* nascentis in Arabia, quæ & *ἀρπίνης* dicitur: de qua vide in dictione *ῥεσάρα*.

A<sup>χρ.</sup> *ῥοδάκης ἄβλος*, acerosus panis. vide *ἄρπος*.

A<sup>χρ.</sup> dicuntur à Celfo manantia capitis ulcera: Sunt autem tumores præter naturam in ipsa capitis cute excitati, tenuissimis foraminibus eam exulcerantes & saniem viscosam lentamque effundentes. Oriuntur hi plerumque furfuribus præcedentibus, & ferme etiam scabie, ut Crito scripsit. Non vnus humor eos gignit, sed alias biliosus, alias melancholicus, maxima autem ex parte nitrosa & salsa pituita. Sunt autem *οἱ ἀχρῶες ῥυχνή*, id est fauo, non multum absimiles, nisi quod hic maiora habet foramina, humore melleo referta, illi autem per exigua. Quamobrem inde nomen habuisse Galenus prodidit, quod non amplum locum occupent, sed angustis spatiis conclusi tenuem etiam humorem contineant, *ἅπὸ δ' ῥυχνή* *αὐτῶν* *ῥυχνή*.

A<sup>χρ.</sup> *ῥυχνή* genus est potionis ad ventriculum accommodatæ. fit autem ad varios vsus, ut ad ventriculi robur, ad flatum, ad emolliendam aluum, ad purgandum. Nec est dubium sic dictam primum fuisse quod magna ex parte absinthio cōstaret. Postea vero etiam sine absinthio ex vino, melle, mastiche, & aliis aliquot aromatis composita est, addito etiam vbi purgare expedit, agarico, aloe, scamonia aut epithymo, prout corporis affectus & humor vitiosus postulat. A recentioribus dictum etiam fuit conditum huiusmodi potionis genus. Habentur apud Aetium compositiones aliquot eiusmodi lib. 3. cap. 69. 70. 71. & lib. 9. in curatione alui adstrictæ, & ad finem lib. vltimi. vbi obseruandum nullam ex iis esse quæ ad aluum emolliendam mastichen non recipiat, ut ipse Aetius scribit lib. extremo.

A<sup>χρ.</sup> *ῥυχνή* *οἶνος*, vinum ex absinthio factitium, vtile stomacho, hepati & renibus. Eius vero

faciundi ratio multum euariat. Nam differetes compositiones describit Dioscorides lib. 5. cap. 34. Item Columella lib. 12. ca. 35. & Constantinus Cæsar lib. 8. cap. 20.

A<sup>χρ.</sup> *ῥυχνή* absinthium, multiplex est. vnum vulgare, Gallorum vulgo aluyna dictum, quod est frutex insigni amarore præditus caule ramoso, foliis incanis, multipliciter sectis, aureo flore, partu rotundo, racematim coherente. Id quia à Ponto veniret cæteris præstantius, Ponticum veteribus dictum fuit. minus calfacit & extenuat cæteris, sed eque reficcat, magisque adstringit, proindeque stomacho conuenientius est, ipsum roborans. Aliud genus est, marinum quod *ῥυχνή* vocant. herbæ fruticosa, prætenuibus cirris, paruo similis abrotano, exiguo semine, prægnansq; subamara, stomacho inimica, graui odore, linguam adstringens & leniter exalfaciens: inuenitur maxime secus mare in littoribus. Huius semen est quod vulgus barbotinam vel mortem vermium vel semen contra lumbricos vocat. Tertium genus est quod Santonicum dicitur, gentili regionis, vbi prouenit, vocabulo, fruticosis caulibus, lentis, tenuibus, folio Pontici siue vulgaris absinthii, sed lōge pluribus segmentis digesto, candicante, aureo flore, copioso semine, mitiore multo amaritudine. Id autē stomacho dicitur aduersari. Sunt qui *ῥυχνή* vocatum dicant *ἅπὸ τοῦ ῥυχνή*, quod est tangere, sed per contrarium sensum, quod nullum animal ob eximiam amaritudinem ipsum attingat. Id etiam veteres Græci *ἀνιχνή*, conformi etymo, quasi impotabilem, dixerunt.

A<sup>χρ.</sup> *ῥυχνή*, etiam à quibusdam dicitur *τὸ ἀχρῶδες*, ut author est Dioscorides, forte ob amaritudinem quam similem absinthio habet, eandemque ob causam etiam *ῥυχνή* à nonnullis dicitur, ut idem Dioscorides scripsit.

A<sup>χρ.</sup> *ῥυχνή*, retrorsum fluens, apud Hippocratē.

A<sup>χρ.</sup> *ῥυχνή* dicitur ab Hippocr. *ἡ ῥυχνή*, ut interpretatur Gal. comment. 3. *εἰς τὸ ῥυχνή* *ῥυχνή* *οἶνον*, quasi tactam mentem, id est laxam, dicas.

A<sup>χρ.</sup> *ῥυχνή*, apud Hippocr. in Prothetico dicta est *ῥυχνή* *ῥυχνή*, ut eodem loco exponit Gal. & in interpretatione linguarum Hippocratis.





# I O. G O R R A E I

## P A R I S I E N S I S

### Definitionum medicarum

T O B.

*A'δρῶα*. dicuntur apud Athenæum quæ à Gal. *βεβρυχα*, pruna scilicet, ut putat, Damascena.

*Βαθυιδες*. sunt bæs quædã ac sinus in brachii siue humeri osse, v-

trinque singule, in quas cum extenditur flectiturque tota manus, vlnæ ipsius *καρπῶνας*, siue processus, ingrediuntur. Cõditæ-æ sunt à natura ne vel præter modum flecteretur cubitus, vel tantum etiam extenderetur & in posteriorem partem recederet, quantum modo adducitur in anteriorem. Siquidẽ in anteriori humeri sede & in posteriori similiter sinus cavi habetur, singulos vlnę processus excipiens, sic quidem ut anterior sinus priorem vlnę processum intra se recipiat, quando cubitus extreme flectitur: posteriorem vero posterior, si cubitus extendatur. Neque enim aliud sunt *βαθυιδες* quam summæ extensionis inflexionisque termini. Proprie autem in brachio, siue humero dicuntur. Veruntamen ab Hippocr. non hi modo, sed ceteri omnes sinus in quibus recipiuntur ossium tubera siue processus, eo nomine appellantur, sicut annotavit Gal.

commentario *τ. εις τὸ πᾶσι ἀγνοῦν*. *Βαθρον*. scamnum. Recentiores medici, inquit Rufus, sic appellant organum quod Hippocrates multis in locis *ἐνλον*, in quibusdam etiam *χεῖρας* vocavit: eoquẽ affixis cruribus & pro organo & pro scamno vsi sunt. Struitur autem hunc in modum: Paratur lignum sex cubitos longum, latum duos, novem digitorum crassitudine, resupinaturque, & quatuor alia ligna pedem longa extremis partibus rotunda, duo scilicet & duo: cum eius extremis iunguntur, huiusmodi ligna, quæ *φλῆαι* ab Hippocrate vocantur, in latitudine peruiis foraminibus pertunduntur, quibus continentur penetrantes axes, in medio clauos habentes, & in extantibus capitibus manubriola ductaria ad cõuertendum. Totum lignum in medio vsque ad alteram partem quatuor digitorum spatio iniecto caua habet, quorum altitudo pariter & latitudo tres digitos æquet. Caua hæc Hippocrates *καπῆτις* nuncupavit. Medium præterea lignum alte in quadratam figuram excavatur, quo scalm' demittitur, qui *σπριαπτικός* vocatur. Alias item habet *φλῆαι* in medio ad similitudinem literæ non inutiliter adiectas. Structura igitur Pasicrate auctore huiusmodi est.


A. lignum quadratum seu cubitum, latitudine bicubitali, crassitudine dodran tali.

B. postes breues axes habentes.

C. fossula.

D. lignum teres in medio cavo inficum.

E. postes pedales lignum transversum, tanquam scala gradum, continentes.



**Baccharion.** dicitur hoc nomine à nonnullis in casibus, ut habetur apud Dioscoridem. nec dubium quia ob insignem quæ præditum est amaritudinem.

**Baiou.** proprie dicitur palmæ termes cum suo fructu anullus, & in Baiou in mediu hoc est, quod via uellatur. Est & Baiou malagmaris nomen, quod describitur à Pauli Ægineta lib. 7. cap. 18.

**Baiou.** herba est similis dictano vel pulegio, ut scribit Helychius.

**Baxæus.** Est herba fruticosa, generis coronarii, folio aspero, magnitudine inter violam & verbaſcum, anguloso caule, cubitali altitudine, subcubro, circa quem caudiculi agnascens modo sobolis funduntur, floribus in purpura candicantibus, radice, veratri nigri, cui inest odor cinamomo proximus, gracili solo, nec humido proniciens. officina eam non nouere. Rura alicubi diuæ Mariæ chirothecas appellat. Ex eius radice, quod gradioris esset, ynguentum olim fiebat quod **Baxæus** ab Hippocrate vocari Galenus commemorat à **γράμιος**. Alii vero scribunt ynguentum illud non dici **Baxæus** ab Hippocrate. sed **Baxæus** sine **Baxæus** **trayon**. Porro quod ad scripturam attinet, apud Plin. & Helych. est **Baxæus**: apud Dioscor. **Baxæus**: apud Galin Gloss. Hippoc. **Baxæus**, sine.

**Baxæus.** balineum, sine balneum. Id dicitur quod sudandi, lauandi, detergendique corporis vſibus est deputatum. Cum simpliciter dicitur, dulcis aquæ intelligendum est. Conſtabat veteribus ex quatuor partibus variâ facultate præditis: siquidem primū ingredientiēs in aere verſabantur calido: postea in aquam calidā deſcēdebāt: mox ab hac egreſſi in frigidam: poſtremo ſudorem detergebāt. Primam partem Celfus Laconicū, Vitruuius **trayon**; alii **trayon** appellat, ut ait Galen. quod in ea corpus præmoliri ſoleret. In hac enim parte qui lauari debent, primum verſabantur, antequam lauacrum ingrederentur. Conſtabat ſolo ae-

re eoq; triplici, primum tepido, deinde mediocriter calido, poſtea multum calido. Sic enim ſenſim blandeque corpus incaleſcit, meatus aperiuntur, denſæ partes deſatiq; humores liquantur atq; funduntur, contenta ſub cute vacuantur, calor, vapores humores & excrementa foras vacuantur: hæc enim commodā ex ea prima balnei parte proueniunt. Ab ea in ſecundā ibatur, via quam fieri poterat breuiſſima: tepidarium & caldarium Vitruuius vocat. Conſtabat tribus aquæ ſoliis: primum tepidæ, ſecundum mediocriter calenti, tertium calidæ erat. Huius opus eſt per ſe quidem caleſcere, humectare, vias aperire, deſata fundere, laxare, euocare, molire, lenire, coquere, ſomnum, conciliare, per accideſ vero refrigerare, eductis fuliginofiſ excrementis & foras euocato calore febrili (quanquam & per ſe refrigerare poſſit, propter aquam quæ poſteſtate frigida eſt) exicare, euacuare, diſcutere ſtatuſ, digerere per ſialium & corpus extenuare, pro modo ſcilicet caloriſ & teporiſ quō quis in eiufmodi ſoliis diuerſatur. Cæterum hæc amplā eſſe expedit. Siquidem in amplo ſolio membra liberius expanduntur, corpusq; facilius volutatur, in quō tamen nec moueri vehementer vtile eſt, nec vociferari, ne nimio clamore fluxio in thoracē prouocetur, præſertim phthiſicis & quib. imbecillū pectus eſt: ſed habitū corporiſ in eo decentem & cōpoſitū eſſe oportet, q̄ incuruato corpore & partibus muſculi conuexarum quidem partium tenduntur, concavarum autem cōprimuntur: ex quo & poti clauduntur & corp⁹ molli leniq; prohibetur. Tertia vero balnei pars, quæ Vitruuius frigidarium dicitur, conſtabat ſimiliter tribus aquæ ſoliis, quorum primum aquam mediocriter calentem, ſecundum tepidam, tertium frigidam contineret. Per hæc enim aquarum differentiaſ tranſeundum erat; præſertim ægro, qui ſubitaſ mutationeſ ferre non poteſt, ut ſani hi enim celeriter ſtatimque à calida in frigidam deducendi ſunt, ſi eorum natura, vires,

& consuetudo permittant. Ab ea corpus refrigeratur, cutis cogitur, meatus clauduntur & densantur, calor, spiritus & humores introsum repelluntur, atque immoderatum substantiæ effluuium comprimitur; totumque adeo corpus per accidens calidius redditur, clausis videlicet meatibus, ne calor tantariarius quam ex calidæ lauatione ascitus expiret. Demum vero quarta balnei parte exiccabatur corporis mador, sordes strigili vel pannis asperis detergebantur, cutis fricabatur, & oleo aliquo conueniente inungebatur. Siquidem se habebant quatuor balnei partes, quas domos aliqui appellant. in quas tamen omneis nec necesse fuit semper ingredi, nec similiter singulas earum differentias experiri, nec eodem semper modo, sed his atque illis aliquando plus, aliquando minus utendum pro natura, viribus, ætate & habitu lauantis, & pro temporis aerisque constitutione. Ut enim balneo quibusdam in totum uti non licet, sic multis satis est una vel alteram balnei partem experiri, & alias fugere. Pleno ventre plenisque intestinis nemo balneo se tuto committat, quod sic facile iecur noxam contraheret, humorque crudus in totum corpus raperetur, ut nec in principio aut augmento morbi, propter carnis cutisque costipationem & humoris cruditatem, nec in copia crudorum succorum maioribus in venis scatente, nec imbecilla parte aliqua principe, ut ventriculo, iecino-re, liene & pulmonibus, quod à balneo fusos humores magno sanitatis detrimento exciperet. Ad eundem modum à prima balnei parte abstinere debet quibus calida & sicca intemperies est, siue naturalis, siue morbifica, fueritque illis abunde in secunda balnei parte lauari: quam quidem sicut calidæ & siccæ naturæ appetunt, sic fugere debent humidæ & calidæ, & qui similibus morbis laborant. Tertiâ calidæ & siccæ naturæ & affectus consimiles exposcunt, dehortantur autem frigidæ & humidæ naturæ, morbi eiusdem generis, sanguinis paucitas, carnis nuditas, & corporis gracilitas. Propter quæ quanquam in hæcicis à frigida periculum impendeat, tamen quoniam in iis agentem aliquid vel periclitari oportet, præstat nos ad summam illam hæcicorum intemperiem attētos, eos ducere in frigidam, quam eius incommoda metuentes, ab ea arcerē: neque enim ex frigida lauatione error mortiferus est aut immedicabilis. Hæc quidē de dulcis aquæ balneo dicta sunt. Præter id blanea quædam sunt medicamentosa, eaque vel naturalia sunt, vel arte præparatur. Naturalia quidem nitrosa, salia, aluminosa, bituminosa, sulphurea, & quæ ferri ærisque vim obtinent: arte vero parantur si in aqua dulci calamintha, amaracum, hyssopum, lauri baccæ, rosamarinus, lapis pyrites, sal, fex vini vsta, nitrū, pumex, sinapi, vna Taminia, coccus Cnidius & alia his similia mista fuerint. Hæc autem talia facultatibus esse, qualia sunt ea ex qui-

bus constant, neminem laet. proindeque singulorum vires suis quæque locis requirendæ sunt.

*Balanus* oleum ex glande vnguentaria siue myrobalano confectum. Conficitur autem, ut scribit Dioscorides, eodem modo quo amygdalinum. Vim habet aluum solvendi, repurgandi maculas, lentigines, varos, aurium dolorem, tonos tinnitusque sedandi, si cum adipe anserino instilleretur. sed stomacho aduersum est.

*Balanus*, glans, proprie intelligitur fructus roboris, quercus, esculi, cerri, ilicis, suberis. Hæ namque arbores glandes proprie dictas ferunt. Sunt autem earum per multa genera, non specie tantum differentia, sed etiam sexu, sapore, colore, figura & magnitudine. Suum proprie cibus est, nec nisi in annonæ magna inopia arefactas glandes moli in farinam, spissarique in panis usum constat. Capitis enim dolorem & flatum in cibum sumptæ pariunt, & difficillime concoquuntur & in venas transiunt. Decoctum tamen earum conuenit dysentericis, coeliacis, sanguinem excrementibus, tritzque in pello foeminis fluxione vuluæ laborantibus comode subiiciuntur, & crudas inflammationes illitu leniunt. Dioscorides iligneas quercinis anteponit.

*Balanus*, glans, pars penis. Est extremi penis carnosâ substantia in glandis similitudinem facta, utrumque penis meatum, quem natura urinæ & seminis communem efficit, complectens & ambiens. Hac autem parte meatus ille parum amplior est, quam reliquo ipsius ductu, tandemque in extremo arctior denuo euadit, quo videlicet longiore seminis mora maior in cōcubitu voluptas excitaretur. Ex quo tamē simul fit, ut & gonorrhœa laborantibus & calculosis summus ea parte dolor sentiatur. Urina enim acris ea parte copiosior affluens, tanto maiorem acrimoniæ sensum iniecit, quanto ibi diutius constiterit. Siquidem fieri non potest, ut in ea canitate conclusa, tota confertim simulque erumpat, propter meatus in extrema glande angustiam.

*Balanus*, glans, remedii genus. Est medicamentum quod in glandis formam effictum, sedi imponitur ad deiciendam ahiū. Eius varius usus est. aliquando propter imbecillitatem ægri qui clysterem non potest admittere, interdum vero quod excrementa in ipso recto intestino sunt, præsertim vero in febribus magnis & ardentibus & quibus humor sursum repit, in quibus clysteres indere nocuum est. Expediit autem glandibus uti tam in frigidis capitis affectibus, cataphoræ, & delirio, tum in quibus immixtus clyster non reuertitur. Cæterum parantur varia ex materia, mellecocto, resina, pice, cæra, bitumine, sicu pingui, radice panacis, & herbarum foliis intritis, vel salis etiam grumo: hæc vel per se & sincera,

vel cum aliis confusa adhiberi possunt.

*Βάλαρος Αιγυπτία*, ἢ αἰθιοπικὴ ἢ ἀραβικὴ. iis nominibus dicta fuit à veteribus ἢ μυρεψικὴ de qua paulo postea.

*Βάλαρος Αἰὶς*, glans Iouis. sic dicitur castanea, quæ in glandium quoque genere continetur. eadem alio nomine *Βάλαρος σαρδηνία* appellatur. vide *Αἰὶς Βάλαρος*.

*Βάλαρος εὐβοϊκὴ* nux castanea.

*Βάλαρος μυρεψικὴ*, glans vnguentaria. Est fructus arboris myricæ similis, magnitudine anellanae nucis, cuius nucleus Græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo, vice olei, præciosa vnguenta compinguntur. Nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia, & Petra oppido iuxta Iudæam: à quo *Βάλαρος αἰθιοπικὴ*, *ἡβοϊκὴ*, *ἀραβικὴ*, *πετραία*, *συνεμακὴ* καὶ *Αιγυπτία* dicta est Plinius & Aetius *μυρεψικὴν* appellant. Præfertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Eius caro drachmæ pondere vomitoria est, aluum largiter subducit & iecur lienemque expurgat. carnis succus multum calidus est, cortex autem plurimum adstringit. Sunt qui putent eandem esse, aut non longe dissimilem à nuce quæ vulgo muscata dicitur. Quos vereor ne vna hæc res redarguat, quod veteres glaudem vnguentariam prodiderint vomitiones mouere, quas nobis nux muscata videtur sistere: aluum resolvere, quam nostra nux confirmat: & stomacho non eam modo aduersari, sed & eius oleum, quo nihil nunc habemus stomacho gratus.

*Βάλαρος σαρδηνία*, nux castanea, ideo dicta quod à Sardibus primum venerit. eadem dicitur *Βάλαρος εὐβοϊκὴ*.

*Βάλαρος πίστεμα*, glandis vnguentariæ succus, ut quidam volunt, vel eiusdem glandis expressæ recrementum.

*Βάλαρος φοινίκων*, fructus palmularum, qui composita voce *φοινικοβάλαρος* dicuntur & *δίκτυλοι*.

*Βάλαρος*, balauitium. flos est sylvestris punici, cytino similis. Tria eius genera reperiuntur coloribus distincta: candidum, fulvum, rosaceum. Succus ex eo exprimitur hypocisthidis modo. Adstringit vehementer, siccatur ordine tertio & refrigerat. Ideo sanguinem fluentem sistit. vide *κύνανος*.

*Βάλαρος καυλότης σαρδηνίας*, hoc est, concauitas oblonga, apud Hippocr.

*Βάλαρος*, dicitur à quibusdam *σίκυς ἄχνη*, hoc est, cucumis anguinus, ut habetur apud Dioscoridem.

*Βάλαρος*, ballote. Herba est caulibus quadrangulis; nigricantibus, hirsutis fere ab vna radice numerosis, folio marubii sed maiore, pene rotundo, piloso, ingente perintercapedines caulem, apiastrum similitudine, grauēolente, orbiculari florum ambitu, qui candidi in rotæ speciem scapos verticillatim obducunt. Dicitur alio nomine *μελασφόλλον* & *μελαμυρρίδιον*, siue *σφάγιον μέλας*, ut ait Plinius lib. 5. capite 4. Officinæ omnes marubiastrum aut nigrum marrubium appellat.

*Βάλαρος*, qui est ex Vazra urbe Macedoniae, apud Hippocr.

*Βάλαρος*, dicitur à quibusdam *παραβάλαρος*, ut habetur apud Dioscor.

*Βάλαρος*, balsamum frutex est, vel, ut Dioscorides ait, arbuscula, magnitudine albæ violæ aut pyxacanthæ: vel, sicut ait Actius, binum cubitorum, folio rutæ proximo sed candidiore, & perpetuo virente, in Iudæa solim quadam conualle & Ægypto nascens. Cæterum postea propagata est & plurimis locis satà ex quo Romani Iudæa potiti sunt. Ex eius cortice gutta manat quæ *εὐβάλαρος* appellatur. Eius autem surculus *ξύλοβάλαρος* dicitur. de quibus vide suis locis. Balsamum desiccatur & excalfacit secundo excessu; est & tenuium partium & odoratum.

*Βάλαρος μέλας*, est succus balsami oleo persimilis, qui ex eo imis partibus crebra scarificatione vulnerato emanabat. Idem cum opobalsamo est; ut scribit Simeon.

*Βάλαρος μόδις*, cognomentum est *καρίας*, ut inquit Plinius, quæ balsami odore est, sed amara, ideoque vtilior medicis, sicut nigra vnguentis.

*Βάλαρος*, lapis est seu gemma bituminosa, molli odore prædita. Sic dicitur ex tinctura, quam Plinius non explicat quo colore fuerit tincta. Sunt qui existiment anchusæ radice intinctam fuisse.

*Βάρβαρος*, barbara dicuntur (inquit Gal.) à recentioribus medicis emplastra quæ bitumine constant. Est enim generis nomen, non particularis alicuius medicamenti. Siquidem multa compositione inter se admodum differentia barbara appellantur. Eorum vero pluraque etiam nigra dicta fuere, videlicet à colore bituminis. Quoniam autem bitumē glutinandi vim habet, cruentisque vulneribus conuenit, quæ *εὐαίμα* appellantur, ideo sæpe *εὐαίμα βάρβαρος*, hoc est, barbara cruentis vulneribus conuenientia, dicuntur à medicis, ut à Gal. lib. 5. meth. med. in sistendo sanguine è pulmone erumpente.

*Βάρβαρος*, nomen est medicamenti acopi ad coxendicum dolores efficacis, quod etiam *σινιφωρίς* dicitur. huius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 19.

*Βάρβαρος*, dicitur proprie arbor ex osse perficæ enata, ut annotat Constantinus Cæsar lib. agricult. 10. cap. 13.

*Βασίλις*, est lapis multangularis, colore ferri & durissimus, ut non facile vulnerari secariue possit.

*Βάσις*, dicitur à quibusdā coticula lapis, quod aurum ipsi attritum colore, tanquam trutinæ, examinetur.

*Βασίλειον*, est collyrium *απικτινόν* ad principia suffusionum, omnem visus hebetudinem & cataractes efficacis. descriptio habetur apud Aetium lib. 7.

*Βασίλειον*, est collyrium *ψωεινόν*, diuersum à superiori. describitur à Galeno lib. 4. *τὴν κατὰ πύλιν*.



**Βασίλειον**. est emplastrum, quod & *πασφάρμακον* dicitur à Gal. Aetio & Paulo, quia constat quatuor simplicibus medicamentis, paribus scilicet portionibus cere, resinæ colophoniae, picis & leuitaurini simul mistis coctisque. Vim habet maturandi abscessus & ad suppurationem perducendi. Est & huius nominis emplastrum nigrum & iisdem fere viribus præditum apud Cor. Celsum libr. 5. cap. 19. habens, Panacis p. i. galbani & mastice picis & resinæ singulorum p. x. olei diuidium cyathum. Habetur & apud Scribonium Largum duo emplastra, vñ Tryphonis nigrum quod *Βασίλειον* dicit appellari, recipiens Picis Brutæ p. i. resinæ p. i. galbani p. i. olei cyprii p. i. fescunciam cum olei communis p. x. Alterum emplastrum Aristi chirurgi, similiter nigrum, quod *πασφάρμακον* nuncupat, eodem prorsus modo descriptum quo habetur apud Gal. Aetium, Paulumque. Ex quo apparet *Βασίλειον* illud celebre, ab Aristi chirurgo profectum innocentumque esse.

**Βασίλειον**. recentioribus qui de re herbaria scripserunt dicitur *πύρινος*, atq; apud omnes fere iam receptum hoc nomen est, vt Galli quoque lingua vernacula sic appellant. Rationem Psellus addit, quod ocimū medicum possidet calorem, capiti cordique odoratu salutare.

**Βασίλειον** etiam est genus vñum Satyrii, foliis nigra plumbagine maculosis, & reliqua superficie cynosorchi simile, cui radix subest lutea, ac instar manus effigie ramosa. Officinæ Christi palmam appellant. Eius vñus esse perhibetur ad erugendam cutem & nemorum dolores, & contra noxia medicamenta.

**Βασίλειον** apud Hippocratem plerique interpretantur *πύρινος*.

**Βασίλειον** dicitur à quibusdam *αίανος*, vt habetur apud Dioscoridem.

**Βάσιον**. dicitur à Gal. mora *πύρινος*. Arthenaus vocat *βάσιον* fructus rubi, moro rubro, fragi similitudine, suauissimi gustus, quam vulgus Gallicum frambosiam vocat. dicitur & *πύρινος*.

**Βάσιον**. rubus. planta est vulgaris notitiæ, vt ait Dioscorides, & spinis horrens, sed multo maioribus quam rubus Idæus, qui etiam sine spinis inuenitur: cum tamen ambo eadem præstare videantur. Folia, germinas flos, fructus, & radix non obscure adstringunt, sed folia plurimum habet aquæ substantiæ, parum vero adstrictionis.

**Βάσιον**. ranunculus. herba est cuius multa produntur genera, de quibus apud rei herbariæ scriptores.

**Βάσιον**. gemma est cuius tres species produntur. prima ranæ colore ex quo nomen habet, secunda eboris, tertia quæ nigro rubet: quæ duz quamvis ranæ colorem non habent, tamen quia in eadem Copto, in qua

prima nascuntur, eodem cum prima nomine donatæ sunt.

**Βάσιον**. est tumor phlegmonodes partium quæ sub lingua sunt, sed maxime venarum, pueros præsertim infestans.

**Βάσιον**. hirudo, sanguifuga nomen est animalis. Sic etiam dicitur *βδελλίον* Helychio teste.

**Βάσιον**. arbor est nigra, oleæ magnitudine, folio roboris, fructu caprifici, nec insuauis. Manat ex ea humor eiusdem cum sua arbore nominis, cuius duo genera fecit Gal. Vñum Scythicum, alterum Arabicum. Scythicum nigrius resinoliusque, Arabicum translucidius & succiosius: esse autem debet amarum gustu, simile cere, vel taurino glutini, translucidum, interius pingue, si digitis subigatur, lentescens, humano vngui colore simile, sine ligno, sine sordibus, & cum incenditur, odoratum: id Arabicum dicitur. Alterum genus sordidum est, nigricans, gradioribus glebis, & conuolutum in ossas. id *αδύσενον* vocat, & aduehitur ex India. Vtrumque excoalfacit & vim habet, emolliendi duritias & discutiendi aquas atque aquosos ramices. Sed priuatim Arabicum vinas mouet & calculos frangit.

**Βάσιον**. est lapis qui *βέλιος*, id est sagittæ, effigiem repræsentat. eo hodie quidam pro lyncurio vtuntur. Similis est succino colore, & pellucet, & paleas aliasque res minutas tanquam succinum ad se allicit. Si ratur, candidus euadit, vel ex candido cinereus. Si confricetur, olet aliquando cornu bouis limatum aut vñum. Diuersa illi magnitudo est, sed vt plurimum quidem digiti longitudinem & crassitiem æquat. reperitur vero interdum sesquipedalis, brachii crassitudine. Omnibus figura est sagittæ ex ampla radice desinentis in tenuissimā aciem, atque in intimo corpore aurea quædam armatura interdum est in aliis aurem terra, aut arena, aut alius etiam lapis: quæ omnia in acutum æque atque *βέλιος*, ipse turbinata sūt. Verum lapis qui in eo est aurei coloris armatura rectus, plerumque constat ex crustis, tāquam membranis quibusdam, primo latis, mox magis atque magis strictis. Excoeat, sanat vulnera, frangit calculos.

**Βέλιος**, à quibusdam dicitur *δύλιος*, vt habetur apud Dioscoridem, quod tradant vulneratis capris mederi dicamnum, à pastu eius statim decidentibus telis, quasi telorum remedium.

**Βέλιος**. est procellus vnus ossis *βέλιος*, ab inferiori eius parte exorrens, solidus, oblongus, & subtilis instar styli, graphii vel acus, quem proinde toridem nominibus vereses appellantur. Sunt etiam qui à gallinæ calciaris similitudine *βέλιος* vocent.

**Βέλιος**. à quibusdam dicitur *δύλιος*, vt habetur apud Dioscoridem, quod & sagittarum & partuum remedium sit.

**Bonada** est ferramentum extrahendis telis accommodatum. quod Celsus lib. 7. ad auctoritatem Dioletem refert. Est autem lamina vel ferrea vel aenea, etiam ab altero capite duos utrinque deorsum conuersos uncas habens, & altero duplicata lateribus, leuiterque extrinseca in eam partem inclinata quae perforata est.

**Epispasius** est nomen *ἑπισπασίης*, hoc est, vnguenti sicci, ex pluribus aromatis compositi citraliquoris vilius admixtionem, cuius descriptio habetur apud Aetii libro vltimo, haud longe a fine.

**Epistemon** nitrum est tenuium partium, valens maxime ad vulnera nervorum.

**Erysipellus**. Est efflatio vehemens quae quicquid spirandi instrumentis molestum est, natura expellere conatur. Motus est deprauatus actionis animalis motricis, vt & sternutamentum, & pandiculario, & horror, torusque praeter naturam, ex eorum symptomatum genere in quibus causa aliqua quae praeter naturam est, ad tales actiones eam excitulat. Cuius tamen expellendi modus a reliquis diuersus est. Cum enim reliquae partes id quod noxium est sui contractione expellere conentur, aspera autem arteriae duriores sint quam vt contrahi constringique possint circa id quod intra se continet, natura spiritum concitato impetu foras excludit, quo ipse plurimus celestissimeque foras actus, vna quicquid est molestum propellat. Motus autem hic per eadem omnino instrumenta fit, per quae magna & vehementes etiam spiritus expulsionones, quas Graeci *ἐκφυσις* vocant, hoc est, efflationes: in quarum genere tussis est, vt quae non aliud sit quam vehemens efflatio sapienter reposita, si primo contra causa depulsa non est: siquidem pro eius magnitudine tussis vehemens aut exigua, frequentes aut raras mouentur. Excrementa namque crassa lentaque multum, aut valde tenuia & aquosa, quae ab ipso spiritu comprehendi nequeunt, difficilime tussiendo reiciuntur. Similiter calida atque frigida siue asperam arteriam mordeant, siue tantum obstruant, adhuc rodentes humores vel in ipsis arteriis collecti, vt in tabe, peripneumonia, pleuride: vel a capite defluentes, vt in catarrho. Cibum etiam & potus in asperam arteriam decerrans, atque morbi partium tum respirationi inferuentium, tum vna cum iis motarum, veluti diaphragmatis, iecinoris, lienis atque stomachi tumores magnam tussim inducunt, sicut & contrariis ordinem causae pauciores aut minores exiguae tussim, vel tantum *ἄπυον* mouent, velut & intemperies frigida in aequalis partium respirationi dicatarum, per quam nihil tussiendo expuitur, tussisque tantum exigua mouetur, vnde sola spiritus cohibitione (nisi admodum magna sit) supprimi curarique possit, aucto per eam calore, & spiritu cohibito in omnes etiam ar-

terissimos meatus subeunte, quibus duobus remediis ea interpres tollitur. Haec autem crassis creatum non ab similibus est. Per ea enim musculi thoracis, vt scribit Galenus, concutuntur, vt ea quae carnibus suis molesta sunt, in pulmonum arterias expellant, & ad horronis rigorisque genus pertinere videtur, nisi quod haec citius sentitur, ob motum peripneumoniae in strumensorum thoracis.

**Beryllus** herba cuiusdam nomen est, vt ait Heliodorus: forte ea quam officinae berulam appellant, quae propriis nominibus sion seu lauer dicitur, quae quibusdam *ἑρμύνης* modum superius. beryllus, gemma est ex puro liquidoque succo nata, translucida, colore viridi, sed multum diluto, vt aliquando altius coloris esse videatur: ex quo octo eius genera statuantur. Qui vere *superius* dicitur, viriditatem puri maris imitatur. proximus, electus fulgoris aureum vergit colorem, & *obliquus* nuncupatur. tertio loco est *hermaphroditus*, factus ex auro & porri succo nomine, pallidior superiore. quarto, *vanus*, quia colore similis sit hyacintho. quinto, *aspidochelone*, sextimo, *septimo*, *trachinus*: vltimo, *apollonius*. Sic dicti a coloris similitudine. Omnibus autem facile color hebescit ni turbidus & euandus percussu angulorum exoletetur. Quia de causa sexangulam figuram illis dant artifices, atque cylindros ex iis faciunt magis quam gemmas. Sed & ipse cylindri modo teres nascitur.

**Bisyllus** est nomen medicamenti ophthalmici siue collyrii, quo Beryllus quidam ad mazimas epiphoras utebatur, quodque describitur Galeno lib. 4. *de catarrhis*. Est & pappi nomen ad dysentericos perutilis, quod habetur lib. 9. *de morbis*.

**Bisyllus** dicitur a Syria mira syluestris, quam alii etiam *appara*, Cappadoces *μύρα* appellant, propter quandam quam habet cum *μύρα* similitudinem, utraque enim radicem habet nigram & florem lacteum. Secundum Asclepiadem: cuius verba Galenus citat lib. 9. *de morbis*: *Bisyllus* est semen rutae syluestris, quae in Syria nascitur, & vernaculo nomine ab illis *appara* appellatur. Calefacit tertio gradu, tenuis substantiae est, discutit & vnam promouet. Apud Dioscor. legitur *οὐβισύλλος*, auctori alicui *βύσσαν* *βύσσαν* quae est ex Bessia in Thracia, apud Hippocratem *μύρα* *μύρα*.

**Bisyllus** Est medicamentorum genus ad leniendam & sedandam tussim praeparatum, nec tussim tamen tantum conducens, sed iis etiam qui sanguinem reiciunt, & qui praeterea in tabem inciderunt, quique thoracis pulmone, aspera arteria aut alia quadam parte interna laborant. Pro diuersitate autem affectionum, varia materia constans, alias quidem styrace & croco, quae concoquendi vim habet, alias vero alais, interdum calefacientibus, aliquando cum exigua adstrictione aromaticis, & siccantibus, aliquando seminibus quae nobis in frequenti usu sunt,

sunt, ut anisi, apii, feniculi, dauci, feseleos, ex quibus non modo obtunditur medicamentorum vehementia & ingratus sapor, verum vrinæ etiam commouentur: aliquando vero alperitates delinientibus, ut tragacantha, radice dulci, & dulci vino. Saepem etiam *rapontia*, hoc est stupefacientia, remiscuntur, quæ tabidis commodissime possunt exhiberi. Verum facultatem illam stupefacientem exiguam prorsus in his esse oportet, nec tantam quidem quanta in colicis medicamentis habetur. In his enim vehemens esse & exuperare solet, eamque inducit refrigerantium medicamentorum copia, cuiusmodi est semē hyoscyami, & cicuta, succus papaueris & cortex mandragoræ: ac tantam quidem adhibere propter colici doloris magnitudinem necesse est. Quæ ferè sola in re *παραχρησάμενοι ἰσθὺς κωλύουσιν*, hoc est, bechica ab iis quæ proprie colica dicuntur, videntur discrepare.

*Βρύσην*. russilago. folia illi sunt maiuscula quam hederæ, sex aut septem à radice, subalbida à tota, superne virentia, in plures angulos excurrentia: caulis palmum altus, flos luteus, vere prodit, quo vna cum caule confestim exiit. Inde nonnulli his vacare existimant. Radix tenuis est, nascitur in amœnis & riguis. Est modice acris, ut sine molestia noxaque omnes thoracis abscessus credatur rumpere. Nomen illi inde datum est quod russini sedet. Dicitur & alio nomine *μαμαλευν*, dicitur & à quibusdam hoc nomine *ἰελασπράκος*, id est, saluia, sicut habetur apud Dioscoridem.

*Βίαιον*. est species vini salsi siue marini apud Græcos clarissimi, & ad plurimos valetudinum usus excogitati. fiebat hūc in modum: vix paulum ante maturitatem decerpit, siccabantur in sole, ter die versatæ per triiduum, quarto exprimebantur, deinde cadis sole inueterabantur, aqua demum marina largior miscebatur. Hoc vini nomen etiam si Dioscorides in marinorum vinorum confectioe omisit, non tamen rationem eius conficiendi videtur neglexisse, scribens aliquos sic vina falsa comparare, ut passas prius vvas in doliis aqua marina maceant, mox calcaras exprimant. quod vini genus passii generibus magis adscribendum censet.

*Βιδνός*. nomen est emplastri ad hydropem efficacis, cuius descriptio habetur apud Galenum lib. 9. *τῆς βιδνός*.

*Βιδνός* etiam dicitur pastillus quidam descriptus ab Aetio lib. 14. & à Paulo lib. 7. Valet ad vlcera contumacia, ut legitur apud Galenum libro nono De simplicium medicamentorum facult.

*Βλεβίσι*. humidæ & muscosæ apud Hippocratem.

*Βλαβός*. blæsus, varus, valgus. Sic à plærisque vocatur cui membra resoluta sunt, hoc est, *σθενέλιος*. Dicitur & cui lingua impedita est, & literam aliquam exprimere non po-

test, qui proprie *σθενέλιος*, id est balbus, appellatur. Refertur etiam ad alia membra, ut manus, pedes, brachia, ut qui gressum habet manciū vel deprauatum, cuique suræ sunt in diuersum actæ, qui proprie à Latinis valgus & varus nuncupatur. Quod vini genus Alexand. Aphrod. in prolex imbecillitate fieri scribit. Quum enim, inquit, eorum partes inferiores nequeant sustinere superiores, facile peruertuntur, indeque vitium, quod pedum blæsitatem vocamus, prouenit. Ei opponitur *ὁ παλός*.

*Βλαβέν*. *ἐλγισσέν*. vilipendere, contemnere, apud Hippocratem.

*Βλαβία*. mucus, frigidus humidusque succus: quem omnes homines *φλέγμα* vocant, ut scribit Gal. lib. 2. de facult. natur. Sic Hippocratiorem pituitam vocare consuevit, qualis è cerebro per palatum & nares descendit. Dicitur alio nomine *μύξα*, de qua vide suo loco.

*Βλέφαρ*. palpebræ, genæ Plinio. Sunt partes membranosæ, pilis ornatæ, supra infraque oculos ambientes & claudentes. Hæ cum duæ in utroque oculo habeantur, inferior & superior, sibi tamen coniunctæ sunt & continuæ, & ab vno principio proficiuntur, scilicet à membrana caluariam succingente: nec tamen hac simplici membrana constant, sed præterea cute atque cartilagine quæ *ταρσός* dicitur, non modo simul vnitæ, sed cum alba etiam oculi tunica. Palpebra inferior immobilis est, superior sola attollitur & demittitur, idque duorum obliquorum musculorum beneficio, quorum vnus à nasi finibus oritur, & in dimidiam cartilaginis eius quam *ταρσόν* diximus vocari, partem sibi propinquam inseritur. Hic palpebram sursum mouet, alter vero, ei oppositus totum minorem oculi angulum complectitur, quodammodo factus semicircularis. Oritur namque à medio inferioris palpebræ, & per minorem oculi angulum circumductus, superiorem palpebram petit, inque reliquam tarsi dimidiam partem implantatur. Is deorsum palpebram trahit. Sic quidem Gal. visum fuit ad finem lib. 1. o. de visu partium, quamquam idem in initio lib. 3. de locis affect. videatur sentire geminis musculis palpebram descendere, oculumque claudi, & ab alio quem ipse non describit (is forte à musculo cute frontis & supercilliorum nascitur) sursum attolli. Cæterum palpebra utraque pilos habet oris extremis insertos, & sibi semper æquales, quod cartilagini inserti sunt, à qua non potest copiosum alimentum eorum incremento suppeditari. faciuntque non modo ad ornatum, sed etiam ad securitatem: *φλεφαείδες* & cilia appellantur. Dicitur *βλέφαρον* *ὡς τὸ φάρος ἐστὶ βλεφός*, hoc est, quod oculi sit indumentum: unde poeta quidam Græcus non illepide *ἑμμετρίων* appellauit, perinde ac si oculi folium diceret. Cicero lib. 2. de natura deorum palpebras tegumēta oculorum vocauit.

**Βαρεαίδη.** cilia. Celsus non aliter quam pilos palpebrarum dicit. Plinius etiam palpebras vocat. Sunt pilī ad extremum vtriusque palpebræ ambitum siti. vide supra *φάρα-*

**Βαρεαίδη.** instrumentum chirurgicum radēdis, vellendis, concinnandisque palpebris aptum.

**Βαρεαίδη.** filix. Refertur à Nicandro in Theriacis inter remedia quæ suffitu serpentes abigunt. Græcus scholiastes *βλέφαρον*, hoc est filicē, interpretatur, quam alio etiā nomine *βλάχον* appellant. Nicander autem *παιλαχιδόν* vocat, hoc est, multifidam, quod etiam vrticæ conuenit.

**Βαρεαίδη.** legūminis quoddam genus apud Hippocratem. quod & *βλαχών* scribitur, teste Galeno.

**Βαρεαίδη.** à quibusdam dicitur *βλάχον*, vt habetur apud Dioscoridē.

**Βαρεαίδη.** *ἐν ἡπείρῳ πυρετός.* pusilla sicca febris. Est differentia febris apud Hippocr. lib. 6. *ἡ ὀνείδη*, opposita *τῇ ἀνδραχμῇ πυρετῇ*, hoc est ardenti febrī, cum ad manum quidem calor debilis est & pusillus, penitusque lentus, vt in hepialis febribus & diariis multis & plurimis pestilentibus, intus tamen plurima apparet siccitas ex linguæ scabritie, siti magna, inquietudine totius corporis, vigiliis & reliquis symptomatis, febris malignitatem indicantibus, quibus hoc febrium genus à mitibus differt quas Hippocr. *ἡπείρας* & *εὐνίχους* appellare consuevit. Itaque apud Hippocratem meo quidem iudicio, tum lib. 6. *ἡ ὀνείδη*, tum lib. 1. de diff. febr. cap. 1. debet legi *βλαχός-ἐν ἡπείρῳ* coniunctim, hyphen, vt his duobus nominibus vnum febrium, quod modo exposuimus, genus designetur.

**Βαρεαίδη.** sic à nonnullis dicitur *βλάχον*, hoc est, pulegium, quoniam pecus eo dum florer gestato, balatu compleatur.

**Βαρεαίδη.** blitum. Est olus radice contra cæterorū fere olerum morem multiplici, proluxa, nec in rectum tendente, betaceis foliis, sine acrimonia fatiuis, semine corticeo, racematim singulis ramis infidente. Ad id proxime accedit quod rubens olus, vel poretta rubens dicitur. Est fere qualitas expers, lentam, humidum & aquosius reliquis oleribus, & in medio boni malique succi.

**Βαρεαίδη.** idem quod *βόφθαλμος* apud Hippocratem, quod & alio nomine *χρυσοθαλμος* appellatur.

**Βαρεαίδη.** Est vlcus corneæ tunicæ cæuum, angustum, purum, puncturæ rotundæ simile. Sic dictum est à cavitare, quasi fossula. *βόθος* enim foueam significat. Differt *ἀπὸ τοῦ καυώματος*, quod hoc amplius & rotundius sit *βοθρίο*, sed minus profundum. Est & *βόθος*, auctore Galeno, cuiusq; dentis alucolus & cavitās.

**Βαρεαίδη.** Est genus quoddam parnorum polyporum, apud Hippocratem, quod & *βόμ-*

*κόλον* à multis vocatur.

**Βαρεαίδη.** bulbus. Notior visus est Dioscoridi quā vt debuerit depingi. Est autē capite ex pluribus nucleis coagmetato, vertice fibris cristato, ceruice tenui, tota radice corticosa, foris squarosis membranarum tunicata, fronde cepitia, terete, inani, angusta, in mucronem desinente, cauliculo dodrantali, in cuius fastigio flos emicat purpureus. Cephæ modo tunicati sunt bulbi, cumque iis capilli velluntur, aut cum vertex præciditur, non nihil lactis remittunt. Hi quod appetentiam excitent, appetitus à rusticis appellantur. Prouocant quoque & semen & venerem. Sunt namq; acres, & crassum succum statumque generant.

**Βαρεαίδη.** appellant quidam *βόθων*, sicut habetur apud Dioscoridē.

**Βαρεαίδη.** est status ab intestinis crassis etumpens cum sonitu quodam humoris. Cum enim humor intra intestina continetur, cuius expulsionem natura molitur, huiusmodi murmur editur, ex quo flatum in humore versari facile queat intelligi. Flatus namque siccior cum sono prodians, *βόμος* nuncupatur. Galen. comment. aphor. 73. libr. 4. definit *βόφορρυμνόν*, sonitum spiritus qui nec magnus sit nec multus, sed cum modica quadam humiditate deorsum descendit.

**Βαρεαίδη.** Boreas. Aquilo. Est ventus, inquit Hippocratem, ab Vrsis & Riphæis montibus spirans, frigidus, siccus, serenus, minimeque putrefaciens. Hippocrati ad stipulatur Aristot. lib. de mundo, scribens ventos qui ab Vrsa spirant, *Βορέας* appellari. Galenus vero Boream vñā cum Euro & Subsolano ab ortu flare scribit lib. 3. meth. med. Tabias describens. Ortum autem intelligere oportet æstiuum.

**Βαρεαίδη.** Picis sicca alterum genus, quod vilci modo lentum est.

**Βαρεαίδη.** apud Hippocratem *αἰτὴν τῆς βάραντος* *ἡ δὲ τῆς βόλης πρὸς τὴν ἔχνην* id est, quod vocem asperam habeat.

**Βαρεαίδη.** sic dicitur à quibusdam *ἀσπιδόλας* lapidis.

**Βαρεαίδη.** Emplastri nomen est cuius nomen eminit Paulus lib. 4. cap. 22. Describitur autem apud eundem lib. 7. cap. 17.

**Βαρεαίδη.** *καδμύα.* Species est cadmeæ vitæ, quæ in editioribus domorum, in quibus vritur, partibus colligitur. Nam quæ in inferioribus legitur, *καδμύα* vocatur. Illa partium est tenuiorum, hæc vero crassiorum. vide *καδμύα*.

**Βαρεαίδη.** herba est fruticosa, lutea tota, & in multas alas sparsa. semen circa totos ramulos prouenit. folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat: qua re vestimentis interponitur. A Cappadocibus *ἀμυρῶν* vocari auctor est Dioscorides, forte quod florem emittat odore suauis & vinoso. Vocari etiam ab iisdem *ἀρταμῶν* docet.



**Bubalus** eius agnos. hoc est, cucumis sylvestris, siue anguinus, apud Hippocratem atque Dioscoridem.

**Bubastus** eius, vlcus prae humidum, quod pueris maxime in superficie oritur, vt scribit Aetius lib. 4. cap. 21.

**Bubon**, inguen, sunt qui definiant esse femoris cum ischio innecturam, alii, esse locum ad latera pubis, vbi femur & coxendix coeunt: alii vero, esse glandulas in inguinibus vtroque bique sitas: hac enim magna vena arteriaque cum ferantur in crura, earum securitati natura protidens multas ibi magnasque glandulas inseruit, quae essent eius diuisionis stabilimentum & aduersus, externas iniurias operimentum. Cum autem glandulae omnes propter sui imbecillitatem omnium maxime opportuna sint fluxionibus, potissimum tamen illae quae sitae sunt ad inguina, quod praeter naturam imbecillitatem accedat etiam motus huius partis, in qua sitae sunt, vehemens, situs declinatus, & redundans iis in partibus semper humiditas, quorum occasione promptae incurrunt in tumores, quos eodem cum ipsa parte nomine *βυβωνας* nuncupant. Quod nomen quanquam proprie iis quadrat qui in inguinibus consistunt, vsurpatur tamen etiam in iis, qui in alia quauis parte corporis oriuntur, vt in axillis & collo. Tumores autem quibus ea laborant, multiplices sunt, omnes tamen propemodum *φλεγμονώδεις*. Fiunt omnes summis duabus de causis, vna quidem euidente & externa, altero vero interna. Causa euidentis est vlcus & contusio, quorum alterum si caput perpersum fuerit, bubonem in collo creat: si manus aut brachium, in axilla: quemadmodum si pes dolore tentatur, in inguine eum concitat, quod sanguinem vna cum spiritu ad partem affectam transmissum à natura, vel praeter dolore ab ea attractum glandulae in diuisionibus magnorum vaforum iis in locis collocatae intercipient & combibant, itaque in tumorem attollantur. Verum eiusmodi bubones magna ex parte innoxii sunt, febresque non alias excitant quam diarias. Causa autem bubonum interna & laras est vel viscerum interiorum prauus quidam affectus, vel magna, venenata, pestilensque putredo, vnde perniciosi quoque bubones oriuntur, in quorum genere & à venere natos colloco, à quibus non diaria, sed saepe febris putrida malignaque gignitur.

**Bubonem**, sic dictus est à quibusdam *ὁ ὅσπρ ἀπὸ τῶν* itemque herba quaedam in vepribus, vt ait Plinius, passim nascens, quam vt profit inguinibus, in manu tantum habendam esse scribit. Ob id à Latinis tum alter Articus, tum herba inguinalis vocatur, quod non modo illi sed contactu etiam bubonibus vtrumque auxilio esse credatur.

**Bubonem**, inguinis ramex. Est prolapsus intestini vel omenti in inguen, sic tamen vt in ipso inguine consistat, nec descēdat in scro-

tum, vt scribit Paulus lib. 3. cap. 13. Morbi generis est in vitiosa partium conformatione: si rupto aut extenso peritonæo.

**Buglossum**, lingua bonis. Est herba verbasco similis, foliis in terram sparsis, nigrioribus, asperis, bubulas imitantibus linguas flore caruleo, specioso, caule pedali, ramoso. Officinis dicitur borago. Calida est & humida, & in vinis iniecta latitiae atque hilaritatis causa esse creditur. Fit *βυγλάσιον* emplastrum ad multa vtile Pollete auctore, quod ab Aetio describitur lib. 15.

**Buccella**, Est medicamentum in panis formam concinnatum, purgandi vim habens. Id Paulus ita describit: Scammoniae tostae uncia, piperis, seminis apii, singulorum scrupulum vnum, foeniculi, anisi, singulorum uncia vna, mellis libra vna. Torrentur mediocriter, & pondere unciae dantur in condito. Aetius vero lib. 3. cap. 100. scammoniam cum iis quae vitium eius emendant, cumque fermento coquit in clibano & artifices efficit, bilem sine molestia purgantes. Ratio quae Paulus eos parat, non videtur valde diuersa ab electuariis solidis quae vulgo apud pharmacopolas nostros apparantur, purgandi vim habentia, vt quod diacarthamum & diaphenicon appellatur. Est autem *βυκελλά* vox barbara, & recentioribus tantum Graecis vsurpata, quidam Latine buccellam purgatoriam reddiderunt, quod videatur dici *δὲ τὸ ἐκ τῆς βύβωνος*.

**Bucera**, dicitur Hippocrati & Theophrasto foenum Graecum, quanquam hac voce etiam anagallidem aliquos appellasse Gal. in interpretatione vocum Hippocratis auctor est.

**Bucera**, dicitur à quibusdam *ἡ ἀμύγδαλος μέλαινα*, hoc est vitis nigra, auctore Dioscoride: scribit autem Gal. etiam *τὸ ἀντίρρυν* sic appellari.

**Bucera**, idem quod *ἡ πολεμίδα*.

**Bucera**, est ingens fames à vehementi refrigeratione oris ventriculi contracta. Famem quidem ingentem esse, ipsa nominis ratio ostendit. Eam autem inducit indigentia quaedam in ore ventriculi percepta, quam vehemens eius refrigeratio excitaui. Perseuerat quidem toto morbi spatio ea refrigeratio, quae sicut initio famem inducit, ita non multo postea ciborum fastidium summamque inappetentiam gignit, cum tanta stomachi imbecillitate, vt animi defectus viriumque exolutiones tam crebro incidant, vt merito affectionem istam definire possis, esse exolutionem oris ventriculi ab eius refrigeratione, indigentia, & imbecillitate profecta. Symptoma est male affecti oris ventriculi, quo primum quidem agri expleri cibis nequeunt, paulo vero postea destituuntur prorsus appetentia, animo linquuntur, viribus deficiunt, exoluuntur, decolores sunt, torquentur stomacho, refrigerantur corde

& extremis partibus pulsusque habent admodum obituros. Causa huius fere sola est frigus externum, à quo tantopere refrigeratur os ventriculi, vt ea quæ diximus symptomata consequantur. Ex quibus apparet, & *bulimus* proprie nō esse id quod nomen ipsum sonat, ingentem scilicet famem, quæ quamuis principio fuerit, paulo tamen postea nulla prorsus est, & in totum, languente nimium ventriculo, & pene extincto eius calore, aboletur. In eo namque differt *bulimus* à canina appetentia, quod in canina appetentia cibus perpetuo appetitur, nec vnquam ventriculus expleri potest. Quamquam & aliis quibusdam inter se distinguantur, maxime quod Gal. auctore comment. aphor. 1. libr. 2. *bulimus* magis specialis particularisque sit, canina autem appetentia generalior sit, siue vniuersalior. Quod non est ita accipiendum, quasi de genere proprie dicto à logicis, & specie illi subiecta dictum sit, vt cum animal hominē vniuersalius dicitur, sed quod bulimi causæ possint caninā etiā appetentiam mouere, cum ē contrario causæ appetentiæ caninæ non sint etiā causæ bulimi. Siquidem bulimi vna tantum causa proditur, frigus nempe externum famē ingentem adferens: canina vero appetentia, non ab eo modo frigore, sed ab acido etiā humore impacto ori ventriculi gignitur. Itaque illum aphor. Hippocratis si quis de bulimo tantum intelligat, videbitur Hippocrates id tantum dicere, quod meri pōio intemperiem frigidam (à qua bulimus nascitur) persanet, cum non eam modo, sed humoris etiā acidi in os ventriculi affluxum curet, à quibus duobus canina inducitur appetentia. Præterea vero inter se differūt quod in appetitu canino propter insatiabilem ingluuiem vomitiones perpetuæ infestent, bulimus autem sine vomitu sit.

*Bouia* *ἢ βούιον*. est napi altera species, olim omnibus, nūc paucis nota. Eius radix dicitur in altum valde crescere, & in rotundum extuberare: vnde nomen Græci indiderunt, qui *βούιον* appellat colles & loca verrucosa. Vim habet aduersus venena, vnde & Theriacæ admiscetur. Apud Athenæum non aliud est quam rapum masculum, quod alii *πάσιον*, alii *πάσιον* vocant.

*Bouion*. sic à quibusdam vocatum fuisse. *ἢ βούιον*. Dioscorides auctor est.

*Buprestis*. est olus sponte nascens, caule cubitali, foliis multis longisq; muscario anethi.

*Buprestis*, buprestis. Est animal quoddam cantharidi & specie & virib' ad simile, vt ait Gal. vel, vt Plinius, scarabæo longipedi. Nicander quoque & Dioscorides buprestidē manifeste inter animalia recensent. Plinius tamen Dioscoridis opinor vt videre est apud Gal. lib. de vōcum Hippocr. interpretatione) auctoritatem sequutus, alterius buprestidis mentionem facit, quam & oleris genus dicit & boum venenum appellat, scri-

bitque ea degustata boues dissilire, & à ventribus contra eam remedia, tanquam contra venenum, prodita fuisse: tribuens huic suo oleri eadem omnino quæ veteres Græci animali. Idem scripsit & etymologici auctor, nisi quod in hoc nomine *βούιον* non animalis speciem, sed magnitudinem significare arbitratur. dicitur enim *βούιον* & *βούιον*, quod & inflammare & inflare significat. Plinius hoc verbum in buprestide accipit pro inflammare, scribens aperte buprestidem haustam ita inflammare vt rumpar, nisi, vt opinor, mendosus sit codex, & legendum sit, ita inflat vt rumpar. Siquidem non inflammationi, sed potius inflationi succedit ruptio, & Dioscorides magnos tumores à buprestide, non autem inflammationes scribit excitari. Cæterum de hoc veneni genere vide Nicandrum in Alexipharmacis, & quæ de eo ibi annotauimus.

*Buprestis*, vnum genus est *ἢ βούιον*, differens breuitate caulis à satiuo & radice colore rufo.

*Buprestis*. dicuntur grandiores & fatuæ ficus, quas nostri mariscas ficus appellant.

*Buprestis*. est frutex palustris, caule admodum laui folio arundinis, angulari, fructu nigro, mali amplitudine, sexu duplici. sic forte dictus est quod cōmōdissime secetur boum pabulo. Herbarii & officinæ vocat iuncum cabacinum, propterea quod ad vitium nexu utilis sit.

*Butyrum*. butyrum. Est lactis substantia pinguis, ab ipso multa agitatione secreta. Sunt qui definiant non substantiam quidem pinguem lactis, sed id esse quod ex pingui lactis substantia cōfiscitur. Attamen retiera butyrum est ipsum pingue lactis, cui non aliud quicquam additū sit, sed sola præparatione, hoc est, agitatione, à lacte secretum. Posteaquam enim lac diutissime agitātū est, quicquid in eo pingue cōtinetur, id supernatat, deinde colligitur, abluirur, reponitur. Itaque optimum butyrum est pinguisimum, quale ex lacte bubulo copiosissimum elicatur, ex quo *ἢ βούιον* nomen habet: sic enim dicitur non hoc tantum, sed omne etiā quod ex quocunque lacte manat. Dioscorides ex uillo probatissimum fieri scribit: quod sibi mirum esse Galenus prodidit, existimans ē bubulo cōfici longe præstantius, vt nomē omni butyro dare meruerit. Butyrum recēs quidem vel maxime temperatum est: nam vetustate calidius & tenuius euadit. Vsum habet tum alimenti tum medicamenti. nā & olei vice obsoniis adhibetur: & concoquendi paulumque etiā digerēdi vim habet, proindeque lenit inflammationes, laxat, emollit, & dolores mitigat. Confert etiā promouendo ē pulmone spūto, siue solum, siue aliis mistum quæ pulmone laborantibus conueniunt.

*Boaria*. boaria, siue bouis oculus. Est herba cauliculis teneris ac subtenuibus, foliis fœniculi, floribus luteis maioribus quam antheridis, qui similes sint oculis, vt nomē ipsum

G 4

Hippocrates appellat. Vbi autem ea definit, alia duz cauitates à lateribus se ostendunt, quas anatomici *βασίλειαι*, peculiari nomine nuncuparunt. Hæ excipiunt cubiti apophyses *καρπιοειδείς*, anterior scilicet anteriorem cum cubitus inflectitur, posterior vero posteriore cum extenditur. Sic quidem habet brachii descriptio, quod à Galeno comment. 1. *εἰς τὸ ἀπὸ ἀρσπῶν* definitur esse pars manus inter duos articulos sita. duos autem articulos intelligi vult, & eum qui ad latum scapularum os, & eum qui ad cubitum est. Idem autem aliquando totum ipsum membrum à summo humeri articulo ad extremam usque manum, eodem nomine *βραχίονα* appellat, pariterque Celsus & Gaza brachium. Certe ab Aristotele *βραχίων* totum id membrum aperte vocatur, de hist. animal. lib. 1. cap. 15. Sunt autem & qui *βραχίονα* dici existiment ab Hippoc. medium os inter duos illos articulos: alii vero, ut annotat Galen. comment. 2. *εἰς τὸ ἀπὸ διγύφης*, non os ipsum, sed totam eam partem, quæ inter duos illos continetur articulos, quod consueuerint omnes homines ita loqui. Ille in capite plagam accepit, ille in brachio vel in cruribus, cum tamen os non sit læsum, sed vel nervus vel musculus, vel vena vel arteria, vel forte sola cutis. Vide *κεφαλὴ*.

*Βρεῖμα* synciput. Est pars anterior capitis supra frontem sita, & à lateribus ad tempora usque protensa. Ea constar duobus ossibus prope modum quadratis, quorum vnum dextrum, alterum sinistrum est. Ambo autem parte quidē posteriore, lateribus futura *λαμβδωδὴ*, anteriore vero futura coronali, à lateribus *μεσοκολλημασι*, siue. futuris *λεπιδωδεῖσι*, superiore denique ea futura terminantur quæ utriusque communis est, & secundum longitudinem capitis recta procedit, *δελαιαν* nominant. constant, ut & reliqua fere omnia cranij ossa, duabus squamis, inter quas valde fistulosa raraque apparent, nisi quæ temporum ossibus coniunguntur: hic enim tenuissima quidem sunt, sed solida & minime fistulosa. Nec frustra quidem ossa huiusmodi natura machinata est, quod toto vitæ decursu tenuia & halituosa cerebri excrementa maxime per synciput diffilari oportebat. Est enim cerebrum ea cranij parte quam reliquis copiosius. Sunt qui *βρεῖμα* ἀπὸ τοῦ βρέχον dictum esse putent, quod hæc pars capitis humidissima mollissimaque sit, præsertim infantibus. Ex quo forte etiam obstetrices partem eam fontem capitis appellant.

*Βρετανικὴ*. britanica, siue betonica. herba est folio rumicis sylvestris sed nigriore & pilosiore. gustus adstringentis, caule non magno, radice breui, tenui. Sunt qui putent esse lapathum acutum, sunt qui bistortam vulgo nominant. Adstringendi & glutinandi vim habet.

*Βρέφος*. infans. sic dictus ἀπὸ τοῦ βρεῖος, id est quod egeat alimento.

*Βρέχων*, madescere. hoc est, extrema tantum su-

perficiē madescere, hanc etiam in alium humorem penetrare: ut auctor est Galen. libr.

9. de simpl. medic. *βρόγχια* significat apud Hippocr. ut lib. de morbis maiore, id quod cum tussi expuitur, & secretum eijcitur, & *βρόγχια* cum tussi expuere. quidam *βρόγχια*, sine *ρ* scribunt. Galen.

*Βεῖλα*. Cum Gal. Thraciam & Macedoniam peragraret, segetem multis in aruis offendit non spica modo, sed & culmo quoque toto triphæ simillimam, consulensque rusticos ac rogans, quodnam illi esset apud eos nomen, stirpem totam semenque *βείλας* vocari respondunt.

*Βρόγχα*. arteria cartilaginosa: apud Hippocr. *Βρόγχα* dicuntur asperæ arteriæ cartilaginee penne circulares in totum pulmonem diuisæ. Figuram ait Gal. 4. de locis affectis, literæ Creferunt. hæc cum in medio crassiores sunt, extremis partibus attenuantur, & tandem in membranam degenerant, qua parte cælophagum respiciunt eique incumbunt, eandemque constructionem per totum pulmonem sparsæ habent. membranas plures fortitæ sunt: vnam quidem propriam, quomodo & ossa omnia & præter eam alias duas, vnam internam, crassam & validam, sed tenuem, alteram externam, proprie membranæ pertinacissime connatam, quibus omnibus cartilagine illæ sibi inuicem connectuntur. Dictæ sunt *βρόγχα* diminutionis forma ἀπὸ τοῦ βρόγχου, quod asperam arteriam significat.

*Βρόγχιον*. est tumor magnus & rotundus in guttore, aut aspera arteria exortiens. Vtrumque enim *βρόγχος* significat. Est autem duplex eius differentia. nam vel adipe tumer, sicut *στάσιμα*, vel partium illarum dilatatione accidit, ut plerisque puerperis, cum propter vehemetissimos dolores spiritum violenter continuerint. Est vero hæc incurabilis, quemadmodum & quæ in scirrhum durata est.

*Βρόγχος*. dicta est à Rufo & plerisque medicis aspera arteria, propterea quod maxima ex parte cartilaginibus constet quæ *βρόγχα* appellantur. Gal. comment. 3. *εἰς τὸ ἀπὸ ἀρσπῶν* scripsit Hippoc. *βρόγχον* appellasse vel totam asperam arteriam, vel guttur duntaxat, nec tamen ipse definiuit vtrum appellarit. ex quo patet vtrumque eo nomine significari. Quod autem *βρόγχον καφαλὴν*, hoc est bronchi caput, aliquando dicitur, certum est ἀπὸ τοῦ λαρυγγος ἢ φάρυγγος dictum esse.

*Βρόμιον*. nomen est medicamenti acopi quod describitur à Paulo lib. 7. cap. 19. Describit & Aetius libr. 15. emplastra duo *βρόμια* vocata, emolliendi vi prædita.

*Βρόμος*. auena, vel potius auenæ species. herba est folio & stipula tritici geniculata, dependentibus in cacumine paruulis veluti locustis, quibus semen inclusum est, non ut *τῷ αἰγίω* deciduum, radice numerosa: tãquam sylvestre triticum est, inter vitia segetum. Est enim primum omnium frumētū vitium, &



& hordeum in eam degenerat, sic ut ipsa frumenti sit instar. Est autem *βρύων* aliena species, videturque nostra vulgaris esse aëna, iumentorum pabulo nobilis. Altera enim eius species *αίχμη* appellatur, festuca Latinis dicta & Gallis auron. *βρύων* semē inter legumina censetur Galeno, idque illitum deficcat & digerit mediocriter & sine morfu, temperiem autem habet paulo frigidiorē. Nonnihil etiam adstringit. Sunt qui scribant *βρύων* per *ω*.

*Βρύων*. sic dicitur à quibusdam *παιών*, siue sedum minus, auctore Dioscor.

*Βρυών*. stridor dentium, apud Hippocratem: & *βρύξ*, seu *βρύξ*, stridere dentibus.

*Βρύον* muscus. hoc est, substantia quædam capillata, villosa, viridis, germinationis modo circa cortices arborum concrescens. Laudatur maxime qui in cedro, deinde qui in populo alba & quercu provenit, præsertim qui odorator est. Alio nomine *αδάρχων* vocari Dioscorides auctor est. Habet vim adstringendi.

*Βρύον θαλάσσιον*. alga, siue muscus marinus. Est marina herba in lapidibus & testaceis nascens lactucæ folijs, rugosa, veluti contracta, sine caule ab ima radice excurrentibus folijs. Præcipua eius pissandi siccandique vis.

*Βρύον* etiam dicitur herba alia, quam Latini lupum salictarium, officinæ lupulum appellant, forte quod huic herbæ folia sint bryoniæ similia.

*Βρύον* etiam dicitur à quibusdā *λεχών* herba, quæ super saxa nascitur & corulenti petris adhærescit.

*Βρύον* quoque dicitur vva, hoc est fructus populi albæ, ex quo populneum vnguentum conficitur.

*Βρύον* etiam dicitur à Democrito *ήκοντις*, sicut habetur apud Dioscor.

*Βρύον*. vuc. *αίχμη*. Sunt qui alij genus esse putent, auctore Hesychio.

*Βρύον*. est potionis genus ex hordeo, quod Ari-

stoteles *πύον* vocavit. Eo qui temulentus fuit, non in omnem partem, inquit, coarctat, ut cæteri, sed retrorsum duntaxat & supina. Hellanicus ex obriza *βρύον* fieri cōmemorat. sit & ex milio, ut Athenæus auctor est.

*Βρυών*. id dicitur (inquit Galenus lib. 3. meth. med.) quod molle nimium est, & algæ, quæ *βρύον* dicitur, ritu fragile. Sic quidem Linæus interpretatus est. quanquam fragile dici non debuit, quod musci siue algæ mollis & cedentis proprium non sit frangi, sed potius algæ ritu cedens. Nam & huic Galenus eo loco durum & premens opponit.

*Βρυονία*. bryonia. Est quæ alio nomine *ἀμπλοκύνη*, hoc est vitis alba, dicitur, siue *ψιλάδρον*, ut ait Galenus lib. 6. simplicium medic. Inde factum est ut & bryonia nigra dicatur vitis nigra, apud Dioscoridem.


*Βρυονία αίχμη*. dicitur à quibusdam *ή χαμαίπτης*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Βύζιον*. *αδάρχων* ή *πικρὸν*, apud Hippocratem.

*Βαύον*. est hordeum madefactum quod germen emisit, & deinde vna cum enatis ligulis tostum est, ut scripsit Aetius lib. 10. cap. 29. Ex quo apparet *βυάλον* id esse aut non longe diuersum ab eo potionis genere quod *zythū* & vulgo bieram appellant.

*Βύσσος*. byssus. Est lini genus tenuissimum & nobilissimum, nascens in India & Ægypto, ex quo pretiosissimæ vestes olim contexebantur.

*Βολίς*. boletus. fungi genus est sic dictum vel quod connolatum sit & quasi glebosum (voluam enim, ut scribit Plinius, terra prius gignit, ipsum postea in voluæ, seu in ovo est luteum) vel à colore *βώλου*, hoc est, rubricæ illius qua pictores aurum operibus suis inducunt. Huic Paulus primum bonitatis locum inter fungos assignat, quod ab eo solo nemo adhuc dicatur interiisse, quemadmodum Galenus scribit lib. *περὶ τοῦ χυμῶος*. succum tamen gignit pituitosam & frigidum, à quo periculosa multa symptomata possunt excitari. Vide *μύκκης*.





# I O. G O R R A E I

## P A R I S I E N S I S

### Definitionum medicarum

#### T O I.



**Agria.** species est myrrhæ, pinguißima, læto & pingui solo nascens, quæ copiosam sudat stacten: authore Dioscoride.

**Gagates.** Est lapis ex liquido bitumine, vel ex succo pingui & bituminoso concretus, qui igni admotus, ardet atque bituminis odorem reddit. Sunt autem qui dicant nihil aliud esse quam bitumen durum & politum, niger est plerumque & squalidus: crustosus, per quam levis. vim habet emolliendi & discutiendi. trahit ad se paleas, pilos, festucas veluti succinum. Dioscorides author est eum nasci in Lycia (male enim pro Lycia Ciliciam vertit Ruellius) quæ influens aranis in mare effunditur proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur, atque inde nomen habere. Namque & locus & amnis in cuius faucibus inuenitur, Gagas vocatur. Quem fluuium quamuis Galenus nauicula vectus, tota Lyciæ ora, perlustratâ studio rerum quæ illic nascerentur cognoscendarum scribit lib. 9. simplicium medicamentorum se non vidisse (id quod Ruellio forte Ciliciam pro Lycia reddendi occasionem dedit) tamen Gagam oppidum in Lycia fuisse scriptores memoriz prodiderunt, idque Alexandrum in primo rerum Lyciacarum libro, antiquum murum vocasse Stephanus author est: quare simul cum deserto oppido paruus amnis nomen mutasse potuit. Plinius etiam in oppidis Lyciæ numerat Gagen. Quod oppidum quoniam, vt scribit Nicantri interpres, Gange & Gangis vocabatur, Gagatem ipse Nicader in theriacis *ἡ γὰρ ἡδὲ τὸ πλεον*, & Strabo Gangitum appellauit. Idem vero etiam Obsidianus lapis vocatur, quod in Æthiopia inuentus sit ab Obsidio, ex quo fiunt gemmæ quæ Obsidianæ nominantur. Gallico vocabulo getz dicitur.

**Γαγγαρόν.** sic à plerisque appellatum est omentum, quia propter varium venarum atque artieriarum textum, reti quod Græce γαγγαρόν dicitur, simile videatur. Aliis autem qui circa vmbilicum cernitur, quasi neruorum quidam contextus γαγγαρόν vocatur.

**Γαγγίς.** idem quod γαγγατός. de quo supra. Est & cognomen cuiusdam generis nardi Indiciæ sic dictæ à Gange fluuiio circa quem nascitur, quæ etiam γαγγίς appellatur, de qua vide in dictione γαγγίς.

**Γαγγίς.** est nerui nodosa & renitens contractio nullo præter naturam colore, doloris expers. In multis corporis partibus accidere potest, sed in manibus & talis frequenter. rarius in cubito & capite oritur. His fere notis deprehenditur: tumor est paruus, inæqualis, nullo præter naturam colore dolorisque expers, nisi valide comprimatur. Verum ne tum quidem vehemens, sed stupidus dolor mouetur. Plerumque ex plaga, aut lassitudine, raro sponte prouenit, nec in alto, sed sub cute radices agit, neque in orbem vel ad anteriora posterioraque transferri potest, sicut melicerides & atheromata, sed si vim facias, ad latera tantum, hoc est, ad dextram vel sinistram pro nerui situ, moueri & flecti potest.

**Γαγγάνα.** est partis alicuius mortificatio & extinctio proueniens à magnitudine inflammationis quæ neque digeri, neque in pus mutari potuit, sibi que coniunctas partes in affectionis consortium pertrahens, nec ab ossibus quidem abstinens, quæ vitioso humore perfusa imbutaque, quo caro circumposita mader, putrescunt emoriunturque. Non est autem γαγγάνα perfecta *νέκρωσις*, sed adhuc fit, sic tamē vt nisi opportune succurratur, non modo pars ipsa quæ laborat, sed & aliz vicinæ partes, ipseque totus homo denique intereat. Cum vero sensum affectæ partes

partes penitus amiserunt, iam non *γάργαρα*, sed *σπέρμα* appellatur. Est enim per gangrenam via ad sphacelum, qui perfecta *νεκrosis* est. Verum, ut ait Gal. comment. 4. *αὐτὸς τὸ σπέρμα*, abutimur interdum vicinorum affectuum nominibus ad eos significandos ad quos proxime accedunt, quanquam nondum ex toto ipsorum speciem & naturam habeant. Sic namque & Hippoc. ingentem inflammationem cum non amplius suum colorem teneat, dolorique est, interdum *γάργαρα* appellavit. Sic videtur *γάργαρα* *σπέρμα* dixisse lib. de fract. cum propter inflammationis magnitudinem videntur venae liquentes & nigrae propter contentum in ijs sanguinem. quo tamen loco Galen. *νεκrosis* interpretatur.

*Γαδύρι*: est lapis de genere Acetatorum, etiam si Dioscor. *αὐτὸν ἀπὸ τοῦ γαδύριος* separatim describit. Terram intra se completur, ut plurimum quidem candidam, sed aliquando pallidam, aliquando luteam, solaque figura *αὐτὸν* *βενερίνῳ* differt: hic enim instar sagittae oblongus est, *γαδύρι* vero rotundus. Muscus qui ei adhærescit, olet violam. Hic lapis adstringit, siccatur, caligines oculorum discutit, & illitus ex aqua testium mammarumque inflammationes sedat.

*Γάλα*, lac. Est benignum corporis excrementum, sanguine rubro in cadidum mutato in mammis redundans ad foetus nutrimentum. Sanguis enim in foemina quidem superflues & inutilis, nec tamen alia re quam copia molestus, deponitur apud mammas tum pervenas quæ ab utero ascendunt, tum per eas quæ a propagibus venæ causæ descendunt, ubi vi mammarum & glândularum in album & rubro vertitur, & lactis naturam nomenque accipit, non dissimili modo quo idem facultate testium peculiari in semen transmutatur. Dum enim glandule illum sibi assimilare conantur, non modo dealbant, sed frigidius etiam efficiunt, sic tamen ut facile a foetu cōcoqui possit, ad cuius nutritionem comparatum est. Itaque nulli fere animalium lac fieri solet antequam vterum ferat, nisi forte (quod Hippoc. annotavit, & ipse aliquando vidi accidisse mulieri, cui nec gravidæ, nec puerperæ tanta lactis copia in mammis succreuerat, ut satis alieno foetui alendo esset) menstrua purgationes defecerint. Hæ namque si in vbera se conferant, nec in habitum corporis regurgitent, aut alio pervenas ferantur, vertuntur in lactis speciem nulla in re mulieri moleste. Sed nec dum vterum ferunt animalia, nec statim a partu lac utile omnique est ad foetus nutrimentum. Nam & cum fieri incipit, ad speciem puris densatur, & primum a partu spissitudinem & coactionem quandam spongiosam habet, quod recens natis exhibere incommodum est. Hoc Latini colostram suæ colostrum, & qui ex eius siccitate male affecti sunt pueri, colostratos appellant. Nomen quo vitium hoc lactis significant. Græci proprium non ha-

bent. Eo autem e mammis vacuato, lac optimum succedit, quod veluti sanguis ex quo gignitur, purum syncerumque est, nec amaritudinis, nec acrimoniæ, nec aciditatis, nec falsedinis particeps, non graucolens, sed vel modice odorum, vel saltem odoris expertus, gustu etiam suave & parum dulce, adhuc album & æquale, atque inter liquidum spissumque medium, ita tamen ut in vnguem instillatum non dissolvatur: de quo cum dico, optimi lactis & a bene sano animali proteluntis notas explicō. Cæterum lac omne quanquam simile videatur, partes tamen multum dissimiles habet. Constat enim tribus substantiis, crassa, ex qua caseus conficitur, pingui, ex qua butyrum, aquea, quam Græci *σπέρμα* sive *σπέρμα*, Latini serum nuncupant, quæ pro specie animalium, proque foeminarum temperamento, in æqualibus omnino portionibus cōfusa sunt. In animalibus enim alias alia exuperat. Lac quidem in hominibus haud longe ab earum mediocritate abest. Huius proximum caprinum est. Crassius hoc ovinum. Crassissimum & pinguisimum bubulum. Tenuissimum cameli est, mox equæ, rum asinæ. Sus crudum & æqueum habet. Itaque ex his caseus effici non potest. Sunt enim serosiora, quæ ut possint coagulo concreescere. Est & lac verum æstivo a quoque dilutiusque. Nec vero dubium est quin pro varia temperie & mistura diversas adeptum sit facultates. Quod serosius est, magis refrigerat & extergit & alium subducit, quod est pinguius, magis cōcoquit & laxat: quod crassius est, alium sistit, obstruit & emplasticum est. Lac autem generatim omni boni succi est, corpus autem alium emollit, & viridi præsertim pabulo stomachi & intestina inflatione vexat, sed minus caprinum, quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis magna ex parte vescitur. Inde stomachio accommodatissimum reddi solet. Ovillum autem dulce, crassum, & præpingue, non viq. adeo utile stomacho, Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea, sed ipsum turbant. Vtrem adstringit lac omne detoatum, præcipueque cadentibus calculis marinis exustum: sicque vicerofas vetricis fluxiones adiuvat. Utile est & contrarotiones vitionesque ab externalibus medicamentis factas, ut a cantharidibus, salamandra & reliquis venenis. Lac autem omne respiciendum est splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & nervorum vicio laborantibus, febri culosis & capite dolentibus, nisi si quis interdum purgationis gratia bibat. Est autem *γαδύρι*, hoc est lac scissile, a quo dirempta secretaque est serosa portio. Verum tamen non lac quidem ipsum, sed serum eius hoc nomine verius appellandum venit. Eius enim causa medici *αὐτὸν* *γαδύρι* meminere, quod valeat ad subducendam aliam. Est autem huius conficiendi ratio hæc, quam scripto prodidit Dioscor. Lac sicili novo feruet, ramoque

ficulneo recenti mouetur, insparis, postquam bis aut ter efferbuerit, totidem acetum cyathis quot sunt heminae lactis. Ita enim ferescens liquidum ab eo diuiditur quod in caseum concreuit. A quo non discrepat Paulus, nisi quod videtur mel aut acetum nullum admiscere sero lactis posteaquam à caseo discesserit, & non ante eorum separationem, ut videtur velle Dioscorides. Verum *ῥῆς γὰρ τοῦ τοῦ*, hoc est, scissionem hanc, moliendam esse citra coagulum oxymelite frigido in lac valde feruens, instillato docet Galen. lib. 3. de aliment. facultat. Idem etiam mulso effici, interdum etiam citra vllam liquoris instillationem vase gelidam aquam continente in lac demisso ipsum scindi separarique. Quod autem ipse precipit lac ficulneo ramo agitandum, duplicem habet causam, auctore Columella lib. 8. cum ut quod in lacte casei est, citius deferatur, tum ut incundissime sapiat. Datur subducendi ventris causa etate quidem florentibus ad duos sextarios, iunioribus non minus sextario, ut ait Paulus. Verum secundum Dioscoridē bibitur heminis, per intervalla singulis, vsque ad quinas, ita ut intercedentibus spatis potantes ambulent. Vide *ῥῆς γὰρ*.

Fit etiam ex lacte id quod *συνήμα* appellatur, quod statim à partu multum & cinere calido modice reperfactum, citra coagulum statim concreuit. de quo vide suo loco.

Est & alia lactis preparatio, cum per coagulum, melle admisto, lac cogitur: medici *ῥῆς γὰρ τοῦ*, Actius *πικρὸν* appellat. Sic enim seri lactis à crassiore parte secedit. Id vario modo sumi solet. Alii tantum quod concretum est, sumunt: hoc autem tribus constat, caseosa lactis substantia, calida igneaque coaguli virtute, & melle. Alii cum eo serum simul hauriunt, idque vel nihil dementes, vel alterum altero largius. Habet id facultatem subducendæ alui, sed magis minusque, prout plus minusve seri habet, cui ad deiciendam aluium præcipua vis est.

*ὀξύζαλα*, hoc est lac acidum. fit certa quadam lactis preparatione, per quam sola caseosa substantia relinquitur, eaque ipsa non eiusdem omnino naturæ cuius ab initio fuit, verum ad frigidiorē statum deflecta. Valde frigidum est & crassi succi. Vide suo loco.

*ῥῆς γὰρ καὶ διαρκῆς*, hoc est lac purgatorium, aliud à prædictis docet Aetius lib. 3. in lactis afinini vel caprini hemina scammonia scrupulos duos miscet quo bile purgat: aut cnici granorum internam partem inijcit, quo pituitam euacuat. Sic enim optime falluntur qui metuant purgari, propterea quod ab his non immutatur lactis color.

*ῥῆς γὰρ*, radice nomen est de qua nihil à veteribus scriptum esse comperimus; innotuit tantum ex Manritanorum commentarijs, qui duplicem eam statuisse, vnā maiorem,

alteram minorem. Minor tenuis est, intra extraque purpureo colore rufescens, geniculata, internodijs reflexa, odorata, sapore valde acri & piperis gingerisque modo linguam vrente odore formaque cypero similis, & credita à quibusdam eadem cum cypero Babylonico. At maior, tamen longe crassior sit, viribus tamen infirmior est & colore dilutior minusque odorata. Calefacit & siccatur ordine tertio.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, dicitur à *ῥῆς γὰρ τοῦ*, ut ait Aetius.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, est lapis, ex saxo calcario nascens, sicut & *ῥῆς γὰρ τοῦ*, cui & in reliquis notis valde similis est, cinereo colore, qui cum corti attritur succum reddit lacteum & dulcem, ex quo nomen suum accepit. Singulis fere annis capit incrementum, quo fit ut aliquando magnitudine pueri caput exæquet. Caloris aliquid habet atque abstergit, ad oculorum fluxiones & vlcera inungitur. Oportet autem in aqua tritum pyxide plumbea recondere, propter vim glutini quod ei obhæret. Idem mulieres lacte copioso implet fissitas post balneum cum aqua aut vino dulci bibatur.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, apud medicos absolute dictum significat idem quod tepidum atque egelidum, quod in modum lactis neque calidum est neque frigidum. Sic apud Dioscoridem plerisque locis videtur *ῥῆς γὰρ τοῦ* (ut cap. de aloë, ubi Marcellus falli videtur, serum lactis verens, quod nemo vnquam animaduertit aquam dictum fuisse) apud Aetium lib. 9. cap. 6. *ῥῆς γὰρ τοῦ* *ῥῆς γὰρ τοῦ*: & apud Gal. lib. 7. meth. med. *ῥῆς γὰρ τοῦ* intelliguntur, ut facile est ex eorum lectione iudicare. Verum à colore *ῥῆς γὰρ τοῦ* *ῥῆς γὰρ τοῦ*, dicitur vitiata lacti similis.

*ῥῆς γὰρ τοῦ* idem quod *ῥῆς γὰρ τοῦ* de quo postea.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, lapis, qui & *ῥῆς γὰρ τοῦ* & *ῥῆς γὰρ τοῦ* dicitur, de quo vide *ῥῆς γὰρ τοῦ*.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, idem quod *ῥῆς γὰρ τοῦ* de quo vide suo loco.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, dicitur à quibusdam à *ῥῆς γὰρ τοῦ* frutex paruus, ut habetur apud Dioscor.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, est apud Xenocratem herba leucæantho similis, palustris & spinosa caule ferulaceo & alto, cui summo in capite inhæret quiddam simile ouo. Ad eam proxime *ῥῆς γὰρ τοῦ* accedit.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, herba *ῥῆς γὰρ τοῦ*, ut habetur apud Dioscoridem.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, fuit olim primum nomen *ῥῆς γὰρ τοῦ*.

Sic enim ab Andromacho & aliis qui ipsum etate anteibant appellabatur, cum videlicet viperæ carnes nondam admistas haberet. Eas primus Andromachus Neronis tempore creditur addidisse, & à Critone postea eam ob causam *ῥῆς γὰρ τοῦ* fuisse nuncupatam.

Est autem dicta *ῥῆς γὰρ τοῦ*, ut ait Galenus, quia corporibus tanquā aliqua morborum tempestate vexatis tranquillitatem & veluti serenitatem inducit.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, nomen est malagmatis cuius compositionem habet Paulus lib. 7. cap. 18.

*ῥῆς γὰρ τοῦ*, dicuntur ab Hippocrate, ut scribit Galen.



Galen. qui ob humeri caput in alam prolapsum dum adhuc crescebat, humerum breviorē habent. Huius autem rei ille duplicem causam assignat, vel quod dum in utero sunt, humeri luxentur; vel quod post ortum tenera adhuc ætate iuxta humeri caput in intimis partibus atque suppurationes oriuntur, siue secentur, siue viantur, siue per se pus aperiatur, sicut ab eo scriptum est *ἐν τῇ ἀρθρῷ*. Idē vero *ἐν τῇ γλασσῷ ὁ κνηστὶς* scribit sic appellari eos qui parvum & gracile habent brachium, partes autem circa cubitum tumētiōres in modum mustelæ quam *γαστῆρ* appellant, à qua deductum hoc nomen esse videtur.

*Γάριον*, ἢ *γαστρίον*. herba est rectos stantesque ramos habens & folia aparinæ similia, florem in cacumine luteum, densum, exilem, numerosum, odore grato, qui ambustis emplastri modo impositus medetur, & sanguinis è naribus profusio sistit: nōmē accepit quod coagulandi lactis vim habeat. Rura Gallicā minus muschetum vocant.

*Γαλίον*. frutex est totus caule & foliis vriticæ similis; nisi quod folia maiorem habent ætatem, & trita pergraviem odorem reddunt. flores habet tenues & purpureos. Totus frutex vim habet emolliendi si ex aceto tepidus emplastri modo imponatur, aut in fotu adhibeatur. Dicitur & *γαστῆρ δαλον*. Putatur eā esse quam officinæ agripalmam dicunt.

*Γάλλος*, gallus. Nomen est *δραπέτης* ab Oribasio compositi, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 19. & apud Aetium libri 3. cap. 180. *ὡς δραπέτης*.

*Γαμμή*, à quibusdam dicitur *στραγγὴ καὶ ἄλμυ*, hoc est maxilla.

*Γαμψός*, *καμπύλος* ἔχων *πυλὸς*. curvus, vel curviaturas habens, apud Hippocr.

*Γαργαρέων*, cingulio. Particula oris est, solius hominis propria. Est autem caro fungosa, oblonga, à palato iuxta narium meatus in os propendens superiori quidem parte latior, inferiori vero in modum pyramidis acuta. Facit ad vocis modulationem, ideoque *πληκρὸν* à quibusdam dicta est. Eadem morbo affecta, iam non amplius *γαργαρέων*, sed *κλῖον* & *κωνίς* & *σαφίλη* & *ἱμαί* appellatur.

*Γάρον*. garum. Est liquamen seu sanies piscium sale conditorum & maceratorum. Primum factum est è garo pisce, vnde & nomen habet. Deinde ex scombro, intestinis eorum cæterisque quæ abicienda essent sale maceratis. Postremo & priuatim, ut ait Plinius, ex inutili quodam pisciculo minimoque cœpit confici, & ex qualibet etiam materia diuersis modis præparari. Verum Dioscorides non è falsis modo piscibus, sed animalium etiam carnibus garum fieri solitum scribit. At nemo veterum, ut plerumque fit in re nota, certā eius confectionem docuit. Diuersum enim esse à muria seu salugine piscium intelligi potest ex Gal. libro 11. de simpl. medic. facult. & Martialis er-

iam Xenii, de garo & muria. Notimus quidem nunc thynnium, scombrum, aliosque ex quibus conficiebatur pisces, confectionem vero non facile aliquis ostendat, quibus additis saporibus & qua muria condiretur, & quæ tam diligens purgatio & lotura eius esset, ut sordidum alioqui & feculentum poculum grato sapore bibi potuerit: nam & Gal. gari dulcis meminit; idemque scripsit plurimum facere ad delectationem. Sed longo post tempore Constantinus Cæsar extremo lib. 20. de agricultura aliquor quidē parandi gari rationes memoriæ prodidit, de quibus tamen dubitari adhuc potest, sintne illæ eadem quæ superioribus seculis fuere. Intestina, inquit, piscium iniiciuntur in vas & saliantur, parui item pisciculi, maxime ætherinæ; aut exigui nulli, aut manulæ; aut lycostomi, aut si qui alii parui habeantur, omnes similiter saliantur, & in sole inueterantur, frequentetque versantur. Postquam vero per calorem fuerint inueterati, garum ex ipsis hoc modo tollitur. Cophinus longus imponitur in vas plenum prædictorum piscium, influitque garum in cophinum, atque sic per cophinū percolatum suscipitur. Reliquum vero retrementum alex efficitur. Hæc quidem potuit esse simplex gari conditura; præterquam fuisse alias satis indicant variæ gari differentię & nomina: ut Carthaginense, Hispanum, sociorum, nigrum, *αἱμαίνον*, *ὀνόγαρον*, *ἐξὺγαρον*. Ac Carthaginense quidē & Hispanum dictum est quod è finibus Carthaginis & Hispaniæ laudatissimum deferretur. Sociorum vero, quod gæneones & gulæ dediti sociatim eo vterentur, & ob præcipuam quæ inter socios eo vscentes caperetur voluptatem. Nigrum vero & fecosum & *αἱμαίνον*, hoc est sanguineum, quod veluti fex esset piscium; quodque eorum cruor ad confectionem eius adhiberetur. Fiebat autem *αἱμαίνον* præstātissimum hunc in modum. Intestina thynni cum branchiis cruoreque ac sanguine accipiuntur; aspersioneque salis quod satis est, & in vase sinuntur. Post menses autem duos vas ipsum perforatur; effluitque garum quod *αἱμαίνον* dicitur. Id credō esse quod Paulus Aegineta *γάρων ὀνόγαρον*, hoc est garum primarium siue excellens, appellat. Quod vero *ὀνόγαρον* atque *ἐξὺγαρον* appellatur, iam simplex non est; sed illud quidem vinō mistum est, hoc vero aceto conditum. Similiter & *ὀδόνόγαρον*, quod aqua dilutum est, de quibus apud Aetium libr. 3. cap. 84. 85. 86. qui libr. eiusdem cap. 82. descriptionem etiam *ὀνόγαρον καθερτισκός* explicauit. Cæterum garum, ut scribit Gal. facultatem habet multum calidam & siccam, ac proinde ex eo quidam vfi sunt ad vlcera putrescentia. habet & vim ex se soluendi, ut idem scripsit lib. 2. de aliment. facult.

*Γαστήρ*. venter, ventriculus. Sunt qui eo nomine designari dicant totam eam regionem quæ septo trauerso, hypochondriis & pube cir-

cunſcribitur, quam ego potius *βηλασπίον* vocari arbor: *μασπ* autem peculiari nomine Galen. ventriculum appellat in quem cibi ingeruntur & concoquuntur. De qua nos etiam hic sub eo nomine dicemus, non tamen repudiata priori ſignificatione qua aliquando *μασπ* αὐτὴ τῆ βηλασπίος ſumitur. Eſt autem pars membranosa, caua, rotunda, oblonga, duabus tunicis conſtans & oſophago continua, ciborum receptaculum. Nec vero tantum in homine, ſed etiam in animalibus, in quam partem cibum ea recipiunt, ventriculus nominatur. Incipit à mucronata cartilagine, ſitusque eſt medius exacte inter dextram & ſiniſtram partem, & utrinque duo habet viſcera, dextro quidem latere iecur, cuius fibris tanquam digitis comprehenditur, in ſiniſtro vero lienem inferius protenſum. Rotundus eſt ubique in figura oblonga, ut inſtans oſtendit. Eſt autem oſophago continuus & ſubſtantia ſimilis. Duabus enim tunicis etiam componitur, interna neruoſa, craſſa, externa carnoſa, minus tamen quam oſophagus, quarum illa rectis fibris ſuperne deorſum procurrētibz intertexitur, hæc vero tranſuerſis, utraque autem obliquis, ſed paucis. Habet præterea tertiam tunicam à peritonæo, qua illud phrenas ſubtegit, omnium craſſiſſimam, epiploī anterioris procreatricem. Eſt autem ventriculo oſ geminum, vñum ſuperum quod *σπέρμαχος* proprie dicitur & *τῆμα τῆς μασπ*ος, amplius & maxime ſentiens propter neruos quibus præditum eſt, infernū autem anguſtius quod *πυλῶς* appellatur. Venas habet multiplices, ſed præcipue propagines duas paruas à vena porta proficiſcentes, & in ipſum varia ſerie diſtributas quæ *μασπικαὶ* poſſunt appellari. Nec tamen ambæ ab eodem loco manant, vna enim ex venâ portæ truncō oriitur, quæ pylorō, & poſteriori ventriculo illi propinquo diſtribuitur. Altera vero ex eiſdem venâ portæ trunco ſplenico proficiſcitur, & gibbæ ventriculi dextræ inferitur. Arterias vero habet ab arteria quæ ſecundum lumbos fertur, neruos autem duos inſignes à ſexta coniugatione qui per ipſum ſparſi præſertimque oſ eius & partes alias ori vicinas, ſenſum ventriculo exquisitiſſimum inuehunt, quo & indigentiam & roſionem perſentiſcit.

*Μασπ*. ſic dicta eſt rapa apud Lacedæmonios, ut ſcribit Athenæus.

*Γαστροκήμη*. ſura. poſterior tibiæ pars carnoſa. ſic dicitur quoniam veluti tibiæ venter eſt: ſiquidem extuberat, propter mūſculorum eam tibiæ ſedem occupantium craſſitiem. Ea vñi homini ineſſe dicitur, cum reliqua omnia animalia cura habeant ſine ſuris. Dicitur & *μασπικήμιον*.

*Γαῦρος* apud Hippocr. gibbum, obtortum & incuruum ſignificat. Sunt qui accentu in vltima *μασπ*ος ſcribant, ſicut annotat Gal. comment. 2, εἰς τὸ αἰεὶ ἀγμῶν.

*Γελασμός*. ſunt qui exiſtunt porrum capitarum

ita appellari, alii *γέσσον* ita vocant.

*Γέσσον*. herba eſt ceparum generis, pene ſine capite, cervicis tantum longæ. ſapius reſecatur, ut porrum. Didymus dicitur *γέσσον* ſimile feciſſe *τῆς ἀμπελωγράφου*. Sunt qui alio nomine *γεσμῖδα* tradant vocari. Plinius ſcribit à Latinis pallacanam nominari.

*Γέσσων* ἢ

*Γελασμός*. Pars quæ in ſuperciliis prominet, velut imbricamentum quoddam alioſum humores deriuans. Gaza grundam vocat. Sunt autem grunda & fuggrūdia recti partes prominentes, quibus ſtillicidia arcantur à parietibus. Aliqui *γέσσον*, ſimplici ſcribunt.

*Γελαστοὶ ὀδόντες*. ſic dicuntur dentes quatuor medii & anteriores qui per riſum parent. Vocatur & *γελαστός* caput illud quod in media bucca per riſum apparet: de quo intelligendus eſt verſiculus ille Martialis: Nec grata eſt facies cui gelafinus abeſt. quanquā ſunt qui interpretentur eam faciem deformem videri, cui deſunt dentes anteriores *γελαστοὶ* dicti, *τομῆς* alio nomine vocantur & *δυσχεῖρες*. Sunt qui ſcribant *γελαστοὶ*.

*Γέλγες*, ἢ *γελγές*. grana quibus alii caput compactum eſt, alio nomine *αἰγλές* appellantur.

*Γέλας*. riſus. Eſt motus ex contractione labrorum & expiratione intercifa, ſonora, hilaritatem declarans. Motum quidem eſſe, nemo ambigit, verum ad quam facultatem pertineat, iure poteſt dubitari. Nam cum ipſe nota ſit hilaritatis, eaque inter animi affectus cenſeri debeat, qui oēs ſine controverſia ad facultatem *θυμοειδῆ* pertinent, non immerito ipſe quoque riſus eiſdem facultatis functio videri poterit. Cum enim contrariorum eadem ſit ratio & diſciplina, & triſtitia quæ hilaritati aduerſa eſt, eiſque propriæ notæ, ut contractio caloris ad interna, extremorum frigiditas, faciei pallor, pulſus parvus, languidus, tardus, rarus, & reliqua quæ eam comitantur, opera ſine facultatis eius animoſæ quam in corde medici collocarunt, pariter hilaritas cum ſuis notis tota facultatis erit animoſa & vitalis. Verum ea eſt animi pathematum conditio, ut protinus atque in corde concepta fuerint, reliquas ſimul facultates afficiant, atque in iis affectionis ſuæ notas exeitent. Sic quidem timentes corripiuntur totius corporis tremore: gaudentes geſtiunt: irati extra ſe ſunt & mentis impotes, qui non iam *θυμοειδές*, ſed animalis facultatis motus exiſtunt. Quo fit ut quæ affectus animi conſequuntur ſymptomata, non ſint omnia eiſdem facultatis ad quam ii primo & per ſe pertinent, ſed in aliis etiam corporis partibus eorum ſigna manifeſta appareant. Ergo cum in corde concepta eſt hilaritas, mox indicibili quodammodo mouetur & veluti geſtit copiaque ſpirituum luxuriat. Hi in pulmonem effuſi eam intercifa ſonoramque expirationem faciunt quæ riſus dicitur. Ac quoniam mutuus eſt & promptiſſimus omnium facult-

facilitatem inter se consensus, cerebrum quoque voluptatis quæ cordi inest participes, eam quasi cordi congratulans, laborum contractione, motu sibi proprio testatur. Quæ tamen motu cur potius quam alium quemvis in risu delegerit, nemo plane est qui se scire possit profiteri. Satis est intelligere eò motu naturam voluisse prodere conceptam in animo cuiusque hilaritatem. Est autem ea laborum contractio compressioque æquabilis, & in moderato quidem risu modica, amplior autem in profusiore, & aliquando tanta ut dentes denudet atque deformitatem inducat. Quia tamen ea plane naturalis est, risu sedato protinus ad se labra orisque habitus redit, longe dissimilis ab ea contractione quam aliqua præter naturam causa expressit. Itaque ea laborum contractio quæ Sardos herba crociue potu, aut præcordiorum inflammatione præuenit, non nisi *naraxenquos* risus nomen accepit. Tunc enim ita labra conuelluntur, ut risus speciem quandam & similitudinem præbent. Iam quod pertinet ad eum sonum qui ridendo editur, is in vocalibus instrumentis perficitur. Eius materia est spiritus multus, tenuis, calidus e corde prodies & in pulmones effusus. Quibus enim eiusmodi spiritus suppetit, ii ad risum solent esse propensissimi: sicut e contrario quibus paucus est, & crassior & frigidior spiritus, ut plurimum ridere non possunt. Ea quidem causa est cur frigido siccoque homines prædicti temperamento, ut senes & melancholici, ad hæc ægri aut qui tenui sunt valetudine, nunquam aut admodum raro ridere videantur: cur etiam qui literarum studiis auidiùs incumbunt, potius *ayxanai* reddantur. Non enim habeant spirituum eiusmodi protentum, qui confertim e corde erumpere possit eamque concitare expirationem, quæ in se diuisa & intercise prodies singulis sui partibus atque sectionibus sonum edat. Siquidem non erupit in risu *ayxanai* ille spiritus, sed diuissim & per incisiones, ut non vna, sed quodammodo multiplex exspiratio illa videatur. Ea sæpe tanta est, ut nimia spirituum exolutione syncopas & vitæ periculum prouocet. Tantos quidem in corde motus concitat hilaritas. Sic autem appello affectum animi, non à seriis quidem rebus pacato tranquilloque motu profectum (id enim gaudium potius dicendum est, quo multi pii bonique viri, & senes & philosophi & omnis generis homines citra risum perfruuntur) sed potius à placidis & ludicris effuse manantem. Talis hilaritas sensibus maxime hauritur, perque eos in cor progreditur aut eius quæ aliis sensibus percepta est voluptatis recordatione redintegratur atque innouatur. Quo fit ut non auditu modo visuque rerum ludicarum sed alarum etiam plantarumque pedum leni contactu, quem titillationem vocant, in risum solui possimus, sed & sani & qui per morbum delipiunt, sola eiusdem volu-

ptatis quam aliquando senserint recordatione persaperident. Quem risum verum esse & naturalem non dubitarem asseuerare. Est enim hilaritatis animi index cum ea contractione laborum & sono quibus antefectum constare definiuimus. Quæ quidem duo semper in risu concurrunt numeris suis omnibus absoluto atque perfecto, alias quidem moderatius, alias vero profusius, quod Latini proprio nomine *cachinnum* vocant, pro ridentis natura, sicut antè à nobis dictum est: quorum alterum si desit (deest autem aliquando sonus ille, præsertim in modestioribus naturis) is non plene vereque ridere, sed potius subridere dicitur.

*Riquoris*, idem quod *ayxanai*, lapidis nomen est, sic dicti quoniam quasi prægnans sit, id quod etiam actura proprium est.

*Rosæ*, lanugo prima, sic dicitur & fasciæ circuitus qui sub mento circumagitur, ut habetur apud Gal. lib. de fasciis.

*Rentor*, mentursum. Est pars prior genæ inferioris in acumen subrotundum tendens: posterior namque mandibula appellatur. Ea in parte duo ossa genæ inferioris futura iunguntur, in pueris manifesta, quæ ita progressu ætatis coalescit, ut tandem symphyssi uniantur, & nulla fere vi, coctione aut putredine separari possint. Rufus auctor est eadem partem *ayxanai* etiam dici, eamque definit esse *ayxanai* & *ayxanai*, id est, quod inferiori in maxilla in acutum definit. Ab aliis etiam *ayxanai* vocatur, teste Polluce.

*Rentor*, gentiana, herba est foliis iuxta radicem erumpentibus, iuglandis vel plantaginis similibus, subrubris, parum dissectis, caule cauo & leui, genicularo & ex interuallis maioribus foliato, binum fere cubitorum, semine in calycibus lato, sine podere, radice longæ aristolochiæ crassa, amara, quæ pinde obstructions soluit, abstergit, extenuat, purgat. Nomen habet à Gentio Illyriorum rege, qui primus eam reperiisse dicitur. Retinet autem ipsum in officinis.

*Rentor*, genus. Id nomen scripsit Galenus comment. *ayxanai* & *ayxanai* observasse apud veteres Græcos aliquando in iis usurpari, quæ *ayxanai* dicuntur, quæ vnum quidem habent significatum, sed ex eius diuisione in plures differentias deducuntur, de quo dicere sapius consueuimus genericas eius rei differentias esse vel duas, vel tres, vel quotquot esse possunt. Indifferenter tamen genus pro specie, differentia, formaque dicitur.

*Rentor*, genæ. Significat maxillam tam superiorem quam inferiorem: additur autem ad distinctionem *ayxanai* vel *ayxanai*. Dicitur & alio nomine *ayxanai*, sed ambigua pariter significatione. Distinguit tamen Aristot. de histor. animal. lib. 1. cap. 61. scribens, *ayxanai* & *ayxanai*, hoc est, interprete Gaza, Est præterea maxilla duplex: cuius prior pars mentum, posterior mandibula est. Sed nos nostram di-

nitionem sequamur. Dicitur *αἰὼς ὤφης*, hoc est gena superior, pars faciei, fronti proxime subiecta, auribus vtrinque, ab imo autē gingiuis terminata. Non vñico osse, sed pluribus, solidis, duris & leuibus cōstat, de quorum numero non bene conuenit inter anatomicē professores, quod aliqui suturas, in iis valde obscuras neglexerint, nec duxerint ossa iis esse separanda. At qui scrupulosius ea diuiserunt, omnia enumerāt quatuordecim, ab vtroque scilicet latere septē; quorum tria sibi & magnitudine differentia ossi frontis contigua sunt, quartum nasi pars est, quintum, quod valde longum est, dentes priores quos *τοὶ μὲν* & *δὲ χασίπας* vocant, complectitur, sextum omnium maximum dentes ceteros continet latere suo sitos, septimū vērō, quod minimum est, in iatimo palato ad eius foramina reconditur. Sic quidem se habet gena superior. At inferior, quæ *ἡ κατω ὤφης* dicitur, est pars faciei infima & mobilis, dentes inferiores continens. Constat osse non simplici, vt plerique putant, sed gemino, sicut Hippocrati & Galeno visum est, quorū distinctio medio in mēto est, vbi sutura appareret, in pueris quidem euidenter, in adultioribus autem paulo obscurius, quæ tamen etiā in prouectis coctura fatiscit. Aliter namque ea duo ossa separari vix possunt, adeo inter se *τὴν κομφοῦσαν* coaluerunt. Non est igitur os illud simplex & vnum, sed geminum, & vtrumque quidem durum & solidum, quod ea ex quibus constat gena, sola mobilis sit, & in manducando plurimum laboret. Vtrinque ossis partes extremæ quasi bicornes sunt propter duas *ἐκφυσεις*, hoc est processus, qui ab eis oriuntur. Alter processus infra latior, vertice ipso tenuatur (quod genus à scriptoribus anatomes *καρπύνη* vocatur) longiusque procedens sub osse iugali subit, & temporū musculis excepto ab iis tendine, alligatur. Alter breuior & rotundior, & in eo sinu qui iuxta foramina auris est, in osse temporū iuxta processum *μασθηδίνος* cardinis modo versatur, ibique huc & illuc se inclinans maxillæ facultatē motus p̄stat. Sub his processibus vtrinque vnum foramen est, per quod portio nerui à tertia coniugatione, itemque vena & arteria ad dentes fertur, quibus & sensus & alimentū ipsis superat, cuius gratia non modo inferior, sed superior etiam gena sua impol sed in medulla refertum.

*Γερων*, seniores, maiores nam. sic dicuntur ab Hippocrate non qui simpliciter senes sunt, sed in collatione & comparisone ad eos qui trigessimū annum excesserunt. Qui enim ab ea ætate ad senectam vsque annis excedant, hi per comparationē seniores ab eo appellantur, sicut Gal. comment. 3. *αἰὼς γερων* annotauit.

*Γερύδρον*, dicitur vetus quæcunque arbor. Greci enim *δρῦς* vocabulo lignum omne significant.

*Γερύδιον*, herba est duorum generum, vnum folio anemones, sed longiori dimensura, radice

fere orbiculata & dulci, cacumine gruni rostri (ex quo nomen habet) figura quod in mucronem acuminatur, vnde pastoris acus vulgo dicitur. Alterum foliis maluar paulo candidioribus, caule lanuginoso, flosculo purpureo. Vbique per Galliam pes columbinus appellatur. Nullius sunt in medicina vsus, auctore Dioscoride.

*Γεραιον*, emplastrum est sic dictum quod præter cætera gruis pēnas vltas recipiat. Tribuitur Polleti. Habetur eius descriptio apud Aetium.

*Γερανίς*, est vinculi genus ad humerum excidentem aut iugulum fractum ab Hippocrate, vel, vt aliis placet, à Perigene inuentum: sic autem per similitudinem appellatum est.

*Γεραροχρῶν*, sic dicitur à quibusdam *τὸ γεραιον*, vt habetur apud Dioscor.

*Γεροντιον*, herba est quæ inter saxa gignitur, longa barba, foliis instar capillorum prælongis, flore luteo, qui in volucres barbulas euanesceat, quas pueri barbas Dei nuncupant. Lactemanat & radice amara est, eoq; à tragopogone differt.

*Γεύσις*, gustus. Est sensus saporis. Nec vero sensus ipse solum, sed etiam vis ipsa gustandi ita appellatur, sicut *ὁσπρησις*, hoc est odoratus, non solum odoris sensus, sed etiam ea facultas, cuius odorandi officium est. Huius autem sensus, tum facultatis præcipuū instrumentū lingua est, quam ob id natura & mollem esse voluit, & mollioribus nervis donauit. Humor enim ad gustum omnino necessarius est, inque eo rationem obtinet causā non eius modo per quam gustus melior sit, sed eius etiam sine qua fieri prorsus nequit. Idcirco quæ dura sunt nullumque humorem exserunt, nullo modo gustum afficiunt, nec lingua etiam ipsa scabra & arida, vt per febres fit, de saporibus recte iudicare potest. Itaque natura nervos illos valde molles esse voluit, quos in linguæ superficie & tunicam ad gustum diffudit. Hi maxima portio sunt tertiæ coniugationis à cerebro prodeuntis, quæ tota ob id à Galeno gustatoria nuncupatur: & cuius etiam nerui propter insignem molliem simpliciter *ὡδὲ γεραιον*, id est nerui molles, appellantur. Ad hoc necesse est quicquid gustū mouet, molle humidumque esse, aut facile in ore liquari posse, vt saccharum & sal. Ceterū quoniam ex illa eadem tertia coniugatione propagines quædam nervorum in labia, gingiuas & dentes excurrunt, ideo in his quoque partibus vis aliqua inest saporum discretrix, sed quæ multum linguæ cedit. An vero & palato, vt poeta loquuntur, vis ea insit necne, ignoro; quod nec legerim id scriptum à Gal. nec palatum eiusmodi coniugationis princeps esse ab anatomicis annotatū sit. His igitur instrumentis cerebrum anteriore sui parte saporē quos Græci *γεῦσις*, & *γεῦσις* dicitur, hoc est saporē, & gustatorias facultates siue qualitates vocant, diiudicat,



non quidem propter se, sed ventriculi causa, quod ad delectum ciborum, saporum genera maxime pertineant. Sūt autem omnes gustus differentiz octo, αἰσθητός, σφοδρῆτος, πικρότης, ἀλκότης, δριμύτης, ἔξυπτης, γλυκύτης, λιπερότης, id est austeritas, acerbitas, amaritudo, salsedo, acrimonia, aciditas, dulcedo, pinguitudo. Alii, inquit Galenus, septem modo enumerant, alii vero his quoque pauciores. Qui septem statuunt αἰσθητός, πικρός, σφοδρῆτος, hoc est austeritatem & acerbitatem, vnum genus faciunt, quod non differant specie, sed intensione sola. vtraque enim adstringit, illa magis, hæc minus. Itaque ambæ sub adstrictione, quam σφίλον vocant, comprehenduntur, quam propterea Gal. in comm. in libr. de nat. hum. inter gustabiles qualitates recenset. Qui pauciores numerant, similiter sub vno genere πικρότητα, ἀλκότητα, δριμύτητα, hoc est amaritudinem, salsedinem, acrimoniam, comprehendunt, quod amarus ex nitroso proveniat intensione, salsus vero aut nitroso imbecillior, aut præterea adstrictionis aliquid assumere videatur. Sed de singulis suo loco, quæ à nobis scripta sunt, requirantur. vide γυμνός.

γυμνός. dicitur ab anatomicis quibusdam pars ea linguae quæ ad fauces est, in qua gustus sensum maiorem inesse putant, ut habetur apud Iulium Pollucem.

ἡ ἀργίλη, apud Hippocr.

ἡ σμακρίς, ἡ κωμώλια, alba creta, apud Hipp.

ἡ χαλκίτης, idem quod lapis chalcites, apud Hippocr.

**Senectus.** Est temperamentum corporis frigidum & siccum annorum multitudinis ratione proveniens. Sic quidem senectutem Gal. libr. 5. de sanit. tuend. definiuit, non veritus eam temperamentum dicere, quod potius videtur adiunctum quid esse senectuti quam generis rationem obtinere. Dicitur forte aptius esse. Vitæ portio eo constans temperamento. Omnes siquidem vitam per ætates distinxerunt, earumque singulis sua temperamēta præscripserunt, annorum spatia diuersa. Ita namque fert nature conditio, ut corpus humanum nequeat diu eodem in statu esse, quod sit omni genito corpori corruptelæ interitusque connata necessitas. Cum enim ita nati simus, ut in naturæ nostræ primordiis calidum frigido, humidum sicco præpollear, consterque nobis ex humida substantia genituræ origo, quam tamen humidam perpetuo seruari conueniens non erat, quod ex ea nerui, arteriæ, ossa, cartilagine & alia id genus fieri deberent, natura statim in generationis initio ignem terramque copiosius admiscuit, quæ non torrerent quidem vterentur, sed tamen abunde siccarent. Quæ tamen à parvis initiis eo tandem progrediuntur, ut omnibus iam partibus supra modum sicciscentibus non solum cuiusque officium minus probè administraretur, sed etiam corpus ipsum macilentius graciliusque, quam ante reddatur. Er-

go ultra siccatum, non macilentius morio, verum etiā rugosum efficitur. Attus quoque ipsi inualidi, atque ad motus suos incerti inconstantesque redduntur. Affectio hæc in animalibus γῆρας dicitur, ei quæ in stirpibus αἰωνος Græce vocatur, proportionē respondens. Est enim & illa stirpis senium, siccitatis excessu proueniens. Absumpto autem eo humido quod & insitū, & radicale, & primigenium nuncupant, necesse certe est corpus frigidius reddi tum quod terrena portio iam exuperet res omnino frigida & sicca, tum quod natiuus calor vna pereat, qui totus in eo humoris genere consistit. Itaque natiuo calore humoreque destitutum corpus imbecillum euadat necesse est, maleque concoquat, & excrementa quàm plurima colligat: à quibus senectus humida esse potest videri, cum tamen solidarū partium temperamento sicca sit. Sed cum multas ob causas refrigerari siccarique corpora hominum possint, eam solum veri propriæque dicti senii agnoscimus, quæ ætatis decursu annorumque numero prouenit. Ea namque senii est propria, quæ senium est: aliz autem, ut vitæ exercitiū victusque ratio siccior, vel morbus, vel sollicitudo, vel mœror, vel alia id genus immoderatus siccantia, frigidum quidē siccumque temperamentum inducunt, sed quod improprie, nec simpliciter senium nūcupari potest, sed vel senium ex morbo, ut primum Philippus appellasse dicitur, vel ex mœrore, vel ex alio quopiam. Id enim proprie est, sicut diximus, quod annorum multitudinis ratione prouenit. Incipit autem, ut visum est pluribus, peractis annis quadraginta nouē, quo tempore ἡ γῆρας definit, quemadmodum Gal. comment. aphor. 30. libr. 3. annorauit. A quo tamen quoniam etiam siccitas corporis indies magis magisque inualefcit ad extremum vsque vitæ curriculum, iccirco Galen. totam senectutem in treis partes diuisit, primam statuēs ἡ ὁμογενέτην, id est, eorum qui cruda viridique adhuc senectæ sunt, quique adhuc obire ciuilia negotia possunt: secundam autem cui apte nomen ipsius senii conuenit, & proprie γῆρας ἡ γερωνική dicitur: tertiam autem decrepitam, ad quam qui peruenit, Græce πρηνὴς nominat, quod ipsi pompa funebris iam paretur.

Γερωνική. est artis medicæ portio quæ præest senum sanitati tuendæ. Incertū an ad γῆρας, an ad πρηνέτην pertineat. Est enim senectus non exacta planè sanitas, sed vel morbi & sanitatis affectio quædam media, vel omnino eius generis non est quæ firma constansque sit, quam καὶ ἔξω appellant, sed potius fallax & incerta, quæ γῆρας dicitur. Plures tamen salubris medicinz partem esse volunt.

Γίγνη. exterior pars terræ quæ mollis est & minime lapidosa, apud Hippocr.

Γυγιδιον. gingidium. Syrium quidem nomen est, sed tamen à Græcis & Latinis receptum pro herba syluestri pastinacæ simili, tenuiore

rantum & amariore, radice parua, candicante, subamara. Venit in cibos crudū coctumve, magna stomachi voluptate. Proxime accedit ad chærefolium, vel potius idem cum eo est. Temperatum est calore & frigore, siccat secundo ordine, non parum adstringit. Dioscorides etiam author est, sic à quibusdam *παραδιδω* appellatum.

*Γιγγυλις*, est tortia species *δισρθρώσεως*, per quā ossa sese inuicem ingrediētia ita secum coniunguntur, vt vnus caput in alterius cavitatem condatur, & vicissim huius caput in illius sinum excipiat. Est enim hæc *δισρθρώσεως* plerisque ostiorum cardinibus similis, in quibus ferramenti vtriusque (quod proprie à Græcis *γίγγυλις* appellatur) tum eius quod parieti infixum est, tum alterius quod ostio adheret, pectines mutuo implexu sese subeunt. Quæ quidem compositionis ratio nō videtur *πρὸς τὴν φύσιν*, id est à futura, valde differre. In quibus vero ostiis clauus crassior parieti affixus ostii verticillum subit, non *γίγγυλις*, sed verius *γρίφωσις* dicitur. Phura autem ossa in corpore *πρὸς γίγγυλιν* connectuntur, vt cubitus cum brachio, crus cum tibia, tibia tum astragalo, astragalus cum perna, vertebrae similiter inuicem, quanquam vt Galen. ait, in his quædam sit differentia. Si quidem media in sibi tum subiectam, tum suprapositam subit. Ob id Hippocr. libr. *περὶ ἀρθρώσεων* vertebrae parte posteriore *γίγγυλις* *μέναντες*, hoc est per ginglymon iunctas, esse scribit, seu, vt eo loco interpretatur Galen. structuram habere ginglymo quodammodo similem, vt ostendat in iis verum non esse ginglymon, quia non sit in eodem mutuo ossium duorum ingressus. Secundum vero eandem speciem *δισρθρώσεως* Hippocr. in li. *περὶ ἀρθρῶν* imum humeri caput *γίγγυλις* *ἐπὶ* appellauit, de quo vide Gal. comment. 1. in eura librum.

*Γύς*, vox est barbara apud Gal. libr. 1. de antidotis. Est autem casia vna species, quæ apud eundem lib. 3. *γύς* *καὶ ὄντις*, *ζυκρος*, & à Dioscoride *ζυγυρ* dicitur. Vocatur autem, vt hic ait, eo nomine casia nigra & purpuram colore referens, crassaque.

*Γλαυκός*, *γλαυκώδης* *καὶ ὕψος*. hoc est lippus & humidus, apud Hippocr. Dicuntur enim *γλαυμαί*, siue *γλήμμαι*, oculorum vitia, quæ etiam Latini glamas vocant.

*Γλαῦξ* idem quod *γλαῦξ*, nomine à lacte indito.

*Γλαυκίον*, est humilis herba, densis foliis fere corniculati papaueris, minoribus ramis sordidioribusque, odoris tetti, gustus amari, cum adstrictione. Granum habet crocei coloris, quod in olla fictili luto circumlitum in clibanis Parthi calefaciant, deinde exempto succum exprimunt, qui eodem nomine *γλαυκίον* appellatur. Officinis memitha dicitur. Ex eo medici collyrinum temperant, quod *δισγλαυκίον*, siue *δισγλαυκίον*, nominatur: de quo vide suo loco. Mistura glaucii est ex aqua terreaque substantia, ideoque refrigerat. Habet etiam vim adstringendi.

*Γλαυκὴν ὕδρον*, vrina glauca, cornu pellucido similis. Ea albarum genere est, media inter lacteam & charopam. Prima enim inter albas est aquosa, siue crystallina: secunda, lactea: tertia, glauca: deinde charopos, vt habetur apud Actuar. *περὶ ὕδρων* lib. 1. cap. 8.

*Γλαυκωμα*

*Γλαυκωσις*, à vulgo glauco dicitur, à Plin. perpetuo glaucoma, seruatō Græco nomine. Duobus modis accipitur, vt scribit Aetius. Proprie quidem est, transmutatio humoris crystallini in glauceum. Cuius rei causam Rufus, vt habetur apud Paulum l. 3. humiditatem statuit. sed ego quidem locum eum mendosum esse iudico, & non *ὕγρως* sed *ξηρῶς* legendū, quod nemo veterum, quod sciam, causam glaucomatis in humiditate posuerit: etiam si non diffitear fieri posse, vt viridis aliquis humor crystallino permixtus eius albedinem splendoremque offuscet atque obtenebret. Sic enim glaucus color fieri dicitur, viridi & albo simul mixtis. Verumtamen Galenus non videtur aliam causam glaucomatis quam siccitatem agnoscere, qui & lib. 10. de vsu partium diffinit *γλαυκωσιν* *ἢ* *ξηρότητα καὶ σπῆν* *τῆς κρυσταλλίνης ὕλης*. hoc est, glaucoma esse siccitatem & concretionem crystallini humoris. & alibi causam reddens, cur Hippoc. scripserit glaucomata senibus fieri, immodicā instrumentorum siccitatem causatur. Improperie vero glaucoma, auctore Aetio, dicitur id oculi vitium quod orta prius suffusione, & humore circa pupillam valde concreto resiccatoque contractum est. In qua quidem significatione veteres *τὸ γλαυκωμα* vsurpasse testis est Rufus, qui scripsit *γλαυκωμα* atque *καταχυμα* idem mali genus à veteribus esse creditū, à solis tantum neotericis fuisse distincta. A qua sententia Gal. non videtur esse alienus comment. aphor. 3. l. libr. 3. scribens *τὸ γλαυκωμα* *ἔχειν ἰδίαν* *τῇ* *καταχυμάτι*, hoc est, glaucomata suffusionibus similia videri, & eandem referre speciem. Ex quo tamen non sequitur illa eadem esse. Suffusio enim est extranei humoris & aliunde influentis concretio: glaucoma vero ipsius humoris crystallini resiccatio densatioque. Præterea non omnes suffusiones tantæ sunt, vt toti pupillæ prætendantur, & visum ex toto adimant: glaucoma vero crystallini vniuersi est, atque siccitas est per ipsum totum ex æquo diffusa, & ex siccitate concretio. Ad hæc plærque suffusiones curationem recipiunt, cum tamen nullum glaucoma, vt Rufus ait, curetur, vti nec vllus alius morbus ab immodica siccitate contractus.

*Γλαῦξ*, herba est foliis cythi aut lenticulae, quæ auersa candicant, superne virent, ramis è terra quinis senisue, palmeis; tenuibus ab radice, floribus albis violæ, sed minoribus & purpureis. Eam Plinius scripsit *εὐγλαυκῶ* antiquis dictam fuisse. Vocatur eadem & *γλαῦξ* & *γλαῦξ*, à lacte. Cocta enim in forbitione similaginis; ad excitandam vbertatem

tem lactis valere proditur, ex quo intelligitur calidam quodammodo humidamque esse.

**Γλίσκος.** est genus acris campestre, præcipuo cado-  
re ac crispum. Sunt qui Gallicam interpretentur,  
vt Theodorus Gaza. Scriptum reperitur etiam γλίσκος.

**Γλῶκος.** mustum. Est succus vinarum recens expressus. Crudus is est, flatuosus, concoctus difficilis, & crudum succum, etiam si coquatur, gignit. Vnum hoc in se boni continet quod aliud emolliat & relaxet: quod nisi contingat, tanto magis noxius euadit. Calefacit primo ordine præsertim qui ex mediis vis expressus fuerit, hoc est, neque acidis neque austeris, neque dulcibus, ideoque inflammationum mitigatorium est: & ab antiquis ad oris plegmonas parabatur illitionis genus, quæ δὲ γλίσκος τομαζική, ἢ ἡ δὲ γλῶκος dicebatur, vt est apud Aer. lib. 8. cap. 45.

**Γλαῦκον.** mustum vnguentum. Pluribus modis paratum fuit à medicis, vt docet Gal. lib. 7. κε κε γλῶκος. Sed quod simplex est, vt scribit Dioscorides, constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celtica nardo, spatha, aspalatho, fertula campana, costô & musso, circumdatis interim vinaceis vasis, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus bis in die mouetur: postea expressum oleum reconditur. Inter acopa à Galen. numeratur & relaxantia. Itaque iis quos vehemens lassitudo infestat, est vtile. Galfacit, emollit, remittit, horroribus & neruorum vuluæque vitiis auxiliatur, estq; omni acopo iuuantius, vt ait Dioscorides, quod emolliat.

**Γλῶν.** pupilla oculi. cavitates ipsa oculi, de qua vide in dictione κέρον. Ab ea facta etiam metaphorica est ad alias ossium cavitates. Siquidem apud Hippoc. γλῶν significat cavitatem ossis in quam alterum os inseritur, quæ & κέρον appellatur. Inter quæ tamen posteriores medici distinxerunt. Nam auctore Gal. lib. de ossibus, ex cavitatibus ossium capita suscipientibus quæ profundior est, κέρον dicitur: quæ vero superficialia, vt ambigere possis an cavitates sit necne, γλῶν nominatur. Id vero quoniam in latitudine quadam dicitur, iccirco γλῶν dicitur appellatur sinus qui obsecurus est & leuiter cauus. Nec tamen sinus γλῶν dicitur & γλῶν differunt, sed idem sunt omnino. Eiusmodi sinus cum multis in locis corporis, tum in prima ceruicis vertebra apparent gemini, excipientes duo capita secundæ vertebrae.

**Γλῶχον.** pulegium. Herba est fruticosa, semipedali altitudine, foliis sampsiuchi, surculis per intervalla purpureo flore coronatis, vnde multis pulegiū regale nominatur. Alterum genus est flore candido, cui magna cum nepeta & mentha societas. Multū exalfacit & extenuat. Si à pecore gusteretur, balarum ilico dicitur concitare, ex quo quasi βλήχον vocatur. Pulegium autem Latini appellant quod recens incensum pulices enecat.

**Γλῶχον ἀγρία.** dicitur à quibusdam ὀδύνη, vt auctor est Dioscorides: forte quod hic folia & vires pulegio similes habeat.

**Γλῶχον οἶνος.** vinum ex pulegio factitiū. Eius compositio habetur apud Dioscoridem lib. 5. apud Columellam lib. 12. cap. 35. apud Constant. Cæsarem lib. 8. cap. 7.

**Γλῶχον glutinosum.** dicitur & de solidis corporibus & de humoribus. In solidis quidem id est quod fractu est contumax, humore videlicet multo, & qui tensioni cedit, terrenas partes glutinâre, sicut in salice & coriis. huic contrarium est τὸ κρεῦρον, quod plerique friabile interpretantur. In humoribus vero dicitur quod quicquid tetigerit, huic ægre dissolubile adheret, vel quod dum trahitur aut tollitur, continuitatem longissime seruat, vt oleum, mel & adeps. Huic Gal. lib. 11. methodi. med. scribit oppositum esse τὸ ρυθικόν quasi detergium dicas.

**Γλοιῶν.** τὸ ἐπιμύοντες ὀφθαλμοῦ, hoc est, coniuventes oculos versare apud Hippocratem. vnde & γλοιῶν idem quod νύκτωρ, hoc est, oscitanter, & quasi domitanter.

**Γλοιῶς.** fordes quæ in balneis atque etiam palæstra ab hominum cute deradebatur, quoniam in medicina utilis, nunc prorsus neglecta. Calefacit modice, emollit, discutit: rhagadibus, atque condylomatis prodest. Dicitur & ῥύπος: Latini strigmenta & fordes appellant.

**Γλοῦπα.** sunt corpora duò dura in cerebro emittentia, ad latera meatus illius sita, qui à tertio ventriculo in quartum, siue in cerebellum ducit. Producta sunt ex cerebri substantia duriore, supraque & ante conarium sustinent, posterius vero epiphysim σπυγγοειδῆ, inter latus dextrum & sinistrum constituunt meatum, qui à medio ventre ad postremum fertur. Eorum autem vsus est ne meatus ille à supernis cerebri partibus comprimitur & intercludatur. Sic dicta sunt quod his narium quædam similitudo sit: nam perinde ac nates prominent, seque contingunt. vocantur autem & à quibusdam διδύμα, siue διδυμοί. Quidam vero ea parte qua conarium contingunt, διδύμα, conario ipso penem representante, altera vero qua ipsum conarium non est, γλοῦπα, hoc est, clunes natesque, appellant.

**Γλοῦπες.** dicitur apophysis externa eademque maior ossis femoris, quam & ὀστέον μέγαν appellant. Ea in femoris superiori ceruice exterius apparet, ampla multumque gibbosa. Sic autem dicta est vel à similitudine quam habet cum natis, vel quod musculi quibus nates constant, ei præcipue inserantur.

**Γλοῦπα, καὶ**

**Γλοῦπες.** idem quod τὸ γλοῦπες, de qua paulo postea.

**Γλυκὺ.** dulce. saporis genus est. Sic autem dicitur quod veluti subungit, replet, mitigat exasperatas & quasi etolas linguæ partes, &

eas cum manifesta delectatione contingit. Quicquid enim dulce est, moderato calore aqueam humiditatem, si quæ prius inerat, veluti in fructibus acidis, concoquit, sed ita tamen, vt omnem non absumat. Illa autem concoctione tali paulo crassior euadit atque pinguior, & propterea si lingua exasperata est, eâ lenit & veluti inungit, quod propter mediocrem crassitiem & pinguedinem non facile disfluat, neque absumatur, sed diutius inhæreat. Quia vero à moderato calore eiusmodi est, id etiam modice calidum sit oportet, & non longe supra calorem nostrum. Quare sicut aqua calida refrigeratis voluprati est, hætenus scilicet eos excalefaciens dum concretas in iis frigore particulas fundat, non tamen soluat aut secer distrahatur continuum: sic omne edulium dulce delectationem linguæ parit, calidum quidem, non eo excessu vt lædat & molestum sit, sed consistens inter limites fundentis, læuigantis & mollientis: sin ab eo abest delectatio, iam non dulce, sed pingue appellatur. Quoniam igitur dulce in medio fere omnium qualitarum consistit, quæ in lingua fuerint exasperata, lenit: quæ vero præter naturam coierint, aut fusa laxaue fuerint, partim contrahit, partim laxat omniaque quam maxime ad naturæ statum reducit. Itaque quicquid eiusmodi est, inquit Plato, iucundum suauisque & cognatum est omnibus; violentarumque passionum remedium ac medela, nominaturque dulce. Quod autem eiusmodi est, calidum humidumque moderate est, & naturæ tam familiare, vt solum aptum sit corpori nutriendo. Solis namque dulcibus nutritio perficitur, veraque eâ sententia est, si nutrimentum in tertia sui significatione sumatur. Vt enim à calore solis coacti fructus dulces euadunt, sic à nativo corporum calore quod concoquitur, exiit omnes alias qualitates, dulcemque adsciscit, si modo optimum & euchymum alimentum futurum est. Quicquid enim nutrit, plus minusue dulce est. Hæc quidem propria est τῷ γλυκύος significatio, sed à qua dilcedit ea, qua dulce dicitur id quod αἰσιν quidem est, & qualitatibus expers, sed quod tempore dulcem eam qualitatem facile potest assumere. Sic enim aqua optima dulcis dici potest, quam tamen saporis, vt & aliarum qualitarum, expertem esse oportet. Sic etiam pituita γλυκύη καὶ αἰσιν, hoc est, dulcis & insipida, vocari potest, vt Galenus in initio libri de atra bile prodidit.

Γλυκὺ. passum. Vini genus dulce, quod Plinius aliquoties non passum, sed simpliciter dulce vocat, Græcorum imitatione. Olim in Italia frequens, nunc prorsus neglectum. Non est autem prorsus idem γλυκὺ quod αἶνος γλυκὺς. Vinum enim dulce dicitur cuiusque dulcedo aliqua inest, eiusque multa sunt genera tam nativi quam factitii. γλυκὺ vero, siue passum, vni modo vini genus dicitur, quod vniis aut sole siccatis in area, aut in fermento

torrè factis exprimitur, nimirum propter eximiam saporis qualitatē. Cuius tamen aliquot etiam differentiæ Dioscorides enumerat, Creticum, pramnium, protropum, si non siue hepsēma, quod decocto fit musto, sicut Columella parandum docet lib. 12. cap. 39. post traditā alia cap. 27. vini dulcis faciendi rationē. Item quod à nigro colore μελαμύδιον appellatur. Numerantur & à Galeno alia quædam genera, vt Hispanum, Scybelire, Theracum. Omne eiusmodi vinum multum alit, pulsus reuocat, adstringit, venenis medetur. Γλυκὺν βοτάνην. sic dicitur ἡ γλυκύριζα apud Hippocratem.

Γλυκύριζα. dulcis radix. frutex est ramos spargens bicubitales, foliis lentisci densis, pinguibus, tactuque gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis asperiore tantum, atque rubescentes lenticulæ valvulas referente, radicibus prælongis, buxæ colore, gentianæ modo flauescens, sapore dulci, quadatenus subacerbo. Actuario neutro genere sæpe γλυκύριζον, & Galeno lib. 7. τῷ κ' τέτυς absolute γλυκεία dicitur. modice humida est, simulque natura humana frigidior.

Γλυκὺς ἀγρόν. Sic dictum fuisse à quibusdam τῷ ἀγρότονι Dioscorides author est.

Γλυκυσίδη. sic à quibusdā dicta est pronia, quod acinos mali Punici similes habere videatur. σιδίω enim malum Punicum Bæoti appellant.

Γλυκύτης. dulcedo. Ex iis quæ supra dicta sunt πρὸς τῷ γλυκύος, hoc est, de dulci, apparet esse gustabilem qualitatem quæ cum voluptate linguam lenit & subungit: eamque similiter à moderato calore provenire in corpore mediocriter calido & humido, & omnium quæ nutriunt communem esse: recipit autem plus & minus.

Γλυκύφύτον. sic à quibusdā dicitur, ἡ γλυκύριζα, vt habetur apud Dioscoridem.

Γλυκυνος ἐμπλαστος. Glyconis emplastrum. Describitur à Scribonio Largo, vocaturque ab eodem ἵσις. Est & apud eundem aliud τῷ γλυκυνος emplastrum nigrum, quod inter Barbaræ numeratur.

Γλῶσσα ἡ

Γλῶσσα. lingua. Est pars fungosa, medio in ore posita, lèrmonis & gustus præcipuum instrumentum. Rara quidem est supra reliquos omnes musculos laxaque, quo facilius gustus esset. Pluribus struitur musculis, omni fibrarum genere varie admodum intertextis, præter reliquorum musculorum sortem: quorum alii πλάγιοι, alii λοξοί, alii ἐνθεῖς, alii ἐκτρέπονται, hoc est, subrecti, obliqui, recti, transuersi, à Gal. appellantur: quos omnes quidam decem, quidam nouem tantum statuunt. In causa est musculus vnus quidem, sed bifidus à Gal. dictus lib. de musc. dissect. Nec tamen de aliis bene conuenit inter anatomicos, vt idē scripsit lib. de fact. format. Cæterum lingua ad radicē, vbi ossi ὑποειδῆ quasi basi innititur, lara amplexus est. κεφαλῆν αὐτῆς partē Græci dixerunt,




dixerunt, atque etiam *γλῶττι* ut habetur apud Pollucem. definitur autem in angustum, obtusum tenuemq; mucronem qui *αεγλασις* appellatur. Mediam linea quædam dirimit, ut & ipsa, quemadmodum reliqua sensuum instrumenta, gemina foret. Integitur duplici membrana, una quidem interiore & muscularis omnibus communi, altera vero externa & prætenui, quæ eadem continuaque est cum interna stomachi tunica. Venas præterea duas maiusculas, totidemque arterias habet, & duo neruorum coniugia, vnum durius à septima coniugatione, quod in musculos eius distributum, eam admodum mobilem volubilemque reddit, alterum vero mollius à tertia. Ea enim maxima sui parte in linguæ tunicam distribuitur gustus gratia, ob idque tota illa coniugatio à Galeno gustatoria dicitur. Sic quidem instructa lingua explanatur distinctæque vocis fictrix atque

moderatrix est, & saporibus præcipue diiudicat, eximio gustandi sensu prædita.

*Γλωσσόμητρον* η

*Γλωσσόμητρον* nomen est Atticum, ut scribit Gal. commentar. 2. *εἰς τὸ ἀεὶ ἀγμῶν*, & proprie significat arculam, in qua homines recondunt res preciosas, & quam multi iter facientes portant. est autem oblonga & angusta. Ab eius similitudine medici Hippocr. posteriores (nam Hippocratem id genus instrumenti non nouisse Galen author est) machinam quandam chirurgicam, fracto femori vel cruri, ubi callus circumdatur, accommodatam *γλωσσόμητρον* nominarunt. Est autem machina caua, oblonga, & ad femoris proportionem arcta superna parte trochleas vtrinque singulas habens ad latera fitas, & inferna parte transuersum axem, ad quem alligati laquei contrarii nixu toti membro gemina tensione efficiunt. Sic autem habet eius descriptio.

A. axis, ad quem laqueorum habentur, siue appendices relegantur.  
B. laqueum superior.  
C. laqueum inferior.  
D. pars inferior glossoconi.  
E. trochlea.  
F. habentur siue appendices laquei superioris musculi, ad tensionem efficientes.  
G. appendices laquei inferioris, tensionem diffundentes.



Id habet, ut ex figura supra dicta patet, ab ima parte axem, ad quem extremi laquei in diuersa extendentes deligantur. Itaque si femori curique aptandum est, iniiciuntur laquei extremis partibus ossis fracti, fiuntque ex duabus appendicibus siue habenis, sic ut quatuor vterque capita habeat, bina à dextra parte, totidem à sinistra. Ex iis capitibus quæ inferioris laquei sunt, per foramina facta in inferiori parte glossoconi ad axem duci debent, quæ vero superioris, primo procedere ad superiora, deinde ipsa quoque per latera glossoconi perforata traici, quibus foraminibus trochleæ inclusæ sint. Vtrinque autem ab exteriori parte glossoconi, superioris laquei capita ferenda sunt ad axem. His enim ita constitutis, una axis cōuerfio, pariter ambos laqueos & quatuor appendices extendit, sed contrario prorsus nixu. Nam qui ad inferiora fracti ossis alligatur laqueus, os ipsum deorsum versus extendit, qui vero ad superiora religatus est, sursum os adducit. Earum tensionem altera, quæ vtrique membrum tendit in directum, Græce *εὐθύπορος*, id est, in directum procedens, nominatur: quæ vero prius sursum, mox deorsum agitur, *μεταπλάτη*, quasi translatinam dixeris: si quidem per trochleas quæ in lateribus glottocomi sunt posita, circum-

actio siue reflexus, siue translatio fit à superioribus partibus ad inferiores. Licet porro, ubi crus sic extensum est, in posterum quotidie hanc laqueorum in diuersas partes intentionem corrigere, valentius vel lenius extendendo. Sic quidem Gal. *γλωσσόμητρον* suum descripsit tum comment. 2. *εἰς τὸ ἀεὶ ἀγμῶν*, tum lib. 6. meth. med. ubi etiam docuit licere & *σπλῆνα* vocare eiusmodi machinam, & cum adiectione *σπλῆνα μηχανῶν*, aut *γλῶττι μηχανῶν*. Habetur apud Orisabium in lib. de machinamentis etiam aliud glottocomum, quod ad Nymphodorum auctorem refertur, sed æquilaterum, non oblongum est.

*Γνάθος*. gena. maxilla. bucca. proprie dicitur ea pars faciei quæ τοῖς μύλοις subiecta est. Significat autem quemadmodum & η *γῆμις*, tam supernam quam infernam genam. Siquidem apud Hippocratem *γνάθος* & *γῆμις* confundi annotauit Gal. comment. 2. *εἰς τὸ ἀεὶ ἀγμῶν*. vide *γῆμις*.

*Γραφάριον*. herba est foliis candidis & mollibus, quorum pro tomento usus esse potest: inde *γραφάριον* dicta est quasi tomentitia. Nam & Dioscorides folia dictamini, quod mollia sint, *γραφάριον*, hoc est, tomentitia & lanca, appellauit: & pars cucurbitæ interior, quæ eius semen complectitur, ab Aetio dicitur

*χαλαρότης*, propter candorem & molliem.

*Γυμνάσιον* autem Dioscorides centunculum vocari Romæ prodidit & centuncula sem herbam. Est enim centonibus cum tomento maxima cognatio. Aliqui, vt Plinius ait, *χαμαίηλοι* vocarunt. Sunt qui eam esse putent quæ vulgo cruciata dicitur.

*Γύσιον*, legitimum, verum. Quæ vox proprie ad morborum species pertinet: nec eam aliis in rebus cum Hippocr. tum alii præstantes medici vsurpare consueuerunt. Quare nec de sudoribus, nec deiectionibus, nec aliis eiusmodi recte dicitur, vt annotauit Gal. comment. *εις τὸ ἀεὶ διαίτης ὄξεναι*.

*Γόγγυς*, vel potius *Γόγγυς* ἢ *βρυχόκλη*, hoc est, gulæ tumor apud Hippocr. Sunt enim *γέγυς* proprie eminentiæ quædam rotundæ in truncis arborum. In qua significatione etiam vsurpauit Theophrastus lib. de plantis, scribens, *ἐν αὐτῇ καὶ ἴσται τὰς κομμημένους ὑπὸ πινυ γόγγυς*, ἢ τὸ ἀνδρόγον, οἷον ἡ ἐλαία. hoc est, aliqua vero etiam habet vocatos à quibusdam gon-gros, aut aliquid simile, veluti oliua.

*Γόγγυς*, ἢ *Γόγγυς*, rapum, rapa, duorum generum est. vñ satium, alterum sylvestre. satium duplex traditur. aut enim in latitudinem funditur, aut in rotunditatem glomeratur. Sylvestre in longitudinem excurrit. Proprie autem *γόνυλη* vocatur quod rotundum est.

*Γόγγυς*, dicuntur apud Hippocrat. τὰ σφαιροειδῆ ὡσπερὶ κέλευπτα, hoc est, globuli orbiculiue quasi cataportia.

*Γόγγυς*, τὸ στρογγύλον, hoc est, rotundum, apud Hippocr.

*Γομφίασις*, affectio est dentium vel gingivarum: alius molarium, alius maxillarum à dentitione dolores interpretatur, alii aliter *γομφίασιν* siue *γομφιασίων* vocantes, vt habetur apud Helychium, dentium *συνθλασίων*, ἢ *συνθλασίων*, ἢ *συνθλασίων*, hoc est contractionem, stridorem, aut stuporem. Sunt autem qui eo nomine non aliud intelligant quam dentium compages. Ad eam affectionem Dioscorides decoctum cornu ceruini commendauit, scribens ipsum *παρηγορεῖν τὰς γομφιάσεις*, hoc est, affectiones dentium mitigare. id quod videtur de dolore intelligendum, ad quem proprie videtur τὸ παρηγορεῖν pertinere, alioquin per *γομφίασιν* dentium mobilitatem, eorum præsertim qui *γομφιοί* dicuntur, & per *γομφίασιν* iuncti sunt articulatique, non absurde dici posse crederem.

*Γομφιοί*, clauales, seu molares dentes. Sunt dentes asperi, inæquales, ampli, lati, molidis atterendisquæ cibis comparati, à caninis ad extremam vsquæ mandibulam pluribus radicibus affixi. Dicuntur *γομφιοί* quod clauorum modo genis infigantur. Vnde & *γομφίασις* species τῆς συνωρθρώσεως dentium ferre propria, de qua mox dicitur. Iidem etiam *μόλαι* foeminino genere à Galeno appellantur, & masculino *μόλοι* ab Aristotele & Rufo. Sunt autem molis quibus cereales fruges in farinam vertuntur, non solum vsu

similes sed figura etiam asperiore, inæquali & lata, præsertim qua parte sibi occurrunt, & cibos comminuunt. Altera vero parte qua in genas inserti sunt, *πολύριτοι*, hoc est, multifidi, sunt, sed vario modo. Genæ namque superiori tribus, inferiori duabus radicibus adhaerescunt, interdum tamè pluribus vel paucioribus. In quo tamèn obseruatum est superiorum dentium plures semper esse & firmiores radices. Sunt autem molares dentes vt plurimum viginti, quini scilicet in vnaquaq; parte. In quorum genere etiam censentur qui omnium nouissimi oriuntur, quos Graeci *συνωρθώσας*, Latini genuinos vocant. vide *ὀδόντες*.

*Γόμφωσις*, est species τῆς συνωρθρώσεως: dicitur, vt ait Gal. cum os ossi clauo modo infigitur. Idè quoque eam diffinit esse *συνωρθώσιν κατ' ἐμπέδον*. Verum talis ossium *συνωρθώσιν* ambigua est & prope ad *σύνφωσιν* accedit, cum scilicet quippiam tam exacte infixum est, vt ne tantillum quidem loco moueri possit, sicut habet in dentibus. quos tamen per *γόμφωσιν* iunctos esse; non autem à uiculis suis adnatos indicio est quod vel sponte decidunt vel eruantur. Per *γόμφωσιν* quoque iuncta quædam iossa dici possunt in carpo, metacarpo, tarso, pedio & aliis quibusdam partibus, synarthroses enarthrosi & arthrodiax similes; sola motuū magnitudine ab ea differentes.

*Γονή*, genitura, eadem & semen dicitur. Idem enim est *γονή καὶ σπέρμα*: ratione fortasse differre videbuntur. Aristoteles aperte vtrumque distinxit lib. i. de generatione animalium, his verbis: Genitura id vocatur quod à generante proueniens causa est, quæ prima obtinet principium generationis, videlicet in iis quæ coire natura voluit. Semen autem est quod ex ambobus coeuntibus illis originem trahit, quale semen plantarum omnium est, & animalium nonnullorum, in quibus sexus distinctus non est, velut id quod ex mare & foemina primum miscetur, quasi conceptus quidam aut animal. Quibus verbis Aristoteles significat genituram esse causam principiumque generationis proueniens à perfectis animalibus quæ natura coeunt, semen vero tantum plantarum esse & animalium imperfectorum: deinde quod genitura sit ens naturale imperfectum, principium tantum alterum generationis obtinen, semens vero ens aliquod sit perfectum, ex duobus rerum naturalium principis constans, cuiusmodi est nux, triticum, hordeum, & alia semina eiusdem generis, quæ quidem perfecta sunt, non minus quam ipsum animal perfectum est. De qua Aristotelis sententia abundè diximus in annotationibus nostris quas in lib. Hippocratis de genitura dudum edidimus. Verum Hippocrates, sicut Galen. annotat, non ipsum modo semen recens emissum, vel in suis vasis contentum, sed quamdiu à concepto etiam foetu species seminis adhuc apparet,

paret, siue per abortum, siue per dissectionem, *παιον* appellat, nondum illi tribuens factus nomen, vt lib. de natura pueri, vbi exponit quæ ancillæ suæ, die à conceptu sexto, acciderint.

*Εναις* etiam ab Hippocrate appellari partes naturales quæ generationi inserviunt, author est Gal. comment. 3. *εις τὴν αἰσθητικὴν ἀφροδίτην.*

*Γαστήρ* quoq; nomen est pelli ad conceptū perutilis, qui describitur à Paulo lib. 6. c. 24.

*Τοκοειδὲς ἐκταχυρμημία* dicitur apud Hippocratem quod in vrina pendet genituræ simile: Species est τὸ ἐκταχυρμημίατος genituram referentis, hoc est crassioris, candidioris, rotundioris, magisque compacti. vide *νεφελή*.

*Ενέρπησις* generali quidem significatione dicitur omnis inuoluntaria seminis excretio, siue intento pudendo, siue citra pudendi tensionem. Sed quæ proprie gonorrhœa dicitur auctore Gal. lib. 6. de loc. aff. est perpetua seminis excretio sine pudendi tensione. Itaq; hæc non pudendi, seu propriorum seminis instrumentorum quæ spermatica vocantur, affectio est, sitque reteratrice eorum facultate resoluta, siue ex eorum fluxione, siue ex satyriasi præcedente, acciditque tam viris quam mulieribus, sed maxime puberibus. Quæ vero intento pudendo fit, propter conuulsionem accidit, inque ea duo morbi coniunguntur.

*Γίνος* idem quod *ἡ γυνή*. sic enim appellare solebat Xenocrates, vt refert Galenus.

*Γόνος ἡγερέλιος*, sic à quibusdam dictum est helleborum album, vt habetur apud Dioscor.

*Τῶν* genu. est femoris & tibiæ dearticulatio. In hac cum, sicut in aliis omnibus, sinum quendam esse oporteat, qui prominens alterius caput excipiat, caputque hoc tam rotundum esse debeat, vt apte & sine vlla molestia in cavitatem eam inseritur, femoris extremitas inseritur, eamq; tibiæ caput excipit. Tibia enim cum femori subiecta sit, duo eius capita duobus sinibus suis, qui neruo & cartilagineo discrimine apte distinguuntur, admittit. Est autem ea dearticulatio omnium expeditissima iustissimaque, vt scripsit Hippocr. lib. de fracturis, præterea firmissima, magnoq; naturæ artificio comparata, vt quæ in ea epiphyse & cavitates ita construxit & ad amissim fabricata est, vt neque laxior sit epiphyseon in cavitates ingressus, neque etiam adstrictior. Continentur autem & firmantur extrinsecus superciliis quibusdam ipsorum ossium & ligamentis, aliis quidem in profundo positis, aliis autem in circuitu totam dearticulationē comprehendentibus. Quo vero firmior etiam fieret, eam anteriore parte rotula seu patella, quam *μύνδον* & *ἐπὶ γονατῆς* appellant, muniuit, quæ prohibeat ne femur curuatis aut per declina currentibus loco excidat & dilabatur.

*Γερρονίας*. dicitur à quibusdam corallium, propterea quod quamprimum vbi ex alto in ætrem profertur solet lapidescere. Nam &

Gorgonas in lapides verfas fingunt poætæ.

*Τερδύλλιον* ἦ

*Τερδύλλιον* dicitur apud Paulinam quod alii *τερδύλλιον* appellant: nisi mendosus est codex. Est autē fefeli, vel eius semen.

*Γαστήριον*. frutex est exiguus, laniger, palmæ folio, similem barbaræ nuci gerens fructum, cuius in exteriori bombyce lanugo netur in linum candidissimum molissimumque, quod cotonium vulgo dicimus, & lanuginē ipsam cotonium.

*Γαστήρις*. dicitur pellis vmbilicum ambiens, quod corrugata senectutis indicium sit.

*Γεσμία*. scripulum. Est vigesima & quarta pars vnciæ. Tot namque scripula sunt in vna vncia. Eamque ob causam, vt Fannius scribit, ponderis id genus Græci *γεσμία* dixerunt, quod vncia in tot huius generis pondera diuideretur, quot essent apud Græcos litteræ, quæ illi *γεσμία* vocant. Fannii versus sic habent:

*Vncia fit drachmis bis quattuor. unde putandum.*

*Grammata dicta, quod hæc viginti quattuor in se*

*Vncia habet. tot enim formis vox Græca notatur,*

*Horis quot mundus peragit noctemq; diemq;*

Qua in re Latini Græcos imitari à scribendo primo scripulum, deinde scripulum dixerunt. Qui scripulum dicunt, sine auctore & ratione sic dicere videntur. Eius nota apud Latinos fuit *γ*. Apud Græcos veteres raro in vsu fuit, sed eius loco fere semper *δράχμον*, vel *δράχμῃ* dixerunt. Quem loquendi modum etiam Plinius non mutauit, cum haberet scripulum, quo alias vtitur, & dimidium scripulum posset dicere.

*Γεσμίη κυκλοτερής*. dicitur circulus pupillam ambiens, qui alio nomine *λεῖς* appellatur.

*Γεσστής*. dicitur à quibusdam hordeacea farrago, quāquam & multi non indocte semiaridum scænum interpretentur. Reperitur & *κράσις*.

*Γεσστής*. dicitur pellicula illa quæ lacti aut iuscullo refrigerato superinducitur. Est enim veluti rugosa cutis, qualem vetulæ habent.

*Γεσφισσίδης*. dicitur apophysis ossis petrosi, quæ alio nomine *στροβιδής* & *βήγονοειδής* vocatur. vide in dictione *βήγονοειδής*.

*Γεσφισσός διονκός*. ferramenti chirurgici genus est, telis è corpore extrahendis accommodatum: sic dictum quoniam auctorem Dioclem habet, qui inter priscos maximosque medicos habitus est. Lamina vel ferrea, vel ænea etiam ab altero capite duos vtriusque deorsum conuersos uncus habet, ab altero duplicata lateribus, leniterque extrema in eam partem inclinata, quæ sinuata est: insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perforata est. Hæc iuxta telum transuersa demittitur, deinde vbi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, vt telum foramine suo excipiat. Cum in cauo mucro est,

ilico duo digiti subiecti partis alterius vncis, simul & ferramentum id extrahunt & telum. Descriptio hæc habetur apud Celsum lib. 7. cap. 5.

*Γερμασμον*. quid significet apud Hippocrat. vide Galenum in lib. 1. prorrhethici comment. 3. aphor. 8. ubi etiam annotat quosdam scribere *γερμασμον*.

*Γυμνόν*. dicitur à quibusdam *σικυς ἀγριος*. vt habetur apud Dioscoridem.

*Γυμνόν*. *ἐκόν τὸ σῆμα*. totum corpus apud Hippocrat. lib. 6. *τῷ ὁμιδύματι*. vt Gal. commen. 4. annotauit.

*Γυμνόν*. *ἀπὸ γυμνῶ*. καὶ ἐκ τῶν τῶν δυνάμεων. hoc est, enervatio, & vires exoluo, apud Hippocrat. vt exponit Gal. comment. *ὅτι δυνάμεις ὀλίγαι*. significat etiam *γυμνάσιον* apud eundem idem quod *ἐλάττωσι γυμνάσιον*. hoc est, decurtari, vt interpretatur Galen. comment. 3. in lib. de artic. ac quanquam *γυμνάσιον* proprie maiora membra dicantur, vt pedes manusque, de reliquis tamen omnibus partibus dicitur.

*Γυμνάσιον*. exercitatio. duplicem habet significationem: vnam communem, qua dicitur omnis motus vehementior anhelitum immutans. Terminus enim vehementiæ est anhelitus alteratio: quando in quibus nulla sit anhelitus mutatio, has nondum exercitationes vocamus. Quod si quis magis minusue, celerius aut crebrius iam ex motu aliquo respirare cogitur, huic certe tantus motus exercitatio fuerit. Ea quidem communiter exercitatio vocatur, significans idem quod *πῆνος*, id est, labor: quippe cum & qui fodiunt, & qui metunt, & qui equitant, non laborent modo, sed etiam exercitentur, communi saltem exercitationis appellatione. Proprie vero exercitatio appellatur quæ eo loco suscipitur quem Græci *γυμνάσιον* appellant. Is locus erat in publico quodam vrbis loco extructus, quo vngendi, fricandi, luctaturi, discum iacturi, aut tale quippiam facturi consuebant: cui qui præerat, *γυμναστής* vocabatur. Callebat enim omnia exercitationum genera, earumque usum & modum nouerat. Sunt autem exercitationum tria saltem prima genera, vti que quot motionum differentiarum: quippe aut à nobis ipsis mouemur, aut ab aliis, aut à medicamentis. duæ priores sanis & ægris communes sunt, tertia species nequaquam ad sanos pertinet. Ab alio quidem motus fit nauigatione, equitatione, uestione. A nobis ipsis mouemur cursu, *ἐκπλεδρισμῷ*, *πυγλισμῷ*, saltu, disci iactu, lusu coryci pilæque seu magnæ seu parux. Mistus vero ex ambobus motus est equitatio violentior, lucta, pugilatus, *ὁπλομαχία*, *σκιωμαχία*, *ἀκροχολογίος*, & pleraque alia eiusdem generis exercitia: sed in his quoque complures differentiarum inueniuntur: nā quædam aut violentæ sunt grauæque acrobustæ, aut leues, celeres & concitatæ, aut pariter violentæ & celeres. Quædam enim lente motis sunt, quædam ocysime agitatæ, & quædā robore ac nixu adhibitis, quædam

sine his, adhuc quædam cum robore pariter & celeritate, quædā languide. Ac quod violentè quidem sine velocitate exercetur, *ἐπιπορῶν*, id est, valens, vocatur: quod violenter & cum celeritate, *εὐποδῶν*, id est, vehemens. Violenter autem robuste dicere nihil referat: sed tardā quidem exercitatio, vt scribitur apud Hippocrat. lib. 6. *τῷ ὁμιδύματι*, pinguefacit: velox autem carnes & adipem detrahit, succorumque abundantiam minuit. Præterea aliam partem aliarum aliis magis fatigant: quippe iratio cursusque crurum exercitationes sunt. Acrochirismi & sciomachiarum brachiorum & manuum propriarum. Lumborum autem assidue se inclinare, ac rursus reuocare: item alteres attollere. Thoracis vero & pulmonis maximæ respiraciones propriarum exercitationes sunt. Totius vero corporis est parua pilæ lusus. Cæterum hæc ipsa exercitationum genera aut priuato, aut publico in loco obeuntur. In illo quidem magna ex parte nulla adhibita gymnastæ cura industriaque, quippe quæ sapientius non exercitationis causa, sed necessarij operis, vel etiam meditationis vsurpantur. Nam cum fodit quis, aut remigat, aut arat, aut metit, cum domos ædificat, seu ferrariam æriariamue facit, aut alia quæcunque homines, vel opifices vel non opifices in vita vsus causa exercent, facit, operis potius causa quam exercitationis ea facit, id eo quæ perpetuum diem ea obit, neque vnquam, ne post cibum quidem intermitterit, adeo vt plerumque inter causas insalubres huiusmodi exercitatio habeatur. At quæ publico in loco suscipitur, cui peritus gymnastes præfectus est, salubris semper est, & maxima artis tuendæ sanitatis portio, vt quæ non alio tempore quam ante cibum obeatur, & præparato semper corpore, serueturque perpetuo modum, & vocatur *ἐπιπορῶν*. Itaque simplex vniuscunque modi exercitatio ea est quam quisque priuatim vsurpat: quam vero gymnastes moderatur, tribus vtiq; partibus constat, videlicet præparatione, ipsa exercitatione, & apothera pia. Præparatio perficitur frictionibus & inunctione. Sic enim calefactis & præmolitis solidis partibus, adhuc vero humoribus tenuatis, & exiguis meatibus laxatis nullum periculum nec rumpendi alicuius, nec obstruendi exercitatio impendit: quibus quidem vitandis eiusmodi præparatio adhibetur. Vt autem hæc fiant, oportet linteolo totum corpus mediocriter fricando prius calfacere, mox oleo fricare. Eiusmodi frictionem *πρόπιν ὁμαστικῆς* Gal. appellat. Ab ea dandum se exercitationi, quæ pro ratione corporis, naturæ, sexus, ætatis, virium & temporis anni constitutionisque præsentis oportet esse vel violentam, vel celerem, vel remissam: item longam vel breuem assiduam vel interpolatam, & quæ vel totum corpus æqualiter, vel aliam quamvis partem egregie præter cæteras fatiget. Tum demum *τῷ ἐπιπορῶν* vtendum, quæ constar frictionibus



tionibus & motibus aliis, sed multo magis moderatis & remissioribus quam per ipsam exercitationem sicut ante in dictione *ἐν δὲ ἐκείνῃ* ostendimus. In hunc modum perfecta exercitatio optima est & saluberrima, quod eam duo maximè commoda sequantur, excrementorum inanitio, & *ἐνέργεια*, id est, commoda solidarum corporis partium habitudo. Nam quoniam vehementior motus exercitatio est, necesse quidem est tria hæc ab ea perfici in corpore exercitando, membrorum duritiem ex mutuo ipsorum attritu, genuini caloris augmentum, & spiritus citatiorem motum. Sequuntur vero hæc reliqua omnia priuatim commoda, quæ corpus exercitiis excepta refert, utiq; ex membrorum duritia, tum ut minus ex labore afficiatur, tum ad actiones robur: ex calore, tum deducendorum in corpus validè attractum, tum immutationem magis expeditam, tum nutritionem magis felicem, tum ut singulæ corporis partes sint (vrita dicam) persusæ. Cuius fusionis beneficio & solida mollescere, & humida tenuari, & exiguos corporis meatus laxiores fieri accidit. At ex spiritus valentiore impetu & purgari hos omnes meatus necesse est, & excrementa expelli.

*Γυμναστική*. gymnastica. Est pars medicinz sanitatem exercitatione conseruans. Pertinet ad *ὕγιον*. Eo autem nomine intelligere oportet eam quæ modum in exercitatione adhibet, & quæ scopum habeat tantum exercere corpus quantum confert ad tuendam valetudinem. Est etiam alia gymnastica vitiosa, athletis propria, nomine quidem suo insignis, sed extra naturæ limites progressa, quæ non optimum finem habet, sed molem corpori adicere, quæ aduersarii prosternantur in certaminibus. Quorum quidem habitum etiam si Hippocrates summum bonitatis attingere dicat, non est tamen simpliciter bonus, sed ut ait Plaro lib. 3. de republ. vituperandus, ut inutilis ad omnia ciuilia negotia, quemadmodum suo loco annotauimus.

*Τριφύλον ὄσπρον*. hordeum nudum. Cereale semen est in Cappadocia proueniens, ut scribit

Orribalius lib. 1. collect. medicinal. cap. 1. forte id hordeum quod decorricarum nascitur, & quod vulgo hordeum mundatum appellatur.

*Τριφύλον*. sic dicitur à quibusdam *ἰβρηνία*, hoc est vitis albà, teste Plinio.

*ἡ Τριφύλα*. muliebria, menstruarum purgationes. vide *ἡ τριφύλου ἄσμα*.


*Τριφύλον*. dicitur à quibusdam *ἡ σίλη*, id est, stibinum, quod eo mulieres decoris causa cilia illinerent. vide *σῆμα*.


*Τριφύλον*. est mammarum muliebrium summum incrementum: non est ea affectio præter naturam, sed aucta. prouenit pinguedine mammarum.

*ἡ ἑν*. pollen ex farina, qui, ut scribit Paulus, amylo virtute respondet.

*ἡ ἑν*. gypsum. Id dicitur quod ex lapidibus totis & ambutis exprimitur. Cognata calcres est. Plura eius genera. Nam è lapide coquitur, & è terra foditur, & è summa tellure colligitur, ut habetur apud Plin. Adstringit, glutinat, sanguinis profluvia & sudores coepescit, sed potum strangulat.

*Τριφύλον*. sic Archigenes non male appellauit, authore Galeno, speciem quandam pulsus, qui non toto arteriæ circulo, sed eius angulo tantum ferit. fit propter maximam imbecillitatem facultatis quæ attollere onus nequit. Tunc enim flexum in alto quendam pulsus repræsentat, non circuli figuram: quæ quidem flexum Archigenes *ἡ τριφύλου* nuncupauit. Nam altitudo arteriæ non ut circuli iam figura, sed ut vertex trianguli mouet ractum. Id quod magis etiam ei accidit horrescenti & rigenti præ frigore, ut quomodo libet aliter indurata. Itaque initio grauium accessionum & cum frigore inuadentium talem pulsus cernere est: non in his tamen omnibus vel solis, ut quidam putant. Nam si propter duritiem arteria ægro flecti possit, facultasq; imbecilla grauetur utrinque, perdit circuli veluti circumferentiam. refert autem verticem trianguli, quod propter duritiem arteria nequeat paulatim flecti, & ad profunditatem utrinque inclinari, sed vibretur potius quam flectatur.





# I O. G O R R A E I

## P A R I S I E N S I S

### Definitionum medicarum

### T O Δ.



*Ardes.* dicuntur quidem proprie magnæ lampades & ardentes. Per metaphoram vero sic vocatur caput allii, eo quod multis spicis in modum lampadium compar-

atum sit, sicut annotauit Galenus *εἰς τοῦς γλῶσσους*.

*Τὸ δαρύνει.* mordacitas. Est tangibilis qualitas, quæ in corpus subiens exasperat, & punctationis sensum inducit. Qualitas est tactus propria, non gustus. Quod autem lingua aliquando diiudicetur, non fit proprio linguae sensu, sed communi, quoniam, ut reliqua corpora sensilia, tactus sensu prædita sit. Quippe si in aliam quamuis cariem cute nudatam inieceris quod mordicar, & illam sane non minus quam linguam mordebit. Est autem mordicatio tribus istis saporibus, acido, amaro & acri communis: sed acido quidem, ut frigidus simul & subtili, amaro vero, & acri, ut calidis, mordacitas inest. Si quidem tam ea quæ frigida sunt quam quæ calida, sicutem penetrant, & in sensibiles partes per carnem dispersas subeant, mordicationis sensum inuehunt, dispari tamen, ut docuit Galenus, modo. frigidum namque non nisi in raris corporibus, qualia sunt vulnerata omnia, oculi, os, nares & veter, mordicat: calidum vero in solidioribus. Ac frigidum quidem spiramenta cuncta subiens omnes circumquaque partes amplectitur, contrahit, condensat, & à continuis auellit, unde molestus mordacitatis sensus exoritur: calidum vero in duriora etiam corpora subiens, ea dissoluit, fundit, colliquat, itaque earum cōtinitatem multo quam frigidum celerius diuellit, secat, distrahit, unde mordax necessario sentitur, velut aqua feruens atque ipse ignis. Nec tamen quicquid calidum aut frigidum est, mordax apparet, nisi

etiam conuellar & violenter condenset. Sic utriusque immoderatus aucti communis est mordicatio. Quoniam autem quicquid mordicat in profundum subire & penetrare debet, ideo necesse est, vel id quod mordicat tenuis esse substantiæ, vel quod mordeatur tam rariū esse, ut intra se facile admittat quod mordicandi vim obinet, vel utrumque, tum quod mordet, tum quod mordeatur, rara tenuique substantia prædita esse. Calida quidem quæ mordicant aut amara aut acria sunt, & omnia tenuium partium quadamtenus existunt: in quorum tamen genere non quo quicquid tenuius est, idem etiam magis mordicet necesse est: quin potius magis mordicat quod crassius est, minus autem est mordax quod est tenuius. Frigida vero, cum & ipsa mordeant, ut Hippocrat. dixit, dubitari tamen potest an tenuium partium ea esse oporteat. Quippe acetum & Boreas mordent forte propter partium tenuitatem, quæ tamen niui & aquæ frigidæ non minus mordacibus haudquaquam inest, ut docuit Galen. lib. 1. de simpl. medic. ostendens non omne quod mordax est, idem etiam temere esse oportere. Hoc autem inter ea discriminis est, quod frigida tenuium partium dura etiam solidaque corpora mordicent, quæ vero crassum sunt partium, ea modo quæ sunt vlcera aut rariora. Caterum non est idem sensus omnium quæ mordicant. Eorum enim quatuor discrimina in maioris & minoris collatione Gal. docuit in libr. de multitud. Primus, inquit, gradus eorum est quæ mordendo pruritum mouent, ut scilla. Secundus eorum quæ vehemētius id agunt, ut cepa. Plurculum enim si corpus nostrum eiusmodi medicamentis assuescat, vlcerabitur. Sūt præterea quæ hoc magis acria sunt, atque vbi vlceratis præsertim admoventur, horrorē pariant vel, si acriora sint, etiam rigorem. His vero respondent, inquit, quatuor humorum

*Adhuc per lacryma.* Est humor ex oculis distillans  
Cuius rei multæ sunt causæ atq; inter se et-  
iam contrariæ: nam & præ nimia lætitia &  
præ nimio dolore æque lacrymæ excutiu-  
tur. Ad hæc fumus & alia lacrymas mouet.  
Id quod diuersis accidit rationibus. Quas ut  
intelligamus, sciendum est ad singulos ocu-  
los quatuor inesse glandulas, in utroque sci-  
licet angulo geminas, vnâ infra, alteram  
vero supra, quæ humiditate à cerebro dela-  
bente replentur, eaque oculos humectant,  
ne nimio motu exiccati deteriores euadant.  
Ab his dolor, cui vis inest meatus refrigerâ-  
di atque adstringendi, spissitudine meatuum,  
humorem quem illæ continent, exprimit,  
pariterque commiseratio & tristitia: lætitia  
vero humorem ex laxitate meatuum effun-  
dit, in naturis præsertim humidioribus at-  
que rarioribus. Nam quicumque arctiori-  
bus constant meatibus, lacrymam neutra  
de causa mittere consueuere. Similiter fu-  
mus & alia & reliqua acria oculos morden-

Δάκτυλοι. digiti. sunt partes manuum & pedum extremae, unguitibus firmatae, oblongae, teretes, & singulae ternis ossibus constantes. Vtrique in manu & utroque similiter in pede quini habentur, & tales ut descripti sunt, exceptis pedum pollicibus, qui duobus tantum ossibus componuntur. sunt autem digiti manus hi: μέγας, qui & αἰχμή, λεγόμενος,

μείος, ὀλίγιμος, μικρός, singuliter na ossa continent, mutuo sibi colligata & ordine sibi succedentia velut in acie: vnde & φάλαγγες à Græcis appellantur. Ab aliis autem οὐνυμίδες, à turma equitum, quam Græci οὐνυμίδες nuncupant. Latini communi vocabulo digitorum internodia dicere possunt. Græci vero etiam eorum singula suis nominibus distinxerunt, à quibus primi articuli metacarpio proximi, μετὰ καρπίου, medii καρπίου, postremi μετὰ δακτύλου appellantur, & ab his vnguium principia seu radices ῥίζον, extremitates deinde digitorum fines ῥίζος καὶ κορυφή, ut scriptum est à Rufo in partium hominis nomenclatura. Porro ima digitorum ossa metacarpio per diarthrosin alligantur, excepto pollice, cuius os infimum non metacarpio, sed carpo per diarthrosin copulatur. Ex quo quidam censent os illud non ad pollicem, sed ad metacarpium pertinere, ipsumque pollicem, ut & eos qui sunt in pedibus, duobus tantum ossibus constare.

δακτύλος, digitus, minima mensura est eorum quibus rerum intervalla dimetiuntur. Hæc autem non secundum digiti longitudinem, sed secundum eius latitudinem siue crassitudinem accipi debet. Hæc sæpe Dioscorides utitur, ut de anchusa scribens, δακτύλου τὸ πλάτος, hoc est, digiti crassitudine: & de buniō, καυλὸς αἰνῶς πικρὸς ἀγρῶν εὐμήκης, πλάτος δακτύλου, hoc est, caulem emittit quadratum, oblongum, digitali crassitudine. Quoniam vero indice & infami & medico pollex plenior & crassior est, minimus exilior & tenuior, differentiam quæ est in herbarum radicibus & caulibus, etiam his duobus digitis explanant. Ut de radice eryngii, δακτύλου τὸ πλάτος, hoc est, digiti magni crassitie. & de spinæ albæ caule, καυλὸν τῶν δύο πλάτος, δακτύλου τὸ μέγεθος ἢ καὶ μείζονος πλάτος, hoc est, caulem supra bina cubita altum, maioris digiti aut etiam amplioris crassitudine. De radice inulæ Egyptiæ, πλάτος δακτύλου μικρῶν. Et pluribus in locis similiter, in quorum nonnullis & διδακτύλου & πενδακτύλου mensuram inuenies.

δακτύλοι, dicuntur palmæ fructus, quos Græci alio nomine φοινικοβάλανες, Latini palmas, Franci dattas vocant.

δακτύλος. Graminis aculeati nomen est, quod etiam καρπύριος dicitur. Eius tria genera statuuntur. Vnum cui in cacumine aculei sunt, plurimum quini: quod ab aculeorum, quasi digitorum, numero δακτύλων appellatur. Alterum αἰγίσον simile, δακτύλων etiam dictum, quia ad reducias optimum sit, & digitis medeat. Tertium genus τὸ δακτύλον tenuius nascitur in parietinis & regulis, cui caustica vis inest.

δαμασκότιον, dicitur à quibusdam τὸ ἀλυσμα, sicut habetur apud Dioscor. & Galenum.

δαμάλη, sic dicitur à quibusdam τὸ δαμάλη ἀλδελή, hoc est, laurus Alexandrina: ut habetur apud Dioscoridem.

δαμάλη ἑεροκαλιέρον, Describitur ab Actio lib. 7.

cap. περὶ ἑεροκαλιέρον.

δαμάλη & δαρός, vide in Ἀπρίο ἀλυσμα.

δαρός, vna est è quatuor membranis quæ testes innoluunt. Earum prima & intima ἐντρίδιος est: post eam ἐπιτρίποιος: tertia δαρός, carnosa, erythroide multo valentior: quarta & extrema scrotum est.

δαρὶ τῶν ὤμων, spiritus asper. Sic à quibusdam appellatur qui cum sono ducitur tum ob angustiam loci quo ille redditur, tum propter humoris multitudinem, ut annotat Galen. comment. 3. eis τὸ περὶ ἀρτηρίων.

δαρὶ μύα, oculi vitium idem quod τὸ ἀζυμα, ut scripsit Actius lib. 7.

δαύμον ἢ

δαύκος, herba est trium generum. Creticum forniculi similitudine, minoribus foliis & candidioribus, caule semipedali, capitibus rotundis, ut coriandri, flos albus, semen album, acre, hirsutum & odoratum, radix crassitudine digitali & longitudine dodrantali. Nomen retinet in officinis. Latinis Gallica pastinaca dicitur, vulgo sylvestris carota. Aliterum ubique præuenit, apio simile, feruens, acre, odoratum, radice digitali crassitudine, bipalmarum longa. Tertium pastinacæ non dissimile, opacante fastigium anethi umbella, semine oblongo & odoratu graui sapore, ut cuminum, acri. Gal. & Paulus daucum nihil aliud esse voluerunt quam staphylinum sylvestrem. Omnium generum semen calfacit & extenuat, vrinas & menses mouet. Dioscorides scribit τὸν καυκαρίδην à quibusdā δαύμον ἀγρῶν fuisse appellatam. Reperitur & δαύκος, ut testatur schol. Nicandri.

δαφνί, laurus. Est arbor læui cortice & tenui, radicibus obliquis, inæqualibus, perpetua coma, candice procero, pingui succo scatente, nodis perquam paucis. Geminam Dioscorides statuit, vnā tenui folio, alteram latiore. Desiccatur laurus & calfacit vehementer. Eius fructus δαφνίς appellatur.

δαφνί δὲ λέγεται δρυς, laurus Alexandrina. herba est folio myrti sylvestris, molliore, candidiore, maiore, seminis inter folia magnitudine ciceris rubri, ramos spargit à terra dodrantales, eoque ampliores, radice myrti sylvestris, maiore, odorata, teneriore. Dicitur aliis nominibus δαφνί ἰδαία καὶ σαμωδερμική & ἱερογλυφίον: vulgo vuluaria & Bonifacia dicitur. Calida est, acris & subamara.

δαφνίς, sic dicitur bacca seu fructus lauri arboris.

δαφνίς, est species vna τὸ καρίας in Arabia nascentis, quam & ἀρχὸς Dioscorides scribit appellari, vide in dictione καρίας.

δαφνίς etiam dicitur à quibusdam ἡ χαμαίδαφνι, ut habetur apud Dioscoridem.

δαφνοειδής, frutex est ramosus, crassior & molliore quam laurus folio, floribus candidis, baccis è nigro rufis. Eius folia os ac fauces accendunt. Non aliud est quam sylvestris laurus. Herbarii laureolam vocant.

δαφνοειδής etiam dicitur ἡ κληματίς, de qua suo loco dicetur.



*Δενός*, idē *αυγώνος*. gravis aspectu febris. Est differentia febris apud Hippocr. lib. 6. *ἡ δὲ ἡμίων*. Eam aliqui hecticam interpretantur, quæ in solidis partibus accēsa, carnosum genus ubi iam populata consumpsit, & multo celerius spirituosum, corpus strigosum & aspectu terribile reddit, quod præter cutim & ossa nihil amplius superfit, præsertim si est hectica marasmodēs. Ob id homines ita emaciat, vulgo mortes vocantur, & nos, dum occurrunt, mortis modo terrent. Verum id summæ emaciationis symptōma longis etiam morbis contingit & omni atrophiz. Visu quoq; terribiles sunt febres quædam pestilentēs & malignæ, & omnes phreniticorum febres, quibus oculi cæsi & minacēs & torua tuētes, & qui si a nobis spectentur, nos terreat, quia intēti, fixi & velut minarum pleni sunt. Pestilentes quoque cum phlyctænis aspectu grāues sunt. Galen. tamen hecticam febrem apud Hippocr. intelligit.

*Δειροσμός*. dicitur a quibusdam *ἡ κέντρα*, vt habetur apud Dioscor. non dubium quin a gravitate odoris.

*Δερή*. ὁ ἀρχὴ καὶ ὁ τελευτῶς. collum seu cervix, proprie tamen sic dicitur pars colli anterior, per synecdochien autem totum collum significat. Hinc *ἡ ἀποδείξις* dicta est vltima colli anterioris pars, quæ monilibus cingitur, & *ἡ δειροσμός* totus ille colli ambitus apud Pollucem.

*Δειρομήριον*. malagma Oribasii, sic dictum quod ex decem aromatum generibus paratur. Refertur eius compositio ab Aërio & Paulo, sed depraviatis Pauli, vt iudico, exemplaribus pro nardo enim nardinum vnguentum reponi debet, vt habetur apud Aetium, & pro libris tribus ceteræ, sexcunx. alioqui iam non malagma erit sed emplastrum.

*Δειρομήριον*. sic dicitur musculus qui brachium ad superiora adducit, propterea quod triangularis videatur, & in Δ similitudinem efformatus. Cuius basis intelligi potest a media clavicula ad extremam vique scapulam secundum humeri longitudinem, a quibus scilicet partibus ducit originem: latera vero, hinc quidem internum a clavicula, inde vero externum ab ima scapula ad medium vique brachium, quo loco huius musculi veluti vertex est. Is musculus multum carnosus est & in longum valde exporrectus, totumq; humeri ad scapulam articulum, quem *ἡμίων* vocant, integrit, vnde & *ἡμίων* alio nomine appellatur, quasi humero instratus & superpositus.

*Δειρομήριον*.

*Δειρομήριον*. herba est cui rami ab vna radice dracrantum binum, vel etiam maiores, circa quos folia pusilla, tenuia, diuisa, oblonga, delphini effigie. quanquam alii non foliis, sed siliquis repadis Delphinum referre prodant. qua similitudine quidam inducti, delphinium senam esse Mauritanis dictam existimarunt. Flos illi violæ albæ in purpuram

*Δειρομήριον*. vterus sic dictus quasi *ἀδελφομήριον*. Siquidem *ἀδελφοί* dicuntur fratres ex eodem utero procreari, quasi uterini.

*Δειρομήριον*. dicitur a quibusdam *ἡ κέντρα*, quod etiam alio nomine *κέντρα* appellatur.

*Δειρομήριον*. thus arbor. quæ & simplici nomine *κέντρα* appellatur, de qua vide suo loco.

*Δειρομήριον*. althæa, siue ibiscus. Maluæ agræstis species: quam etiam *ἀδελφομήριον* Galenus appellat.

*Δειρομήριον*. labrum, lauacrum, solium aquæ calidæ, in quo qui lauantur, etiam innatare possunt. dicitur aliis nominibus *κέντρα*, & *κέντρα* & *κέντρα*.

*Δέρμα*. cutis. Est membrana omnium amplissima, partium subiectarum tegumentum, munimentum, ornamentum. Quia membrana est, ex eo intelligitur simplicem esse, planam, tenuem, albam, nervosam, atque ob id sentientem. Siquidem per cutem dispersi nervi dant illi sensum, verumtamen sentit solum, non etiam motum habet voluntarium. Oritur ab extremitatibus vasorum per subiectam carnem dispersorum: hæ namq; dilatari coniunctæque, in cutem degenerant, quo fit vt a subiecta carne sine summo dolore separari non possit. Ac quanquam ex carne, venulis & alicubi arteriis composita sit, ex nervis tamen præcipue constat, nec tamen nervi prorsus naturam retinet, sed inter nervum carnemque quodammodo media est. Nec vero solum omnium corporis partium, sed etiam vniuersæ quæ generationi corruptioniq; subicitur substantiæ media est: quod enim in duritia & mollitie, & in calore ac frigore similiter medium omnium particularum sortita sit, ex eius quæ dixi substantia maxime intelligitur. Est enim veluti sanguine præditus nervus, qui sit inter carnem & nervum quiddam plane medium, & iis ambobus secum mistis conflatum. Est enim nervus durus, exanguis & frigidus: caro mollis, multi sanguinis & calida: media inter utrumque est cutis, nec dura & plane exanguis vt nervus, nec mollis & sanguine abundans vt caro. Est igitur cutis extremorum media calidi, frigidi, humidæ & sicci: præsertim autem manus, in qua tanquam temperatissima, perfecta tangendi potestas sita est. sic quidem vera cutis habet. Cæterum ab eius extremitate alia cutis produci- tur *ἡ δειρομήριον* dicta, ei toti supertensa, sentinq; destituta, & quæ sæpe citra dolorem facile ab ea separatur: de qua vide suo loco.

*Δειρομήριον*. *ἡ δειρομήριον*. hoc est, dura & crassa cerebri membrana, ossi caluæ adherens, sic dicta quasi coriacea.

*Δειρομήριον*. significat fasciculum, vt est apud Scribonium Largum, siue manipulum, vt est

apud Cellsum, cuiusvis rei quam medici nec metiuntur nec ponderant, sed manus complexu sumunt. Neque vero *stupidum* modo dicunt, sed etiam *stupidum* *χρηστός*, id est, fasciculum quantum manu licet comprehendere.

*Stupida*. lora. vinum secundarium. Est portionis generis quod fit maceratis aqua vinaceis. Ab Atticis sic vocabatur. Græcorum vulgus *σπίνα*, Asiatici *σπίνα* temporibus Galeni appellabant, ut scripsit lib. 2. de aliment. facult. Coniectis, inquit, in parua dolia vinaceis tantum aquæ superaffundunt, quoad omnia permeant quod ubi satisfactum videtur, in doliū fundo foramen apertum, ubi dilutum effluat, idque pro vino bibunt. Affundunt autem aquam moderatam, quolora neque parcius sit neque aquosior. Deinde rursum aliam aquam, parciorem tamen priore affundunt vinaceis, ita ut id quoque in potu sit tolerabile, quod quidam Attici proprie *stupidia* nominari volunt. Vtraque capiti dolorem adfert, nisi quis dilutiores ipsas bibat, sed prior magis caput ferit. Commodum hoc habent quod cito per vrinas reddantur, in quo tamen magnū est pro viarum specie discrimen. Dioscorides scribit *stupidia* ab aliis *σπίνα* appellari, & fieri solitam adiectis metretis tribus aquæ in vinacea quibus triginta vini metretæ extractæ fuerint, calcatis vinaceis, & expresso decocto ad tertias partes, & additis in singulos congios modis eius qui remansit binis salis sextariis: post hyemem transfundi in vasa, & ea intra annum vtendum, quod celeriter exoleat. Conuenit, inquit, agris quibus timemus noxam vini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Parem fere eius conficiendæ rationem describit Columella lib. 12. cap. 40. nisi quod simul spumas defructi siue sæpe & fecem ex lacu confundit & permiscet, eamque in tritam macerari vna nocte sinir, postero die pedibus proculcat, & sic permistam prælo subiicit. Scribit præterea & patre suum ex aqua vetere eam facere solitum, & nonnunquam plus biennio innoxiam asservasse. Plinius lib. 14. cap. 10. scribit non posse iure dici vina, quæ Græci *stupidia* appellant, Cato & Latini loram, sed tamen inter vina operaria numerari: tria eorum genera esse decima parte aquæ addita quæ musti expressa sit, & ita nocte & die maceratis vinaceis, rursusque prælo subiectis: alterum quomodo Græci factitare, tertia parte eius quod expressum sit addita aquæ, expressoq; decocto ad tertias partes: tertium esse fecibus vini expressum, quod fecatum Cato appellabat. Nulli autem ex his plus quam anno usum esse.

*Stupida* secundæ sortis in utero velamentum, quod & *χελίον* appellatur, ut scribit Paulus lib. 6. cap. 75.

*Stupida* deleterium. Est medicamentū quod

malis corrumpit. Id genere duplex est: vñ quod omnino corpori contrarium est, & nulla qualitate à corpore alterari potest. eiusmodi est papaueris succus, siquidem nulla substantiæ suæ mutata parte, sed tota seruata integra, corpus nostrum afficit: neque enim in eum quicquam agere, ne vna quidem qualitate potest, multo minus rota sua substantia possit. Alterum genus est eorum quæ ex nostro calore momentum aliquod mutationis accipiunt, ac deinde in multifariis alterationes vertuntur, quibus corrumpi naturam nostram accidit. sunt autem hæc genere duplicia: alia potestate calida, ut quæ corporis naturam rodunt, putrefaciunt & liquant: alia vero frigida sunt, ut cicuta, hyoscyamus, mandragora. hæc enim omnia calido corpori applicata & mutationis momentum aliquod hinc adepta partim eorū ad summam caliditatem, partim perueniunt ad putredinem, partim in cor delata calore natium suo frigore extinguunt. hæc autem & *διάρρηκτα* & *σπασμικά* & *σφοδρα* appellantur.

*Stupida* *σπίνα*. Cerealia semina. sunt quæ alio nomine dicuntur *stupidia*, & à quibusdam etiam *χέσπια*. scilicet omnia ex quibus confici panis potest, vel vicem panis supplere, siue manu legantur, quæ proprie Græcis *χέσπια*, Latinis legumina appellantur: siue falce putentur, ut triticum, hordeum, lens, faba, lupinus, cicercula, panicum, milium, pisum, scenum Græcum, auena, titha, cicer & alia id genus.

*Stupida*. sic dictum fuisse à quibusdam *σπίνα*, Dioscor. author est.

*Stupida*. est subita potus omnis per vrinas cum magna siti profusio. Proprie pertinet hic affectus ad renes: Gal. vero etiam huius participem quodammodo vesicam facit, scribens hunc renem vesicæque affectum similem esse ventriculi intestinorumq; laxitati. Consentit quidem quodammodo vesicæ, & copia vrinæ premittitur, at nec ipse morbus, nec morbi causa est in vesicâ, sed in solis renibus. Est autem attrahendæ vrinæ inexplibilis cupiditas, & eius retinendæ impotentia. Attractionem tantam excitat vel calida & sicca renum intemperies, vel humor biliosus, acris, salsus, & renes assidue irritans, inq; ipso renum corpore impactus, vel, ut ait Aretæus, morbus aliquis acutus in renes firmatus, & per crismum malignitatem suam in eos deponens, vel venenum aliquod deleterium, ex eorum genere quæ vesicam & renes infestant, quale id est quod à Dipsade funditur. Hæc enim omnia sitim ingentem mouet, ob quam assidue æger bibit. Potum autem hunc avidè renes attrahunt antequam etiam in ventriculo concoquatur, sed eum propter imbecillitatem non retinent, sed talem effundunt qualis sumptus est. Quia in re diabetes appetitæ caninæ persimilis est quam *σπίνα* vocant. Nec vero id solum quod bibitur protinus crudum mictur,

tur, sed humor etiā copiosus à renibus colliquato corpore trahitur, in eoq; diabetem proprie consistere Aretæus arbitrat, definienti esse, *ἀπὸ τοῦ νεφρὸς ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ*, hoc est carnum & membrorum in urinam colligationem, ob quam & summa totius corporis macies est, & copiosior multo urina redditur quam potus sit. Diuturna quidem est huius morbi creatio, & longotempore parturit, sed brevis hominis vita est, in quo malum hoc perfectum fuerit. Velox enim est colliquatio, & cū dolore laborantes meunt, ut scribit Aretæus. Viscera, ut idē ait, ipsis vti videntur, omnia fastidiunt, animo sunt dubio, salivā habent albā & spumantē, præcordia graua. Quod si amplius increscar morbus, calor mordax in visceribus sentitur abdomē corrugatur, venæ intumescunt, fit rabes. Quod si vel modico tempore à meiendo abstinerint, tument lumbi, testes & ilia. Rarū id prorsus mali genus, & à Galeno bis rartum visum. Eo autem nomine appellatur, quod humor corporis nullo in loco consistat, sed subinde de loco in locum *ἀσθενῶν*, hoc est pertransit, non aliter quam aqua per siphonem, quem *ἀσθενῶν* vocant mechanici, ut scribit Columella lib. 3. cap. 10. Alii aliis nominibus eum appellarunt, *ὡς δὲ ποτὶς αἰσθύνει*, *ἀσθενῶν αἰσθύνει*, *δυσχερῶν*. Latini nullum illi peculiare nomen dederunt.

*Αὐτὸς ποτὶς*, erosio dicitur & *αἰσθύνει*. Est autem exulceratio à re acri & mordaci facta. Si intrinsecus ab ipso animali prouenit, vitiosi succi soboles est. Si extrinsecus, aut à valentibus medicamentis fit, aut ab igni. Hæc ab effectu *ἀσθενῶν* appellatur, media quodammodo inter *ἐκσθενῶν* & *καυστῶν*, hoc est extergentia & adurentia. Sunt enim extergentibus valentiora, vrentibus autem debiliora & periculosa minus, ut scribit Galenus lib. 1. *τῶν καυστῶν*. Huius generis sunt auripigmentum, sandaracha, Asia petra flos, & misy.

*Αὐτὸς δὲ*, dicuntur apud Hippocr. migrationes humoris de parte in partem, siue humoris alicuius exceptiones. Sic enim aliquando humor de parte in partem transfertur, ut à iecore in lienem & contra. Huius generis sunt abscessus omnes critici.

*Αὐτὸς δὲ*, digestio seu distributio alimenti, cum per venas maiores in minimas ipsūq; corporis habitum transit, dicitur & *αὐτὸς δὲ*.

*Αὐτὸς δὲ*, collyrii nomen est, quod à Scribonio Largo describitur hūc in modum: Croci p. v. sarcocollæ p. x. glaucii succi p. xx. tragacanthi p. v. opii p. v. Scribit autem Largus se opium adieciisse, cum in veterum compositione non esset. Non est dubium à succo glaucii sic dictum esse.

*Αὐτὸς δὲ* seu *Αὐτὸς δὲ*, Emplastri nomen est nobilis & perutilis ad extrahendum. Recipit, ut refert Celsus, Resinæ terebinthinæ p. xx. nitri, cere, picis aride, baccarum lauri, singulorum p. xxx. olei paulum. Sic appellatur quia lauri baccas contineat.

*Αὐτὸς δὲ*, septem transversum, à Gaza apud Aristotelem dicitur cinctus & præcordia. Proprio & vsitato nomine *ἀσθενῶν* appellatur. vide suo loco.

*Αὐτὸς δὲ*, sic à quibusdam peculiari nomine vocatur duodecima dorsū vertebra. A cinctu sic dicta est, quod per eam partem cingimur.

*Αὐτὸς δὲ*, affectio. Dicitur ab Aristotele qualitas esse facile mobilis à subiecto. venit *ἀπὸ τοῦ ἀσθενῶν*, quod significat affectum & dispositum & constitutum esse, atque tam in bonum quam in malum vsurpatur, & in aliis etiam quam in homine. Nam & cantus & harmoniz & orationis & dictionis *ἀσθενῶν* quædam videtur esse, pertinetque *ἀσθενῶν* nomen ad omnes pariter, tum qui sani, tum qui acri sunt, tum qui neutro modo se habent. Siquidem omnes quodammodo *ἀσθενῶν*. Itaque *ἀσθενῶν* commune nomen est, & morbi & omnium symptomatum & causarum morborum: eorum enim vnumquodque *ἀσθενῶν* est, non autem è contrario omnis *ἀσθενῶν* aliquid eorum. Siquidem omnem motum, omnesque adeo sensuum alterationes in se comprehendit, non acri modo, sed sanis etiam contingentes. In visu quidem eas quæ ab albo, nigro, flauo, & cæteris coloribus fiunt: in tactu, quæ à calido, frigido, humido, sicco, molli, duro, cæterisque id genus: & ad eundem modum in singulis reliquorum sensuum. At hæc omnes alterationes reuera *ἀσθενῶν* sunt, id est passionēs. Itaque *ἀσθενῶν* & *ἀσθενῶν* idem quodammodo videntur. Atque idem certe sunt, soloque motu inter se differunt. Nam dum mutatur & alteratur quippiam, *ἀσθενῶν* fit, ut cum incalescit aut cum refrigeratur, à calore vel frigore procul dubio paritur: vbi vero motus desit & iam incaluit aut refriguit, aut nigredo vel albedo inducta est, *ἀσθενῶν* existit. Græci tamen, ut ait Galenus, etiam manentem *ἀσθενῶν*, sedato iam motu, *ἀσθενῶν* solent appellare, sicuti & causam non eam tantum quæ facit, sed eam etiam quæ iam fecit: quanquam neque hæc simpliciter causa est, nec *ἀσθενῶν* quæ manet, simpliciter *ἀσθενῶν* dicenda sit.

*Αὐτὸς δὲ*, *ἀσθενῶν*, apud Hippocr. ut interpretatur Erotianus.

*Αὐτὸς δὲ*, *ἀσθενῶν*, apud Hippocr. hoc est transparent, lib. 2. de morbis mulieb.

*Αὐτὸς δὲ*, victus ratio. Est certa vitæ institutio quæ quis sequitur in rerum omnium vsu. Neque enim solo cibo & potione constat, verum etiam omnibus aliis, ut ocio, exercitatione, balneo, venere, somno, vigiliis, & aliis omnibus quæ quouis modo fiunt in corporibus humanis, ut scribit Gal. comm. 3. in lib. 3. epid. Hæc enim omnia qui ita moderatur ut bene habeat, bona victus ratione: qui vero peius ex his habet, mala vti dicitur. Sed hæc *ἀσθενῶν* iure dici non debet. Pertinet enim hoc nomen proprie ad eam quæ bona est, cuius instituendæ disciplina *ἀσθενῶν* dicta est, non leuissima pars artis me-

**dicz.** Est autem duabus eius partibus communis, tum illi quę sanitatem tuetur, tum alteri quę morbos curat. Nam & sani & ægri suam habent dieteticen. In sanis quidem permagni est momenti (imo vero tota ipsa *ὅλη* est) non modo ad conservandum sanitatem, sed etiam ad bonos mores faciens. Siquidem præiū victus ratio & mores bonos corrumpit, & semina morborum in corporibus spargit, quę postea tum ex seipsis, tum ab ambientis aeris temperamento principium mutationis adepti, gravissimos morbos pariunt. Cæterum non est simplex & unius modi sanorum diætā, sed tam multiplex, quā sunt & variz temperamentorū differentiz & aeris constitutiones, qui in vitæ ratione legitime instituenda magnam sibi partem vindicat. Sunt tamen in ea duo hæc potissimum præcepta, in quibus tota fere vertitur: integram sanitatem similibus esse conservandam, inclinatam autem, & in vitium prope ruentem, modico contrarium vltu retinendam esse. Est autem dieteticæ morborū curationis pars maxima, quę victus eā rationem instituit & ordinat, quę & vires sustentet, & morbum oppugnet. In qua recte instituenda ad multa attentum esse oportet. Nam & morbi speciem & eius accessiones & tempora & ægri naturam & consuetudinem & vires præsentis, adhuc anni tempora & constitutiones considerare cōuenit. Inde varia & *διαίτης* nomina, *λεπτή*, *αἰσθητή*, *ἐλαφύς*, *λεπτή*, *λεπτοτάτη*, *συνκροτὴν*, *ἀδρότερά*, de quibus Hippocr. & Galen. libr. 1, aphor. 4. & 5. Item *λεπτοψύχη* καὶ *παχυψύχη*, hoc est, extenuans & incrassans: de quibus apud Galen. libr. de sanit. tuenda, & libro 7. meth. med. & lib. de victu attenuante. Est autem hæc diætā proprie *ἡγεμονικῆς*, à qua diuersa tantum est alia quę dicitur *αιαντική*. nam differunt inter se *ἡγεμονικῆς* καὶ *αιαντικῆς*. Hæc conualescentibus à morbo conuenit. in quibus, quia nulla præter naturam causa superest, neque affectio morboſa, sed infirma tantum sanitas, aut parua admodum vitia quę per imbecillitatē vitari vix possunt, ea diætā vitendum, quę robur quod deest suppleat, quodque vacuatum est atque dissipatum resarciat, simulque concoquat, enacuet purgetque excrementa, & ab his abstinere quę sanitatem sæpe labefactant, cuiusmodi sunt albor, æstus, lassitudo, cruditas, ebrietas, vigilia, iracundia & reliqui animi affectus: hæc enim omnia & *διαίτης* nomine comprehendendi ante diximus.

**Διαίτησις.** medicinæ pars quę docet victus ordinandi artem. Hanc Galen. lib. ad Thrasybulum Homeri temporibus nullam fuisse existimat, ipseque Plato philosophus antiquos Asclepiadas hac medicinæ parte non admodum vltos esse assenerat. Tanta illis temporibus erat in cibo abſtinentia. Sed cum ars ea ad tuendam sanitatem proprie pertineat, alia tamen est *διαίτησις* quę ab omnibus pars & *ἡγεμονικῆς* esse cēsetur, docetque quę cui-

que morbo ratio victus quadret. Eius autem exactam notitiam non ipse modo morbus eiusque causa, sed vires etiam eius qui ægrotat, & natura & consuetudo, & ætas & anni tempus, & cætera eiusmodi præstant. Pars ea & *ἡγεμονικῆς* longe nobilissima est, de qua tribus libris Hippocr. accuratissime differuit.

**Διαίτησις.** dicitur apud Hipp. cum ossa non toto quidem loco mota sunt (id namque *ὀστέον* appellat) sed cum paulum exciderunt, vt annotat Galen. comm. 3. *ἐν τῷ ὀστέῳ ἀκρίαν*, & *ἀπὸ τοῦ ὀστέου ἀκρίαν*.

**Διαίτησις.** apud Hippocratem. idem quod *ἡγεμονικῆς*. Dicitur & *διαίτησις*, vt annotat Galenus *ἐν τῷ ὀστέῳ*.

**Διαίτησις.** dicitur ab Hippocrate vulnus omne quod altè descendit impactumque est. Scribit tamen Galen. proprie eo nomine significari apud medicos solutam in osse capitis continuitatem ab aliquo acuto occurrente atque abscondente, vocarique aliis nominibus *ἐκκρίσις* & *ἐκκρίσις*.

**Διαίτησις σφραγισ.** intercisus pulsus. hic proprio nomine *σφραγισ* vocatur, de quo vide suo loco.

**Διακριτικὴ δύναμις.** secretrix vel discretrix facultas. Ea tanquam quinta facultas inter naturales à plerisque ponitur, qui Galenum culpæ insinulat quasi eam non nouerit. Aiunt enim hanc esse facultatem à reliquis omnino diuersam quę bonum à malo secernat, separet, & quodāmodo diiudicet, eamque diuersam esse ab expultrice, quod ptius malum à bono secerni oporteat quam vacuari. Eius enim facultatis beneficio, vt aiunt, renēs serum à sanguine secernunt, lien melancholicum succum, & natura singularum partium non tantum in alendo corpore, sed per morborum etiam crises vtilia à superuacuis, & maligna à benignis primum secernit, & postea vacuat atque expellit. Certe Gal. facultatem hanc non videtur à reliquis distinxisse. Ipse quidem nomen hoc in libro de symptomatum differentiis usurpauit, vbi ea persequitur quę ad functionem naturalem pertinent: verum illic eam *ἀπὸ τῆς ἀποκριτικῆς*, hoc est pro expultrice, accipit. Ait enim in regio morbo naturalis coloris mutationem fieri, sed eam nisi alteratricis venarum virtutis vitium sit, & *διακριτικῆς* *σφραγισ*, hoc est discrettricis actionis, symptoma esse. Siquidem excretio secretionē quādā sit. Nec tamen eiusmodi secretio propriæ cuiusdam facultatis est opus, sed vel ad attracticem aut retentricem sequitur, aut mistum quid est ex actione retentricis atque expultricis. Bilis enim aut seri à sanguine secretio nihil est aliud quam rei cōuenientis & familiaris attractio. Eam autem necessario sequitur secretio: nam simul atque attrahitur, secerni quoque & separari oportet ab eo à quo attrahitur, alioqui non iam serum aut bilem, sed totum ipsum sanguinem attrahi oporteret. Similiter in mittendo sanguine secretio

etiam



etiam fieri manifesto cernitur: primū enim natura si sit robusta nec ab aliquo impedita, vitioso sanguine sese exonerat, deinde bonum quoque profundit coacta, nec tamē id opus tectricis facultaris est, sed partim re-tentricis, partim expultricis. Siquidem natu-rā superuacuum expellente & vtile bonum-que retinente, cuiusmodi secretionem fieri contingit, quæ tamen non vnius facultaris, sed duarum opus est. atque idem de reliquis quoque moribus iudicandum, per quos natu-ra inter bonum & malum distinguere vi-detur. Hi namq; alicuius à Gal. commemo-ratæ facultatis omnino motus sunt.

*Ἀφροκα.* sunt collyria arida, ophthalmiæ prin-cipio conuenientia. sic dicuntur quod cro-co consent. Inter quæ hoc vnum præci-puum habetur quod ab Aetio & Paulo AE-gineta describitur. Recipit autem sarcocolle drach. vii. i. croci drach. i. i. i. glaucii drach. i. i. i. vt scriptū inuenitur apud Paulum. Ae-tius habet glaucii drach. xx. i. i. i. Omnia sic-ca læuigantur: deinde gummi drach. i. i. i. tragacanthi drach. i. i. adiiciuntur, atque in collyrii formam rediguntur. Id autem ea-dem die fieri oportet. Nam collyria diu in mortario manentia nigrescunt & vires im-mutant. Est alterū ab hoc diuersum *ἡσχρο-pον*, quod habetur apud Celsum & caligatio-nem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur.

*Ἀδελειμμα.* integritas, intermissio. Dicitur qui-dem in febribus *ἀπυρεξία*, in aliis vero mor-bis, vt cephalæa, epilepsia, podagra, simplici-ter *ἡσχροπύμα*, ὅπο ἡσχροπύμα, hoc est ab inter-mittendo. significat autem apud Hippocra-tem *ἡσχροπύμα*, hoc est remissionem pu-ram & synceram, vt aphor. 4.3. libro 4. febres quæcunque non intermittentes tertia die fortiores fiūt, magis periculosa: si vero quo-uis modo intermiserint, periculum abesse significatur sic enim in comment. Galen. ex-plicat. Idem vero initio comment. 3. in lib. 1. *ἡσχροπύμα* scribit intermissionem bi-fariam dici, primum quidem de iis febribus quæ accessione perpetuam non habent. deinde vero de iis quarum accessio non sol-uitur integre, etiam si insignes subeat mu-tationes, & post principium, augmentum, atque vigorem manifestam habeat remis-sionem.

*Ἀδελειπτεν.* quod dicatur ab Hippocrate de fe-bribus quæ *εἰς ἀπυρεξίαν* desinunt, annotauit Galen. comment. in aphor. 4.3. lib. 4. Ve-rum tamen apud veteres bifaria dictum fu-isse, idem explicauit comment. 3. in lib. 1. *ἡσχροπύμα*: interdum quidem de iis febribus solis quæ perpetuam accessiōem non ha-bent, interdum vero de iis quarum nō rece-dit accessio, sed insignes faciunt mutationes singularum accessiōum, in principium, in-crementum, vigorem & declinationem. Sed iuniores quosdam medicos eas quæ nō ma-gnam mutationem habent, appellare *αὐτοχρως*: eas autem *αὐτοχρως* dicere solas, quæ non

veniunt ad integritatem, & intermittūt post singulas accessiones: easdē autem vocari ab antiquis continuas, interim intermittentes quod scilicet inter continuas & integre de-sinētes mediz sint: proinde eas vbi cum syn-ochis conferuntur, intermittentes appellari: cum iis vero quæ ad integritatē perueniunt, continuas.

*Ἀδελειπτεν πυρετός.* febris intermittens. Est febris putrida quæ vicissim soluitur & repetit. Gi-gnī: omnis ex humore putrescente, nō qui-dem vbiq; , sed in habitu corporis & maio-ribus venis, eoque differt à continua, cuius materia in vasis maioribus continetur. Dif-ferentia enim à loco est. Putret autem triplex tantum humor, pituita, bilis flaua, bilis atra. Inde tres sunt omnes intermittentiū fe-brium differentiz materia differentes, quo-tidiana, tertiana, quartana. Quotidianam pituita, tertianam bilis flaua, quartanam bi-lis atra gignit putrens & per habitum cor-poris delata. Quod quamuis apud multos fide careat, verissimum tamen esse ex iis intelliges quæ scripta sunt à Galeno extremo lib. 2. de differen. febrium: ea enim huius rei abunde fidem faciunt: ac si breui charta ro-ta ea demonstratio. comprehendī potuisset, eam hīc inseruissē, sed longior est, & nemo non habet librum eum Galeni in ma-nibus. Humor ille quisquis sit, colligitur primum in toto habitu, aut totius habitus parte aliqua, vt in ventriculo, iecinore, liene, cerebro etiam quandoq; , aut pulmone, aut corde, aut renibus, aut vtero: cumque pro-pter partis intemperiem aut imbecillitatem concoqui nequeat, pro bono & vtili vitio-sus & nocens euadit & putredinem concipit. Inde facultas expultrix irritata, ipsum tā-quam alienum & noxium expellit. Expul-sus autem & delatus per sensibiles corporis partes, vel frigus vel horrorem, vel rigorem excitat, pro varia humoris natura. Pituita enim suo contactu, & quia frigiditate vel al-terationem subitam mouet, vel continuum diuellit, transiens per partes sentientes, pri-mum frigus, deinde etiam horrificum frig-us, vbi paulo plus incaluit, excitat. Bilis quia pungit & rodit, & calorem natium cum sanguine & spiritu intro reuocat, hor-rorem: melancholicus vero humor rigorem inducit. Deinde vero in corpus reuocato & accenso & concepto per putredinem calore febris accenditur ( si modo humor tantus est, vt qui ex eius putredine acceditur calor cordi comunicari possit ) nec desinit, donec vniuersus ille humor, qui putruit, absum-ptus sit & in cinerem versus, quemadmodū & ignis ardere non cessat quamdiu humor aliquis in ligno superest. Est enim caloris fe-brilis ad putrentem humorem eadem fere ratio, quæ & ignis ad ligna. Exipsis enim li-gnis, dum alterantur, generatur ignis, nec tā-mē perpetua est hæc alteratio, sed finem habet vbi consumptus in totum fuerit nati-us lignorum liquor & in cinerē redactus. Sic

in putri humore calor accenditur & tamdiu perseverat, donec omnino fuerit assatus, aut e corpore quovis modo vacuatus. Nā si intro pellitur in carnē internam, & versus vētriculū, intestina aut renes, vomitū, aut deiectionē, aut urinis finiet accessionem: aut si ad cutim, quod fere fit, pellitur, madore aut sudore tandem dissipatus accessioni finē facit & intermissionem febris adfert: siquidem integrē vacuetur, puram & integram: si minus, dubiam, & in qua manifestum *ἐμπύημα* relinquetur. Oportet autem ut febris intermitat, tantum humoris post singulas accessiones extēni, quantum per ipsam accessionem computruit. Nam si vel propter ægri corporis densitatem, aut errorem aliquem totus humor, aut bona eius portio in corpore retineatur, pro eius copia accessio ipsa vel grauior, vel mitior diutissime, & sæpe ad alteram accessionem perseverabit. Hæc quidem intermissionis, quam *διαμυμία* medici appellant, causa est, eiusque, ut suo loco dictum est, geminæ. Verumtamen soluta ea accessione, factaque intermissione, altera nihilominus accessio vel secundo die, vel tertio, vel quarto repetit, posteaquam scilicet humoralis tantusque in caloris febrilis foco denuo coaceruatus est, ut eum partis natura amplius ferre patique nequeat, sed iam putrere & calere incipientem a se depellere conetur. Tamdiu autem circuitus iste accessionum perseverat, quamdiu ipsa putredinis causa in parte febrem fouente residet, proque eius causæ magnitudine magna putredo magna que accessio excitatur. Ac pituita quidem, quia cruda semicotta que est, facile in ventriculo aut alia parte gignitur & colligitur, ideoque quotidianas gignit accessiones, post vigesimā quartam horam recurrentes, vel eo etiam celerius quod crudior fuerit. Bilis flaua, si exquisita est, quia longiore eget tempore ad sui perfectionem, tertio quoque die colligitur, & redundat in iecinore, nec citius, nisi pallidior, crudior, frigidiorque sit, & pituitæ particeps. Bilis quoque atra si naturalis exquisitaque est, quia longiori tempore a liene trahitur & in eo coaceruatur, aut si vltione sit, tardius omnino eam gigni oportet quam flauam bilem, quarto quoque die accessiones mouet, vel celerius etiam, prout magis ad flauæ bilis naturam accedit. Hinc fiunt accessionum anticipationes. Quod si horum trium humorum singuli naturæ modum excesserint, ut pituita quidem ad flauam bilem magis accedat, bilis flaua ad atram, atra autem crassior sit quam naturæ eius modus & ratio ferat, aut magis vsta sit, ipsaque putredinis causa parua sit, nec valde offensa sit & irritata facultas expultrix, tardiores fient accessiones, & ab atra etiam bile fortasse quintanæ, septimanæ & nonanæ febres, quas libr. I. *ἑπταήμερον* Hippoc. commemorat.

*Διαλείπων πυρετός*. pulvis deficiens siue intermitrens. Est pulvis inæqualis in pluribus pulsa-

tionibus, in quo non solum vno, sed pluribus etiam magnis vnus minor apparet, atque interdum totus quoque motus aboletur. Huic contrarius est *ἡ παραμυμία*, in quo expectata quiete, in medio tanquam superuacuis aliquis pulsus incidit. fit ab imbecillitate facultatis pulificæ. Differt *ἡ ἀσπύζια*, q̃ hæc ut sensus ipse indicat, sit veluti defectus totius functionis, ille vērō dimidiata tantum priuatio.

*Διάκονος*, sic dicitur à quibuldam *αἰδομένοις* *ἡγεμονία*, ut habetur apud Paulum lib. 7. cap. 3.

*Διαμύημα*, est linamentorum in vlcere cauitatem insertio.

*Διάπυος*, p̃p̃etuis apud Hippocr. libr. de artic. Sic autem appellat *πυὸς τῶν ὀστέων* siue *πύου*, quasi à superiore parte deorsum magna longitudine protensus, ut annotat Galen. comment. 3.

*Διάκονον*, id dicitur quod inane non est nec teneram fungosamque medullam habet, sed lignosa soliditate durum est. Eo nomine *ἀσπύζια* à Syris vocatū fuisse, habetur apud Dioscoridem.

*Διαπύματα*, dicuntur aspergines medicamenti alicuius ficci & in puluerem triti. fiunt ad varios vsus. Plinius quædam ad coercendos sudores, & ut à balneis inarescant corpora parari scribit ex rosīs libro 27. cap. 15. *diapasmata*, inquit, ex rosīs fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corporibus, deinde frigida abluantur. id quod Dioscorides Græce dixit, *χρόνται ἡ καὶ πλείους ἐν διαπύμασι καὶ σὺν χροῖμασι μετὰ τὸ λουτρὸν, καὶ μετὰ τὸ ἐνεσθῆναι ἀπὸ κλύσταιν πυρετῶν*. hoc est, vtuntur vero etiam plures in diapasmatis & synchris matris post balneum, & postquam resiccari fuerint frigida abluantur. Idem Plinius lib. 13. cap. 2. Siccis, inquit, odoribus constant quæ *διαπύματα* vocantur. De his & Martialis lib. 1.

Quid quod olet grauius mistū diapasmate virum?

Diapasma enim dixit ficos odores qui in pastillos inspergebantur. Verumtamen non eum modo vsum præstabant, nec ex medicamentis vnus generis componebantur. Siquidem totis corporibus vel eorum partibus fouendis, siccandis, laxandis, adstringendis, molliēdis, durandis, & odorandis aliquando inspergebantur. id quod satis euidenter docet Paulus Aegineta lib. 7. cap. 13. *καταπύματα* appellans, quæ omnino eadem sunt atque *διαπύματα*. Dicitur autem *διαπύματα* non id modo quod corpori siccum inspergitur, verum etiam quod in potum inditur, & inspersum potui bibitur. Nam & huius exempla quædam habentur apud Gal. ut libro 9. *ἢ ὡς πύου*: anchusam tenuissime tritam cum aqua potabili bibendam dato. Et, struthii cochlearium cum melle dato. Nam ipse medicamenta *ἡτε καταπύματα*, siue (quod idem est) *διαπύματα* appellat. Refert tamen Oribasius ex Antyllo *ἐμπύματα*, *καταπύματα* & *διαπύματα* differre: quod *ἐμπύματα* compescendis sudoribus aut alia corporis

poris per halitum digestionem adhibeantur, aut ad summam cutim scarificandum, aut commouendum pruritus: *ἡ δὲ περὶ τὸν* vero vlceribus superponantur: *ἡ δὲ περὶ τὸν* vero ad odoris gratiam apparentur, & alis atq; feminibus ad summouendam graueolentiam illinantur.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. hoc est, diuisa longoque intervallo à se innicem distantia crura. Id participium, vt ait Galen. comment. in prognosticum, etiam *ἡ δὲ περὶ τὸν* scribe potest.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. significat apud Hippocratem diuaticarica & cruribus diductis iacere: quod etiam ab eo *διὰ τὴν ἰσχυρίαν* dicitur. Græci enim *ἰσχυρία*, siue (quod idem est) *ἰσχυρία* appellant, quod inter vtrumque crus spatium est, vt scribit Galen. comment. 2. *εἰς τὴν ἰσχυρίαν*.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. transuersaria. pars sunt instrumentorum, quæ ad crurum laterumq; compaginem funt: ad quem vsum primo præcipueq; destinantur. Huc accedit quod machinationes quoque sustinent, vt puta trochleas, cubitos, atque alia quædam.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. est solæ continuatæ species, per quam sanguis, veluti transcolatus, siue sudoris modo transmissus effluit. Id autem duabus de causis contingere potest. Nam vel vasorum tunica ipsa rarefacta, sanguine vero tenuato oritur: vel accidit interdum ex graciliū vasorum ore aperto. Non est autem hæc sanguinis effusio: qualis per anastomosin, in qua tum maiorum venarum arteriarumq; ora aperiuntur, tum sanguis impetu & copia erumpit. Siquidem per *ἡ δὲ περὶ τὸν* veluti transcolatur siue sudoris modo transmittitur, perque carnem sub cute diffunditur in modum *ἡ δὲ περὶ τὸν*, temporisq; progressu liuescit & atër euadit, paruis grumulis ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis. Nec vero proprie sanguis est qui per *ἡ δὲ περὶ τὸν* effunditur, sed feri potius species, vt scribit Gal. in lib. de sympt. caus. Eumque in modum ex iecino- ris renūque debilitate meitur, ac sæpe per alium deicitur sanguinolentum serum. Itaque & *ἡ δὲ περὶ τὸν* præcipua causa est sanguis serosus, tenuis & calidus effluens per vasorum tunicas rarefactas, eoque proprie differt ab anastomosi. Quod si contigerit aliquando *ἡ δὲ περὶ τὸν* apertis vasorum osculis, vasa quidem omnino exigua sunt, & ex quibus sanguis impetu & copiosus emanare non potest.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. dicitur à chirurgis fracti ossis compositio eiusmodi, vt contaminati ossis extrema se contingant omnesque eius partes sibi ex aduerso collocentur, & in pristinam unitatem reducantur, vt annotat Gal. comment. 1. *εἰς τὴν ἰσχυρίαν*.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. illinere, iungere. Inde *ἡ δὲ περὶ τὸν* vnaiones aut fomenta, quibus totum corpus oblinitur. Significat & membra fracta componere, atque in pristinam formam re-

stituere, vt, cum scribit Gal. comment. 1. *εἰς τὴν ἰσχυρίαν*. hoc est, vt semper conseruetur fractorum membrorum compositio.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*, difflatio, perspiratio, transpiratio. Est totius corporis veluti respiratio quædam per cutem. Est enim species quædam respirationis quæ *διὰ τὴν ἰσχυρίαν* dicitur. Itaque vt hæc duplici motu constat, vno quo aer frigidus attrahitur, altero quo fuliginosa excrementa vacuantur, sic duplici modo ipsa *ἡ δὲ περὶ τὸν* efficitur, & animalium corpora difflantur: vno quidem, effusis ad exteriora vaporosis & fuliginosis superfluitatibus, altero vero attracta refrigerante ac ventilante natium calorem ærea substantia. Hi autem motus quoniam obscuri sunt, ipsum ideo opus à medicis *ἡ δὲ περὶ τὸν* *ἡ δὲ περὶ τὸν*, & *ἡ δὲ περὶ τὸν* *ἡ δὲ περὶ τὸν*, hoc est, perspiratio quæ ratione comprehendatur, & transpiratio sensu imperceptibilis, appellatur. Hæc corporibus omnibus toto vitæ curriculo, inest, eiusque author est calor natiuus, etiam si varia sit pro discrimine ætatum, anni temporum, studiorum, & totius, vt breuiter dicam, diætz. In quibus tamen differētis commune hoc inest, quod calidioribus temporibus, regionibus, ætatibus, naturis, diætis non parua substantiæ nostræ portio per *ἡ δὲ περὶ τὸν* exhalet, vt contra in frigidioribus pauca propter cutis adstrictionem. Est autem necessaria difflatio ad corrigendam qualitatem & intemperiem quæ retentis fuliginosis & acribus excrementis necessario excitatur: eoque fit vt quibus suppressa est, eos febres facile corripiant.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. *ἡ δὲ περὶ τὸν* *ἡ δὲ περὶ τὸν*, hoc est auriū purgationes, apud Hippocr. quod pennis interdum aures repurgemus.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. dicitur apud Hippocratem, cum aliquo præter naturam tumore concocto opus vniuersum collectum est: significat idem quod *ἡ δὲ περὶ τὸν* atq; *ἡ δὲ περὶ τὸν* idem quod *ἡ δὲ περὶ τὸν*.

*Διὰ τὴν ἰσχυρίαν*. *ἡ δὲ περὶ τὸν*. suppuratorium medicamentum. Id dicitur quod calore & humore temperatum, porosque obstruens, pus mouet. Est enim suppuratorii medicamenti effectus, puris generatio. At pus caloris natini opus est, qui quanto fuerit vegetior, tanto præstantius pus efficit. Itaque quæ puri gignendo conueniunt, ea proximè oportet ad caloris nostri substantiam accedere, eumque quoad fieri poterit augere. Quemadmodum enim alterationes quæ secundum naturam ab innato calore fiunt, à simili calore externo iuantur, ita etiam in suppurationibus vsu venit. Sunt autem natura modice calida & humida calori natino proxima, & proinde aptissima ad iuuandam concoctionem quam nativus calor molietur. Ex quibus perspicuū est suppuratorium medicamentum, cum similem naturali temperaturam habeat, eius substantiam tueri potius quam immutare. Itaque in mouendo pure, humor quidem alteratur, aut

si quæ caro confusa est: alia vero omnia, quæ secundum naturam sunt, substantiam suam conferuant. Tale igitur debet esse medicamentum quod ad pus mouendum adhibetur, qualis est in naturis temperatis natiuus calor. At vero quæcunque hoc modo temperata sunt, rarefaciunt, emolliunt, laxant, nec halituosa modo excrementa, aut tenuiorem humoris partem, sed ipsum etiam natuum calorem euocant & dissipant, atque ex accidenti refrigerant. Ex quo liquidò apparet emplasticum esse oportere medicamentum quod ex æte suppuratorium est, vt præclusis meatibus, natiuus calor intus continetur, in quo concoquentis naturæ robur inest. Ita substantia quidem caloris augebitur, neque intendetur qualitas, potiusque obstructis nulla diffusio fiet vel insiti humoris, vel halituosorum excrementorum, vt inde metui possit partis affectus siccitas. Quæ enim ita detergent aut calefaciunt cataplasmata vt etiam exiccent, pus mouere nullo modo possunt. Nam quæ detergent quidem, etiam si non multum calefaciant, quia tamen obstructione liberant & referant meatus, faciunt vt vna quoque calor partis euolet: quæ vero plurimum calefaciunt, non parum caloris foras euocant, & eum qui superest acriorem reddunt. Ex quo fit vt natiui caloris substantia imminuatur, & eius qualitas intendatur: quorum tamen neutrum in pure mouendo fieri expedit, sed potius halituosum & calidum spiritum contineri quamplurimum, & ad vnguem caliditate symmetrum. Sic enim vbi aliquid coquere consilium est, melius perficitur coctio. Genus autem concoctionis est ea quæ per in pus conuersio, quam quæ præstat medicamenta, à medicis etiam *πύμα* vocata sunt.

*Διάσπυρον*. consiligo. sic dicta Græce quod inter triticum & siliginem nascatur.

*Διάσπυρον*. dicitur aliquando generatim omnis ossium compositio ad motum voluntarium comparata, quomodo saepe à Galeno vsurpatur libr. de vsu partium & commentariis in libros Hippocratis: sed nominatim speciatim sumitur, estque altera *διασπύρον*; id est, articulationis differentia, quam diffinit Galen. esse *αὐτὴν* siue *αὐτὴν*, hoc est, commissuram naturalem ossium inter se motum euidentem habentium. Eam alio nomine Hippocr. *μεσάρθρωσιν* appellat. Est autem ea ossium connexio omnino laxior, sic vt euidentis, facilis magnusque motus sit, cuiusmodi in cruribus, brachijs, manibus & pedibus habetur. Huius tres differentias Galen. ait, *διασπύρον*, *αὐτὴν*, *σύνσπυρον*.

*Διάσπυρον*. dicitur apud Hippocrat. de his qui cum altero crure breuiore sint, siue huic siue alteri innitantur, in illud quoque totum corpus modo à recto habitu & qui sine inclinatione est in affectum crus inclinando, & rursus ab ea inclinatione attolli in crus sanum

& erigi, vt annotat Galenus comment. 3. in *αὐτὴν*. *Διάσπυρον* sunt certæ collyriorum species ex solis compositæ. Eorum multæ etiam differentie sunt: *Διάσπυρον* Nili omnium celeberrimum, *Διάσπυρον* in *Διάσπυρον*, quod alio nomine *γυμνόν* appellatur: *Διάσπυρον* *λευκόν*, *ερυθρόν*, *κρόκον*, *αἰγόν*: quorum compositiones habentur apud Gal. Aetium, & Paulum Aeginetam.

*Διάσπυρον*. est alui profluuium absque intestinorum exulceratione, quo vel pituita vel bilis altera, syncera aut inuicem mista vacuatur. In causa sunt humoris copia & cruditas, quæ aut in toto corpore aut in certa quadam parte sedem habet: ventriculus enim multitudine grauitus quam vel ipse colligit, vel ex aliis sese in eum exonerantibus suscipit, aut maligna aliqua qualitate irritatus quam cruditas (sic autem nunc appello concoctionis deprauationem, quæ proprie *δυσεντερίαν* dicitur) inuexit, in *Διάσπυρον* intestatur: maxime quidem, si otificium eius supernæque partes valentes sint, inferiores autem & *πυλὸς* languidæ. Nam si contra acciderit, vomitiones *αὐτὴν* *Διάσπυρον* citabuntur, vt docet Gal. lib. 3. fac. nat. Quemadmodum autem ex ventriculo in intestina materia diarrhoeæ fluit, sic etiâ per venas mesaraicas in eadem portio ipsius deferitur. Cæterum humorum cruditatem cum vitiosi cibi potusque, aeris intemperies, insuetum oecium, cutis adstrictio, tum etiam febres longæ aut acutæ molliuntur, quæ & humores & ipsam corporis habitum vitiant, vt inde facile diarrhoea exciteretur. Verum sicut ea febribus quandoque succedit, sic illas utiq; non minime prorit ex defurgendi frequentia. Quod si etiam rosis aut dolor aut calor immodicus (quæ pro qualitate humoris fluentis sentiuntur) in ventr. atque intestinis sit, huic certe vel longè magis affectio febrilis increfcit: sed nec solæ febres diarrhoeam mouent, verum etiam venenæ sumptæ, & purgantia medicamenta, quæ intemperiem in iecino- re, ventriculo aut intestinis reliquerint. Quæ quamdiu manebit, aluus descendet, perque eam corrupti & putres humores, non vnius quidem generis, sed varii pro ciborum differentiis & ægotantis intemperatura vacuabuntur.

*Διάσπυρον* eis *εἰς*. profluuium vrinæ. Vide *Διάσπυρον*.

*Διάσπυρον*. sunt collyriorum species, quorum plures habentur differentie. Duas describit Gal. lib. 4. *Διάσπυρον*, *λευκόν*, *ερυθρόν*, & *αἰμαίνον*. Aliquot etiâ Aetius, vt *λευκόν*, *αἰμαίνον*, *ερυθρόν*, *κρόκον*. Habet & Scribonius Largus collyrium *Διάσπυρον* descriptum, quod alio nomine *αὐτὴν* & *αὐτὴν* appellari dicit. Non est dubium omnia sic vocari quod myrrhâ constant.

*Διάσπυρον*. interstitium, interuallum. Dicitur apud Hippocr. cum ossa quæ citra commissuram naturaliter se constringunt, affectu aliquo



quo diducuntur & diuelluntur. Galen. in  
*phlog.* interpretatur *figura* corporū ipso-  
 rum compositionem lanis similem.

**diastole.** Est motus cordis & arteriarum quo dilatur in longum, altum & latum. Pars enim pulsus est, cor atque arteriam à corde proficiscerem attollentis & velut explicantis: illud quidem ut à pulmone aerem frigidum attrahat, quo contemperetur & alatur, hanc vero ut spiritum vitalem intro mittat, quo per singulas partes postea diffuso calorem nativum earum augeat atque tueatur.

**Διασμητήριον.** specillum dilaratorium, apud Hip-  
pocratem, vñ annotat Galenus *ἐν τῇ γυναι-*  
*στικῇ.*

*Dissepimur.* Species est luxationis, qua non ea modo quę iuxta articulum nervosa sunt, sed & ipse articulus leuiter deprauatur, suaque sede commouetur. Nami si ipso articulo il-  
lato, nervosa tantum resoluuntur, id quod præsertim accidit, cum ambulando vestigi-  
um fallit, *sepimur* appellatur, sicut annotat Gal. comment. 3. sic n. 4. et. inferi.

Δισπλοῖς, significat apud Hippocr. *δυσπλοῖς* τῆς  
 χροῦς, id est perpetuo. Attica lingua *δυσπλοῖς*,  
 seu *δυσπλοῖς*, dicit.

*Antidysenteria*. nomen est potionis quam antiqui ad coxendicis dolorem instituerunt continuandam toto anno. Sic dicta est quod quatuor medicamentorum generibus constet hunc in modum: Chamædryos pondō, gentianæ uncia novem, aristolochiæ rotundæ uncia novem, ruscæ seminis sicci sexarius. Hæc rusa dantur quod die ad annum ieiunio ex duobus aquæ frigida cyathis. Author Paulus lib. 3. cap. 77.

*Asperum* tridui inedia Inuentum est Empirico-  
rum, primumque à Thessalo excogitatum.  
Totum autem erat in victus ratione, quam  
ita instituebāt in omnibus ægris, vt primam  
in quarto die ipsos cibarent, post in sexto,  
mox in octauo, deinde in decimo. Prima  
quidem cibatio post primam diatriam, reli-  
quæ alternis diebus. Sed nugæ eas & deli-  
ramenta Gal. multis in locis ridet.

*Alephar*. peripicuū. significat & candens apud Hippocr. ut interpretatur Gal. comment. 1. *ut in alephar*. Quo loco consulit Hippocr. ferramenta quæ ad alam admonentur, candentia esse oportere.

*Διαφανής λίθος.* dicitur à Romanis lapis specula-  
ris, ut scribit Gal. lib. 4. *ἄσπερ κρύσταλλον.* Leuiter &  
sine morfu exicat. Itaq; xlcibus aggre qui-  
dem cicatricem admittentibus conducit nō  
item malignis & rebellibus.

Διφυλῆς. ἰσχυρῆς, hoc est effusiones, apud Hippocr. ut Gal. explicat ἐν τῷ πρώτῳ.

Διαφύονται. humectantia apud Hippocratem.  
 Διαφλυχθεῖσα. petrusa & humectata, apud Hip-  
 pocratem.

*διαφορά* differentia. Est quid ab aliquo dif-  
fert. Gal. anthur est maiores Græce solitos  
appellare *διαφοράς αἰδρ. τριμυς ἰσας*. *ἵνα* eaque  
omnia pro vna eademque re visuasse.

*Διασπορῶν.* digestio, enaporatio, discussio. Est humorum qui in parte aliqua continentur per meatus insensibileseductio. Hęc facultatem quę possident medicamenta, *Διασπορῶν*, hoc est discussoria, & per halitum digestentia, appellantur. Ea proxima sunt attractantibus: siquidem vicinę sibi virtutes sunt, eorum quę in alto latent attractrix, & attractorum digestrix. Nam quę trahunt, etiam nonnihil omnino discutunt, & quę discutunt pariter trahunt. Omnia in vniversum deficcant, idque duplici ratione, aut humores ebibentia cum poris quibusdam insunt, aut totam partem alterantia.

*Septum transversum.* Septum transversum. Est musculus rotundus obliquus, caput in medio habens, & fines vndique thoraci interno annexos, liberæ respirationis instrumentum. Hic nec situm nec formam ulli alteri musculo responderi: siquidem in medio caput principiumve habet, ex quo fibræ, instar linearum, à centro ad circumferentiam excurrentium, in eas partes proficiscuntur in quas ipse inseritur. Est autem suo capite membranæus, indeque paulatim carnosior efficitur. Totus admodum obliquus est, siquidem ante pectoris ossi, iuxta mucronatæ cartilaginis radicem adhærens, per spuriarum costarum extrema in lumbos duabus aponeurosis longius protenditur, itaque à prioribus partibus deorsum ad posteriora vergit. Duabus membranis tegitur, vna inferiore, à peritonæo, altera superiore à tunica costarum succingente. Est enim medius inter partes alimento seruientes quas peritonæum continet, & inter spiritus organa quæ tunica succingente concluduntur, eamque ob rem iure *Septum* nominatur, quod eas partes *Septum*, id est discludit, quasi septum quoddam medium. Eundem vero *Septum* veteres appellauerunt, quia (vt aliqui putant) eo inflammatione affecto mens lædatur. Nam multi quidem varios ob morbos delirare solent, sed quæ eo affecto incidunt deliria, non multum distant à phrenitide. Nulla enim pars cerebro subdita præter septum transversum perpetuum delirium excitat. Itaque maximus illi videtur esse cum mente consensus, & ad eam septum transversum aliquid conferre. Latini præcordia, vt ait Plinius appellauerunt, quia cordi prætenduntur. Dicitur & in naribus *Septum*, quod narium meatus diuidit: *nasæ* & *sanæ*, à quibusdam dicitur.

Διαφραξίς. σφίς. apud Hippocratem, hoc est  
manifestum.

*Diaphragmatis vñvis.* dicuntur membranz illz,  
quz totum thoracis spaciũ à ingulo ad  
septũ vsque in duos sinus, dextrũ fini-  
strũque, diuidunt: vulgo mediastinum  
vocatũ.

*Sinapis spumans* apud Hippocr.

*Διὰ τῶν*. dicitur ab Hippoc. in commissura ge-  
nu corpus quoddam *νευροεπίσπινος*, quod in  
media commissura eminet, & processus fe-

moris, qui in tibiam inferuntur, distinguit, vt annotat Gal. comment. 2. *εἰς τὸ ἀντιδρῶν*. *διαχρῶν*. emplastrum est cuius variaz habentur in myropolijs descriptiones.

*διαχρῶσις*. liquefactio. Est corporis siccū ad humidius alteratio. Contraria est τὴν *πύξη*, hoc est, coagulationi siue concretioni. Fit per humectationem: tunc enim quæ siccæ erant & terminatæ, incipiunt diffilure & liquari, quod opus humidū est. Humiditas autem inducitur, vel nouo humore superinducto, vel resolutione quadam partium aquearum quæ ante in corpore latebant compressæ & constipatæ, vel per dissolutionem partium terrestriū prius in vnum coactarum: quemadmodum Aristot. libro 4. τὴν *μετῴραν* demonstrauit.

*διαχρῶσις* etiam, & *διαχρῶν*, dictum est à quibusdam τὸ *δελφῖνον*, vt habetur apud Dioscoridem.

*διαχρῶσις*. idem quod *ἐκρῶσις*, id est excretio seu vacuatio. Dicitur de omni humore, quacūque corporis parte prodeat: eoque differt *ἐκρῶσις* τὸ *διαχρῶσις*, quæ tantum excrementorum alui est.

*διαδρῦμα*. nomen est malagmatis ad ischiadicōs & plaxaque alia mala utilis, cuius descriptio habetur apud Galenum cap. 2. libr. 10. *ἢ καὶ πᾶσι*.

*διαδρῦμα*. radix herbæ, apud Hippocratem, quæ & *ὄρχις* nominatur. auctor est Galenus *ἢ γλῶσσας*.

*διαδρῦμα*. dicuntur proprie fratres vno partu editi. Dicuntur & testes honestiores, vt ait Galen. vocabulo: de quibus vide *ὄρχις*. Dicuntur & *διαδρῦμα* in cerebro, de quibus vide in dictione *γλῶσσα*.

*διαδολήσας*. decepti sunt, apud Hippocr. in qua significatione etiam Euripides vsurpauit in Hippolyto, teste Erotiano.

*διαδόδος*. idem significat quod *κένωσις*, id est vacuatio, apud Hippoc. lib. 1. epidemion.

*διαπῆσις*. διαπῆσις καὶ καθαρὸς, apud Hippocr.

*διαπῆσις*. significat concutere, apud Hippocratem lib. 2. de morbis mulierum. significat etiam transcolare & diuidere: author Galen. *ἢ πᾶσι γλῶσσας*.

*διαίματος*. humida & exudans, apud Hippocr.

*δικαίος*. apud Hippocratem idem quod *ὁμαλὸς* & *ἰσός*, id est pariter & æqualiter: apud quem τὸ *δικαίον* multa significat, vt annotauit Erotianus: imprimis quidem *ἑλόνος*, hoc est rationale. alias vero *ἑμῶν*, hoc est simile. vt libro de articul. vbi scribit, *ἐπειδὴ δὲ δικαίον ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸ πᾶν ὅλον σῶμα καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλη*. hoc est, quoniam simile habent homines tum corpus reliquum, tum manus & crura. alias autē *ἰσός* & *συμμερόν* hoc est, æquabile, & conueniens siue conducibile. vbi scribit, *ὡς ἐκ τοῦ κράτους ἐμβολῆς ὁμοῦ, δικαίον τινος μὴ μαχλυνεῖν, ὑπὸ μόνον ἐσώτηρον ἢ κεφαλῆς ἢ τῆς βραχίονος. δικαίον τινος δὲ δὲ ἀνθρώπου ἀσφαλέως ὅτις*. hoc est, permulcūm potest ad humeri iniectionē, æquabile quidē fuerit ad naturalē situm reducere, si solum extra

caput brachii fuerit: sed conducibile id fuerit, quo tutius os collocetur. alias solum τὸ *συμμερόν*. hoc est conducibile. vt lib. de fract. *ἐχέτω ἢ ἰσόν, ἢ δὲ ἀπὸ τῶν καὶ κατὰ μέγεθος ὡς ἰσότητος τὰς κατὰ τὰς πᾶσι δακτύλους. αὐτὴ γὰρ ἡ δικαίον τινος, ὡς ἀπὸ τῶν, δικαίον*. hoc est, oportebat medicum luxationum & fracturarum quam maxime legitimas facere cōpositiones. hæc enim est iustissima natura, quemadmodū & lex iusta est. Et lib. de artic. de coxa scribens, *ἢ τὸν δικαίον μαχλυνεῖς ὅτι ἀνθρώπου, ἀπὸ τῆς ἰσότητος. μόνον γὰρ τὸ δικαίον, ὡς ἰσόν, ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν καὶ ἰσόν, & συμμερόν*. hoc est, quid enim iusta membrorum cōpositio non mouerit? pro robusta & forti. Id enim duntaxat quod iustum est, rationale est, & simplex, & forte, & conueniens.

*ἀνέστην*. est collyrium calidum & acre, ciens lacrymas. Eo Paulus vtitur *ἢ τὴν ἐκροφθαλμῶν* τὴν *ἐκροφθαλμῶν* libr. 3. describitur ab Aetio hoc modo: *Æruginis, misyos, succi papaueris, singulorum oboli tres, gummi drach. 111*. Excipiuntur aqua pluuia.

*Διαίτης*. dicitur apud Hippocratem bipartitus, vt possit inferiore parte clausa, superpositam aperire. Author Gal. *ἢ τὴν γλῶσσας*.

*Δικαίος*. dicitur à quibusdam ἢ *ἑμῶν*, quod duplici grano prædita sit.

*Διχρῶν*. τὸ *διχρῶν* αἰς δύο, & *ἢ διχρῶν καὶ διπρόν*: hoc est, diuisa in duas partes, & quasi bifida & bicipitia: apud Hippocratem.

*Διχροῦς*. σφῆρας: est pulsus inæqualis in vna arteriæ pulsatione & vna arteriæ parte, qui post absolutam diastolen, antequam perfecte contrahatur, secundo tactum ferit. Huius exemplum haberi potest ex maleis in eadem percutientibus, & postea resiliens, vt voluit Archigenes, qui etiam pulsus hanc non vnum, sed geminum esse existimauit. Talis fit nonnunquam propter inæqualem cordis intemperiem, propter quam inter se contendunt calida partes cum frigidis, vt subsistere interim necesse habeant calida retenta à frigidis, interim celerius frigida moueri à calidis attracta. Fit etiam & cum collectus est in multis eius partibus ingens fuliginosorum excrementorum acervus: si namque vna contingat vt cordis partes quædam sint præcalida, aliæ fumosa fuligine præfocentur, ad contrarios proficiunt motus, vt altera distentionem moliantur, altera vero ad superfluitarum expulsionem confidunt: ex qua lacta tres numero pulsus huius differentia existunt, vt docet Gal. libr. 2. de præfag. ex pulsib.

*Διχροῦς*. τὸ *ἢ διχρῶν*. hoc est, veluti biceps, apud Hippocratem siue bifidum: quod etiam *ἢ διχρῶν* significat. Author Galen. *ἢ τὴν γλῶσσας*.

*Διτάμνον*. dictamnūm. Est herba in Cretana scens, ramis prætenuis, acris, læuis, pulegio similis, sed maioribus folijs, sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui & superuacua. Est & *ἢ τὸν διτάμνον*, quasi dicas dictamnūm illegitimum, multis in terris nascens,

scens, ante dicto simile, sed minus quam illud acre, & viribus ignavius. Tertium etiam genus adjicit Dioscor. quod è Cræta similiter affertur, foliis lilymbrii, ramis maioribus, flore sylvestris origani, nigro mollique. odor foliorum inter lilymbrium & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem est, sed minus nares ferit. Dictamnium vires habet pulegii, sed multo efficaciorès. partus ejicit, impactos aculeos illitu extrahit, lienem imminuit, venenatis moribus remedio est. Sunt qui agreste pulegium appellant, Galli hortense zinziber, quod estuosa vi statim os adurat & linguam vellicet.

**Arterialis plexus.** retiformis plexus. Est multiplex implicatio contextusque ramorum arteriæ soporalis ad basim cerebri, in quo spiritus animalis ex virali elaboratur. Arteriæ enim hæ, quam Græci *καρπιδία* vocant, posteaquam ramo interno & maiore per obliquum foramen ossis *λάρυγγος* intra cranium penetravit, in duos ramos non obscure diuiditur, qui deinde in alios atque alios sibi mutuo incumbentes retium in modum per aream temere iacentium simulque congestorum, ad latera *τῶν ἀρτηριῶν ἀποφύων* in eo osse quod *ἐπιλάρυγγος* dicitur, sub crassa meninge, varie inter se complicantur. Illic enim non exiguum spatium est, in quo natura veluti thalamum quendam huic arteriarum contextui instruit, quem à retium, ut dictum est, similitudine *ἀρτηριῶν* medici veteres cognominarunt. Hic quia mortuo homine calore spirituque exolutis, & tam exilibus arteriis in sese confidentibus non facile videri potest, multis calumniæ aduersus celeberrimos medicos occasionem præbuit, tanquam nullus omnino esset, sed merum commentum. Verum si secta eo loco crassa meninge à qua hic plexus tegitur, carotidem in collo inflaueris, manifesto ipsum deprehendes. tunc enim arterias ita sibi implicatas flatu plenas dissilire animaduertes, & ab ijs, si quò loco violatæ fuerint, sanguinem vibrari. Cæterum hæ omnes arteriæ postea in vnum truncum redeunt, suo quæque latere, & crassa meninge pertrusa in cerebrum & eius membranas infinitis prope ramis disperguntur: quorum alterum si lubet perinde atque inferiorem calamo inflare, videbis & totum eum arteriarum chorum flatu intumescere, excitari & assurgere, ipsumque flatum ad inferiorem usque carotidem descendere. Præcipuus huius vsus est spiritum animale percoquere atque elaborare. Ut enim femini per multos gyros & anfractus ad testiculos via est, & lacti per longissima vasa ad mammas, ut illic diutius immorata absolutam concoctionem adipiscerentur: ita cum à corde ad cerebrum via nimium brevis videretur, plexum hunc veluti labyrinthum quandam naturam contexit, in quo mora longiorè vitalis spiritus purior, tenuior, similiorque animali spiritui euaderet, ante-

quam in cerebri, vbi perficitur, ventriculos intromitteretur.

**Arterialis vertigo.** Est affectus quo caput circumagi videtur. In quo si præterea tenebræ oculis obuersionentur, *αἰνιδίαι*, quasi tenebricosa vertigo, appellatur. vide *αἰνιδία*.

**Arterialis quinquaspos.** describitur à Corn. Celso libro 5. cap. 19.

**Arterialis.** sic vocata est hedera à Baccho, qui primus eam ex India in Græciam asportauit.

**Arterialis.** fici quibusdam *ἡ χαμαίνης* dicta est.

**Arterialis.** emplastrum est Heræ Cappadocis, ut ait Aetius, à quo bis describitur lib. 15. valens mirum in modum ad abscessus & ad mammas & ad inguina, vim habens trahendi & per latentes meatus discutiendi. Recipit ceræ, terebinthinæ mannæ thuris, spumæ nitri, olei veteris, singulorum sexuncem, misyos crudi vnciam vnā, aquæ pileariorum quantum sufficit. Spumam nitri & misy cum aqua terito, & cum oleo coquito: ceræ vero cum oleo liquatæ terebinthinam adjcito, & paulatim ad compagem coquito, ut manus non inquinetur, & ablatis ab igne mannâ thuris inspergit, & assidue agitando frigatefacito, & ad reliqua prius trita ammiscito residuum lixiui paulatim instillando, donec totum fuerit absumptum.

**Arterialis.** est vel vitis vel hedera, ut scribit Gal. libro 12. *τῶν ἰγνῶν*, exponens Ruffi Ephesij versus. vtraque enim Baccho sacra est, qui à poetis *ἀρτηριῶν* appellatur.

**Arterialis.** dicitur à quibusdam *ἀρτηριῶν* vel, ut Galeno placet, alterum genus est *τῶν ἀρτηριῶν*.

**Arterialis collyrium.** Dionysii collyrium, describitur à Corn. Celso lib. 6. cap. 6. Feruntur etiam Dionysii nomine emplastra duo, vnum nigrum, alterum rubrum, quorum descriptiones habentur apud Scribonium Largum.

**Arterialis.** sunt ossæ eminentiæ quæ prope tempora nascuntur. dicuntur & *κίετα*, hoc est cornuæ, detorto à cornigeris animalibus nomine. Authoꝝ definit. medic. inter affectus præter naturam enumerat. Sic dicuntur à Baccho quem poetæ cornutum fingunt.

**Arterialis collyrium** apud Aetium lib. 7. quod & inter *ἰσχυρὰ*, & inter *χαλὰ* collocari potest. Nam & myrrhâ continet, & vino Chio lzuigatur. Non dissimilem ab eo compositionem Paulus recitat libr. 7. titulo malabathrini collyrii & isorhei.

**Arterialis.** templi curator apud Hippoc. quod quæ in eo sunt, inspicat & curret. Dictio Artica est, à multis etiam vsurpata.

**Arterialis.** est quæcunque aliquo modo excedunt, in naturalem & moderatum statum restituere. dicitur & *ἐκαστοῦ*. Erotianus *ἀποδοῦν* interpretatur *ἰσχυρὰν*.

**Arterialis.** *μυρρα* est *τὸ ἰσχυρὸν καὶ ὑδατὸς*, hoc est, mutatio in serum & aquam apud Hippocr.

**Arterialis.** Plinius florem Iouis interpretatur. Est autem æstiuus, sine odore soloque pur-

pureo colore commendatur. rustici cocolurdas vocant.

**Διὸς βάρβαρος.** Iouis glans. Latinis dicitur castanea. Est arbor inglandi non dissimilis, foliorum venosiore & fimbriato, nuce intus solida & plurimum plana, triplici tegminis ambitu septa, membrana primum amara, mox lento cortice, demum echinato calyce. Plura quidem sunt eius genera, sed duo præcipua, vnum atrile, multo maiore corporis tuberculo, Galli maronem vocant: aliud longe minus & veluti ferum. Galenus castaneam non esse mali succi scripsit. crassum tamen succum generat, ægre concoquitur, & flatum excitat ventremque adstringit, eodem auctore.

**Διοσκουρι.** dicuntur à quibusdam *αἰ παρωδῆς*, vt habetur in libello definitionum medicarum.

**Διοσκολιπύον.** nomen est compositi medicamenti, cuius compositionem Galen. geminam recenset lib. 4. san. tuende: alias ex paribus omnibus, cumino, pipere, ruta, nitro: potestque ita magis ventrem soluere, præsertim si crassius apparatus est: alias cum reliquorum pari pondere miscetur nitri dimidium. Facit ad flatus discutiendos, & ad dissecandum humores crassos, & ad cruditatem quæ in primis venis continetur. Paulus lib. 7. præparat ex cumino aceto madefacti torrefactique vicia vna, piperis, zinziberis, singulorum vnciis duabus, rutæ vitidis sesquuncia, nitri drachmis duabus & dimidia. quæ omnia melle excipienda sunt.

**Διόστρονον.** nomen est arboris apud Theophrastum: quam nonnulli contendunt eam esse quæ appellatur Iouis barba, & quam alii *διόστρονον* malunt vocare.

**Διόστρονον.** sic dicitur à quibusdam *ἡ διόστρονον*. Aliis sic dicitur arbor quædam quæ vocatur Iouis barba, quæ in siccis nascitur folio argenteo, & in rotunditatem spissa.

**Διόστρονον.** Iouis barba. dicitur à quibusdam *ἡ χυονομήν*, vt habetur apud Dioscor.

**Διοσφρηγίς φάρμακον.** medicamenta vrinam mouentia. Ea duum sunt generum. Aliqua enim mediocriter id præstant, vt *οὐκιδιφρηγίς*, hoc est, poros expurgantia medicamenta, quia calida sint, tenuiunque partium: alia vero vehementius, vt quæ plurimam mouent vrinam. Hæc prioribus acriora sunt, multoque magis siccant & exsiccant: cuius generis sunt semen apij, petroselinij, feniculi, dauci, smyrnij, & quæcunque lac augent & menses mouent, quod ab his sanguis non modo extenuetur, sed fundatur etiam atque secernatur. Siquidem quo facile ad se attrahant renes quod in sanguine aequum, tenue & serosum est, hæc duo moliri oportet, primum totius sanguinis fusionem, deinde segregationem, quorum neutrum absque valido calore fieri potest. Calori autem adiunctam esse oportet siccitatem, quod humiditas acrimoniam retundat in ciendis vrinis necessariam.

**Διπλάμα.** vas duplex. Id quod patet ex scriptis Galeni libro septimo *τῶν κτ' ὀπῆς*, vbi Critonis arteriacas describit. Eas enim ipse *διπλάματι* coquendas præcipit, quomodo vnguentarii vnguenta sua præparare solent, in magnum leberem calidam aquam infundentes, & in eum alterum statuentes, qui medicamentum quod coqui debet contineat, deinde suppositis carbonibus aut lignis quæ fumum non faciant, ignem accendentes. Idem habet libro etiam quinto, vbi coquendi olei lentiscini rationem instituit. Verum non semper ab eo *διπλάμα* dicitur, sed aliquando *διπλοῦν ἐργεῖον*, & *διπλὸν σκεῦος*, hoc est, duplex vas & instrumentum: quo nihil est in officinis pharmacopæorum visitatus, à quibus & duplex vas & balneum Mariæ appellatur. Neccaret quidem magna ratione eiusmodi decoctio: impedit enim ne ignis violentia dissipentur eorum vires quæ coquere volumus. Minus enim aqua feruens agit quam vel ignis vel calor siccus. Quare mitiora quidem sunt quæ ita decoquuntur, etiam si minus diu duratura videantur.

**Διπλοῦν.** emplastri genus est à duplici facie seu colore sic dictum. vide *διχρῶμον*.

**Διπύλον.** instrumentum chirurgicum, hoc est, specillum duas cuspides seu capitula habens. *πύλον* enim Græci extremum specilli summamque cuspidem appellant. dicitur tam singulari numero quam plurali, aliquando absolute, aliquando cum addito *διπύλων μόνον*.

**Διπυλῆτις ἡ**

**Διπυρος ἄρτος.** est panis gentis apud Hippocr. delicatum, & ad aquam intercutem cibo vtile. ex quo coniectari licet pro biscocto capiendum esse.

**Διπρυγία.** dicitur à quibusdam *ἡ διπρυγία*, vt habetur apud Dioscor.

**Δισκοειδὲς ὕδρον.** idem quod *ἡ κρόσσωνειδὲς*, vt habetur apud Aetium lib. 7. cap. 1.

**Διστρία ἡ**

**Διστρίασις.** affectus est palpebrarum, videlicet cum sub ordine naturali pilorum palpebræ alius ordo pilorum præter naturam succrescit, hic oculorum membranas pungit, & fluxiones in oculum excitat. Oritur ex humoris cuiusdam in eam partem defluxu, qui copiosus quidem, sed rosionis & acrimonie expertus sit. Nam acrior aut magis salis, aut alio quodam modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebræ pilos corrumpit. dicitur & *πυρίασις* hic affectus: sed *πυρίασις* generalior est, *φάλαγγων* etiam comprehensens.

**Διπρυγίσις.** idem quod *ἡ διπρυγίσις*, vt habetur *ἡ διπρυγίσις*.

**Διπρυγίς.** diphrygès. Est perfecti æris veluti fex subsidens & coherens imz fornacum partit: tanquam vistorum in foco lignorum cinis ablato ære visitur. Enumerantur eius genera quatuor, quæ omnia constant ex materia, seu lapide æroso torrefacto, vel etiam cremato,



cremato, aut excocto. Primum fit è luto quod è specu quodam Cypri sublatum primo arefit sole, mox circumdatum sarmentis viritur, atque ex eo *stipitis*, hoc est, bis crematum, vocatur, nempe solis ardore & ignis calore. Id in sola Cyprio fieri Dioscorides tradit. Alterum est veluti sedimetum quoddam & fex æris excocti: quod postquam æs affluxit in tatinum, remanet in fundo fornacis: hoc Galenus in Cyprio proiectum inuenit in spatio intermedio inter ædes ante metallam extructas & vicum eis subiectum; quod post cadmiam inuentum præfectus metalli inutile esse dixit, atque iccirco non aliter quam cinerè lignorum in foco vstorum proijci. Tertium fit ex pyrite æroso, per aliquot dies in calcis modum cocto vsque dū rubricę colorem contrahat. Quartum fit ex lapidis proprie dicti orbibus, qui si fuerint ex pyrite excocti, eos bis aut ad summū ter torrere satis est: si ex lapide fossili, is quamvis multoties sine in arca sue in fornace excoctus, tamen vix diphrygis naturā assequitur. Omne diphryges saporem habet æris, itaque mistis etiam viribus præditum est: nam modice & adstringit & acre est, vt æs vstum: vehementer siccāt, ideo vlceribus rebellibus multum prodest. Præstantissimū habetur quod ad purpuram inclināt: deterius cinereum est vel fuscum: secundi generis nigricat. habet & aliquod colorem rubricę, pro quo ochrastrū vstam quondam vendi solitam Dioscorides auctor est. At diphryges madefactum, vel æris colorem contrahit, vel cæruleum euadit.

*Διχαλκον*. pondus duorum æreolorum, hoc est tertia pars oboli: siquidem obolus ἑξ ἡμωβόλων hoc est sex æreola, continet. Proinde male apud Paulum Eginetam scriptum est extremo cap. 29. l. 3. *διχαλκόν διχαλκόν ὁ ἑξ ἡμωβόλων*: clarerij dichalcon, quod est semiobolus. Siquidem ἡμωβόλων continet ἑξ ἡμωβόλων.

*Διχαλκίς*. vocantur in vtroque ordine quatuor dentes anteriores, quod cibum diuidant, qui eandem etiam ob causam *πυλὸς* appellantur. vide *πυλὸς*.

*Διχαλκός*. est genus medicamenti cui geminus color inest. neque enim particularis alicuius medicamenti nomen est, sed multorum quæ duplici colore prædita sunt. Horum autem colorum rationem Galenus explicat libro 2. ad Glauconem, de sinu differens. Ex lithargyro, inquit, & arugine plurimum decoctis emplastra sunt *ὑπὲρ τὴν φάρμακον* dicta. His vero, statim vbireposita sunt, quædam extrinsecus supereminentia fusca concreuit, sub qua pars medicamenti profundior plusquam ab initio fulua apparet, atque iccirco eiusmodi emplastra *διχαλκία* & *διχαλκίον* appellantur.

*Διχαλκός*. etiam à quibusdam dictum fuisse in *ἀντισπασμῶν*, Dioscor. auctor est.

*Διψία*. sitis. est frigidi humidique appetentia. Ea autem duplex est, vna naturalis, altera animalis, sicut & ipsa ciborum appeten-

*Διψία*. Illa quidem naturali quadam inclinatione frigidam humidamque substantiam desiderat, quam in dissipatæ locum substituat, non aliter quam ciborum appetentia calidam siccamque substantiam exposcit. Cum enim corpora nostra quatuor elementis consent, eaque expediat in eodem temperamento, quantum fieri potest, conseruare; natura cibi potitionisque appetentiam nobis indidit, vt illo quidem, quicquid calidæ siccæque substantiæ dissipatum est, restitueretur: hac vero quod frigidi humidique, effluxit, sarciretur. Animalis autem sitis est, cum ventriculus exugi se sentiens potum desiderat. Ad eam vero tot prorsus symptomata eodemque ordine concurrunt, quot & in ciborum appetentia Galenus constituit, de quibus vide *ἰνδύς*. Quintam quoque circa cibos symptomata, totidem etiam in siti spectari Galen. libro 1. de symp. causis ostendit. Aliquando enim quædam priuatio sitis est, hoc est, nulla prorsus sitis, cum corpus vel propter excessum humoris & frigoris potum penitus non expetit, vel ventriculus affectionem suam sitimque non sentit. Aliquando vero minor quam deceat sitis est, cum eadem ipsa remissiora sunt. Interdum autem etiam vitiosa est, habetque se ad potitionem cum ea quæ alimentum vitiosum appetit, alias quidē immodeste potum affectans, si in ipsis ventriculi tunicis malus aliquis succus salsus aut biliosus continetur, aut naturale humidum in eo veluti feruet, vt per febres ardentes accidit, alias vero prauum & à natura abhorrentem; pro ratione vitiosi succi in ventriculo & corpore redundantis. His accedunt & aliæ causæ inexplabilis sitis, vt à vipera, aqua marina, medicamentis, & aliis eiusmodi, quæ Galenus recenset.

*Διψία ὑπερφάνεια*: sitis superficialis. Dicitur apud Hippocratem libro 6. *τὴν ὑπερφάνειαν*, valde exigua; quæ nec à toto corpore; nec ex magno ventriculi affectu excitata est; sed arecentibus aut incalescentibus locis illis per quos ab ore in ventriculum humor delabitur.

*Διψία*. à quibusdam dictus est morbus renum, quem *διψία* appellant, propter vehementem sitim qua eo affecti torquentur. vide *διψία*.

*Διψία*. herba est aculeata, binum fere tubitorum, foliis lactucæ prælongis, geniculata, hispida, torulos habens in quibus ros aut pluuus humor subsistit: vnde nomen videtur traxisse. Latini labrum Veneris propterea appellant: herbæ virga pastoris, vulgo pectorius cardo dicitur. Eius radix secundo ordine exiccat, & nonnihil absterget.

*Διψία*. pondus est duorum obolorum, sine scriptuli vnus. *διψία* enim, hoc est scriptulum, duos obolos pondere efficit. dicitur & diuisis nominibus *διψία* & *διψία*. Ex eo fit *διψία*: vt apud Galen. vide *ἀντισπασμῶν* *ἰνδύς*.

**Διόσκορος**, id est, ex aqua formato pastillos respondere duorum obolorum. **Διόσκορος** habetur apud Aetium libro 7. **cap. 19.** **Δογματικοί** dicuntur qui ratione duce inveniunt remedia, ex quibus perfici possit morborum curatio. Idem aliis nomine **λογικοί**, & aliquando **σοφιστικοί**, quod methodo remedia conquirunt, appellantur, ut scribit Gal. initio lib. 3. **meth. med.** Diverſi tamen sunt à methodicis proprie dictis. Cum enim à morbo remedia per rationem & methodum investiganda referrent, in eo tamen differebant, quod Methodici communia tantum quidam dogmata, quae **κοινὰ** vocabant, consideranda dicerent. Dogmatici vero non ea tantum, sed multo etiam plura in morborum curationibus spectanda esse arbitrantur. Neque enim curationis indicationes ab ipso tantum affectu petendas censent, verum etiam ab aegrotantis viribus, natura, ætate, sexu, habitu, consuetudine, anni tempore, colli situ, regione, omniaque salubria, & infalubria & neutra diligenter cõtemplantur, nihilque omnino negligi volunt quod ad curationem pertinere possit. Præterea vero rerum etiam usum atque experientiam adhibent, quam tamen negant inveniendis remediis solam sufficere. Eorum princeps fuit Hippocrates, quem sequutus est Diocles, Praxagoras, Chrysippus, Herophilus, Erasistratus, Asclepiades & Galenus, qui sectam eam constituerunt, non à Methodicis modo, ut dictum est, verum etiam ab Empiricis valde diversam. Siquidem Empirici res tantum evidentes confectabantur, & ijs tantum credebant, quæ vel sensui paterent, vel memoriæ per sensum mandata essent. Dogmatici vero præter hæc, illis quoque fidem habebant, quæ ex naturali rerum cõsequencia per rationem acquiri solent. Itaque Dogmatici rationes suas, quod rerum essent occultarum, **ἐν αἰσθητοῖς**: suas vero Empirici, quod essent evidentium, **ἐν ἀποδείξεσιν** appellabant. **Δοῦλο**, furunculus. Id nomen, ait Galenus, nec locum affectum repræsentat, nec causam quæ ipsum efficit. Significat autem tumorem **ἐν τῇ μέρει**, ex crassis humoribus in carnosis plerumque partibus consistentem, mittem quidem cum solam cutem occupat, sed perniciem & malignum ubi subter actis radicibus erumpit. Galen. libro 5. **Δοῦλος** geminasti eius differentiam facit, alios dicens esse duos, varis similes, & qui concoctionem vix admittant, alios vero esse **φλεγμονώδεις** & magnos, qui febrem etiam aliquando excitent, & in pus vertantur. Hi corpora paulatim conficiunt, & mortiferi sunt. Nascuntur furunculi passim & in quacunque parte. **Δοῦλον** emplastrum nomen est, quod à Paulo lib. 7. describitur. dicitur & **δοῦλον** medicamentum valens adversus **δοῦλα**, cuius meminit Paulus lib. 4. cap. 23.

**Δοῦλος**, cochleare, de quo vide in dictione **χελών**. significat & radium siue pistillam quo aliquid in mortario tunditur.

**Δοῦλος** appellantur, ut ait Galenus libro 1. de alimentorum facultat. semina plantarum hortenſis, quæ alii **λόγος**, alii **φασκόλιος** appellant. Nec vero semen ipsum modo, sed & ipsa planta sic dicitur. Verum, ut idem eodem loco scribit ex dictis Hippocrat. in libro, de ratione victus, dolichi videntur esse cicerculæ & phascoli. & Diocles eos similiter pro phascolis videtur accepisse. Idem sentit & Aetius libro 1. addens etiam quod ab aliquibus similax hortenſis appellantur. Galenus libr. de euchym. & cacochym. scribit dolichos, cicerculis meliõres esse, sed deteriores faba, piso & lenticulis. Suidas pro paroxytos **δοῦλος** vocari hoc legumem tradit.

**Δοῦλος** dicitur à quibusdam **δοῦλος**, hoc est spina alba, ut habetur apud Dioscorid. forte quod inani & concavo caule harundini similis sit.

**Δοῦλος** species est **δοῦλος**, id est, arundinis eius quæ apud amnes nascitur crassa & concava, quam alio nomine **δοῦλος** vocari Dioscorides scribit. Galli rosetum nominant.

**Δοῦλος** mala doracia. Genus sunt præcoxis siue Armeniaci mali, præstantiora Persicis, ut quæ nec acceſcant nec corrumpantur. Paulus scribit ea mala nuncupari etiam Armenia. In Geoponicis inveniẽs scriptum **δωρεάν**.

**Δοῦλος** caprizans pulsus. Est motus inæqualis in vna pulsatione vnaque arteriæ parte, qui intercidit quiescere, & post eam velocior euadit. Similis est similitudo à capra, quæ post primum saltum in aere adhuc suspensa manet, & denuo velut ex insperato, multo velocius resilit. Vnicus est pulsus. Quamvis enim bis tactum feriat, hoc tamen in vna diastole fit, ex mutuo certamine duarum inter se facultatum, tum eius quæ cor dilatat, tum alterius quæ contrahit. Oritur autem ea concertatio vel ex inæquali cordis aut arteriarum intemperie, frigidis partibus calidas moveri & plene dilatari verantibus, vel calidis frigidis ad motum compellentibus; vel propter ingentem fuliginosorum excrementorum copiam, cum præcalida cordis intemperie, sicut Galenus lib. 2. de præſag. ex pulsibus explicavit.

**Δοῦλος** sic dicitur à quibusdam **δοῦλος**, ut habetur apud Dioscoridem. Ratio est quod ceræ vulneratæ dictamnum primum ostenderunt, quibus eo pastis tela statim decidunt.

**Δοῦλος** cœna apud Hippocr. quæ vesperi fiebat. dicitur **δοῦλος**, quod qui cœnaturi essent, debebant hasta abstinere. Nā quod nos **æcis** vocamus, veteres **δοῦλος** dicebant, **δοῦλος** dicitur à Cræteæ frutex fere cubitalis, si-

his, similis oleæ recens enatæ, quæ modo surrexit in vimen. Dioscorides in *de pisoni* idem esse cum solano furioso, in proœmio lib. 6. prodidit: similiter & Plinius, qui præterea *de pisoni* vocari dixit quod olim eius succo lancearum, quæ *de oleo* dicuntur, cuspides ingererentur inficerenturque. Demophon autem, quod ad inferendam mortem pares *de oleo* vires habeat. Est enim venenum, de quo Theophrastus scripsit eum qui drachmæ potere biberit, sibi placere, ac se pulcherrimum existimare, mente iam tentari coëpta: qui vero duplicato pondere, magis insanire, spectris animo obuersantibus, si vero triplicato, perfecte & ingiter insanire: quod si quid ponderi adiiciatur, repete mori. Colore & gustu lactis est, & temperie frigidum, naturaque somniferum. Vide Alexipharmaca Nicandri & nostras in ea annotationes.

*Δραχμή*. palmus. Mensura est apud Græcos: quarum dimetiuntur internalla: sic dicta est *ἀπὸ τοῦ ἁρξάου*. Constat ex quatuor digitis, de qua sic Iulius Pollux, *δραχμή δὲ, συγκαταλέγεται ἀπὸ τεσσάρων δακτύλων*. Eos autem transuersos intelligere oportet. Eadem mensura & *δραχμή* & *παλαστή* & *δύρον* dicitur.

*Δράκων*. est herba cubitalis, gracilibus virgulis, foliis lepidii, sed tenerioribus candidioribusque, in cacumine sambuci gerens umbellam, in qua candidi flores emicant. Dicitur alio nomine *ἀράκων*. Alii oriërale nasturtium, alii Babylonium vocant: semen eius piperis vicem supplet.

*Δράκων*. sic dictum fuisse à quibusdam *τὸ ἐρυθρὸν δάκνεν* Dioscorides auctor est.

*Δρακύντιον*. dracunculus. herba est simplici caule, bicubitali, laui glabroque, baculi crassitudine, versicoloribus anguis inæulis variegato, purpureis etiam intercurrentibus lituris, ita ut plane serpentis habitum, colorëque referre videatur: Fructus illi in vertice est, vuarum modo collectus, herbaceo primum colore, deinde cum maturuit luteo, deinceps tanquam lingua concauo foliorum sinu, cœn rictu quodam serpentis exeritur, & quasi spectabili hiantis draconis forma mediis è faucibus emicat, unde & nomen habet. Ea est quam officinæ herbam serpentariam nominant. Calfacit & tenuinū partium est, acre, & amarum, leuiterque adstringit. Itaque maxime viscera expurgat, crassos & lentos succos extenuans. Ex ea sanguinē Draconis in India colligi Aetius scribit lib. 1. cap. 12. in descriptione emplastri quod *τοῦ ποταμοῦ* inscribitur.

*Δρακύντιον*. dracunculus. Malum est curis, ut scribit Introductionis seu Medici auctor, varici simile, magnumque dolorem, dū paululum prominens mouetur, concilians. Aetius autem ex Leonida dracunculū lūbrico similem esse dicit, interdum magnū, alias parū reperiri, & frequētius quidem in cruribus, aliquādo vero & in brachiorū musculis oriri & consistere: nasci autem in Æthio-

pia atque India maxime pueris, lūbricis latissimis non absimilē, moueri que sub cute sine molestia, verum tēporis progressu circa dracunculū extremitatē suppurationē fieri, cuteque aperta dracunculū caput exerere: quē si quis tentet attrahere, dolorem ingentē moueri, præsertim si eū abrūpi cōtigerit: quod enim intus relinquitur, acerbissimos dolores excitare: proinde ut ne intro animal recurrat, valido filo brachiū constringi oportere, idque quotidie agendum esse, ut dracunculus paulatim progrediens integer excludatur. Verum Soranius, ut refert ex eo Paulus Æginetæ, nō existimat animal esse, sed aeruolam quandā substantiā, quæ opinionem motus solum præbeat. Sed quid reuera sit, nemo medicorū explicare potest: qui Europā incolūt posse tamē animal esse ratio nobis dicitur, cum non modo in ventriculo atque intestinis creari, verum etiam ex cute erumpere, tum pediculos, tum maiora quandoque animalia cōpertissimū habeamus ex historiis.

*Δρακύντιον*. laquei nomen ab Oribasio descripti ad talum suo loco motum. Dicitur vero eodē auctore & dracones in machinamentis, qui in vicem manubrioli ductarii fabricantur.

*Δράκων*. diuulsa, dilacerata, apud Hippocratem. Homerus ea significatione *δρακόντιον* dicit.

*Δραχμή*. drachma. nomen est ponderis, mensuræ & nummi. Ponderis non vnum ubique fuit, Ægyptia obolum pēdis, scribete Cleopatra, *δραχμή ὃ καὶ ἀπὸ τοῦ ὀμῶντος καλεῖται αἰγυπτιακή πρὸς ἑξῶν μέρος ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ δραχμῆς ἀγορεύεται ὀβολὸν ἄ*, hoc est, drachma autem etiam alia cōsimili significatione vocatur Ægyptiaca, quæ sexta pars est Atticæ drachmæ, pendens obolum vnum. Attica sex obolorum fuit, ut & ex sententia nūc citata palam est, & ex Cleopatrac verbis quæ sic habent: *ἡ δραχμή ἔχει ἡμίσητα γ'. ὀβολὸς δ' ἑξήμους β'. καὶ ἑπτα μ'. χαλκὸς μί'*, hoc est, drachma habet scripula tria, obolos sex, lupinos nouem, filiquas octodécim, æreola quadraginta octo. Id etiam testatur Plinius scribens, Drachma Attica (fere enim Attica obseruatione medici vtritur) denarii argentei pondus habet, eademque sex obolos pondere efficit. Ergo apparet drachmam medicam eiusdem cum Atticæ ponderis esse. Mensuralis porro drachma etiā vnciæ octaua pars fuit, & nonagesima sexta libræ, & in Romanorum cornibus, ut scribit Galenus, lineis intersectis distinguebatur. Ceterum *Δραχμή* etiā nummus fuit pendens drachmam vnam. Is fere argenteus fuit, sicut apud Romanos denarius, de quo Suidas scribit, *δραχμή ὃ, ὅλην τοῦ μάρκατος ἀργύρου*. hoc est, Drachma aut pōdus denarii argentei. Et Fānius: *In scripulis ternis drachmum, quo pondere dolitis*.

*Argenti facili signatur pondus Athenis.*

Atque etiam Alexarchus apud Athenarum mutato more loquendi *τὸν δραχμὴν ἀργυρεῖδα* nuncupauit. Verum hanc argenteam drachmam Galen. eandem cum denario

Romano statuit lib. 8. *¶ 17. rēmis.* Quod si verum est, septem drachmæ argenteæ viciam constituunt, cum iuxta Celsum lib. 5. cap. 17. & Scribonium Largum in libri sui proœmio, in vicia pondus septem denariorum sit. Verum ea paulo leuior est denario, ut suo loco diximus. Fuit & aurea drachma, quam *σπερμυλὸν χρυσεῖον* Hefychius & Suidas nominant. Dicta est *σπερμυλὸν*, ut Iulius Polux scribit, quod sit quasi manipulus obolorum, quem *σπερμυλὸν* vocant *ἀντὶ τῆς σπέρματος*, quod comprehendere, pugnūque implere significat.

*Δερμὶς.* acris. id dicitur quod linguam mordet, & cum multa caliditate erodit: sunt enim omnia acris valde calida & tenuium partium, proinde vehementer calfaciunt, incidunt, digerunt, aperiunt, purgant, irritant atque ad excretionem impellunt.

*Δερμὶς.* acrimonia qualitas est gustatilis, iisdē facultatibus prædita quibus supra acris polleat dictum est.

*Δερμὶς.* acrium esus. Vtitur ea voce Dioscorides aliquot locis, utitur & reliqui medici. Marcellus interpretatur vomitionem ciborum acrimonia quæ sitam. In quo tamen non videtur vim huius verbi plane assequutus. Neque enim acris cibi citandis modo vomitionibus conducant, sed ad alia etiam pluraque utiles sunt, ut ad calfaciendum, aperiendum, incidendum, digerendum. Hæc enim per se præstare possunt cibi acres, vomitiones non item: quas etsi radicula, eruca, fassamentum venis, origanum viridis, cepæ, porrum & alia quædam acris pronocent, non tamen quicquid habet acrimoniam, protinus vomitorium est. Itaque quod *ἀκρὸν* scripsit Dioscorides, *ἢ τὴν δερμὶν φέρει* *μάλιστα ἀκρὸν*, hoc est, ad acrium esus præcipue quadrare, intelligendum accommodari maxime & convenire, quoties cibis acrioribus opus est, siue ad ciēdos vomitus, siue ad calfaciendum, siue ad incidendum, siue ad aliud quidvis quod per acres cibos queritur.

*Ἀποσπῆμα.* mel roscidum, quod & *ἄσπῆμα*, id est, mel ærium, appellatur. Venit hoc ex aere Vergiliarum exortu vel per Caniculam sub lucanis temporibus, siue ille sit cœli sudor, siue syderum salina, siue purgantis se aeris succus, siue aquæ sit liquor, siue naturæ, cum prima aurora locis quibus provenire solet, folia arborum herbarumque melle roscida inveniuntur. Quod si qui matutino sub diuō fuere, vinctas hoc liquore vestes, capillumque concretum sentiunt: Hoc tanquam ros è cœlo cadens, dum venit, obuiō terræ halitu cōcrefcens in mellitos grumos coit, qui herbis, arboribus & lapidibus interdum inueniuntur hære. Id manna ab Arabibus appellatur, ut ex ipso etiam Galeno patet, cuius hæc sunt verba capite de melle: In foliis, inquit, stirpium adnascitur quidpiam, quod nec eorum succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sed rorulentum

quiddam, nec tamen cōtinenter neque copiose pronasci solet. Nec me præterit per æstatem in arborum, fruticum, herbarumque foliis plurimum fuisse inuentum, sic ut à ludæis rusticis Iuppiter diceretur melle pluisse. Præcesserat tum nox frigidior, pridie calida siccaque cœli conditio diluxerat. Quapropter inter rerum naturæ peritos conveniebat, halitus quos terra vel aqua prospirasset, extenuatos & excoctos, æstivæ frigoris beneficio coaluisse. Id in regione nostra rarius evenit, in Libano monte quotannis, adeo ut extensis pellibus arbores succutiant, receptoque quibd profluit, ollas & fictilia compleant. priusque nomine vocant *ἀποσπῆμα*, id est, roscidum mel, & etiam *ἄσπῆμα*, id est, mel ærium. Hæc Galenus.

*Ἀπὸ σπῆματος.* filicula, herbula est in vetustorum roborum musco nascens, filici similis, multo minore foliorum iacitura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbo in dulcedinem vergentē. Vis ei septica est, & caustica, proinde pilis glabram cutem efficit.

*Ἀπὸ σπῆματος.* olus est sylvestre filici simile, ramis sesquipedalibus, flore sambuci lacteo, semine gustu mordaci, quo vice piperis rustici utuntur. Officinæ nemoralem myrtum vocant.

*Ἀπὸ σπῆματος.* drupus, hoc est, maturus & primus nigrescens, dicitur proprie de fructibus non oleæ modo, sed reliquarum etiam arborum maturis & adultis & iam ex arbore casuris *ἀντὶ τοῦ τῆς ἄκρης δρῦς*.

*Ἀπὸ σπῆματος.* hoc nomine Græci omne genus arboris omneque lignum comprehendunt, nam quod Gallicum vulgus thesam vocat, Græci *δρῦν ἄσπῆμα*, Latini robur appellant. Habet autem omnis quercus vim adstringendi.

*Ἀπὸ σπῆματος.* dropax. Medicamenti forma est, interdum liquidioris in modum malagmatis, interdum siccioris, emplastri modo, prout usus exigit. Eadem materia, inquit Paulus, constat, quæ & acopa & emplastra. Est autem dropax alius simplex, alius cōpositus. Simplex is est qui & *πικρὸν*, hoc est picatio, appellatur. Pix arida cum exiguo oleo liquatur, deinde dum calet cuti illinitur, & præterea locis agglutinatur, & antequam omnino refrigeret, auellitur. Deinde rursus ad ignem calfacta reponitur, & similiter priusquam frigescat, auellitur, & tertio quartoque, vel sepius etiam id repetitur. Convenit frequentibus vomitionibus, & cruditatibus, & cœliacis affectionibus, & reliquis partibus alimentum non sentientibus. Maxime vero ante sinapismū adhibetur ad corporis præparationem, & post sinapismum etiam, ut reliquæ morbi euellantur. Dropax vero cōpositus est, cui præterea adiciuntur alia ad diuersos usus, ut ad excitandum calorem piper, pyrethrum, semen rosmarini, bitumen: ad deficcandum vero, sulphur viuum, calcinis farmentorum: ad lancinandum vero, li-



ro, limnestis quæ & adarce vocatur, aut euphorbium. Hæc enim tria liquefactæ pici insperguntur, aut alia etiam eiusdem facultatis. Si vires ægri imbecillæ sunt, liquidior fieri debet in formam malagmaris, & præradi pili in loco cui adhibebitur, & paulatim postea auelli. Sin valentes sunt, emplastri modo præparandus est, & non derafis pilis admouendus, confertimque auellendus, nisi forte capiti aut mento, aut pubi applicandus esset. Sic enim plus habet efficacia, spiritumque remissum magis firmare potest, & ad superficiem reuocare, humoresque attrahere & discutere. Sed & medicamenta depilatoria, *ῥιζοδρα* proprie dicta, dropaces appellantur, ut constat ex versibus Martialis qui habentur lib. 10.

*Lenis dropace tu quotidiano,*

*Hirsutus ego cruribus genisq.*

Fortè quod sola pice constarent in oleo liquata, quemadmodum & dropaces.

*Δροπακὰ φάρμακα*, dicuntur vel dropaces, vel quæ dropacum modo illinuntur. appellantur eadem *ῥιζοδρα* à Galeno comment. 3. *εἰς τὴν κατ' ἰσχυρίαν*, aphor. 32.

*Δυνάμεις*, facultas. potentia. Est causa à qua actio procedit. Sed cum causa ad aliquid dicatur (est enim eius vnus quod ab ea fit, reliquorum nullius) planum est facultatem quoque in relatione ad aliquid dici. Ac quoad agentis causæ substantiam ignoramus, facultatem eam siue potentiam appellamus, in venis quidem sanguificam, in ventriculo concoctricem, in corde pulificam, & in singulis reliquarum particularum propriam quandam eius quam edunt actionis, siue etiam operis (primum enim actionis ipsius facultas est causa, deinde etiam operis ex accidenti quodam) effectricem. Itaque si certa ratione & via quot & quæ facultates sint inuenturi sumus, inuestigare eas ab ipsis operibus oportet. Singula namque opera ab aliqua procedunt actione, hæc vero omnino aliqua præcedit causa, quam facultatem vocamus. Ergo cum variæ admodum sint actionum differentiæ, multiplices quoque facultates statuere necesse est, quas tamè medici in homine in tria summa genera reuocarunt, aliam vitalem, aliam animalem, aliam naturalem appellantes. Si quidem sub earum aliqua alias omnes particulares comprehendunt. Sub vitali quidem pulificam & irascibilem quam *δυνάμει* & *ῥιζοδρα* appellant, cuius tot etiam habentur differentiæ quot & animi passionum. Sub animali vero, sensificam, motricem & principem: sub sensifica, visoriam, auditoriam, odoratoriam, gustatoriam, tactricem, adhæc vigilandi dormiendique facultatem quæ ad primum & communem omnium sensum pertinet: sub principe, imaginatricem, ratiocinatricem & memoratiuam: sub naturali vero, concupiscibilem & nutritoriam: atque sub his rursus attractricem, re-  
tentricem, concoctricem, expultricem, ge-

neratricem, auertricem & reliquas quæ pertinent vel ad generis propagationem, vel ad indiuidui conseruationem, ut sanguificam, ossificam, nervificam, spermaricam & alias cuiusvis particulæ formatrices, vel totius etiam fœtus opifices. Sic quidè se habent tres in hominum corporibus facultates, quas quidè ut operibus, sic etià substantiis instrumentis & sedibus natura seiunxit. Hæc diuersi inter se generis gubernant animal, toti corpori ex uno quodam veluti fonte quæque distributæ. Eas Plato animas vocat, propriam cuiusque substantiam inueniens, quæ, ut ait Galenus, tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistit. Est autem earum vna, ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis, quæ iecur veluti pro fonte habet, canales vero ab hoc in totum corpus sparsos, ipsas venas. Hæc seu appetitricem, seu naturalem, seu altricem vocas, nihil interest, veluti nec si animam aut facultatem. Altera est quæ non modo ut stirpibus aut vita præditis, sed et ut animalibus anima est insita. Hæc sedem in corde habet, ipso quoque insiti caloris quodam cœu fonte. Ab hoc fonte canales arteriarum sunt: vocaturque hæc multis sane nominibus: nam & facultas siue virtus vitalis, & facultas siue virtus animosa, & anima vitalis, & anima animosa dicitur. Tertia anima siue facultas ratiocinatrix in cerebro domicilium habet: ea voluntariis actionibus vna cum sensibus præsidet. Vtitur & hæc particulis quibusdam cœu canalibus, nempe ipsis nervis, sensum motumque per hos in totum animal transmittens. Ergo has facultates seruare, nihil plane est aliud quam vitam seruare. Siquidem qualibet earum amissa, necesse est reliquas quoque perire. Sic enim inter se coherent, ut altera alteri subsidio sit & mutua ope consistant: quanquam fieri aliquando possit, ut vna alterius affectionem non sentiat. Ortu quidem ipso prima est naturalis, deinde vitalis, postrema animalis: nobilitate & principatu prima est animalis, ab hac vitalis, postea naturalis. In actionum autem & vitæ necessitate omnium prima est vitalis, quod ex ea spiritus & vis influat vitæ in partes omnes, siue illæ moueri, siue sentire, siue nutrirī debeant, atque per eam calor innati (à quo omnium partium functiones proficiuntur) temperies in singulis partibus conseruetur. Cæterum præter facultates iam commemoratas alias quoque in medicamentis medici usurpant, à quibus singula suas actiones obeunt. quæ cum sint admodum differentes, in quatuor tamen summa genera ab iis reuocantur, quas appellant primas, secundas, tertias, quartas. Nec vero interest facultates an qualitates dicas: ipsa enim facultas reuera est qualitas, sola ratione ab ea differens: quādo qualitas per se dicitur, facultas vero quatenus ad aliquid refertur. Prima quidem dicitur quæ reliquarum communis est tanquā basis, excepta ea  
quæ

quæ à cæca proprietate est: ex ipsis elementis nullius interuētu prodit, ipsisq; omnium maxime tribuitur. Generatim quidem est calfaciendi, refrigerandi, humectandi, siccandi, tum simplex, tum per horum coniugationem composita: particulatim verò efficiendi id ipsum in principio; mediò; finè ordinis primi, secundi; tertii, quarti: ac primo quidem ordine, obscure: secundo, manifeste: tertio, vehementer: quarto, summe facultas ea tactum nostrum gustatumque afficit, idque in horum singulorum ordinū principio, mediò, finè. Facultas secunda est, quæ primas facultates simplices, vel coniugatas nullius alterius interuētu sequitur; vt facultas molliendi vim humidam primo sequitur: durandi, siccandi; rarefaciendi, attrahendi, aperiendi, tenuandi, calidam: densandi, repellendi; claudendi; incrassandi, frigidam. Vires & qualitates secundas in acerbis, austeris, acidis, dulcibus, salis, amaris, acerbis, digerentibus, adstringentibus, contrahentibus, repellentibus, ex altro trahentibus, referantibus, sensum stupefacientibus constituit Gal. lib. 3. τὴν 13<sup>ην</sup> πρῶτος. Facultates autem tertiæ sunt quæ ulterius procedendo prope particulatim appellantur, vt ἀρτηριακή, καρδιακή, σπληνική, διουρητική, ἐμμητική, ἐκκριτική, ἱππική, ἀποφλεγματική, menses ciendi aut sistendi facultas, seminis generatrix vel extinctrix, prouocandi; reprimendi. Hæ magna ex parte primas simul & secundas sequuntur, vt sarcoticū, siccum primo gradu & detergēs: collenticum siccās & adstringens: epuloticum siccans secundo gradu & valenter adstringens. Est tamen quando in nullam præcedentium reuicere possis hanc tertiam, vomitorium enim aliquando est, vt bulbus vomitorius, nux vomica, agarius & helleborus albus, non ob aliquam primā vel secundam qualitatem, sed quia vel substantiæ suæ raritate innatant, vel stomacho sua substantia sunt contraria. Facultates vero quartæ sunt cum magis etiam procedendo, ad particulares peruenitur facultates, quæ à partibus nomē accipiunt, vt cephalica, cardiaca, stomatica, stomachica, hepatica, splenica: vel à morbis partium, ischiadica, nephritica, podagrica, colica, pleuritica: vel ab effectis, bechica, calculos frangentia, colletica, epulotica, cathēretica, cathartica, carnem super ossa nuda creantia, fœtum corrumpentia, fœtum extrahentia, ad choerandas discutiendas, ad epilepsiam, spasmus, & alia prope infinita similiter dicuntur. Tamen sarcotica, colletica, epulotica inter tertiās numerantur à Galenō lib. 6. τὴν 13<sup>ην</sup> ἔτι & alia ex tertiis eadem ratione inter quartas recenseri possunt, vt lac, semen menses, vrinas, sudores respicientia. Reuēta enim quedam horum ambigunt, & utriusque generis vicina sunt. Ob id Auerois §, coll. cap. ultimo tertiam & quartam in vnam miscet Alii vero quatuor hæc facultatum genera aliter distinguunt, vt primæ sint calfacrix,

refrigeratrix, humectatrix, siccatrix: secundæ, quæ primos effectus primarum sequuntur, vt vis aperiendi, claudendi, erodens, glutinatoria: tertiæ, quibus medicamēti vnam partem magis quam aliam respiciunt: quartæ, quæ sunt à virtute & formā occulta seu specifica, vt purgatrix, theriaca, alexipharmaca: quibus ἐπισπαστικὸν & ὑπερσπαστικὸν mirum est per hos adiungi, cum manifestam causam habere videantur.

*διωκτική*. accipitur aliquando pro ipsa medicamenti compositione & structura, quod sæpe occurrit apud Galenum in libr. τὴν 13<sup>ην</sup> ἔτι, vt πρὸς ἀφάρμακον διωκτική, hoc est, medicamentum tetrapharmacum.

*Δυναμική* (M). potestate esse. Quod quale dicitur tale non dūm est, sed potest esse tale, hoc esse potestare dicimus. Hominem, verbi gratia, qui modo natus fuit, rationale, & auem volatilem: scilicet quod eorum vnumquodque futurum est; si nihil id extrinsecus impediatur, hoc cū iam sit appellantes: vnde arbitror hæc esse potestate non actu dicimus. Perfectum namque est ac iam præsens, ipsa energia, siue quod actu est: quod vero potestate est, imperfectum & adhuc futurum, & vt fiat quidem id quod dicitur, veluti habile, non tamen adhuc subsistens. Ac maxime quidem proprie sola ea potestate esse dicimus, in quibus natura ipsa suo præceptu ad absolutionem venit; præterea quæcunque sentientium, vt sic dicam, continentes materiæ sunt. Dicitur autem potestate esse etiam quod ei quod ex accidenti dicitur, est ex aduerso positum, vt sic carnosus quis iuuenis in frigida lauationem corpus eius ex accidenti, non ex propria potestate calefacere dicat.

*Δυσκοινησία*. difficilis sensus vel prorsus nullus, sic *δυσκοινησία* non modo difficultatem motionis, sed etiam immobilitatem significat.

*Δυσκοινός*. sic dicitur ab Hippocr. lib. 3. τὴν 6<sup>ην</sup> ὁτι δὲ μὲν qui vilibus de rebus multum stomachatur, & de magnis plus cæteris mortalibus diutiusque. *ἀνὰ πρὸς καὶ συνδράμης*, vt explicat Galen.

*Δυσκοινησία* is in quo vlcerà agere sanescunt. quæque laborat vlcenibus curatū difficilibus. cuiusmodi sunt corpora mollia & humida, & quæ aqua inter cutem laborant. ei opponitur *εύκοινης*. Item *δυσκοινης ἕλκος* dicitur vlcus malignum & curatu difficile.

*Δυσκοινησία*. est exulceratio intestinorum, deiectiones ramentosas, cruentas & dolorificas inducens. Latini intestinorum tormina appellant. Exulcerationis causa est bilis mordax, tum flaua, tum atra, sed hæc lethalem excitat dysenteriam, vt scribit Hipp. quod vlcerà quæ ab ea facta sunt, difficilime sanantur. Morbus quidem ipse exulceratio est, symptomata autem plurima, in primis quidem ipsius biliosi humoris per initia excretio varia, mucosa & pinguis, deinde vero tunica intestinorum internæ abrasio, per quā prodeunt membranosa quædam corpora, quæ

que ipsorum intestinorum particulae sunt: postea vero euenta deiectione sequitur, & vicerum interdum crustulae quae ipsius appellatur, & puris non raro magna quantitas: quo quidem tempore affectus ipse iam proprie dysenteria est. Consistit autem illa interdum in crassis, aliquando in tenuibus intestinis, id quod & ex cruore & ex ipsis ramementis diiudicatur. Nam si & cruor & ramementa ita mista sunt reliquis excrementis, ut vniuersa misceantur vniuersis, in superioribus: si vero supernatant, in inferioribus intestinis vlcus esse ostenditur. Talis quidem proprie dicta dysenteria est, nomen habens à laxa particula, quam solam plerique dysenteriam nominandam censent. Alii vero, inter quos ipse etiam Hippocrates est, dysenteriam interdum appellant non ipsam modo exulcerationem intestinorum, verum omnem etiam cruoris per intestina vacationem: quo quidem modo morbi nomen symptomati tribuunt, ut annotauit Galenus comment. 4. in 1. aphor. 40. Sunt autem excretionis sanguinis per intestina sine vlcere tres modi: vnus propter boni sanguinis copiam in toto corpore aucti, qui ex venarum orificiis in intestina apertis effunditur, eo tantum differens ab haemorrhoidum profusio, quod in hoc venae anni duntaxat, in illo autem secundum totam intestinorum longitudinem, perque omnes eorum anfractus, longeque ab ano venae aperiantur. Talis *δυσεντερία* appellatur, acciditque potissimum iis quibus aliquod membrum exsuum est, aut intermissa exercitatio. Secundus est cum propter iecinoris imbecillitatem aquosus sanguis deiecitur, locumque carniū per similes quod enim imbecilla sit vis eius retentrix atque alteratrix, sanguis eiusmodi excernitur: vocatur autem ea *δυσεντερία* tertius est cum sanguis propter bilis flauae vel atrae permissionem acrior venarum orificia aperit, & per intestina fertur. haec proprio nomine caret, & a Paulo comprehenditur sub ea dysenteriae specie quam *αἱματική* vocant: distinguitur vero à Gal. lib. 3. de causis sympto. illam propter sanguinis copiam, hanc propter acrimoniam efficiatserenti. Itaque quatuor sunt in vniuersum dysenteriae: vna vere & proprie dicta, tres vero improprie à symptomate, quod omnium commune symptoma sit sanguinis per alui excretio.

*Αντρίωλα* dicuntur vlcera quae vix cicatricem recipiunt. Nec vero caeothae eam etiam admittunt: differunt tamen inter se, quod vlcera quae ex humorum confluxu vel multorum vel acrium oriuntur, si locus ipse affectus eiusmodi dispositionem non contraxerit, ut quod ad ipsum influit bonum probumque corrumpat, *αντρίωλα* appellatur: si vero locus affectus ad eam dispositionem iam peruenierit, ut corrumpat quicquid influit, *καυώδη* dicuntur. Eadem & *δυσεντερία*

& nominantur, & *δυσεντερία* à Philopono.

*Αντρίωλα* qui non facile tristatur aut morosissimus est. Critias ita interpretatur hoc nomen, quicumque propter parua tristatur & propter magna magis vel diutius quam alii homines. Erotianus autem *δυσήμιον* interpretatur & *δυσήμιος* quae *δυσήμιος* τὰς αἰτίας φέρουσα. Hoc est, qui cum vi magna, & difficulter admodum fert ea quae ipsam contristant. Vide *δυσήμιος*.

*Ανδραγαθία* dicuntur apud Hippocr. in prognostico tum qui tarde & paulatim, tum qui cum dolore moriuntur.

*Ανελκυστήν* apud Hippocratem est in placide & moleste decumbere, ut annotat Gal. comment. 2. in 1. aphor. 1. *δυσεντερία*.

*Ανελκυστήν* intemperies. Est mistio inaequalis quatuor primarum qualitarum: vbi enim illae ita coeierint ut earum pares sint portiones viresque, temperamentum emergit exquisitissimum, quod exterorum omnium norma est. Ab eo quodcunque deficiat, intemperies dicitur: tunc enim aliqua qualitas exuperet necesse est, aut etiam dua. Itaque cum quatuor sint ex quibus temperamentum illud exquisitissimum, & ut ita dicam temperatissimum absoluitur, singulorum excessu simplices quatuor intemperatae fiunt, calida, frigida, humida, sicca: & totidem compositae, calida humida, calida sicca, frigida humida, frigida sicca. Nec vero singulorum modus vnus est & vna ratio, sed immensa omnino latitudo, adeo ut intemperatarum infinitae propemodum habeantur differentiae. Ne tamen omnes eiusmodi intemperies morbosae sunt, sed plurimae contra salubres, quae videlicet intra limites sanitatis consistunt. Quum enim omnis actio a partis reperimento proficiscatur, & vari prorsus generis actiones esse oporteat, multiplices quoque temperaturas esse oportuit, quae non simpliciter, sed ad iustitiam temperamenta appellantur. Non aliud autem ad iustitiam significat, quam prout cuique parti expedit. Itaque in singulis partibus primarum qualitarum etiam inaequalis mistio, quoniam secundum naturam est, non dicitur intemperies, etiam si reuera intemperies sit, sed temperamentum, quandiu scilicet naturae modum non excedit: cum vero excessit plane absoluteque, intemperies est, & iam morbus aut morbi causa euadit. Est & praeter istas alia intemperiei differentia, per quam aequalis est quae inaequalis dicitur. Aequalis quidem est quae in omnibus intemperanter affecti corporis partibus aequaliter solaque inest. Ea enim ita inducitur, & occupat corpus, ut depulsa naturali temperie, sola in corpore dominetur: neque enim ea in fieri est, ut aiunt, sed in facto esse. Itaque in habitum transit, & euadit veluti altera natura acquisititia & priori contraria, neque villo dolore molesta est. Eiusmodi intemperies in febre hectica esse perhibetur.

Sicut

Sicut autem in toto corpore, sic & in vna certa parte corporis contrahi potest. Intemperies vero inequalis dicitur, cum idem corpus simul & calidius & frigidius, aut humidius simulque siccius quam pro naturali habitu redditur. Ea in fieri est, eamque ob rem dolore non vacat, & alias in toto animalis corpore fit, alias in vna qualibet parte, idque vel cum fluxione vel absque materie affluxu, quemadmodum Galen. libello de inequali intemperie scripto declarauit. Dicitur etiam inequalis intemperies quando singulæ corporis partes non sunt similiter intemperata, sed varias sortite sunt intemperaturas. cumque corpus totum intemperatum sit, non tamen vnica intemperies dominatur in toto corpore, sed plures in singulis partibus.

**Διούρεσις.** est vrinæ difficultas & cum dolore excretio. Sæpe quidem ambo hæc symptomata in dysuria concurrunt, vt ea difficulter & cum dolore reddatur, nec tamen in dysuria semper coniuncta esse oportet, sed si alterum modo adsit, dysuria recte dicatur. Ea namque manifesto distinxit Gal. comment. aphor. 48. libr. 7. duas dysuriæ species. confluentes, vnam *αὐτὴν πᾶσι* odinam, hoc est, quæ cum dolore alterum, *αὐτὴν μὲν διὰ πόνου, ἄλλαν δὲ διὰ δύσκειν* hoc est, quæ cum difficultate, vt vix ipsa vesica opus suum peragat. Illius causas recenset inflammationem, abscessum, exulcerationem, inequalem intemperiem, & spiritum flatulentum: huius vero aut facultatis imbecillitatem, aut tumorem præter naturam. Ab his enim causis fit, vt cum facere æger cupiat, non statim vrinæ excretio sequatur, sed magno cum conatu atque etiam aliquando dolore. His autem duobus exceptis symptomatis, vrina naturalem excretionis modum seruat, neque inter cisse fluens, neque guttatim neque maturius quam naturæ conueniat. Hæc enim symptomata aliis nominibus appellantur.

**Δυσενμία.** est deprauata alimenti coëctio, siue alimenti corruptela. Symptoma est actionis naturalis coëctricis deprauatæ: quam libuit eo nomine appellare, sicut debilem, *βραδύνη*, protusque abolicam, *ἀσπληνη*. Deprauatur autem, cum alimenta in qualitatem à naturâ alienam alterantur. Ea gemina statuitur, *αἰματική* & *οἰστική*, hoc est, nidiosa & acida hæc frigidis, illa calidis de causis provenit. Intemperies ventriculi calida, eiusque morbi organici calidi, excrementum calidum & biliolum in eo redundans, cibi potusque calidiores, nidiosam gignunt: ea ructibus facile deprehenditur. Non est autem vnus generis, sed quilibet eibus id nidoris genus reddit quod naturæ suæ proprium est, alius virulentum quid, alius cæni fetorem, alius piscium, alius ouorum putidorum aut alterius absurdæ quæque dici vix potest, putredinis nidorem ructu gustuque refert. Contra vero frigida ventriculi affectiones, excrementum pituitosum & frigidum in eo

redundans, cibus potusque frigidior & natura pituitosus, *αἰματικὸς* inducunt, quæ ructibus similiter dignoscitur. Nec tamen ructibus eas ciborum corruptiones perpetuo licet deprehendere, quod, vt scribit Galen. si cibi calidiores fuerint aut flatulenti, & calori frigiditas quædam aliunde accesserit, vapore spirituque ventriculus repletur, qui neque nidorem neque acorem vllum sapiat.

**Δυσπνοία.** spirandi difficultas. Symptoma est læsæ respirationis, commune orthopnoicis, pleuriticis, peripneumoniacis, synanchicis, & aliis plarisque male affectis, à quo ægri *δυσπνοῖαι* appellantur. Galen. tamē li. 7. *καὶ τὴν*. sic eos simpliciter scribit à veteribus vocatos quibus bronchia pulmonis crassius & viscosius humoribus sunt obstructa, & in quibus medicamenta præterquam quod incidunt atque attenuant, humectandi etiam facultate prædita esse oportet. Aerius addit sic proprie dici qui febris omnino expertes sunt, nec grauitatem pondusque sentiunt, nec febricitantium in morem calidum spirant. Celsus ab orthopnoicis qui & asthmatici dicuntur, sola causæ magnitudine distinguit, dyspnoeam scribens esse spirandi difficultatem, non omnem quidem, sed eam quæ modica est, neque extorret strangulat. Nam cum vehementior est, vt spirare æger sine sono & anhelatione non possit, *ἀσπλην* appellari.

**Δυσπνοία, ἢ Δυσπνοία.** apud Hippocratem.

**Δυσπνοία.** emplastri nomen est quod à Galeno describitur lib. 5. *πῶς καὶ ἵππ.*

**Δυσπνοία.** graueolens. de quo vide *δυσπνοία*. Est & nomen malagmatis ad pleuritidem vtilis: est & *δυσπνοία* medicamentum. Vtriusque descriptio habetur apud Paulum libro 7.

**Δυσπνοία, ἢ Δυσπνοία.** principium est intestinorum ab imo ventriculi orificio exoriens. Id sub sede ventriculi posteriore, secundum dextram spinæ partem deorsum expotrigitur, sine vllò anfractu, quo de locum quibusdā partibus quas natura inter ventriculum & ieiunum intestinum collocauit. duodecim digitorum longitudinem vt plurimum æquat, ob idque *δυσπνοία* ab Herophilo primum appellatum est. Sunt qui ipsum intestini nomine non dignentur, sed *δυσπνοία* modo appellent, vel cum addito *δυσπνοία* *δυσπνοία*. In id meatus inferitur à vtriusculum continente, per quem ea in ipsum expurgatur.

**Δυσπνοία, ἢ Δυσπνοία.** nomen compositi ex duodecim rebus medicamenti, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7.

**Δυσπνοία.** herba, cui folia septem lactuicis similia exeunt à radice lutea. Eam quidam putant esse moly Homericum.

**Δυσπνοία.** nomen salis è multis compositi, de qua ante in dictione *ἑλκ.*

**Δυσπνοία.** sic dicta est à quibusdā *δυσπνοία*, vt habetur apud Dioscoridem.



*Δάκτυλος* palmus. mensura est apud Græcos quatuor interuallametiūtur. Est autem quatuor digitorū: sic dicta est *ἡ τῆς ἀδελφῆς* & *ἡ τοῦ ἀδελφοῦ*. Id est, ab eo quod manu plurimas res demus, qua metimur palmum. Eadem aliis nominibus *πλάστη* & *δοχμῆ* dicitur. vide in dictione *δοχμῆ*. Ab eo fit *δάκτυλος*, *πλάστη*, *δοχμῆ*, *πλάστη*, & alia quæ passim apud auctores

occurrunt; & apud Plinium leguntur libr. 35. cap. 14. ubi scribitur *δάκτυλος* lateris genus esse sesquipede longum. Sed aduerte num legendum sit semipede, cum manifesto *δάκτυλος* palmum esse dicat. Sic enim recte lateris illud genus *δάκτυλος* vocabitur, hoc est, duorum palmorum, quæ dimidiū pedis mensura est, cum ipse quatuor palmis constet.

# I O. G O R R A E I

## P A R I S I E N S I S

### Definitionum medicarum

#### T O E.



**E** Ap. ver. est anni tempus primum & omnibus qualitatibus temperatum, æquinoctio quod hyemen sequitur incipiens, & Vergiliarū matutino exortu desinens. Nā cū singuli anni ætatem suam peragant, & quatuor ætatum spatia percurrat, ut initio quidem augeantur & pubescant, postea in vigore sint, exinde declinet, postremo emoriantur, haud absurde vernum tempus prima anni ætas censebitur, quo annus per hyemis intemperiem pene extinctus & demortuus, quasi reduce vitæ repuerascit, & exerendis virgultis, floribus foliisque depromendis, maxima rerum omnium amenitate & suauitate iuuenum more luxuriat. In causa Sol est, cuius accessione & recessioneque quadripartito anni tempora distinguuntur. Cum enim perfecta hyeme ad nos rediens noctis dieique pares horas facit, placidissimo temperatissimoque lydere terras illustrat. Tum calor vigorque omnibus redit, animalia atque omnia ex terra virescunt, maritantur, gestit natura semina accipere & sese aperit, à quo Aprilis mensem quasi à perile dictū aliqui existimauere, atque ille animā inferi satis omnib⁹. Tūc enim genitalib⁹ terræ locis animatur semina. Eo tempore Faunus mundi spiritus, *ἑρμῆς* Græcis dictus, primum flare incipit, genitalis prorsus ventus, à fouendo dictus, ut multis visum est, ab occasu æquinoctiali ver inchoas. Ver autem ille est lenissimus, sic ver talem in modum afficit, ut nemo de eius frigore vel calore vel humiditate vel siccitate queri possit: est enim in eo quatuor harū qualitarum mixtionis æqualitas, quæ & mediam in eo temperaturam & salubritatem conciliat. Ver autē durat donec Vergiliz matutino orientur. Earum enim is exortus, æstatis principium

est. Itaque cum hoc tempore apud nos æquinoctium quinto idus Martii peragatur, & Vergiliarū ortus matutino septimo, octauo vel decimo die Maii fieri insueuerit, paret totū vernū tempus dierum fere sexaginta esse. **Ebenus** arbor est plarumque tenuis & frequentior, vimine raro, in crassitudinem caudicis extuberata, hiuleo cortice & admodum reticulato, dehiscenibus venis, adeo ut per ipsos sinus pars intima vix terui libro contegatur. Lignū omne atque mediale eadem ferme & facie & nitore qui est in lapide gagate. Duo sunt eius genera. Rarum id quod melius, arboreū, trunco enodi, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus iucundi. Alterum cunctis modo fructuat, nodosum & cadidistenuis viriatum. Nascitur in India atque Æthiopia. Tam graue est, ut aquis innatare nō possit, sed protinus demergatur. Dioscorides Æthiopicum laudat magno splendore, cornus ex polni nitore, citra lzuorem prædens materic, si frangatur gustu mordaci, odore cum vitru iucundo, citra fumi tedium. Ebenus caliginē oculorum discutit, contra veteres fluxiones & pustulas pollet. Huius speciem esse Gaicum Ruellius scripto prodidit.

**Ἐλεφάντιον**. dicitur à quibusdam *ἡ ἀδελφῆς*, ut habetur apud Dioscoridem.

**Ἐλῆος**. est *ἡ μάχη*, quæ & althæa, inquit Suidas. Galenus dicit esse *μάχηλον ἀγρίαν*.

**Ἐλῆος**. *ἡ μάχη*. mollificatus est, mollis factus est, apud Hippoc.

**Ἐλεφάντιον**. dicuntur apud Hippocratem qui clauso ore loquuntur, quia videantur ex ventre loqui.

**Ἐλεφάντιον**. congenitum, proprium apud Hippocratem.

**Ἐλεφάντιον**. Est cranii fissura, in qua os affectum loco naturali dimouetur & desiderat, atque ad inferiorem cerebri membranam pertingit, quæ etiā vrget premirque. Est autem in eo fissuræ genere omnino ossis fragmentum

grandius. Nam si os in plura fragmenta per-  
ruptum est, *ἐκπνεσμα* appellatur. sic dicitur  
ἀπὸ τοῦ ἐκπνεσθαι, id est, prope, quod os fractum ad  
subiectam membranam appropinquet.

*Ἐν ὑποφάρυγγι*. idem quod *ὑποφάρυγγις*. de qua vide  
suo loco.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. dicitur apud Hippocratem ἐν τῷ κατὰ τὴν  
ὀφθαλμῷ, habitus ille brachii qui est ad rectum  
angulum, sic ut cubiti os cum humero rectū  
angulum efficiat. Author Galen. in exposi-  
tione huius loci, & comment. 1. *ἐν τῷ ὀφθαλμῷ*.

*Ἐν ἡδυστομάτῃ*. est sessio in aqua medicata ab imis  
pedibus vel feminibus vsque ad umbilicum,  
ita ut supernæ partes non madescant. Quod  
quidem auxilii genus cum plerique mor-  
bis conueniat, iis tamen solis adhibetur qui  
partes intra peritonæum conclusas infestant.  
Itaq; inflammationis renibus sedere conuenit  
in decocto scenigraci, maluz hortensis ac  
sylvæstris & seminis lini: in calculosis affe-  
ctibus conuenit *Ἐν ἡδυστομάτῃ* in iisdem propter  
inflammationem, & præterea artemisiæ de-  
cocto & rosarum & petroselinæ & spicæ-  
nardi, quibus etiam in vesicæ morbo uten-  
dum est adiecta ruta. Ad vterum vero artemi-  
siæ decocto, saluæ, lauri & similium. Ad se-  
dem, meliori papaueris & rosarum. Ad hæ-  
morrhoidas & fluxiones vteri, plantaginis,  
polygoni, malicoræ, rosarum, ruborum, &  
eorum quæ similes vires habent. Ad vulne-  
ra vero ex quibus neruorum distectio timeri  
potest, aqua & oleo. Quod si ad alios præ-  
terea affectus conuenire potest, id accidit vel  
ob balnei penuriam, vel ob imbecillitatem  
ægroti, qui totius balnei vsum non possit ad-  
mittere, vel ob supernæ alicuius partis debi-  
litate, vel affectionem cui aqua perfusio  
inutilis sit, aut aliquod aliud impedimentum.

Ceterum qui in talibus decoctis sessuri sunt,  
omnes sunt illinendi & immergendi in a-  
quam vsque ad infimum umbilicum. O-  
porteret autem partes quæ non madescent  
prius inungere, sed præsertim caput quod  
tegi debet ne repleatur. Qui medicinam  
nunc faciunt, id genus remedii semicupium  
appellant.

*Ἐν ἡδυστομάτῃ*. innixu, apud Hippoc.

*Ἐν ἡδυστομάτῃ*. in profundo, apud Hippoc.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. proprie quidem dicitur oculorum  
angulus, tum maior qui naso est proximus  
& proprio nomine *πτερύγις* dicitur, tum minor  
qui est ad tempora, vocaturque *παρὰ τὴν ὀφθαλμῷ*. In-  
de vero eius etiam morbo inditum nomen  
est, & significat tuberculum quod in angulo  
minore nascitur carne naturaliter excre-  
scente, & palpebras haud facile diduci pati-  
tur. Id sicut aliquando succedit oculorum  
pterygiis, ita si vel a pharmacis nimium im-  
minuatur, vel ab imperito chirurgus sic tol-  
latur, ut una cum carne præter naturam au-  
cta ipse etiam oculi angulus excindatur, in  
aliū affectum degenerat qui *πτερυγία* appel-  
latur. Malum hoc in canibus frequens est, &  
homines minus corripit, sed eos magis qui

in mari versantur. Cuius duæ differentiæ ob-  
seruantur: siquidem aliquando hoc carnis  
incrementum benignum est, tenerum, la-  
xum & sine dolore, quod medicamentis sic-  
cis consumendum est: aliquando vero ma-  
lignum, durum, inæquale & cum dolore  
punctorio, quod manu curare & scalpro e-  
uellere oportet.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. est medium cuiusque rei, internæ pars  
& medulla cuiusque ligni. dicitur alio no-  
mine *ὀφθαλμῷ*.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. inustio, pustula ex vitione contracta.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. est vlcus in oculo quod à febre  
ut plurimum cum crusta impura in nigro  
aut albo oritur. Ac in nigro quidem dum fit,  
sæpe profundum est, ac fere semper in ipsa  
expurgatione, maior tunicarum erosio con-  
tingit, adeo ut humores paulatim diffuant,  
& totus oculus effundatur. author Aetius  
lib. 7. cap. 26. Id oculi vlcus *ὀφθαλμῷ* Paulus  
Ægineta appellauit, à quo tamen diuersum  
Aetius scribit, quod ipse *ὀφθαλμῷ* nominat.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. *οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ χεῖρες*, hoc est, inni-  
tentes, incumbentes & adunci, apud Hip-  
poc. dictum est autem de vnguibus.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. apud Hippoc. significat *τὸ εἶναι ὀφθαλμῷ*, id  
est, insidere & quasi inherere, ut interpreta-  
tur Gal. comment. 3. *ἐν τῷ ὀφθαλμῷ*.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. cerebrum. Est pars capitis mollis,  
alba flexuosa, facultatis animalis principium.  
Medullæ quidem similitudinem gerit, imo  
vero medulla etiam à quibusdam dictum est:  
per multum tamen ab ossium medulla dif-  
feri, quod nec liquefieri nec absumi, ut illa,  
possit. Non est omnibus sui partibus æqua-  
biliter molle, sed extimis quidem & ante-  
rioribus humidius est: intimis autem posti-  
cisque, quoque magis ad posteriora tendit,  
siccus, coactius, densiusque. Totum in duas  
partes diuiditur, anteriorem & posteriorem:  
quarum illa *Ἐν ὀφθαλμῷ*, totius nomine, hæc *πα-  
ρὰ τὴν ὀφθαλμῷ* appellatur. Rursus anterior du-  
plex statuitur, dextra & sinistra, duosque si-  
nus seu vèctres habet, dextrum & sinistrum,  
qui à corpore calloso, quod *πρωκένδρις* dicitur,  
dirimuntur. Hi posteriore sui parte in tertium  
sinum mediocrem sub psalloeide concurrunt,  
à quo meatus est lógus, *τὸν ὀφθαλμῷ* subditus,  
qui in sinum alium quartum, omnium po-  
stremum minimumque inter cerebelli ba-  
sim spinalemque medullam situm, incidit.  
Istis quatuor maxime ventriculis spiritus a-  
nimalis continetur, diffusus nihilominus per  
totam cerebri & cerebelli & spinalis medullæ  
substantiam, cuius opus est mouere, sentire  
& principibus actionibus defungi. Eum in  
subiectas partes cerebrum per neruos mit-  
tit, quos à seipso producit, molles quidem  
& ad sensum comparatos ex anterioribus  
humidioribusque suis partibus, duos autem  
qui motionibus deseruiant, ex siccioribus,  
maximeque cerebello.

*Ἐν ὀφθαλμῷ*. *ἡ δὲ* apud Hippoc. significat *ἡ δὲ*  
*ἡ δὲ* hoc est, hederæ modo conuolui  
atque implicari.

*Εγχείρις*. incisio. Dicuntur proprie in capitis ossibus, inquit Gal. soluta continuitas ab aliquo acuto occurrente & abscedente. Vocatur aliis nominibus *Εγχειρις* & *Εγχειρις*.

*Εγχειρις*. placentæ genus. farina bene subacta in oleo primum coquitur, mox mel adicitur. *Πολυξ*. Pollux videretur, quod parvis fere frigitur.

*Εγχειρις*. genus panis, qui & *Αγροπας*, id est, forensis & vernalis, dicebatur, quod in foro vendendus proponeretur.

*Εγχειρις*. dicta est à quibusdam *Εγχειρις*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Εγχειρις*. *Εγχειρις*, vigilania, apud Hippocratem.

*Εγχειρις*. *Εγχειρις*, veluti frenis cinctus est, apud Hippocratem.

*Εγχειρις*. scarificatio. Est cutis & subiectæ etiam carnis per scalpellum dissectio multis foraminibus. Differt. *Από* & *Φλεβοτομία*, quod hæc vno vulnere venam aperiat, illa multis vulneribus cutem carnemque diducat. Diuisio autem ipsa cum multas habere possit differentias, in treis tamen referri potest secundum Galenum libr. 2. ad Glauconem: aut enim tenuis & superficialis est, aut è contrario magna & profundior: aut longitudine & profunditate inter eas media. Quibus omnibus Galenus se usum fuisse prodidit in abscessuum curatione. Quæ in superficie fiunt, non attrahunt è longinquo, non reuelliunt, non deriuant, sed in summa modo cute hærentem humorem quæ vlcuscula facta sunt, educunt, nec magnis morbis opitulantur. Quæ longæ sunt & profundæ, plurimum sanguinis exhauriunt (cuius rei Oribasius testis locupletis est, qui scarificatio sibi cruræ, cum pestilentia laboraret, duas fere sanguinis libras inde detraxit) adeo ut animi deliquium aliquando inducant, & è partibus etiam remotissimis, vt à capite in crura, à crure in manum reuelliunt: & quia in carnem alius adactæ sunt, propriam curationem in modum vulnerum efflagitant. Quæ ambartium medix sunt, earum pariter incommoda declinant, ideoque aliis præferri debent, si quando scarificationis usus incidit. Ea autem tribus de causis suscipitur, ad reuulsionem, ad deriuationem, ad vacuationem humoris tum corpore toto redundantis, tum ea in parte quæ scarificari debet, impacti. Quæ omnia quamuis per phlebotomiam consequamur, quia tamen (vt ex Apollonio refert Oribasius) multum nocere solet corporibus venæ sectio sæpius repetita, ideo ea omissa tutius est scarificationes moliri, quod ex citra validam totius molis corporeæ commotionem, eadem quæ & venæ sectio commoda præstare valeat. Itaque si crura fluxione vexentur, si phlegmone laborent, manus scarificate commovent, vt è contrario crura, si manus male affectæ fuerint: similiter si dextrum crus doleat aut dextra manus, sinistrum crus aut sinistram manum scarificare poterimus, quod reuul-

sio non tantum à summo deorsum, aut ab initio sursum, verum etiam à dextris ad sinistram, & contra fieri recte possit, vt & secundum alias situs differentias. Isto quidem modo mihi magis libet Galeni locum qui habetur libro 13. meth. meden. intelligere, quam nimis dura interpretatione à *Αγροπας*, hoc est reliquum, interpretari reliquum manum. Crus enim alterum Galenus mihi videtur intelligere, geminamque reuulsionis speciem iis verbis indicasse, vnam quæ fiat à summo ad imum, cum manu laborante scarificamus crura, alteram vero quæ fieri possit à dextris ad sinistra, vt cum crure vno laborante, alterum scarificatur. Siquidem Galenus generalem reuellendi methodum eo loco explicans, eam duobus reuulsionum adductis exemplis patefecit. Adde quod scarificatio quæ reuulsionis gratia instituitur aut vacuationis è toto corpore, haud temere aliis in partibus quam in cruribus usurpata est à veteribus medicis. Quæ namque aliis in partibus adhibetur, non solet reuulsionis causa fieri, sed vt quicquid iis inhaerit humoris, vacuetur: proindeque eo loco Galenus recte interpretabitur, qui laborante vno crure, alterum scarificandum esse intelliget quo reuelli possit humor qui in crure affectu influit. De quo tamen quisque, vt volet, statuat sentiatque. Similiter si humorem deriuare volumus, aut eum qui parte aliqua inhaeret, vacuare, scarificationibus utemur, præsertim si acris est, si rodens, si virulentus, vel nimius, qui vel maligna qualitate, vel sui copia calorem partis natium obnuiat. Nec minor est etiam scarificationis usus in tollenda plenitudine, siue eam consuetæ exterioris suppressio, vt menstruorum aut hæmorrhoidum, siue otium, siue alia quævis causa induxerit. Cæterum, vt monet Anryllus, pars quæ scarificari debet, prius, si fieri potest, laxanda est: sin minus, aqua tepida quousque rubescat perfundenda est, aut spogiis fouenda, aut soli igni exponenda. Incisiones etiam faciendæ in cruribus, abdomine, thorace, dorso, ceruice, vt *Εγχειρις* in capite secundum capillorum positionem, in fronte autem per transversum. Debent etiam magnitudine inter se æquales esse, & paribus distare intervallis. Scarificationis autem principum idem consulit ab infernis partibus sumendum esse: sic enim fieri vt sanguis ad superficiales partes decurrens eam non obscurer quæ postea scarificanda venit. Præterea vero scarificationem non *Εγχειρις*, *Από* & *Φλεβοτομία*, hoc est, non punctum, sed cæsum faciendam esse, quod ita minus doloris moueat.

*Εγχειρις*. grumosum, granulosum, micæ frequentes habes, cuiusmodi mannam & thus esse oportere Dioscorides scripsit. Herimolus cartilagineum interpretatus est, quod à multis non probatur.

*Εγχειρις*. solet Hippocrates usurpare *Εγχειρις*, hoc est, de iis quorum ab

rerum alteri inhiaret, ut annotauit Galenus comment. 3. *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*.  
*Ἐρμῆς* infusio. Species altera est *ἡ μῆκος*, hoc est plenitudinis & copiae humorum, ea videlicet quam locus continens metitur. Cum enim duplex sit omnis multitudo, una ad vires, altera ad vasa, illam *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, hanc *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ* appellant. Siquidem vasistatium humoris affusum videtur, quantum ipsa capere & continere possunt. Non ad animantes modo pertinet, sicut ea quæ ad vires dicitur, verum etiam ad inanimata etiam ænea ferreaque: quod hæc quoque conclusio in iis copiosiore spiritu, rampantur.

*Ἐρμῆς* iud. est sanguinis & humorum in partē aliquam naturalis effusio, per quam & partis eius venulæ replentur sanguine, & color viuus parti redditur. Sic Hippocrates vsurpat libr. 2. *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ* scribens, *ὅτι οὐδὲν ἔστιν ὁμοίον ἐν τῷ σώματι, καὶ ὁμοίους ἀνὰ τὸν σῶμα ἐν τῷ σώματι*: hoc est, curare, ut in iracundiam inducatur, tum ut coloris reuocationem acquirat, tum ut sanguis effundatur. Nam, ut ait Galenus *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ* natium calorem excitat & accendit. Est ergo *ἡ μῆκος* siue *ἡ μῆκος* affectio secundum naturam, differtque propterea *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, quod præter naturam est.

*Ἐρμῆς* sedes. anus, podex, dicitur & Græcis alio nomine *δυσκοιλίας* & *δυσκοιλίας*. Est meatus ventris inferior, continendis transmittendisque excrementis destinatus. Cum enim venter totus peritonæo vndique conclusus sit, duo tamen in eo sunt meatus, superior quidem ad stomachum, *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ* dictus inferior vero hic de quo nunc nobis sermo est ad rectum intestinum, cuius orz vltimæ incumbit. Est autem instrumentum vacuadis excrementis comparatum. Cuius generis instrumenta cum sint duplicia, aliis excrementorum effluuium intempestiuum cohibentibus, aliis vero tempestiuum incitantibus, ea quidem ne intempestiue & præpropere labantur, muscoli sedem ipsam constituentes non sinunt. Sunt autem duo ad sedem musculi, quorum vnus rotundus est, solutus, & sine pari siue opposito musculo, per transuersum ipsi circumfusus, adeo ut rectum intestinum exacte & firmiter occludat, & excrementa intus contineat. Substantiam habet labiorum parti vltimæ similem, mediam scilicet inter cutem & musculum, eundemque quem & musculus vsuum præbet, præterquam quod actionis robore multum illi musculus præstat. Eum anatomici *σφιγκτηρ* appellant, quod animum adstringat: quia in re musculo vesicæ similis est. In eo perinde atque in musculo vesicæ plurimi errarunt, quasi ad excretionem superfluitatum conditus esset, neque perpenderunt quod eo resoluta tantum foras excrementa prodeant, nobis etiam inuitis. Itaque musculus hic nihil agit ad excretionem, sed iis etiam recludatur quicquam molimur, nec

nisi onere vel acrimonia vel alia causa irritatus relaxatur, adeo ut transmittendis potius quam expellendis excrementis inservire videatur. Hic autem sicut proprium & à musculis diuersum motum, ita & formā diuersam possedit. Est enim contractis crumenis similis & rugosus, vnde etiam animum Latini dixere, quemadmodum quibusdam placere video: quantum alii quasi anulum sic dictum fuisse cõtendunt, quod *δυσκοιλίας* à Græcis appelleretur. Alter vero sedis musculus est geminus vel etiam tergeminus (cum namque in duos vel tres diuidere possis) qui oblique supra rotundum musculum situs, sedem sursum retrahit. Quo fit ut si quando resoluatur aut reddatur imbecillior, sedem ipsam prociduat & prolabantem, ut in magnis contentionibus corporis fieri aliquando solet, sursum retrahere & reuocare non possit, sed ea omnino euerfa maneat, nisi manu reponatur.

*Ἐρμῆς*, apud Hippocr. lib. de vuln. capitis, est ossis fracturæ species eiusmodi ut in eo reli vestigium remaneat, atque appareat quare relum impactum fuit. Quem quidem affectum à solo acuto fieri necesse est. Authoꝝ Gal. comment. 2. *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*. Idem vero scribit in lib. de causis morborum eo nomine peculiariter designari solutam in ossibus capitis continuitatem ab aliquo acuto occurrente atque abscindente, vocariq; etiam *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, ut haberetur apud Hippocr. lib. de vuln. cap. Cum vero idem scribit *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, *καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τῷ σώματι* hoc est, reducere vero quæ supereminet, in sedem calce aut palma significat *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, hoc est, locum naturalem & proprium.

*Ἐρμῆς* *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ* comprehendunt, cōstringunt apud Hippocratem.

*Ἐρμῆς* dixit Hippocrates *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ* id est, Velle, pro Posse, quemadmodum etiā Homerus, *Ὀὐδὲν ἔστιν ὁφθαλμοῦ*, hoc est, neque poterat profuere: Iliad. 6. sicut annotauit Gal. comment. 3. *ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ*.

*Ἐρμῆς* cōsuetudo. Est natura lōgo rei cuiuslibet vsu acquisita. Alii alterā, hoc est secundariā, naturā esse diffiniunt: sic enim frequentis vsu rei cuiusvis natura ei assuescit, ut ea, perinde ac si naturalis esset, amplectatur. Ceterum ea cōtrahi pōt in omnibus rerum non naturalium differētiis, aere, cibo, potu, motu, quiete, somno, vigilia, excretis, retētiis, & passionibus animi. Earum natura rerum cōsuetudo esse dicitur, in qua rātum vsus valet, ut rei, etiā naturæ contrariæ, consuetudo nonnunquā inqueatur. Itaq; si consuetudo trāsit in naturam, patet vim eius non esse minimam tum in tuenda sanitate, tum in depellendo morbo, & magnam siue salubris viētus inueniendi, siue ægrotorum curationis ex cōsuetudine sumi indicationem. Siquidem ea singulorum corporū naturā enidētius quā reliqua omnia ostendit. Si namque omnes tēperamentorum notas in vnum colligas, bz lon-



hæ longissime absunt, ut parem ei quam consuetudo præstat faciant fidem: quando, si quis per sanitatem frigidam perpetuo bibent, nulla in reiectione, ventriculo, renibus aut aliis visceribus offensus, planum est ex eo, non consulis etiam aliis signis, valida sanaque illi esse hæc viscera. Nec vero non offenditur solum aut defatigatur consuetudine, verum etiam impense delectatur natura, adeo ut ea quibus longo tempore assuevimus, etsi deteriora sunt, insuetis tamen minus molesta esse soleant; quemadmodum Hippocrates prodidit. Ipse etiam inter maxime necessarios scopos curationis eam constituit, eique secundam à natura indicationem vim assignavit: primum quidem naturam ipsam inspiciendam seruandamque vel etiam restituendam esse docens, nisi quatenus pro cuiusque consuetudine variandum sit.

*Ephorus*. pupugit, stimulat; apud Hippocratem.

*Eidos*. species, pars quæ generi subiicitur, quæ aliis nominibus *hypochole* & *hypochole* à medicis dicitur, ut scripsit Gal. comment. 1. *de morbis in ieiunio*. Dicitur etiam *idos* corporis natura & temperamentum; ab eo qui edidit, quæ in extremo libro de natura humana habetur, ut Gal. in comment. annotauit.

*Encephalus*. membranz quibus cerebrum involuitur; quæ proprio nomine *meninges* vocantur.

*Eileus*. est intestinum ordine à ventriculo tertium. Incipit ubi ieiunum definit: eo scilicet loco; in quo chylus iam crassior effectus incipit consistere: chylus enim admodum liquidus è ventriculo prodicens facile per ecphysem & ieiunum intestinum effluit: exiunctus vero à venis quæ ieiunum circumstant, attractaque liquidior eius parte; paulo crassior redditur, & in ileo diutius cunctatur; præsertim obtrusa iam bilis acrimonia in ecphysem excutitur, ileoque ab ea minus demorso atque irritato. Inde igitur ileon incipiens, definit ubi crassa intestina incipiunt; quorum primum ileoque vicinum *hypocolon*, hoc est cæcū, appellatur. Dictū est *eileus* à multis anfractibus & circinnulationibus, atque ab eo morbus qui *ileus* vocatur. Idem vero & *ileus* hoc est tennè, simpliciter dicitur, nomine duobus etiam prioribus communi.

*Eileus*. Est tenuis intestini obstructio peracuta & dolorifica, nihil sinens deorsum descendere. Sed nihil vetat etiam in crassiore intestino obstructionem eiusmodi fieri, ut scribit Gal. comment. 2. in lib. 3. *de morbis in ieiunio*. Hæc tamen minus acuta, dolorifica periculosaque est, quam ea quæ in tenuibus consistit. Id quod forte fuit in causa cur Diocles Carystius, ut scribit Celsus, plenioris intestini morbum *eileus* nominat. quanquam, ut idem ait, mutata est postea nominis significatio, & tennioris intestini morbus *eileus* cepit vocari, qui ante *hypocolon* dicebatur. Sunt autem huius morbi symptomata signa-

que ventris tormina, stomachus multum humiditate perfusus; exolutiones animi; ructus inanes, vomitus pituitosi & bilioli, & inde aliquando desipientia & convulsiones: moriturus vero sudor frigidus, vix difficultas, podex ita adstrictus, ut vel specilli extremum nequeat admittere, & vomitio stercoris. Verum hæc omnia non omnibus pariter contingunt: vnum tantum est huic morbo proprium inseparabile quod nihil ad inferiora descendat, nisi forte liquida quedam pauca & serosa. Vomitus non semper adest, sed morbo tantum exitiali, quod si vehementius æger laboret, stercus in os usque ascendit & singultus oritur. Cum enim intestina quæ hoc malo tentantur, appetant à se expellere quod nocet, quodque iam longo tempore cepit esse molestum, nec se propter obstructionem exonerare possint, cōcitant violentius noxiam materiam, & in partes superiores contra naturam propellant. Obstructionis autem causæ sunt cruditates, & continua ciborum corruptio; lethalia medicamenta, eterocela, inflammatio, colicus affectus, & aliquando stercoris nimia refectio. Nomen hoc morbus habet à parte affecta (*eileus* enim dicitur tenuè intestinum quod hoc malo prehenditur) vel symptomate; ut scribit Gal. lib. 2. meth. medendi, quod per eum intestina *eileus*, hoc est conuolui, videatur: unde & quidam Latine conuolutum dixere: vocatur & alio nomine *hypocolon*, quod qui manum loco dolenti admovent, & *hypocolon* attingit, hoc est, chordam attingere videatur, propter partis affectu tensionem.

*Eipos*. vocabulum est ab Hippoc. usurpatum de quo sic scribit Erotianus, alios quidem existimasse sic dici *hypocolon* & circumscriptionem tumoris scirrholi in liene consistētis: alios vero malam totius corporis affectionem interpretatos esse, sed neutros recte sentire, quod *eipos* febris species sit.

*Eipocia*, hoc est, *ileus*, apud Hippocratem in Prothetico;

*Eileus*. dicitur in accessione primus eius insultus primaque aggressio. Est autem, ut ait Gal. lib. de morbo tempore tempus indiuisibile & exacte primum à quo ipsa accessio incipit dicitur alio nomine *catanactis*. vide suo loco.

*Eileus*. inspiratio. Est pars respirationis quæ aer intra pulmonem per os & nares trahitur ad cordis refrigerium. Is enim precipuus est & necessarius inspirationis usus, cui & alius accedit, nimirum spiritus vitalis nutritio. Si quidem attracti per inspirationem aeris calidior, tenuior, puriorque portio in eius nutrimentum cedit, primum quidem in pulmonis carne elaborata; deinde vero in sinistro cordis ventriculo percocta & confusa sanguinis vapori, qui ex dextro ventriculo proficiscitur. Sunt autem inspirationis multa instrumēta, os, nares & aspera arteria eiusque bronchia per pulmonis substantiam dif-

fusa, per quæ spiritus inromittitur, pulmo, qui aerem continet non suis modo maioribus spatii, sed etiam minimis (est enim eam ob causam factus à natura spongiosus, molli & aerius) adeo ut totus spiritu plenus distendatur, & præterea diaphragma & thorax & thoracis externi muscoli. Cum enim inspiratio voluntarius motus sit, aut omnino missus ex naturali & volutario motus, eam quidē muscoli, ut efficiant oportet, quos natura plurimos pulmōni circumposuit. Nec tamen omnes omnem inspirationem edūt. Siquidem si modica est inspiratio, ad eam satis est vñ diaphragma, quod deorsum descendens satis magnū pulmōnibus spatium concedit quo se dilatet & aerem sufficientem excipiant. Sin autem magna debet fieri inspiratio, præter diaphragma, quod est præcipuus respirationis musculus, thorax etiam modice attollitur & dilatur, eorū musculorum ope qui inter costas interitus conditi sunt. Verum per maximam inspirationem præter diaphragma & eos musculos accedunt & ii qui thoraci extrinsecus incūbunt, ab humeris ad partes thoracis superiores deriuati, & octo insuper muscoli epigastrii quorum omnium concursu thorax quam maxime fieri potest distenditur: cui quidem maxime inspirationi, contraria est maxima exspiratio quam proprie *expiratio* appellant. Ceterum de musculis id vñum scire oportet, eos qui inspirationem absoluūt quatuor esse, duos internos & duos externos: ex internis quidem vñum qui ex clauicula in primæ costæ cartilaginem ad sternon vsque protenditur, alterum vero qui ex omoplaræ basi ad costarum nouem superiorum ossa procedit. Externorū vero vñum, qui ex vertebris ceruicis in quatuor costas superiores inseritur, alterum vero qui ex spinis lumborum & metaphreni in quatuor costas inferiores peruenit. Quibus quidem distinctis, facile iam erit loca pleraque Galeni de respiratione intelligere.

*Emplastrum* est ab Hecæto compositum, præditum vi extrahendi. Recipit galbani ꝑ. x. i. fuliginis thuris ꝑ. x. i. i. picis ꝑ. x. v. i. ceræ & resinae terebinthinae, singulorum ꝑ. xv. i. i. quibus paucum vñguenti irini miscetur.

*Emplastrum* nomen collyrii quod huiusmodi est. Cadmiz vsq̃ lotrequē, zris cremati & eloti, singulorum drach. vii. i. i. stimmios combusti, acaciæ rubetis, gummi, singulorū drach. xv. i. aloes, gallæ, æruginis vermicularis, castorii, lycii, spicæ nardi, croci, opii, myrrhæ, cerussæ, ebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drach. i. rosarum drach. lx. aqua pluuiæ teruntur. Detergendi vim habet, & crassas oculorum cicatrices extenuat.

*Emplastrum viridis* nomen est viridis emplastri ab Andromacho compositi hūc in modum: Ammoniæ thymiamatis drach. v. i. i. squamæ zris drach. x. i. i. pollinis thuris drach. xv. i. resinae pinus drach. x. i. i. adipis virulini

drach. x. i. i. i. terebinthinae drach. vi. i. i. ceræ drach. x. x. i. i. acerem quantum satis est. Hoc magna vulnera glutinat, sordida vlcera extergit, crassa ipsorum labia dēterit, sinus contrahit, discunt & repellit, & canis vlceribus inditū ea carne implet. sic dicitur quod centum drachmis constet. Acrius.

*Emulsiua* species est *collyrii* collyriorū: sic dicitur q̃ vñuersa eius structura sit drachmarū cētū. Recipit autē zris drach. x. i. i. cadmiz drach. xv. i. i. myrrhæ drach. i. i. i. i. acaciæ drach. x. x. i. i. opii drach. i. i. i. i. gummi drach. x. x. i. i. croci drach. i. i. i. i. Excipitur aqua; valet ad sistendam fluxionē, præsertim vbi affectio ad concoctionem peruenit. Acrius.

*Excoria* quædam sunt medicamenta quæ abortum faciunt, quæ & *phœcia* appellantur. Eadem & fetus demortuos extrahunt.

*Exedentia* sunt papulæ ardentes & feruidæ, quæ alio nomine *exulcerata* dicuntur, diuersa *exedentia* dicuntur.

*Exedentia* *exulcerata*, eicit, expellit, apud Hippoc.

*Exedentia* dicuntur à medicis recentiorib. *exedentia* *exedentia*, hoc est, articuli exedentes, ut annotauit Gal. comment. 4. *exedentia* *exedentia*.

*Exedentia* *exedentia*, succussionem, apud Hippocr.

*Exedentia* dicuntur medicamenta quæ vrendi virentia cutem abradunt & exulcerant, *exedentia* *exedentia*, quasi excoriantia, qualia ex cantharidibus apparari possunt, ut habetur apud Dioscoridem lib. 3. *exedentia* *exedentia*, quod ille eiusmodi medicamentis resistere prodidit.

*Exedentia* sunt pustulæ ardentes & feruidæ, dolorem ciētes, citra saniem. Ingens enim feror omnem materiam absumit. Dicuntur & *exedentia*.

*Extrudens* effeminare, *extrudens*, corpus molle & laxum reddere, ac proinde imbecillius facere. sic lib. 6. *extrudens* Hippocrates *extrudens* *extrudens* intellexit. non enim aliud hoc nomine quam crurum imbecillitatem designauit. sunt enim mulieres natura viris molliores & laxiores, & propterea imbecilliores.

*Exulceratio* quæ in summa cute ex compressu nascitur: sic enim appellat Hippocr. ut annotat Gal. comment. 2. *exulceratio* *exulceratio*.

*Exulcerata* papulæ per cutem erumpentes, sic dictæ *exulcerata* *exulcerata*, quod significat *exulcerata*, hoc est, impetu ferri & erumpere. Ortum habet ab humoribus superfluis & tenuibus. Ideo in cute leniter extruberant, quod tennes humores exulcerationem potius quā tumorem creent. Dicuntur & alio nomine, ut ego arbitror, *exulcerata*: neque enim harum vocum discrimen vllum comperi. Eius generis sunt tum quæ per febres ardentes exeunt, tum variolæ vulgo dictæ & morbilli. Vide *exulcerata*.

*Exulceratio* dicitur medicamentū acre & paritum per aduersionem tenuiū, poros omnes corporis expurgans: idem alio nomine etia *exulceratio* appellatur, hoc est, obstructiones tollens. Contrarium est emplastica: nā neque

neque viscosum est, neque mordacitatis expers, sed nitrosum & subtile. Eiusdem est generis cum *nitrosum*: differt tantum per magis & minus. Nam quæ in superficie sordem auferunt, sine in cute sine in viceribus, *nitrosum* dicuntur: quæ vero poros etiâ expurgant, subtiliorum sunt partium & maioris energiz. Sunt autem ea facultate duplicia, tum nitrosum, tum amara. Nitrosum quidem cutis extrinsece poros expurgant: amara vero, præsertim si ad iuncta est aliqua adstrictio, meatuum minores, cuiusmodi sunt in cute, purgare non possunt: maiores vero meatuum qui sunt in alto corpore, purgare abstergereque possunt. Nam foris meatuum exiguitas prius ab adstrictione medicamenti occlusa, quam probe queat repurgari, non admittit in altum abstergentem facultatem. Ergo *nitrosum* sunt omnia nitrosum & amara: cuiusmodi sunt per se nitrum, aphonitrum, abrotanum: similiter & erui & lupinorum farina, maxime si amara fuerint; & amigdala amara, & viticæ semen, & iris: vim enim habent crassos lentosque humores extenuandi in thorace, pulmone & ceteris, sed maiorem capparitis cortex, radix amaricis, scolopendrium, scilla & asplenos, ut quæ maiores etiam lienis obstructions expurgent.

*Enallagma*. dicitur Hippocrati scapus silphij siue laserpitij, quem ipse alio nomine *καυλός* appellant.

*Εκκαρπία*. *ἐκκαρπία*, qui corticem detraxit, apud Hippocr.

*Εκτομή*. excisio. Est calvarie fissura cum ossis offensi ruptura, ut ait Paulus lib. 6. cap. 90.

*Εκτομή*. dicuntur medicamenta imbecillia, quæ monendi tantum stercoreis, & ea quæ in spatis intestinorum continentur deijciendi vim habent, non etiâ ex alto attrahendi & vacuandi humoris. In eo genere Gal. aloen collocant: dicuntur *ἐκτομή*.

*Εκτομή*. *ἐκτομή* *ἐκτομή* *ἐκτομή*, ut annotavit Eronianus, qui se primum dicti eius vocis interpretem extinxisse.

*Εκτομή*.

*Εκτομή*. est medicamentum quod ori inditum sensum liquefit & deglutitur: datur ad pectoris & pulmonis vitia: vocatur & alio nomine *ἐκτομή*. Verum Paulus etiâ *ἐκτομή* nomen tribuit medicamentis, quæ deuorantur ad lumbricos lib. 4. cap. 57. dicitur *ἐκτομή*, id est, à lingendo.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, subterrestris, qui desijt albus esse, apud Hippocr.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, apud Hippocratem, hoc est prouatur.

*Εκτομή*. exolutio. idem quod *ἐκτομή*, id est animi defectio: ut habetur apud Aetium lib. 5.

*Εκτομή*. *ἐκτομή* *ἐκτομή* *ἐκτομή*, massa subacta apud Hippocr. lib. *ἐκτομή*.

*Εκτομή*. vehementer furere, apud Hippocratem in prothet.

*Εκτομή*. formare. apud Hippocr. lib. *ἐκτομή*, *ἐκτομή* *ἐκτομή*, *ἐκτομή* *ἐκτομή* *ἐκτομή*, trochiscos fingere. Significat etiam *ἐκτομή*.

*Εκτομή*, hoc est exprimere apud Hippocr. lib. 1. de morbis maiore, de spongia & mercuriali & sambuci folijs.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, inquirere & inuestigare, apud Hippocratem.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, inquinantur, *ἐκτομή*, apud Hippocratem, hoc est, semen eijciunt & excernunt.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, imber cum sole factus apud Hippocratem.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, febris humida simulque inflammatoria, apud Hippocr. sicut & *ἐκτομή* dicitur quando imber æstuosus est.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, strepebat, apud Hippocratem.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, explicata, explanata, apud Hippocratem.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, diuaticari & diductis cruribus iacere. *ἐκτομή*, vero etiam Hippocr. lib. de fract. *ἐκτομή*, dicitur hoc est digrediens, diductum, & cuius labra expansa diductaque sunt, translatione sumpta à cruribus per gressum diuaticatis.

*Εκτομή*. *ἐκτομή*, expansa. vsurpatur hoc verbum ab Hippocrate in vuneribus quæ præter quam quod distant amplius quam par sit, utrisque labris expansa atque aperta inter se sunt: id quod ex vehementi inflammatione euenire interdum conspicitur. Cum enim caro ad multam vsque altitudinem diuisa, & musculus per transversum sectus fuerit, conglutinationem autem & consolidatio fuerit impedita, tum inflammatio superuenerit, ex qua cutis distenta utrinque labrum sibi annexum retraxerit, utraque in parte *ἐκτομή*, id est expansum, os vulneris redditur. Annotat Gal. comment. 2. *ἐκτομή*.

*Εκτομή*. est fractura calvarie in multas partes, in qua profundius fracta ossicula descendunt & membranam cerebri comprimunt. Significat & *ἐκτομή* apud medicos rei cuiusque retrimmentum, quod expresso ab ea succo superest, nec id ratum, sed etiam sapenunmero succum ipsum, ut cum dicitur *ἐκτομή*, siue quod idem est, *ἐκτομή*, quod & *ἐκτομή* & *ἐκτομή* appellatur. Sumitur in ea significatione apud Dioscoridem lib. 4. de glande vnguentaria.

*Εκτομή*. est totius oculi prolapsus extra cavitatem suam. Sic enim oculi aliquando exprimentur, ut prominentes permaneant. Avicenna oculi exitum & egressiorem vocat. Differt *ἐκτομή* à *ἐκτομή*, hoc est à procidetia, quod in hac vena tantum tunica, in illa totus oculus foras erumpit. Id malum intellexit Celsus, cum ait, nonnunquam ingentem inflammationem tanto impetu erumpere, ut oculos sua sede propellat. Contingit & his qui stragulantur, ut scribit Aetius, & in athletis certaminibus, & foeminis quæ in partu præ dolore vehementius distenduntur, aut ex magnis fluxionibus quæ à capite impetu descendunt. vide *ἐκτομή*.

*Εκτομή*. vehementer & ad stuporem vsque metuere, apud Hippocr. ut annotat Galen. comment. in prognost.

**Εκστασις.** timor subitus & vehemens. huic contraria est voluptas maxima, quam *εὐχάρεια*, quasi excessum gaudii, appellant. Author medicarum definitionum dicit esse mentis ab alienationem quæ ex repentina aliqua perturbatione extrinsecus provenit. Multi syderationem & tabem interpretantur. Galen. comment. aphor. 14. lib. 7. *εκστασις* esse scripsit; cum quis ex morbo nec loquitur nec quicquam agit, sed apertis oculis quietus manet, veluti præ timore attonitus. quo loco obstupescencia ab interprete vertitur.

**Εκπνοή.** exspiratio. Est motus respirationis quo spiritus foras fertur. Constat enim respiratio geminis partibus seu motibus sibi contrariis, uno quo spiritus intro subit, & *ἐκπνοή* appellatur: altero quo spiritus è pulmonibus redit, qui contrario etiam nomine *ἐκπνοή* dicitur. Ea solius septi transuersi, quod *φρένας* appellant, opus est, quemadmodum & inspiratio, ut scribit Galen. libr. 2. de motu musculi. neque ab ullo thoracis musculo perficitur. Sed nec contractio quidem pectore fit, ut nec inspiratio eo dilatato, si modo sine vi foras spiritus feratur aut trahatur, sicut se aliquando Romæ in celebri virorum doctorum cotu demonstrasse Galen. prodidit libr. de præcognitione. Itaque quod ipse scribit tum libr. 4. de locis affect. exspirationem fieri ab vniuersis musculis thoracem contrahentibus, tum in libello de causis respirationis, internos qui circum costas sunt musculos exspirationem perficere, non est de simplici exspiratione intelligendum, sed de violentiore, qualis per febres fit & apoplexias & post magnam exercitationem. Tunc enim magna violentaque exspiratio est *ἐκσπνοή*, proprie dicta, à musculis tum intercostalibus, tum ijs qui ex scapulis & dorso ad thoracem feruntur, facta. Maximam enim inspirationem externi, maximam vero exspirationem interni intercostales absolunt, ex costæ superno latere in suprapositis latus infernum oblique inferi. Est autem exspirationis usus aerem, qui præcedente inspiratione attractus fuerat refrigerandi cordis gratia, foras expellere, ut alteri frigidus aeri fursum inspirando locum faciat. Siquidem aer per exspirationem nihilo fere paucior redditur quam qui per inspirationem attractus est. Quo in opere contingit etiam permulta simul fuliginosa excrementa quæ à sanguinis vitione in corde & pulmonibus redundant, vacuari. Ipse enim aeris motus & impetus, multa eorum quæ per se transire nequeunt, una secum trahit, perque.

**Εκχέλιμα.**

**Εκχέλιμα.** luxatio, hoc est, ossium è propria sede excessus sine fractione. Nec vero id modo significat; sed etiam *ἐκχέλιμα* siue *ἐκχέλιμα* apud Hippocratem. ut Galen. annotat in initio comment. *ἐκχέλιμα*. Est autem duplex omnis luxationis differentia, una sursum, cum à musculorum contentione

articulus ad supernum locum trahitur: altera extrorsum, cum in partem anteriorem aut posteriorem, dextram aut sinistram motus transit. Omnis autem eiusmodi luxatio aut simplex est aut composita. Simplex quid est cum luxationi nihil insuper accessit, non vicius, non ossis denudatio aut fractio. Composita vero est cum præter luxationem aliquid eorum accessit. Causa vero omnis luxationis duplex, externa, vis omnis quæ articulum loco mouere potest: interna, defluxio humoris articulum præ copia vel mollietate loco propellens.

**Εκκύμα.** dicitur ab Hippocrate. vniuersi puris collectio tumore aliquo qui præter naturam est concocto: & *ἐκκύμα* ad suppurationem perducere.

**Εκρύμασι.** *ἐκρύμασι* *ἐκρύμασι*, scissuris pannorum apud Hippocratem.

**Εκρύθμος.** *ἐκρύθμος*, pulsus ecrhythmus. Est pulsus arrhythmus, qui nullius ætatis, naturæ, temporis aut reliquorum rhythmum retinet, vel, ut ait Paulus, qui omnem prorsus ecrhythmiā euertit. Tertia species est pulsus arrhythmici. de quo vide *ἀρρυθμίας*.

**Εκρύσις.** effluxiones. Aristot. libr. 7. de histor. animal. scripsit sic vocari eas conceptus corruptiones quæ intra septimum diem fiunt, abortiones vero *ἐκρύσις* usque ad diem quadragesimum appellari.

**Εκρύσιμα.** non aliud est quam *ἐκρύσιμα*, hoc est carnis excrecentia.

**Εκρύσιμα.** *ἐκρύσιμα*, *ἐκρύσιμα*, aperiantur, apud Hippocratem.

**Εκρύσις & Εκρύσις.** dicuntur apud Hippocratem de vehemēti motione & aberratione mentis, eadem prorsus significatione qua *μανία* & *ἐκρύσις* usurpat, ut annotat Galenus in initio comment. 3. in libr. 3. epidem. & comment. 1. in prorethet. fit à flaua bile vsta, per cerebrum diffusa, vigiliasque habet coniunctas, atque ideo comati contrariam esse Galenus scribit. Ea non est quam plerique interpretantur abstractionem mentis à corpore, ad contemplanda cœlestia, quam alio nomine *ἐκρύσις* appellant. hæc enim morbus non est.

**Εκρύσις.** dicitur facultas quæ vim habet ab alienandi animum, qualis est in hyosciamo, coriandro viridi & ephemero.

**Εκρύσις.** dicuntur medicamenta hæmorrhoidibus cæcis extrahendis aperiendisque conuenientia, quo postea facilius medicamenta adhiberi possint. Eiusmodi aliquot Gal. recenset libr. 9. *ἐκρύσις*.

**Εκρύσις.** mensura Attica, octo chœnicas capiens. sic dictus est quod sit sextarius medimni. Budæus de arte interpretatur modium.

**Εκρύσις.** hæctica. Geminam habet significationem. Vna quidem dicitur, omnis febris soluta difficilis, siue sit pituitosa, siue melancholica. Opposita est *ἐκρύσις*, hoc est, febris soluta facili. Vt enim *ἐκρύσις* qualitas est à subiecto facile mobilis, *ἐκρύσις* vero ægre mobilis: sic *ἐκρύσις* & *ἐκρύσις* inuicem opponuntur, vt



tur, vt scribit Gal. lib. 8. meth. medendi. Altera vero significatione speciatim magis dicitur quæ & putrida & diutius opposita sit. Retinet tamen eandem nominis rationem: sicut enim æger separatur à subiecto, sic hectica curatu difficillima est: vel ut dicitur quod in habitu corporis, quem æger appellat, tanquam in subiecto consistat. Est enim hectica febris calor præternaturalis in totius partibus accensus. Hæc cum vnicam habeat accessionem ab initio ad finem vsque & mortem, diuiditur tamen in tres species à varia corporis dispositione sumptas. Prima est hectica tantum, in qua corpus cordis & ceteræ partes solidæ iam primum sunt incensæ: duratque hæc species quamdiu in corpore cordis & aliis partibus solidis humor substantificus & radicalis, terreas ipsius partes glutinans, adhuc multas superest, ipsum calorem igneum nutriendus & fouens, quomodo oleum, cera, sebum & similiter pingua in ellychnio flammam alunt. Hæc cognitu difficillima est, curatu vero facillima. Altera extrema est *μαρασμική* dicta, quod marasmus calidus sic enim habeat adinactum: sic autem dicitur cum humor ille omnino absumptus est, partesque omnes solidæ non solum corpus cordis, velut vitz sunt & versæ in cinerem, vt putrefacta & vsta omnia, qualescunque exustum est ellychnium, quod nullius olei affusione non amplius ardet: sic enim absumptio humido substantifico, calor natiuus extinguatur, nec potest instaurari. Ob id hæc vt nullius visum & tactum latere potest, sic nunquam curationem recipit, & hanc à marasmo simplici, qui solius siccitatis excessu prouenit, & composito frigido sicco senilibus, familiari, & quibusdam etiam pueris hydrope, lumbricis vel aliter atrophja sine febre laborantibus, separat Gal. l. 1. de differ. feb. qui tamen nomine marasmi alterius compositi, id est calidi siccis, hectica ista speciem comprehendit libr. de marasmo, atque etiam aliquando marasmo pro hectica marasmo accipit, vt quandoque marasmi nomen minus late pateat quam libr. de marasmo. Tertia hectica species inter has media est, nunc illi, nunc isti propior, vt satis magnam latitudinem obtineat, vti etiam extremæ duæ. Maioris enim & minoris ratione omnes hæc tantum differunt. Cum autem siccitas sit triplex, vna sanguinis penuria, in propriis cuiusque particulæ exhibus venis & arterijs: altera ex absumpta omnino humiditate propria in omnibus animalis partibus contenta, & totis modo sparsa, ipsas nutriende, quæ solo alimento instauratur: tertia ex solida simularum partium substantia siccata, hectica tres species in his duabus postremis videntur esse, aut fortasse verius in solo humore substantifico & radicali siue tertio. Ceterum hectica febris magna ex parte & frequentissime sequitur febres ardentes, biliosas & æstivas, non etiam hybernas & pituitosas, cum ea

laborantes calidi siccis, à causa calida sicca, in aere calido sicco, calidiores & sicciores euaserunt, vel ex longiore ieiunio, vel victu tenui, & eo calido sicco, nec frigida humida ab his tempestine sumpta sunt vel admota. Interdum in homine calido & sicco nascitur à causis calidis & siccis, ira, morore, cura, vigilijs, æstu. Interdum à phthisi & dysenteria & lienteria & principum viscerum aliis morbis, ex quibus alimentum vel non retentum vel male coctum vel vitiatum partes solidas non humectat, quæ propterea alimento destituta, & calorem actiorem & febrilem concipientes resiccantur & incalescunt. Has tamen febres non proprie hecticas, sed potius symptomaticas quidam censent esse. Signa autem triplicis hectica à Galeno tradita sunt libr. 1. de differ. febrium, inter quæ maxima sunt oculi caui, squalor & siccitas totius corporis, sed maxime frontis, collapsa tempora, venter inferior extenuatus, & præcordia versus thoracem vehementer contracta, pulsus tenuis, durus, debilis, frequens, calor tangenti primum quidem mitis, sed postea acer & rodens: nec tamen æger se febricitare sentit, non quidem ob caloris exiguitatem, vt qui mordax sit & medico molestus, sed quia alteratio illa diuturna & paulatim facta est; non autem affatim, quodque hectica intemperies omnino æqualis sit. Habet & hoc hectica proprium quod sumptis semper alimento in ea calor augetur, & pulsus maior & velocior fit, quamdiu cor ab alimento humectatum, intemperatum minus est, ob idque robustius euasit, & ad motum magis expeditum, quod quidem febris hectica maximum, indubitatum, & inseparabile argumentum habetur.

*ἡ κίττος ἐκ πυλῶος*. hecticus pulsus. Est species inæqualis pulsus in vna pulsatione & diuersis arteriarum partibus, confinis formicanti, qui Græcis *μυρμιλίων* dicitur, sed eo adhuc minor. Phthisi, empyemati, & feбри hecticae proprius est, & sicut hæc, ita nec ipse magnam ullam mutationem sustinet, sed perpetuo similis manet; hoc est gracilis & paruus, quia propter siccitatem in longum & latum duci nequit arteria, & debilis, ob facultatis vitalis imbecillitatem, & præterea frequens: quia cum propter actum calorem pulsus velox esse deberet, nec tamen talis esse hecticis possit propter virium infirmitatem, necesse sit frequentia magnitudinem & velocitatem suppleri.

*ἡ κίττος ἐκ τοῦ σπλῆνός, ἡ κίττος ἐκ τοῦ σπλῆνός*, veratri nigri, apud Hippocratem alii tamen *ἐκ τοῦ σπλῆνός* legunt.

*ἡ κίττος* apud Hippocratem aliquando non significat extra, quæ loci differentia est, sed præter: in qua significatione & à Demosthene & aliis rhetoribus usurpatur, cum dicunt aliquid *ἐκ τοῦ τοῦ σπλῆνός*, hoc est extra rem, siue præter rem dictum factum: ve esse, vt annotat Galenus comment. in 7<sup>o</sup> *ἐκ τοῦ σπλῆνός*.

*ἡ κίττος*. ægroti inclinatio ad latera, siue sit to-

tius corporis, siue eius partis duntaxat quæ ægra est, vt annotat Galen. comment. 1. *αἰς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ, & ἐν τοῖς ὡτίαις.*

*Ἐκτρίσις.* est affectus inferioris palpebræ oculi contegentis, ita inuersa & retracta deorsum, vt parum sursum attollatur, sed pendat & hiet, neque extorō oculum integat. Quod vitium si palpebræ superiori acciderit, *κατὰ φύσιν* dicitur: sed tamen *κατὰ φύσιν* naturaliter contingere potest, *ἐκτρίσις* vero non nisi à causa præternaturam, vt cicatrice, carnis excrescentia; relaxatione; à medicamento, sutura vel vitione inartificiosa, interdum etiam senectute.

*Ἐκτρώσις.* abortio, non omnis quidem, Aristotele auctore, sed quæ ad diem vsque quadragesimum fit: quemadmodum *ἐκτρώσις* quæ intra diem septimum contingit, de qua vide paulo ante.

*Ἐκρῶσις.* *Ἐκρῶσις* dicitur, *ἐκρῶσις* erumpit, expellit, ebullit, apud Hippocratem.

*Ἐκρῶσις.* dicuntur medicamenta quæ pororum obstructions expurgant, facultate nitrosa & amara. dicuntur alio nomine *ἐκρῶσις*, de quibus supra.

*Ἐκρῶσις.* efflatio siue exufflatio. Est, vt ait Galenus libr. 2. de motu musculorum, *ἐκρῶσις* *πνεύματος* *ἐκρῶσις*, hoc est, expiratio conferri facta. Eius opifices sunt muscoli omnes intus inter costas sitæ, adiuti etiam ijs qui ad thoracem perueniunt ex scapulis & dorso, atque alijs etiam magnis qui in epigastrio habentur: efflationis enim gratia eos factos esse Galen. docuit libr. 4. de vi partium. Propria est vocis materia, neque vox citra eam fieri potest. Differt à simplici expiratione tum violentia, tum musculis à quibus efficitur. Nam & paulatim expiratio fit, & à solo septo transuerso. Galen. libr. 4. loc. affect. duplicem statuit *ἐκρῶσιν*, vnā *ἀπὸ τοῦ*, alteram *ἀπὸ τοῦ*, de voce verba faciens. vide in dictione *ἐκρῶσις*.

*Ἐκρῶσις.* est intestinum à ventriculo primum. Id ventriculo coniunctum est, nec protinus in circinuationes reflectitur, prius quam ijs locis præbuerit quæ in medio inter ventriculū & ienunum spatio locari necesse erat. Itaq; cum intestinorum propria videatur esse circinuatio, quidam ipsam *ἐκρῶσιν* non dignantur intestini nomine, sed vel simpliciter *ἐκρῶσιν*, vel *ἐκρῶσιν δωδεκάδακτυλον*, vel etiam absolute *δωδεκάδακτυλον* appellant, quod duodecim fere digitorum longitudinem æquet. Sunt verò & qui nō totum eum processum *ἐκρῶσιν* appellandum censent, sed ipsius tantum orificium quo depēdet à ventriculo. Cæterum ad hoc intestinum meatus deferitur, qui bilem ipsam ex hepate in ipsum dimittit.

*ἐκρῶσις* in osse dicitur idem quod *ἐκρῶσις*.

*Ἐκρῶσις* *ἢ*

*Ἐκρῶσις.* sugillatio. est sanguinis sub cutem per grumos effusio. Cuius affectio est, eius causa, vt plurimum cōtusio carnis est, à qua cum exigua venæ diuortium perpelli fuerit,

sanguis per diapedesim profunditur; & sub integra cute colligitur per grumos. Inde tumor excitatur tactu mollis & cedens, & magna ex parte indolens, nisi quatenus ex contusione dolor est, & principio quidem rubens, deinde progressu temporis liuidus & niger. Ac cum in phlegmone quoque sanguis è vasīs effundatur, distinguit tamen phlegmonem ab ecchymosi Gal. aphor. 20. sect. 6. quod in phlegmone sanguis per musculorum cavitates sola ratione contemplabiles secundum minimas sui partes effunditur: in ecchymosi vero in spatia effluit quæ venis circumiacent. Species ecchymomatosis sunt *ἐκρῶσις* & *ἐκρῶσις*, & sanguinis ad vngues concursus ex plaga. Id quidēti proprie significat *ἐκρῶσις*: Hippocrates vero aliquando generalius appellat, effusionem omnem sanguinis è vena, & inanitionem quam alio etiam nomine *ἐκρῶσιν* vocat, vt annotauit Galenus comment. 2. *αἰς τὴν ἐκρῶσιν*.

*Ἐλαία olea.* Arbor est saligneis fere frondibus & pēpētuis, angustis, quæ tam breui inniuntur pediculo, vt quasi defixa cohæreant: floribus pusillis quidē, sed foliatis, fructum ambientibus, baccis maturitate nigratibus. Huic supina foliorum, contra quam cætarum, candicant magis quam prona, minusque sunt læuia, vētunturque mox post æstium solstitium. Viuax est & diutissime durat. fructus eius *ἐλαία* eodē nomine dicitur, cuius succus oleum est, *ἐλαίον* Græcis vocatum.

*Ἐλαία oliua.* est fructus oleæ. Constat tribus partibus nucleo, carne, & amurca, quæ sanies eius est amara: succus eius oleum est. Traduntur autem oliuarum multa genera, sed præcipua decem: pausia, algiana, liciniana, iergia, nazua, culminia, regia, murtea, orchis & circites, seu potius cercites. Sunt & inter eas particulatæ quædam differentie: *καρμῆδες* vocantur, quæ oleo suo puræ, hoc est sine accersita commedatione, innatant, & velut vim abunde fluunt. eadē etiam *καρμῆδες*, hoc est muria condite, aliquādo dicuntur. *πυκνῆδες* etiam dicuntur Iulio Poluci, quoniam enatent. Dicuntur & aliquæ *πυκνῆδες*, hoc est fursuræ, quæ antequam omnino maturefiant, decerpuntur & condiuntur. sic dictæ à colore. nondum enim nigre sunt.

*Ἐλαίον oleum.* Est succus ab olea expressus: is propriè & simpliciter oleum dicitur. Humidum est & moderate calidum, id quē tanto magis quanto ductus fuerit: tale fit potissimum ex oliuis quas *δρυοναί*, hoc est drupas, vocant, siue māraras. Quod enim *δρυοναί* & *δρυοναί* nūcupatur, ex vis scilicet immaturis expressum, id quantum in se habet adstrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Quanto autem quodque vetustius fuerit, tanto etiam euadit calidius & tenuius. Habet præterea mitigandi laxandique facultatem. Ab eius similitudine succus

omnis oleosus ex fructu quouis expressus oleum vocatur, adiecto fructus ex quo prodit nomine, ut oleum ricinum, amygdalinum, caryinum, laurinum, terebinthinum, nec paucapraeter hæc ex fructibus expressa omnia, sed tantum inter se facultatibus discrepantia, quantum & fructus ipsi ab invicem dissident. Sunt etiam ab his alia oleorum genera, quæ æquiuoce cum ipsis dicuntur vnguentis, ut rosaceum, melinum, liliaceum, & quæcunque id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo maceratis conficiuntur.

*ἔλαιον* etiam à quibusdā dictus est *ὀλίαν*, hoc est bitumen liquidum, quia maxime propter pinguedinem olei simile sit, vel quod eo ad lucernarum lumina antiqui præsertim in Sicilia vterentur.

*ἔλαιον ῥόδινον*, oleum rosaceum, id est, quod aromatibus conditum non est, apud Hippocr. ut annotat Gal. *ἐν τοῖς γυναικείοις*.

*Ἐλαϊόμαλον*, genus quoddam resinæ Palmyris Syriæ familiare. Id ex vetustis arborum caudicibus manat pingue, vnguinofum, crassius melle, resina tenuius, perinde quasi nunc è lapidibus quibusdam, quod *πινέλαιον* nominant. his quibus infederit, hæret admodum pertinaciter, atque si edatur marcore consumit & viribus destituit, veternumque inducit.

*Ἐλαϊοειδὴς*, est fructus vitis in oleam inflatus, utriusque fere parentis naturam retinens.

*Ἐλαϊόφυλλον*, herba est quæ *φύλλον* dicitur, quod in saxosis nascitur.

*Ἐλάτη*, abies. Arbor est procera & recta, semper virens, pinò non dissimilis, radice nervosa, singulari, hirsuta, caudice rotundo, foliis pinnatis & insectis, summo mucrone rigentibus, flore croceo. Duum generum est: mas & femina: mari pungentiora, acutiora, & magis flexa folia sunt: femina materie constat molliore, candidiore, operibusque faciliore, & caudicem prolixiorem habet, qui maius versicolor, latior atque durior est: præterea maris nucibus pauci quidam nuclei parte priori insunt, sed feminae nucibus nulli omnino. à Gallis & sapinus & anetum dicitur. Sed nec Dioscorides nec Galenus huius arboris meminerunt. Preparatur autem ex abietino semine medicamentum *ἀιόνιον*, hunc in modum: Abietis semen septembri potissimum mense collectum conijcias in oleum quando voles, permittasque macerari aut trium aut quatuor mensium spatio: prius tamen contusum. Quæritas eorum talis esto: seminis eius modium Italicum in viginti quinque heminas siue libras olei conijcies: ubi satis semen erit maceratum, ipsum abijceis, humidum vero quod superest, linteis percolabis: postea ceram quatuor libras inijcito, resinæ abietinæ libræ vnius partem vnam, siue drach. xxxi. resine etiam pinæ tantundem: aut si harum copia non sit, terebinthinæ. Concoquas postea in vase duplici, aut igni lento. Valet ad eos qui

in carne & tota corporis mole succos con-gesserunt, ut eos concoquant & digerant. valet ad omnem lassitudinem seu spòte ortam: seu alia quantis ratione contractam. Author Galen. lib. 4. sanitaris tuendæ.

*ἐλάτη* Galeno est *πᾶσιλον ὀβελίσμα* *τὸ φοίνικος*, hoc est, tenerum palmæ germen, cum quo idem sentit Hefychius ut autem Dioscorides ait, *ὁ ἀπὸ τοῦ φοίνικος τὸ αὐτὸς καρπὸς, ἐλάτη καλεῖται*: hoc est, qui continetur sub ea fructus, *ἐλάτη* vocatur.

*Ἐλατήριον*, elaterium. Est succus ex fructu cucumeris agrestis expressus, & in orbiculos coactus, cuius quidem conficiendi rationem Dioscorides libro quarto explicavit. Perutilis est ad medicationes. Eligi autem debet quod in candido leuiter humectum est, sine pondere, sine scabritia, gustu amarissimo, quodque lucernarum luminibus obiectum facile ignem concipit. Improbatur asperum, turbulentum, herbaceum, aspectu medio inter cruum & cinerem, quod & pōderosum est. Dioscorides scripsit ipsum à bimatu tempestiuum esse ad purgationes, durareque biennio: Paulus vero Ægineta anno non vetustius deligendum esse docet: ab Actio inter venena recensetur. Ciet menses & fortum interimit appositum, ceu alia amara omnia & subtilium partium, præsertim si calida sint, cuiusmodi est elaterium: summe siquidem amarum est, & secundo ordine exalfacit, habet & vim digerendi. Nec vero ex fructu tantum cucumeris anguini elaterium fit, sed etiam expressis radicibus & foliis, quibus tamen vis inest imbecillior. Gaza apud Theophrastum *ἐλατήριον* agitatorium interpretatus est. commouet enim vehementer corpus & superpurgationes inducit. sed hoc Latinis incertius quam si simpliciter elaterium dixisset. Nec vero tantum succus, sed & ipse cucumis *ἐλατήριον* à quibusdam dicitur, ut habetur apud Dioscoridem.

*ἐλατήριον* nō id solum quod ex agresti cucumere factum est, sed quicquid deorsum ventrem purgat, sic vocatur ab Hippocr. ut annotat Gal. *ἐν τοῖς γυναικείοις*.

*Ἐλάτην*, herba est foliis helxinæ minoribus rotundioribusque, pilosis, tenuibus, & semipedalibus ramulis, quinis senisve, ab radice statim foliosis, gustu adstringentibus. Vulgus campestre rapistrum vocat.

Est & alia quæ elatine pampinaria dicitur, huic similis quam nostrates pimpinellā aut potius pampinulam dicunt.

*Ἐλαφίσσατον*, herba est quæ caulem emittit foeniculo vel rosmarino similem, angulosum, foliis latitudine digitorum duum, prælongis, infractis & aliquatenus asperis, propages multæ umbellæ anethi subluteas sustinent: ipsum quoque semen anetho simile est, radice tres digitos longa, vnius crassitudine, candida, prædulci, & culenta. Officinæ & herbarii gratiam Dei vocant. Exalfacit & desiccatur tertio ordine.

*Elephantia*. etiam à quibusdam dictum esse *typhlo* *typhlo*, Dioscorides auctor est.

*Elephylis*. Helychio est *typhlo*, hoc est Cyperus, forsitan quia in paludibus radices agit. est enim Cyperus ex iuncorum genere, qui palustres sunt.

*Elephylis*. id est agrestia, apud Hippocrat. ut scribit Gal. *in typhlo*.

*Elephylis*. saluia. Est fuitex oblongus, furculosus, quadrangulas habens & candidas virgas, folia cotonei mali effigie, longiora, scabriora, paulo callidiora, extritarum quoque vestium similitudine hirsuta & incana, vehementer odorata, sed virosa, semine sylvestris homini in summis caulibus. Plinius eleliphakon in censu frugum inter lentis species retulit sylvestris. Nunc tamen nihil est commune lentis & saluie, facileque fieri potuit ut Plinius *eleliphakon* à *typhlo* cepcrit. Est autem dicta *eleliphakon*, quasi tabida herba, est namque salua squalida & scabra, ac fetorrida semper & exueta apparet.

Est & alterum saluie agrestis genus quod *eleliphakon* vocat, breviori & leniori folio, vulgus francà saluiam appellat. Evidenter utraque ex calcacit & leuiter subastringit.

*Elephylis*. herba est folio verbasci angustioris, asperiore, oblongo. Caulem quibusdam in locis non emittit, radice subcandida vel subrufa, odorata, subacti, vegeta, magna, tactu molli. Romani inulam dicunt, vulgus enulam campanam.

*Elephylis*. est herba humidis locis nascens, apio satiuo maior, folio rariore, cetera prorsus apio consimilis, odore, sapore, figura, virib'. Homerus *Iliados* β. *eleliphakon*, quasi dicas in palude nutritum, vocauit. Gaza Latine paludapium reddidit.

*Elephylis*.

*Elephylis*. est extuberatio melancholica & contagiosa, totum corpus in speciem elephantis immutat. Totus hic morbus sub tumorum genere continetur. Non est autem tumor vnus, sed multiplex & inæqualis, & per vniuersum corpus huc illuc dispersus, intus à visceribus facti initio, & progressu vsque ad extimam cutem continuat. Pares enim in internis visceribus tumores excitantur, qui & exterius apparent. Si quidem, ut scripsit Archigenes, non est existimandum tumorem gigni morbum cum ad cutem tumores erumpunt, sed potius perfici, atque inde euenire ut morbus hic curatu difficillimus sit, quod principio, quia læt, nulla medicina reprimatur, sed vires in interno corpore acquirit maiores, quam ut possit postea superari. Si quidem vitiosus humor ipsum creat, qui malignitatem hanc non in summo corpore acquirit, sed in internis visceribus concipit. Prima enim mali labes in iecinore & liene residet, atque inde vitium serpit. Humor autem qui morbum parit, melancholicus est, plus minusve, siue fecis instar accumulatus, siue bile vsta genitus, siue syncerus, siue sanguini, aut bili, aut pituitæ mistus. Nam pro

mixture modo variz elephantiasis differentiz exhibuit. aliz, ut vocat Paulus, *typhlo*, hoc est subrubicunda, à sanguine melancholico & limoso, quæ mitiores vel minus malignæ sunt: aliz *typhlo*, id est albæ, à melancholico humore cum pituita misto, vel ipsa etiam pituita crassa, salia, nitrosa & acti: talis namque genere atra bilis est, eiusdemque naturæ particeps, quod propter ingentem crassitiem, acrimoniam & saluginem non parum siccæ sit: aliz vero malignæ & pessimæ, ex humorum adustione genitæ, per quas & corpus vniuersum scaturit vlcerebus, & extrema etiam decidunt. Et has quidem tres elephantiz differentias plerique statuerunt pro varietate humoris & coloris. Humores eiusmodi tam sunt maligni, ut vere inter venenatos habeantur, & contagione etiam sanos inficiant, non aliter quam pestilentia & venerea lues. Verum incurritur in eum morbum magna ex parte ex elephantico parentum semine, vel ex victus ratione gignendis ijs humoribus congruente, præsertim quibus suppressi mentes, aut varices vel diuturnæ hæmorrhoides cohibent. Hos autem humores in præcipuis visceribus noxios natura, sicut solet in omnibus morbis venenatis & pestilentibus, ita in hoc ad cutem propellere aggreditur, id quod aliqua quid ex parte præstat, verum humor propter crassitiem sub ea hæret, variosque toto corpore tumores præ sui copia excitat, itaque corporis vniuersi figuram immutat, ut verius elephantis quam hominis esse videatur. Quam quidem morbum cum elephantis similitudinem Aretæus libr. 2. de diuturnis morbis elegantissime persequutus est, in hanc fere sententiam. Elephantum morbum ferè multa sunt & specie & colore, & magnitudine & victu communia. Ut elephas nulli alteri animali similis est, sic neque hic morbus alteri morbo. Elephas omnia animalia magnitudine & crassitie superat: omnis niger est, tenebricoso colore, morti & nocti similis, facie est fœda & informi, collo perbreui, auribus magnis, latis & alarum similibus: corium habet asperum & crassissimum, prætumidis, fissuris inæquale & velut angustis longisque fossis inartatum, scissuris aliis cauis & transuersis intercurstantibus, aliis etià obliquis & valde profundis: ac etiam reliquis animantibus natura pilos aut setas dedit, hic solus habet lanuginem. Sic & morbus iste magnitudinem habet, non tantum quia genere magnus sit, sed quod eo laborantes euadant seipsum maiores & crassiores, totumque corpus in tumorem attollitur. Tumores diuersi erumpunt, nondum quidem continui, sed cralli & asperi. Finditur autem tumorum interstitium, ut elephantis corium. Venæ late sunt, non sanguinis redundantiæ, sed propter cutis crassitiem. Non multo post corpus æqualiter intumesce. Pili ubique moriuntur, in manibus, femoribus, tibis, pube, mento & capite & caluitia



uities vel canities præmatüre aduenit. In capitis cute rimæ frequentes, profundæ, asperæ. Tumores in facie duri, acuti, albo sæpe fastigio, basi viridiore. Pulsus pusilli, grænes, tardi, tanquam per cõnnum vix se mouentes. Lingua grandinosis varis exasperatur, impetigines summos digitos infestant, genua pruriunt, & cum volupate scæpuni-  
tur. Rubent malæ cum modico tumore, supercilia prominent, glabra, deorsum versus pondere vergetia. Color linidus aut ater est. Nares cum atris tumoribus salebrosæ sunt, labia crassa prominent. Aures etiã consueto grandiores videntur. Totum corpus rugis asperis exaratur, & alte descendunt scissuræ velut nigri in corio sulci. Morbo vero aucto tumores vlcerosi fiunt, vlceraque foetida & insanabilia oriuntur, membraque ipsa hominem mortē præueniunt, exciduntque de corpore nasus, digiti, pedes, genitalia & totæ manus. Neque enim hæc labes prius perimit, & à turpi vita sæuisque cruciatibus hominem liberat, quam membratim totus dilaceratis sit. estque admodum longæua, quemadmodum & elephas animal. Hæc & alia plura Aræteus edisserit, ex quibus manifesto constat vererēs huic morbo nomen ab elephantis similitudine indidisse. Idem vero scribit etiam λεόντιον καὶ λέοντιον appellatum fuisse propter extremarū frontis rugarum similitudinem cum leonibus autijs qui irascuntur. Archigenes, vt habetur apud Aetium, λέοντιον appellari scripsit, quum frons ægrotum cum quodam tumore relaxatur perinde ac cutis flexilis superciliorum leonis. Dicitur & οὐνιελανθὺς tum à genarum rubore, & faciē Satyris persimili, tum propter inexplabilem & impudentem coeundi libidinem, vocarunt & veteres morbum huic ἡρκαλῆιον, hoc est Herculeum, quod nullus eo maior sit & violentior. nam præter ea symp̃tomata quæ ex Aræteo recensui, morbo ingrauescētē primum quidem stupet cutis, deindē sensum prorsus amittit, vt ne actu quidem cõpuncti dolorem sentiant, aur feruente aqua affusa vřantur: estque, vt ait Paulus, velut cancer quidam totius corporis, qui nullam omnino admittat curationem. Hic morbus verē est qui vulgo lepra appellatur, cnius quatuor differentias recensent, alopeciam, tiriā, leoninā & elephanticā, nomina istorum rationem non intelligentes.

Ελεφαντίνος. emplastri nomē est, quod habet cerussæ p. xxx. ceræ p. xlv. olei heminam, aquæ sextarium. Est autem compositio ea percandida, ideoque elephantina nominatur. Habetur apud Aetium gemina.

Ελκευσαμένον. ὅτι πλεῖστον διελέχθη. multum disferui, apud Hippocr.

Ελκερῶν. ἡλκῶν. inoletur, apud Hippocr.

Ελκερῶν. τὸ αἷς ἀπὸ ἡλίου θερμὸν. quod ceu à sole calidum est, apud Hippocr.

Ελκυσίν. cessare & toto corpore quiescere. dicitur de ijs qui ex motu & actione ad ocium

& segnitie transeunt, apud Hippocr. αἰεὶ στα-  
ταις ὄντας, vt comment. 2. Galenus annotauit  
cui Hippocrates opponit γυμναζομένους. Apud  
Hesych scribitur non tantum ἐλκυσίν, sed et-  
iam ἐλκυσίν, verum male, vt opinor.

Ελκὺς capiteolus vitis vel hedera. Sic etiam dici-  
tur tertia hedera species, quam etiam Lati-  
ni helicem vocant, quasi clauiculam: ste-  
rilis est, tenuibus viticulis, breuibus angu-  
losisque & concinnioribus foliis. Signifi-  
cat & ἐλκὺς extremam auriculæ oram, siue, vt  
Rufus ait, τὸ συμπίπτου πρὸς ἀφ' ἑρῆαν τὸ ὅτιον.  
hoc est quod complet circumferentiam au-  
rii. Inde ἐλκὺς appellat oppositam illi  
partem, τὸ ἐν μέσῳ τῶν ἀφ' αὐρῶν πρὸς κοιλότητι, siue πρὸς  
τῷ κοιλότητι: id est, quod in mediō iuxta  
cavitatem eminet. Cavitatem autem illam  
quæ in mediō est, ἐλκὺς vocant: Dicuntur  
etiam ἐλκὺς anfractus & conuolutiones in-  
testinorum.

Ελκυσίν. herba est cauliculo tenui, virenti, ere-  
cto & duro, folijs angustis ex interuallis, a-  
brotono similibus, comis auræ lucis in or-  
bem (vnde quidam ἡλόχυσον eam appellant)  
ymbella rotunda, aridis corymbis depen-  
dentibus, radice exili. Dicitur aliis nomini-  
bus & χροσάλημος & ἀμυδανόν. Proxime vi-  
detur accedere ad eam quam officinæ cotu-  
lam maiorem vocant.

Ελκὺς. vlcus. Est solutio continuitatis à ratiōne  
proueniens in omnibus præter ossa parti-  
bus. Internam habet causam, humorem sci-  
licet vitiosum & acrem, qui exedendo soluit  
particulæ in quam incubuit continuitatem,  
siue ea caro sit, siue cutis, siue cartilago, siue  
membrana, siue aliud quid ab ossē diuer-  
sum: vbi enim id vitij in ossa incidit, περιδόν  
appellatur. Paulo generalius nomen vlce-  
ris Hippocrat. usurpauit, cum dixit omnem  
morbum vlcus esse, omnem continui solu-  
tionem eo nomine significans. Neque e-  
nim, vt arbitror, inditā adhuc fuerant no-  
mina θραύματος, ρήγματος, θλάσεως, ραγμῆς, ρή-  
ξεως, & reliqua quibus recentiores medici  
solutæ continuitatis differentias distinxe-  
runt.

Ελκυσίν φάρμακον. attrahentia medicamēta, quæ  
& ὀσμωτικά appellatur. Sunt medicamen-  
ta calida & tenuium partium, quæ humores  
ex profundo in superficiem proliciunt. At-  
trahit enim perpetuo calidum, nec quicquā  
est trahendi facultate præditum inter medi-  
camenta quod calidum nō sit. Verum quod  
cum caliditate coniunctam habet partium  
tenuitatem, trahit vehementius. Est autem  
duplex attrahētium essentia: alia enim spō-  
te nascitur, vt dictamni, propoleos, thapsiz,  
sagapeni, vt succorum Cyrenaiici & Medi-  
ci: alia vero ex putrescente & acescente ma-  
teria est, & fermenti & p̃lorici. Quod si fi-  
mi quoque ex putrefactione generantur, om-  
nes vtique attrahendi facultate pollent.  
In his tamen non parum est discriminis: nā  
columbinus admodum attrahit. Ex æquo  
autem vtrumq; ab hoc recedunt, ad calidius

quidem anserinus, ad frigidius vero gallinaceus: hoc etiam magis vincuntur humanus & suillus. At canum sterens simile est medicamentis extergentibus, maxime si vescantur ossibus. Nec vero valde à se inuicem differunt *τὸ ἐκ γαλακτὸς καὶ τὸ ἐκ σφαγίονος φάρμακον*, hoc est, attrahentia & discutientia medicamenta. etenim virtutes sibi vicinæ sunt eorum quæ in alto latent attractrix, & attractorum digestrix. Nam quæ trahunt, etiam nonnihil omnino discutiant: & quæ discutunt, pariter trahunt: verum in digerentibus medicamentis diffusoria virtus in attrahentibus attractrix præpollet: atq; ab ea hæc quidem *ἐλκυστή*, illa vero *διαφορητική* appellantur.

Est & aliud medicamentorum attrahentium genus, quod qualiter familiaritate attrahit: id quod non est aliud quam totius substantiæ similitudine. Huiusmodi sunt omnia purgantia medicamenta & quædam alexeteria: virtus enim illorum purgatoria pars est, seu species facultatis attractricis: sed calida ut sint id genus omnia necesse est. Nā inter ea quæ essentis similia sunt, quod calidius est, id potentius attrahit, utpote quod similitudinis cōiunctum habeat auxilium calorem. Siquidem cum id duabus causis attrahat, vehementius trahet quam quod vna duntaxat attrahit.

*Ἐλκυστή διώγμος*, attractrix facultas. Est prima facultatum naturalium, quæ singulæ partes sibi cōueniens nutrimentum addacunt. Nam cum sint quatuor facultates quibus natura regitur, attractrix, retentrix, alteratrix & expultrix, ociōsæ sint oportet postremæ tres, si desit nutrimentum in quo occupentur. Itaque primum attrahi nutrimentum oportet: id quod euidenter in ventriculo cernitur, quod est primum concoctionis instrumentum, cibos per magnam famem semesos e faucibus ita rapiente, ut manuteleus & violentius vix rāpi possint. Neque enim suo pondere cibi in ventriculum deuoluuntur, sed ab insita ventriculo facultate, quomodocunque situm corpus sit, attrahuntur. Verum tamen non omneis cibos indifferenter attrahit, sed naturæ tantum suæ familiares & consentaneos. Hanc autem attractionem præcedit appetentia, pro cuius modo, cibis auidius vel languidius à ventriculo attrahitur. Cæterum sicut ventriculus vim suam tractricem cibi possidet, ita in cæteris partibus facultatem cōuenientis, siue alimentis, siue alterius rei attractricem inesse existimandum est, venis quidem & iecinori chyli ad se trahendi, vesiculæ felle trahendæ bilis, lieni trahendi humoris melancholici, renibus trahendi feri & vrine, testiculis & vtero trahendi seminis, pulmōni non sanguinis solum, sed etiam ætis, & reliquis similiter partibus attrahendi aliud quo delectantur, & frui possunt: nulla enim pars est quæ eiusmodi facultate careat. Est autem ea vis à tota substantia & naturali proprietate cuiusq; partis, à qua & magnes

ferrum & succinum paleas, & medicamentata purgantia humorem sibi familiarem attrahunt: ita tamen ut in eo opere natura villis seu fibris rectis tanquam adminiculis utatur: siquidem fibris rectis attrahit, sicut transuersis expellit. Porro nihil refert *ἄνισσος* aut *ἐλκυστή* aut *ἐλκυστή* *διώγμος* dicas, ut nec Latine attrahentemne an attractoriam facultatem.

*Ἐλκυστή*, vlcusculum. sic dicitur omne vlcus paruum, nec eo nomine certa vlla species vlcus designatur.

*Ἐλκυστή*, dicitur scoria siue recrementum argenti, isdem fere viribus, quibus & *ἡ μολύβδευρα*, præditum, ut habetur apud Dioscor.

*Ἐλκυστή*, *ἐμβρύονακον*, instrumento quo fœtus ex vtero trahitur apud Hippocr.

*Ἐλκυστή*, nomen est emplastri emollientis & discutientis abscessus etiam in pas transmutatos. Descriptio eius habetur apud Aetium lib. 15.

*Ἐλκυστή*, sic dicta est à quibusdam à *ἔλκυστή*.

*Ἐλκυστή*, elleborum, veratrum. Planta est duorum generum, vnum album, alterum nigrum. Album folio est plantaginis aut boræ sylvestris, sed breuiore, & nigriore, rubescente. Caulem habet canum, quadrantalem, tunicis conuolutum cum arescere cœpit. Radicibus nititur multis, tenuibus ab oblongo & exiguo capite exeuntibus, ceparum modo fibratis. Optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modice extensum, nec tamen iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit & tenuem habet medullam, de quo cum scribitur aliquē elleborum sumpsisse, intelligendum est. Hunc enim simpliciter elleborum nominare consueuerunt. Nigrum autē folia habet viridia, platani similia, minora, foliis sphōdylii, proxima, subaspera, nigriora, plurib; diuisuris incisa, caule asperum, flores purpureos, candidos, racematim coherentes, semē cnicī: quod in Anticyra *σπαραγμίδι*, vocabāt, quo deiectiones olim moliebantur. Radicibus cohzet nigris, tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis. Sic dicitur *ἔλκυστή τὴν ἐλκυστήν τῆς βορᾶς*, quod esu perimar, utpote *σπαραγμὸν φάρμακον*. Eligī debet corpusculum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu feruensque: vtriusque coloris discrimen non in semine, neq; in virgultis, sed in radice apparet. Candido vomitiones ciuntur, eoq; stomachum & ventrem superiorem purgat. Nigro altius inferior diluitur, vtriusque periculosa sumptio: vtrumq; calfacit & siccit tertio ordine: item acre est & absterforium.

*Ἐλκυστή*, emplastri nomen cuius duæ habentur descriptiones apud Gal. l. 6. *ἡ ἐλκυστή*, vna Andromachi, altera Heræ.

*Ἐλκυστή*, Theophrastus appellat siliquata, hoc est *λοβύς*, siue siliquas, habentia, ut lentesc, fabæ, lupini, dolichi.

*Ἐλκυστή*, dicuntur apud Hippocrat. velamenta spinalis medullæ: quorum duo interiora sunt deducta à mēbrana quæ cerebrum inuoluit,

uoluit, reliquum vero exterius vertebra omnes cōplectens, à caluaria, quā cum prima vertebra committitur: author Galen. comment. 3. *εἰς τὸ πρῶτον ἀρδρῶν.*

*Ἐλlichnium.* ellychnium, apud antiquos certum quoddam materiæ genus fuit quod *εἰς μέλινους*, id est ad funiculos lucernarum, aptissimum erat. Id quod ex Galeno apparet qui eiusmodi ellychnio etiam spongiæ loco uti iubet lib. 14. meth. med. præsertim molliissimò, quale, inquit, est Tarsense. cui etiam vis inest, ut ait lib. 13. vlcera quæ supercrescunt submittendi: verum quale hoc ellychnium fuerit, non constat mihi nec Plinius prodidit, cum tamen multorum aliorum ellychniorum mentionē faciat, ut eius quod ex vuaricini fiebat, præcipue claritatis, præterea papyraci, & alterius ex phlomide compositi. quā ob id *ελχίνιον* appellant.

*Ἐλlichnium.* linamenti genus apud chirurgos, sic dictum vel quod in ellychnij formam componeretur: vel, quod verius est, ex eadem materia constaret ex qua ellychnia olim fiebant, quibus vis erat, ait Galen. ad supercrescentia vlcera non mediocris.

*Ἐλμυρίδες.* lumbrici. Sic dicuntur animalia quædam longiuscula in ventre genita. Ea ex omnibus corporis partibus maxime intestina occupant, nec alibi nasci videntur. Quod si quæ interdum ex auribus, aut vesica aut sordidis vlceribus prodeant, admodum exigua sunt, & *παλινκίς*, non etiam *ελμυρίδες* appellantur. Sunt autem tres vniuersæ lumbricorum differentiæ. Prima teretum secundum crassitiem, secunda latorum, tertia ascaridum. Teretes (quos *ελμυρίδες στρογγύλαι*, hoc est, lumbricos teretes seu rotundos, vocant) alii frequentiores esse solent. creantur plerumque in superioribus gracilibusque intestinis, & superiorem ventriculū subeunt, ideoque frequenter per os reijciuntur atque etiam per nāres. hoc genus infantibus peculiare est, & plurima parte cum febricula. Latus vero lumbricus (*ελμύδα πλατύναν* vocant) mutatio est, si ita dicere liceat, membranæ interioris tenuium intestinorum in corpus quoddam viuū & animalis modo mobile, quod sæpe totum redditur longitudine incredibili aut in partes dissolutum. Nunc in ijs qui febris carent abundat, nunc febricitantibus accidit, ex longo morbo continuas stomachi rosiones inferens, ac impotentem ciborum cupiditatem. Nam quod animarum euasit, in intestinis obiectum rapit alimētum, ut alio statim opus sit, & nisi assumpserit, intestina rodantur. Certissimum eius indicium est, si cum recrementis nonnulla semini cucurbitæ similia excernuntur. Talia enim ab ijs gigni Aristoteles author est lib. 5. de hist. anim. cap. 19. Hi lumbrici etiam à medicis *κελείας* appellantur, hoc est institæ, à similitudine quā ad institas habent. Vocatur etiam *πυρίαι*, quod instar fasciarum sunt lati ac longi. Ascarides autem exigui sunt & tennes simulque tere-

tes, vermibus similes. Hi reperiuntur in extremo longanone & musculi sphincteris initio, vehementem horum locorum pruritum excitantes. Omnes lumbrici in intestinis nascuntur ex crassa lentaque pituita frequentibus cruditatibus collecta. Animantur autem à plurimo calore nativo, itaque pueri quā adulti lumbricis sunt magis obnoxii.

*Ἐλχνη.* planta fruticosa est foliis hederæ, minoribus, ramulis exilibus, quibus complectitur quodcumque contigerit. cognomento *κισσάμπελος*, dicitur, quasi vitis hederacea. potest videri species conuoluuli. sic dicitur quod facile adherescat rei cui libet. In officinis parietaria appellatur.

*Ἐλκτρά.* *ἐκπύματα.* hoc est velamenta, apud Hippocrat. Sic etiam dicuntur *εἰς πύον*, hoc est, extremi palpebrarum ambitus vnde excrescunt cilia.

*Ἐλμυρός.* panicum. Est semen frumentaceum milio simile, denis cum minimum foliis luxurians; culmo pene in surculum extenuato; nutante, rubido panicularum fastigio, prædensis acerrato granis, alias purpureis, alias rufis, nigris alias, item & candidis. Eodem modo quo & milium in panes subigitur, eosdemque habet vsus: minus tamen & nutrit & stringit. A quibusdam *μυρίον* dicitur, ut scripsit Dioscorides.

*Ἐλχισσον.* frutex est ramulum habes candidum, viretem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatiis angustā, abrotono similia: comam aureæ lucis, in orbem. Umbella rotunda, veluti siccis corymbis dependentibus, radice tenui. nascitur in asperis & torrentium alueis. Incidit, extenuat, desiccāt.

*Ἐμβάριστα.* intinctus condimenta, hoc est, liquores in quos cibos intingimus ad saporis commedationem & gulæ irritamentum: ut garum, sapa, acētum. Latini etiam embarmatis nomen vsurparunt, ut apud Columellam lib. 12. cap. 55. Hoc sinapi ad embarmata non solum idoneo, sed etiam specioso vtetis: *ἐμβάριστα* enim intingere est. Dicuntur & alio nomine *ἀρτίματα*.

*Ἐμβάρις.* solium aquæ calidæ, labrum & piscina in qua aliquis lauatur. dicitur & *κολυμβήτρα* & *πύλος* & *δύεσμιον* & *μακρά*: nisi quis ista ab inuicem distinguere velit longitudine & capacitate.

*Ἐμβάριον.* *ὄξύβαριον*, hoc est acetabulum, apud Hippocratē.

*Ἐμβροχία.*

*Ἐμβροχία.* auxilii genus, cum locis affectis liquore aliquo humectatis perfusisque lanam deinceps aut linteam eodem liquore imbutum imponimus. Differt *ἔπειθ' ἡ καταιψίσις*, quod hæc ἡ *ἐμβροχία* pars & principium tantum sit, cum ἡ *ἐμβροχία* præter *τὴν καταιψίσιν* adhibear loco affecto remedium quod perpetuo infideat. Minus virium habet quā cataplasma: sed tamen vbi commode aptari id non potest, ut in capite, ibi ἡ *ἐμβροχία* apte adhibetur, & illis similiter qui propter

imbecillitatem ferre non possunt cataplasmatum grauitatem: item præcordiis inflammati, per initia morborum, quo tempore intempestius est cataplasmatum usus: præterea fracturis & contusionibus, cum emplasticis vti non licet.

**Ἰμῆσις.** vomitus. Est eorum quæ in ventriculo continentur, per os excretio. Symptoma est male affecti ventriculi, quemadmodum & diarrhœa. Differentia tantum in eo est, quod vomitio superioris partis ventriculi male affecti symptoma sit; diarrhœa autem inferioris. Sicut enim vbi in imis partibus ventriculus vel multitudinis pondere vel mordentis acrimonia offenditur, ac firmæ partes sunt quæ circa stomachum habentur, diarrhœa citatur: ita cum eius os sic afficitur, si cæteræ partes sunt valentes, vomitiones ciuntur. Sunt autem vomitionis duæ maxime causæ: copia cibi & potus ventriculum grauians, & qualitas mordacis cuiusdam rei, siue ea cibus sit recens ingestus, siue excrementum biliosum, pituitosum aut serosum in ventriculo natum, vel ex iccinore, vel liene in eum (sicut per crises sæpè contingit & fere semper in accessionum principiis) deriuatum, vel è cerebro distillans. Cuius vero etiam aliquando vomitiones ea quæ cum nec grauias nec mordacia sunt, in ventriculo tamen præter naturam continentur, nec ab eo concoqui possunt, cuiusmodi est pituita acida aut salia, & sanguis in ventriculum effusus. Adde his etiam malignam venenatamque qualitatem, & ab ea os ventriculi offensum. Tunc enim fere perpetuæ sunt vomitiones vel nausæ, hoc est inanes quidam vomendi conatus, qui vomitiones fere semper præcedunt.

**Ἰμῆσις.** *Ἰμῆσις.* hoc est vomitus apud Hippocratem. Est autem Atticum nomen.

**Ἰμῆσις.** menstrua mulierum purgationes. vide *Ἰμῆσις*.

**Ἰμῆσις.** est medicamentum liquidum quod lintæolis conserptis exceptum intra vlcera eiusque sinus reconditur. Liguatur etiam aliquando in eam rem, vt penitus subeat. Sic dicitur quod *ἰμῆσις* adhibeatur, ipsa enim linamenta *ἰμῆσις* & *ἰμῆσις* appellantur. Ab hoc medicamentorum genere *ἰμῆσις* dicitur, apud Hippocratem lib. *ἰμῆσις* *ἰμῆσις*, qui vlcere cauo laborant, quod curationem *ἰμῆσις* *ἰμῆσις*, hoc est per linamenta, desiderent, vt annotat Gal. comment. 3.

**Ἰμῆσις.** inspergines. medicamenta arida quæ cuti insperguntur, vt immoderati sudores, aut alia per halitum digesti cohibeantur, aut vt cutis extrema scarificetur, aut pruritus excutitur. Sic quidem Oribasius lib. 10. collectorum medicinalium, qui etiam ab his *ἰμῆσις* differre scribit, quod hæc ad suauitatem tantum odoris alis, inguinibus, pedibusque adhibeantur.

**Ἰμῆσις** & *ἰμῆσις*

**Ἰμῆσις.** est altera è primis medicinarum sectis. Eius author primus Serapion extitit qui na-

turæ cognitionem, rationalemque disciplinam nihil ad medicinam pertinere professus, in usu & experimentis eam posuit. Quæ Apollodorus & Glaucias & aliquanto post Heraclides Tarentinus & aliqui non mediocres viri sequuti, ex ipsa professione se *ἰμῆσις* appellauerunt. Erant autem *ἰμῆσις* genera tria, *ἰμῆσις*, *ἰμῆσις*, & *ἰμῆσις*. Primum quidem dicebatur cum aliquid experirentur, in quod forte fortuna, nihil tale cogitantes, incidissent. Secundum cum ad alicuius rei experientiam dedita opera venirent, siue per somnia, siue aliter admoniti. Tertium vero cum ea quæ pro sunt vel nocent, siue natura, siue fortuna, siue aliquo consilio, in morbis iisdem experirentur, alios, qui eadem prius experti essent, imitantes. Quicquid autem iuuat aut nocet, hoc est causarum omne genus, dicebant vel naturale, vel fortuitum esse, vocantes naturale quod casu fieret, neque haberet manifestam causam: fortuitum vero, quod sine electione quidem nostra fieret, sed euidenter causam haberet. Tribus autem his theorematibus utebantur, *ἰμῆσις*, *ἰμῆσις*, & *ἰμῆσις*. Appellabant *ἰμῆσις* quicquid aliquando obseruassent. quorum cum magnam habebant copiam, eam omnem *ἰμῆσις* nuncupabant, atque id rursus *ἰμῆσις* quæ est eorum memoria quæ frequenter & eodem modo visa sunt. quæ cum didicissent, eam *ἰμῆσις* appellabant. Quæ in re diligenter considerabant quæcunque simul acciderent symptomata, eorumque omnium obseruationem *ἰμῆσις* appellabant, hoc est, concursum & congeriem symptomatum omnium quæ in affectu essent loco. Quod si in morbos nondum visos incidere, aut eo loci essent vbi inuentorium auxiliorum facultas non suppetere, transibant ad consimile, quod *ἰμῆσις* *ἰμῆσις* vocabant, eamque triplicem statuebant, de affectu in affectum, de loco ad locum, de remedio ad remedium. Eam autem obseruationem quam per illam *ἰμῆσις* *ἰμῆσις* habebant, *ἰμῆσις* *ἰμῆσις* appellabant.

**Ἰμῆσις.** herba est nascens in montibus & maritimis, salso gustu. Romanis saxifraga dicitur. Est & alia eiusdem nominis quam Latini calcifragam appellant.

**Ἰμῆσις.** Dicuntur medicamenta quæ poris corporis illita tenaciter hæreat. Sunt autem eiusmodi glutinosa, terrea, & minime acris, sed gustu potius aquosa. Nam si qualem tibi sensum præbet aqua omnis plane qualitatibus experta, talem in re sicca & terrea inuenias, ea vti que calore & frigore temperata est, aut paulo certe frigidior. Itaque consistentiam siccam habet & terrestris sit, citraque morfam desiccat necesse est, atque si meatibus corporis illinatur, difficulter inde euelli & elui poterit. Eius generis medicamenta sunt plurima, si exquisire sint loca, vt amyllum, pompholyx, cerussa, calx, cadmia, pincarum vesca pars aqua mace-



rata. Verum quædam eorum non solum terrea sunt, sed natura etiam aquea; quædā etiam aeris non parum habent, tenacia tamen sunt omnia, atque ideo emplastica. Duplex enim est emplasticorum natura, altera exquisitè terrea & sicca, altera tenax omnino: mista vero ex aqua & terra, & plerumque etiam aere, ut oleum dulcesalis expertis. Qui quoque album ex ipsdē quodammodo mistum est, magis tamē terreum est quā oleum. Quinetiam caseosa lactis pars emplastica est, tenerque ac recens caseus, & suilla pinguedo, & cæteri quoque adipēs qui nondum acrimoniam contraxerunt, eoque magis quō sicciores magisque terreī fuerint. Eadem medicamenta etiam *ἐμψυχνι* appellantur. His contraria sunt *ἐκκαθάρτι*, quæ & *ἐκκαθάρτι* vocantur.

*Ἐμπλαστρον*. emplastrum. medicamentum in massam coactum quod præmollitum vulneribus imponitur. Differt à malagmate, quod hoc magis è floribus eorumque etiam surculis fiat, emplastrum vero sicut & pastillus, magis ex metallicis patitur. Deinde malagma contrusum abunde mollescit: nam super integrā cutem injicitur, laboriose vero conteruntur ea ex quibus emplastra pastillique fiunt, ne vulnera lædant cum imposita sunt. Inter emplastrum vero & pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquatū aliquid accipit, in pastillo tantum arida medicamenta aliquid humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit: arida medicamenta per se teruntur, deinde mistis his instillatur aut acetum aut si quis aliud nō pinguis humor accessurus est, & ea rursus ex eo teruntur, ea vero quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur, & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquid ex oleo prius coquitur: ubi facta sunt quæ separatim fieri debuerunt, tum omnia simul miscuntur. At pastilli hæc ratio est: arida medicamenta contrita, humore non pingui aut vino, vel aceto coquantur, & rursus cocta inarescunt, atque ubi utendum est, eiusdem generis humore diluuntur. Tum emplastrum imponitur: pastillus illinitur, aut alicui molliori aut cera romiscetur. Sic quidem distinxit Celsus lib. 9. cap. 17. Sunt autem multæ & variæ emplastrorum differentię: quædam cūventis vulneribus conveniunt, eaque agglutinant & fracturis accommodantur, alia maturant, discutiunt, attrahunt, sinus implēt, resiccant, cicatricem inducunt, leniunt. quas vulneris varietates varia simplicium medicamentorum natura misturaque distinguit. Sumuntur & à coloribus. unde alia *λευκά*, hoc est alba, appellantur, quorum magnā pars cerussam habet: alia *μέλανα*, hoc est nigra, ut quæ pice, resina & bitumine constant: alia *χλωρά*, id est viridia, ex ærugine, chalcantho, squama æris: alia *ερυθρά*, id est rubra, ut ex minio, siue rubrica Sinopide: alia *μαύρα*, hoc est colore mali cotonei, qualia parantur

tur ex ærugine moderate cocta, aut etiam mixtura (neque enim omnia *μέλανα* ærugine constant) medicamentorum: alia vero *σινελευρά* siue *σινελευρά*, hoc est, duplicis coloris siue aspectus, ut quum ærugo plurimum coquitur: alia autē *κρίνα*, hoc est fulva, propter nimiam æruginis coctionem; ut ostendit Galen. lib. 2. *Ἐπὶ κατὰ φύσιν*. Dictum *ἐμπλαστρον* *κατὰ φύσιν*, quod primario quidem significat obstruere atque implere, secundo vero, videlicet ab effectibus emplastri, subigere, versando mollire, in massam formare, illinere, item cutem & ulceratum locum in integrum restituere.

*Ἐμπλαστρον*. *πλησθόν*. prope, apud Hippocratem.

*Ἐμπύριον*. inflatio idem quod *ἐμψυχνι*, de quo postea.

*Ἐμψυχνι* *σπυγμός*. pulsus serratus, seu serranilis.

Est pulsus inæqualis in vna pulsatione & diversis partibus arteriæ, in quo pars alia arteriæ magis elata distentaque, alia minus, videtur. fit ob inæqualem arteriæ duriitiem, ex phlegmone præsertim contractam. sic enim fit ut pars alia attolli, alia non attolli videatur, quod durior sit minus apta distentioni. Habet quiddam vibrati simile & celet quidem est & frequens, non tamen semper magnus. Proprius est omnis magnæ inflammationis.

*Ἐμψυχνι* *σπυγμός*. est perpetua totius corporis convulsio in partem anteriorem. Species est *πύριον* sic à symptomate appellata, quod qui ea laborant, inclinatur in anteriora, nec se erigere valent. Est autem totius corporis convulsio, non solius cervicis: ex quo constat nō modo cervicis musculos, sed omnes etiam qui tota in spina habentur affici, & proinde hunc affectum ad nervorum, qui corpus in partē anteriorem inflectunt, principium pertinere. Quamquam fieri interdum possit, ut ijs non affectis, sed oppositis potius resolutis id mali genus exciteretur. Ac si totius quidem corporis est, *ἐμψυχνι* simpliciter appellatur: si vero certarū quarundam partium, nō simpliciter, sed addito eius partis nomine quæ ita distenditur, ut cervicis, vel maxillæ, vel lumborum. Oritur ab humore in nervis refrigerato. Pelops causam tribuit musculis repletis spiritu & aere crasso nebulosoque, quæ impense frigidum & concretum, eoque ad motum contumacem affirmabat. vide *ἐν ἐμψυχνι*.

*Ἐμψυχνι*. dici potest in omni corporis parte facta puris collectio, siue illud in inflammata parte adhuc contineatur, siue abscessus ruptus sit: alii non omnem quidem puris collectionem, sed eam modo quæ in internis visceribus facta sit, ita appellandam censent. Rursus alii nec eam quidem omnem, sed ubi inter thoracem & pulmonem pus effusum est. quæ quidem magis propria magisque usitata est *πύριον* significatio. Symptoma est peripneumoniz vel pleuritidis, si digeri vel per sputa vacuari non potuit. Succedit etiam interdum angina, ut

habetur apud Hippocrat. aphor. 10. libr. 5. Rupto namque inferne abcessu, pus in vacuum thoracis locum effunditur, ibiq; fluctuationis cuiusdam sensum mouet, cum aeger ē latere in latus conuertitur, inde vero per occultos meatus in aluum; intestina vesicamque subit, vel aliquando ad cutem erumpit, sibi que foras viam vno aut pluribus vlceribus aperit. Cæterum non semper inflammationi succedit empyema, sed quandoque nulla febre præcedente serofus aut pituitosus humor ex reliquo corpore eo loci delapsus putrescit, & empyema mouet, vt Aetius scriptis annotauit.

**Εμπύημα**

**Εμπύος, εμπίσμα** *εμπίσμα* suppuratus, purulentus, quacunq; corporis parte pus collectum sit. Verumtamen medici, vt ait Galen. in prognost. solent eos solos vel præcipue *εμπύος* nominare, qui in thorace aut pulmonibus hoc modo affecti sunt.

**Εμπύος μύς**, linamenta conserpta & conuoluta, quæ vulneribus induntur ad purgandam saniem, vel *εμπύος*, apud Hippocr.

**Εμπύημα**, reliquæ caloris febrilis post solutâ accessionem. Dispositio quædam est neutra, mediaque inter febrem, & febris intermissionem. Propria est intermittentium febrium & putridarum, in quibus solutâ accessione superest tamen nonnihil caloris vel in ipsiis humoribus putrentibus relictæ, vel in solidis etiam partibus impressi. Huic contraria est *απύεσις*, vide *σφαιρίσμα*.

**Εμπύωσις**, significat apud Hippocratē *σπύρισμα*, id est conclusit, vt Dioscorides interpretatur, vel adnata habuit humore plena, in morem fungorum, sicut interpretatur plurimi.

**Εμπύωσις κεντραγύωσις**, contabuit, apud Hippocratem.

**Εμπύωσις ενδερμωσις**, induruit, apud Hippocratem.

**Εμπεριον**, Medicamentum quod pores suo lentore obstruit. *Εμπεριον* etiam appellatur. Huic contrarium est *το εμπεριον*, sed hoc quidem modo sumptum *εμπεριον* tantum lentore suo obstruit. Verum aliquando sumitur generalius, vt eo etiam nomine comprehendantur quæ copia vel crassitie obstruunt.

**Εμπεριον**, obstructio. Est stipatio meatuum aut cavitatum naturalium ex abundantia aut vitiosa qualitate succorum. Speciem *σπύρισμα*, hoc est stipationis, esse Galenus libr. 10. meth. med. prodidit, sicut & *σπύρισμα*. Est autem obstructio morbus organicus, pertinetque ad formam organicæ partis corruptam, amissis videlicet meatibus aut cavitatibus parti alicui debitis, vel propter succorum abundantiam, vel propter vitiosam qualitatem, quod ij nimium lentæ vel crassæ sint. Hæ enim duæ esse possunt obstructionis causæ, quæ morbus est instrumentalis eorum quæ obstructa sunt corporum. Hæc symptomata multa consequuntur, & maxi-

me quidem ipsa transpirationis retentio, atque rursus putredo, aliorum morborum antecedens quædam causa.

**Εμπίσμα** inflatio. Est spiritus flatuosi collectio in inanibus corporum spatiis. Eius principium, inquit Gal. male concoctus cibus est, à calore videlicet debili, & à quo flatu excitati resolui nequeunt. Hi quidem collecti alias sub cute, alias sub membranæ quæ ossibus circumdantur, aut musculos vlceraumve aliquod includunt, *εμπίσμα* generant. Colligitur vero non parum aliquando etiam in ventriculo & intestinis, itemque in medio spatio horum & peritonæi. Gal. duabus differentiis omnem inflationem complexus est: aut enim in maioribus cavitatibus continetur, aut in minimis spatiis, quæ non licet sensibus usurpare, sed sola ratione comprehendipossunt. Cuius generis tumores, vt scribit, aliquando extiterè, quibus dissectis nullum pus inuentum est, sed spiritus tantum, qui per totam carnem minimis portionibus disseminatus esset. Cæterum differt inflatio ab œdemate, quod & pressa digitis non retinet vestigium, & sonitum veluti tympanum reddit, itemque quod incavitate sensibili subinde continetur, atque hæc nonnunquam maxima. Hæc affectio non solum *εμπίσμα*, sed etiam *εμπύσμα* *καὶ πύσμα* dicitur. Hæc enim nomina medicos confudisse apparet, neq; rationem habuerunt in maioribusne an in minimis spatiis spiritus conclusus esset, vt illud *εμπίσμα*, hoc vero *εμπύσμα* appellarent. Quæ enim in ventriculo & intestinis & medio eorum & peritonæi spatio nascitur, eam Galenus libr. 14. meth. med. *εμπίσμα* vocat. eandemq; *εμπύσμα* appellat postremo libro de symptomatum causis. Cum autem *εμπίσμα* omnium partium communis affectio sit, in oculo tamē proprie dicitur quum ille absque manifesta causa intumescens, decoloratior, pituitosior & multum pruriginosus sit cum fluxione, vt Aetius ex Demosthene recitat. Cōtingit autem, vt idem ait, plærumq; seniores, pruritu ab angulo qui ad nasum est incipiente, velut si quis à musca aut culice sit commotus. estq; hæc affectio per æstatem frequens.

**Εμπίσμα**, cruentum & recens vlcus. Sic dicitur confestim vbi illatum est, & nondum ex toto siccum, sed sanguine & cruore adhuc stillans, quodq; coniungi sibi labra tantum postular, omnis adhuc expertus alterius symptomatis.

**Εμπίσμα**, cruentum medicamentum. Id dicitur vt ait Galen. initio comment. 3. *εμπίσμα*, quod cruento vulnere iniicitur vt primum illatum est, & nondum ex toto siccum, sed adhuc cruentum, hoc est cum cruore qui *εμπίσμα* dicitur, ex cute ipsa vulnerata, vel etiam ex carne in roris speciem distillat. His emplastris, inquit Celsus, nulla maiore vsum præstant. Nam reprimunt inflammationem, nisi magna vis eam cogit, atque

atque illius impetum minuunturum glutinat  
victa, & cicatricem iisdem inducunt. Con-  
stant autem, inquit, ex medicamentis non  
pinguibus, ideoque *αἰσχροί* nominantur.  
Quæ enim huius generis sunt, siccare debet,  
& citra absterfione leniter adstringere: hæc  
maximè ex bitumine componuntur, cum-  
que varii sint generis, duo tamen habentur  
præstantissima, vnum *βάρβαρον*, alterum *αἰσχροί*  
appellatum. hoc tamen paulo plus quã  
cruenta exiccat, ideoque nisi diluatur nocet  
magis quam profit, contrahens membra at-  
que dolorem inducens. Cæterum *αἰσχροί*  
etiam à quibusdam *αἰσχροί* nomi-  
natur, vt scribit Galenus: de quo vide suo  
loco.

*Ἰσχυρὴ* est portio vrinæ crassa candidaque  
in eius medio sublimis. Partem quidem v-  
rinæ esse patet ex eo quod omnes vias emē-  
sa sint, & mutationes sortita quas & vrina,  
attracta primū per emulgentes venas à re-  
nibus, deinde demissa in vesicam, & conco-  
ctionem iis in locis sortita non aliter quam  
vrina. Sed nulla etiam vrina est, quæ eam  
non habeat vel secretam vel in se confusam,  
quemadmodum etiam hypostasim, de qua  
suo loco dicemus. Differt autem ab ea sola  
crassitie & gravitate. vnde fit vt hypostasis  
matulæ fundum petat, encephala autem in  
media vrina pèdulū sit, aut si forte exqui-  
site medium non est, paulo magis deorsum  
quam sursum vergat. Est enim corpus vrina  
paulo crassius & grauius, multo tamen le-  
uius quam hypostasis. Ac quāquam quod  
optimum est, eo loco situm esse oporteat &  
in imum magis inclinare (quanto enim ma-  
gis deorsum subsidet, tanto melius haberi  
Galen. author est) sæpe tamen in aduersa  
valetudine supra medium fertur, atque ipsi  
etiam vrinæ supernat, pendetque in ea,  
veluti nubes in aere, propter statum copiam,  
atque ab ea similitudine ab Hippocr. etiam  
*ἰσχυρὴ* nominatur. Sic enim putauit Galen.  
*ἰσχυρὴ* & *ὑποστασίς* apud Hippocrat. idem si-  
gnificare: quāquam ipse comment. 2. in  
prognost. dubitare videatur num Hippo-  
crates *ἰσχυρὴ* genus faciat & *ὑποστασίς* &  
*ὑποστασίς*, *ὑποστασίς* ita vt duæ enzotēma-  
tis species sint, vna nubeculæ similis, altera  
genituræ. Cæterum quod pertinet ad colo-  
rem quem candidum esse decet, eius ratio  
posita est in perfecta concoctione, quem-  
admodum color albus lactis, seminis, atque  
ipsius etiam sedimēti, sicut suo loco dicitur.  
vide *ἰσχυρὴ*.

*Ἰσχυρὴ* oculi instabiles & qui per-  
petuo mouentur, apud Hippoc.

*Ἰσχυρὴ* contrarium: aliter Aristoteli, aliter a-  
liis definitur. Hi enim non in corporum  
modo qualitate, sed etiam in quantitate &  
loco contrarietatem constituunt, quā vti-  
que Aristoteles oppositionem vocat, non  
contrarietatem. Neque enim magnū paruo  
vult esse contrarium, sed in eo quod ad ali-  
quid dicitur oppositum: neque multū pau-

co, sed nec rarum densò, neque relaxatum  
contracto, neque ipsi quod secundum na-  
turam est, id quod præter naturam est, vt nec  
summum imò, dextrum sinistro, antèrius  
posteriori. Verum Hippocrati omnia id ge-  
nus cōtrariorum habet appellationem, sic-  
uti etiam Platoni, qui generationes ex con-  
trariis esse dicit. sed nec Aristoteles suam  
ipsius legem in nominibus seruat, quo loco  
principia eorum quæ natura reguntur, ma-  
teriam, formam & priuationem statuit ita-  
que nihil interèst in medicina dicas, contra-  
ria contrariorum esse remedia, vel opposita  
sibi inuicem esse remedia. Siquidem copiam  
sanat vacuatio, defectū nutrimenta, in sum-  
ma quod exuperat, ablatis, quod deficiens  
est, adiectio. Cum vero dicantur contraria  
quæ sub vno genere plurimum inter se di-  
stāt, nō tantum extrēma extrēmis, sed medio  
etiā cōtraria sunt. Itaq; si intellexerimus in  
vno quoq; genere quod mediocre siue me-  
diū est, infinita quædam contrariarum rerū  
multitudo inuenietur, quæ maioris mino-  
risque ratione inter se dissideant. Hæc enim  
quævis à se non distent lōgissime, contrario-  
rum tamē nomine cēsantur ab Hippocrate.  
*Ἰσχυρὴ* species est & *ἰσχυρὴ*. Dicitur au-  
tem cum cavitās articulum excipies admo-  
dum profunda est, caputque quod in eam  
inseritur, oblongum. Eius pauca sunt exem-  
pla, vt cruris cum ischio, & forte tali cām of-  
fense nāvis speciem referente.

*Ἰσχυρὴ* indicatio. Est significatio eius quod fie-  
ri in singulis rebus debet, sumpta à propria  
cuiusque rei natura. Cum enim in singulis  
rerum generibus quæri possit quid sequen-  
dum quidue fugiendum sit, eius cognitio ab  
ipsa rei de quā queritur natura peruestigan-  
da est, quodque illa faciendum insinuauerit  
id eius indicatio dicitur. Vt si queratur de  
sanitate quid sentiendum sit, primum per-  
pendere oportet sanitatis naturā, quæ quia  
bona omnibus mortalibus videtur, facit vt  
iudicemus eam à nobis seruandam esse.  
quāobrem sui custodia, sanitatis indicatio  
est. Idem vero & in morbo agendum, qui  
quoniam totus præter naturam est & toto  
genere malus, indicat & ostendit se tollen-  
dum esse. Itaque quemadmodum duo sunt  
summa rerum omnium genera bonum &  
malum, ita duæ sunt primæ & generales in-  
dicationes Custodia & Ablatio, illa quidem  
boni, hæc vero mali. Singula enim de se-  
ipsis alterum eorum necessario indicant:  
quicquid enim est, aut secundum naturam,  
aut contra naturam, aut medium est, quod  
non naturale solent appellare. Quod se-  
cundum naturam est, vel est sanitas ipsa, vel  
vires nostri corporis triplices, vel causæ sa-  
nitatis, ad quas temperies, etas consuetudo  
& ambiens aer referuntur, vel sanitatis effe-  
ctus, hoc est, actiones omnes quæ secundum  
naturam fiunt. Hæc autem omnia custo-  
diam sui medicis omnibus indicant: quem-  
admodum quod cōtra naturam est, sui abla-

tionem. Id autem est, aut morbus ipse, aut causa morbi, aut symptoma. Est autem ea prima & comunissima indicatio & idioarata etiam non latens, quæ quid agendum sit declarat a qua alia sunt magis speciales indicationes, quare illæ fieriue possit quod prima indicauit, alia vero quibus remediis, ostendunt. Hæc autem nihil aliud sunt quam rei propositæ argumenta à quibuslibet rebus desumpta, quæ ad eius cognitionem conferre possunt. Vt si queratur de morbo an curari possit, indicatio siue argumentum primum petendum est ab experientia, deinde vero à ratione: illud Empiricorum proprium est, & *ἡμῶν καὶ τῶν αἰσθητῶν* vocatur: hoc proprie *ἰατρικῆς* est, nec aliud quam *ἡ ἀπὸ τοῦ νοσήσαντος*, hoc est, consequentia ratione inuenta ductaque, diciturque alio nomine *ἡ μὲν*. Petitur autem quadrisariam, à substantia totius aut partis affectæ; ab actione partis læsæ, ab usu à situ partis. A substantia quidem petitur argumentum hoc modo: nam si eius temperies æqualiter vitata est, indicat id non posse præstari quo tendimus: contra vero si inæqualiter vitata est; aut si solida aliqua substantia perierit, indicat ipsa se non posse reparari: si vero carnosa aut spiritalis, posse. Ab actione autem partis læsæ in hunc modum. Nam ea tum per quam vita est, tum siue quia esse non potest, tum per quam conseruatur si perierit, certum est argumentum morbum eum cuius vitio perierit non posse curari: si vero per quam melior vita est perierit, spem esse curationis. Similiter pars ea cuius usus ad vitam necessarius est si perierit, indicat morbum esse incurabilem: contra vero cuius non necessarius est usus. A situ quoque partis idem indicatur. Nam si ita sita est vt medicamenta ad eam perungere nequeant, argumentum est præstari id non posse quo tendimus; sicut contra præstari posse si medicamenta ad eam deduci valeant. Similiter vero de alia questione statuendum, qua queritur quibus remediis præstari possit quod speratur. Argumenta enim petuntur & à rebus secundum naturam, & ab iis quæ sunt præter naturam. Quæ enim secundum naturam sunt, vt sanitas, vires & causæ omnes salubres, ad sui custodiam similia sibi adhiberi postulant: quæ vero sunt præter naturam, remedium, insinuat contrariæ cum morbo facultatis; vt qualitas contrariam qualitatem, repletio vacuationem, & præterea definitum certâ quantitate & numero. Sed quantitatem quidem metiri oportet tum ex morbo, tum ex natura. Morbus enim indicat medicamentum tanto excessu contrario à natura deficiens, quanto ipse naturæ modum excessit, vt si morbus primo ordine sit calidus, medicamentum indicat adhibendum primo etiam ordine refrigerans. Natura vero multiplices variasque deligendi medicamenti indicationes præbet. Spectare enim oportet, & totius corporis & partis affectæ naturam. Totius autem na-

tura partim à naturali temperamento partim à viribus nostrum corpus dispendantibus æstimanda. Ac temperies quidem medicamenta indicat cum totius temperie æquali mensura esse oportere. Vires autem si robustæ fuerint, valida medicamenta: si imbecillæ, mitiora indicant. Similiter & partis affectæ natura distinguenda est: nam pars similis in corpore quidem temperato, si medii est cum ipso corpore temperamenti, indicat remedium tantum esse oportere, quantum soli morbo debetur: si autem medii non est temperamenti, indicat medicamentum plus quam morbus ipse exposcat ea qualitate intendendum quatenus plus minusue à mediocritate temperamenti recessit: verbi gratia, glandulosa pars minime siccans medicamentum indicat, carnosa parum siccans, venosa non multum, arteriosa magis, membranosa & nervosa amplius, musculosa medio modo inter carnosam & nervosam, cartilaginosa multo magis, ossea vero quod maxime deficeret medicamentum indicat. Eadem vero similis pars in corpore intemperato, si quidē ambo, pars videlicet & corpus totidem contrariis gradibus recesserunt a sua temperie, indicat medicamentum tantum esse exhibendum quantum parti debetur temperatæ, quantum scilicet morbus ipse solus postulat: si vero pars sola in medio est temperamento, indicat eatenus intendendas esse vires medicamenti; quatenus corpus ad intemperiem deflexit: si autem & pars & corpus imparibus gradibus contrariis recesserunt a sua temperie, tunc quot gradibus vnum alterum excedit, totidem gradibus vires medicamentorum augendas esse ostendit. Pars vero organica, tum ex sua figura, tum ex positi sui remedium genera modumque indicat: sicut Galenus extremo lib. 7. meth. medendi demonstrauit. Sed hæc quidem simplices sunt indicationes, præter quas alia etiam habentur compositæ genere similiter triplices: alia enim quid agendum sit, alia an præstari possit, alia quibus auxiliis præstari possit, ostendunt. Quid vero agendum sit, in compositis indicationibus non alia methodo inuenitur quam in simplicibus, quod compositi cum aliis affectibus non indicet aliud esse agendum quam si simplices per se subsisterent. An vero præstari possit, indicari potest, vel æstimatis per se singulis affectibus, qui si curari non possunt, nec ipsi quidem cum aliis compositi curationem vnquam admittent: vel affectuum inter se collatione. Si namque inter se contrarii sint, aut si eorum vnus alteri noceat, difficiliorem, prolixiorē aut periculosam omnino curationem indicant: si vero indifferentes sint, vt sibi mutuo nec prosint nec noceant, prolixiorē: si vero alter alteri auxilio sit, faciliorem pollicentur. Quibus autem auxiliis præstari possit, inuenitur non aliter quam si simplex esset indicatio, siue remedii genus, siue quæ mensura, aut quam



sepe fit exhibendum requiratur. Verum in remedium ordine dictamen est, & cui primo cui secundo medendum sit inuestigandum. Affectus quidem in ordine promiscui, quorum nullus altero prior est, nullum ordinem exhibendi medicamento definitum indicat: in quibus vero ordo aliquis est, etiam medicamenta certo ordine sibi adhiberi possunt. Id autem indicabitur à causa eius quod post futurum est, id est, cuius curatio est causa curationis alterius: hoc enim prius remedia sibi adhibenda esse possunt ab eo quod obtinet rationem causæ sine qua non: hoc enim ante alia medicamentum requirit ab eo quod magis urget: siquidem id prius sibi medendum esse indicat. Hæc quidem fere præcipue sunt indicationes quæ in morborum curationibus spectari solent. Nec tamen in parte tantum medicinae therapeutica indicationibus locus est, sed in sanitate etiam conservanda, & in re breuiter omni de qua trium earum questionum aliqua quas explicauimus institui potest.

*Ἐνδύμνος* ἢ

*Ἐνδύμνος νόσος*, morbus patrius, vernaculus, & regionis seu populo alicui familiaris. Hic in regione aliqua frequens est & perpetuus, omnesque ex æquo corripit, quod causâ habeat omnibus communem. Altera est communis morbi quem *παῖς* appellant differentia. De hoc morborum genere agitur apud Hippocratem lib. de acie, locis & aquis.

*Ἐνύμα*, infusum, quod per inferna in alium infunditur. *ἔγχυσμα*, *κλύσηρ*. venit *ἐν* ἑ *αὐτῷ*, quod infundere significat.

*Ἐνύμ*, vocantur à Græcis, inquit Galenus comment. 2. *ἐν τῷ κατ' ἰσχυρῶν*, qui ab ortu surdi sunt, simulque indistincte loquuntur. Vnde quidem apud Hippocratem *ἐνύμ* metaphorice interpretatur inefficax & inutile. ut enim illi obeundis vitæ munus profusus inutilis sunt, sic quicquid non iuuat, *ἐνύμ* ab Hippocrate dici existimant.

*Ἐνέργεια*, actio, motus est partium actiuus, vel, actio est agentis motus, vel, actio motus est actiuus, qui à se editur, hoc enim pacto pluresque actiones excluduntur, quæ verius passionibus nominari debent, quales quibusdam partibus accidunt, cum ab aliis mouentur. Siquidem crurum brachiorumque ossibus motus inest passiuus potius quam actiuus, qui fit à musculis ea mouentibus. Qui tamen & geminam quoque rationem habent. Nam si ipsum primum mouens, quod est princeps animæ facultas, respexeris, musculi ratione instrumenti habebunt: si autem ossa quæ ab ipsis mouentur, rationem habebunt agentis. Possidet autem omnis actio, ut & passio, in ipso fieri essentiam suam. Quamdiu enim fit, actio dicitur: cum facta est iam non actio, sed *ἔργον*, id est opus. Siquidem caro non est naturæ actio, sed opus: quanquam recte etiam loquentibus actionem quidem licet opus

quoddam naturæ appellare, cum digestionem, concoctionem, sanguificationem non tamen contra licet opus actionem omnino nuncupare. Paret enim alterum eorum nominum bifariam dici, alterum non item. Habet vero omnis actio in animantis corpore peculiarem aliquam partem per quam perficitur, nec pars vlla est in animalis corpore quæ careat sua actione, verum primarias quidem actiones corpora similia, secundarias autem organicae partes, sed vtriusque quidē (si modo integræ & inculpatae fuerint) à proba & naturali qualitatibus temperie perficiunt. Actio namque proba esse non potest sine corporis naturali affectu, ut nec vitiosa, nisi cum corpus fuerit vitio affectum. Sicut autem probitas actionis, sanitas, ita actionis vitium morbus dici potest. Itaque habent singulae partes animalis suam propriamque actionem, quæ quamuis partis eius cuius actio est, usus etiam esse possit videri (visio enim actio est oculi, nec aliud ob oculo usum exposcimus) idem tamen non est, sed ab eo differt, quod actio, uti diximus, motus sit actiuus, usus vero nihil aliud sit quam quæ vulgo dicitur *ἐνέργεια*, id est, ad agendum aptitudo, quodque usus actionem quidem dignitate præcellat, actio vero constructione & generatione præcedat, ut in lib. de usu partium docuit Gal. Sunt autem omnium actionum duæ summæ differentiae, alteræ animales, alteræ naturales. Animales triplices, sensitiuæ, motiuæ & rectrices, siue principes, quas præcipuas obtinet ea quæ à pueritia ad remissionem usque succedit ætas. Naturales vero, quæ & corporales à Galen. dicuntur lib. 6. sanitatis tuendæ, plurimas, quarum tum cor, tum iecur principia existunt, in pueritia præcipue vigentes. Alii vero tres summæ actionum differentias constituunt à tribus partibus desumptas quæ sunt in toto corpore nobilissimæ: animales, quæ cerebri sunt, vitales, quæ cordis, naturales vero quæ iecinoris, vocabulis tantum à prioribus dissidentes.

*Ἐνέργεια*, id est actu, aliquid esse dicitur quod *ἔργον*, id est reuera, tale est quale esse dicitur, ut ignis calidus, nix alba, homo niger qui reuera niger est, & calidus qui calet: dicitur autem relatiue *κατὰ τὸ δυνάμει ἔστι*, id est, ad id quod potestate tale est.

*Ἐνδύασις*, infringit, apud Hippoc.

*Ἐνδυσασις*, fanatica percussio seu afflatio nūminis. Est veluti cum quidā mente in sacris faciendis capiuntur, si qua viderint, aut si tympana vel tibias vel signa audierint, ut legitur apud authorem *ἐνδύσαντες αὐτοὺς*.

*Ἐνδυσις*, inter olera syluestria à Theophrasto ponitur. Athenæus & Plinius anthriscum hoc maluerunt appellare.

*Ἐνδράσει*, *ἐχέμενον νύκτα*, instans punit apud Hippoc.

*Ἐνέσιον*, annum. Ut annuus morbus. Id dicitur vel quod vno anno à prima sua origine soluitur, vel quod annorum numeris indicatur, quemadmodum & quædam septem annorum

annorum spatio finiuntur, sicut ab Hippocr. in aphorif. scribitur, pueris plerisque morbos desinere, alios quidem quadraginta diebus, alios septem mensibus, alios annis septem, alios vero cum ad pubertatem venerint. Auctor Galen. comment. in lib. de nat. hum.

**Enautis.** annus est temporis spatium quo Sol à puncto vno zodiaci digressus in idem reuertitur. Id trecentis sexaginta quinque diebus & sex horis, excepta fere centesima vnius diei parte, peragitur. Ac sex quidē horarū quarto quoque anno diem vnum efficientes eodem intercalantur. Nec dubium quin post annum quemque circiter ceterisimum, dies vnus eximi debuerit. Quod quia à temporibus vsque Iulii Cæsaris neglectum est, solstitia æquinoctiaque quindécim vel sedécim diebus celerius apud nos hodie contingunt, vt patet cum ex multis, tum maxime ex Columella lib. 1. cap. 2. Nec me mouet quo minus ita sentiam, Galeni auctoritas, scribentis lib. 3. *ἡ μέγιστος χρόνος*, annum nō trecentorum & sexaginta quinque dierum tantummodo esse, sed etiam quartę partis diei, & præterea fere centesimæ. Si quidem malō hāc in re cum astrōlogis sentire & scribere rationi consentanea, quam Galenū imitari, si modo hic locus integer est, & mēda vacat. Eo autē curriculo cum sol nunquam eodem in locō consistat, sed variē nobis illuceat propius ad nos accedēs, vel longius à nobis digrediens, etiam vario modo afficit atque immutat aërem. Cuius quidem mutationis cum sint quatuor magnæ siue generāles differentię (tot enim modis inter se cōiūnt quatuor qualitates) ideo totum annum in quatuor partes genere siue specie differentes, quas Græci *καιρὸς*, interdum simpliciter *ἄρῃς*, aliquando *ἄρῃς* & *ἔτος*, Latini anni tempora appellant, veteres diuiserūt, ver æstatem, autumnum & hyemē eas nominantes. Quorum etiam singulas differentias si in magis & minus sēcēs, particularia quædam tempora cōstitues, sed nominibus carentia, præter æstatis particularia tempora, cuius mediū *ἡ μέση καὶ ἡ μέση*, postremum *ἡ ὀψιμή* nominatur. A quibus inducti quidam annum in septem partes diuiserunt, æstatem secantes in duas, hyemem vero in tres, vt scripsit Gal. Ac primam quidem earum, ver appellabant, ab æquinoctio verno vsque ad Vergiliarum ortum, ipsamque indiuisum propter paruitatē relinquebant: secundam vero, æstatem, vsque ad Canis exortum: tertiam, *ἡ ὀψιμή*: quartam, *ἡ ὀψιμή*, hoc est autumnum: quintam *ἡ ὀψιμή*, id est sementum: sextam, hyemē, eo nomine tempus id proprie intelligentes quod sub solstitium est: extremam vero, *ἡ ὀψιμή*, quod inserendis arboribus opportuna sit. Qua quidem diuisione ver & autumnum integra sinebant, propter temporis quod continent breuitatem: æstatem vero in duas partes, hyemem autem in tres diuidebant.

Attamen Hippocrates annum quadrifariā tantum partitus est, pro ratione, vt dixi, temperamentorum. Nec tamen tam firma rataque semper est partium anni tēperies, quin persæpe propter aliorum haud ignobilium quidem syderum ortus, occasus & coniunctiones euariet. Sed hanc quidem qui seruauit, *ἡ ὀψιμή*, id est, constantem annum: qui vero nō seruauerit, *ἡ ὀψιμή*, hoc est inconstantem, Hippocrat. appellat. si enim, inquit, pro ratione facta fuerint signa quæ diximus in ortu & occasu syderum, & in autumnū si aquę descenderint, & hyems mediocritatem seruauerit, neque valde serena neque frigore excedens, & vere aquę conuenerint tempestiue & æstate, par est annū fore saluberrimum.

**Emplastum.** pelli nomen est qui ad vteri & sedis inflammationes cōuenit. habet autem adipis anserini & bubuli, cerę albę, terebinthinæ, butyri, medullę ceruinæ, mellis olei rosacei & cicini, pares portiones. Hæc omnia recentia simul liquefiunt & vniuntur. Est & emplastri genus, quod Aetius lib. 1. 5. dicit esse Hori Mendesii. Recipit autem adipis anserini, vitulini, butyri, medullæ ceruinæ, cerę, terebinthinæ, olei rosacei, cicini, mellis, singulorum æquas portiones, simul omnia liquefiunt & vniuntur. suppurat, laxat, & præcipue neruis per consensum affectis cōducit. ex eo etiam pessus fieri potest. Aliud eiusdem nominis emplastrum describitur à Celso ad pus mouendum & purgandum valens, nouem scilicet simplicibus medicamentis compositum, cera, melle, seuo, resina terebinthina, myrrha, rosa medulla vel ceruina, vel vitulina vel bubula, hyssopo, butyro, omnibus pari pondere inter se mistis.

**Emedagum.** herba nouem folia longa habens, causticæ naturæ. In lumborum doloribus & coxendicum imponitur vtilissime, lana circumdata ne vrat latus: continuo enim pustulas excitat.

**Empyrum.** impetum facientia. Sic dicti sunt spiritus ab Hippocrate, aptissima prorsus appellatione & rei naturam omnino exprimente. Est enim spiritus omnium quæ sunt in corpore leuissimum tenuissimumque, nō tam aerea quam æthera substantia præditus, ex qua non modo celerissime mouetur, sed etiam in omnia corpora subit & commeat. Triplex autem cum sit, naturalis, vitalis & animalis, omnes ab iis facultatum omnium actiones perficiuntur, & quo singuli sunt, vt ita dicam, habitiores, firmiores, largiores, tenuiores, calidiores, eo plures & vehementiores & celeriores, & crebriores impetus motusque cient in suo quique genere. Itaq; cum pro ætate, sexu, temperamento, partibus anni, ratione victus & reliquis circumstantiis magna sit spirituum differentia, inæquales quoque ab iis in corporibus motus excitari oportet. Sunt tamen omnes, vt & spiritus, genere triplices, quorū scilicet sunt &

sunt & facultates ad quas motus omnes referuntur. Naturalis spiritus à iecinore prodiens, atque à solido eius corpore suam vim roburque sortitus, nativoque calore comitatus, instrumentum est cuius opera functiones omnes naturales perficiuntur cum magna etiam vehementia, toto corpore trahendo, distribuendo, excremandoque quicquid corpori officit. Vitalis autem quantos motus cieat, præter gloriæ, honorum, vindictæ & aliorum eiusmodi magnam cupiditatem aliosque animi affectus, ostendunt etiam cordis & arteriarum pulsus magni, vehementes, celeres, crebri, ab ipso quidem corpore cordis, seu facultate ipsi insita profecti, sed spirituum ministerio absolvi & continuati. Cerebrum autem per spiritus animales impetus edit omnium vehementissimos in omni sensuum genere, sed maxime quidem dum partem aliquam pro voluntate mouet, multoque adhuc magis cum tam repente dormientibus, timentibus, animo deficientibus, in cerebrum tam cito recurrit, aut à cerebro in membra omnia, dicto citius euolat expergefactus, metu solutus, reuocatus, & per neruorum spiracula sensum fugientia penetrans atque permeans. Verum, sicut initio proposuimus, tanti impetus non à sola spirituum copia, sed à caloris etiam robore, eorundem tenuitate & subiecti ipsius corporis raritate plurimum adiuuantur. Siquidem pueris, adolescentibus & ætate florentibus, quia omnes eiusmodi causæ concurrunt, magno quoque impetu spiritus in iis aguntur, ætate declinantibus minore, quod ex causæ multo sint in iis remissiores, minimo vero senibus præsertim decrepitis. vide *πνῦμα*.

*Χυλόν*. caro ginginarum interna, ut scribit Polux. quæ enim externa est, *οὐλον* proprie dicitur: quæ vero inter dentes ipsos media est, *κέρως*.

*Ἐρυθμὸς πρῶτος*. pulsus erythmus. Est octaua pulsus differentia à Galenō explicata. Sic autem pulsus omnis dici potest: omnis enim pulsus rhythmum omnino aliquem habet. Sed qui naturalem & optimum seruat, *ἰσορυθμὸς* dicitur, unusque est & indiuisus: qui vero non seruat, *ἀρυθμὸς*, in tres diuisus differentias. Itaque *ἰσορυθμὸς* genus est commune *ἢ ἰσορhythμὸς καὶ ἢ ἀρhythμὸς*.

*Ἐνάλειον*. collyrii genus, sic dictum quod oculis instillaretur liquidum. Eius multæ sunt apud Aetium differentia. Habetur & collyrium apud Galen. *ἐνάλειον* appellatum libr. 4. *πῶν 13. πῆνις*. Paulus Aegineta *αὐχλινὸν* appellat.

*Ἐμπλάστιον*. emplastri nomen, quasi dicas intensorium. Constat magna ex parte iis quæ penè possunt intèdere. Descriptio habetur apud Paulum libr. 7. cap. 17.

*Ἰντερ*. intestina. Sunt corpora membranosa, caua, rotunda, ab imo ventriculo ad anum usque protensa, distribuendi in iecur chyli & continendi expellendique stercoris in-

strumenta. Eorum substantia non multum à ventriculo diuersa est. Sunt autem illis duplices tunicæ propriæ, partim vt expultrice vi maiore pollerent, partim vero naturæ quadam providentia, vt si interior aliquo morbo putrescat vel exulceretur, exterior salua sit, ne chylus effluat. Est autem interna carnosior, externa vero membranofior. Vtrique fibras fere tantum circulares siue transversas habet ad chyli & stercoris expulsionem, alicubi tamen & rectas, ad earum firmitatem, quod periculum esset transversas à se inimicè diuelli, nisi à rectis veluti ab aliquo ligamento extrinsecus continerentur. Ac tunicis quidem his intestina ventriculo differunt, quod huius interior tunica, contra quam intestinorum membranofior est, rectisque fibris intertexta. Præter eas vero duas proprias etiam tunicam habent tertiam à peritonæo duabus illis circumdatam. Sunt autem intestinorum duæ summæ differentia. alia enim tenuia sunt, eaque superiora, *ἐκφυσις, νήστις, εἰλεὺν ἢ λεπτὴ*: hoc est, ecphysis, ieiunum, ileon seu tenue. alia vero crassa & inferiora totidem, *πυλὸν, κώλον, ἀπενδυσιμὸν*: cæcum: colon & rectum. Illa quidem chyli à ventriculo cocti in hepar distribuendi instrumenta: hæc vero stercore colligendo magis destinata, quanquam ex his quoque chylus aliquis in iecur perferatur. In id autem vena porta sobole numerosissima in partem eorum sumā (nam cum permulti in iis sint gyri atque anfractus, necessario pars eorum altera gibba, altera caua existit) inseritur, chylum vndique exuens. Verum is succus potissimum in tenuibus intestinis perficitur: iam enim ex chylo stercus fieri formarique incipit, ubi ad cæcum intestinum peruenit: quod quia terrestrius acriusque cunctando morandoque efficitur, ideo inferiora intestina, quibus continetur, carnosiora minusque sensibilia natura perfecit & magis sinuosa atque anfractuosa, ne nimium frequenter & cumulatim fierent excretiones. Cæterum præter venas etiam arteriæ quamplurimæ ad intestina perueniunt à maioris truncō, qui lumbis insidet, profectæ, & nerui insuper à ramo sextæ coniugationis, qui ab ea per costarum radices ad partes ventris inferni dimittitur. Sunt autem omnia intestina sex numero, hoc ordine sese conlequentia, sumpta à superis partibus initio: *ἐκφυσις*, quæ & *διωδεδυσιμὸν* dicitur, *νήστις*, *λεπτὴ*, quod & *εἰλεὺν* vocant: *πυλὸν, κώλον, ἀπενδυσιμὸν*, hoc est, duodenum, ieiunum, tenue, cæcum, colam, rectum: de quibus vide suis locis. Hic omittendum non est quod annotat Gal. comment. 4. in libr. 6. *ἢ διωδεδυσιμὸν*, cum *πῆνις* singulari numero dicitur apud Hippocratem, alios *πῆνις* interpretari, alios vero cæcum: illud quidem *πῆνις* *ἐκφυσις*, propter magnitudinem, hoc vero quod solum ex intestinis in scrotum descendit & *ἀπενδυσιμὸν* compositum.

**Ἐντερίδιον.** pars interna cuiusque rei, siue medulla sit, siue nucleus, siue ossiculum. alio nomine *ἐγκάρδιον* appellatur.

**Ἐντεροειπτοκώλη.** est tumor scroti, intestino & omento in ipsum simul deuolutis. Tumor est compositus, ut scribit Gal. libr. de tumor. præter nat.

**Ἐντεροκόλη.** est tumor scroti, delapso in id intestino. Accidit magna ex parte laxato, nonnunquam vero & abrupto eo meatu qui à peritonæo ad testiculos pergit. Sic enim ad ipsum meatum aut ad tunicam quæ ἐντεροειδής dicitur, intestinum delabitur. Id autem fere cæcum est: Græci *πύλος* vocant: facile enim, cum omni vinculo solutum sit, descendit in scrotum, quoniam solum hoc intestinum solutum sit, cum reliqua omnia lactibus alligentur, ut scribit Gal. comment. 4. in lib. 6. *Ἐντερομήμων.*

**Ἐντεροφάλοι.** quibus intestina ad umbilicum procedunt, ipsumque extuberare faciunt. Species una est τὸν ἐξομφάλιον, ut habetur ἐν τῇ ἰη' β'.

**Ἐντεροχόμα.** sic à quibusdam dicuntur οἱ παροί, hoc est, extremi palpebrarum ambitus, unde excrescunt cilia.

**Ἐντοπίσις.** humeri acetabulum. Articulus humeri cum brachio, sicut habetur apud Iulium Pollucem, qui alio nomine *ὠμοσπύλιον* scribit vocari.

**Ἐξάριον.** ponderis nomen est quo utitur Actuarius in aurea antidoto Alexandri. Pendet autem quatuor scripula: Latini sextulam appellant.

**Ἐξάλιπτος.** *καυστός, χρίσις.* illitor, victor, apud Hippocratem.

**Ἐξάλιστος.** *ἐκκενός,* euacuaretur, apud Hippocratem.

**Ἐξάρθημα.** papula. Sunt eruptiones leues humorum per cutem: sed illæ diuersorum omnino generum sunt. Nam & *φλυκταίναις* & *ψώρα* & *ὀπτηκίδιας* & *λεῖχνας* & alia multa tumorum genera comprehendunt. Earum autem quedam in altum attolluntur & extuberant, à calidiore videlicet humore genitæ: quedam depressæ sunt & latæ, nec cutem fere excedunt. Præterea aliæ toto prope corpore efflorescunt, ut quæ per malignas & pestilentēs febres oriuntur, & quæ per Gallicum morbum erumpunt, & variolæ vulgo dictæ & morbili: aliæ in parte tantum aliqua consistunt, ut capite, facie, quas omnium malignissimas Herodotus medicus dixit, circa labia & nasum, quales sunt in febrium declinationibus. Sunt & earum ex colore differentiæ plures. Quoniam enim omnis humor in cutem potest erumpere, iccirco & rubræ & pallidæ & flauæ, nonnunquam vero & nigrae, & liuidæ apparent. Pro materia vero unde nascuntur varias habent appellationes. Alias enim feruentes papulas, alias nigras medici nuncupant: ipseque Plinius eas quæ à pituitoso humore fiunt, pituitæ eruptiones vocat. Præterea & papularum quedam sine dolore, sine pruritu, sine

ulcere sunt: aliæ pruritus inducunt tantum, ut scilicet continuo labore vigilæ succedant. Aliæ vero exulcerantur, & aliquando ad quandam carbunculorum speciem accedunt, quas *ἀχρίας*, hoc est feras, Celsus scribit à Græcis appellari: in iis enim cutis plurimum exasperatur, ulceraturque ac vehementius & roditur & rubet: interdum etiam pilos remittit: quod papularum genus pluriusque *λεῖχνας*, hoc est impetiginem, interpretantur.

**Ἐξάρσις.** *ὄρησις,* sanus, apud Hippoc.

**Ἐξάρθρμα.** *συνεπρημα.* contractio, collisio, apud Hippocratem, ut Galenus exponit.

**Ἐξάρθρυν.** vide *ὀλοσθαι*.

**Ἐξάρθρημα.** luxatio. Est positio articuli deprauata & præter naturam. Ea fieri potest sursum, deorsum, intro, foras, ante, retro. Sex enim istis differentiis in articulo ossa à sua sede transponi possunt. Est autem luxatio morbus ossis, non quia os pars similis est, sed quod partis organicæ portio sit. Sic enim & in multis aliis partium organicarum morbi partibus similaribus per accidens tribuuntur, & contra similiarium morbi organicis. Sunt autem qui per *ἐξάρθρημα*, non omnem luxationem intelligant, sed eam tantum in qua totus articulus à sua sede omnino recessit. Nam paruam luxationem *ὑπάρθρημα* vocari contendunt. vide *ὀλοσθαι*.

**Ἐξάρθρις.** Hippocrates appellauit eos quibus articuli naturaliter exant & prominent, ut annotat Galen. comment. 1. *ἐν τῷ ὑπάρθρυν.*

**Ἐξάρθρμα** siue *ἐξάρθρυν*, dicitur ab Hippocrate cum os citra fracturæ suo loco mouetur, quod malum etiam alio nomine *ἐκπύμα* atque *ἐκπύσις* appellatur.

**Ἐξάρθρηται.** *ἐκκενούνται, ἐκλύεσθαι.* euacuatur, exprimitur, apud Hippocratem. Quidam vero interpretantur *ἐξάρθρυν καὶ ἀπυλὴν πνέσται*, hoc est, aggregatur & minatur.

**Ἐξάρθρυν.** *ἐκπύρηνσις.* exhaustio, apud Hippocratem.

**Ἐξάρσις ἢ Ἐξάρσις,** quidam apud Hippocratem interpretantur lina eminentia in oris linteorum scissorum, & à vilibus pannis fila. Galeno autem etiam anrequam scindatur, extantia eodem modo videtur Hippocrates appellare. Idem Galenus annotat ἐν τῇ κατ' ἰνδύν, in iis fieri *ἐξάρσις* quæ texuntur interdum de industria, interdum autem contra voluntatem nostram. Sed obseruandum vulgatas editiones & Hippocr. & Galeni habere ibi *ἐξέρσις*.

**Ἐξέρυθρον.** valde rubens, apud Hippocratem in Prothier. ut Galenus interpretatur. Annotauit autem Erotianus à quibusdam *ἐξέρυθρον* intelligi τὸ ἐξερυθρόμενον ἐρύθημα, hoc est, ruborem exterius factum: inque ea sententia fuisse Philonidem Siculum.

**Ἐξέρυθροι.** gutturosi, apud Hippocratem libr. de artic. id est, qui guttura habent in anteriore partem protuberantia. *βρυχον* enim ipse appellat





qui præter naturam est materiam crassam esse & melancholicam. Sunt autem huiusmodi remores Gallico morbo laborantibus frequentes.

**Ἰζουρα.** *eis sēon autōn mēta.* in angustum contracta; apud Hippocrat. quæ & *μύουρα* dicuntur.

**Ἰζοχάς.** est in ano genitum tuberculum quod callum nondum contraxit. si namque iam contraxit, *κονδύλιμα* vocatur. Dicitur & *ἰζοχά.*

**Ἰζυδάτωσις.** idem quod *ἰζυπότρυχα* & *αἱματώσις*, id est, frustrata sanguificatio: sanguinis enim loco humor aquosius reponitur, unde propterea aqua inter cutem emergit.

**Ἰπαριωδής.** laquei species apud Oribasium, quo sinus super sinum iniicitur, faciens ad corpora figuranda.

**Ἰπαρόγια.** dicuntur membrorum genitalium præputia, sed male tantum affecta: videlicet curta & quæ facile reduci non possunt, siue à natura, siue ex circumcissione. sic enim vsurpat Dioscor. cap. *περὶ ἰπάρων* & *περὶ ἀλόν.* Quæ autem naturaliter se habent, *πύδα* vocantur. Dicta sunt autem *ἰπαρόγια* quod ducantur & reducantur.

**Ἰπαμαστικός πυρετός.** species vna est febrium quas *αἰνώχους* appellant, quæ cum vnam quidem à principio ad finem vsque accessionem habeat, non tamen eodem tenore perseuerat, sed assurgit atque inualefcit. Dicitur & *ἀλκαπικός* alio nomine.

**Ἰπακρα.** *πρὸς εἰς σπὸν πλείωνων.* in angustum definentia apud Hippocratem, quæ etiam *ἰζουρα* ab eodem dicuntur.

**Ἰπαλιώων ὀππαίων.** inspergens: apud Hippocratem: additur autem ad denotandam vehementiam.

**Ἰπαριδιδούς πυρετός.** increscens, resurgens febris. Est differentia febris apud Hippocrat. libro 6. *πρὸς ὀππαίων*, sumpta à caloris motu, cui ipse *ἰζωά*, id est acutam, opposuit. sic dicitur cuius calor initio minus mordax, postea assurgit, manum quæ ad motam mordet. Huius generis sunt pituitosæ febres. Nam quum primum medicus manum thoraci admouerit, illæ nec mordent, nec tantum calore suo feriunt, quod materia frigida humida igni cōtraria, non facile accenditur. Manu autem diutius immorante & calorem paulatim fouente atque excitante, calor accensæ iam materię mordax effluuiio fumi excrementi manum mordet. Nec tamen ista febrium differentia à motu caloris ita sumitur, quin & febris essentia, id est, calori intensiori, & materię in qua calor accenditur, aliquid suæ generationis debeat.

**Ἰπαριδιδούς,** siue

**Ἰπαριδής.** idem quod *αἰαδιδής* in febribus, Galeno auctore eomm. 2. in lib. 6. *Ἰπαριδής* vide *αἰαδιδής*.

**Ἰπυροφουδής** significat apud medicos, quæcumque aliquo modo excedunt, in statum naturalem restituere, vt hiæcia coniungere, quæ

abscesserunt propellere, peruersa dirigere. dicitur & *διφιδής*.

**Ἰπάρματα.** vocantur ab Hippocr. tumores præter naturam qui secundum aures ægrotantibus exoriuntur. Ea etiam *οἰδύματα* communi significatione appellat. Recentiore proprio nomine *παρῶδες* nuncupantur.

**Ἰταυξὺς νόσος.** increscens morbus. Dicitur apud Hippocrat. qui procedente tempore augeatur, semperque, nisi prius soluasur, labitur in peius: vt podagra, arthritis, nephritis, epilepsia, melancholia: increscunt enim vna cum ætate. Sabinus vero *ἰταυξὺς νόσος* interpretatus est morbos pueriles, qui vna cum ipsis pueris crescunt donec ad venerem apti sint, vt scribit Galenus comment. 5. in lib. 6. *Ἰταυξὺς*.

**Ἰταφαίσις.** repetita sanguinis missio, apud Galenum.

**Ἰταφάση πρὸς δακτύλου,** cōtigeris digito: *αὐτὴ ἰταφάση* apud Hippocr. dicitur autem *ἰταφάση*, vt annotat Erotianus.

**Ἰταφρα.** *πρὸς δακτύλου καὶ ὅς ἀρρῶδη*, apud Hippocratem.

**Ἰπυροφουδής πρὸς ὀππαίων.** hoc est, impediuntur menstrua. *ὅτι ἰπυροφουδής*, apud Hippocr. *ἰπυροφουδής* enim apud Atticos idem quod *ἰσχυά*, vt annotat Erotianus.

**Ἰπυρόριον.** abdomen. Est pars humani corporis, inquit Celsus, quæ à coxis & pube sursum versus ad præcordia peruenit, ab exteriori parte, euidenti cute: ab interiori, leui membrana inclusa quæ omento iungitur. *περὶ τῆς κοιλίας* autem à Græcis nominatur. Sic quidem ille libro 4. cap. 1. quid abdomen sit, diffiniuit. Alii verò multo aliter *ἰπυρόριον* interpretantur, sic appellantes eam tantum partem quæ supra vmbilicum est, quæ quæ icciloni & lieni incumbit, decepti vel nominis etymologia (*γαστήρ* namque ventriculum significat) quasi sic dicatur id quod ventriculo insidet, vel male intellecto Galeno comment. in aphor. 35. libr. 2. Nam cum Galenus initio eius commētarii statuisset *ἰπυρόριον* commune nomen omnium partium quæ in imo ventre continentur, cōclusit circa finem *οἰς τῆς κοιλίας ὁ ἰπυρόριον*, *ἰπυρόριον* πρὸς τῆς κοιλίας, καὶ τῆς κοιλίας. hoc est, in tres partes omnem eam regionem (epigastrium intelligens) diuidi, in hypochondrium, in partes vmbilico circumpositas, & in ventrem infimum. Est enim hypochondrium pars superior epigastrii. Itaque relicta ea interpretatione nostra sequamur, quæ dicitur *ἰπυρόριον* tota ea caro quæ ab imis costis ad pubem vsq; protenditur, quasi *ὅτι τῇ γαστρὶ κατέκειτο*, propterea quod ventri incubat. Constat ea octo musculis, quorum quatuor obliqui sunt, duo recti & duo transversissimi. Sunt autem obliqui omnium primi discissa cute statim obuii, quorum duo priores è costis profecti in pubis ossa oblique inferuntur, reliqui vero contrario fibrarum siti ab illius osse exorti in extremas nothas costas feruntur. Hi autem quatuor muscoli



sit cuiusque septimanæ dies quartus, diligenter considerandum est, quem eade causa *καρπν* Hippocr. appellauit: designat enim qualis futurus sit proximus ab eo septimus. Si namque quarto die cuiusque septimanæ signa mortifera appareant, cerra perniciēs septimo expectanda: contra si illo die salutifera signa se prodant, salus die septimo promittitur. Quod cum in omnibus morbis verum sit, in acutis tamen omnium manifestissime deprehenditur, in quibus mutationes maiores magisque subitæ contingunt. Adeo verum est quod scripsit Hippocrates, septenorum semper quartum diem esse indicem. Quod si fuerit aliter aliquando obseruatum, sciendum id non ex ipsius diei natura, sed alia de causa contigisse. Ex sua namque natura, hoc est, si nihil rarum magnumque vel extrinsecus, vel ex ipsa morbi specie moreque, vel etiam agrotantis habitui acci-

derit, quartus omnino septimum qualis futurus sit, declarat, sicut Gal. de diebus criticis lib. 1. cap. 11. apertissime demonstrauit.

*Επιδήμιος* hoc est morbus communis & à cōmuni causa natus, non tamen patrius & familiaris, sed potius externus & aduentitijs. in hoc enim differt *ἀπὸ τοῦ ἐνδημίου*. Nam vterque cum *πᾶσι δῖμῖς*, hoc est, communis, sit, hic tamen familiaris est alicui regioni & quodammodo vernaculus: ille vero non affuetus, sed à cōmuni causa & insolita natus habet aurem duas differentias: quod alijs *καρμῶδες* est siue pestilens, alius vero mitior, quem generis videlicet nomine *ἐνδημιον* ἢ *ἐπιδήμιον* vocari scribit Gal. comment. 1. *εἰς τὸ καθ' ἑκάστην ἐξέστω*, aphor. 9. Sed satius fuerit omnes eas morborum differentias in tabula sub oculis ponere, quemadmodum Galenus distinxit.

*Σπρεξῆδες*, hoc est, dispersi, qui singulos separatim corripiunt. Sunt plures simul morbi vagantes & genere diuersi, quorum alius alium inuadit. Non ab aere, sed à ratione victus nascuntur, quam singuli habent propriam & peculiarem.

Morborum alii

*Ενδημιος* ἢ *ἐνδημιος*. hoc est, patrii, vernaculi & alicui regioni familiares. Hi in aliqua regione frequentes sunt & perpetui, & omnes ex equo corripiunt, ob causam quæ omnium communis est. De his agitur ab Hippocrate lib. de aere, locis & aquis.

*Κοινὸς* ἢ *πᾶσι κοινός*. hoc est, cōmunes. Sunt certi morbi & singulares qui alicubi vagantur, & multos æque simul corripiunt. Vt autem omnibus sunt cōmunes, sic & causam habent communem,

ut aerem quem omnes pariter inspiramus, vel aquæ malæ porum, vel cibū etiam aliquādo à cœli intemperie aut alia de causa vitiatū, aut grauem terramque exhalationē, vel simile quid quod virari nullo modo potest.

*Επιδήμιος* ἢ *ἐπιδήμιος*. communes quidem morbi, & à cōmuni causa nati, non tamen patrii & familiares, sed potius externi & aduentitii.

*Λοιμώδης*. pestilentes. Hi sunt contagiosi & omnium perniciosissimi.

*Μῆλοιδες*. non pestilentes, sed pestilentibus mitiores. Carent proprio nomine, quam Galenus quasi oblitus eorum quæ in proœmio lib. 1. epid. scripserat, asserit alibi eos qui pestiferi non sunt vocari *ἐπιδήμιους*, mutato scilicet generis nomine, ut plerisque alijs accidit rerum differentijs.

*Επιδήμιος*. est propria & intima testium tunica & illis omni ex parte contigua, dura, crassa & admodum valida. Eius supernæ parti venæ arque arteriæ, sanguinem spiritumque testi deferentia inferuntur, & multi ab iis ramuli intra testis corpus peruadunt. Huic alia tunica superposita est, *ἐπιθήκη* dicta, non eam modo, verum totum etiam testem comprehendens. Dicitur *ἐπιδήμιος*, quod testiculis quos *διδύμους* vocant, superinducta sit. Male quidam eo nomine testiculi quoddam caput & veluti efflorescentiam signifi-

cari putant, nominibus manifesto abutentes (id enim *καρχαλμὸς* vocatur) & ob id in errorem lapsi, quod existiment *τὴν ἐπιδήμιον* eadem ratione dici, quæ *τὸν ἐπιδήμιον* καὶ *τὸν ἐπιδήμιον*.

*Επιδήμιος*. incrementum. vide *αὐξήσις*. *Επένεος*. apud Hippocratem significat verisimile & probabile, ut annotat Gal. comment. 3.

*Επένεος*. significat apud Hippocr. modice, hoc est, neque perfecte siue omnino vehementer, neque ex toto, sed mediocriter, ut annotat Galen.



**Galen. comment.** 3. *εἰς τὸ ῥέει ἀφ' ὧν*. Idem præterea author est comment. in prorrheticum *ἑνὲν* in symptomatis viciari quæ nec multum spei, nec multum etiam timoris habent.

**Ἐπιθεμα.** est medicamentum quod in malagmaticis formam compositum mediis corporis partibus aptatur ad varios vsus. *Ἐπιθεμα* καὶ *βαρπικα* pluraque describuntur ab Actio libro 3.

**Ἐπιθυμῶν.** vocatur à Paulo id quod supra thymbram siue sanureiam provenit, quod citiorum modo comas & ramos crebro volumine complicat, sæpenumero purpurascens. Atram bilem perinde atque τὸ *ἑνὲν* purgare dicitur.

**Ἐπιθυμῶς.** à quibusdam dicitur *ἐθύμω*, ut habetur apud Dioscoridem.

**Ἐπιθυμητικὴ δύναμις.** concupiscibilis, appetitrix facultas, quæ & *φυσικὴ* & *θεσπικὴ* appellatur. Est pars animæ irrationalis, cibum, potionem, & omnis generis voluptates appetens. Eius principium iecur est secundum Hippocratem & Platonem, non cor ut Aristoteles existimavit, in quo irascibilis potentia sedes est, à concupiscibili tam diuersa, ut eam nunquam adiunget, sed una cum ratione repugnantem sæpe habeat. Vbi namque pars ea animæ concupiscit, ratio primum de concupiscentia iudicat, quæ si appetitum sequatur, sponte una cum ratione accedit etiam irascibilis: si autem concupiscentia aduersetur, continuo etiam infurgit in eam irascibilis, sociâ rationis & adiutrix.

**Ἐπιθυμῶν.** flos est è thymo duriore sanureia simili. Capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas quasi capillamenta. Thymi habet facultatem, ad omnia efficacius, exsiccatur & calfacit ordine tertio.

**Ἐπιφανίδες.** oculorum ambo anguli, qui & *ἐγχανίδες* & *καρφοί* vocantur. vide *ἐγχανίς*.

**Ἐπίκροτος.** maior & grandior apud Hippocratem, & qui vim in re quacunque magnam habet: quemadmodum nervi qui non longe distant à spinâ medulla & maxime pleni sunt, dicuntur ab eo *ἑνὲν*, sicut annotat Gal. comment. 1. *εἰς τὸ ῥέει ἀφ' ὧν*, & comment. 2. *εἰς τὸ ῥέει ἀφ' ὧν*.

**Ἐπιπνεύου.** ex uno vase in aliud transferre dicitur & *κατεπνεύου*. Nam τὸ *ἐπνεύου* significat euacuare.

**Ἐπίκρουμα.** dicitur à Gal. *ἐν τῇ εἰσαγωγῇ*, exulceratio tuniculæ in superficie inusta, vel etiam profundius: quod vlcus genus Scribonius Largus vstione appellat, alii etiam inustionem. Sed aduertendum est duo vlcus generâ hoc uno nomine apud Paulum & Aetium designari. Scribit enim Paulus *ἑνὲν* vlcus esse oculi fordidum, impurum, crustosum, quod dum repurgatur, sæpe humores oculi effluunt. Id vero ab Actio non *ἑνὲν*, sed *ἐγχανμα* appellatur. Vocat enim *ἑνὲν* vlcus superficiarium, cum videlicet nigrum oculi in superficie exasperatum in-

ustum fuerit, & coloris cinerei euaserit; cuius vlcus non meminit Paulus.

**Ἐπιπνεύου.** scenumgræcum apud Hippocr. Dicitur & *ἀρθρῶν* siue *ἀρθρῶν*.

**Ἐπιπνεύου.** vocari potest, quicquid paulatim bonum succum sufficit in locum mali vitiosique succi paulatim vacuati. In hac enim significatione Galen. *ἑνὲν* vsurpat. Proprie vero dicitur medicamentum temperans & obrundens malignitatem vel morsum humorum in aliqua parte contentorum, veluti una passa mordentes mediocriter stomachum humores obrudit apud Galen. lib. 2. de alimentis. Idem medicamentorum genus etiam *καταπνεύου* appellatur. Vide *ἑνὲν*.

**Ἐπιπνεύου.** cilium ut interpretatur Gaza, quo nomine veteres extremum ambitum genæ superioris designarunt.

**Ἐπιπνεύου δύναμις.** facultas coercendæ ac retinendæ alui, ut apud Gal. lib. 11. simpl. medic. ubi de iure gallinarum, & gallorum loquitur: *ὅτι μὲν τὸ ἀλκίμελιδον ἀπλὸς ζῶνς ἑνὲν κρατικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὡς τὸ ὅτι παλαιὸν ἀλκίμελιδον ἑνὲν κρατικῆς.* hoc est, gallinarum autem simplex ius facultatem habet retinendæ alui, sicut veterum gallorum sistendi. Quam sententiam ita Paulus refert. lib. 7. Ut manifeste appareat, legendum esse apud Gal. *ἑνὲν κρατικῆς*, non autem *ἑνὲν κρατικῆς*.

**Ἐπιπνεύου.** est ratio curandæ cacochymia, seu potius, ut ait Gal. cacochymia curatio, per quâ, ut scribit lib. 9. meth. paulatim vacuatur quod vitiosum est, inq. locum eius paulatim quod bonum est reponitur. Est enim in vniuersum duplex omnis curationis ratio. Aut enim in totum summouetur vitium, si & vires valent & humor concoctus se facile educi patitur: aut si vires imbecillæ sunt, ut conferim factam vacuationem admittere nequeant, vel humor propter cruditatem non sit futurus obediens medicamento, tunc ubi eum attemperaueris, tenuaueris, mitificaueris, paulatim educere oportebit, inque locum eius benigniores sufficere. Quamquam non est necesse *ἑνὲν* vacuatione perfici. Nam quæ etiam in corpore manent, alterari mitigariq. possunt, permissa vel naturæ vacuatione, quæ eorum partem vel conuertat in corporis alimentum, vel per alium, vrinam, sudorem aut aliter expurget. Hæc quidē curandi ratio proprie *ἐνὲν* appellatur. Atque in eo sensu accipiendum est quod scribit Galenus de vinis fuluis lib. 12. meth. *ἑνὲν* siue *ἐνὲν* καὶ *θεσπικῶν*. Id enim postea interpretatur, dicens, *πρὸς τοῦτο ὅτι μὲν, ἐκ κακοχυμίας ἐπὶ τοῦ σώματος.* hoc est, magis autem nutriunt, & humoris vitium emendant. Quod non videtur Linacer animaduertisse, de mixtione non de hac quam tractamus *ἑνὲν* interpretatus.

**Ἐπιπνεύου.** *ἐπίστον*. pars muliebris quæ pubes dicitur, apud Hippocratem. In lanificio autem significat puluerem pectini insidentem.

**E'minua**. est foetus alter grāvida iam muliere conceptus. Id quod sit, vt scripsit Hippocrates, cum foetuiam concepto non clauditur exacte vterus, sed semen aliud etiam postea intro admittit.

**E'mphases**. habetur hoc nomen apud Hippocratem lib. 6. *Ἐμφασιν*. Id nonnulli interpretantur mutationem temperamenti ad calidius & siccius: hoc enim ætatis progressu velut flamma effulget. Alii vero interpretatur corporum perfectionem, quod iuvenes per ætatem euadant carnosiores, magis adulti, colore formaque gratiores, & viribus ingenioque præstantiores, vt quodammodo fulgere videantur. Verum eo loco alii non *ἐμφάσεις*, sed *ἐπιήψεις* scribunt, aut *ἐπιήψεις αἰν' ἢ ἐμφάσεων* interpretantur, vt annotat Gal. comment. 1. in eum librum.

**E'mphix**. comitialis morbus. Est conuulsio totius corporis non perpetua, cum mentis & sensuum oblatione. Eam molestæ rei sensus inuehit, & cerebro noxiæ tum quantitate tum qualitate. Quantitas quidem cerebro grauis est, eiusque vim expultricem excitat, consistitque in humore vel pituitoso vel melancholico, sed fere semper frigido, crasso & viscoso. Quem tamen non adeo multum esse oportet vt penitus obstruat, vimque ipsius cerebri exuperet, alioquin non epilepsiam sed apoplexiam potius pareret, sed quantitate mediocrem, vt ad eius depulsionem, quam natura totius corporis concussu molitur, cerebro vires adhuc suppetant. Qualitas vero maligna & venenata, & virtuti animali infesta est, siue à veneno sumpto, siue ab vlcere cacœthe cerebri vel subiectarum partium, siue ab alia affectione, vt ventriculi cruditate & largo meri potu proficiatur. Itaque vbi eorum aliquid in cerebro præter naturam fuerit, ipsum mouendi sentiendique principium in sese recurrit & contrahitur, atque ita totius corporis conuulsionem inducit. quinetiam eam à se amoliri contendit, crebra & inæquali cerebri totiusque corporis concussionem. Apparent enim manifeste in eo morbo hæc duo symptomata, conuulsio concussioque tanta, vt spumam etiam eliciat. Valido in motu humor qui in cerebro continetur exagitatus, non aliter quam oui candidum, spumam creat. Sunt autem (quanquam loci affecti nullum signum appareat) cerebri ventriculi, anterior maxime & posterior, huius mali sedes, in quibus spiritus gignitur atque continetur, primum animæ instrumentum, tum in sensibus actionibus omnibus, tum in iis quæ à consilio & voluntate prodeunt. Spiritus igitur cum laboraret & veluti arronitus in depellenda morbi causa versetur, alias interim functiones deserat necesse est. Quare non imaginari, non ratiocinari, non meminisse potest. Et quia se fere totum in suos ventriculos tamquam in arcem recipit (quod & spiritui vitali calori

que accidit, si quid cordi molestum est. tunc enim in cordis ventres spiritus calorque vitalis se recipiunt, reliquis partibus calore destitutis & frigentibus) ideo ægri neque vident neque audiunt, neque aliter omnino sentire possunt, sed facultate pristina destituti musculi urinam, stercus, & semen quasi resoluti profundunt. Horum enim symptomatum ego potius eam causam esse existimo, quam cerebri ventriculorum obstructionem. Nam præterquam quod non est, tanta ventriculorum obstructio (qualis in apoplexia esse perhibetur) vt cursum prorsus intercipiat spiritus animalis, certum etiam est eam non esse communem omnis epilepsiz. Tres enim cum sint, auctore Galeno, comitialis morbi differetiz, vna omnium frequentissima cerebri propria est; hoc est, ab humore in ipso cerebro genito aut cumulato: altera ab ore ventriculi, affectu scilicet ab eo ad cerebrum per consensum ascendente: tertia vero à quavis alia parte, à qua affectus ipse incipiens, sentiente ægro ad cerebrum usque conscendit. Ac primam quidem Galenus docuit à crasso viscosoque humore fieri ventriculos obstruente atque impediante ne spiritus animalis, qui in iis continetur, inde exire possit. Quod quidem vt in ea specie verum sit, in reliquis tamen duabus verum esse nequit. Quandoquidem neque ab ore ventriculi, neque ab aliis partibus, vt vtero, & (quod se in duobus vidisse Galenus scripsit) crure, talis humor sursum ferri potest (hic enim præter naturam motus esset) sed vel vapor, vel tenuis & spiritalis quædam substantia, vaporis in modum sursum ascendens, vel nuda quædam qualitas, alteratis per continuationem partibus cerebrum petens, quemadmodum Pelopem præceptorem suum differentem Galenus se audiuisse prodidit, epilepticæ conuulsionis, reliquorumque symptomatum causa est. Ea igitur cum obstruere ventriculos non possit, conuulsionem tamen & concussionem vehementem totius corporis nihilominus inducat, patet ea symptomata ab obstructione non fieri, sed à rei tristis & infesta sensu, facultate animali in suum principium se recipiente, quodque noceræ se depellere tentante. Eorum autem quæ nocerent, sicut initio proposuimus, duplex est differentia. Aliud enim copia, aliud qualitate nocuum est. Sed copiam quidem in epilepsia non oportet esse tantam, vt prorsus obstruat, & vim cerebri expultricem exuperet, sed mediocrem, vt in eam natura valeat insurgere. Virtus enim propter copiam nimium oppressa, & veluti coarctata, non habet spatium quo se moueat, insurgatque ad excutiendum humorem totius cerebri ventriculis infarctum. Ob id namque in apoplexia conuulsio illa corporis exagitatioque fieri nequit, futura alioqui, si minus esset humoris. Est enim hoc præcipuum inter apoplexiæ epilepsiamque discrimen, quod & inter paralytum tremoremque esse animaduertitur. In hoc enim tremor epilepsiz

epilepsie quodammodo similis est, sicut paralytis apoplexiz. Ergo ut tremoris causa non est obstructio, sed superfluum tantum humor naturæ gravis, & granitate duntaxat non etiam obstructione, sicut in paralyti, motum conatusque naturæ impediens, ita in epilepsia indicare licet, humorem qui copia sua cerebro nocet, non ea ratione epilepsia aliaque eius symptomata excitare, quod obstruat, sed tantum quod gravis & molestus cerebro existat. eoque fieri ut inde concitata facultas animalis in suum principium se recipiat, quo tota in eius depulsionem postea incumbat. Non est igitur omnis epilepsie causa obstructio, sed quemadmodum singultum, inquit Galenus, generari aliquando cernimus, sic etiam epilepsiam quandoque fieri putandum est. Si Galenus piper plus æquo edisset, ilico singultu se correptum fuisse memoriæ prodidit. Proinde existimauit similem quendam in cerebro motum fieri posse, qualis aliquando stomacho singultiente accidit, atque acrem quoque humorem non modo singultum, verum etiam conuulsionem per vniuersum corpus excitare, ipsumque neruorum principium, quo à se expellat quicquid molestiam exhibet, isto motu concuti. Motus hic vniuersalis quidem diuturnus est, & qui à pueritia maxime incipiens (qua de causa, opinor, Hippocrates libr. de aere, loc. & aquis, πῦρ πυλιδιον, hoc est, puerilem morbum appellauit) fere semper consenescat: particularibus vero accessionibus, inter acutos, qui sine febre sunt, à Gal. numeratur. Eundem morbum veteres νόστος μέγαν & ἡεκελεία & ἡεκε hoc est, morbum magnum, Herculeum & factum vocarunt, iis nominibus eius magnitudinem designantes. Latini comitiales dixerunt, quod in comitiis & hominum frequentia maxime inuadat.

Ἐπιτομή. est communis ratio & omnium assensu comprobata, ut definit Galen. vel est ratio apparens nec recedens ab his quæ manifesta sunt, sed illa semper vsurpans, ut idem ait libr. de sectis. Huiusmodi rationes multæ habentur apud Hippocratem in prognost. ut quæ à facie ægri & signis aliis euidentibus sumuntur.

Ἐπιμόδιον. vindicta Romanis. caulis est nō magnus, hederæ foliis denis vel duodenis, neque florem neque fructum ferens, radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Refrigerat & humectat.

Ἐπιμόδιος. est alterum genus mespili, ut ait Dioscorides, in Italia nascens, quod à rusticis, ut scribit Galenus, vnedo vocatur, & plurimum in Calabria nascitur. Est autem arbor mali similitudine, folio tantum minor, ferens pomum rotundum esculentumque, adstringens & tarde maturescens. Dicitur à quibusdam alio nomine ἐπιμόδιος. Galenus quoque auctor est eandem etiam ἀμαμνίδα dici.

Ἐπιμόδιος. ἡ ἐπιμόδιος.

Ἐπιμόδιος ἀννύς. annuens siue innuens pulsus dicitur à Latinis interpretibus. Idem vero & ἀννύς ab Archigene dictus est. Species est pulsus inæqualis in vna pulsatione & diuersis arteriæ partibus, quoties pulsus magnus circa duos medici digitos medios sentitur, minor autem ab extremis. Sic enim appellauit Archigenes, volens indicare diastoles breuitatem cum vtriusque extremi quidam ὀπισθός, hoc est, inclinatione. Neque enim ut præcisus affatim, sed veluti inflexis vtriusque partibus in breue contrahitur, fitque μίκρος, hoc est, decurtatus magnitudine, secundum extremam vtramque sui partem. Hic pulsus proprius est marcescentium ex inflammatione quæ discussa non sit, nulli eorum conueniens qui aliam ob causam in marasimum inciderint, ut scripsit Galen. in Isagoge pulsum. vide μίκρος.

Ἐπιμόδιος ἕρπης ἡ ἐπιμόδιος. vide νεφέλη.

Ἐπιμόδιος. pustula est, ut ait Celsus, pessima colore vel subliuida, vel subnigra, vel alba suo videlicet humori similis, circa quam vehemens inflammatio est: & cum ad aperta est, sanies inde defluit & reperitur intus exulceratio mucosa. Dolor in ea supra magnitudinem eius est: neque enim ea faba maior est. Oritur in eminentibus partibus, suaque sponte erumpit, & fere noctu, vnde nomen quoque ei ἐπιμόδιος impositum est, sicut etiam placet Galeno. Scribunt autem Paulus & Aetius eam non magnopere per diem excruciare, sed noctu grauissimum ciere dolorem atque inde nomen habere. Vera autem est vtraque ratio: nam qua hora orta est, eadem exacerbari verisimile est. In reliquis cum Celsus consentiunt, scribentes ἐπιμόδιος, vlcuscula esse sponte erumpentia, phlyctænis similia, subrubra, ex quibus ruptis sanies cruenta effluit. Nec obest quod ille pustulas, hi vlcuscula dixerint: sunt enim & ipsæ pustulæ vlcuscula: nec similiter quod Celsus variis coloris, hi subrubra dixerint, quoniam sub istis & subliuida & subnigra comprehenduntur. Omnis enim sanguis etiam biliosus (à quo subrubrum illum colorem fieri verisimile est propter dolorum vehementiam, quod à bile dolor omnium vehementissimus sit) sub cutem effusus, facile in eos colores mutatur. Qui enim ab atra bile talis est, non habet fere magnum dolorem adiunctum, quantum inuehunt epinyctides. An vero & alba tantum inferre valeant, dubitari potest, nec de eo tantum, sed an alba etiam omnino sint, præsertim cum scribat Celsus circa eas vehementem inflammationem esse. Præterea tum hi, tum Celsus saniem iis ruptis emanare scribunt, nec illi egant in fundo vlcusculi mucosum quid repetiri. Quod vero bilis mista sanguini dolorem non moueat nisi cum mouetur, quodque noctu interdum moueri soleat, declarant & febris tertianæ & hemiplegiæ accessiones aliquando per noctem contingentes statim periodis.

Ἐπὶ πρὸς. scapula. ἢ ὀμὸς πλάτη.

Ἐπικαυὶς. frutex est pusillus, exiguis foliis. Valer. aduersus venena & iocinoris vitiiis utilis. sima est. alio nomine ἐμφορὶον dicitur.

Ἐπικαὶ φάρμακα. medicamenta quæ insperguntur. dicuntur & καὶ ἐπὶ αἵματι, de quibus vide suo loco.

Ἐπίπεδον. sic dicitur αἶκνος auctore Plinio. Hanc Hippocrates libr. αὐτὸ ἐλκὺν aduersus tumores & inflammationes commendauit. refrigerat enim & modice adstringit. Sunt tamen qui eo nomine ἀέλιον intelligant, quod πρὸς οὐρὸν à quibusdam dici Dioscorides scripserit.

Ἐπιπεφυκὶς χιτὼν. adnata tunica. Est tunica oculi extrema orta ex pericranio; oculum continens & vicinis partibus alligans. Sic dicta est quod aliis quæ oculum constituunt tunicis forinsecus sit adnata. Ea oculum vniuersum non complectitur, sed à lateribus tantum, adhærescens corneæ tunicae eamque complectens ad iridem usque progreditur. quo cum peruenit, summa tenuitate etianescit, nec ad pupillam usque extenditur, ne visioni officiat vulgus coniunctiuam appellat. Vocatur autem à Græcis & ἐπιπέφυκος & ἐπιπεφυκίος ὕμην, ut scribit Galenus.

Ἐπίπυχνος. pars cubiti superior, sicut ὑπερόπυχνος inferior.

Ἐπίπλευσμα. idem quod ἐκπύπλευσμα de quo suo loco.

Ἐπίπλοον. est delapsus omēti in scrotum. Morbi genus est in situ præter naturam. Est autem herniæ species; cuius cum sint plures differentiæ, hæc ab ipsa parte quæ excidit & tumorem facit sortita nomen est. Descendit autem id rupto laxatoue peritonæo, sicut & intestinum, præsertim quibus longius fuerit: multis enim breuius est.

Ἐπίπλοος ἡ

Ἐπίπλοον omentum. Est pars membranosa, dupla, pluribus nervis, arteriis venisque intertexta, intestinis incumbens. Id secto peritonæo primum venit in conspectum, ac primo quidem obtutu nuda simplexque membrana apparet: sin totum eius corpus contempleris; multis præterea venis, arteriis, nervis, plurimoque etiam adipe eam constare deprehendes. Ac venas quidem habet ab ea magna ἡ ἐπὶ τὰς πόλεις, quam portam vocant: arterias vero ab illa arteria quæ secundum lumbos descendit: nervos autem à sexta cerebri coniugatione, cuiusque ramis qui in iecur, lienem & ventriculum feruntur. Ad quorum valorum tutelam natura illi glandulosum corpus, καλὴν κίρην & πύρην dictum, inseruit, inferiori eius membrana ad fundum ventriculi innatum, ut illorum dinaricatio securior redderetur. Ita instructum omentum recti non est absimile, proindeque & γαγγάνιον & σαζήνιον à plerisque dictum fuit. Nascitur à peritonæo, duplicemque est, tunicis videlicet duabus constans densis, tenuibus, sibi que incumbenibus, nec usquam secum vnitis, ex quo peræ aut nār-

supio Galenus ipsum compatamit. Dorso ad vndecimam thoracis vertebra, & iecinoris cauo, & ventriculi fundo, & duodeno intestino, & lieni & colo ligamenti adhæret, reliquis autem intestinis prætenditur & quodammodo ἐπικαίει, hoc est, innat: unde & nomen habet. Vfus eius maximus est ut ventriculum, cuius fundo incumbit, foueat, innatumque calorem etiam per mediam tueatur, deinde vero ut venæ portæ ramos quoque versus protensos, sibi que implexos fulciar, & arterias pariter nervosque proximis ipsi partibus inserendos tuto deducat.

Ἐπιπλάζον. significat apud Hippocr. idem quod πλεονάζον, hoc est, redundans, vel quod syncerum est aliisque impermixtum, ut annotat Galenus comment. in librum de natura humana.

Ἐπίπλυνος. significat apud Hippocr. idem quod ἐκ ἐυφώρας. ut annotat Galen. comment. εἰς τὸ ἀπὸ ἐπὶ δὴ μὲν.

Ἐπίπλυνος. pubes. pecten. Idem quod ἡ ἐκ καὶ ἐφύλαγον. alii aqualiculum interpretantur. scribitur & ἐπίπλυνος.

Ἐπιπνοσία. dicitur ipsum principium siue insultus accessionis febrilis, in quo ægri solent horrere, refrigerari, oscitare, pandiculari, dormire; aut alia quædam his similia pati. Est autem insultus accessionis, ut explicat Galen. lib. de morb. temporib. tempus indivisibile, exacte iam primum, quo ista fere quæ reruli, solent oboriri: horum si quod ægri senserint iam accessionem adesse, quasi eo signo præsentiant, eamque ob causam tempus id ἐπιπνοσία, hoc est, significatio, nominatur. dicitur autem & ἐπὶ πρὸς τὴν παραφύσιν. Ac eiusmodi quidem accessionis significatio, quæ scilicet cum talibus signis inuadit, simpliciter ἐπιπνοσία appellatur, estque februm putridarum propria. Verum habent & suam ἐπιπνοσίαν hæctica febres, sed ab illa differentem: ea autem est vna fere hora vel duabus post assumptum cibum, quo tempore qui hæctica febre laborantem tetigerint, quandam febris veluti accessionem deprehendent, calorem & pulsuum magnitudinem atque celeritatem intendi sentientes, nec quicquam tamen eorum obseruantes accidisse, quæ solent in putridis febribus euenire, hoc est, non horrorem, non extremitatum refrigerationem, non dormitationem, non aliquam pigritiam aut aliquam omnino inæqualitatem in calore aut pulsu, sed neque paruitatem neque debilitatem, neque aliud quid simile. Ideo hæc quia ἐπιπνοσία non est, non absolute, sed cum addito, ἐπιπνοσία ἀδύνητος nominatur, quod careat iis angustiis molestiisque, quibus alii grauitè premuntur per incia accessionum. Est autem hæc febrium hæcticarum propria, ut docet Galen. lib. 1. de differentiis febrium cap. 9.

Ἐπισκληρὸς. induratis apud Hippocr.

Ἐπισκῆλον. vocatur extrema frontis ruga, quæ in oculis



oculis superinducimus, quoties attentius aliquid cogitamus, aut erubescimus, ut scripsit Rufus. Sunt autem qui partem eam carnosam quæ superciliis subiecta est, *ὑπερπύριον* appellent. Nicandri Græci scholiastes, in Theriacis *ὑπερπύριον* interpretatur *ὑπερπύριον* hoc est superciliorum extremum. Id quod Nicander simplici nomine *συνόριον* dixit. Gaza supercilium interdum apud Aristot. vertit.

*ἑλκυστικὸν φάρμακον*. attrahēs medicamentum, quod aliis etiam nominibus *ἑλκυστικόν* & *ἑλκυστικὸν φάρμακον*. Sunt autem multa eius generis medicamenta, quorum nonnulla habentur apud Galen. libr. 6. *ἑλκυστικόν*. & apud Scriboniam Largum certum quoddam emplastri genus *ἑλκυστικόν*. ab eo appellatum nomine sui generis, quod aperit & educit pus, aut si quid aliud subest.

*ἑλκυστικόν*. dicitur apud Hippoc. aphor. 34. & 35. lib. 7. id quod insidet & supernatat urinae, siue bulla, siue pinguedo, siue quid aliud.

*ἑλκυστικόν*. cunctatrix, cogitabunda, hæsitans, apud Hippocratem.

*ἑλκυστικόν* primæ vertebræ nomen fuit apud antiquos medicos. Nam ea super secundam vertitur, veluti super axem quandam: quam ob causam etiam hæc *ἑλκυστικόν* à veteribus dicta est.

*ἑλκυστικόν*. os transuersum & latum in imo ventre quod pubi subiaceret & munit ingestina: Latine pecten & os pubis dicitur.

*ἑλκυστικόν*. dicitur ab Hippocr. *ἡ ἀρχὴ τῆς παροξυσμοῦ*, hoc est initium accessionis; ut annotat Galen. comment. *ἡ ἀρχὴ τῆς παροξυσμοῦ*.

*ἑλκυστικόν*. sic dicitur à quibusdam *ἡ ἀρχὴ*.

*ἑλκυστικόν*. dicuntur ab Hippocr. aphor. 23. lib. 5. ardores & feruores alicuius partis, veluti à flamma vitæ propter exuperantem humorū caliditatem. Idem profus eo nomine significatur quod *ἡ φλεγμονή*, quo veteres omnem ardorem etiam citra tumorem notabant. Dicitur & Hippocrati *φλεγμονή*.

*ἑλκυστικόν*. est impetus omnis humoris in quamcunq; partem influentis: quod vocabulum quamuis Græcum sit, sæpe tamen usurpat Plinius, dicens epiphoras vteri & ventris & oculorum. Verum de oculis aliquando simpliciter *ἑλκυστικόν* dicitur, & significat fluxionem in oculos irruentem. Paulus vero libr. 3. non simpliciter, sed *ἡ φλεγμονή τῶν ὀφθαλμῶν* dixit, & Gal. libr. 4. *ἡ φλεγμονή*, describens Nectarium Marci, dicit *ἡ φλεγμονή τῶν ὀφθαλμῶν* efficax esse.

*ἑλκυστικόν*. dicuntur apud Hippocr. in Proorrhethico, ut nonnullis placet, mulieres grauidæ & iam vicinæ puerperio: ut alijs autem videtur, quæ facile concipiunt & crebro pariunt, ut annotat Gal. in comment.

*ἑλκυστικόν*. est vnio ossis cum altero osse, quasi os alterum ossi innatum sit. In epiphyysi enim ossa in se mutuo subeunt, quo securius vniuntur, & fere ad ossis alterius finem portio hæc maioris ossis per epiphysim agglutina-

tur, tanquam natura sui oblita os breuius fecerit, quod deinde epiphyysi addita perficiat atque producat. Quo in opere naturam ars fabrilis videtur imitari, quæ breuius lignum alterius adiectione ceu epiphyysi auget. Apparet manifestius epiphyysi in infantibus, non ossis, sed cartilaginis specie. Tempore autem in os durefcit, adeo ut senibus commissura quandoque nulla appareat, nisi eam interdum vis aliqua detegat & separet. Est vero epiphysis ossibus quibusdam vniæ, alijs duplex, triplex quibusdam, aliquando quadruplex vel etiam quintuplex. Vsus epiphyseos est, ut scribit Galenus, non tantum quod medullam in magnis & raris ossibus operit, sed quod tutam etiam articulationem reddit, quod per epiphysim os dilatatum in magnas, sæpe etiam multas apophyses, tutā magis diarthrosim efficiat, dum pluribus partibus os vtrumque committitur: quomodo columnarum bases & epistylia amplificantur ad sustinendi securitatem. Nam si angusta & acuta his patribus essent ossa, ac veluti puncto sese tangentia, fallax omnino & periculosa esset diarthrosis. Ne vero os propter epiphyseos amplitudinem esset oneri, raritate & casternulis amplioribus & pluribus succum illum medullosum ad sui nutritionem continentibus, natura prouidit. Cæterum quod *ἑλκυστικόν* differat a *ἑλκυστικόν* Gal. libr. de ossibus annotauit, scribens *ἑλκυστικόν* totius ossis partem esse, *ἑλκυστικόν* vero non esse partem ossis, sed aliquid ossi adnatum.

*ἑλκυστικόν*. *ἑλκυστικόν*. concretum, lanuginosum, apud Hippocr.

*ἑλκυστικόν*. medicamentum quod vmbilico illitum subducit aluum. Cuius generis multa describuntur *ἑλκυστικόν* apud Actium libr. 3.

*ἑλκυστικόν*. *ἑλκυστικόν*. extensa, apud Hippocratem.

*ἑλκυστικόν*. palmes ex quo nascitur quippiam, ut ex colocynthide, apud Hippocr.

*ἑλκυστικόν*. est tuberculum & carnis excrecentia in gingiuis proueniens & ad intimos molares dentes pertinens. Oritur ex inflammatione, febreque interdum, & dolorem habet adiunctum, eumque aliquando tantum ut æger os aperire nequeat. Quanquam autem Paulus libr. 3. scripserit intimi molaris affectum esse, generalius tamen dicit libr. 6. carnis esse excrecentiam iuxta dentium aliquem in gingiuis exorientem.

*ἑλκυστικόν*. *ἑλκυστικόν*. cicatricem inducens facultas dicitur & *ἑλκυστικόν*.

*ἑλκυστικόν*. *ἑλκυστικόν*. est medicamentum valde siccum & adstringens, vlceri cicatricem inducens. Nam quia cutis carne ipsa sicior densiorq; est, qui carnem cuti persimilem reddere cupiet, eam necesse est contrahat, constringat, constipet, denset, præterea siccet & calli instar induret, quippe cum cutis velut in callum durata caro sit. Hæc quidem est medicamenti quod cicatricem

inducit summa, verum ea non satisfacit ad intelligendam plane eius naturam. Nam & glutinatorium medicamentum, quod καλλη-  
πιδόν dicitur, tum siccatur, tum etiam adstringit. At in glutinatione vlcerum siccandum modo est quod affluit, quo videlicet affecta pars superuacuis vacet: in cicatrice vero ducenda, non modo quod affluit, verum etiam humor qui in ipsa carne continetur est consumendus. Itaque multo siccior est quod cicatricem inducit, quam quod agglutinat, quando glutinaturum vnum id propositum est, ut eius quod secundum naturam est redundantiam consumat: qui cicatricem inducet, non hoc modo, verum etiam ut eius naturalem humiditatem absumat. Sunt autem huius generis medicamentorum multi gradus, pro diuersa corporum natura & partium: galla immatura, mali corium, Aegyptiacae spinæ fructus, modice siccantia sunt: chalcitis, æsustum, æris squama, misy, fissum alumen, multo his valentiora sunt: misy quidem & chalcitis præcipue, mitior autem æris squama, atque etiam hoc mitius æsustum. Talia quidem sunt ἐπουλαστικά φάρμακα, cicatricem primario proprieque inducentia. Nam sunt & alia quæ per accidens & secundario id possint, veluti καυστηρικὰ, si ad exactum pulueris lætiorem redacta perspicilli cuspidem carnem leniter contingant: & ea quæ absque adstrictione desiccandi vim habent mordacitatis expertem. Nam & hæc quoque ex accidente ἐπουλαστικά sunt, ut myrrha, lithargyrus, ostreum & diphryges combusta: nam & hæc sæpe cicatricem inducunt illita.

Ἐπιάπλευρον. dicitur à quibusdam τὸ ἀντίχλωρον, hoc est plantago, ut habetur apud Dioscoridem: ratio est vel quod septem crassioribus fibris quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sunt, ob quam causam etiam à plerisque πλάπλευρον appellat: vel quod maior foliis septenis, laterum modo includitur. Graiorum imitatione septinervia dici potest. Verum Paulo Aeginetæ ἐπιάπλευρον alia videtur herba quam plantago, id quod aperte in emplastro cui nomen est βετανικόν, aduersus collectiones inuento demonstrauit: quippe in quod tres quærantur herbæ, plantago ternis vnciis, heptapleuron senis, leoneuron quoque ternis.

Ἐπιάφθικον. medicamentum laxans, suppurans, carnemque gignens. sic dictum quod septem pharmaca admittat, cerussæ bestem, spumæ argenti trientem, ceræ, picis, colophonizæ, adipis taurini, thuris, singulorum sextantem, ut habetur apud Aetium libr. 15. cap. 22.

Ἐπιάφικον. herba est quinque folio similis nisi septem haberet folia. Ea utrinque lanuginosa sunt. Florem habet luteam, radicem puniceam & intortam. Officinæ bistortam vocant.

Ἐπιοιμένοι. dicuntur αἱ ἀποπληκτικαί, hoc est stupidi & mente consternati, ἀπὸ τῆς πλοῖας, quod est

Trepido & Attonitus sum. Sunt qui τρεπιδόντες interpretentur.

Ἐπίδης. δυσώδης ἐπὶ τῷ ὄντι, foetens, male olens, apud Hippocr.

Ἐπίονος ἐρη. τῷ ὄντι πλεονεχέμενος, multo ytensaceto, apud Hippocr.

Ἐπώμις. dicitur à Galeno comment. 1. αἰς τὸ πρὸς ἀρθρον, pars humeri superior quæ ad ceruicem vique porrigitur. Rufus definit esse partem eam quæ à tendine ad humeros pertingit. Hanc autem quidam musculum esse interpretantur, articulo humeri superiniectum & brachium sursum mouentem, quem etiam veteres δελτοειδὴ appellarunt. Quod ego magis arbitror quam dicere ossis portionem esse, cum Galenus nullam eius ossis mentionem fecerit libr. de ossibus, neque ab acromio distinxerit.

Ἐραιοειδής.

Ἐράνημος dicitur ἡ ἀνθή, quod vere floreat: ramersi non omnia anthemidis genera, quidam censent hoc nomine appellanda, sed proprie illud modo cui flos colossinus est, foliorum fruticisque amplitudine maiusculum.

Ἐραινός. lapillus quidam qui in Euphrate reperitur. Quidam turcicam vulgo dictam esse putant.

Ἐραιορίμη. Species est myrrhæ, omnium deterrima, pingui caret, cano situ obducta est, acris, ad gummi imaginem vergens, ut scribit Dioscorides.

Ἐρίονος. cicer. Est legumen radice surculosa, eademque altissima, caule lignoso, obliquo, foliis circinatis, siliqua rotunda, femine vario, tum colore, tum sapore, tum forma. Eius genera sunt arietinum, χρίδι à Græcis dictum, quod arietino capiti simile sit, Columbinum idemque Venerium, erui similitudine, ὀροβίσκον ob id appellatum, à Columella punicum. His generibus sylvestre additur à Dioscoride, Galeno, Pauloque, cuius vis alia duo excedat: ὀροβίσκος calidior arietino, subamarusque ut erium, unde nomen. In columbino & orobixone & sylvestre contineri putamus. Est autem cicer copiosi nutrimenti alio mouendæ habile, ciendæ urinae idoneum, tacti & semini generando aptum, prolicit veto & menses. Sed arietinum cæteris efficacius urinam prouocat, eiusque decoctum renem calculos confringit. Cæterum ὀροβίσκον eadem vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modice sicci, participes item sunt amaritatis, per quam viscera expurgant.

Ἐρίονος. dicitur etiam pudendum virile. quomodo apud Aristoph. explicat eius scholiastes.

Ἐρέχμης. simpliciter quidē & absolute, faba frasa fractaque: ut sit ἐρέχμης in faba quod πικρὸν in hordeo, & χέρος in alica. Quod si faba molam experta sit & in farinam redacta, iam non ἐρέχμης, sed vel κνέμας ἄλευρον vel ἄλευρον ἐρέχμης dicitur. Quamuis autem de faba sæpissime ἐρέχμης vsurpetur, obseruatum tamen

men est etiam de aliis leguminibus itemque radicibus eodem modo fractis dici non simpliciter quidem sed nomine ipsorum appposito, ut καὶ ἔριμος, ἔριος aut ἄλλοις αἰσῶνς aut ἔριος. Non est idem quod ἔριος, neque quod λείκος. Nam ἔριμος, ut dictum est, fabam ipsam aut aliud leguminum genus frustum fractumque significat, sed crudum adhuc incoctumque ἔριος vero & λείκος, ipsum iam elixatum ita ut mandi possit. Dicitur ἔριμος ἀπὸ τοῦ ἔριεν, ut ait Galen. quod frangere significat. Alicubi ἔριμος innenitur scriptum ἀπὸ τοῦ ἔριεν, quod idem est.

**Ἐρεθισμός.** pruritus. Hoc vno nomine Hippoc. omnia comprehendit & designat quæ quovis modo virtutem reddunt infirmiore, ut morsus quem aeris humor vel in intestinis vel in ventriculo & præsertim eius ore excitat, vigilia, ira, moror, lumbrici ab intestinis ad ventrem ascendentes, pruritus totius cutis aut partis cuiusdam per noctem molestus, à quo non solum propter irritationem sed etiam vigilias vires exoluuntur. Hæc enim omnia Hippocr. ἐρεθισμὸς appellavit, ὡς τὸ ὅτι διὰ τὸν ὄλεον, sicut Gal. commen. 3. annotavit.

**Ἐρεθισμός.** idem quod ἔριμος, hoc est, partis ægræ fulcimentum per fasciam & vinculum, ut ait Galenus.

**Ἐρεθισμός.** ἢ

**Ἐρεθισμός.** Eretria sine Eretiensis terra. Regionis & loci è quo effoditur nomen habet: sic enim dicitur ab urbe Eubææ Eretria, sita prope Chalcidem. Ea est modice pinguis, sed densane an rara fuerit non facile sciri potest, quod nihil ea de re veteres prodiderint. Sunt autem ipsi duæ colorum differentię: alia enim candida, alia cinerea est. Illa pictores, hac medici vruntur, præsertim vero admodum molli, & quæ per aramenta tractim si ducatur, lineam violaceam refert. Extergendi vim habet valentem, sed citra mortuum, maxime si elota sit. Quod si vratur, subtilitatem & acrimoniam acquirit, & vim etiam digerendi. Sin post vstionem lauerur, deposita acrimonia & retenta tenuitate, desiccantior euadit. Quo autem modo eam tum lauare tum vrere oporteat Dioscorides exponit lib. 5.

**Ἐριγμή.** ἔριγμον. ἀπὸ βάλανος. ructus, reiectio, apud Hippocratem.

**Ἐριγμός.** vide ἔριγμή.

**Ἐριγμός.** vide ἔριγμή.

**Ἐρίων.** erice. Est arbor fruticosa bis anno florens, prima videlicet & vltima sylvestrium. Plinius ait non multum à myrice differre, colore rosmarini & pene folio: multo tamen quam myrice minor est. Athenienses τὸν ἔριον auctore Plinio appellant tetradicem: vel, ut habetur apud Theophrastum, nisi mendosus sit codex, tetralicem. Eubœi σισάρον, vel, ut Varro habet, sisaram. Vescuntur apes eius flore, vnde mel ἔρικαιον vocatum, sylvestre improbum & simile arenoso faciunt. ἔρικον vi pollet discutiente citra rosionē,

sed flore eius potissimum & foliis vtendum. Sunt qui putent esse eam quam officinæ genistellam nuncupant. Sunt qui ἔριον per diphthongum scribant, quod ab ἔρικῳ deducatur.

**Ἐριγρόν.** species est collyriorum τὸν σάλευρον, cuius aliquot differentias Aetius recenset. Non dubium est sic vocari à fructu erices quem recipiunt, quem Galenus lib. 4. τὸν ἔριον inter mediocriter adstringentia enumerat.

**Ἐρίδις.** ἢ ἀδραμερὸς διηρημένη κρίται. hoc est, hordea, in crassiores portiones diuisa, apud Hippocratem. quidam bifariam diuisa interpretantur. Nam & ἔριδις, quod bifariam diuisum sit, vocari aiunt. Galeno tamen vtrumque dictum videtur ἀπὸ τοῦ ἔριεν, quod non significat bifariam diuidere, sed frangere simpliciter. vnde & placentæ quoddam genus ἔριδις vocatur quod facile frangatur. Sunt qui ἔριδις per diphthongum scribere malint.

**Ἐρίδις.** à quibusdam dicuntur ὡς ὄλεον, id est, grossi, de quibus vide in dictione ὄλεον.

**Ἐρίδις.** caprificus. qui & ἔριος.

**Ἐρίος.** herba est foliis ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis senisue, drantalibus furculis, flore candido, semine nigro & acerbo: in cuius foliis & caulibus lacteus succus continetur. Quam autem Dioscorides ἔριον appellavit, Galen. ἔριον vocat, qui τὸν ἔριον non meminit, vti nec ille τὸν ἔριον: in reliquis eadem dicentes. separavit tamen eas Paulus, & de vtraque seorsum egit. Quia autem ἔριος ocimi similitudine sit, ab aliquibus ὀκίμου ὀκίμου, dictus est, & à Romanis ocimum aquaticum, propterea quod apud fontes & fluuios nascitur. Herbarij herbam lactis & ocimum aquaticum appellant.

**Ἐρίος.** caprificus. Est ficus sylvestris generis, nunquam maturescens, carpenisque muros ac parietinas: longe validior est quam ficus & nodosior, nullis fere vitiis obnoxia. Est & fico multo viuacior. Habet & vires multo etiamnum efficaciores. Dicitur & ἔριος.

**Ἐρίξ.** dicitur apud Hippocratem, de iecinore, ut ait Galen. ὡς τὸν γλαύκωτος. scriptum tamen est in plurimis ἦ ῥίξ. significat autem partem hepatis superiorem qua eius fibræ à se inuicem diuiduntur.

**Ἐρίων.** lana magni est in medicina vsus. Eius duæ differentię sunt, pura & sordida. pura dicitur quæ lota est: sordida vero, illota, quam Græci ἔριον ῥυπαρὸν & αἰσθηρὸν, Hippocrates vero πῖον καὶ πῖονδες appellant. est autem πῖος idem quod ῥυπός.

**Ἐρίφρον.** est bulbi genus auctore Theophrasto, circa ripas amnium nascens, cuius inter summum corticem partemque eam quæ edendo est, lanæa continetur materia, ex qua mappæ vestesq; quondam conficiebantur. Nomen ex eo accepit quod lanam ferat.

**Ἐρίφρον.** vide ἔρίφρον.

**Εριφίας.** herba est septem lanuginosis ramulis apud modo foliata purpureo flore & perenni, semine rabaceo, totidem radiculis, quot ramis. Hanc magi prodidere in auena scarabaeum habere sursum deorsumque decurrentem, cum sono hædi; unde nomen accepit, simulq; nihil ea esse ad vocem præstantius.

**Ερμαφα.** dicitur ab Hippocr. partis ægræ fulcimentum chirurgi industria adhibitum, iniecta fascia & vinculo: quod conuenit iis modo partibus quæ mouentur. Differt & τὸ τῆς σπινθιατος, id est, à firmamento, quod hoc & sine vinculo & partibus illis quarum motus necessarius est, à quo cessatio non est in nobis, adhibetur, dicitur autem alio nomine ἐρμαφα, vt annotat Galenus comment. 3. εἰς τὸ κατ' ἰσχυρίον.

**Ερμαφρόδιτος.** est vitiosa membrorum genitalium conformatio, præter legitimum pudendum, alterius etiam sexus pudendo apparente. Huius vitii quatuor differentias esse Leonides memoria prædixit, tres quidem in viris, vnā in mulieribus. In viris quidem alias iuxta τὸ ἀδελφόν, alias in medio scroto pudendum muliebri pilosum apparet, alias vero, quæ tertia differentia est, per id ipsum quod in medio scroto pudendi formam habet, vrina emittitur: in mulieribus autem supra pudendum, iuxta pubem virile frequenter genitale reperitur, tribus quibusdam ex tantis, corporibus, vno tanquam cole, duobus autem veluti testiculis. Sed fere fit vt è duobus pudendis alterum iners sit & inuolidum, nec nisi rarissime vtrumque ad vnerem idoneum habetur. Pluribus vero etiam vtrumque imperfectum est, vt nec maris nec feminae opus exercere possit, id quod Ausonius poeta hoc epigrammate significauit.

*Mercurio genitore sacro genitrice Cythere,  
Nominis vt misti, sic corporis Hermaphroditus,  
Concretus sexu, sed non perfectus utroque,  
Ambigua Veneris, neutro potiundus amori.*

Nomen huic malo datum est ab Hermaphrodito quem Mercurii & Veneris filium fuisse & ἀνδρόγυνον, hoc est, virum & mulierem, perhibent. A quo qui vtrumque similiter sexum habent, ἐρμαφρόδιτος καὶ ἀνδρόγυνος appellantur.

**Ερμαφία.** compositionis cuiusdam nomen est, qua magos quondam vfos esse perhibent ad liberos generandos pulchros bonosque. Constabat nucleis pineæ nucis tritis cum melle, myrrha, croco & palmeo vino, atque ita admixto lacte bibere iuebant: similiter & à conceptu puerperas partum enutrientes. Sic fieri constantes animo & forma excellentes atque bonos alumnos pollicebantur.

**Ερμολόχικος.** à recentioribus Græcis dicitur bulbi genus quod foliis emicat pinguicululis, caule semipedali, flore croci, candido, qui autumnū exitu erumpat, radice bulbacea, forinsecus nigra, intus alba, lacteo dul-

cique succo plena. hæc lethifera pruritum exterius ciens, interius vellicans, cum graui stomachi exaltatione, mistum cruorem strigmentis in aluum depellens. Eius duo genera Actuarij dicit esse, candidū & purpureum, quæ veterum καλὸν καὶ ἐφ' ἑμπερον esse plerique existimant. Assueuerat tamen Ruellius τὸ ἐφ' ἑμπερον Hermodactylum non esse ex quo cataportia illa aduersus arthritidem tantopere commendantur.

**Ερμολόχικος** dicitur à quibusdam τὸ πικρὸν, vt habetur apud Dioscor.

**Ερμόλας.** sunt species collyriorum τῶν ἁλινῶν, hoc est, reprimentium sistentiumq; fluxiones. Eorum autem alter magnus, alter paruius dicitur. Paruius recipit Cadmiz vnc. i. croci drach. i. i. i. myrrhæ drach. ii. i. aloes drach. vi. i. i. acaciæ drachm. vi. i. i. gummi drach. vi. i. i. nam male apud Aetium legitur καμίζ & ἄ. pro & ἄ. quorsum enim tanta gummi copia? excipiuntur aqua pluuia. Magnus autem habet hoc modo: Cadmiz vnc. vi. i. i. spicæ nardi sesquiuncia, æris sesquiunciam, croci vnc. i. i. i. aloes vnc. vi. i. i. lycii Indici vnc. ii. acaciæ vnc. vi. i. opii vnc. ii. i. i. zinziberis vnc. i. i. i. tragacanthi vnc. i. gummi vnc. vi. i. excipiuntur aqua Aetius.

**Ερμύστα.** vocatur à multis eo nomine τὸ ἀνδρόγυνος, quam Latini vocant Mercurialem, propterea quod eam à Mercurio inuentam perhibent.

**Ερμόνος καλόν.** est collyrium quod refertur ad Hermonem authorem, cuius descriptio habetur apud Corn. Celsum lib. 6.

**Ερπύχιστος.** dicitur à quibusdam ἁπλῆστος, vt habetur apud Diosc. quod natura sua hæreat, nitatur, longiusque foliis suis serpat.

**Ερπύς.** pediculi capitis & reliqui corporis.

**Ερπύς.** herpes. Est tumor exulceratus à flaua bile sincera proueniens. Sunt autem tres eius differentia. Nam si bilis substantia crassior est atque acrior, totam cutem vsque ad carnem subiectam exulcerat, & dicitur ἐρπύς ἐσθίμενος: qui vlus inæquale est, vt ait Corn. Celsus, cæno simile, cui multus humor glutinosus inest, odor intollerabilis, maiorque quam pro modo vlceris inflammatio sic dictum à Græcis quia celeriter serpendo penetrandoque vsque ad ossa corpus vorat. Quod si bilis tenuior est & minus acris, superficiem solum velut inurit, appellaturque simpliciter ἐρπύς eodem cum suo genere nomine, citra cognominis adiectionem. Sin autem bilis ipsa tenuior, & minus tum acris tum calida est, pustulas exiguas multasque per summam cutem excitat, καίχας, hoc est, milio, similes. atque ob id ἐρπύς καίχας dicitur, quem Latini miliarem interpretantur. Idem vero etiam ἐρπύς φλυκταϊνός nuncupatur à pustulis suis indito nomine. Cæterum ἐρπύς à Latinis zonam vocatum fuisse aliquot locis apud Scriboniam Largum intelligitur, vt capite 62. Est autem zona ignis sacri species quæ medium hominem ambit cingitque



cingitur. dicitur alio nomine *serpyllum*. Sic à quibusdam vocatum fuisse *serpyllum*, Dioscorides auctor est. quod de primo eius genere intelligi debet.

*Erysipelas*. medicamentum quod naribus purgando capiti infunditur. Quicquid autem eam habet facultatem, extergens & acre sit oportet: sic enim & commodissime atrahit, & vim expultricem irritat. Eiusmodi est betæ succus, cumini, medulla cucumeris sylvestris, melanthium, cyclaminum, sal ammoniacus, nitrum, iris sicca, veratrum, staphis agria rum oleo aut vnguento, aut lacte aut alio liquore excepta, & naribus inuncta, tum in pulverem trita tenuissimum & per arundinem insufflata. Quod ubi actum est, æger deorsum pronuere debet, quo videlicet coactus humor distillet.

*Eripis*. prostratio & deiectio corporis. Signum est extremæ imbecillitatis. Nam stare aut sedere aut surgere non posse, graue quidem est: at tanquam mortuum & inanimatum corpus deorsum ferri, & à culcitra sublabi ad pedes, longe grauissimum. Neque enim illi accidit nisi omni robore protus & soluto & perduto. Talem quidem iacentis habitum Hippoc. lib. 6. *χρυσὴν ἐρίψιν* appellauit.

*Erythra*. reicitur. apud Hippoc. teste Galeno. vel Eructat.

*Erythra*. ructus. Est excretio flatulenti spiritus, à ventriculo per os erumpentis. Symptoma est quod ad motum quidem facultatis expultricis pertinet, sensu tamen percipitur & cum voluatario communicat, non aliter quam horror, rigor, pruritus, tussis, sternutamentum, oscitatio, pandiculatio, singultus, vomitus. Quos motus quamuis sola natura, hoc est facultas nostrum corpus regens, edat, ea tamen à causa aliqua morbifera cogitur: ob id symptomatis præternaturam annumerantur, quia causæ præternaturam cogunt eam ad eiusmodi motus ciendos, ut quod noxium & superuacuum est, à se depellat. Itaque si quando in ventriculo collectus est halituosus quidam spiritus & flatus, eiusque excretionem per os natura molitur, ructus fit: quemadmodum si per sedem excernatur, crepitus aut silens flatus. Is autem gignitur, & ab humore vel cibo manat propter eius inconcoctionem, quod ventriculus humori ciboue concoquendo par esse non potuerit, siue ex cibi ingesti humorisque natura, illato manente ventriculo, siue à ventriculi imbecillitate, rem concoctu facilem non valentis concoquere. Eam autem imbecillitatem calida aut frigida intemperies excitat, tum per se tum cum humoris affluxu. Sed calida quidem nidorosos & fumosos edit ructus, frigida vero acidos, quos proprio nomine *ἄγρυμναις* appellant. *Ἐρύθρις* ab Hippocrate *ἡ ἐρύθρις* dicitur lib. 6. *ἥτις ἐπιδιμνύει, ἀπὸ τοῦ ἐρύθριου*. quo tamen nomine quidam, ut illic Galen. annotat, contendunt

Hippocratem appellasse omnem flammosi spiritus vacationem, vndeunque & quouis modo ille prodeat, secundum quos & tussis & sternutatio & singultus & crepitus *ἐρύθρις* vocabuntur. Alii vero omnem non spiritus modo, sed quorumvis etiam humorum excretionem *ἐρύθρις* ab eo dictam esse volunt, Homerumque testem citant qui scripserit, *ἐρύθριος ὁ λόος ἔστω*, loquentem de mari quod omnia extra se reiciat.

*Ἐρύθριος* morbus ructuum effectiuus & flatusosus, apud Hippoc.

*Ἐρύθριον*. nomen est malagmatis, cuius compositio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 18.

*Ἐρυθρόδαιμον*. rubia. Herba est caule anguloso, geniculato, aspero, foliis circa articulos per intervalla stellæ modo radiatis, semine primū herbofo, mox rubro, denique nigro, semper rotundo, radice rubra, tantæ altitudinis ut raro tota queat effodi: hac tinguntur lanae pellesque, & ob eam causam rubia tinctorum in officinis dicitur.

*Ἐρυθροειδής*. tunica testium & vasorum spermaticorum, ubi extra ventrem processere: quādiu enim intra ventrem sunt, eorum tunica, quod illic nihil habet eximium, nullo proprio donatur nomine: posteaquam vero extra ventrem processit, quia rubet, *ἐρυθροειδής* incipit appellari. Ruber autem tum à colore rubro muscoli testium gracilis, tum à vasis multis quibus implexa est. *Ἐριφύσις* est peritonæi, testemque totum eiusque proximam tunicam *ἐπιδιμνύει* dictam inuoluit, præsertim in viris: ea namque mulieribus vel nulla est, vel tam exigua & obscura, ut oculis videri non possit.

*Ἐρυθρίς*. à quibusdam dicitur *ἡ ῥοδός*, quem vulgo sumach appellant.

*Ἐρυθρὴν ῥέαν. τὸ ἔσχυμον*. apud Hipp. hoc est adeps cruentus & sanguinolentus.

*Ἐρυμα. ἡ ῥιγμὰ*. apud Hippocratem, hoc est firmamentum, quod & *ἱερμα*.

*Ἐρυθρὰν*. herba est foliis acanthi, flore luteo.

*Ἐρύσιμον*. tritico. Est legumen Cereale quod culmo confurgit ferulaceo, in lori modum flexili lentoque foliis eruca sylvestris, floribus luteis. In cacumine siliquas gerit graciles & corniculatas in quibus semina continentur parua, nasturtii specie, gustu ardenti. Sunt qui existiment frumentum Turcium esse.

*Ἐρύσιπας*. erysipelas. Est tumor præternaturam in cute à sanguine & flaua bile calidioribus, vel à sanguine feruente tenuique proveniens. Continetur in genere tumorum præternaturam: sed tumor ad solam cutim pertinet, nec subiectas cuti partes inuadit. Cutim appello tum hanc externam quæ omnium partium commune est tegumentum, tum membranofam & tenuem, quæ singulis internarum est circumdata. Habet quidem doloris aliquid, sed longe moderatius quam phlegmone, neque, ut illa, pulsât, premit aut distendit. Verum multo calidior est & aspectu flauior, & si tetigeris, sanguis facile refluit, rursusque affluit valde tenuis

& rubens. Tale quidem est proprie dictum erysipelas & exquisitum. Fit à flaua bile, non syncera quidem & secreta à sanguine (nam pro erysipelate herpes facile fieret) sed sanguini calidiori mista, vel sanguine quidem, sed feruido & tenuissimo, ut scripsit Gal. lib. 2. ad Glauconem. Ergo exquisiti erysipelatis causa sanguis est, non simpliciter quidem dictus sanguis, hoc est, & qualitatibus & substantia moderatus, qualis in carnem effusus phlegmonem gignit, sed vel flaua bile mistus, vel feruens & tenuis. Talis autem biliosus utique fuerit, aut etiam potentia bilis, iisdem fere quibus illa qualitatibus præditus, nec viribus longe impar. Itaque cum Galenus scribit, id quod facit multis in locis, erysipelas flauæ bilis aut biliosæ fluxionis sycobolem esse, non oportet eam puram & ab omni sanguine secretam intelligere, ut quæ herpetem non erysipelas excitet, sed sanguini calidiori mistam: vel sanguinem feruidum & tenuissimum, ut qui proxime ad bilem accedat, neque aliud vnquam tumoris genus quam erysipelas committat, si in sola cute hæserit. Neque vero propterea ita genitum erysipelas exquisitum non est: siquidem non ab ipsa materia exquisitum aut non exquisitum erysipelas dicitur, ut quam habere possit cum multis aliis morbis communem, sed ab ipsa tumoris specie & natura. Itaque exquisitum est, quod non est alterius tumoris particeps: non exquisitum, in quo tumoris alterius generis notæ confusæ sunt & permixtæ. Vbi enim rerum species distinctæ sunt, exquisitæ & legitimæ dicuntur. Si quod igitur erysipelas ita in cute consistit, ut tangenti calidum appareat, intuenti flauum aut rubens, sed rubore multo viuidiore magisque splendenti quam naturalis mediisque sanguis, adhuc cum paruo dolore, sine pulsu, sine distentione, sine renixu, sine laxitate & molitie, sineque duritie, exquisitam censendum est & alteri tumori impermixtum. Verum si non cutim modo, sed carnem etiam subiectam fluxio inuasit, tumorque occupat, si dolor pulsatorius est, si humor non plane tenuis, sed crassior est, si color vere ruber, sicuti cum notis erysipelatis mixta sunt phlegmones symptomata, ita erysipelas hoc non dicitur exquisitum & simplex, sed *ἐρυσιπέλας φλεγμονώδης*, si modo propria erysipelatis symptomata præualeant. Si enim contra phlegmones signa potiora fuerint, *φλεγμονή ἐρυσιπέλατιώδης* appellabitur. Quod si neutrius luculenter vincant sed paria cernantur, duo affectus misti esse dicentur, phlegmone scilicet & erysipelas. Similiter si vna cum erysipelate mista esse videantur propria cedematis symptomata, non simpliciter dicetur, sed *ἐρυσιπέλας οίδηματιώδης*: atque ad eundem modum *σκιρτώδης*, si tumoris scirrhusi notæ quædam proprie simul insint. Ceterum tam exquisitum quam non exquisitum erysipelas duplicem præterea ha-

bet differentiam. Nam vel abque exulceratione, vel vna cum hac incidit. Nec tamen quod cum ea est, herpes est, quod bilis quæ herpetem committit, tenuior sit & syncera: quæ vero erysipelas, paulo crassior & semper alteri humori confusa. Non ignoro quidem Paulum libr. 4. cap. 21. erysipelatis duas apud Galen. significationes annotasse, vnam, ut ait, propriam, alteram vero communem: quas ego peritioribus relinquo diiudicandas.

*Ερυσιπέληρον*. dicitur à nonnullis *ὁ ἀσπλάγης*, ut habetur apud Dioscoridem. dicitur & à quibusdam *ἡ ἀπαντα λευκή* eodem auctore, forte propter aculeos & virilium modo lentorem quem habet. dicitur & à nonnullis *χάμα λεοῦ* albus, ut habetur apud eundem. Dicitur & à quibusdam *ὁ κύριος*, ut habetur apud eundem, & confirmat etiam Hesychius in suo lexico.

*Εσχαράς*. *εἰς τὸ ἐσχαλάσας ὥστε μαρῶσαι*, hoc est, intime & penitus relaxans vel diducens, ut aliquid inuestigetur, apud Hippocratem.

*Ἐσδρα*. Esdra antidorus apud veteres celebris

*Ἐδιδύμενος*. est herpes vna cum cute carnem pariter exedens: fit à bile magis visa & paulo crassiore. vide *ἐρπης*.

*Ἐρεμίσσειν*. alte inquirere & inuestigare, apud Hippocratem, ut annotat Galen. comment. 2. *εἰς τὸ πρὸς ἀρδρην*.

*Ἐσπερίον μήλον*. malum citrium, ut habetur apud Athenæum.

*Ἐσπερίς*. herba est generis violarum, ramosa, cubitali caule, exili folio quasi brassicæ longo latoque, aspera lanugine, canescenti, ambitu rariuscule laciniato, flore quadri-folio, non vnus coloris: nam alii purpurei sunt, alii niuei: foliaceum semen tenuibus siliquis teretibusque continetur. Noctu fragantius spirare quam interdiu dicitur, unde illi nomen hesperidi. Rustici grossulam vocant.

*Ἐστία*. nomen nobilis apud veteres emplastri, quod sic dictum est, quia ex Græci nominis literarum calculo quæ in *ἐστία* continentur, indicetur ipsum drachmis *xxvi*. constare. Refertur ad Necephonem regem. Conducitur omni vulnerum generi. descriptio eius habetur apud Aetium lib. 15.

*Ἐσπικαμένα*. *συνδεδεμένα*, *οἰνωσπικαμένα*. colligata, constricta, apud Hippocr.

*Ἐχέλας*. crusta dicitur ea proprie quæ ab ardente ferro aut medicamento caustico indacta est. Eius generatio, inquit Galenus, ex subiectis circumpositisque corporibus, ut sic dicam, semiustis, sic ut cuiusmodi res in hyemem extinctos hos carbones parant, eiusmodi ipsæ crustæ carnis exustæ sunt reliquæ. Quare quantum particulæ adustum ad crustam est, tantum ipsi de naturali carne deperditur. Sic vero dicitur & ea quæ sponte sua vlceribus cauis accrescit crassa nigraque. Nam quæ leuior est, non *ἐχέλας*, sed *ἐρύων* appellatur.

**Ἐξορρυσσόμενον** crustificum, seu crustam inducens medicamentum. Est autem duplex **ἡ ἰσχυρὴ**, ignitum ferramentum, & crustificum medicamentum: hoc autem calidum & siccum est quarto gradu, crassæ essentia & dolorificum: id carnes colliquat & adurit, sicque crustam facit. Eius usus in primis necessarius est, ubi ex erosione putrescentis alicuius profluvium sanguinis excitatur, atque ubi quod computruit sublatum est, ad adurendam ipsius veluti radicem. Est autem in crustantium medicamentorum materia non utique solus calor, sed cum quo adstringendi facultas sit coniuncta, qualis in chalcitide & misy & atramento sutorio, siue vstis, siue inustis. Quæ vero ex calce non extincta conficiuntur, ea utique valentiora his sunt: cæterum calx adstringendi vim non habet. Excidunt igitur citius quæ ab his fiunt crustæ, hærent autem corporibus diutius quæ ab adstringentibus: quod utique longe est utilius in profluvio sanguinis, quando ita prius nascitur in imo earum caro, efficiturque profluenti vasi velut operculum quoddam: unde nec nosmet præcipites esse ad crustas, ubi hæmorrhagiæ periculum imminet, detrahendas oportet, nisi in illis tantum affectibus in quibus propter putredinem candens ferrum admovere coacti sumus. Tunc enim celerrime crustam excidere expedit.

**Ἐξάντη** extrema. Sic dicitur **τὰ ἄκρα**, hoc est manus pedesque, apud Hippocr. significat verò etiam **ἡ ἰσχυρὴ** apud eundem vigorem seu statum morbi: ut aphor. 7. lib. 1. quo ait per acutum morbum extremos labores statim habere, hoc est accessiones & symptomata. id enim nihil aliud est, quam morbum in vigore esse, sicut Galen. extremo lib. 1. de diebus decretoriis interpretatur.

**Ἐχέμεν, πλινθίον**. prope. apud Hippocratem.

**Ἐπίκρητον**. genus hordei, quod nunquam rubigine vitriatur, quoniam incurvum nascitur.

**Ἐπιτοκρῆτα**. idem quod **ἡ ἰσχυρὴ**.

**Ἐπιπροπῆτες**. dicuntur apud Hippocratem **ἡ πρὸς διαίτης ἔξων**, dies magnas in utrumque, hoc est tum ad salutem tum ad mortem, vires habentes. Siquidem insignes ab his mutationes contingunt. Eiusmodi quidem sunt dies impares.

**Ἐπὶ ῥυθμῷ σπυγμῷ**. ex pulsus qui rhythmum remotioris alicuius ætatis, naturæ, sexus, partis anni, & reliquorum quæ peculiare pulsus habent, proprium mutantur. Species est **ἡ ἀρρυθμία**, ut qui nullius proprium rhythmum cōseruet. Cuius etiam cum species sit, **ἡ ἀρρυθμία**, ab eo tamen differt, quod hic propinquæ vicinæque ætatis, naturæ & reliquorum proprium rhythmum habeat, ille vero, multum ab iis remotus. vide **ἀρρυθμία**.

**Ἐπύλαι**. Etesia. Anniverfarii venti, qui circa decimum vel duodecimum diem à Caniculæ ortu flare incipiunt, usque ad Arcturi exortum, hoc est usque ad æstatis finem. Qui eos

antecedunt venti, **ἡ ἰσχυρὴ** appellantur. Eos autem Canis ortus dirimit.

**Ἐπύλας**, edulium est ex leguminibus fractis conculisque paratum. Itaque ex omni leguminum genere fieri potest, faba, lentè, panico, milio, anena, frumento, sicut ex eorundem farina **λέκκος**. Sic enim Galenus distinxit lib. de bono & malo succo. ita ut **καυμὸν ἔπυλας** non aliud sit quam faba fresa elixata, & **καυμὸν λέκκος** nihil aliud quam fabæ lomentum elixatum. vide **λέκκος**.

**Ἐπύλας**. annus. vide **ἐπύλας**.

**Ἐπύλας**. sic dicta est apud Macedonas quercus quæ dulcem glandem produceret, quasi veri quercus.

**Ἐπύλας**. sic videtur ab Hippocr. dici **ἡ ἀνέμια**.

**Ἐπύλας**. medicamenti nomen convenientis ad hæmorrhoidas, cuius Nicomedes medicus author fuit, sic dictum à lenitudine describitur à Gal. lib. 9. **ἡ ἔπυλας**.

**Ἐπύλας**. sic à quibusdam dicta fuit **ἡ γλαυξ**, ut habetur apud Plinium.

**Ἐπύλας**. dicuntur ii quibus libera corporis transpiratio est, quod hominum genus nec assidue agrotat, nec longo tempore, quod excrementa vsta & fuliginis speciem præ se ferentia facile per halitum digerantur. Id quod Hippocrates testatus est his verbis: Laxitas corporis ad transpiratum, quibus plura percutim feruntur, salubrius: quibus pauciora, minus salubre. Pater autem iuraram esse cutim, ideoque eosdem aliqui tum medicorum tum gymnastarum **ἀραιόσχητοι** appellantur.

**Ἐπύλας**. dicuntur homines quibus facile sanescunt ulcera, quibus opponuntur **δυσπύλας**: Vtrorumque mentio fit à Galeno libro sexto meth. med.

**Ἐπύλας**. bonus habitus. Species est **ἡ ἔξων**, hoc est habitus: sed de bono tantum dicitur. malus enim **καχέξια** vocatur. Est autem duplex **ἡ ἔξων**. una est **ἡ ἀπλὴ ἔξων**, quæ in optima corporis constitutione deprehenditur: altera vero, **ἡ ὀχρὰ ἔξων**, sed **μετὰ σπυγμῷ ἔξων**, quam habent singulae corporum naturæ propriam, & in comparatione dictam. Itaque **ἡ ἀπλὴ ἔξων** nihil aliud est quam **ἡ ὑγιανὴ ἔξων ἡ πλεονέκτης**, hoc est perfectissima & absolutissima sanitas, quam sequuntur necessario, bona omnium partium temperies, actionum robur, euchymia, & præterea sanguinis, carnis, totiusque corporeæ molis symmetria. Et quia species & ipsa **ἡ ἔξων** est, non facile à causis insalubribus offenditur, sed firma constansque in corporibus perseverat. Quæ autem ab hac deficit, modo nondum vitiosa sit, non iam **ἔξων**, sed ab omnibus **ἡ γίνα**, hoc est sanitas, nuncupatur, quæ eadem est cum **ἡ μετὰ σπυγμῷ ἔξων**. Tunc enim non simpliciter, sed huius vel illius **ἔξων** dicitur. Sic **ἡ ἀπλὴ ἔξων** non simpliciter dicitur, quoniam optima non est, quam periculo proximam esse Hippoc. pronunciauit, & negavit natura esse comparatam: nam ut reliqua habeat optima, arta-

men sanguis & p̄cipue carnosum genus in ea supra modum excreuit.

*Eucrois*.

*Eucrois*. sic dicta est eruca propter suauitatem, quasi iustibus grata.

*Euphras*. facilis, simplex, & p̄cipue sic dicitur ab Hippocrate morbus qui nihil habet malignitatis & facile soluitur. annotauit tamen Galenus comment. 3. in lib. 1. prorrheticis, *eufrasi* aliquando significare & *eufrasi*, & multos veterum videri eo verbo vsos in hac significatione: quanquam significet etiam & *eufrasi*.

*Euphras*. *eufrasi* *eufrasi* *eufrasi*. ingenitus corporis habitus, apud Hippocrat. vide & annius *eufrasi* vocatur, & *eufrasi* *eufrasi*, hoc est, fertilis & fecundus.

*Euphras*. sic à quibusdam dicitur *eufrasi*, vt habetur apud Theophrastum libr. 9. cap. 13. sed non sine mendii suspitione.

*Euphras*. dicuntur quæ in rectum è curuo reduci possunt vide *eufrasi*.

*Euphras*. *eufrasi*. tensio recta siue in rectum procedens, quæ vñq; membrum quod fractum est, tendit in directum: de qua Galenus lib. 6. meth. med. in glossocomi mentione. vide *eufrasi*.

*Euphras*. rectitudo, rectus trames, recta via. Non est aliud quam directio quædam meatuum per quos humorum deductiones commode fieri possunt. Hippocrates peculiari nomine *eufrasi* vocauit.

*Euphras*. *eufrasi*. apud Hippocr.

*Euphras*. bona probaque temperies, quæ ex optima & conuenienti mistura calidi, frigidi, humidi & sicci prouenit. Illa sua cuique est, ex quo patet magnam esse eius latitudinem. Ea proprie partium similarium est, & prima est omnis earum functionis causa. Hanc qui adeptus est, *eufrasi*, hoc est optime temperatus, dicitur.

*Euphras*. non solum significat cubile, sed & costum apud Hippocr. vt lib. 2. de morbis mulierum: *eufrasi* *eufrasi* *eufrasi*, id est, coitu vehementissime offenditur.

*Euphras*. sic dictum est à Pythagoricis lactuca quoddam genus suapte natura latum & caule viduum, quasi spadonum, quoniam maxime refragetur veneri.

*Euphras*. *eufrasi*. *eufrasi*. hoc est moribus melioribus seu facilibus, apud Hippocr. *eufrasi* enim dicuntur ei *eufrasi*, & ita inter mores censentur.

*Euphras*. epitheton vinculi apud Hippocratem *eufrasi* *eufrasi*, quasi dicas gestabile. sic autem vinculum vocat, quod bene gestat & sustinet, hoc est firmiter, & sine ulla compressione continet.

*Euphras*. est herba fruticosa surculosaque vnicum efferens caulem, tenuem, lignosum, subrectum, nigricantem, hirsutum, cubitalem & aliquando ampliorem, folio per intervalla inciso & magna ex parte quinquepartito: semine leuiter plumoso, & medio caulo profligente. A rege sic nuncuparum

esse multorum opinio est: alii *eufrasi* *eufrasi* *eufrasi* appellant. videtur ea esse quæ in officinis agrimonia dicitur. Quod enim in illis eupatorium vocatur, sunt qui putent esse & *eufrasi*, siue piper aquosum.

*Euphras*. dicitur à quibusdam & *eufrasi*, vt habetur apud Dioscor.

*Euphras*. facile & prompte, apud Hippocr.

*Euphras*. spirandi facilitas. respiratio quæ secundum naturam fit, apud Hippocr. vt annotauit Gal. comment. in prognost.

*Euphras*. expeditio, promptitudo, facilitas, apud Hippocratem.

*Euphras*. sic à nonnullis dictus est lapis iudaicus, quasi facile fluens, quod urinam mouere & calculos frangere dicatur.

*Euphras*. *eufrasi*. pulsus eurythmus. Est pulsus eurythmus, seruans rhythmum proprium ætati, naturæ, temperamento, partu anni & reliquis omnibus circumstantiis. Nam cum suus sit cuique ætati naturalis pulsus, qui rhythmum seruat ætatis, *eufrasi* vocatur: vt qui eum labefaciat, & *eufrasi*. Idem de naturis ætatis temporibus & locis omnibusque aliis statuendum, quod horum singulis certus quidam rhythmus sit, qui seruatus *eufrasi* pulsus facit. Eum autem qualis sit Galen. lib. 3. de pulsuum causis in singulis generibus sigillatim explicauit. vide *eufrasi*.

*Euphras*. iunci genus, cuius semine somnum allici dicunt.

*Euphras*. sinus, cauitas & spatium internum.

*Euphras*. caries, sitis, putredo: *eufrasi* Gaza apud Aristotelem exponit vermiculari, atq; Dioscorides *eufrasi* *eufrasi*, quæ situm sentiunt, quæq; nimis inueterarunt & mucam redolent.

*Euphras*. homo bene habitus, optime compositus. Linacer apud Galenum quadratum interpretatur. Is porro est quem nec gracilem dicere nec crassum possis, sed nec castidum nec frigidum; nec alio quouis nomine ex his quæ excessum defectumue indicant appellare. Est enim eius habitudo media, qui sicuti debitam partium conuenientiam speciemque inculpata habet, ita mediocri & nullis vitis obnoxio temperamento est.

*Euphras*. sic dicta est à quibusdam & *eufrasi*, vt habetur apud Dioscoridem.

*Euphras*. cibi appetens, & *eufrasi* quod cibi appetentiam excitat, vt apud Hippocr. *eufrasi* *eufrasi* *eufrasi*, id est, iam vero & labores & longiores professiones cibi appetentiam inducunt.

*Euphras*. significat apud Hippocr. valde mite & blandum, quodque cito consistit, & veluti in æquilibrio positum nihil habet periculi, vt interpretatur Galenus.

*Euphras*. montanum hordeum, quod alio nomine & *eufrasi* appellatur.

*Euphras*. est collyriū *eufrasi* Oribasii describitur ab Aetio. quod aliis etiam nominibus *eufrasi* & *eufrasi* vocari scribit.

*Eunotus*, dicitur à Gal. motus qui violenter & sine velocitate fit. nam qui cum violentia celeritatem habet, *αποσπης* appellatur. ut ait lib. 2. sanis. tuenda.

*Euphorbia*, sine

*Euphorbia*. est arbor ferulacea nascens in Aphrica, succo madens acerrimo, lacteo, & valde renium partium. Ab incolis propter eximium eius ardorem non sine metu legitur. Quapropter ventriculos omnium elutos, in quos succus profluit, arbori adalligant, & eminus caulem contrisicidunt, confestimque è plaga tanquam è vase quodam magna vis eius in subiectos ventres effunditur. Huius autem sacci duo sunt genera, vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo translucidum: alterum vitreo nitore, in ventriculis concretescens. Eligendum est translucens & acre: sed difficile gustus experimentum, quia vel leni linguae tactu os accensum diu detineat, & ad mota omnia euphorbium respere faciat. Vim habet discutiendi suffusiones & sedandi coxarum dolores, in odorifera portione haustus, aut cum melle cocto. sic enim eius drachma una epota, ut scribit Paulus, pirituram, vel potius aquas: exturbat atque emolitur. Euphorbium Iuba Prolemæi pater appellavit nomine inuentoris medici sui & fratris Mulsæ, à quo Cæsar Augustus conservatus est, dicato illi priuatim volumine. Fit autem ex eo ceratum ad netuos vulneratos optimum, cuius descriptio habetur apud Aetium lib. 14.

*Euphorbia*. herba est hyssopo similis, cauliculis purpureis, folio paruo & per ambitum serrato, flosculo albicante, quæ in opacis collibus nascitur. De ea veteres nihil prodidere scripto, etsi Græcam nomenclaturam præseferat. *εὐφροσύνη* forte dici debuit, quod faciat ad animi hilaritatem. Valet autem ad oculorum caligines & suffusiones.

*Euprosium*. dicitur à quibusdam τὸ βούλων, cui dos hæc præcipua traditur quod in vinum coniectum animi voluptates auget. Dicitur & eo nomine *εὐφροσύνη*.

*Euphorium*. nomen emplastri quod describitur à Scribonio Largo, & ab eo appellatur Tryphonis viride emplastrum. Est & huius nominis cataplasma quod habetur apud Gal. lib. 4. τὸ τῆς ὀφθαλμοῦ, oculis conueniens.

*Euphorium*. dicitur alimentum quod boni succi est. Id autem duplex est, tum quod portionem quandam boni succi continet ad nutriendum habilis, sed plurimum habet recrementi, tum quod plurimum habet quod nutrire potest, minimum autem quod sit inutile, ut habetur apud Galen. lib. 9. meth. med.

*Euoletis*. bene olens, de quo vide *εὐοσμήτης*. est & nomen malagmaris, quod habetur apud Paulum lib. 7. Item collyrium quod alio nomine *αἰσθητικόν* & *αἰσθητικόν* appellatur, & à Scribonio Largo describitur.

*Euoletis*. est arbor Punica mali magnitudine atque folio eiusdem, maiori quam vincaper-

tuinca, & ut Punica tenero: flore albo & violaceo proximo, odore grani ac pestifero, folliculis sesami, in quibus acinus quadrangulus, solidus, pectori gustatu lethalis. Sunt qui eam *αἰσθητικόν* vocent.

*Euphorbia*. herba quam & caucum appellant.

*Euphorbia*. αἰσθητικόν. hoc est nates.

*Euphorbia*. herba quæ & *εὐφροσύνη* & *αἰσθητικόν* dicitur. Sic vocatur ab insidendi natura: ascendit enim proximas arbores, & iis insidens coma propendunt iuncea. Vide *αἰσθητικόν*.

Significat etiam *εὐφροσύνη* apud Hippocrat. sedem vel corpus aliud stabile, ut in eo desiderare aliquis firmiter possit, ut exponit Gal. comment. 2. αἰσθητικόν.

*Euphorbia*. crustula quæ vlceri obducitur. Dicitur tum de externis vlceribus, tum de internis: quandoque enim crustulæ eiusmodi & per tusses è pulmonibus, & per deiectiones ex intestinis vacuantur.

*Euphorbia*. nomen emplastri egregie resiccantis, quod & *μαλός* alio nomine dicitur. Eius descriptio habetur apud Aetium lib. 10. inter remedia hydropicorum.

*Euphorbia*. pubes. pecten. Id torum quod est ab hypogastrio vsq; ad pudenda, ut scribit Rufus. Dicitur etiam *εὐφροσύνη*.

*Euphorbia*. pubertas. idem quod *εὐφροσύνη*. vide *εὐφροσύνη*.

*Euphorbia*. quid sit, ait Celsus lib. 5. Cap. 5. à plerisque ignoratur, cum nihil aliud firmissi asperitas quædam & durities mali coloris. Prouenit potissimum in facie ex inflammatione aut ardore solis: præsertim vero, ut scripsit Crito, circa malas & nasum eiusmodi maculæ apparent, non quidem in alto fixæ, sed instar flosculorum productæ. Nomen inditum *εὐφροσύνη*, non quod à sole tantum vitia illa in cute contrahantur, sed quod à reliquis inducta causis, similem asperitatem & colorem habeant. Quæcunque enim causa ea excitat, cutis ceu multo sole exusta, candorem & lætiorem amittit, contrahitque nigritiem & aspredinem. Plinius aliquando discoloriem à sole cutem, aliquando à sole vsta, vel à sole adusta interpretatur, eoque vitio deformes solares appellat. Alii vitia cutis simpliciter Latine reddunt.

*Euphorbia*. ephemerum. Duplex est Dioscoridi & Galeno, vnum quod irim syluestrem dixerunt, foliis & caule lilii, tenuibus, radice oblonga, vna, digitali crassitudine, saporis adstricti, odoris non ingrati, flore candido, amaro, semine vero molli. Ea videtur esse quam lilium conuallium, & rura muschetum appellant. Alterum vero deleterium & lethale est. Alii *καλχέον*, Romani bulbum agrestem vocant. flos illi croceo similis, subcandidus, caulis semipedalis, semen rufum, radix rotunda, foris è nigra rufescens, quæ desquamata intrus albicet, tenebraque ac lacte succosa, gustatu dulcis inuenitur, fungorum modo ingulat, bulbi similitudine inuitante. A quibusdam hermodytyli genus esse proditur. Verum Ruellius



contendit hermodactylos à quibus caraporia tantopere commendantur ad podagras, non esse ephemerum, fretus autoritate Aetii & Pauli. Vtrique ephemerum et si nomen vnum est, diuersa tamen est nominis ratio: illud enim sic dicitur quod flos illi confestim deciduus, non longius vno aut altero die commoretur, aut decerpto longior vita quam dies, nullam enim ei vim mortiferam Dioscor. & Gal. tribuerunt: hoc vero ita vocatur, quod eodem die perimar. de hoc vide Nicandri Alexipharmaca, quæ nos aliquando versibus Latinis reddidimus.

*Εφίμαρον*. dicitur à quibusdam *καίμαρον*, id est cicuta, ab interitus celeritate, vt Phocion author est.

*Εφίμπερος*. diaria febris in spiritibus accensa, cuius tota constitutio vnta accessio est horarum viginti quatuor. Hanc excitant causæ febribus aliis communes; præter putredinem: motus multas tum corporis tum animi, quies immodica & ommissa exercitationum consuetudo, suppressio calidi effluuii densata cute, obstructio mediocris à succo multo, crasso, lento si modo per initiare recte tractetur, alioqui facile in putridam transit; præterea contractus calidæ substantiæ, satietas & ebrietas, cruditas, fames, & omnes animi affectus vehementes. Huius febris signa sunt in primis calor mitis & blandus, pulsus nullam habens inflammationis notam, nullamque omnino inæqualitatem in vna pulsatione, aut certe minimam: vntæ omnino similes naturalibus, aut parum ab his mutatur, bene coloratur & rufatur, in quibus quod vel pendet vel subsidet, optimum est: adhuc facilitas tolerandi accessionem. Est enim hæc febris mitissima, quia calor illi vaporosus est, quibusdam primo manus occurfu, aliis paulo postea. hæc quidem sunt diariæ febris signa communia. Singulæ autem quædam habent sibi propria, quæ naturam causarum sequuntur, à quibus sunt excitatur.

*Εφιδρσις*. significat apud Hippocratem *εφιδρσις* exolutionem virium corporis ab humido calore inductam, quasi corporis quandam elixationem, vt Gal. in comment. annotauit.

*Εφιάλτης*. incubus. Est nocturna corporis oppressio & suffocatio. Quidam demonem esse putauerunt, aut externam quandam vim quæ quiescentes inuaderet, & pondere suo oppressos gravaret: ex quo nomen *εφιάλτης* indiderunt, quod hoc malo correpti imaginantur se ab aliquo iniuri & violari. At demon non est, nec vis vlla externa, sed tota mali causa intra corpus est. Ea autem est non humor, sed crassus & frigidus vapor, vt scripsit Posidonius, ventriculos cerebri implens, & prohibens spiritus animales per nervos ferri. Per somnium tantum fit, coque laborantes per ipsam accessionem eadem patiuntur quæ & apoplexia correpti; sed tamen mitiora. Quia

enim vapor in causa est, non in totum opulentur ventriculi cerebri, ne tam diffculter excitantur qui eo laborant. Manent tamen aliquandiu immobiles: deinde vero multo labore & conatu tenuato discussoque spiritu, & meatibus obstructione solutis, de repente è somno excitantur. Læditur illis potissimum imaginatio: ex quo verisimile est in priori potissimum ventriculo morbum consistere. Ex his intelligi potest incubi differentia ab apoplexia & epilepsia. Præludium tamen procæmumque eorum morborum est, atque etiam insaniz. Diuturnior enim & frequenter repetens, crudus humor in ventriculis cerebri paulatim cumulat, in eos facile degenerat. Præcedunt incubum suffocatio, vocis amissio, gravitas & immobilitas; & hæc rursus crapulæ & cruditates ex quibus crassus ille frigidusque vapor suscitatur. Proinde quidam morbum hunc recte quidem, sed imperfecte definierunt, *πύλωσις καὶ ἀπύλωσις*, hoc est, vaporum in caput discursum ex nimio cibo & cruditate. Themison vero à suffocatione *πύλωσις* appellauit.

*Εφιδρσις*. antiquis vocata est *προνία*, vt quæ aduersus *εφιδρσις*, hoc est suppressiones incuborum nocturnas, valeret.

*Εφιδρσις*. duo significat, vel sudoris circa thoracem & caput exortu, vel in vniuerso corpore sudoris prouentum qui & paucus sit & inutilis: cumque eo nomine frequenter prothetici autor utatur, non liquet tamen vtro modo *εφιδρσις* intellexerit, vt annotat Gal. in comment.

*Εφιδρσις*. *εφιδρσις*, apud Hippocratem, diffusi sunt & dispersi.

*Εφιδρσις*. dici solet proprie de hostibus aut latronibus. Sed ab his Hippocrates transtulit ad dies criticos, appellans *εφιδρσις* *εφιδρσις*, hoc est periodos dierum criticorum, vt annotat Galen. comment. in Prognost.

*Εφιδρσις*. sic dicta est à quibusdam *εφιδρσις*, vt habetur apud Dioscoridem, nisi *εφιδρσις* legendum sit.

*Εφιδρσις*. dicitur medicamentum glutinosum & tenax, quod affectæ parti appositum extrinsecus firmiter adheret, vt ipsum vinculo contineri non necesse sit. Idem distrahendo plurimum extendi potest.

*Εφιδρσις*. Sequitur pro Appetit & affectat & coniectat. quæ sanie omnia vim eam habent, vt significant quænam vires & quæ opera eius sint de quo dicitur. Appello autem opera nunc non operationes, sed effecta, sicut ædificatoris domus, fabri lectica, textoris vestis est. Galen. comment. 1. *εφιδρσις* *εφιδρσις*.

*Εφιδρσις*. *εφιδρσις*, hoc est alba bryonia, apud Hippocratem.

*Εφιδρσις*. non recensetur vel à Galeno, vel à Ruffo inter partes corporis humani. Eustathius tamen

tamen in Odyss. & scribit partem ventris esse, sicut & τὸ ἄνθος Nicander in Theriacis:

Ἢ ἰδίῃ τῷ δὲ, τὸ δὲ ἡγεῖσθαι ἐξῆς,

Ἄνω δὲ ἐλατὶς ἡ κατὰ φύσιν.

Dicitur autem à multis eo nomine designari sinum illum ventris in ruminantibus animalibus qui parte interiore asper est, cancellatus, crustatus, & magnitudine reticuli. Hermolaus omasum interpretatur. Vocatur & ἐξῆς in stirpibus quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumen, ab etinacci marini similitudine.

Dicitur & à Galeno ἐξῆς herba, quæ alio nomine ἔρπος, aliquibus ἀνιμωδὴς, Romanis ocimum aquaticum appellatur. Significat etiam ἐξῆς ollam magnam multumque patentem apud Hippocratem vt annotavit Erptianus.

Ἢ χῆν. herba est cui folia prælonga, hirsuta aliquantum tenuia, anchusæ proxima, sed minora, subrubra, pingua, & spinulis horridula. calliculi exiles & numerosi, quibus minuta utrinque folia, expansa, pinnata, nigra, in summo caule minuscula, flores secundum folia purpurei, in quibus semina insident viperarum capitulis similia. à quibus nomen videtur habuisse. Auxiliatur vero etiam demorsis à serpentibus, cum vino pota. Sunt qui anchusæ speciem eam esse dicant quam ἀνιμωδὴν appellant. Nicander etiam ἐξῆς in Theriacis vocauit.

Ἢ χῆν. species vna ἢ ἀνιμωδὴς apud Plinium.

Ἢ χῆν. κατὰ φύσιν. ἢ ἀνιμωδὴς, qui detinetur & cogitur: apud Hippoc. aphor. 16. lib. 6. vt in comment. Galen. annotauit.


Ἢ χῆν. sic dicitur flos cnici, vt tradit Hermol. in Dioscor.

Ἢ ψαλλ. genus piscium apud Hippocr.

Ἢ ψαλλ. ἢ ἐψαλόν. sapa, defrutum. Vinum ad tertiam mensuræ partem vel dimidiam etiam decoctum. vt apud Dioscoridem cap. de nitro, lib. 5. ἢ ἀπὸ τοῦ ἵππου ἢ ἀπὸ τοῦ βοῦς ἢ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ τῶν ἄλλων δυνάμεων πρὸς τὴν ἰσχυρίαν, ἢ τῶν ἄλλων δυνάμεων πρὸς τὴν ἰσχυρίαν. hoc est, Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur in hydromelite, aut sapa aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt. ἢ ἰσχυρίαν etiam id Græci appellant. Nec tamen ἢ ψαλλ. pro sapa semper vsur-

paratur, sed aliquando simpliciter pro decocto & coctura, vt apud Galen. lib. 2. ἢ ἡ χῆν, cum ait ἐλατὶς ἡ κατὰ φύσιν, ἀνιμωδὴς ἢ ἡ χῆν, hoc est, non statim coctionis initio, sed postquam coctione iam quodammodo intabuerint. Vide ἢ ἰσχυρίαν.

Ἢ ἰσχυρίαν. elixatio. Est coctio indefiniti humoris facta à calore humido. Genere quidem ἢ ἰσχυρίαν est. fit ab humido calore: quæ enim elixantur, & ab aqua calida, & in calore humido concoquantur. Perficitur autem eiusmodi concoctio, definito eo humore qui indefinitus, hoc est, flatusosus vel aquosus, mistus erat reliquo humori. Est autem elixatio eorum proprie quæ possunt elixari. Non est autem elixabile tum in quo nihil humoris inest vt lapis, tum in quo aliquis quidam est, sed propter densitatem superari & excerni non potest, vt lignum: sed id cui humor inest ab humido calore passibilis. Quod si alia elixari dicantur, id non proprie sed per metaphoram & similitudinem quandam dicitur. Sic enim aurum elixum esse dicitur, cum ignis vi humorem alienum remiserit. Dicitur similiter & lac & mustum elixum esse non proprie, sed metaphora & similitudine quadam, quum flatus aut aquosus humor discussus concoctusque est, etiam si eorum concoctio propius quam auri & ligni & similibus accedat ad veram elixationem. Nec tamen proprie elixari dicuntur, quod neque lac neque mustum dum coquantur, posita sint in humore calido, neque ab eo concoquantur illorum humiditas, sed ignis vasi in quo continentur circumfusis eorum humiditatem concoquat. Est autem elixis proprium vt seipsis ficciora euadant: humor enim qui circumstat, propter calorem attrahit ad se rei elixæ humiditatem, eaque facile sequitur propter pororum laxitatem, contra quam in iis quæ assantur, in quibus conclusi & continentes ab ignis calore pori humorem intus continent. Quo fit vt elixa proprio humore destituta, ficciora intus sint assis: foris autem alieno humore madeant. Elixæ tamē nutrimentum humidius præbent quam assa, præsertim si in aqua dulci elixa sunt: omnes enim qualitates quæ initio sibi inerant deponunt, ita vt tandem ἀραιὰ & aquosa euadant & aquæ qualitatibus prædita.



# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

### T O Z.



**Zingib.** barbarum nomen est, sed tamen à Græcis recentioribus usurpatum. Est autem radix teres, aristolochiæ non ab-  
similis, sapore & colore gingiberis, quæ ex India ad nos deferretur. valet aduersus pestilentiam.

**Zadup.** idem quod *zadvea*, vt author est Aetius.

**Zaccharis.** sic voluit Nicander rapam appellari. Alii vero non rapam, sed cucurbitam ita dici arbitrantur. Reperitur & *zaccaris*.

**Zaccus.** dicta est à quibusdam *zaccum* dicitur, vt habetur apud Dioscor.

**Zea.**

**Zea.** frumenti genus est tritico simillimum, radice multiplici & alba, culmo numerofo, sed tritico fuscior & minus. Dux sunt eius differentia, vna simplicis grani, altera gemini duabus tunicis inuoluti, quæ ob id *sinuæ* cognominatur. Ex zea olim fiebat alica, sicuti far ex frumento: æque est assentendum Asclepiadæ, qui authore Gal. cap. 3. lib. 9. *zæ* & *zæum* far & zeam idem esse existimauit. Siquidem *zæ* Latini non far ipsum, sed semen ex quo parabatur, à frugis præstantia appellarunt.

**Zæum** autem & *zæum*, hoc est, pro filigine, usurpauit Hippocrates, vt scripsit Galen: & *zæum*.

**Zæum.**

**Zæum.** frumenti genus, medix inter zeam & triticum naturæ: nascitur in Bithynia.

**Διαζυμάν.** Collyrii nomen est quod habetur apud Paulum lib. 7. cap. 16.

**ZZ.** duplex, apud medicos veteres *zæum* dicitur, hoc est, myrrham designabat, vt annotauit Hermolaus Barbarus lib. 1. corollariorum, propterea quod *zæum* perinde atque *zæum* diceretur. Nunc tamen vulgo per duplex *zæum* omnes zinziberi intelligunt, magno & periculoso errore.

**Zæum.** est fordes animantis odoratissima, ex eius genitalibus locis deprompta. Nonnulli è recentioribus Græcis hoc animalis genus *zæum* vocant, vulgus nostrum hodie suetram nominat.

**Zinziber.** zinziber. planta est in Arabia Troglodytica magna ex parte nascens: qua virente ad multa, perinde atque nostuta, vtuntur. Radices habet cypeti modo paruas, candicantes, odoratas, & piperis sapore. Impense calefacit: nec viribus dissimilis est piperi, vt scribit Dioscor.

**Zinziber.**

**Zinziber.** est species caliz purpurei coloris crassiore sarmento, rosam spirans, & præcipui in medicina vsus. vide *zæum*.

**Zinziber.** sic dicitur à quibusdam *zæum*, hoc est, lolium.

**Zinziber.** arbor est flore oleæ, sed magis odorato, cuius fructus corni baccis similior est quam malis. Est duum generum, vt scribit Columella, vna rutila, altera candida: omnibus officinis iuiuba dicitur.

**Zinziber.** idem quod *zæum*, myrrha.

**Zinziber.** carpinus. arbor procera: sic dicta quod ex ea iumentis iuga optima fiant, quia, vt scribit Vitruuius, fragilis non est, sed habet vtilissimam tractabilitatem. Galli charme vocant.

**Zinziber.** est serpyllum sylvestre, quod rectum exilibus ramulis & longis attollitur, foliis rutes, oblongioribus & angustioribus, flore gustu acti, odore incundo.

**Zinziber.** os iugale, iugamentum. Est os ex duabus, vna ossis temporalis, altera ossis parui oculi angulum constituentis apophyses, inter oculum & aurem coeuntibus conglutinatum. Nec vero interest apophysesne an ecphyfes dicantur, harum quidem posterior, à capitis osse quod iuxta aurem est: anterior vero ab osse quod ad paruum oculi angulum est, procedit, iunguntur autem in medio sutura obliqua. Ob id *zæum* siue *zæum*, quasi coniugiale & ex duobus coniugatum, vocatur. Est autem solidum & durum in lapidis modum, medullæ expers, & foris quidem gibbum: intus vero cauum, quod musculum temporalem quæ subiectum habet, & cui velut propugnaculum obiectum est, contineret & ab externis iniuriis vindicaret. Siquidem sub hoc osse musculus ille magna ex parte delitescit.

**Zinziber.** zythum, est potus qui fit ex hordeo aqua macerato resolutoque in liquorem vino similem, qui propterea *zæum* dicitur, hoc est, vinum hordeaceum, à quibusdam dictus est. Inebriat enim perinde ac vinum, & acris gustu est ex putrilagine quam ipsa præparatio-  
ne concepit. Dioscorides scripto prodidit eum vrinam ciere, renes & neruos tentare, membranæ præsertim cerebrum vellentibus officere, inflationem parere, vitiosum succum creare & elephantiasim gignere.

**Zinziber.**

**Zinziber.** fermentum. Est farina subacta, quæ acorem contraxit. Subigitur aqua priusquàm addatur sal, & quia non perfecte coquitur, putrescit, caloremque & acrimoniam à putredine concipit, vt & alia quæ putrescunt

omnia

omnia. Simul autem & tennitatem partium & aciditatem acquirit, quemadmodum acetum quod putrescente vino tale euadit. Ergo quanto vetustius fermentum fuerit, tanto est prastantius. Sic enim calidius acius, & tenuius est, magisque ea quæ in alio fixa sunt attrahit & discutit. Miscetur ob id panificiis, leuioremque panem & concoctu digestuque faciliorem exhibet. miscetur & medicamentis extrahentibus & digerentibus, atque etiam suppurantibus.

*Ζύμωσις*. fermentatio, vt Plato definiuit, est *ἡ κίνησις τῆς βίης ἀπὸ τῆς ἀέρος*. hoc est, terrenæ substantiæ motus simul & in aerem resolutio. Est enim motus fermenti vi factus in terreno crassoque corpore, quo in tumorem leuem attollitur, conceptoque aere distenditur, inflatur, & quodammodo ebullit. Id quod fermentum farinæ triticæ subactæ inditum, euidenter præstat, & in multis rebus tum simplicibus tum compositis quæ per se eam vim fermenti æquirunt, manifesto cernitur. Ipse enim vini feruor in dolio, & solidiorum medicamentorum vt Mithridatii, theriacis & conseruatorum, vt appellant pharmacopola, ebullitio (neque enim Plato inter *ζῆον* & *ζύμωσιν* distinxit, vtrumque eadem definitione comprehendens) quædam fermentatio est, etiam si inde acida non fiant, vt nec ipse panis fermentatus. Idem effectus & in atra bile apparet, quæ incendio bilis flauæ genita, terram in quam effusa fuerit, abradit, & partes quæ aduntur omnes in altum attollit. Est enim is humor aceto simillimus, ex quo in terram effuso idem omnino fieri apparet, eumque propterea veteres humorem acidum nominauerunt, æque vt pallidæ bilis, amarum. Ab eadem causa etiam *ἡ ἐξ ὀσμίνων*, hoc est, vrinæ fermentatæ, dicuntur ab Hippocrate, vt annotat Galen. comment. 2. in lib. 1. prorrhæ. Sicut enim in terram acetum acre effusum protinus intumescens quædam terræ partes sursum simul attollit, fitque compositum quoddam ex terrestri substantia, aceti humiditate, & vaporoso spiritu, aut quemadmodum effusa in terram atra bile, aut in feruente musto, motio quædam spiritus manifesta assurgit, aut sicut in panibus quotidie misto farinæ subactæ fermento & mediocriter macerato fermentatio fieri cernitur, fusa simul & intumescens quæ fermentatur substantia: sic & in vrinis aliquando crassis multum spissisque leuis quidam feruor per agitationem excitatur, motisque & rarefactis spiritibus in ea conclusis, in maiorem quam cum primum excreta fuerant, tumorem attolluntur.

*Ζύμωσις ἡπατος*. iecinoris tumor œdematosus, apud Hippocr. vt annotauit Erotianus.

*Ζωή*. vita. Est coniunctio animæ & corporis. Hæc enim coniunctio cum primum in utero cæpit, & quamdiu durat post ortum, homo viuunt, adeo vt vita aliquot locis à Galeno

dicatur actio animæ primaria. Continetur autem ea coniunctio vno calore nativo, quo quidem vt præsentem viuimus, sic extincto morimur. Quamdiu enim vel scintilla huius caloris erit in corpore, vita erit, vitæque functiones, licet aliquando valde obscuræ, perseuerabunt. Quod autem eo quasi vinculo vita constet, mors ipsa ostendit, quam omnes philosophi caloris huius extinctionem esse prodiderunt. Vita igitur consistit in calore, non eo quidem elementari, sed diuiniore, vt suo loco dicetur, ita tamen vt non sit censendus opifex omnium functionum, atque causa per quam omnia in corporibus nostris perficiantur (id enim animæ proprium est) sed tanquam instrumentum animæ eiusque facultatum, sine quo nihil prorsus agere valeant. Abundat ille vigetque potissimum in corde, à quo tanquam è fonte quodam in omne corpus diffunditur. Ex quo patet vitam in corde tanquam in penu conditam, in omne tempus eius beneficio distribui, quod propterea primum viuunt postremumque moriuntur, sedemque in medio habet corpore, quo vitam, calore suo per artérias diffuso, in omnibus particulis tueatur.

*Ζωμός*. ius. ius esculentum, liquor eorum quæ cocta sunt adiectis condimentis: ex quo *ζωμωσις* vocatur à Dioscoride quicquid gratiæ iuribus conciliat, seu quod gratiam in iuribus habet. Cum autem plura sint condimentorum genera, duo tamen apud veteres maxime celebria fuerunt, ius album, & ius nigrum. Illud *ζωμός ὁ λευκός* dicebatur: fuit autem conditura genus coquendis edendisque non piscibus modo, sed Gallorum etiam testiculis & columbarum pullis aliisque carnibus dicatum. Erat quidem, vt scribit Gal. cocturæ genus præstantissimum, atque hunc in modum apparabatur. Copiosa aqua primū iniiciebatur, deinde olei quod satis esset affundebatur, cū pauco aethi & porri: postea cum pisces semicocti erant, salis tantum aspergebatur, quod totum ius falsum non redderet: eratque præparatio eiusmodi etiam ægrotis accommodata, nec eo quidem modo coctas carnes Galenus, vel in febre, vel in dolore capitis ex ebrietate contracto exhibere dubitauit. Tale quidem fuit ius album antiquis, sed simplex. Siquidem alias cum garo & vino, aut alia quadam superuacua cõditura, cuiusmodi *καρυκτῆς* Græci vocant, præparabatur, sed minus salubriter. Dicitur autem ius album ad nigri differetiam, cuius tamen parandi quænam fuerit ratio, ignorare me profiteor. Nigritiem enim potest contrahere varia mixtura & multa præsertim sapa, sicut Galenus comment. 1. in lib. 1. prorrhæ. annotauit. Eo vrebantur senes Lacedæmonii, vt refert Plutarchus in Apophthegm.

*Ζωόν*. dicitur pars ea corporis qua cingimur apud Hippocr. quanquam sunt qui *τὴν ὀστέω* interpretentur, vt annotauit Erotianus.

Est & *zōm* ignis facer, siue heperetis species, sic dicti quod medium quodammodo cingit & complectatur hominem, ut author est Scribonius Largus cap. 62. scribens medicamentum Andronis facere ad carbunculos & ad ignem sacrum & ad zonam quam Greci *ζώνη* dicunt. Sed magis vñtato nomine *ζώνη* appellatur. C. Plinius Secundus in lib. 3. quem scripsit de medicina, ait *ζώνη* quibusdam circinum appellari, fieriq; hunc in modum: vesicæ tanquam combustæ ex-eunt & crepant, primum paucæ, deinde cito multiplicantur, quæ si hominem cinxerint, occidunt.

*Zonæ*. species & *ζώνη*, quæ in fornacibus legitur zonarum similis.

*Zonæ* *ζώνη*. dicitur à nonnullis à *ζώνη* siue secundum maius; apud Dioscoridem, ab oculorum animalis similitudine.

*Zonæ* *ζώνη*. est pix cum cera detasa nauibus maritimis, quam aliqui *ζώνη* vocant. Ea dissipandi naturam habet, quoniam marino sale macerata sit. Sunt autem qui pineam resinam hoc nomine appellarint.

*Zopyrus*. nomen est antidoti quam dicitur Zopyrius regi Prolemæo composuisse atque Ambrosiam nominasse, ut scribit Celsus lib. 5. cap. 23. valens ad colicos dolores & alui inflationes & incipientes hydropas & venena. Describitur à Cōtr. Celso atque à Paulo Aegineta eodem prorsus modo, ac ne ponderibus quidem medicamentorum, nisi admodum paucis immutatis. Habetur & apud Aetium *ζώνη* *ζώνη*, eadem quoque omnino materia constans sed diuersis mensuris. Describit & Scribonius Largus antidotum quandam Zopyri ad lethalia venena & omnem serpentis ictum efficacem, sed plurimum diuersam à superiore.

*Zopyrus* vocant nonnulli herbam quæ *ζώνη* dicitur.

*Zōm*. est ignis facer qui medium hominem ambit cingitq; Scribonius Largus eum alio nomine, sed parum differente, *ζώνη* appellat cap. 62.

*ζώνη*. à quibusdam dicitur species vña fructu marini, cui folium larum virideque est, & ob id *ζώνη* etiam nominatur.

*Zōm* *ζώνη*. est facultas vitæ conseruatix. Nam cum vita non aliud sit quam copula animæ & corporis, eaque vñō calore natiuo contineatur, merito ea facultas vitæ conseruatix haberi debet, cui à natura caloris huius gignendi, continendi, partibusq; omnibus impertiendi cura commissâ fuit. Eam facultatē medici vitalem appellarunt multo præstantiore nomine quam reliquas facultates, quæ quauis tam sint ad vitam necessariæ, ut sine ipsis ea nullo modo constare possit, prærogatiuam tamen eam habet vitalis ut per eam vita consistat. Siquidem calorem natiuum, quo vñō viuimus, soli

moderatur. Cuius rei causa in corde residet, viscere nobilissimo: quod propterea omnium in corpore primum vita fruitur & postremum viuere desinit, si utrumque est medio in corpore, ut quoquoersum calorem suum in omne corpus effundat. Neque enim satis naturæ visum est natiuum calorem singulis partibus in ipsa prima conformatione indidisse, qui fixus à medicis dicitur: sed quoniam multis de causis alterari, imminui, digeri extinguique potest, eum perpetua alterius caloris *ζώνη*, accessione refici atque instaurari oportuit. Quod quidem munus facultatis vitalis proprium est. Eo autem ut defungeretur natura, eor condidit huius caloris sedem, in cuius ventriculo maxime sinistro tanquam in fornace coqueretur. Materia eius pabulumque sanguis est atque sanguis vapor quem dexter cordis sinus suppeditat, qui postea perenni cordis motu elaboratus & calidior tenuiorque effectus vitalis spiritus nomen accipit, non tam iam pabulum caloris illius natiui quam vehiculum. Calor namque natiuus duobus iis communibus in singulas corporis partes per arterias decurrit, earumque perpetua pulsatione calorem ipsis à natura insitum temperat atque refocillat. Idem enim præstat vniuerso corpori arteriarum motus, quod cordi respiratio, quæ aeris inspirati non modo calorem in corde alioqui exardescentem, leniter ventilat, sed etiam adauget, expiratione vero fuliginosis excrementis liberat. Itaq; cum facultatis vitalis munus proprium præcipuumque sit vitæ conseruatio caloris natiui beneficio: vel, si mauis, caloris natiui, quo vñō vita continetur, generatio & custodia: præstari autem id non possit absq; cordis & arteriarum pulsu, ut qui eo in opere habeat rationem causæ per quam vita calorq; natiuus conseruetur: consentaneum est vim quoq; pulsificam facultatis vitalis functionem esse: neque enim pulsus aliud est quam caloris natiui motus. Sed nec minus inter eiusdem facultatis actiones annumeranda sunt animi pathemata, quæ & ipsa motus sunt natiui caloris, sed diuersi à pulsu generis. In pulsu namque tum in ipso corde motus sit, tum per arterias: per animi vero pathemata non in corde modo ciuntur caloris motus, sed per vniuersum etiam corporis habitum sentiuntur. Siquidem in motore & metu, adhuc ira & verecundiæ initio calor natiuus intro cum spiritu & sanguine recurrit: contra in gaudio, ira, & verecundia iam vigente, ad cutem cum spiritu & sanguine plurimus erumpit. Quorum quidem motuum concitandorum facultas *ζώνη* à philosophis appellata fuit. Ex quo paret facultatis vitalis geminam esse differentiam *ζώνη* & *ζώνη*. de quibus suis locis agetur.



# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

### T O H.



**E**n. pubertas. Tempus est ætatis quo lanugo circa pudenda oriri incipit. Id quia incerto fit tempore, vt ait Galenus comment. in aphor. 27. libr. 3. propter frigiditatem temperaturæ (calidi enim

cius frigidi tardius pubescunt.) Idcirco pubertatis initium varium est, aliis in duodecimo, aliis vero à decimoquarto anno vel ferius etiam pubescentibus. Sed cum omnes cum cæterarum rerum tum maxime ætatum mutationes annorum hebdomadibus contingant, initium pubertatis post annum decimumquartum recte videtur à Galeno assignatum. Durat autem vsq; ad vigesimum quintum, sicut Hippocrates sensisse Galenus scribit comment. in aphor. 7. lib. 5. qui de comitiali morbo editus est. Quamquam Modestinus iuriconsultus plenam pubertatem decem & octo annis definiat.

**H**æc. pubes, pecten. Est postrema pars hypogastri siue aqualiculi, qua scilicet pili nascuntur. Dicitur alio nomine *ἐπίλατον* & *ὀπίσθιον*.

**H**æc. ossa. ossa pubis, pecten. sunt apophyses ossis sacri tenues, perforatæ & in anteriora protensæ. Illæ inter se in extremo symphyssi coniunguntur, præcipue in viris: in mulieribus autem laxius cohererent, quo facilius in partu diuelli possint.

**H**æc. implicatus est, apud Hippocr. *ἐμπλεκτός* *ὁ σπυγμώδης*, vt explicat Erotianus.

**H**æc. in. in. insuper, apud Hippocr.

**H**æc. dicuntur. dicuntur apud Hippocr. quæ inter se similia sunt & valde, quasi dicas, cognata. Namque inter cognatos non est maior propinquitas & affinitas quam fratrum: annotat Galen. comment. *οὐκ ἔστιν ἀλλοῦ διαφέρειν*.

**H**æc. in. in. in. in. apud Hippocr. *ὁμοῦ* *ἐστὶν*, hoc est, affine cognatumque est & maxime simile.

**H**æc. etiam si tempus plerumque denotet, sæpe tamen addicitur ad aliquid comprobandum, & significat præsertim, apud Hippocr. vt cum dicimus, *καὶ δὲ τὸ αἶμα καὶ τὸν σπλῆνα*: hoc est, & propter alia, & iam propter hoc annotat Galen. *οὐκ ἔστιν ἀλλοῦ διαφέρειν*.

**H**æc. voluptas, delectatio. Est sensus lenis in corpore motionis: eius fons & radix sensus est, sine quo nulla voluptas esse potest. Plato eam passionis nomine comprehendit, eo significans omnem motum qui fit ab altero in alterum. Epicurus & Zeno definierunt esse, *ἐκπαρὸν ἢ ἀπὸ τοῦ δυνάμει*, hoc est, elationem ob rem quæ sequenda videatur.

Pertinet ad facultatem irrationalem: siquidem ad voluptatem vis irrationalis omnes pertrahit, atque ad eam ex concupiscentia trahimur. Sensibus omnibus, vt & contrarius illi dolor, contingit, sed in oculis minus quam in cæteris, euidenter. in tactu autem & gustu maxime luculenter, ab iis deinceps in odoratu & post hanc in auditu. Communis eius, vt & doloris causa est, naturæ ad se reditus vniuersim & celeriter factus. Quod enim sensum & paulatim fit, sensum latet. Itaque eius quod periclitabatur diuelli, reditus ad naturam simul & celeriter factus, voluptatem adfert. Idcirco oculis iucundissimum spectrum cæruleum est, sicut è diuerso grauissimum tristissimumq; quod splendidum simulque album est, quemadmodum sol, sicut Galen. demonstrat lib. 1. de causis symptom. medii vero colores medio etiam modo. In auditu similiter iucundissima vox est quæ lenissima tardissimaque est & in agris etiam parua & exilis, atque hæc etiam magis quæ numerosa est. Est autem voluptas in hoc sensu quam in visu euidentior, propterea quod est sensu crassiore. sicut in odoratu adhuc manifestior est voluptas, propterea quod adhuc eius substantia est magis crassa: postea in gustu. Omnium autem maxima in tactu, dum ad naturalem statum reducimur. Proinde iis quæ ipsum exasperant, vel concoquendis, vel disslandis, vel sensibilibus excernendis, quia ad naturam suam reuertitur, voluptatem percipit. Quinetiam qui lassitudine laborant, vbi molli frictione, vel in balneo loti, ab iis quiescunt, euidentem sentiunt voluptatem. Nec vero solum lauando aut fricando voluptas comparatur, sed etiam in maioribus doloribus pertractatio quæ mollis, blanda & lenis sit, solatium quoddam non exiguum adfert. Cæterum in omni voluptate sensus, ad quæ ea pertinet, sese totum comparat ad excipendum id quod delectat, vt contra in dolore intro refugit, proindeque spiritus eo accurrit, & magna fit facultatis sensificæ relaxatio, expansis veluti vlnis rem gratam amplectentis. Sic fit vt plurimi maximo gaudio (*ἀνέχονται* Græci vocant, quasi gaudii quendam excessum, oppositum timori subito & vehementi, quem idem *ἐκπαρὸν* nominant) repente interierint prorsus dissipatis spiritibus. Quamquam vero non semper voluptas iugulet, at certe facile resolubilem infirmumque spiritum reddit. Ex quo fit vt omnium maxime imbecilli euadant qui nimias volupeates consecretantur.

H<sup>δύ</sup>. vide paulo post ἡδύσματ<sup>α</sup>.

H<sup>δύων</sup> πικρα. pix odoribus condita, apud Hippocratem coquitur autem cum aqua & aromatibus. Similiter apud eundem ἡδύων σίκαρ dicitur adeps in aqua & aromatibus coctus.

H<sup>δύσκειον</sup>. herba est duum generum apud Dioscoridem: vna sativa, altera sylvestris est: illa mentha dicitur, nec à Dioscoride describitur, hæc vero menthastrum vocatur, seu mentha sylvestris. Herba est silymbrio procerior, folio hirsutius, maiore & grauiori odore: maioresque osculos habet, colicorum fastigia coronantes. Calfacit tertio ordine, habetque humorem semicoctum, cuius causa venerem stimulat.

H<sup>δύπνοις</sup>. genus est sylvestris cichorii quod prodit latiore folio.

H<sup>δύσπαρον</sup>. securidaca. frutex est folia ferens ciceris, pusilla, folliculos modo corniculorum aduncos, semen complexos rufum, securiculæ ancipitis figura: à qua πελεκύς etiam dicta est inter hordeum triticumque provenit.

H<sup>δύσματ<sup>α</sup></sup>. dicuntur vnguenta ipsa quibus ad suauitatem odoris aromata adiuncta sunt. Alia non vnguenta, sed aromata sic appellantur, quibus odor vnguentis conciliatur, cuiusmodi sunt amaracus, costus, amomum, nardus, carpobalsamum & myrrha, ut patet ex Dioscoride in descriptione vnguenti amaracini: item coriandrum, mentha, apium, ruta, quæ etiam olera ementibus dari fuisse solita gratis præter legitimum pondus atque precium Galenus scribit. Caterum vnguenta ea quæ ἡδύσματ<sup>α</sup> vocabantur, succus tantum erant, hoc est, liquida, ut quæ solis fere constarent oleis eoque differebant ἀπὸ τοῦ συνμάκτων, ut Plinius scribit, quod hæc corpus haberent, hoc est, solidiora essent: vtrisque tamen eadem odoris gratia. Dicuntur ἡδύσματ<sup>α</sup> ἀπὸ τοῦ ἡδύνειν, quod est suauis & odore gratum facere: vnde & ἡδύσματ<sup>α</sup> generaliter dici possunt quæcunque rem aliquam iucundiores gratioreque reddunt. in qua significatione Galenus lib. 3. de alimentis pinguedinem & adipem, carniū ἡδύσματ<sup>α</sup> esse dixit. cibus enim suauitatem potius conciliant quam in alimentum vertantur.

ἡδύσματ<sup>α</sup> etiam apud Hippocratem dici πικρά καὶ ξηρά ἀπύσματ<sup>α</sup>, vocemque Articam esse, Erotianus annotauit. ex quo ipse lib. 2. ἡδύσματ<sup>α</sup> σίκαρ ἡδύ appellat πικρὸν.

H<sup>δύστρον</sup>. est magma per pastillos digestum, multis aromatis constans. Primum ab Andromacho inuentum descriptumque proditur. Eius compositio refertur à Galeno lib. 1. de antidotis & lib. de Theriaca ad Pisonem. Describitur & à Paulo & Aetio. Non habet postremum locum in Theriacis compositione, ut cui præter alia & saporis & odoris suauitatem conciliet. Nec vero Theriacæ tantum conuenit, sed vn-

guenti etiam loco usurpatum fuit & omnibus odoribus gratia illitum à Galeno, qui resiccando etiam per odorem pulmōni à se exhibitum fuisse prodidit lib. 4. de locis affectis.

H<sup>δύστρον</sup> sic dicitur os illud quod ad summam nasi radicem intus fixum hæret tenue & larum, & magno illi foramini oppositum quo è cerebro in nares excrementa descendunt. Ratio nominis est quod cribri modo (ἡτρυμένον Græci vocant) pertusum sit pluribus locis. Alii spongiæ id ipsum conferunt, & αἰσθητὸν nuncupant.

H<sup>δύστρον</sup>. dicitur à quibusdam pars nasi superior, quæ superciliis proxime subiacer.

H<sup>δύστρον</sup>. significat apud Hippocr. minime, vel, ut alii interpretantur, nullo modo. Contrarium est τὸ μέγιστον, ut annotat Gal. commen. eis τὸ πλεονέκτης ὄψιν.

H<sup>δύστρον</sup> λευκόν καὶ λαμπρόν καὶ ἡδύστρον: hoc est, lucida & splendens. dicitur ab Hippocrate de alui deiectione, ὡς τὸ πικρὸν, hoc est, ab electro & succino: ut annotat Erotianus.

H<sup>δύστρον</sup> λευκόν. succinum. Est succus quidam pinguis, oleosus & levis, qui in lapidem mollem concreuit, ignem flammamque facile concipiens. Sed cuius generis succus ille sit, plurimum variant authorum sententiæ. Multi dixerunt esse arborum succum, ex arboribus littori vicinis stillantem in fluuios & mare: qui cum sit genere triplex, lacryma scilicet, gummi, & resina, Aristoteles succinum lacrimam esse scripsit, nec tamen definiuit cuius sit arboris: multi vero populi esse censuerunt, cuius opinio & Dioscorides meminit, scribens lib. 1. quosdam existimare lacrymam populorum quæ in Padum amnem defluat, durari ac coire in succinum. Quæ opinio vel potius fabula vnde profecta sit, Plinius explicat. Idem vero narrat poetæ aliquos fuisse qui dicerent esse gummi, sed nec eos qui id senserint, nec arborem ipsam ex qua funditur, nominat. Ipse vero pinæ succum esse arbitrat: alii vero cedrinæ. verum alii nec quæ succi species sit, nec quæ arbor eum exuder speciatim explicarunt, contenti in genere dixisse, succum esse arboris: inter quos plurimi fuerunt authores Græci, & à Latinis Cornel. Tacitus. Sunt & qui succinum terræ succum siue sudorem esse dixerint & crediderint solis radios circa occasum vehementiores in terram actos pinguem sudorem ex ea elicere è quo fiat succinum: alii etiam è limo terræ gigni prodiderunt: alii concreti maris purgamentum esse. Adeo multum pugnant inter se veterum sententiæ. Nouissime vero Georgius Agricola vir doctissimus & acerrimi iudicii, repudiatis veterum sententiis, scripsit succinū esse bitumen fossile quod in lapidem mutatum sit, quoniam omnes bituminis proprietates habeat. Cæterum omnes consentiunt succinum in littoribus maris colligi: prætertim ad septentrionem, atque tempestatibus in littora eici. verum è terra quidem, quæ sub

sub mari est, vñri Serapio prodidit, non aliter ac fungi oriuntur ex ea quæ eminet è mari, ipsumque fluctibus & tempestatibus è naturali solo erutum ad littora impelli. Cæteri vero omnes non nasci in mari, sed è fontibus in mare influere sentiunt, ibique durari. Non est autem succino color vnus: aliud candidum est, quod habetur præstantissimum: aliud fulvum & perspicuum instat vitri, quod Genus Græci nuncupant *ὑδρος*: aliud nigrum, quod est deterrimum. Omne ad moto igne accenditur & ardet, vñ reliqua bituminis genera, affricuque calefactum plumas, paleas reliquæ alias leuēs ac minutas, tanquam imagines ferrum, ad se trahit & retinet, eamque ob rem Græcorum quidam *ἄσπερα* ipsum appellarunt. Prebet multiplicem vsum. eiusamenta in suffitus cedunt quibus foetidus & pestilens aer corrigatur: est enim odoris iucundi. Illinendi vim obtinet, atque ob id portum sistit sanguinem vñdecunque profluentem, & vomitus & alui profluvia & catarrhos. Et quia odotum est, cordi amicum esse, eiusque tremori mederi creditur. Cæterum non in Oceano modo, sed etiam in mari Mediterræneo colligitur, quod tamen ad nos adferri negant, dicentes in eius locum substitui factitium ex bēzo, cera candida noua, carie fraxini & arborum musco, vel ex styrace, ladanio, & tamētis xylaloes: ad vtramque vero compositionem addi muscū vel zibetum, atque omnia cū aqua rosacea commisceri: facile tamen fraudem deprehendi, quod narium non tā cito atque factitium aquis mollescat. Mauri atque Arabes ambram citrinam & carabem appellant.

*Ἡλιάκη*. herba est folio myrti in Themiscyra regione & Ciliciæ motibus maritimis proueniens. Ea scribunt quidam cū adipe leonino decocta, addito croco & vino palmeo, perungi solitos Magos & Persarum reges ad conciliandam corporis gratiam, ideoque eandem *ἡλιανίδα* nominatam fuisse.

*Ἡλιαν*. genus *ῥωφίας*, quod & *ῥωφία* vocatur, ex rebus triginta sex constans. Eius compositio habetur apud Paulum libro 7. cap. 22.

*Ἡλικία*. ætas. Est annorum decursus corporis temperamentum immutans. Ita namque fert naturæ conditio, vt corpus humanum nequeat diu eodem in statu perseuerare, quod sit omni genito corpori corruptelæ interitusque connata necessitas. Cum enim ita nati simus vt in naturæ nostræ primordiis calidum frigidum, humidum siccum præpollat, consisteretque nobis ex humida substantia genituræ origo, quam tamen humidam perpetuo seruari conueniens non erat, quod ex ea solidæ partes fieri deberent, natura statim in generationis initio ignem terramque copiosius admisit, quæ non torrerent quidem vñerentur, sed tamen abunde siccarēt. Id quidem in causa est cur progres-

su temporis temperamentorum mutationes contingant, quæ non aliud reuera sunt quam ætates. Ab hoc enim primum cogitur paulumque concrescit quod in vtero conceptum est, mox siccus redditum veluti lineamentata quædam & rudimenta cuiusque membri obtinet: vñterius vero etiam succescens, non lineamenta rudimentarie modo, sed etiam exactam vñiuscuiusque speciem ostendit: iam vero in lucem editum & magnitudine proficit, & tū siccus tū valentius seipso semper efficitur, donec ad summum incrementum sit peruentum: tū vero & incrementum omne sistitur, ossibus nimirum ipsis per siccitatem non vltra sequacibus, & sanguinis spiritusque vasa spiritus ipsius flatu in latum aguntur: cuncta denique membra non solum robusta fiunt, sed etiam vires suas summas obtinent. In eo vero quod sequitur tempore, omnibus iam partibus supra instum succescentibus, non solum cuiusque officium minus probe administratur, sed etiam corpus ipsum macilentius graciliusque quam ante redditur, & postea etiam rugosum euadit. Quo vbi peruentum est, summa artuum atque viscerum imbecillitas seniumque oritur. Talis quidem in genere est totius vitæ decursus omnes temperamentorum mutationes ætatumque differentias complectens. Hæ autem quamuis nisi anteriorum spatii certis contingere non possint, sed eas necessario annis metiri definireque oporteat, non facile tamen est id exacte præstare, certosque fines statuere, sed tantum in latitudine quadam. Nam prout calidior, frigidior, humidior aut siccior aliquis est, etiam celerius aut tardius vel pubescit vel senex est. Earum namque qualitatū temperaturis ætates distinguuntur. Itaque vt quatuor sunt temperamentorum differentię, quas homo toto vitæ suæ spatio sustinet, ita par est quatuor ætates esse illis respondentes. Primum enim vbi natus est homo eum calidum & humidum esse constat, deinde calidum & siccum fieri, postea siccum & frigidum euadere, tandem vero frigidum humidumque effici, & per eas quatuor reperiens decurrere, perinde atque annum per sua tempora eandem quoque temperaturam sortita. Quod enim in anno tempus, id in vita hominis ætas est, non eadem modo temperie prædita, sed humoribus etiam & reliquis plerisque affectionibus. Habent autem & ætates sua nomina, veluti anni tempora: quarum prima dicitur *ἡ βῆβαις*, id est pueritia, veri admodum similis & abundans sanguine: quæ tam diu dicitur, quam diu corpus calidum & humidum existit. Eam autem medicarum diffinitionum author *ἡλικία* appellat, id est iuuentutem, pueros cum iuuenibus confundens. Secunda autem, *ἡ τῶν μετὰ τὴν βῆβαις*, id est adolescentiæ, siue florens & virilis ætas: quæ durat dum calor & siccitas exuperant, ætati similima, in qua, vt in hac quoque,

multa bile corpuscatet. Tertia, *ἡλικία*, quos etiam *ῥώσις* Græci appellant, id est, decrescens siue inclinans ætas quæ est cum frigidas & siccitas corpus occupat, autumno non dissimilis cum temperie tum humoris melancholici pronentur. Quarta est *ἡλικία*, id est, senectus, frigida & humida instar hyemis, propter abundantiam in ea pituitæ copiam. In quo tamen nemo me cernitur si senectutem frigido & humido, non autem sicco definiui. Ego enim Galenū sequi sum sic ætates distinguere lib. 8. de placitis Hippocrat. & Platon. & in comment. quos scripsit in lib. *ἡλικία* *ῥώσις* *ἡλικία*. Verum aliis aliter ætates distinguere placuit, maxime per septimanas, quod eo fere numero natura magnas mutationes efficere consueuerit. Nectamen de earum nominibus, vel quo temporis spatio circūscribi debeant satis conuenit. Omnes primā statunt *ἡλικία* *ῥώσις* *ἡλικία*, hoc est, puerorum cui duas septimanas tribuunt, videlicet usque ad decimum quartum annum. Ab eo incipit *ἡλικία*, id est, pubertas, & secundum Hippocrat. sententiam usque ad annum vigesimum quintum extenditur, vt annotat Galenus comment. in aphor. 7. lib. 5. quo tamen in tempore *ἡλικία* *ῥώσις* *ἡλικία*, id est, adolescentiam, contineri idem Galenus auctor est comment. in aphor. 29. lib. 3. scribens *ἡλικία* *ῥώσις* *ἡλικία* in ædiam esse inter *ἡλικία* *ῥώσις* *ἡλικία*, id est, inter pubertatem & florentem ætatem. Quod si uerum est, pubertas erit ab anno decimo quarto usque ad annum decimum octauum, spatium uidelicet dimidiæ septimanæ: ab anno autem decimo octauo usque ad vigesimum quintum adolescentia, vt scriptum reliquit Galen. comment. in aphor. 9. lib. 5. Itaque pubertatis nomine adolescentiam comprehendere Hippocrat. uidetur. Ab anno autem quinto & vigesimo *ἡλικία* *ῥώσις* *ἡλικία*, id est, florens & iuuenilis ætas, incipiens, quinta septimana terminatur, id est, anno trigesimo quinto. Ab hoc postea *ἡλικία*, id est, ætas declinans, incipit, iuuentuti ad ferendos labores multum impar, & ad duas sequentes septimanas extenditur, vt docet Galen. comment. in aphor. 30. lib. 3. Ea igitur est à trigesimo quinto anno usque ad quadragesimum nonum. Inde succedit senectus, quam triplicem Galen. esse docet extremo quinto libro de sanitate tuenda: cuius primam partem *ἡλικία* *ῥώσις* *ἡλικία* appellat, id est eorum qui cruda viridique adhuc senecta sunt, propterea quod nondum habent sensum senectæ manifestum, sed adhuc ciuilia negotia obire possunt. Nec vero sola senectus trifariam ita diuidi intelligenda est, sed & reliquæ perinde ætates, vt prima pars viridis sit, deinde adulta, postea præceps. Ætatem M. Varro diuisit in infantiam, pueritiam, adolescentiam, iuuentam, senectam. Auctor est Aulus Gellius lib. 10. cap. 28. Seruum Tullium Regem, cum census

faciendi gratia illas quinque classes populi Romani instrueret, eam ratione sequutum, vt pueros esse existimaret, qui minores essent annis septemdecim. Inde ab anno decimo septimo quos idoneos iam esse reipubl. arbitraretur, milites scripsit, eosque ad annum quadragesimum sextum iuniores dixit, supraque eum numerum seniores appellauit.

*ἡλικία*, nomen est compositi medicamenti aridi, quod vel maximas carnis excrescencias usque ad penitiora adurit. Habet autem auripigmenti libram vnam, calcis viuz drachmas duas. Aqua leuigantur per dies canicula, deinde siccantur.

*ἡλικία*, herba quæ & *ἡλικία* dicta fuit de qua supra.

*ἡλικία*, est species squamæ zris, sic dicta quasi clauaris. vide *ἡλικία*.

*ἡλικία*, idem quod *ἡλικία* maius, sicut habetur apud Dioscoridem.

*ἡλικία*, sic à quibusdam dictum est *ἡλικία*, hoc est, heliotropium maius: vt Dioscorides scribit. Plinius tamen heliotropion & tricoccon genera facit duo heliotropii.

*ἡλικία*, solaris herba Celso dicitur: cuius duo genera, maius & minus, describuntur à Diosc. in fine lib. 4. Gustu est adstringenti, cum quadam leuiuscula amaritudine.

*ἡλικία*, insolatio. Est corporis in solē applicatio. Remedii genus est veteribus medicis versus parum variis modis & ad varios affectus: alii enim vncti, alii nō vncti, alii decumbentes aut iacentes super multiplici strato, alii stantes aut deambulantes solis radiis exponebantur: ex quo ista fere commoda consequerentur, corporis perspirationem vbiotiore, sudores, alui adstrictionem, adipis consumptionem, tumorum laxorum, maximeque hydropicorum depressionem, totius corporis exiccationem, respirationem faciliorem, omnisque superflui humoris absorptionem. Proinde eo remedio iuuabantur hydropici, ischiadici, nephritici, paralytici, elephantici, coeliaci, foeminae hystericae & alba vteri fluxione laborantes: adhuc cephalgici, præmissa per aluū vacatione. Quæ quidem omnia ex Antylli libris Aetius plenius explicauit.

*ἡλικία*, clauus. Est callosum tuberculum, album, rotundum, capiti clauorum simile. Prouenit toto corpore, sed pedum plantis digitisque potissimum, nascitur frequens & in calcaneis, præcipue tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremque, etiam si non alias, tamē ingredienti mouet. Sed & in summis manuum digitis sæpissime oriri solet. Accidit & oculis: sic autem vocantur callosa in eorum albo tubercula, vt ait Celsus lib. 7. Aetius agens de staphylomate scribit *ἡλικία* in oculo appellari postquā staphyloma maximum euaserit, adeo vt palpebras excedat, & induruerit, cornea tunica vndique collofa euadente. Cæterum clauus omnis dictus

dictus est à figuræ similitudine. Nec vero in homine tantum, sed olea etiam *ἴλος* dicitur, cui quædam solis iniunctio quæ infectatur, quam, ut scribit Plinius, quidam fungum malunt appellare, alii patellam, quæ Græcis *λοπαὶ* etiam dicatur.

*Ἡμέρα.* dies. Duobus modis potest intelligi. Vno spatium id modo quod est à Solis ortu usque ad occasum, quo quidem à nocte distinguitur. Est autem duodecim quidem semper horarum sed inæqualium, prout dies longiores sunt aut breviores, alioqui si in horas æquales diuisus fuerit, in ipso tantum æquinoctiis duodecim horarum erit: aliis autem temporibus plurium omnino erit vel etiam pauciorum. Altero vero totum id temporis spatium dicitur, quod est ab uno Solis ortu usque ad alterum proxime sequentem. Is vero etiam noctem simul comprehendit, eumque à se intelligi plerisque in locis Galenus professus est. Est autem horarum viginti quatuor æquinoctialium. Hic quandâ cum toto anno similitudinem habere dicitur, in quatuor partes similiter diuisus. Tempus namque matutinum humidum calidumque perhibetur, perinde atque ver, ut ex Antyllo Oribasius scripto prodidit: meridiem ætati comparatur: pars quæ ad occasum spectat, autumno, ut & noctis prima pars, quæque circa vesperam est, occasui similis: medicæ autem noctis tempus, hyemem. Eo namque tempore, quemadmodum & per hyemem, Sol plurimum abest à nobis. Quamobrem utroque tempore corporum perspiratio æque intercipitur, & fluxiones doloresque maxime recurrunt & vrgent. Vltima vero noctis pars ad aurorâ spectans, propterea quod matutino tempori propinqua est, eiusdem cum eo particeps est temperamenti.

*Ἡμέρα κρίσιμος.* vide κρίσιμος ἡμέρα.

*Ἡμέλις.* quercus placida. Roboris genus est, tranco neque erecto, neque leui, neque excelso, sed caudice in orbem comofo, còrorto, sinuosoque.

*Ἡμεροκαλὴς.* herba est folio & caule lilio similibus, herbacei coloris ut porrum. flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lili diuifura, quoties dehiscere cœperunt. colore perquam pallido. radix magna est atque bulbosa. Leuiter digerentem facultatem habet, & cum hoc repulforium quiddam. nostri liliium agreste, vel liliium marinum nominant.

*Ἡμιδραχμῶν.* pondus duarum drachmarum. vide δραχμή.

*Ἡμέλιον.* τὸ ἥμισυ ἑξ ἑπτάς. hoc est, mēsurā chemicas quatuor capiens. Pars est duodecima medimni Attici.

*Ἡμικρανίος.* fasciæ nomen ad dorsi & pectoris deligationem. refertur à Galeno libro de fasciis sub nomine Apollonii iunioris.

*Ἡμικρανία.* hemicrania. Est morbus mediæ partitis capitis summo cum dolore: hic modo

dextram, modo sinistram partem occupat, & ad futuram usque protenditur. Ea enim dolorum interstitium est. Per circumsplerumque reuertitur, vel quotidianos, vel tertianos, ac quibusdam extra caluariam, quibusdam in profundo capitis, plurimis circa temporum musculos, vel alius etiam consistit. Dolores autem aliquando tam sunt vehementes, ut ne manum quidem ferant, affecto scilicet pericranio & cute non expetere morbi. Causa doloris tanti est vaporum, aut humorum, aut utrorumque, vel multorum, vel calidorum, vel frigidorum, vel acrimium salforumque influxus siue per venas, siue per arterias. Affluit autem hi vel quod à cerebro eiusque membranarum foras pellantur tanquam redundantes aut vitiosi, vel quod à subiectis partibus sursum mittantur. Ac vapores quidem tenuis dolores afficiunt: biliosa excrementa mordaces inducunt: plenitudo grauitatis sensum adfert: rubor & calor calidos humores significant.

*Ἡμικρανία φάρμακα.* dicuntur medicamenta topica, curandis hemicraniis conuenientia. Ea non sunt vnus generis: alia enim magis, alia minus calida sunt: omnia tamen calida esse oportet, multum quidem, ubi non est multus calor, moderatius vero, si multa caliditas in dolore percipitur: tunc enim ad reprimendum caloris excessum, calidis pharmacis aliquid refrigerans miscendum est. Omnia etiam aliquid habere oportet quod firmitatem & robur addat, quod adstringentem scilicet habeat facultatem. Porro eorum materia plurima est apud Galen. lib. 2. τῶν κατὰ τόπον.

*Ἡμισοίον.* τὸ ἥμισυ τῆς δραχμῆς. dimidia drachma, apud Hippoc. ut interpretatur Erotian.

*Ἡμίζεον.* idem quod ἡ κοτύλη. propterea quod ζῆσις capit duas κοτύλας. vide κοτύλη.

*Ἡμισόλιον ἢ*

*Ἡμισόλιον.* pondus est dimidii oboli, siue duodecimæ pars drachmæ. drachma enim sex obolos habet. Frequentius occurrit ἡμισόλιον.

*Ἡμίονον.* herba quæ & αἰσάδιον & σκαλοπέδιον appellatur.

*Ἡμιονίς.* herba quam αἰσάδιον plerique vocant, alii πύκτιον, alii etiam ἡμίονον.

*Ἡμισόσιον ἥμισυ.* dimidium, apud Hippocr.

*Ἡμισυγλία ἢ*

*Ἡμισυγλία.* dicitur paralytis dimidii fere corporis, quæ apoplexiæ succedit. Eadem videri potest cum αἰσάδιον siue αἰσάδιον, de quibus vide suis locis.

*Ἡμίπνοος.* deligationis nomen apud Hippocratem. ut annotauit Erotianus.

*Ἡμικρανίος πυρετός.* semitertiana febris. Est febris continua, ex quotidiana & tertiana febre, quarum una continua, altera intermitrens sit, confusis genita & cum horrore inuadens. Continuum quidem esse Galenus ex Hippocrate docet, atque in eo Archige-



nem & Agathinum reprehendit, quorum ille semitercianam in febrium intermittentium numero posuit, hic vero in eodem genere cum tertiana locauit, & sola accessio- nis vehementia ab ea differre existimauit. In eodem errore est & Celsus lib. 3. cap. 3. Nec tamen ex eo continuarum genere est, in quibus humor intra venas maiores putret, & vna tantum à principio ad finē vsq; accessio perseverat, sed vt vel ex ipso nomine semitercianæ intelligi potest, reduplica- tiones habet tertio quoque die, non quales quidem habet tertiana, sed dimidia ex par- te similes. Nam tertianæ confusa quotidiana, accessionis tertianæ verum typum ne- cessario immutat. Cum autem quatuor mo- dis hæc febres misceri possint, vel ambæ in- termittentes, vel ambæ continuæ, vel vna earum intermittens, altera continua, am- barum intermittentium mistio quia & fe- brem omnino parit intermittentem, non potest semitercianam, quam continuam esse oportet, gignere: ambæ continuæ, con- tinuam quidem efficiunt, sed sine horrore (quo tamen Hippocrates hemitritæon ma- xime definiuit) quod omnis febris conti- nua nullam per se rigorem vel horrorem parit. Itaque alteram earum intermittere, alteram continuam esse oportet. Nec vero interest vira continua sit, ut intermittens. Vtroque enim modo & continuitatem ser- uabit, & mista simul bile & pituita cum hor- rore prehendet. Sed accidit multo frequen- tius vt quotidiana continua & tertiana in- termittens febrem hanc constituent quam cōtra: eo quod facilius sit quotidianam fie- ri continuam quam tertianam, cuius etiam exquisitæ accessiones longiores esse soleant quam tertianæ. Horror autem non quoti- die, sed alternis tantum diebus inuadere de- bet, quibus scilicet tertianæ & quotidianæ accessiones simul concurrunt & confun- duntur. diebus autem aliis mediis & pari- bus refrigeratio sola incidit, quam febris quotidiana proprie accersit. Ab eo horrore Hippocrates hemitritæon horridā febrem (Græce *φειδιον πυρετον*) appellauit. Itaq; cum eiusmodi febrium mistio semitercianam pariat, duoque sint omnino modi quibus misceri secum possint, duæ pariter erunt he- mitritæi differentiæ. Nam si æquales sint v- triusque febris vires, nec bilis pituitæ, aut cōtra pituita bili præualeat, hemitritæus fiet exquisitus, qui non aliud est, quam æqualis earum febrium cōposio, per quam æqua- lis quoque humorum pugna enadit. Sic e- nim & bilis celeritatem cohibet pituita, ac rursus pituitæ tarditatem atque hebetudinē excitat bilis. Cumque proprium sit tertianæ febris rigorem mouere, quotidianæ vero re- frigerationem, mista ex vtraque æqualiter febris horrorem necessario afferet, rem quidem rigore minorem, maiorem autem refrigeratione, tantoque hac ipsa maiorem, quantum à rigore magnitudine superatur.

Vt enim extremi humores æqualiter con- fusi sunt, sic horror pariter medius inter ri- gorem & refrigerationem nascetur. Quare nō temere febris hæc hemitritæos, hoc est, semitertianæ, dicta est. Nam ex quotidiana continua & tertiana intermittente tota eius natura cōfusa, dimidiam partem vtramque ex iis febribus retinet, non rigoris modo & refrigerationis, sed etiam reliquorum vtri- usque febris symptomatum. Sin autem ma- gnitudine vehementiaque impares febres sunt quæ hemitritæon gignunt, nō iam ex- quisitus erit, sed ei magis affinis quæ in mi- stione præpollebit, ideoque & propria eius febris symptomata in ipsa mistione magis erunt cōspicua. Nec vero satis est febres eas mistas complicatasque esse, sed ita confusas esse oportet, vt vtriusque accessio eodem tē- pore inuadat. Id quod & perpetuum esse potest, accessionibus eundem semper ordi- nem seruantibus, & potest non esse perpe- tuum, sed semel tantum aut bis terue in earū febrium complexu cōtingere pro accessio- num acceleratione vel retardatione. Quo quidem casu non rota ea febrium comple- xio hemitritæus erit, sed eius modo acces- siones illæ hemitritææ vocabuntur quæ si- mul concurrent, eademque hora inuadent.

Vide *φειδιον πυρετος*.

*Η μὲν βίον*. linæi crassioris pars, apud Hippocra- tem.

*Η μὲν βίον*. pondus dimidii oboli, siue duode- cima pars drachmæ. Sunt enim sex in dra- chma oboli.

*Η τὰ καὶ πᾶσι*. hoc est, cedere vel tundere: & *ήναιον*. *καταμύων*, apud Hippocratem, vt tradit Gal. c. 7. *γνώσας*.

*Η τὸ σπέν*. est ventris sinus in quadrupedibus ab- omasum dicitur. Hic venter est magnitudi- ne amplior omaso, quod *έχον* vocant, for- ma oblongior, cæcellis intus & crustis mul- tis, magnis & leuibis inornatus. Ab eo pro- xime intestinum sequitur.

*Η νίαι*. *ταῖς πρωϊαῖς*, matutinas horas, apud Hippo- cratem.

*Η ἱπαρ*. iecur. Est viscus natura primum, facul- tatis naturalis sedes & principium. Nam cum corpus humanum tribus principiis gubernetur, hepar omnium quasi quod- dam fundamentum existit, sine quo alia esse non possunt, cum tamen ipsum sine aliis initio consistat. Est enim sedes animæ vege- tabilis, qua primum animal præditum esse necesse est in modum plantarum, sicut Gal. lib. de formatione demonstrauit. Oritur autem affuso sanguine crassiore & concre- scente fere sexta die à concepto semine. Ita- que non modo sanguinis substantiæ simile est, sed eius etiam qualitates retinet: calidū enim humidumque est. Vt autem ex san- guine gignitur, sic & gignendi sanguinis vim possidet, quod initum sit vnique parti cuiusmodi ipsa est, tale quid etiam creare. Ea namque naturali propensione iecur chylū quem intra se recepit, in sanguinē conuertit.

conuertit: non eum quidem tantum quo seipsum alit, sed qui etiam alendo vniuerso corpori utilis sit & plane necessarius. Talis autem bonus sanguis & vitio carens fuerit: quem ut efficiat, necesse est iustas esse iecinori quatuor facultates, vnam materiam eius attractricem ex qua sanguis generetur, alteram eiusdem retentricem, tertiam vero concoctricem, tum demum absoluta concoctione, eorum expultricem quae tanquam aliena concoctionem adipisci non potuerit. His quatuor facultatibus primo & per se iecur praeditum est, tanquam naturalium operum principium, quae in solido eius corpore sedem habent, atque ab eo vim omnem accipiunt. Eas functiones cum per se exerceat, spiritu tamē, quem per se ipsum gignit, caloreque tanquam instrumentis utitur, sicut *in primis* explicantes diximus, ex quibus non modo perficit haec opera, sed eandem quoque facultatem reliquis omnibus corporis partibus impertit. Quaecunque enim nutriuntur & augentur, iisdem praeditas esse oportet facultatibus quas à iecinore tanquam à fonte hauriunt. Itaque cum iecur venarum & nutritionis principium sit, est & concupiscibilis facultatis, quae nobis non cum brutis modo, verum etiam cum planis communis est. Proindeque iecinoris facultatem plantae quodammodo similem dicit Galen. lib. de plac. Hippocrat. & Plac. Ipsum enim iecur plantae, venae autem mesaraicae radicibus respondent. Omnes autem in vna conueniunt, quae vena porta dicitur, à qua & ortum habent. Chylum ab intestinis deferentes. Inseritur autem ea vena in partem cauam iecinoris, quam & simam nuncupat: inde chylus in partem gibbam siue conuexam peruenit, in qua propria iecinoris caro residet (eam *πατρική* Erasistratus appellasse traditur) quae primum est sanguinis generandi principium. Ibi autem sanguis genitus in aliam maximam venam, quam cauam vocant, recipitur, ex iisdem sedibus prodeuntem & subiectam venam portam suo officio prope osculantem, quae eum in omnes corporis partes vehat. Quod ut fieret commodius, natura iecur fere medium collocauit: siquidem sima parte ventriculo incumbit, gibba vero septum transuersum attingit. Est autem iecur lobis nunc nullis, nunc duobus aut tribus, nunc quatuor, etiam quinque; Hippocrati praeditum, nobis plurimum quatuor, magnis duobus & paruis totidem, in carne sua continetibus vim sanguinis effectricem. Ceterum sanguis quem iecur facit, multis de causis crassus est, & ad obstructions facilis. quare ad eas vitandas natura siue eius parti, quod in ea crassior sit magisque feculentus, arterias inseruit quae iusti caloris symmetriam in toto viscere conseruarent: nullas autem gibbae dedit, quod ex diaphragmatis vicinia motus illi esset continuus. Ambit autem totum viscus membrana nerualo praedita, qui propago

est nerui à sexta coniugatione venientis.

*Hæmorrhoides*. sic dicitur vnum dysenteriae genus, quo aquosus sanguis excernitur, ei aquae per similes in qua caro recens caesa lota sit. Prouenit à retentrice vel alteratrice iecinoris facultate imbecilla. vide *diagnosticam*.

*Hæmorrhoides*. Generaliter quidem dici possunt omnes qui ex iecinore quouis modo affecto laborant: nunquam tamen tam late eius vocis significationem medici extenderunt, sed veteres quidem sic appellauerunt eos qui propter iecinoris inflammationem febricitarent, ut & pleuriticos & peripneumonicos qui lateris aut pulmonis phlegmone vexantur. Recentiores vero non ita, sed si tumor aliquis in hepate est, hepatis inflammationem, vel abscessum, vel scirrhum, vel aliter morbum ipsum appellant, non autem hepaticam affectionem: cum vero citra manifestum aliquod iecinoris malum imbecillitas sola acciderit, tunc ægrum hepaticum appellant. Hanc ergo imbecillitatem ex qua hepatici dicuntur, sola intemperies prouocat, eaque omnis generis, calida, frigida, humida, sicca, propter quam facultas eius alteratrix ad tantam imbecillitatem peruenit, ut quae prius ex proba temperie sanguinem probum gignebat, tunc ab ea deficiens sanguinem cridum & semicoctum reponat, & aquae modo liquidum in qua recens maceratae carnes abluta fuerint. Is propter facultatis etiam retentricis debilitatem à iecinore excidit & per intestina excernitur, eamque dysenteriae speciem facit quam proprie *hæmorrhoides* appellant. Singula autem intemperies sua habent symptomata, calida quidem ingens cibi fastidium, sitim vehementem, febrem insignem & viciosorum humorum vomitum: frigida vero omnia contraria. Commune vero omnium est, sanguinis aquosi & semicocti excretio, ne quis putet à calida intemperie superaffari humores & reddi non modo nigriores fecique similes, sed etiam crassiores. Id enim verum quidem est iecinori contingere cum sola intemperie calida citra imbecillitatem laborat, cumque morbus non solum iecinoris substantiam afficit: verum hepatica haec affectio, non ad solam intemperiem, sed ad iecinoris substantiam pertinet, quae propter intemperiem quamcunque longo iam tempore contractam imbecillitatem contraxerit: sanguinem enim & humores superaffare, intemperati quidem, caloris excessu, sed nondum prorsus imbecilli iecinoris est.

*Hæmorrhoides*. Sic dici ab Hippocrate venam cauam Galen. annotat lib. de format. foetus, & comment. in lib. de nat. hominis. vide *pat. 1.*

*Hæmorrhoides*. sic à quibusdam dici *hæmorrhoides*, Dioscorides auctor est.

*Hæmorrhoides*. Epiala febris. Species est febris quotidianae continuæ. Inter continuas qui-

dem eam recenset Gal. comment. 1. lib. 6. *ἡ ὁρμημαία*. De genere autem quotidianarum esse, non potest esse obscurum; quod à pituita vitrea & acida oritur. Nam ubi ea moderate, aut potius dimidio sui putret, febrem excitat epialam. In ea autem quæuis pars corporis, eodem tempore, totaque febris constitutione febrem & rigorem sentit: febrem quidem à portione vitrea pituitæ incensa & putrente, frigus vero à reliqua eius parte non putrente nec incensa, sed frigida manente. Siquidem non putris pituitæ pars per omnes venas vel vniuersum corpus dispersa rigorem concitat: quæ vero iam putruit, febrem accendit, non aliter quam si pituita vitrea & bilis flaua simul abundarent & per partes sentientes mouerentur. frigoris ergo calorisque sensus in epiala febre eodem tempore, eademque parte contingit, eoque à lipyriis & reliquis febribus differt, in quibus vel interna vruntur, cum extrema frigeant, vel ardor summus in visceribus est, cum extremæ partes algeant. Nam quod in his maioribus portionibus accidit, hoc in epialis contingit exiguis portionibus, eoque vniuersum corpus pariter ambo perferunt. Huiusmodi febris genus Græci medici *ἡ πύρετος* proprie dixerunt: putauitque Archigenes nullumquam alteri rei id nomen accommodatum fuisse. Verum tamen & Artici, vt Galenus & Hesiychius scripserunt, ita vocarunt *τὸ πύρετον*, hoc est, rigorem qui febrem antecedit: eoque nomine *καὶ τὸ πύρετον* nuncupabantur, vt non sit querenda alia ratio huius nominis, quam quod hæc febris perpetuo frigida sit. Quidam tamen aiunt sic vocatam hanc febrem *καὶ τὸ ἡπύρετον* & aliter: quod mare in summa etiam tranquillitate perpetuo agitur. vel *τὸ ἡπύρετον*, quod molliter & moderate incalescat.

*ἡ πύρετος* *πύρετος*. ὁ μακρὸς καὶ ῥίγος συνεχόμενος: hoc est, febris quæ cum horrore & rigore inuadit: apud Hippocratem, vt annotauit Erosianus.

*ἡ ἑρμεία νόσος*. Hercules morbus. sic dicta est à Hippocrate & veteribus *ἡ ὁρμημαία*, non quod Hercules, vt ait Galen. eo morbo laborarit, sed vt eo nomine ipsius magnitudinem *καὶ τὸ δυσκαταμάχτην*, hoc est, eius vim indomitam atque insuperabilem, designarent. Aristot. tamen problematum sectione 30. scripsit Herculem reuera eo morbo laborasse. Sunt autem qui eo nomine apud Hippocratem *τὸ μανικόν* interpretentur, quod eo morbi genere Hercules è prisca Heroibus solus laborasse dicatur. Aræteus etiam elephantiasim Herculeum morbum dictam fuisse à veteribus prodidit, quod vetemens magna que sit, & nullo remedio superari possit.

*ἡ ἑρμεία* sic dicta fuit à plerisque *ἡ ἑρμεία*: & à quibusdam *ἡ ὁρμημαία*, vt habetur apud Dioscoridem.

*ἡ ἑρμεία* sic dicitur à quibusdam *τὸ ἀβρόσιον*, vt

habetur apud Dioscoridem. Fortasse ab Heraclea Ponti ciuitate, in qua, totoque eius agro, ambrotonum plurimum atque probatissimum nascitur.

*ἡ ἑρμεία* *ἡ ἑρμεία*. lapis qui & *μαγνήτης* dicitur.

*ἡ ἑρμεία* *ἡ ἑρμεία*. medicamenti nomen siccantis, & carnem quæ supercrescit ex edentis. recipit autem squamæ æris, misyos, chalcitidis vitæ, atramenti sutorii, aluminis scissi æquas portiones, vt refert Aetius.

*ἡ ἑρμεία*. nomen collyrii fistularis, & quod ægilopas radicibus tollere dicitur. Descriptio eius habetur apud Aetium libri 14. capite 55.

*ἡ ἑρμεία*. est genus anthemidis ad calculos efficacissimum. florem habet purpureum: cuius amplitudo mascula est.

*ἡ ἑρμεία*. tenuibus & multis venulis instar telæ aranearum implicauit, apud Hippocratem.

*ἡ ἑρμεία*. *ἡ ἑρμεία*, apud Hippocratem, vt annotauit Erosianus: hoc est, profuit & auxilium tulit.

*ἡ ἑρμεία*. *ἡ ἑρμεία* *ἡ ἑρμεία* *ἡ ἑρμεία*. firmatum innatumque esse vel aptatum, apud Hippocratem: sic dicitur *καὶ τὸν ἑρμείαν*, *τοῦτον* *ἡ ἑρμεία*: quo nomine Homerus vsus est *ἡ ἑρμεία*, *καὶ τὸν ἑρμείαν*.

*ἡ ἑρμεία*. firmata, subnixa. Dicitur *καὶ τὸ ἑρμεία*, quod & *ἑρμεία*.

*ἡ ἑρμεία*. senecio, herba est cauliculo cubitali, subrubro, foliis continuis, per extremitates eruca modo diuisis, sed minoribus multo. luteis floribus, qui celeriter dissecti vaneſcunt in pappos. Nomen sibi vendicauit, quod flores capillorum ritu canescant. radice superuacua. Nascitur maxime in maceris & circum oppida. Facultatem mistam habet refrigerandi & modice digerendi.

*ἡ ἑρμεία*. dictum fuisse à quibusdam eo nomine *τὸ ἑρμεία*, habetur apud Dioscor.

*ἡ ἑρμεία* *ἡ ἑρμεία*.

*ἡ ἑρμεία*. herba est aculeis prædita, cui folia lata, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica. Cum autem eryngium adoleuit, complures in eo ramulorum stræ rubent, in quorum summitatibus globosa capitula, durarum & acutissimarum spinarum ambitu stellatim circumuallantur. quorū color alias viridis, alias albus, interdum caeruleus inuenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, interne candida, pollicis crassitudine, odorata vulgus centum capita appellat. Calfacit modicum, sed valde siccit. Memini eryngii cuiusdam montani Aetius libr. 6. cap. 16. cui folia, inquit, angusta & minora, flores autem aurci & oculis similes.

*ἡ ἑρμεία* etiam à quibusdam dictam esse aloen, auctor est Dioscorides, forte à spinis quæ sunt vtrique communes. In reliquis enim nullam prorsus similitudinem habent.

*ἡ ἑρμεία*, apud Hippocratem, teste Galeno: id est Qui percolauit.

*ἡ ἑρμεία*. quies. ocium. Est cessatio à moro. Ergo cum

go cum corpus aliquod ab ijs sub quibus  
 aare fuit in nullo immutatur, quiescere  
 dicitur: ut si in aliquo ab ijs recedit, secun-  
 dum illud id moueri. Itaque cum multis  
 modis corpus à statu in quo erat recedere  
 possit, multisque modis moueri dicatur, to-  
 tidem modis dicitur quiescere, ubi moueri  
 desierit: neque enim quies aliud est quam  
 motus priuatio. Quare ut contrarium con-  
 trario, ita quies motui semper succedit, cu-  
 iuscunque generis motus ille sit qui præces-  
 serit. Itaque cum omnis motus apud me-  
 dicos genere duplex sit, in qualitate & loco,  
 vel ex ijs duobus compositus, patet quie-  
 tem quoque geminam esse, & licet omni-  
 bus ijs motibus communis est prioris status  
 immutatio, ita è diuerso quietibus prioris  
 status conseruationem. Cumque natura  
 certa quadam contrariorum moderatione  
 vitam nostram contineri voluerit, patet et-  
 iam quietem omnium quæ in nobis mo-  
 uentur, esse communem. Proinde factum  
 est ut somnus (qui non est aliud quam fa-  
 cultatis animalis quies) vigilijs interpone-  
 retur, interque vehementes corporis mo-  
 tus atque exercitationes, mediam quietem  
 interuenire oporteat. Neque enim parua  
 eius vis est in tuenda valetudine, ut quæ spi-  
 ritus instaurando, calorem natium augen-  
 do & lassitudinem tollendo vitam retineat.  
 Sed cum ea inter causas salubres censetur,  
 quarum recto usu bene nobis est, depraua-  
 to autem male, modus quoque in ea non  
 minus quam in omni motu tenendus est.  
 Quies enim tum quæ infra modum est, tum  
 quæ eum excedit, mala est. Ex quo patet  
 omnem quietem in relatione dici ad su-  
 um motum, ut quantus is fuerit, tantam  
 quoque illam esse conueniari. Quiete nam-  
 que parciore refici corpus nequit, immo-  
 dica vero nimio redundat humore, vel et-  
 iam (quod fieri posse Galenus comment.  
 3. in lib. 7. τὸν ὀνδρῶν. annotauit) interdum  
 contabescit. Quorum quidem vtrumque  
 non propriæ vi & natura quietis, sed ex ac-  
 cidenti contingit. Quies enim nihil reue-  
 ra est, ut nec tenebræ, nec cæcitas, nec si-  
 lentium, sed mera priuatio. Quamobrem  
 nulla eius actio per se esse potest, sed ex ac-  
 cidenti tantum, quod vel incommoda ni-

mis exercitationis quiete & remissione te-  
 pestiua declinentur, vel abundantia ocio ex-  
 ercitationis commodis priuemur & tan-  
 dem torpeamus. Itaque quies ex accidenti  
 refrigerat & humectat, corpus replet excre-  
 mentis, nervos debilitat, effœminat, omni-  
 umque partium actiones deteriores reddit.  
 Quamquam autem quies ex eorum genere  
 videatur esse quæ in nostra potestate posita  
 sunt, attamen ita comparatum est à natu-  
 ra, ut inter duos motus contrarios eam me-  
 diam interponi necesse sit, quod non ferat  
 contrariorum ratio, ut secum vniri conti-  
 nuarique possint. Nam prius contrarium  
 motum natura ordini non potest, quam pri-  
 orem sedauerit: atqui sedare, subsistere est  
 & quiescere. Exprimat ergo necessitas  
 quoddam esse tempus inter duos contrari-  
 os motus quo quies agatur. Id quod in pul-  
 su (qui cordis & arteriarum motus est) li-  
 quide obseruatur duobus motibus inter se  
 contrarijs constanter, quorum vterque qui-  
 etem suam habet. Cum enim facta artē-  
 riæ dilatione facultas pulsifica non possit  
 eam comprimere nisi à dilatando cessauerit,  
 nec similiter absolutæ arteriæ contractio-  
 ne eam denuo explicare, nisi contrahendi  
 finem fecerit, constat geminam esse in sin-  
 gulis pulsibus quietem, vnā post pera-  
 ctam diastolen quæ externa siue supēra, al-  
 teram post systolen, quæ interna quies si-  
 ue inferior appellatur. Earum vtrique pars  
 pulsus à medicis censetur, non proprie qui-  
 dem & per se ut diastole atque systole, qui  
 vere motus sunt, sed per accidens poti-  
 us, quod reuera nihil sunt, sed cessatio tan-  
 tum priuationeque morus. Conferunt ta-  
 men & illæ plurimum tum ad pulsuum co-  
 gnitionem, tum ad præfagiendum ex puls-  
 ibus, sicut postea in explicatione τῶν σπυγμῶν  
 dicemus.

H' τῶν. pars ventris ab umbilico ad pubem vs-  
 que, τὸν ὀνδρῶν. Gaza apud Aristot. sumēn si-  
 ue abdomen interpretatur.

H' σπυγμῶν. emplastri nomen ad inducendam ci-  
 catricem optimi. Parabatur ex testa ea ma-  
 xime quæ in fornacibus visa esset; eo quod  
 desiccandi abstergendique vim maiorem ha-  
 beret.

H' οὖν. sic dicitur torus oculorum ambitus.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

TO Θ.



**O**leum est ceratum quod faciei rubor conciliatur, quod constat etoici, erythrodani radicis, fuci, thuris, myrrhe, singulorum drachmis 11. Quæ omnia adipe vitulino & mastichino oleo excipiuntur. auctor Paulus libro 3. cap. 25.

Est & *Sais* vinculi genus quod capiti adhibetur, ubi summum caput & quod inter ipsum frontemque est vincire couenit. Cuius generis tres differentias recenset Galen. lib. de fasciis. Nec vero dubium est sic ab elegantia appellari, quod vel Thaidem de- ceant.

**Θαλασσίον**. est collyrium Hermophili accom- modum suffusionibus & hebetudini visus. Descriptio eius habetur apud Galenū, Aetiū & Paulum in hunc modū: Cadmiæ drach. xvi. æruginis drach. 111. artamēti Indici drach. xvi. piperis albi drach. vii. liquoris Medici drach. 111. opobalsami drach. 111. gumini drach. xi. vel xi. aqua adjicitur, qua pro diuersis affectibus varie tempera- tur. facit ad omnem visus hebetudinem & incipientes suffusiones, haberque odorem quam gratissimum.

**Θαλασσία**. dicitur à quibusdam *τὸ ἀνδροσάνης*, vt habetur apud Dioscor. **Θαλασσίης οἶνος**, siue θαλάσσιος, siue *πεθαλασσωμένος*, est vinum mari mistum, siue cui aqua mari- na addita est. Cuius miscendi rationem Dioscorides variam fuisse scribit libr. 5. & Columella libr. 12. cap. 25. latius explicat. Ex quo facile apparet vinum marinum fieri non modo affusa maris aqua, sed etiam my- ria, vt in mediterraneis regionibus, quo nō est facilis aquæ mariæ inuectio. Quod postremum vini conditi genus si quis non marinum, sed falsum appellari malit, parum quidem arbitror interesse. Equidem mihi videtur vtrumque & falsum & marinum vi- num dici posse. Certè Celsus semper vinum falsum, nunquā marinum nominat: id quod ex duobus maxime locis intelligi potest: primum ex libr. 3. in morbi regii curatione, deinde ex cap. 6. lib. 1. vbi negat inter soluta alii remedia falsum homini bibendum vi- num. His enim in locis manifeste per falsum vinum marinum intellexit, vt qui eadem vires falso tribuat quas Dioscorides mari- no. Nec est qui aliquam inter ea differen- tiam apud veteres annotarit. Græcorum in- uentum fuisse constat. Sic enim non fortia quidem & nobilia vina, sed imbecilla, vt ait Galen. libr. 12. meth. med. condiebant, siue

vt gratiam illis conciliarent, siue vt illis præ- cox vetustas accerferetur. Cæterum vini falsi septē genera Plinius enumerat, biazum quod fit siccatis in sole uvis & affusa aqua marinā largiore: leucochrym quod fit eodē vino in album mustum translato. quæ qui- dem duo vini genera sunt Græcis propria. In aliis autem gentibus simili modo factum vinum *πεθαλασσωμένον* dicit appellari. Quar- tum genus thalassiten vocat, vasis musti de- iectis in mare, quo præcox fiat vetustas. Ex quo loco manifestum est quam differenti- am ponat inter *πεθαλασσωμένον* & *θαλασσίον οἶνον*. Quintum est Coum, cuius etiam concinnandi rationem Constantinus Cæsar ex- plicat Agriculture lib. 8. cap. 23. Postea Rhodium Coo simile: vltimum Phorineum fal- sius Coo. Omnia autem eiusmodi vina al- num subducunt & stomacho aduersantur auctore Gal. libr. 12. meth. quo loco recen- set vina quæ stomachum roborant & dige- stionem alimenti in corpus iuuant.

**Θαλασσίον**. est compositio quædam constans æquis portionibus maris, mellis & aquæ pluuiæ defecatis, & in picatō vase per canis æstium insolaris. Sunt autem qui decoctæ maris aquæ partibus duabus vnam mellis adjiciunt, & vase condunt. Vtrumque vim habet purgatoriam, sed hoc multo imbecil- liorem.

**Θαλερόν**. *Θερμὸν αἶς ἀπὸ ἡλίου*. hoc est calidum ceu à sole, apud Hippocrat. dicitur *ἀπὸ τοῦ θερμαίνου*, inquit Galen. *ἐν ταῖς γλάσσιν*. Alii tamen in- terpretantur quasi *γαλλόν*, id est germinans, vt annotat idem Gal. libr. 7. Prorrh. com- ment. 3. Vide infra *θαλερόν*.

**Θάλασσαν**. herba est cuius folia coriandri similia sunt, cauliculus ruræ crassitudine, in quo summa folia consistunt. Nascitur maxime in campestribus. Omnia fere paria habet cum ea herba quam nunc argentinam ap- pellant.

**Θαμία** siue

**Θαμνός**. dicitur germen omne, sed præcipue & κατ' ἐξοχὴν oliuæ: vt apud Paulum libro 3. cap. 66. *ἀφ' ἧς μακρὰν ποδὶν, θαμνίαν, κύπελλον*. Sunt autem in olea summi ramorū colicu- li teneriores, nec à foliis sua mollitie ma- gnopere diuersi. Artamen Festus *θαμνίαν* ce- pæ folliculū priuatim intellexit.

**Θάλασση**. sic dicta fuit à quibusdam *ἡ θεία*, sicut habetur apud Dioscoridē, vbi quidam co- dices habent *θαλῆση*.

**Θάνατος**. mors, est copulæ animi & corporis dis- solutio. Opposita est vitæ, quæ cum calore nativo continetur, sicut ante diximus, eiuf- dem priuatione mors recte definiri videretur, sicut fecit Aristoteles, mortem dicens esse

caloris



caloris extinctionem. Siquidem calori illi quo vita constat, cum elementaris nō sit, sed plane diuinus & cœlestis, nullum frigus opponitur, sed ipsa tantum caloris priuatio, quemadmodum luci tenebræ, visioni cæcitas, & mortui quies.

**Θαλασσίς.** lethale. Dicitur ab Hippocrate tum de ijs quæ necessario mortem afferunt, tum de ijs quæ magna ex parte.

**Θαυμασίς.** sic à quibusdam ἡ ἱερὰ dicta est, quod magna florum varietate, sicut arcus quidam cœlestis, sui admirationem præbeat.

**Θάψα.** planta est in Thapso primum inuenta, tota natura ferulæ similis, cuius radix & incisa lacte manat, & contusa succo vehementer acri, calido, humido qui eodem cum sua planta nomine *θάψα* vocatur. Romani ferulaginem & ferulam syluestrem nuncupant.

**Θάψος.** thapsus, herba est, quam Romanos herbam robiam appellare, & aureo colore splendere Paulus scribit lib. 3. cap. 2. Eadem esse videtur cum ea quæ apud Theocritum poetam legitur tingendis lanis utilis. An vero eadem sit cum thapsia, non constat.

**Θείον.** sulfur. Est succus terræ pinguis & purior, vi caloris ex ipsa expressus, siccatus & concretus. non aliud est quam terræ vel terræ pinguedo tenuis, calida, ignea, calore siccata. Chymistæ definiunt esse vaporem terræ calidum & siccum, qui causa sit & parer metallorum. Alterum enim & fœmininum principium metallorum argento viuo tribuunt. Tale autem est fossile & natium, quod Latini sulfur viuum appellant, Græci *θεῖον*, quod Celsus interpretatur ignem nō expertum. Reperitur vt plurimum in locis ardentibus, vt in insulis Æoliis & Phlegæis campis inter Puteolos & Neapolim, quam planiciem sulfurosam Græci *ἡράσιον ἀργεῖον* appellant, figuraque est fere semper globosa, rarissimeque in stiliarum modum de speluncis vel cuniculis dependet. Præterea translucet, resplendet, viret, pingueque est: cuiusmodi reliquis omnibus præfertur, & à medicis in usum expetitur. Est autem aliud sulfuris genus factitium quod variis modis paratur. Nam aut ex aquis coquitur, aut ex gleba effossa, & in vasis cocta perficitur igni, aut ex pyrite in ollis cocto stillat. Fit etiam ex sulfure & squama ferri simul coctis & in vrceos trāsfulis, quod, quia equorum scabiem sanat, caballinum nominant. Non omne vnius est coloris. Aliud enim est luteū, aliud cinereū, aliud rufum. Sapore est subpingui, odore graui, fulminis & fulguris, cumque viitur, nares ferit aura acri & ignea. Omne rarum leueque est & tenuium partium, trahendique vim possidet, estq; temperamenti calidi. Valet maxime ad morsus venenatorum animalium, si & siccum ictui inspergatur, & cum salina mistum. Cum resina autem terebinthina aut melle psoras & lepras optime extergit sanarque.

**Θείον.** diuinū. Dicitur quod est à Deo, vel à cœlo, quodque vt Deus magnum est aut excellens aut admirabile aut in comprehensibile, hoc est, cuius causam nō sensu modo sed ne cogitatione quidem assequi possumus. Ea significatione intelligi debet id quod in morbis diuinū esse Hippocr. dixit: quanquam in eo explicando variæ fuerint, vt scribit Gal. interpretum sententiæ. Sed omnibus refutatis ipse suam dicit, non aliud esse id diuinū, quam ambientis nos aeris constitutionem. Verum ea cum possit esse multiplex, quam proprie intelligat, non explicauit. Primarium quidem qualitatum temperamentum non est verisimile Hippocratem intellexisse, quod illud nō dicam medicis, sed idiotis etiam notum sit, id autem diuinum cuius notitiam Hippocrates haberi vult, à doctissimis tantum medicis cognoscatur. Itaque aliud quid latentius cogniturque difficilius intelligit, quod certe si temperamentum non est, qualitas quædam siue constitutio sit oportet, non primis qualitatibus, sed proprietate totius substantiæ nobis infensa, quam in lib. de natura humana *πνεῦμα τὸ αἰσθητὸν* appellauit. Eam Galenus comment. 2. expirationem siue exhalationem interpretatur, quæ magis proprietate totius substantiæ quam qualitate corpora offendat, cuius curationem recte tradiderit Hippocrates positam in loci mutatione, & exiguae inspirationis vsu. Hæc autem aeris insalubris proprietas, vel à specu, vel à cloacis, vel à cadaueribus putrentibus, vel ab ipsis etiam astris aliquando esse dicitur. Ex ea omnes fere morbi epidemici prodeunt, quorum *πῶς ποτὲ* considerandam esse Hippocr. præcepit: verum tamen non in solo aere diuinum illud esse potest, sed in alimentis etiam, vt in semiputri tritico, & aquis vitiosis, aliisque eiusmodi.

**Θελασσίς.** sic dicta fuit ἡ ἱερὰ à quibusdam, vt habetur apud Dioscor. vbi tamen quidam malunt *θαλασσίς*, ὅτι τὸ θαλάσσιον.

**Θίναρ.** vola manus. palma. Pars manus interior à magno digito ad indicem, vel, vt alii, spatium quod est à digitis ad carpum. Sic quidem plerisque visum fuit: Galenus autem comment. 1. *εἰς τὸ πρὸς ἀγρὺν* dicit *θίναρ* appellari palmæ partes magis eminentes, *ἀπὸ τῶν θίνων*, hoc est à percutiendo. Nā quod percutimus, partibus illis eminentioribus percutimus. Alii vero, vt idem scripsit, non omnes eminentes palmæ partes sic appellant, sed eas tantum quæ pollicis subiiciuntur. Rufus *εἰς τὸ πρὸς τῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν*, scribit vocari *θίναρ* spatium illud carnosum medium inter indicem & pollicem. *ἡ δὲ θίναρ* autem partem quatuor digitis subiectam: videri tamen sibi *θίναρ* ab Hippocr. nuncupari totam eam partem manus quæ lata est, hoc est palmam. Aristoteles totam eam manus partem quæ est à carpo vsque ad quinque digitos, *θίναρ*, hoc est palmam, vocat:

que cum duabus etiam partibus constet, internam quidem quæ carnosæ est, & scissuris vitæ indicibus distincta; *ἑνὰν ἀρτηρίαν* nuncupat: externam vero, quæ nervosa est, & quinque ossibus constat ad digitos tendentibus, proprio nomine carere dicit: iuniores tamen alii *μετακάρσιον*, alii *ἐντιθένην* appellant.

• *Θεοδόντα*. sunt collyria multorum generum. Eorum enim plures differentias recenset Aetius libr. 7. sic autem dicuntur ab eorum autore Theodoto. nam & *Θεοδόντι καλόν* describit Celsus & Paulus paucis admodum immutatis, quod à quibusdam Celsus scribit *ἀνδρῶν* appellari. Verum sicut plures eorum differentiarum sunt, ita diuersæ facultates: alia extergent, alia desiccant, alia corroborant, alia vero reperiuntur & poros obstruunt, ut ea quibus Paulus utitur aduersus *οφθαλμῶν* oculorum.

• *Θεοδότης*. est antidoti nomen quæ *δὲ ἀνακαρδίων* dicitur ad frigidas capitis affectiones, omnique pectoris vitia, atque ad eos qui vix sefe ex morbo recipiunt, multosque alios morbos perutilis. Huius geminam compositionem describit Paulus libr. 7. cap. 11. quibus tertiam ex aceto mulso addit Aetius libr. 13. quo loco pluribus verbis agit de hac antidoto.

• *Θεοχίρ*. est nomen antidoti ex hircino sanguine præparatæ, quæ nephriticis calculosisque præsentis remedio est. Habetur apud Aetium libr. 11.

• *Θεοφίλιον*. est collyrium *θεοφιλίον*, describitur apud Aetium libr. 7.

• *Θεραπευτική*. pars est medicinæ quæ curandi rationem docet. Duobus modis sumitur, proprie & communiter. Proprie dicitur quæ morbo iam facto curando tollendoque intenta solum est, cuiusmodi est diariarum atque hecticarum febrium. Earum enim vera & propria curatio est. Siquidem maxime propria in soluendo morbo intelligitur curatio. Verum per abusionem etiam siue communiter, siue improprie curatio appellatur, mistum genus tum ex vera curatione, tum prouisione quam *θεοφιλίον* appellant, quæ proprie non ad *θεραπευτικήν* sed ad *ὀφθαλμικήν* pertinet. Eiusmodi est febrium curatio, quæ ex putrescentibus excitatur humoribus. Siquidem ea *θεοφιλίον* quoque sibi adiunxit: cuius officium est causam, quæ morbum creat, adimere. Nominatur tamen hæc ipsa quoque artis pars *θεραπευτική*, hoc est curatrix, quæ utique ab ea quæ pure sincereque *θεοφιλίον* dicitur, in eo distincta est, quod sub hac iam sensibilibiter ex ipsa causa morbus est genitus, in prophylactice vero est futurus. Cæterum *θεραπευτική* tres sunt partes ad morborum absolutam curationem necessarias, *διαίτητική*, *φαρμακική*, *χρυσική*: quarum prima victus rationem ægrotis cōuenientem, altera medicamenta præscribit, tertia vero manum, si opus est, adhibet.

• *ἑρῆον*. locus ad æstiuandum commodus, & in

quo æstate habitare conducit, apud Hippocratem. sunt tamen qui *ἑρῆον* scribant. Gal., *ταῖς γλώσσαις*.

• *Θερμόν*. nomen collyrii quod describitur à Gal. libr. 4. *τὸν καὶ τὸν*.

• *Θερμὰ ἔλαιον*. febricitare, apud Hippocratem libr. 1. *τὸν ἐν τῇ*, ut Galenus annotauit in comment.

• *Θερμὰ*. febris, apud Hippocratem. pro quo & *θερμολή*.

• *Θερμὸν*. calidum. Duo significat, qualitatē & substantiam: illam quidem ut cum dicimus ignem calidum, aut ferrum, aut piper. intelligimus enim calore seu caliditate præditū. Id quod tribus modis accipi potest: absolute seu simpliciter, ut quando ignis elementum calidum dicitur, quod summum calorem possideat: in excessu, ut ferrum candens, piper, leo, canis, quoniā plus caloris habeat quam frigoris: in comparatione, ut cum homo homine, leo leone calidior dicitur. Aliquando vero significat calidam substantiam, ut annotat Galenus comment. in aphor. 4. libr. 1. & comment. 4. in libr. 6. *τὸν ἐν τῇ*. atque etiam aerem, aquam & bene temperatam, quemadmodum idem in comment. eiusdem aphor. annotauit. Talis autem substantia calida non est aliud, ut idem alibi scribit, quam calidum innatum cuius vi omnium animantium vitam natura moderatur. Est enim aut anima, aut primum aut præcipuum animæ instrumentum, quo omnia quæ sunt ad viuendum necessaria, administrat. Id non est nuda aliqua aut elementaris qualitas, non ignis aut aliquid quod ab igne originem ducat, sed substantia cœlius in viuētia corpora delapsa, & aliquid proportionē respondens elemento stellarum, sicut Aristoteles de generat. animal. libr. 2. cap. 3. explicauit. Itaque quoniam elementare non est, sed plane cœleste & diuinum, nullum habet contrarium, non aquam, non terram, aut aliquid quod ab ijs originem ducat. Sui ipsius priuatio opposita tantum illi est, sicut lumini tenebræ, & visioni cæcitas: proindeque ut eo vita, sic eiusdem extinctione mors ab Aristotele definita fuit. Eo omnis generatio perficitur: eo omnia vitam adipiscuntur & conseruant, eo ratiocinamur, sentimus, mouemur, nutrimur, crescimus, non ut opifice quidem harum omnium functionum, sed tanquam instrumēto animæ eiusque facultatum, sine quo eæ non possunt eiusmodi res præstare. Ex his patet illic animam vitamque esse, vbicunque calor ille natiuus fuerit. Est autē inæqualiter in singulis corporis partibus dispersus. In corde enim viget & flagrantissimus est: in ventriculo & præcordiis multo moderatior: in capite & cerebro præsertim adhuc eo minor: in ossibus perexiguus, prout natura unicuique particulæ expedire iudicauit. Hic fixus insitque dicitur, hoc est à natura in prima conformatione singulis partibus certa mensura modoque inditus, qui earum velut forma quædam

quædam atq; anima esset, & illis vitale principium roburque impertiretur. Residet ille maxime in partium singularum spirituosa substantia, & humido substantifico pingui, crasso, lento, multo, nec facile putrescenti in corporibus præsertim sanis, & quæ non facile in morbos incidunt. In tali namque humido calor ille singulis partibus insitus diutissime conservatur, qui tamen nisi subinde notui alterius caloris accessione, instauraretur, paruo temporis spatio marcesceret atq; extingueretur. Proinde natura calorem vocatam à medicis fluentem in corde tãquam in penu collocavit, qui ab eo per arterias cū spiritu & sanguine suis vehiculis & pabulis continenter depromitur, ferturque in singulas partes, vt earum calorem nativum fixum insitumque foueat atque instauret. Ille in motore, metu, verecundia initio, frigore, accessionum principijs & somno intro cum sanguine & spiritu in cor recurrit, ob idque per eos affectus cutis & subditæ illi partes frigent & pallent, contra in gaudio, verecundia iam vigente, statu accessionum, vigilia ad cutim copiosior effunditur cum spiritu & sanguine, à quibus calor, rubor, tumor & nitor inducitur.

**Θερμός πυρρός.** calidus pulsus. In quo arteria calidior apparet quam partes vicinæ, sicut in febre hectica euenit. Neque tamen **εκπνός** est, quod hic sub differentia pulsus in æqualis comprehendatur, ille vero aliam quandam speciem constituat. Huic oppositus est **ψυχρός**. Hæc quidem differentia inter primas & simplices numeratur, sumptaque est à qualitate arteriæ, impropria tamen videtur, verum addendam quidam censuerunt, non minus quam eam quæ mollitiæ & duritiæ arteriæ definitur.

**Θέρων.** lupinus. pondus est duas oboli textias partes pendens. Etenim cum obolus pendat grana duodecim, lupinus pender grana octo. de hoc scribit Cleopatra: **ὀβολός ἐστὶ θέρων ἡ δὲ S.** id est, obolus habet lupinum vnum & dimidium. Diniditur autem lupinus **εἰς δύο κέρματα**, id est in duas siliquas, siue in grana octo. eadem Cleopatra docet his verbis, **θέρων ἐστὶν ἡ δὲ κέρματα β'**.

**Θέρωνος, ὁ πυρρός,** apud Hippocrat.

**Θέρων.** æstas. Est tempus anni calidum & siccū, Virgilium marutino exortu incipiens & Arcturo oriente desinens. Illa ex ætate quidem mediæ & florenti, ex diei partibus, meridiei, ex humoribus flauæ bili, ex elementis igni respondet. Est enim ex suapte æstimata natura, non ex alterius comparatione, calida & sicca temperie, si modo exquisitè suam naturam seruauerit. Est autem sol caloris eius causa, qui ad verticē nostrum quam fieri potest proxime accedens, diemque facies longiorem, aerem nos ambientem excalfacit. Itaque cum Virgilie circiter octauum diem Maij exoriri consueuerint, Arcturi autem ortus fere secundo Septembris die contingat, palam est totum æstatis

tempus quatuor paulo minus mensium esse. Quod quidem spatium etiam antiqui in duas partes diuiserunt, primam appellantem proprie æstatem, ab eius initio vsque ad exitum Caniculæ, alteram vero **ἐπὶ πύρρῳ**, à Caniculæ ad finem vsque æstatis. At vero è Græcis etiam aliqui totam æstatem in treis porciones partiti sunt, quarum primam totius nomine **ἥρος**, mediam **ἄρος** per excellentiam, in quam maturescentes fructus **ἀρόρου** dicuntur, tertiam vero **ἐπὶ πύρρῳ** nuncuparunt.

**Θεοκράτης ἡ**

**Θεοκράτης ἡ** confectiois nomen auctore Apollonio, cuius descriptio habetur apud Galen. libr. 7. **τῶν καὶ ἡπνός.** Conuenit tussientibus, phthysicis, sanguinem reijcientibus, valetq; ad omnes internos pectoris abscessus. Describitur etiam ab Actio libr. 8.

**Θεοκράτης ἡ**

**Θεοκράτης ἡ** contemplabilis dies: hoc est, ex cuius diligenti obseruatione quādo & qualis futura sit crisis intelligitur. Is autem cuiusque septimanæ quartus est, qui si manifesta concoctionis signa proferat, ostendit proximum ab eo septimum diem finem morbo salutarem allaturum, vt qui contra signa edit maligna, mortem prænūciat. videtur **ὁ δὲ ἡλός ἡμέρας**.

**Θεοκράτης.** dicuntur apud Hippocr. qui deorum oracula sciscitarum mirabantur, vt annotauit Erotianus.

**Θεοκράτης ἐμπλαστῆρος.** emplastrū est aduersus achoras efficax: cuius descriptio habetur apud Galen. libr. 1. **τῶν καὶ τόποις.**

**Θήλη.** papilla. Est mamme capitulū, vnde extrahitur lac. Hæc media in mamma protruberat. Substantia cōstat ad penem proxime accedente. Est enim illi neruea quodammodo cutis spongiosam intus substantiam continens, quæ dirigi ac vicissim laxari nō minus quam penis potest. Habet autem tenues & cōspicuos meatus, fibræ prorsus ac nerui modo albicantes, qui venarum furculi sunt, multiplici serie per glādulosam mammaram substantiam excurrentium, ex quibus lac effunditur. Cæterum papillā ambit circulus quidam subniger, qui **φῶς** appellatur.

**Θηλοπιδύσσεια σαφύλη.** vna passa extra vitem, hoc est vna sole siccata, non quidem in vite, sed postquam è vite detracta fuerit, & loco caloris exposita, quod tum in cratibus tum super cannas commode fieri posse ostendit Columella l. 12. quo nomine etiam ea potest intelligi quæ samentis suis adhuc hærens & pedita, in vmbra sub tecto siccatur. Vtitur sæpe Dioscor. eo vocabulo, Ruellius vuam sole siccata in area exponit, Marcellus vuam in cratibus siccata. Est autem **θηλοπιδύσσεια** locus in quo vna siccatur, dictus **ἀπὸ τοῦ θηλοπιδύσσεια** & **θηλοπιδύσσεια**, hoc est, quod siccatae sint in sole & solo. Quæ vna passa simpliciter dicitur, hoc est, quæ in vite adhuc manens à sole siccata est, **θηλοπιδύσσεια σαφύλη** nominatur.

**Θηλυόνη**, herba olez folio, quæ fœminei sexus fœtum edere dicitur. Altera species est ἡ φύλας, de qua suo loco.

**Θηλυκόρνια**, cornus fœmina, sic enim compositio nomine dicitur à Theophrasto, quasi fœmini cornus.

**Θηλυπύλες**, filix fœmina, herba est foliis filicis, succulosis, altioribus, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent: aliæ etiamnum rubræ inveniuntur. Vim siccandi & amarâ possidet, & modice constringit.

**Θηλυπύλες**, dicta fuit à quibusdâ eo nomine ἡ δαΐσα, sicut habetur apud Dioscor.

**Θηλυφθόρον**, sic dictum esse à quibusdâ ἡ ἀλφειον, scripsit Dioscorides.

**Θηλυφθόρον**, dictum sic est à quibusdâ ἡ ἀλφειον, quod, ut Theophrastus & Plinius scribunt, radix eius genitalibus omnium quadrupedum fœminini sexus indita, mortem eodem die inferat.

**Θημύων**, ὁ σαρὴς, cumulus, acervus, apud Hipp.

**Θήξ**, futura, modus unus est adducendi labra hiantis nimium vulnētis, cum per acum eorum ora propius coniunguntur. Dicitur & ἡ θήξ, hoc est, per acum siue per punctiōnem. ἡ δὲ ἡ θήξ, quod acuiere & acu transfigere significat. Itaq; errant qui θήξ per ἡ scribunt, quò nomīne contactus designatur. Quamvis enim per futuram ora vulnēra ita adduci possunt, ut se contingant, id tamē pluribus modis fieri potest, ut per ἡ θήξ, ἡ ἀσμοῖν atque ἡ σαρὴς.

**Θηράκος οἶνος**, vinum Therazum, quod in Cretâ nascebatur, dulce, nigrum, crassumque, sed citra adstrictionem. ideo minus in ventre morabatur, nec tamē vrinas mouebat sed deorsum descendebat. Itaque etiam ante cibum sumebatur. Non est idem quod Θηραῖον, quod Asiaticum erat.

**Θηριακά**, theriaca. Dicuntur proprie medicamenta quæ venenatorum animalium morsus depellunt. Eo ab Alexipharmacis putantur differre, quod hæc venenis intro sumptis, illa venenis à morsu animalium intro subeuntibus medeantur, ut licet videre ex Nicandro qui vitæ quæ duobus libris elegantissime prosequutus est. Cæterum geminam ἡ θήξ, ἡ θηρίακὴν differentiam facere videtur: vnam eorum quibus animalium morsus præcaueretur, siue suffriti, siue institari, siue illiri: alteram vero quibus morsus ipse curatur & innocuus euadit. Dicta sunt ἡ θηρίακὰ ἡ δὲ τῶν θηρίων, hoc est, à feris & venenatis animalibus, non autem ab vlla certa eorum specie: quanquam vipera, quæ proprio nomine ἡ ὄφρα siue ἡ ὄφρα vocatur, à Græcis ἡ θηρία καὶ ἡ ὄφρα appelleretur, ut & leo ἡ ὄφρα aliquando.

**Θηριακά**, theriace. Est antidotus aduersus venena omnia efficax. Ac quæquam omne quod eam habet facultatem ἡ θηρίακὴν vocari possit (nam & allium rusticorum theriacen Galenus appellat) hoc tamē nomen præcipue

obtinuit celeberrimum illud medicamentum ex simplicibus plurimis & viperarum carne compositum, valens ad venena omnis generis, siue morsu siue potu in corpus peruaderent. Nam cum antiqui crebro in venena inciderent, & animaduertirent se nec serpentium ictus euadere, nec venenorum insidias vitare facile posse, simulque considerarent naturas hominum tantopere ab inuicem differentes, ut quod vni prodest alteri sæpe non conferat, hoc medicamentum multiplex & exquisitè compositum excogitarunt, quod omnibus aduersus hæc mala præsentaneo esset remedio. Nec tamen adeo vetus est eius inuentio, sed Neronis fere temporibus. Tunc autem inter medicos celeberrimus erat Andromachus, qui medicis consultantibus inter se quomodo hæc antidotus maxime præsentanea euaderet, primò excogitauit viperas addere. Itaque theriacæ compositio quæ ad Andromachum refertur, antiquissima est & Galeno iudice optima. Eam autē ipse versibus descripsit quos Neroni dicauit, & quos Galenus libello suo de Theriaca ad Pisonem inseruit. Est autem eiusmodi: Pastillorum scillinorum drach. xlviii. pastillorum viperinorum drach. xxiiii. piperis longi drach. xxiiii. succi papaueris drach. xxiiii. magnatis hedychoi drach. xxiiii. rosarum siccarum, iridis Illyricæ, radicis dulcis, seminis napi sylvestris, scordij, liquoris balsami, cinnamomi, agarici, singulorum drach. xii. myrrhæ, costi, croci, casia, nardi, florum iunci rotundi odorati, thuris, piperis nigri, dictamni, marrubij, rheij, stœchadis, petroselinij Macedonici, calaminthæ, terebinthina, zinziberis, radicum quinquefolij, singulorum drach. vi. polij, chamæpityos styriacis, racemorum amomi, mei, nardi Gallicæ, sigilli Lemnij, phu Pontici, chamædryos, foliorum malabathri, chalcitidis assæ, gentianæ, anisi, succi hypocistidis, carpopalsami, gummi, seminum fœniculi, cardamomi, seileos, acacia, thlaspeos, hyperici, sagapeni, ammeos, singulorum drach. iiii. castorei, aristolochiæ tenuis, seminum dauci, bituminis Iudaici, succi panacis, centaurii tenuis, galbani, singulorum drach. ii. mellis libr. x. vini Falerni, quantum sufficere videbitur, hæc quidem Theriaca fuit Andromachi, eum in modum à Galeno descripta libr. ad Pisonem. Cæterum hanc antidotum Andromachus non appellauit ἡ θηρίακὴν, sed ἡ θηρίακὴν, quasi dicas serenam, atque aliis etiam duobus nominibus ἡ θηρίακὴν & ἡ θηρίακὴν. Postea vero Crito & qui eum sequuti sunt, ἡ θηρίακὴν vocauerunt, quia viperæ carnes reciperet. Eius compositionem Aetius exactissime persequitur. Ad huius autem exemplum plerique alias antidotos aduersus venena valentes composuere, quas appellarunt similiter ἡ θηρίακὴν. Sunt autem hæc fere quæ sequuntur, ab authoribus, aut aliis quibusdâ nobilibus viris nuncupatæ.

*Theriaca Aëtiæ Galien.* Theriaca Aëti Galii, quam ipse ex Arabia rediens dicitur Cæsari obtulisse, quod per eam pluresque servasset. Recipit autem, Radicis vitis albae drach. xvi. seminis trifolii, opopanax, singulorum drach. vi. aristolochiae tenuis drach. xii. radicis libanotis, iudaeae, zinziberis, opii, singulorum drach. v. seminis rutae sylvestris drach. xii. cumini Aethiopici drach. xvi. myrrhae, castorei, scelleos, radicis eryngii, serpylli, succi Cytenaici, singulorum drach. v. Medicae drach. xii. sagapeni drach. vi. croci drach. v. farinae erui drach. xxi. hæc cum aqua in pastillos trium obolorum rediguntur, & ex vino dantur.

*Theriaca Aëtiæ Galien.* Constat istis, Radicum mei, serpylli, opopanax, singulorum drach. ii. seminis trifolii drach. i. anisi, fomiculi, ammeos, seminis apii, singulorum acetabulo uno farinae erui tenuissimae acetabulis duobus, vino antiquo quantum satis esset ad commiscendum, ut totulae hinc fieri possent, quæ in umbra siccatæ ex tribus vini cyathis trium obolorum pondere exhibebantur. Eam Eudemius versibus conscripsit, qui à Galeno citatur lib. 2. de Antidotis.

*Theriaca Damocra.* Theriaca Damocratis, qui medicus optimus cum esset, versibus iambicis eam descripsit, qui à Galeno referuntur lib. 1. de Antidotis, medicamenta prorsus eadem continet quæ & Andromachi Theriaca, sed in pōdere discrepat. Nam quorum Andromachus quatuor drachmas accipit, hic duas sumit, & rursus quorum Andromachus duas, ipse quatuor immitit, id quod in multis medicamentorum generibus licet obseruare. Refertur & ab Aetio lib. 13.

*Theriaca Anaxagoræ.* Theriaca Demetrii. Hic ætate Galeni Cæsarem fuit archiateros, qui tum in theriaces compositione Andromachum reliquis in rebus sequeretur, pondere tantum pastillorum scillinorum differebat leni prorsus discrimine. Nam Andromachus xli. vi. drachmas cum immitteret, ipse xlv. tantum admiscebat.

*Theriaca Euclidis.* Theriaca Euclidis cognomine Palatiani. Habet illa: Castorei drach. v. opopanax, sagapeni, scelleos, cæchryos, chamædryos, chamæpityos, marubii, singulorum drach. xvi. styracis, bituminis Iudaici, myrrhae, singulorum drach. vi. succi papaueris drach. vi. mellis librâ unam: datur cum succo fraxini, vel cum vino drachma una, vel plus etiam si lubet: prodest & quartanariis.

*Theriaca Zenonis.* Theriaca Zenonis Laodiceæ: habet autem cardamomi demptis inuolucris, serpylli, seminis apii, radicis vitis albae, seminis trifolii, anisi, petroselinæ, radicis & seminis fomiculi, ammeos, aristolochiae tenuis, farinae erui, opopanax, singulorum pondus æquale. Separatim primo quæque contundi debent, tum misceri, & vino affu-

so subigi, indeque formandi pastilli, & in umbra siccandi.

*Theriaca Mithridatis.* Theriaca Mithridatis. Est antidotus alio nomine *Mithridatica* appellata, quod rex Mithridates ea semper vltus esset, ut se à venenis tutum præstaret. Itaque à Romanis obsessus, bis epoto veneno cum mori non posset, seipsum gladio interemit. Constat per multorum medicamentorum mistura, & describitur à Galeno lib. 2. de Antidotis. Ea est quam nescio quomodo Aetius theriacen Andromachi appelleret: nam quam Aetius describit, istam manifesto continet, parumque habet similitudinis cum illa Andromachi theriaca quæ superius descripta est, & quam Galenus cæteris præfert.

*Theriaca Aëtiæ.* Theriaci sales: hi quales fuerint, supra à nobis dictum est in dictione *sal.*

*Theriaca Apollonii & Asclepiadis.* Theriaci panes seu pastilli. Sunt pastilli ex viperæ carnis confecti, ad theriaces præparationem, sunt hoc modo: Viperæ formæ capiuntur desinente vere. Earum capita & caudæ amputantur, excoriantur, & diligenter repurgantur. Carnes ipsæ bis terque in aqua lauantur, postea in ollam puram injiciuntur cum aqua sufficienti, ac anethi viridis fasciculo, coquuntur subiectis lignis vitis, donec carnes à spinis discedant & penitus separentur. Eas tunc manibus diligenter exprimere oportet, & in mortario tenuissime terere, semper aliquid iusculi in quo decoctæ sunt, paulatim instillando. Deinde panis purissimi recentis, aridi, contusi, cribratique quarta carniū pars addatur, vel, quod minimum, quinta: rursus paulatim iusculi aliquid affundendo. Omnia simul terantur & exactissime uniantur, indeque formantur pastilli mediocres, tenues, modico opobalsamo in his formandis adhibito, qui postea in umbra siccentur. Inde opobalsamo optimo oblinantur, & in vitro vase asseruentur, & si quid puluerulenti & albi in ijs propter situm appareat, id deinceps lintheo extergeatur.

*Theriacum.* nomē etiam est emplastri ex cēntaurio, quod laudat Oribasius, & facit ad neruorum & musculorum vulnera & puncturas, ad feratū etiam & canis rabiosi morsus. Refertur ab Aetio lib. 13.

*Theriacum vinum.* Vinum Theriacum. Id Asiaticum erat, & dulce simul atque pallidum, ut scribit Galenus libro 5. sanitat. tuenda. Idem vero lib. 2. de virginitate, ait nigrum esse, sed minus Caryino.

*Theriacum.* significat apud Hippocratem tum lumbricum, tum vlcus *εχρη*, ut explicat Galenus in τὰ ἔσθια καὶ τὰ γαστρί.

*Theriacum.* frutex est foliis subherbaceis, flore roseo, sic dictus quod serpentibus ad motus torporem inferat.

*Theriacum.* sic dictum est à quibusdam τὸ ἀνίστα, quod feras, si ab ijs edatur, occidat.



**Θελιδιον.** ferinum. Gal. comment. 2. in lib. 6. τὸ  
 Θελιδιον interpretatur χαλιδιον, hoc est mali-  
 gnum: quamquam alij, vt ait, Hippocr. inter-  
 pretes non simpliciter τὸ χαλιδιον significare  
 dicant, sed alij quidem τὸν φθόνον, quod qui eo  
 morbo laborant, propter vnguium curuita-  
 tem feris similes esse videantur: alij *Θελιδιον*  
 vocari dicant proprie pulmonis vlcus. alij  
 vero, vt priore commentatio Galeni scri-  
 psit, eo nomine τὰς ἀσκαρίδας καὶ τὰς ἐλμύδας  
 intelligunt: alij elephantem, alij cancerum.  
 Galeni tamen sententia est eo nomine τὸν φθόνον  
 designari.

**Θελιδιον ὁ φθόνος.** ferina infania. Dicitur ab  
 Hippocrate ea per quam aliquis discit, ut  
 calcibus dentibusque perit, & sibi ab omni-  
 bus fieri insidias putat, vt annotauit Galen.  
 comment. in Prorethet. Idem paulo post ait,  
*Θελιδιον ὁ φθόνος* appellat, quando ij qui  
*μεταγχαίνονται* insaniunt, in obuios quosque  
 delatruunt: eo nomine vehementem me-  
 lancholiam significans.

**Θελιδιον.** genus vlceris terribili, quod idem  
 esse cum carcinomate multorum opinio  
 est. De eo Celsus libro quinto prodidit, vl-  
 cus esse rum perse nascens, tum vlceri ex a-  
 lia causa facto interdum superueniens. Co-  
 lor ei liuidus est vel niger, odor foedus, mul-  
 tus & mucii similis humor. Id ipsum neque  
 tactum neque medicamentum sentit, pru-  
 rigine tantum mouetur, at circa dolor est  
 & inflammatio, interdum etiam febris ori-  
 tur. Nonnunquam ex vlcere sanguis erum-  
 pit: ad id quoque malum serpit, quæ omnia  
 sæpe intenduntur, fitque ex his vlcus quod  
*έρπητα ἐκόμενον*, hoc est herpetem exeden-  
 tem, Græci vocant. Galenus comment. 2.  
 in lib. 6. τὸ Θελιδιον. scribit aliquos existimare  
*Θελιδιον* proprie dici vlcus quod in pulmone  
 est. Author autem Introductorii seu Me-  
 dici scribit quamlibet corporis partem the-  
 riomate impeti.

**Θελιδιον.** eunuchus factus καὶ θλάσθαι, hoc est per  
 compressionem, ad hunc modum: Pueri  
 adhuc infantes in aquæ calidæ solium collo-  
 cantur, deinde vbi eorum corpora eodem  
 solio fuerint relaxata, digitis testiculi com-  
 primuntur, vsque dum aboleantur & eua-  
 nescant, & dissoluti non amplius ad tactum  
 sublabantur. Ex Paulo libr. 6. cap. 68. Re-  
 peritur & *θλάσθαι* pro eodem.

**Θελιδιον.** cōtusio, collisio. Dicitur proprie solu-  
 ta in carne & musculo continuitas, cum gra-  
 tie & durum aliquid deciderit in corpus. Id  
 enim carnem abrumpit & atterit. Quam-  
 quam & in osse videtur aliquando tueri,  
 sed in pueris maxime. Oportet enim in se-  
 cogi id os quod colliditur, atque ita molle  
 euadere vt perfecte durum non sit.

*Θλάσθαι* etiā numeratur inter fracturæ cra-  
 nij differentias, quamquam fractura cranij  
 non est, nec fractura quidem simpliciter, sed  
 ossis caluarie in anteriorem partem impul-  
 sio & veluti inflexio, cavitatem tantum non

etiam vnitaris solutionem in caluarie effici-  
 ens, vt licet in plumbeis & aeneis vasis videre  
 si foris illidantur.

**Θελιδιον.**

*Θελιδιον*: herbula est semine nasturtii, acri, &  
 manum sinapis modo lingua & os vellicat  
 propterea rusticum sinapi dictum fuit à ple-  
 risque, vt habetur apud Dioscor. Herbarii  
 vocant nasturtium tectorum.

**Θελιδιον.** dictum ab Hippocrate. *ἀντὶ τοῦ θελιδιονος*  
 de quo supr.

*Θελιδιον σπινθης* compressio pulsus: cum incipien-  
 te paroxysmo pulsus admodum parvus & in-  
 æqualis est. Proprium est putridæ febris.

*Θελιδιον πνεύμα.* quid significet apud authorem  
 Prorethetici incertum est. Alii putarunt dici  
 spiritum plenum vaporis, qui expiratur: alii  
 spiritum graueolentem, alii rancum, alii per-  
 turbatum, tanquam eo nomine difficilis re-  
 spiratio intelligatur. Plurique verò non *θελιδιον*  
 sed *θελιδιον* per se scribunt, quasi *θελιδιον* &  
*αἰμαζον*, id est florentem & vigentem, siue ma-  
 gnum atque vehementem. Verum Hippo-  
 crates nullo in libro, qui suus legitimusque  
 sit, visus est vel spiritum vel quidvis aliud *θελιδιον*  
 nominasse, vt scripsit Galen. comment.  
*ἐν τῷ περὶ πνεύματος*.

**Θελιδιον.** vinculi genus est quod caluarie adhibe-  
 tur, vbi summum caput & quod inter ipsum  
 frontemque est, vincire conuenit, cuius in-  
 iijciendi rationem Galenus explicat libr. de  
 faciliis.

**Θελιδιον.** sic dictum esse à Pythagora τὸ πῦρ-  
 χον, Dioscor. author est.

**Θελιδιον.** sedes vtrinque peruiæ, apud Hippocra-  
 tem.

**Θελιδιον.** pungitur, stimulat, mouetur, pelli-  
 tur, apud Hippocr. Sunt autem qui *θράσθαι*  
*ἀντὶ τοῦ μαλινώδους* interpretati sunt, vt annota-  
 uit Erotianus.

**Θελιδιον.** species vna ammoniaci, quod in mi-  
 nutas glebas veluti in frusta fractu sit & di-  
 uisum, vel facile fractur. vide *ἀρμυρίδιον*.

**Θελιδιον.** friabile. Id dicitur quod in quasvis sine  
 discrimine, & plures duabus partes diuidi  
 & comminui potest. In quo differt *ἀντὶ τῶν*  
*καλακίων*, quæ non nisi in magnas partes  
 diuidi separarique possunt. Quamquam  
 fieri interdum possit, vt idem *καλακίων* &  
*θραυστὸν* existat: fictile enim vtrumque per-  
 petitur. Distinguuntur autem ab inuicem,  
 sicut scripsit Aristoteles, quod quæcunque  
 ita concreuere vt multis scateant poris al-  
 ternatim dispositis, *θραυστὰ* sint: quæ vero eos  
 longe porrectos habent, *καλακίαι*: quæ vero  
 vitrosæque fortita sunt, vtramque nata sint  
 conditionem. Dicitur & *θραυστὸν* aliis nomi-  
 nibus *καλακίον* & *κραυρίον*. Galen. libr. 3. de ali-  
 ment. facult. definit id esse quod nihil in se  
 lentoris neque pinguedinis continet, oppo-  
 nitque τῷ γλίγγω.

**Θελιδιον διώμα.** altitrix seu nutritrix facultas. Est  
 vis naturæ quæ appositum alimentum in  
 corporis substantiam conuertit & assimi-  
 lat. Cum enim corporis nostri substantia  
 assidue

assidue defluat, neque tamen eam præpropere absumi & consensescere patiuntur, alimenta, natura facultatem alimentum adhibuit cuius munere aliquatenus id quod petijt restitueretur. Est autem opus eius perpetuum, videlicet à primâ conformatione ad mortem usque, nec unquam in corpore otiosa manet. Ex quo necessitas eius intelligitur, & supra auctricem præstantia, quæ usque ad vigorem ætatis solum progreditur. Neque enim auctrix sine nutrice quicquam potest, ut nec formatrix sine utraque. Verum ut nutritrix auctrici atque formatrici inserviat, ita quatuor alie facultates nutritrici auxilio sunt, attractrix, retentrix, cōcoctrix, & expultrix, quarum ministerio, alimenti assimilatio, quæ nutritricis facultatis opus est, perficitur.

**nutritio.** Est eius quod nutrit ad id quod nutritur perfecta assimilatio: vel, est alimenti in corporis substantiam conuersio. Est actio naturæ ex principibus primisque ordine tertia, qua scilicet molitur, ut omnes animalis, primum quidem formati, deinde vero in lucem editi, & ad perfectam magnitudinem perducti partes quantum fieri potest, perdurent. Siquidem frustra genitum animal sit, nisi & ad perfectam magnitudinem perducatur, & diutius perduret, quorum neutrum sine alimento affluente adhærenterque fieri nequit. Nam & nutritio auctrici famulatur, neque aliter inanitionis illud genus quod fit naturali substantia nostra assidue defluente, quodque nutritioni ex aduerso oppositum est, refarciri potest. Est igitur nutritionis materia alimentum, quod cum corporis eius quod nutritur omni partem affigitur, actio quidem ipsa nutritio dicitur, causa vero huius ipsa facultas. In quo opere alteratione quidem interuenire necesse est (est enim nutritio alterationis species) sed non talem qualis erat in generatione. Ibi namque quod os non erat, postea factum est os: in nutritione vero ei quod iam factum est, id quod affluit efficitur simile, ut non immerito alteratio illa nominetur generatio, hæc vero assimilatio. Cum ergo nutritio sine alimento perfici non possit, ipsumque assimilari oporteat, necesse omnino est ipsum prius attrahi, retineri, concoqui & ab excrementis repurgari, ut deinde apponi, postea agglutinari siue adhærere, & postremo assimilari possit. Est enim assimilatio omnis cōcoctionis finis, & summa totius functionis naturalis perfectio.

**mandragoras** femina quæ nigricat, & est foliis angustioribus & minoribus quâ lactuca, à cuius tamen similitudine nomen habet.

**lactuca sylvestris**, ut scribit Gal. lib. 2. **hortensis** enim **Spizæ** vocatur, ut idem auctor est.

**pilus. capillus.** Est pars corporis tenuis, longa, flexilis, sicca, ex cute erumpens. Gal. piles, ut & vngues, enumerat inter corporis

partes in arte parua, quamuis eos excludat è quadruplici illa partium differentia quam eo libro constituit, propterea quod gubernationem nullam habeant. Non enim corporis substantiam constituunt, quare neque sunt principia virtutum, neque principis subseruiunt, nec ingentitas ex se vires obtinent, nec ab aliis vires mutantur. Non enim sensum, motum, aut vitam habet, neque attrahendi, continendi & concoquendi facultatem, neque eas vires aliis suppeditant, sed solum generantur, ac cōcrescunt, non in omnem dimensionem, quemadmodum reliquæ partes corporis, sed in longitudinem solum. Generantur autem ex crassis & fuliginosis vaporibus, qui dum per angustos cutis meatus à calore foras propelluntur, illis inhæret tamdiu, ut facile interim siccari vtrique possint & pilis fieri. Inde mox alius similiter è profundo insciscatus à calore pellitur, qui in priorem meatibus adhuc hærentem, cutique non aliter quam gingivis dentes infixum, impingit, adiungitur, agglutinetur, & illum, ut clauus clauum, trudit: rursus alius atque alius succedunt. Sic fit pilus maior aut minor, crassus aut exilis, passus aut crispus, niger aut alio colore præditus, prout calor, humor, & cutis pori se habent. Hæc enim tria ad pilorum generationem concurrunt, ac ut varia esse possunt, sic varii ex illis pili prodeunt. In calore quidem differentia hæc est, quod imbecillus nullum pilum producit, quippe qui materiam, ex qua pili ortum habent, siccare non possit, nec cutem similiter cui illi inhærere debent. Mediocris siccatur quidem, sed pilum tenue & passum gignit: magnus reficcat vehementer & efficit duriores. Ab humore autem pilorum discrimen est, quoniam à pituitoso albi, à biliioso flauī, à melancholico nigri prodeunt. Iam quod ad cutem pertinet, eam siccam esse decet & raram: siccam quidem, propterea quod in molliore & humidiorē cute excrementa citissime effluant, nec satis diu meatibus hærent, quodque viæ per quas humor ille fuliginosus exit, eo abecedente protinus conueniunt & abolentur: raram vero, quoniam densior non est humori fuliginique petiua. Sed tamen in his quoque moderationem quandam esse oportet. Si ad hæc quæ dicta sunt attente quis aduertat, reperiet certas causas, cur quibusdam partibus pili nascantur, aliis nulli sint, aliis quibus, ut superciliis & palpebris, sint quidem, sed eundem semper modum seruent: in capite vero plurimi longissimique oriuntur. Ac cum plurimæ corporis partes pilos habeant, alios ad venustatem ornatumque, alios vero etiam ad usum: qui sunt in capite, **capilli** appellantur, à Latinis capilli, quasi capitis pili: de quibus hic dicere eorumque nomenclaturas & synonyma referre non erit profus inutile nec iniucundum. **capillitium** dicitur **capillitium**, quod capillitium significat, vocatur

etiam *κῆμα*, coma, *κῆμα* τὸ κῆμα, quod comedere & ornare significat. *Κέρας* quoque apud antiquos *κέρας* significauit, auctore Plutarcho, cuius indicium est *κέρας*, quod tondere significat vnde *κεροπλάτης*, qui in exornanda coma occupatur, apud Archilochum. atque vt Suidas refert, *κέρας* ὁ πλάγιον τὸ κεῖρον ἐπὶ κεφαλῇ. *Κιννός*, cincinnus, capillus intortus, *βασίλειος* à Phauorino dicitur, quod fit botro similis & instat racemi pendulus, *κινναμύς* δὲ ὁ κίανος δὲ ὁ κινναός, cincinnus vel citrus: *κινναμύς* autem, capillorum nodus, *κῆμα* τὸ κινναμύς, & *κινναμύς*, coma, quam veteres alebant & dijs consecrabant. Eadem *κῆμα* δὲ *κεῖρον* apud Iulium Pollucem dicitur. *Σπινθίς* capillus in honorem deorum resecutus, apud Coelium libr. 4. cap. 23. *κῆρος* etiam capillos quidam dixere, vt auctor est Pollux. Cirros eadem ratione Latini *κῆρον* ἢ *κέρην*, hoc est à rondendo, videntur dixisse. *βόσρυξ* δὲ ὁ *βόσρυξ*, plexa cæfaris, dicitur & capillus muliebris. *κῆμα*, capilli crispi dicti sunt, *κῆμα* τὸ ἐπὶ κεφαλῇ: quanquam proprie dicantur de clauiculis siue de capreolis vitium aut hedera. *Οὐλαί* Attici crispas capillos appellauit: vnde *οὐλαί* *κῆμα* δὲ *κῆμα*, qui crispis est capillis, quæ Archilochus *κῆμα* per inuersionem vocauit. *Ἐνυαί* apud Homerum capilli dicuntur, *κῆμα* τὸ ἐπὶ κεφαλῇ, quod comedere siue comam nutrire significat: vel *κῆμα* τὸ ἐπὶ κεφαλῇ, ὁ δὲ *κῆμα*, vt explicat eius interpres. *φύλαξ* interdum dicuntur, *κῆμα* τὸ φύλαξ ἢ *κῆμα* *κῆμα*, atque etiam *κῆμα*, *κῆμα* τὸ *κῆμα*, hoc est à diuidendo, quod in multas tenues particulas sunt discreti, litera *o* per *κῆμα* addita. *κῆμα* seta, proprie porcorum, tamen & de homine dicitur: vnde Celsus libro 2. scorum pectus pro piloso vsurpat. Giza apud Aristotelem *κῆμα* & *κῆμα* capronas vertit, quo nomine Nonius Marcellus comas vocari scribit quæ sunt ante frontem, quasi dicas à capite pronas. *κῆμα* lana & pilus interdum dicitur ex intensiua particula *κῆμα*, & *κῆμα* lanugo, vt volunt etymologici auctores. *κῆμα* nuncupauit Aristoteles discriminē & aquamentum capillorum, vt interpretatur Gaza. *κῆμα* δὲ *κῆμα* *κῆμα* ὁ δὲ *κῆμα* *κῆμα* *κῆμα* sed dicitur proprie de viris *κῆμα* vero in mulieribus est velut flagellum criminum. *κῆμα* autem in pueris appellatur.

*κῆμα* præter communem significationem dicitur etiam apud sacrificos venula angusta, recta, nigra in parte summa iecinoris dextro lobo apparens, vt scribit Gal. *κῆμα* τὸ κῆμα.

*κῆμα*, grumus. Proprie quidem significat continuæ rei fragmentum & frustum. Inde ad lac & sanguinem medicis translata vox est, qui *κῆμα* dixerunt, in lacte quidem, quoties à puerperio fœminis lac sine re delinens in mammis densatur, & in exigua frusta concrefcit: in sanguine vero, cum à venis suis effusus, & in vicina spacia abscē-

dēs, siue per diapedesin, siue erosio vel ruptio quomodolibet vase similiter coit atque condensatur, non in vesica modo verum etiam in stomacho, in renibus, in intestinis, in vtero, in naso, in omni denique corporis cavitare. In qua quoniam præter naturam inest, calorem natium amittit, indeque niger euadit & cogitur, tandemque putrescit, vt & reliqua omnia quæ extra naturalem locum sita sunt.

*κῆμα*, est sanguinis affectio, quando is collisa venarum tunica ab aliquo graui corpore corundente effusus in carnem & receptus locis quæ circum venam sunt, nigrescit. A qua sanguinis affectione factum est, vt *κῆμα* iam sanguis dicatur & sit, quemadmodum annotat Galen. comment. 2. *κῆμα* τὸ κῆμα.

*κῆμα* *κῆμα*, trochisci nomen est, cuius descriptio habetur apud Paulum libr. 7. cap. 12. & apud Aetium libr. 9.

*κῆμα*, vnum genus est phlomidis, siue verbasci fœminæ, quod & alio nomine *κῆμα* vocatur, foliis ternis aut cum plurimū quaternis, crassis, pinguibus, ad lucernarum lumina aptis.

*κῆμα*, iuncus, vltia. sic etiam vocant aliqui fruticis genus, quæ & *κῆμα* *κῆμα* appellant.

*κῆμα*, sic dictum est à quibusdam solanum furiosum.

*κῆμα*, sic dicitur à nonnullis *κῆμα*, hoc est solium, auctore Dioscoride.

*κῆμα*, sic dicitur apud quosdam *κῆμα*, sicut testatur Dioscorides.

*κῆμα*, dicuntur apud Hippocr. *κῆμα* *κῆμα*, hoc est suffitus & odoramenta.

*κῆμα*, arbor est quæ Theophr. syluestrem, perpetuis frondibus virentem, nec ramis, caudice, frondibus syluestri cupresso dissimilem describit. Putant aliqui eam esse quæ Plinius libr. 13. trogeten dicit ab aliis vocari. Dicitur & *κῆμα* & *κῆμα* & *κῆμα*. Hermolans thyam cedrum alterius generis esse prædixit, ex qua cedrina mensæ fiebant. At *κῆμα*, siue *κῆμα*, mortarium est seu pila in qua tunduntur pharmaca & huius generis alia.

*κῆμα*, Thyites lapis, colore subuiridis, vt Iaspis quem vocant. Omnium fere lapidum valentissimam vim habet. Soluitur hic in succum colore lacteum, gustu vero acrem, & proinde illum nemo ocularibus miscet medicamentis, nec fluxiones reperiuntur, vel vlcera sanantibus, sed tantum ad purgandum & abstergendum quæ pupillam offuscant absque phlegmone: ex quibus sunt cicatrices recentes, quas attenuare potest. sed & oculorum vngues, (*κῆμα* Græci vocant) vtique si non admodum duri fuerint.

*κῆμα*, sic dicitur montana nardus in Cilicia & Syria proueniens, propterea quod ex ijs locis à mercatoribus in Græciam sacculis conclusa vernalis deferretur. *κῆμα* enim sacculum ex corio factum vitem-que

que significat: & *ἡλιόφωρος* Hefychius interpretatur *ἡλιόφωρος* πρὸ ἀρώματι καὶ πύραυς: hoc est, faculis & pennis circumferentes aromata. Nicander in Alexipharmacis de pharici sumptu curatione, ἀρώματι *ἡλιόφωρος* dixit. Eandem ob causam etiam *ἡλιόφωρος* à Galeno appellatur. vide *ἡλιόφωρος*.

*Ἑμύματι*. *Ἑμύματι*, apud Hippocratem.

*Ἑμύματι*. satureia & cunila. Est herba pedali altitudine, fruticosa, surculosis utrimque coliculis, foliis hyssopi flosculis per intervalla ex purpura candicantibus, odore saporeque gratissimo, sed hæc horrens est. Quæ vero in asperis & saxosis nascitur, thymo similior est quam hyssopo, sed minor atque tenerior, ferens spicam floris plenam, coloris herbacei. Hæc medicinæ utilior, illa cibus gravior: in tertio ordine calefacit & desiccatur, atque glutinosos crassosque humores incidit.

*Ἑμύματι*. idem quod *ἡμύματι*, apud Hippocratem.

*Ἑμύματι*. est frutex cuius rami tennes, speciosi, cubitorum binum assurgunt. Ipse similis chamelææ; foliis angustioribus, pinguioribus, gummosis si mordeatur glutinosisque; flores albi & inter eos semen quale myrti; exiguum, rotundum, initio virens, postmodum rubens, foris durum nigrumque; intus albet, & ut Plinius tradit, in quo nascitur granum Gnidion, quod aliqui *ἡμύματι* vocant. Herbarij thymelæam nunc oliuellam nunc linum sylvestre vocitant. Calefacit & siccatur ordine tertio.

*Ἑμύματι*. suffimentum. suffitio. Est res odorata, quæ ignibus iniecta gratum nidorem exhalat. ut sunt thus, myrrha, styrax, & quæcumque calidam habent temperaturam, suntque satis odorata. Dictum ita volunt quasi *ἑμύματι*, quoniam languescens animus suffitu eiusmodi recreatur. Sed non desunt qui à thyo odorifera herba deductum velint: ut neque qui *ἑμύματι*, hoc est à sacrificando, quoniam odores dijs suffiebantur. De eo aphorismus celebris habetur apud Hippocratem; suffitus aromatum muliebria ducere, & ad pluraque alia viles esse; nisi gravitatem capitis inducerent.

*Ἑμύματι*. sic à quibusdam dicitur. *ἡμύματι*, hoc est taxus, ut habetur apud Aetium libri 13. cap. 64.

*Ἑμύματι*. *ἡμύματι*. animosa seu irascibilis facultas. Est cordi vis insita, qua motus in nobis gignit & animi perturbationes. Sunt autem illæ variz & prope sibi contrariæ pro diversitate causarum à quibus proficiuntur. Causas enim triplices habent: primam quidem, rem animo obiectam, siue præsens sit, siue expectetur, siue in memoriam redeat: secundam, rationis phantasiam, hoc est, impressam in animo eius rei opinionem & æstimationem: tertiam vero cordis robur, quo vel vehementius vel languidius commouetur. Quantienim ratiocinandi facultas obiectam rem fecerit & æstimaverit, tan-

tum vis illa animosa concitatur. Nascuntur igitur animi motus ex rebus æstimatis opinatisque tam bonis quam malis; utriusque tam præsentibus quam futuris atque etiam præteritis. Ex bonis æstimatis præsentibus quidem lætitia, invidia, malevolentia; ex futuris libido siue cupiditas, exandescencia, odium, inimicitia, audacia, confidentia, temeritas, libertatis, potentia & honoris appetentia: ex præteritis eorundem recordatio. Ex mali autem opinione præsentis quidem animi ægrotudo, misericordia, mœror, tristitia; ex futuri vero timor, terror, paor, conturbatio, desperatio, pudor, pigritia & id genus alia. Eiusmodi quidem species rationi primum obijciuntur, deinde animosæ facultati, quæ tantum movetur quantum id quod obijciatur ratio esse duxerit, & cordis virtus ferre potest. Expedere enim fugienda ne an amplectenda species sit quæ obijciatur, ratiocinantis facultatis est munus: eam vero fugere vel amplecti, animosæ. Cum igitur non omnes eadem polleant ratione, sed alii res quales sunt æstiment, alii non quales, sed meliores aut deteriores, maiores aut minores quam sint, præterea in aliis vehementior sit vis animosa, in aliis minus prompta, sit ut non eodem modo omnes concitentur, sed alii celerius, alii tardius, alii vehementius, alii lenius. Cum enim eiusmodi causæ varie facultatem afficiant, diversa motionum genera esse oportet, quæ Græci non *ἡμύματι*, sed *ψυχῆς πάθηματα*, hoc est, animi affectus & passionibus, appellarunt, quod necesse sit animæ facultates *ψυχῆς πάθηματα* ad hos motus concurrere, etiam si propriè ad animosam cordis facultatem pertineant, & in corde peragantur.

*Ἑμύματι*. iracundia: unde *ἡμύματι* *ἡμύματι*, facultas animosa & irascibilis. In qua significatione etiam Latini animos usurpant. Significat & *ἡμύματι* apud Hippocratem *ἡμύματι*, hoc est cupiditatem aliquid agendi, ut annotavit Galenus comment. *ἡμύματι*.

*Ἑμύματι*. thymum. est frutex surculosus & dodratalis, foliis canis, exilibus, multis, immortalibus, flosculis ex purpura candicantibus, suavissimi odoris, capitellis specie complicatarum formicarum, radice lignosa. Calefacit & desiccatur tertio ordine, & glutinosos crassosque humores incidit: menses, partus & secundas pellit. Cum sale & acero potum pituitam per aluum detrahit.

*Ἑμύματι* à nonnullis dicitur *ἡμύματι*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Ἑμύματι*. est glandulosa illa substantia quæ in ingulo ad os summum pectoris consistit tanquam sultura & obstructio vasorum eo loci diuisorum, eiusdem fere atque *ἡμύματι* generis, nisi quod hoc mollius, rubentius & carni similis est. Hæc in nuper natis animantibus ob vasorum molliem & imbecillitatem est maxima in crescentibus autem, quia vasa per siccitatem sunt firmiora,

decreuit, ita vt vix eius vestigium in iuuenibus appareat.

*Θύμος* est tuberculum carnosum quod super corpus quasi verrucula eminet, ad eam tenuem, supra lauius, subrubrum & in summo perasperum, oblongum; interdum rubens, interdum candidum, magna ex parte sine dolore. Idque summum colorem floris thymi repræsentat, unde ei nomen est, ibique facile finditur & cruentatur, nonnunquam aliquantum sanguinis fundit, sepeque circa magnitudinem fabæ Ægyptiæ est; raro maius, interdum perexiguum: modo vnum, interdum plura nascuntur, vel in sede, vel mediis femoribus, vel talis, vel palmis, vel inferioribus pedum partibus. Pessima tamen in obsecenis sunt, quæ nunc solam glandem, nunc colem, aliquando præputium occupant: quandoque etiam in facie consistunt. Quod paruum est proprie *θύμος* dicitur, vel *θύμος*, vel *θύμων*, vt habetur apud Corn. Celsum libr. 5. quod vero magnitudine excedit, *αἴμα*, id est ficus, appellatur. Cæterum thymorum alii mites facilesque, alii maligni sunt. Illi magis carnosi sunt, inæquales, asperi, candidi aut subrubri, doloris expertes: hi vero duriores, asperiores, maiores, feculenti, liuidi, cum dolore punctorio, qui tum maxime mouetur cum manu tractantur, aut medicamenta adhibentur, nec facile curantur, nisi tota parte in qua nati sunt excisa.

*Θύμων*, τὸ πρὸ τῶν Θύμων. hoc est à Thymis oriundi; apud Hippocratem. Sunt autem *Θύμοι* populi Thraciæ.

*Θύων*, arbor quam Theophrastus vel cupresso similem, vel cupressum esse syluestrem existimat libro 3. cap. 5. de plantarum historia. dicitur & *θύια*, & *θύια*, & *θύια*.

*Θυρεοειδής χόνδρος*, scutiformis cartilago. Est laringis cartilago prima & anterior, & quæ velut scutum quoddam aliis præposita est. Nec vero vsum modo scuti habet, sed etiam formam. vide *λαρυγξ*.

*Θυρεοειδής*, sic dicitur à quibusdam ossis pubis foramen, quod in eo osse tam magna est, vt & *θύρας*, hoc est ostii, instar videatur.

*Θυρεός*, sic à quibusdam dicitur *θύμος*, vt habetur apud Dioscor.

*Θώραξ*, pectus. sic dicta est à veteribus pars ea corporis quæ à collo ad pudenda vsque truncum pertendit, vt definit Aristoteles libr. 1. de histor. animal. cap. 7. Sed & Hippocrates libro *πρὸς Πύρρον*, his verbis: *ὅτι τὸ θώραξ καλεῖται*, hoc est, thorax vocatus in quo hepar cõtegitur: manifesto in-

dicat thoracis nomine ventrem etiam contineri, dictumque quondam fuisse thoracem totum illum truncum qui est inter alas & inguina. Verum à recentioribus medicis & Galeno pars ea thorax dicitur, quæ collo subiecta vtrinque costis clauditur. Quatum enim costæ ab anteriore posterioreque parte, & infra supraque continent, *θώραξ* appellatur, *ὅτι τὸ θώραξ*, hoc est salio, propter continuum cordis motum: vel *θώραξ τὸ θυόν ἀπὸ τοῦ*, quod scilicet mentem, diuinam nostri partem, contineat & seruet. Latini proprie pectus vocant. Quinque ei partes assignantur, in quas diuiditur, *σῆρρον*, *νῶτον*, *πλευράι*, *καὶ ἡ δὲ ἀμφοτέρωθεν*. Dicitur autem *σῆρρον* pars eius anterior in quam costæ conueniunt, pluribus quidem & numero incertis ossibus cõposita veplærisque visum est, sed si Galeno credimus, septenis. *νῶτον*, dorsum Latini vocant, quod duodenis vertebris compactum est. *πλευράι*, hoc est costæ, bis eodem numero attribuuntur, quot illis in dorso vertebræ respondent, quibus vt parte postica inarticulantur: sic antica priori illi thoracis parti quam *σῆρρον* diximus nominari. *καὶ ἡ δὲ* autem gemina illa ossa vocantur quæ collo proxime subiecta sunt, alterius à costis & originis & figuræ. *ἀμφοτέρωθεν* vero duo similiter ossa, quæ à tergo vtrinque sita prominent. Nec me quidem laet Galenum libro de ossibus de thorace differenter ab eo *καὶ καὶ ἡ δὲ* & *ἀμφοτέρωθεν* distinxisse, seorsimque de ijs egisse, quasi thoracis partes non essent: sed quia manifesto videantur trunco illo quem descripsimus contineri, non est dissentaneum eas inter eius partes haberi.

*Θώραξ*, etiam est vinculi nomen quod pectori adhibetur, vbi mediū pectus, vel dorsum, vel latera, seu thoracem volumus deligare, cuius iniiciendi rationem Galenus explicat lib. de fasciis.

*Θωρηξ*, οἶνον ποσιὰ καὶ ἀκρα ποσιὰ. hoc est, vini meracioris potio. vt placet omnibus qui Hippocr. aphor. 21. libr. 2. *λὺνθ θωρηξ λυεῖ*: hoc est, famem thorexis soluit: interpretati sunt Galen. & *καὶ τὰς γλῶσσας οἶνον* & *μέθη* explicat, hoc est vini potionem & ebrietatem. Nam vt scribit Phanorinus, *θωρηξ τὸ μέθυ*, *ἢ τὸ θυμωρεῖν τὸ πᾶν*, ἢ *θώρακα πληρῶσαι*: ἢ *ἢ τὸ μέθυ τῶν μεθύοντων*. hoc est, *θωρηξ* dicitur inebriari, quod excalfaciatur pectus, aut thoracem repleat, aut quia pugnaces sunt ebrij. Inde *ἀποθωρηξ* dictus, qui vel leuiter, vt interpretatur Erotianus, vel, vt quidam exponunt, summe ebrius est.



# IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

## T O I.



**I**amblichus. *ἰαμβλίου ἄλλος*. sales Iambli-  
chi. Genus est salis ex  
multis rerum generi-  
bus compositi, cui vis  
maxima crudos humo-  
res concoquendi. vide  
in dictione *ἰαμ.* Com-  
positionem eius fecit

Iamblichus.

*Ἰακίνη*. est olus sylvestre, humi serpens, copio-  
so lacte succulentum, flore candido, folio v-  
no, sed ita implicato vt plura videantur, fo-  
ris margine in angulos excurrente. Plinius flo-  
rem eius Concilium ait appellari. Putatur  
nō multum ab ea diffidere quam Gallicum  
vulgus liseronem vocat.

*Ἰάσμις*. gemma est, sed multorum generum. Est  
enim ei tanta coloris varietas vt vno nomi-  
ne diuersas gemmarum species videatur cō-  
plecti. Alia viret, smaragdique colore est,  
quæ si per transversum linea vna alba cin-  
gatur *χαμαίπαις* dicitur. Sin pluribus, *πλά-  
χαμμος*: alia glauco pingui est similis, id est,  
viridis lacte suffusa: alia in viridi pallēt, cal-  
laidi similis, quam Dioscorides *περίσπινθιστος*  
vocari scribit: alia vt cœlum serenum cœru-  
lea est: alia cœlo autumnali marutino simi-  
lis, id est, cœrulea lacte suffusa, quam ex ve-  
teribus quidam *ἀψίςτος*, iuniores Turcicam  
vocarunt: alia purpurea: alia rosea est: alia ex  
purpura cœrulea: alia crystallina est, pituitæ  
similis: alia saturo iecinoris colore est, di-  
stincta lineis concoloribus: alia veluti fumo  
infecta est, *καπνίας* ob id dicta. Omnis quidē  
mutice nitet & læpius non translucet, atq;  
in eo differt à gemmis perspicuis. quarum  
speciem gerit, quæ si interdum pellucet, at  
totæ petraræ: aut si totæ nonnunquam, lon-  
ge tamen ipsi præstant gemmæ quarū sunt  
assimiles.

*Ἰατρικὸς ἰατρίης*. medicus vnguentarius, reuictor:  
qui vnguentis & perfrictionibus corporis  
morbos curat. Quæ quidem curandi pro-  
fessio *ἰατρικὴ ἰατρική* dicta est, & primum, vt re-  
fert Plinius, instituta à Prodicō Selymbri-  
nato, discipulo Æsculapii.

*Ἰατρικὴ*. Medicina. Est adiectio & detractio.

Sic eam Hippocrates lib. *ἑβδ. πρῶτον* defini-  
uit, quod & explicauit, addens detractiōē  
quidē superantium, additionem autē  
deficientium intelligi, quod contrariorum  
contraria remedia sint; eumque optimum  
medicum haberi, qui hoc optime præstare  
possit, quiq; ab eo plurimum abest, pluri-  
mum quoque abesse ab arte medica. Ea qui-  
dē definitio sumpta est à medicinæ officio,  
sine & partibus. Est enim medicinæ offi-  
cium quod in corporibus deest facere, &

quod superat detrahere. Id quod etiam ad  
eius finem pertinet, quæ est aduersæ vale-  
tudinis emendatio. Sed & totius medicina-  
ræ capita complectitur, quæ Galenus qua-  
tuor rerum generibus contineri scripsit; as-  
sumenda, facienda, foris incidentia & ex-  
cernenda, quæ corpori recte adhibita adii-  
ciunt quod deest, quodque superuacuum  
est detrahunt. Galenus vero medicinam a-  
liter definiuit, Herophilum auctorem se-  
quutus: esse scientiam salubrium, insalu-  
brium, & neutrorum. In qua definitione  
scientiæ nomen non proprie, sed commu-  
niter vsurpauit, pro ea cognitione quæ mul-  
tis animi perceptionibus, vsu & exercita-  
tione conquisitis, & in vnum finem vitæ v-  
tilem spectantibus constat. Qua quidem si-  
gnificatione omnes artes scientiæ dici pos-  
sunt, omnesque periti artifices, artis suæ  
scientes. At scientia quæ proprie dicitur,  
ex certis indubitatique principiis compa-  
ratur. Huius generis proculdubio medi-  
cina non est, quod talibus non innitatur  
principiis. Pars namque ea medicinæ quæ  
*συμμετρικὴ* dicitur, pene tota coniecturis con-  
stat, media, vt Galenus ait, inter exactam  
notitiam & absolutam ignorantiam: ideo-  
quæ artificiosa dicitur. *Ἀπολογικὴ* autem at-  
que *ὑποκρίνουσα*, quanquam principiis qui-  
busdam vtantur ex rerum naturalium sci-  
entia depromptis, & ad exquisitas scien-  
tias propius videantur accedere, permul-  
ta tamen tractant quæ nisi artificiosa con-  
iectura assequi nullo modo possunt. Ita-  
que medicina scientia est non proprie, sed  
communiter lateque sumpto nomine, sa-  
lubrium, insalubrium & neutrorum. Quæ  
tria quomodo intelligenda sint, Galenus  
initio artis paræ abunde explicauit, suis-  
que locis à nobis exponuntur. Talis autem  
scientia quomodo comparetur, non bene  
inter professores medicinæ olim conuenit.  
Quidam enim existimant vnam expe-  
rientiam satis esse ad perfectam medicinæ  
cognitionem, qui *ἐμπειρὶς ἰατρικὴ*  
se nominarunt: de quibus ante dixi-  
mus. Alii vero particularium rerum inspe-  
ctionem, vt eius qui morbo laboraret, tem-  
peramenti, ætatis, habitus, naturæ, consue-  
tudinis, reliquorumque omnium exactam  
considerationem nihil ad medicinam con-  
ferre professi, nimium compediaria metho-  
do artem concludentes, soli que contenti  
communicatibus quas *κοινὰς* appellarūt,  
*μυστρίαι* dicti fuerunt. Alii vero præter eos  
fuerunt qui se *λογικὴς* & *δυσματρικὴς* nomina-  
runt, qui corporū naturam exacte noscen-  
dam censent, omnium signorum vires, causa-

rum differentias, potionum, ciborum, aeris reliquarumque circumstantiarum facultates expendunt, atque ab omnibus quæ spectari possunt, curationis indicationes inuestigant. Cuius sectæ author fuit Hippocrates Cōs, qui reliquos omnes fama sui nominis & dignitate antecellit. Ab iis tota medicina in quinque partes distributa est, *φυσικὴ λογικὴ, ὑγιαίνουσα, ἀπονοητικὴ, ὁμηγευστικὴ, διαγνωστικὴ*: quas omnes studiose medico perdiscendās tenendasque opinabantur, cum tamē earum alias Empirici, alias Methodici in totum negligerent. Ex quibus patet medicinam quam Dogmatici sectati sunt, omnium prope rerum scientiam & cognitionem complecti, verissimeque dictum ab Hippocrate fuisse artem medendi longam esse. Si enim causarum omnium tam salubrium quam insalubrium atque etiā neutrorum noticiam requirit, si nihil omnino negligendum censeret quod ad remediorum indicationem conferre possit, nihil medicū latere debet, sed astrologiæ, geometriæ, omniumque mathematicarum peritum esse oportet, & omnium regionum, aquarum animantium, herbarum, metallorum naturas exploratas habere, ut intelligat quæ sint homini experenda vel fugienda, ut non vitare modo morbum possit, sed si forte in eum inciderit, curare.

*Ἱατρός*, est vir bonus, medicinz peritus. Bonus quidem ut sit, Hippocratis iusiurandum exigit, ipsaque artis professio & humaniorum literarum studia quæ colit, ipsum ad virtutē instituunt; qua ubi stimulari cōepit, nullis parcat laboribus; nihil recusat subire quo perueniat ad agnitionem veritatis, nihilque habet prius ægrotantium salute: quam ut cōsequatur, omnem quantani potest adhibet diligentiam, & legendo, percunctando, cōquirendo studet medicinz peritus esse, ut ægrotos valeat à morbis vindicare. Hoc enim proprium eius inunus est & finis, nullumque aliū quā medicus est, sibi proponit. Si namque alia de causa medicinam exercet, ut lucri vel honoris & gloriæ causa, vel ut fruatur concessa sibi legibus immunitate ac reipublicæ vacatione: is non simpliciter medicus, sed sumptō à fine cognomine medicus ambitiosus, gloriosus, quæstuosus aut aliter appellabitur. Qui vere dicitur medicus, benignitate atque humanitate ad medendum incitatur. Est autē propriū medici officiū morbos curare, non etiā sanitatē tueri; cuius cōservandæ, rationem qui prōfitetur, non propriē *Ἱατρός*, sed *ὑγιαίνων* appellandus venit. Attamen per abusum receptum est ut is quoque *Ἱατρός* vocetur, propterea quod cum vna sit ars quæ corpori tuendo præsideat, vnicū ei propriū nomen inditum non est, quemadmodum Gal. libr. 2. de sanitate tuenda annotavit.

*Ἱατρὸς*, digni nomen quem Latini quoque medicum vocant, quod vno fere consensu

homines ori, oculis, viriisque lenioribus vel salua vel medicamento delinēdis cum ceu puriorem adhibeant. Is minimo proximus est, nec plurimum inquinari solet reb<sup>9</sup> quas solemus duobus tribusve primis digitis apprehendere.

*Ἱβνεία*

*Ἱβνεία*, herba est folia habens nasturcii, vere virentiora, canlem cubitalem aut minorem, ætate lacteum florem, radices duas nasturcio similes, calfacientes & adurentes. Hanc alii, ut Galenus, *λεπιδιον*, alii *ἀγριόκαρδαμω* appellant, ut scribit Paulus libr. 3. cap. 77. asserens apud suos fruticosam nasci similibus lauri folijs & multo amplioribus, perutilem ad coxendicum dolorem. alii *καρδαμύκην*, ut Dioscorides, appellant. Aetius etiā *καρδαμύκην* vocari tradit lib. 12. cap. 2. scribens eam odore, sapore & figura similem cardamo vidēri, multaque de eius facultate disserens. Ac tantam quidē habet cum cardamo similitudinem, ut *Ἱβνεία* dicatur à quibusdam *τὸ καρδαμύ*, sicut scriptum est à Dioscoride.

*Ἰβίσκος*, dicitur à quibusdam *ἡ ἀλδαία*, ut habetur apud Dioscoridem. Apud Galen. est *ἰβίσκος*.

*Ἰγνί*, herbæ nomen apud Hippocr. sed quæ nā ea sit, incertum est: forte *ἰστίς ἢ ἀγρία*, quam à quibusdam *Ἰγνί* vocari Dioscorides prodidit.

*Ἰγνίς ἢ Ἰγνίς* & Ionice *Ἰγνίς*, poples. *τὸ ἔπαιον ἢ γόνατες*, *ἐπὶ τὸ καμπίμεν τὸ γόνυ*: hoc est, pars ea quæ retro genu est, in quam ipsum genu inflectimus, vel, ut ait Rufus, *ἢ οὐγκάμψις τὸ γόνατες*: hoc est, ea pars in quam genu inflectimus & incuruamus: qui neutro genere *Ἰγνίον* appellat. Valla apud Homerum *Ἰλιάδ. v.* suram interpretatur, quæ tamen proprio nomine *γαστροκνήμια* vocatur.

*Ἰγνίς φλέξ*, venā popliticis. Est venā vna in poplite ex duobus ramis venæ quæ in crura descendit vnitis cōflata. Ea surculis aliquot in cruris partē posteriorem sparsis, per medium poplitē delapsa nunc in suam absumitur, nunc ad calcē usque descendit, nunc venis malleoli aucta secundum eum in pedem variè diffunditur.

*Ἰδαία ρίζα*, radix est à qua prodeunt folia ruscō similia: adherent iis veluti exigui pampini, in quibus flos est. Gustu acerbos est & adstringente.

*Ἰδαῖοι δένδρῳ*, sunt qui radicem pzoniz sic vocent, ut scribit Dioscor.

*Ἰδιοπάθεια*, propria & primaria affectio, siue affectus contra naturam parti insidens eique proprius. Sic dicitur quando causa affectus & dispositio in ipsa parte hærent. Sic caput in lethargo primario affectu laborare dicitur; larynx in angina, pulmo in peripneumonia, pleura in pleuritide, ventriculus in lenteria. Quod aliter laborat, *ἢ συμπαθήειν* laborare dicitur.

*Ἰδιοσυγκρασία*, corporum proprietas & cuiuslibet peculiaris temperatura.

*Ἰδιότης*.

*ἰσχυρὰ καὶ ὀλίγη, ἀνὰ ἑξῆς.* obliquatur & in se residet, apud Hippocr. similiter apud eundem *ἰσχυρὰ* dictum *αὐτὸν* & *ὀλίγη*, quomodo etiam Homerus dixit Iliad. 4. *ἰσχυρὰ καὶ ὀλίγη*.

*Ἰσχυρὰ, μέ.* sic dicuntur ab Hippocrate aphor. 21. lib. 3. pustulæ quædam genitalium partium, summam cutem occupantes & exulcerantes. Oriuntur, ut ipsum ostendit nomen, ab earum partium sudore bilioso & mordaci, qui per facile iis in partibus putrescens ptiriginem mouet, cutemque velut vlceribus exasperat.

*Ἰσχυρὰ.* sudor est humidum tertie concoctionis excrementum per cutem in aquæ speciem erumpens. In singulis enim animalis partibus ex ipso, unde aluntur, succo duplex excrementorum genus nascitur. Aliud quidem seu semicoctæ quædam reliquæ, quæ assimilari nutriendæ parti nequiverunt, quod siccum dici potest earum partium excrementum: aliud vero quod ante transmittendi alimentum fuit vehiculum, nunc functum officio, humidum tenueque existit, quale nimirum serosum illud quod urinam vocant, quod ex venis & arteriis in vesicam defluit. Verum huic excremento nullus cætus à natura præscriptus meatus est. Expellitur tamē partim actum per ipsa molliora corporis, quæ fluentis eius violentiæ cedunt, potissimum cum à spiritu maiore impetu irrumpente impellitur: partim etiam per exiguos omnes corporeæ molis meatus quos *ἰσχυρὰ* vocat, quorum non inodo reliquum corpus vniuersum, sed etiā tota cutis plena est. Ac cum tenuissimū quidem sit huiusmodi excrementum, facile sane efficitur, partim in speciem halitus ab insito calore solutum, & per transpirationem vacuatum: partim violēto motu confertim in aquæ speciem erumpens. Appellant autem medici quod ita excernitur, sudorem: quod aliter erumpit, non sudor, sed *ἰσχυρὰ* & *ἰσχυρὰ* & *ἰσχυρὰ*, hoc est, mador, à plerisque appellatur. Est autem eiusmodi humoris excretio secundum naturam non minus quam urinæ & aliorum excrementorum. Neque Diocli possum assentiri, qui subtilius de sudore differens, omnem præter naturam esse affirmabat, quod indicium esset calidi innati minus valentis, quod quanto valentius fuerit, tanto magis diffusio sensum fugiat, quodque omnibus quæ ad corpus pertinet recte administratis, & alimentum à natura optime concoctum, nullus unquam sensibilis humor per cutem excerneretur & sponte naturæ manaret, alia autem sudorum genera, quæ à balneis, sole aut exercitatione fiunt, à causis violentis originem habeant, sicut Galenus comment. in aphor. 15. lib. 1. recitat. Sudoris ergo materia est humor tenuis & serosus alimentum permistus, quo id facilius exiguas & capillorum modo tenues venas subeat, atque ab his in partes quæ eo ali debent, sese insinuet: estque eiusdem prorsus cum urina generis, in eo tā-

tum ab illa differens, quod urina quidem ad vesicam, hæc longius in corporis habitum deferatur, magisque propterea concocta sit, quod ad cutem usque peruenit, permeatis omnibus quæ interfunt partibus magno calore præditis. Quo sit plerumque ut si copiosior urina sit, exigua aut pene nulla sit sudoris materia: aut contra si ea nequeat vel insensibili transpirata vacuari, aut per poros confertim erumpere, referatur in venas per quas in habitum corporis delata fuerat, & urinæ vim atque copiam maiorem efficiat. Ergo non procedit à visceribus materia sudoris, nisi forte id communi ea ratione fieri intelligatur, quæ iecur omnium humorum, qui per corpus feruntur, officina esse proditur. Cæterum causa sudoris efficiens calor est, non ille quidem acris, qui siccandi vim habeat, sed humidus, qui per habitum corporis diffusus, sudorum materiam calefaciat, fundat, attenuet, cutemque simul emolliat & relaxet. Proinde pueris & adolescentibus & aliis in quibus multum est huiusmodi caloris, sudores per facile mouentur: siccoribus autem sine petetatem, sine per morbum, ut hecticis & quibus iecur vel lien inaruit, nulli omnino fiunt, ut nec iis quibus habitus corporis refrigeratus est, veluti hydropicis. Hi namque propter huius caloris imbecillitatem maximam sudare nullo modo possunt, etiam si vniuerso corpori humor abunde suppetat. Duabus iis sudorum causis etiam cutis raritas accedat oportet, ut causa sine qua sudores erumpere non possunt, qui enim cute sunt densa & dura, inepti sunt ad sudandum. His ita definitis facile iam erit sudorum differentias explicare. Petuntur ex multis causis, varique habentur pro hominum temperaturis & ætatibus, ambiente aere, ratione victus & corporum affectionibus. Qui secundum naturam se habet sudor, particeps est saluginis & amaritudinis, atque, ut urinæ, modice pallet. Cui hæc infra modum contigerint, vel materiæ frigiditas vel caloris natui imbecillitas designatur. cui vero supra modum, contraria. Is calidus etiam sit oportet, quod frigidus vel humoris frigiditatem vel caloris natui extinctionem significet. Præterea vero alius aquosus est & sine villo lentore, qualis benevalentium ut plurimum est: alius autem viscosus vel à permissione viscosæ cuiusdam materiæ cum seroso humore, vel à resolutione proprii ultimi-que alimentum singularum partium, aut earundem colliquatione: cuiusmodi accidit tum hecticis, tum paulo ante mortem, qui *ἰσχυρὰ* à medicis appellatur. Ad hæc alius multus, alius paucus est: ille quidem vel à copia & tenuitate humoris vel à facultatis retentricis imbecillitate, colliquato corporis habitu dissolutaque natura, vel à vitibus robustis, ut qui per crises accidit & post balneum & modicam exercitationem: hic vero vel propter excrementum paucū, lentum, crassum,

vel propter meatuum cōstipationem quam aut succi multi, crassi, lentique, aut atrophia; refrigeratio, mollities, siccitas, & adstringētia induxerint, vel propter facultatis in carne expultricis infirmitatem: aliis etiā mitis suavisque: aliis acēt fetidusque est pro mātērie qualitatē quam natura sudoribus excludit. Est & sudoris differentia propter loca ex quibus ille erumpit: alius nāmque ab vniuerso corpore dimanat, alius à certis quibusdā partibus; qui ex Hippocratis sententia, qua parte corporis sit, ibi morbum esse ostendit. Verum præ cæteris spectanda est ea sudoris differentia qua alius criticus; alius symptomatikus esse dicitur. Critici quidē duo maxime indicia Hippocr. lib. prognost. prodidit, vnum quidem si die decretorio fiat, alterum verò si morbum perfecte tollat. Itaque quemadmodum idem aphor. 3. lib. 4. prodidit; sudores qui euenerint tertio, quinto, septimo, nono, vndecimo, decimo quarto, decimo septimo, vigesimo primo, vigesimo septimo, trigesimo primo & trigesimo quarto die febris, boni sunt quod ii morbos iudicare soleant nō omnes quidem sed præcipue acutos, quorum terminus quadragesimus dies esse proditur. Longi nāmque morbi propter humoris à quo gignuntur frigiditatem arque crassitatem, tum propter caloris natūi post tam longum temporis tractum imbecillitatem sudoribus iudicari non possunt. Quod si præterea sudor morbum perfecte tollat, sic omnium optimus illē censebitur. Cum morbum dico, singulas etiā cuiusque morbi accessiones intelligo, quæ sua tempora suasque crises habent non aliter quam totus ipse morbus. Id autē sudore præstari non potest, nisi is & calidus sit, & è toto corpore erumpat, si modo morbum corporis esse vniuersi intelligamus, cum morbus qui partem tantum aliquam occupat, eiusdem partis sudatione leuari plane possit, atque in totum discuti. Sunt autē sudoris critici argumenta, sicut Galenus lib. 3. de crisis ostēdit, delirium in crescente accessione, partium extrimarum calor & rubor; vapor quidam calidus per cutē erumpens qui antē non fuerat, tum pulsus vndosus & valde mollis. Ex his iam facile liquet quibus notis symptomatikus sudor designetur: habet enim omnes critico aduersas. Itaque si criticus ille est qui sit die critico, posteaquam signa concoctionis visa iam fuerint, quique calidus & ab vniuerso corpore prodies ægrum à morbo prorsus vindicat, censendus symptomatikus est qui antē diem decretorium & nondum visis signis concoctionis exit, legitimum tempus anteuertens propter humoris copiam & acrimoniā, quibus natura infectari arque irritari solet, vel ob imbecillitatem reatricis facultatis; quique non à toto corpore fertur, nec morbum leuiorem efficit, qui non tam *ispais* quam *epidouris* ab Hippocrate appellatur.

*Ite* est medicamenti compositio, sic *κατὰ τὸν* appellari. Ea autē varia fuit & à multis diuersimode descripta, vt patet ex sequentibus.

*Ite* *Ἀντιόχου*. Hæc descripta est à Pacchio Antiocho auditore Philenidis Catinensis, à quo non inuenta quidē dicitur sed præcipue vsu illustrata. Vixit autē sub Tiberio Cæsare, cui libello post mortem euulgato compositionem eam manifestauit, ex qua magnos quæstus fecerat. Habet autē illa, stœchados, chamædryos, quæ herba similia quercus folia habet, agarici, medullæ cucurbitæ syluestris quam *καλαμὸς ὀσά* appellant, martubii, singulorum drachmas decē, opopanacis, sagapeni, petroselini, terræ mali, id est; aristolochiæ sarmentariæ, piperis albi, singulorum drachmas quinque. cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ foli siue troglodytidis, croci, singulorum drachmas quatuor. In vnum omnia ponderata contriduntur & cribrantur. præterea opopanaces & sagapenum hæc enim mortario teruntur adiecto melle tenui, id est, quam liquidissimo, deinde cæteris miscentur: quæ & ipsa recipere debent tantum mellis quantum satis erit ad comprehendenda & continenda ea. Reponitur medicamentum vase vitreo. Sic quidē describit eam Scribonius Largus ipsius Antiochi contemporaneus, nec differt à Paulo & Aetio, nisi quod hi omittunt martubium quod ille addidit. Dicitur hæc à quibusdā *ἰεὲς ἰσχυρὰ* propter amaritudinem, à quibusdā *ἰεὲς δὲ καλὰ καὶ οὐκ ὀσά*, vt idem Scribonius auctor est, qui eam multis verbis commendat. Hanc tempore suo simpliciter *ἰσά* à medicis vocatam fuisse Galenus auctor est lib. 8. *τῶν ὁξέων*.

*Ite* *Ἀποποιεῖον*, ea est hieræ compositio quæ & *ἰεὲς ἰσχυρὰ* & *ἰσά δὲ καλὰ* appellatur: de qua paulo post.

*Ite* *Ἀντιόχου*. describitur à Galeno lib. 8. *τῶν ὁξέων*, citaturque ab eo ex libris Andromachi, quæ ille ad stomachicos utebatur. Habet autē hæc, aloës drachmas quatuor, mastichēs drachmas duas, asari drachmas quatuor, rosarum siccatarum, iunci odorati, mei, phu, calicæ, singulorum semunciam.

*Ite* *Ἀρχιγένους*. refertur ad Archigenem. Cuius cum variz ferantur compositiones, magis tamen placet quæ habetur apud Aetium. Recipit autē, vt ipse refert ex Archigene, medullæ colocynthidis vncias duas & dimidiam, chamædryos, agarici, martubii, stœchados, singulorum drachmas decē, opopanacis, sagapeni, singulorum vnciam vnam, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmas quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, polii, croci, pulegii, singulorum drachmas quatuor. Excipiuntur melle despumato ad sordium crassitiem, & vitreo vase reponuntur. Summa dosis drachmæ quatuor, vel, vt in aliis Archigenis exemplaribus

bus animaduersum est, drachmæ tres cum multa, adiecto modico sale. Paulus quidem Agineta eam compositionem describens cum Actio numero simplicium medicamentorum consentit, trium pondera duntaxat variat. Sed Paulus manifesto mihi videtur errare, quod secundum eius descriptionem, hiera Archigenis eadem prorsus esset cum hiera Antiochi si ab illa solum polium demas, à quo tamen palam est non desumi inter eas differentiam. Differunt enim tantum ab invicem pondere purgantium medicamentorum, quod longe maius est in hiera Archigenis quam Antiochi, ut iis notum esse potest qui animaduertent quam obrem hæc imbecillius, illa vero valentius purgat.

*Ἱέρα Γαλιῆς.* ea est quæ *πικρὴ* & *δυσλόνος* *ἵππας* appellant.

*Ἱέρα Ὀυμπίου.* refertur à Galeno ex lib. Andromachi. Recipit, Aloes drach. centum, mastiches, croci, nardi Indicæ, cinnamomi, carpobalsami, afari, singulorum vnciam vnam. Tunduntur & angustissimo cribro excernuntur, atque arida, ut ne transpirent, seruantur.

*Ἱέρα Ἰσχυρῆς.* describitur à Paulo & ab Actio, pari quidem simplicium numero (nisi quod Paulus nihil piperis tum albitum communis, nihilque casie adiicit) sed inæquali pondere epithymi. Hic enim pondus eius facit vnciarum quatuor & dimidiæ: Paulus autem drachmarum duodecim, hoc est, vnciæ vnius & dimidiæ. Est autem facile commissus error in Actio à librario per incuriam verticè *δ* nimium attollenti, ut non tam æquam esse videretur. Itaque facile Paulo assentior. Sic autem habet: Epithymi drachmæ duodecim, marrubii, stœchados, chamædyros, hellebori nigri corticis, scāmōniæ, agarici, piperis albi, piperis communis, piperis lōgi, scillæ tostæ, singulorum drachmæ sedecim, colocynthidos medullæ, euphorbii, aloes, croci, gentianæ, petroselini seminis, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, singulorum drach. vii. i. i. opopanax, polii, cinnamomi, casie, myrrhæ troglodytidis, spicæ, nardi, iūci odorati floris, pulegii, singulorum drach. iiii. aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum drach. ii. Excipiuntur melle despumato. Dosis est scrupulorum duorum aut triū, aut quatuor, aut drachmæ vnius & semis.

Sic enim scribendū est apud Aetium < α. S. nō autem < δ. S. Nā quis ferat drach. iiii. & dimidiā, cum helleborus, scāmōnia, agaricum & colocynthidis sexta fere pars sint totius medicamenti? Apud Oribasium habetur alia hiera Iusti descriptio in hunc modum: Colocynthidis interioris denarii 24. stœchados, chamædryos, piperis albi, pipetis nigri, agarici, veratri nigri, scāmoneæ, singulorum denarii 13. ammoniaci, thymi, croci, euphorbii, singulorum denarii 8. myrrhæ denarii 4. scillæ tostæ denarii 6. alii qui addunt casie denarios 4. & spicæ nardi

denarios 8. mellis quoddam satis est.

*Ἱέρα δὲ καλαυθίδος.* eadem est quæ & hiera Antiochi.

*Ἱέρα πικρῆ.* sic proprie dicitur quæ ex aloë paratur, quæ etiam & *πικρὴ* simpliciter tempore Galeni appellata est. Eius triplicem fuisse compositionem Gal. docet libr. 8. *Ἱέρα πικρῆ.* Vna quidem fuit Andromachi ad hunc modum: floris iūci odorati, xylobalami, mastiches, croci, nardi Indicæ, afari, cinnamomi, singulorum drach. vii. aloes lotæ drachmæ ceterum. simul trita reponere, præbe ieiunis cochlearia duo: alii vinum præbēt cum aquæ frigidæ cyathis quatuor, aut calidæ. Altera vero fuit ad ceterum drachmas aloes, singulorum aliorum drach. vii. i. admistis. Tertia fuit eorum qui in octoginta aloes drachmas, sex aliorum addunt. Sunt & aliæ quædam particulares differentiæ: alii florem iūci odorati apponunt, alii sine eo conficiunt: alii ut Andromachus ipsam aloem lotam, alii illotam adiciunt, prout magis minusve purgare aut calefacere siccat: que est animus, scribit etiam Gal. libr. 2. *Ἱέρα πικρῆ* se quandoque pictam ex nonaginta drachmis confecisse, nōnunquam etiam & modum croci vna drachma minorem impoluisse. Quidam totum medicamentum melle despumato excipiunt: sitque ita durabilius, sed minus ventrem roborat, magis veto deiecit. Gal. libr. 7. Method.

*Ἱέρα Αργαδίου.* hæc ad Logadiū nescio quæ refertur. Habetur eius descriptio apud Aet. libr. 3. cap. i. i. i. Aliæ etiam habetur apud vulgus aromatariorum, multum ab ea differēs.

*Ἱέρα Ρόβου.* hæc quoque diuersis modis describitur ab Oribasio, Paulo, Aetio & Pharmacopolis nostris.

Sunt & aliæ multæ *Ἱέρα* differentiæ: quæ tamen ad duas omnes referuntur, videlicet *Ἱέρα δὲ ἀλόνος*, vel *Ἱέρα δὲ καλαυθίδος*. Sunt autem ambarum effectus varii: illa maxime ventriculo, hæc capiti & vniuerso etiā corpori purgando conuenit. Quanquam & singulæ aliis etiā vñibus priuatim inseruiāt.

*Ἱέρα νόσος.* facit morbus. Sic à veteribus dicta est *Ἱέρα νόσος*, quo eius magnitudinem, ut ait Galenus, designarent: *Ἱέρα* enim apud antiquos significat magnitudinem. Verum aliqui *Ἱέρα* dici putauerunt quod diuinus esset morbus & à diis in vindictam immitteretur: quos tamen Galenus reprehendit.

*Ἱέρα κακῆς.*

*Ἱέρα κακῆς.* herba est caule subrubro, aspero, intruscauo, foliis per intervalla rariuscule scissis per ambitū more sonchi, floribus luteis in oblongis capitulis. frequens est in pratis. Rustici cichoræā luteā appellant à florum colore: hæc quidē maior est hieraciās. Est & minor, cauliculis viridibus & coloris herbacei, quæ intubū sylvestre rustici vocant. Dicitur *Ἱέρα κακῆς* & *Ἱέρα κακῆς*, quod accipitres scalpēdo eam, succoque oculos tingendo obscuritati visus medeantur. Succus ei candidus, valens ad oculorum epiphoras & caligines.

*Ἱέρα κακῆς.*



*Ἰσχυρίων κολύριον*, est collyrium ad obscurum visum & scabras affectiones. describitur apud Galenum lib. 4. *Ἰσχυρίων*.

*Ἰσχυρίων*, hieracites. Plinius in gemmis, Galenus & Paulus inter lapides numerant. Is alternat totius, miluinis nigricans veluti plumis. sic dictus est *Ἰσχυρίων*. est enim similis specie & colore accipitrum mollioribus pennis quæ ipsi sunt in pectore. Dicitur dextro femori alligatus sistere sanguinem ex hæmorrhoidibus manantem, cuiusque rei se fecisse periculum Galenus testatur.

*Ἰσχυρίων κολύριον*. Hieracis collyrium, quod ad aspretudinem oculorum potest, & describitur à Cor. Celso. Sunt & alia præterea quæ describuntur à Galeno lib. 4. *Ἰσχυρίων* in eundem usum, à quibus etiam differt aliud collyrium eiusdem nominis, cuius facit Plinius mentionem lib. 34. cap. 11. Est & eiusdem authoris pastillus apud Galenum lib. 5. *Ἰσχυρίων*.

*Ἰσχυρίων*, accipiter. Est fasciæ circumductio naso dicata, cuius tres differentias Galenus explicat lib. de fasciis, vnam ex tribus; alteram ex binis fasciis; tertiam quam ad Mene-cratem authorem refert. Nomen videtur inditum quod huiusmodi fasciarum cõtextus accipitrem referat capistro suo obuolutum.

*Ἰσχυρίων κύφι*. cyphi sacrificulorum, quod videlicet illi diis adolebant.

*Ἰσχυρίων*, verbenaca; sic dicta quod usum habeat præcipuum in lustrationibus suspensa vel alligata. dicitur & *verbenaca*. Dioscorides cinnamalem à Romanis vocari auctor est; ab aliis crista gallinacea vel exupera dicitur. Hæc ramulos emittit cubitales aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia quercus, sed minora, angustioraque, eiusdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsisio. radix longa tenuis. flores purpurei, graciles. Desiccat vehementer. discutit, corroborat.

*Ἰσχυρίων*, *Ἰσχυρίων*. apud Hippocratem, hoc est, legitimum & minime fucatum.

*Ἰσχυρίων*. sic dictus est à quibusdam *Ἰσχυρίων*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Ἰσχυρίων* apud Hippocrat. lib. 2. de morbis mulierum significat *Ἰσχυρίων*, hoc est, muliebri pudendum. apud Atticos aduerbium est significans idem quod *Ἰσχυρίων*. Qua significatione usurpatum fuisse ab Hippocrate Erorianus annotavit, scribens aliquos eius vocis ignoratione in eius locum *Ἰσχυρίων* substituisse.

*Ἰσχυρίων*, icterus. morbus regius seu arquatus. Est effusio bilioli humoris in corpus vniuersum. Redundat enim bilis toto corpore, nec vlla omnino pars est in qua diffusa non sit, solis aliquando exceptis intestinis. Id quod contingit propter causarum diuersitatem à quibus icterus gignitur. Aliquando enim fit ab obstructione illius vesicæ quæ bilem excipit. Tunc autem bilis non paren-

tibus illis meatibus per quos secerni atque vacuari debet, regurgitat in iecur & venas, & sanguini permixta effunditur in vniuersum habitum. Inde tota cutis flauescit aureo colore, sed in primis oculi, in quibus vitiosus color propter ingentem illis candorem magis conspicuus est. Et quia destinatis à natura locis non potest excerni, maxima sui parte propellitur à natura in renes vna cum vrina, eamque colore suo inficit, & crassam impuramque reddit: è contrario autem intestina bile vacua sunt, & eorum excrementa candida, deiciendi autem cupiditas nulla vel segnis admodum. Alia icteri species est quam nulla parit obstructio, sed vel calida & sicca totius corporis, maximeque hepatis intemperies, vel facultatis secreticis imbecillitas: illa quidem quod multam bilem gignat toto corpore, hæc vero quod genitam secernere à sanguine non possit. Ea hoc vno argumento maxime deprehenditur, quod intestina & quæ in his continentur excrementa multa bile, perinde atque reliquæ corporis partes, perfusa sint. Ad hanc speciem referri potest is icterus qui à venenatorum moribus aut potu pharmacorum deleteriorum solet contingere, quique nascitur ab omni alio iecinoris vitio quo sanguis deprauatur; & flauus, vel porraceus, vel pallidus, vel plumbeus euadit, siue id inflammatio sit, siue durities, siue compositus ex vtroque morbus. Tertia autem icteri species est, qui fit per morborum biliosorum crises. Natura enim aliquando bilem quæ morbum fecit, ad cutem propellit, vnde color biliosus vniuerso corpori inducitur. Ceterum quæ dicta sunt omnia, communia sunt tamen flauo quam nigro ictero: nisi quod icterus niger non fit obstructione illius vesicæ bilem continentis, sed lienis, quodque in eo non flaua bilis, sed nigra effusa sit in corpus, & proinde color non flauus sed niger appareat. Ferunt hunc morbum icterum vocatum à mustela quæ *Ἰσχυρίων* dicitur, quod ea oculos autem coloris habeat.

*Ἰσχυρίων*, *Ἰσχυρίων* *Ἰσχυρίων*, distorquere vel circumagere oculos, apud Hippocr.

*Ἰσχυρίων*, *Ἰσχυρίων*. describitur à Paulo, eoque ipse vitur ad oculorum vlcera lib. 3. cap. 22. vim habet leniendi & concoquendi, sed non est diutius eo vtendum, quod valde narcoticum sit.

*Ἰσχυρίων* affectus est circuliobis, cum lógior, graciliór, sicciórque euaserit: talis enim loro non ineptè comparari potest. Differt *Ἰσχυρίων* à *Ἰσχυρίων*, quod in hac circuliobis non extenuatus sit, sed crassitiem ex fluxione maiorem ut plurimum adeptus. Prouenit, inquit Aetius, cum ex suffitu nimium ignescit: tunc enim gracilesceat & secundum omnem dimensionem comminuitur.

*Ἰσχυρίων*, *Ἰσχυρίων*, hoc est, cum viro mixto, apud Hippoc.

*Ἰσχυρίων*, nomen collyrii, cuius descriptio habetur apud Aetium lib. 7.

*Ἰνδύς*, coloris genus est, cuius duæ differentiæ à Dioscoride assignantur. vna sua sponte nascitur tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infectoriæ dant officinæ, & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractâ artifices siccant. Optimum existimatur quod cærulei speciem præbet, succum suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est quæ leniter adstringunt, & inflammationes tumoresque rumpunt, purgat & reprimat vlcera.

*Ἰνὴς* euacuat, apud Hippocratem. Sic *Ἰνὴται*, euacuatur, apud eundem. Apud Hefych. vero *ἰνᾶσαι* legitur, quod idem interpreta-  
tur *ἐκκενῶσαι*. Hinc *ἰνθμός*, de quo infra suo loco.

*Ἰνὴς*, villi, fibræ, sunt fila quædam oblonga, gracilia, alba, solida, valida, omnis generis partibus inserta. Cum autem fibrarum multiplex sit differentia, præcipua tamen est quod aliæ nervosæ sint & sentientes, aliæ prodeant à ligamenti in fila tenuissima diductis sensus expertes. Alia quoque à situ sumitur, à quod fibræ aliæ rectæ, aliæ transuersæ, aliæ obliquæ dicuntur. Rectæ vocantur quæ secundum corporis, cui insunt, longitudinem feruntur: transuersæ, quæ rectas interfecant ad angulos rectos æquales: obliquæ, quæ medio inter eas situ utrasque (si modo eidem parti insunt: nam sæpe vnicum genus vni parti inest) interfecant ad angulos inæquales, vnum acutum & alterum obtusum. Propria fibrarum actio est ipsarum in se contractio, quæ quidem pro vario fibrarum situ opus quoque varium exercet. Nam rectæ attrahunt, transuersæ expellunt, obliquæ retinent, præsertim aliis duobus fibrarum generibus adiutæ. Retentio enim firmissima est omnibus fibris simul contractis circa id quod continetur. Sic cor fibris, quæ sunt illi quam musculis multo duriores & valentiores, rectis quidem per diastolen attrahit, transuersis per systolen expellit, omnibus simul contractis, sed præcipue obliquis, quiescit & attractis fru-  
itur. Musculis vnum modo fibrarum genus inest, vel rectum, vel transuersum, vel obliquum, quod singuli musculi motus singulos & simplices per se & primo edat. Ad hæc muscutorum fibræ sunt neruorum & ligamentorum partes: cordi autem, cælophago, ventriculo, intestinis, vesicæ vtriq; & vtero propria est & innata fibrarum species. Insunt autem fibræ omnibus partibus, animalibus, vitalibus & naturalibus, per quas singulæ muneribus suis defunguntur. Quinetiam cutis tota fibris multis à partium subiectarum neruis prodeuntibus plena est, per quas cum partibus ipsis connectitur & sentit. Sanguini quoque fibras inesse, & ob earum frigiditatem ipsum coagulari Hippocrates & Aristoteles testatur, vel hoc argumento, quod cui sanguini sunt hæ fibræ vel ademptæ, vel à natura negatæ, ut damis, ceruis & camelis, ille nunquam frigore possit concrefcere. Ac quamuis hepatis carni, quæ sanguinis fons est, uti &

pulmonum & lienis & renum, fibræ defunt, attamen ad trahendum, retinendum atque expellendum fibrarum vas suis insertarum ministerio vtuntur. Et iis quidē pariter meninges, costasque succingens membrana & peritonæum, quæque ab iis nascuntur, carent: quæ tamen cum vicinis partibus vinculis partim fibrosis & nervosis, partim etiam membranosis alligantur. Aliud autem ab iis est fibrarum genus quæ velut capilli in renibus præcalidis ab humore crasso gigni solent, & per vrinas excerni, de quibus scripsit Hipp. aphor. 75. libr. 4. quæ tamen propter similitudinem fibrarum nomine donantur. Sic quidem se habent *Ἰνὴς* in homine. Transferatur autem hæc vox ad inanimata, ut herbas, in quarum foliis à tergo, non aliter quam in hominis dorso, spina à reliquo folio veluti costa & pulvinus eminet: diuisiones enim eas interfectionesque Græci *Ἰνὴς* vocant. Plinius aliquando fibras, aliquando nervos, aliquando dorsum, aliquando venas appellauit.

*Ἰνθμός*, euacuatio, apud Hippocrat. *ἀπὸ τῆς ἰνῆς* quod vacuare & deplere significat: ex quo *ἰνθμήσις* ipsi Hippocr. est immodica vacuatio à medicamento purgante.

*Ἰνὴν*, occiput. Est os cranii posterius, sutura τῇ λαμβάνειν terminatum. Quinque videtur lateribus constare. Est autem valde inæquale: siquidem parte postica admodum crassum est, inferna qua musculos excipit aut emittit, asperum, tenue, solidum. Duæ illi sunt acutæ apophyses quæ in cauitates duas primæ vertebræ inseruntur. Intus quidem læue, minimeque asperum est: infernis autem partibus, & ubi non minimam capitis basis portionem constituit, valde asperum & inæquale, ut commodius inde ligamenta & musculi nascerentur, quibus caput collumque vel extenderetur, vel flecteretur. Sic quidē mediciani anatomes periti *ἰνὴν* describunt. Verum à quibusdam grammaticis *ἰνὴν* definitur tendo ceruicis, quo concidente ad inferiora & contracto ad humeros *ἰνῶσαι*, hoc est incuruari, dicitur qui id patitur. Plurisque placet *ἰνὴν* sic dictum esse, *ὅτι τὸ νευρῶδες ἐστὶν*, quia nervosum sit: quod Græcis *Ἰνὴς* nerui dicantur à capite in collum descendentes, quos alii *πίνοντες* vocant. Homeri interpres explicans hunc versum Iliados 3,

Βεβλήκει κεφαλῆς καὶ ἰνὴν ὅθεν δρεῖ:

scribit ita dici τὸ κοῖλον ἔπενοντος, ἢ *ὅτι τὸ νευρῶδες ἐστὶν*, ἢ *πλάττω καὶ πάλιν νεύρον τὸ κατῆκεν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ὅπῃ τὸ αἰχρῆνα*, hoc est, cauitatem tenontis, aut quia nervosa sit, aut acutus & latus neruus qui descendit à capite in collum.

*Ἰζάλῃ*, τὸ δέρμα, pellis, apud Hippocratem lib. de fract. siue ea capræ tantum, siue alterius animalis intelligatur: proprie tamen capræ, vel capri.

*Ἰζίαι*, varices, sic dicuntur ab Aristotele *εἰ κιστοί*, sunt tamen qui differre putent, vocantes *κιστούς* venas omnes dilatatas in quacumque corporis parte: *ἰζίας* vero eas modo quæ in

cruribus habentur, cuius tamen differentie nullam fidem faciunt.

*ἰξία*, dicitur chamæleo, ut patet ex Scribonio Largo, ubi de venenis agit, similiter ex Hesychio. Verum non omnis chamæleo est, sed qui viscum fert, cuiusmodi habetur qui in Creta pronenit, quem Theophrastus lacrymam reddere scripto testatus est. Dioscorides autem ad radices eius profundi viscum quibusdam in locis affirmat, quo mulieres utantur pro mastiche. Itaque non omnis chamæleo, sed qui viscum remittit, *ἰξία* dicitur. Quod discrimen intelligens Nicander, cum in Alexipharmacis *ῥιόφον* veneni quod omnium consensu chamæleo censetur, meminit, adiecta nota *οὐλοφόνον ἰξίον*, quasi viscosum, dixit, quod idem erat atque *ἰξία* dicere. Non est igitur idem chamæleo & *ἰξία*: hoc speciei, illud generis rationem habet. Accum chamæleonem veteres in duo genera distinxerunt, album & nigrum, & videatur Dioscorides *ἰξία* speciem albi facere (quod tamen mirum est, cum album bibi posse constet, *ἰξία* vero longe perniciosissimum esse venenum) attamen patet ex eorum dictis chamæleonem *ixiam*, multum esse differentis naturæ a chamæleone viscum non ferente. Nam qui viscum non fert, si albus quidem est, non est venenatus, quod Dioscorides, Galenus & Plinius eum propinent aduersus interaneorum animalia, hydropas & dysuriam: si vero niger est, venenatam quidem & lethiferam radicem habeat, authore Galeno, qui propterea suadet tantum ea foris utendum esse aduersus scabiem, impetiginem & vitiliginem, sed longe variis ab *ixia* modis nocentem, multumque diuersa symptomata inuehentem, & notas similiter differentes, & alia quoque remedia poscentem: testis Paulus Aegineta, qui seorsum de *ixia* deque chamæleone scripsit, quod differant tum symptomatis, tum curatione. Ex eo enim iudicari potest Dioscor. in proœmio libri sexti, venena in suas quæque classes digerentem, non temere chamæleonem & *ixiam* inter radices separatim recensuisse. Cæterum dicitur *ἰξία* *ῥόπον ἰξίον*, hoc est, a visco, quasi viscaria planta Namque visco redundat tam tenaci & pernicioso, ut non nisi interaneorum conglutinatu interitum adferre videatur. Nam, ut cecinit Nicander in Alexipharmacis,

— *strepit attonitus qui viscum exhibuit,*  
*ἔσ' ἀμφο*

*In caco obstructi conuident ventre meatus*  
*Potus atque cibi, flatu ubi carcere clausi*  
*Dant strepitum, & circum spatii voluntur iniquis:*

*Horrissono veluti cælum tonat omne fragore,*

*Aut celeres duris illis rupibus unda*  
*Clamorem attollunt inter caua saxa, fremuntque.*

Quo quidem in carmine *ἰξία* viscum Latine

reddidimus Plinium sequuti: sic enim ab eo multis in locis dicitur, qui è Græcis authoribus omnia fere conuertēs, ad viscum remedia attulit quæ Græci omnes aduersus *ixiā*. Nec tamen visci nomine apud eum intelligi debet id quod aucupes in captandis auibus usurpant, sed quod veteres *ἰξία* vocasse diximus. Siquidem viscum illud aucupatorium ut nemo inter venena numerauit, sic nullus est qui *ixiam* non scripserit venenum esse. Attamen magna utriusque similitudine effectum est, ut Plinius *ἰξία* viscum redderet. Nam sicuti viscum cuiusque rei cui hæserit tenax est, ita si deuoretur *ἰξία*, omnia glutinat interanea, omnesque contrahit & colligat excrementorum exitus. Miror tamen Plinium maluisse viscum quam *ixiam* dicere, cum nec ipse à Græcis vocibus tantopere abhorreat, nec Scribonius Largus eo antiquior libris suis *ixiæ* nomē inserere dubitauit.

*ἰξία*, dictio est Hippocratis propria. significat autem magna ex parte *εὐδυοείαν*, id est, rectum tramitem, ut annotauit Gal. interdum vero *φορὴν* id est, lationem, καὶ ἀφίξιν. Verum rectitudo ipsa, inquit Gal. comment. 3. in lib. de fracturis, non per longitudinem modo corporis, sed per latitudinem etiam intelligitur, ut quæ non aliud sit quam directio quædam meatuum per quos humorum deductiones commode fieri possunt. Eos autem non vnus generis natura fecit, sed multiformes, alios secundum longitudinem, alios secundum latitudinem corporis, alios vero ab anterioribus ad posteriora tendentes.

*ἰξία*, viscum. optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil aut fursuosi cōceperit. sit acinis in quercu nascentibus buxæo fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro & plerisque aliis arboribus: quinetiam inuenitur in quorundam fructuum radicibus. Emollit, discutit, extrahit. Ex plurima aerea & aquea calida paucissima terrena substantia constat.

*ἰξία* ἡ

*ἰξία*, lumbrici, ilia. Sed tamen de huius nominis significatione ambigitur. alii, ut ait Gal. intellexerunt τὰ τῶν λαγόνων ὀστέα, hoc est, lumbrorum ossa: alii vero τὸ ὑπεράνω αὐτῶν, hoc est, partem eis superiorem. Galenus vero in eius nominis explicatione dubius est. Nā ex Homero quidem scribit videri sibi eam partem designari quæ inter thoracis & iliū ossa media est, ex Hippocrate vero in lib. de fracturis, eo nomine ipsa iliū ossa intelligi.

*ἰξία*, late patet hoc nomen, deque multis floribus dicitur. significat sæpe violā non omnem quidem, sed præsertim nigrā & purpuream, ad hæc flores omnes iasminos, calathianā, & quam Græci *ελόγα*, Plinius flammeam vocat, pluresque alios qui figura, quantitate,

titate, foliorum positura, aliaque eiuscemo-  
di ratione aliqua proprie dictis violis simi-  
lis sunt. Sed *ἰὼν μέλας* proprie veteres usurpa-  
runt pro viola purpurea quam Latini vocat.  
quod folium habet minus quam hederā, te-  
nuius & nigrus, nec multo dissimile. cui  
cauliculus à radice medius prodit, in quo  
flosculus suauissime olens, purpureus. Opa-  
cis & asperis nascitur. Aquæam & subfrigi-  
dam substantiam.

*Ἰσθός*, varus. Est tumor paruus & durus in fa-  
ciei cute: gignitur ex crasso succo, nullius  
ferosæ tenuitatis participet, tam ob rem pru-  
riginosus non est, neque ad scalpendum in-  
uitat. Ex iis quæ scribuntur à Paulo libr. 3.  
cap. 25. apparet duplex esse vari genus: vnū  
duriorem & veluti callosum, alterum vero  
minus durum. Aetius scribit *ἰσθός* alio nomi-  
ne *ἄνθω* vocari.

*Ἰς*, rubigo cuiusque metalli, ut apud Dioscori-  
dem *ἰς ἰδρύς*, rubigo ferri, ferrugo Plinio.

*Ἰς*, ærugo sine æruca. Est succus concre-  
tus ex liquore cum æris metallo misto. Du-  
plex autem ærugo est, natia & facticia.  
Natiuam Dioscorides scribit in metallis æ-  
rariis gigni duobus modis. Aut enim ex la-  
pidibus quibusdam nonnihil æris habenti-  
bus efflorescit & abraditur (ex quo *ἰὼν ἔνδο*  
id est æruginem rasilem, Græci appellant)  
pauca quidem illa, sed optima: aut ex specu  
quodam destillat per caniculæ ardores, eo-  
piosa & grati coloris, sed vitiosa, quod lapi-  
des multos collegerit. Est & tertia natia  
æruginis differentia, fossilis videlicet quam  
à similitudine vermium *σκαλιδρία* Græci, hoc  
est vermicularem, quod in vermiculorum  
speciem se contrahat, appellant, quam  
Dioscorides in medicina cæteris prætulit.  
Factitiæ autem æruginis tria similiter ge-  
nera sunt. aut enim abraditur ab ære, quæ  
*ἰς ἔνδο*, hoc est ærugo rasilis, vocatur: id-  
que pluribus modis quos describit Diosco-  
rides. aut in vermes formatur, eodem quo  
ille æri recenset modo. aut in mortario  
æreo efficitur veteri ex vrina, quam aliqui  
chryfocollam ab effectu nuncupant, quod  
aurifices ea sola aurum cum auro congruti-  
nēt. Ærugini suus est color in cæruleo sub-  
candidus, sapor acris, facultas adurens, dige-  
rens, liquans non teneram modo, sed etiam  
duram carnem. Carnem superexcrecen-  
tem minuit, erodit, siccatur & adstringit, ea-  
que omnia vehementissime agit non vsta,  
mitius autem si vratur. Ad emplastra con-  
uenit maxime, in aceto quam acerrimo die-  
bus plusculis macerata & postea in lauore  
redacta.

Cæterum *ἰὼν* & *ἰὼν* sit *ἰὼν*, id est ærugi-  
nosus. quo nomine medici speciem vnā  
bilis acerrimæ, erodentis & malignissimæ  
designant, quam Galenus mediam statuit  
inter biliosum humorem & atrum, & fieri  
cum flaua bilis supra modum exassatur, non-  
dum tamen in atram conuersa est. Eius in-  
diciū est vitidis color, sicut niger vel atræ

bilis vel sanguinis aliquo in loco perusti. Eā  
ipse Galenus specie talem esse prodidit, ac si  
quis optimam æruginem aqua perfunderet  
ad desuper crassitiem.

*Ἰσθός*, saccharum violaceum, apud Actua-  
rium.

*Ἰουδαϊκὸς λίθος*, Iudaicus lapis. Est lapis glandis  
effigie, candidus, scita admodum configu-  
ratione, à cuius obtusiore parte ad acutiorē  
procedunt eminentes linæ æqualiter inter  
se distantes, quasi de industria detornate. Sic  
dictus est quia in Iudæa nascitur: qua de  
causa etiam Syriacus vocatur ab Aetio. Idem  
à similitudine *φανικίτης*, dictus est. Ab effe-  
ctu autem *πικάλυθος* atque *ἔνθαρος*, quia com-  
minuat calculos, atque per vrinam facile ef-  
fluat.

*Ἰουδαϊκὸς ἰμπερασπός*, emplastrum est quo nomine  
obseruauit duo vocari: vnū cuius mentio-  
nem facit Cor. Celsus libr. 5. cap. 19. quod  
dicit factū capiti accommodatum esse: alter-  
rum quod describitur ab Aetio libr. 15. re-  
purgans carnemque gignens.

*Ἰουλος*, iulus. Id dicitur quod in auellana nuce  
coryloque compactili callo racematim cohe-  
ret, & veluti prælongus vermis singulari pe-  
diculo pensile nititur.

Dicuntur etiam *ἰούλοι*, ut scribit Rufus, *ἰού-  
λοι* πῶς χρόνιός τῶν περὶ τὴν βαρυτέτα. hoc est, pi-  
lorum circum tempora exortus. quanquam  
non eos modo pilos, sed qui in mento etiam  
lanuginis instar primi erumpunt, eo nomi-  
ne plerique intelligant.

*Ἰππός*, *ἰππός*, apud Hippocratem *ἰππὸς* *ἰππὸς* id  
est, potio.

*Ἰππία*, hippace. caseus est equinus, virus re-  
dolens. magnopere alit, bubuloque pro-  
portionē respondet. Nec desunt qui hippa-  
cen equinū coagulum appellarint. auther  
Dioscorides libr. 2.

*Ἰππία*, quibusdam placet radicem esse plantæ  
cuiusdam, cuius esu fames sitisque sedetur.  
Ruellius contendit non radicem aut herbā,  
sed equinū caseū ea voce designari: quam  
tamen *ἰππία* quidam scribunt.

*Ἰππύλαιος*, frutex est qui alio nomine laurus  
Alexandrina aut Idæa dicitur.

*Ἰππύλαιος*, frutex est paruus, folia habens figu-  
ra myrti sylvestris & gracilioris, coma spi-  
nosa, & in iis ceu ligulas, folio paruo de fo-  
liis exeunte.

*Ἰππύλαιος*, species est oleris, foliis valde ma-  
gnis in paludibus (ut ait Dioscorides) na-  
scens, easdem habet vires cum rumice.

*Ἰππία*, frutex est alio nomine *ἰππία* &  
*κινωράμης* dictus, equis præsertim: si eo ve-  
scantur, lethalis de quo Theocritus *ἐν τῇ φαρ-  
μακωνείᾳ* ita cecinit:

*Ἰππία* φυτόν ἐστι παρ' Ἀρκάσι. τῇ δ' ὅττι πᾶσι  
καὶ πῶλες μαίρονται αἰὶ ὄρεα, καὶ βοαὶ ἴπποι.

Sunt vero qui existiment virus quoque  
desuens ab equarum inguinibus, quo tem-  
pore amoris infania concitantur, eo nomi-  
ne vocari, quæ quidem fuit Virgilio senten-  
tia libr. 3. Georg.

*Hinc demum hippomanes, vero quod nomine dicunt.*

*Pastorcs, lentum distillat ab inguine virus.*

Alii vero *ιππομας* intelligunt non cum modo, quem equæ amore furentes emittunt è genitalibus locis humorem, sicut scripsit Aristoteles libr. 6. capit. 18. de histor. animal. sed aliquid etiam quod narratur fronti nascentis pilli inherere, minus earica parua, specie laticulatum, orbiculatum, nigrum, quod equæ postea perlambentes abstergentesque abrodunt. Id carunculam esse quidam scripserunt, nullius quidem in medicina usus, ad incantamenta autem & amatoria expetitam.

*Ιππομας* *σπινθ*, feniculum sylvestre, satino gradus, semen ferens ut canchry, radice odorata. Constat à magnitudine sic appellatum esse.

*Ιππος*, est oculorum affectio, sed insita & naturalis, per quam nunquam illi conquiescunt, sed tremule subinde nictant, semper instabiles. hanc oculorum affectionem Galen. comment. 1. *εις το σπινθιν* comparat stridori dentium naturali & congenito, patetque ex eo non esse morbum, præsertim cum heimo medicorum eius meminerit.

*Ιπποκλινον*, olus atrum. Est apium multo maius hortensi apio cum caule tum foliis. Natura illi myrrhæ similis est, ideoq; à quibusdam *μυρρινος* dictum est.

*Ιππος*, equisetum. herba est cui cauliculi inanes, geniculati in se fracti, rubescences, scabri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. Atrolitur in sublime, vicinos arborum caudices scandens, obuolutumque dependet, comis multis nigris, ut equorû cauda, à qua similitudine quidam equinam vulgo appellant. Radicem habet lignosam & duram. Altera *ιππος* est caule recto, cubitali, inani, comis per intervalla brevioribus, candidioribus & mollioribus. Adstringit, & valenter si reque morfu desiccatur.

*Ιπποφαις*, frutex est quo vtuntur fullones concinnandis vestibus: dicitur alio nomine *ιπποφαις* atque *ιπποφαις*. Vocatum est etiam à quibusdam eo nomine *το ιπποφαιον*. Romani lappaginem & lappulam dixerunt.

*Ιπποφαις*, sic dicitur *το ιπποφαις*: præterea carduus & *το ριζον*, ut annotat Galenus *εις τοις χλωμασις*.

*Ιπποπιν*, nomen est malagmatis cuius Philagrius author perhibetur. Descriptio habetur apud Aetium lib. 12.

*Ιρις*, iris, herba est folia ferens gladioli, sed maiora, latiora, pinguiora. flores in summitate cuiusque caulis æqualibus inter se spatiis distant, incurui, varii. siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei aut caerulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris specie, quædam celestis arcus imago in cauo calyculi sinu representatur. Radices subiacent geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ in umbra siccantur, & traictæ lino reconduntur. Melior est Illyrica & Ma-

cedonica, præsertim quæ mutila fere & densa constar radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro, odore perquam grato & sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quæ dum tunditur, sternutamentum mouet. Duo in vniuersum iridis genera produntur, satiuæ & sylvestris. Illa cultu vegetior, grandiorque euadit, at viribus imbecillior: hæc duorum est generum: altera satiuæ & vulgari similis, foliis tamen, flore, caule radiceque paulo minoribus: altera foliis gladioli longioribus, radice tenui, lignosa, geniculata, subrufo, inodoraque, caule breui, flore cæteris longeminori, odore Armeniaci mali. Iris excalfacit ordine secundo completo, vel tertio inchoante, & pariter siccatur. Officinis suam appellationem retinuit. herbarii celestis lilium malunt vocare. rura nostra partim flammam, partim glaiurum, quasi dicas gladiolum, quod folium in gladii speciem mucronatim exeat.

*Ιρις*, dicitur circulus pupillam ambiens, inter eam & album oculi medius, quo vniuersæ oculi tunice inter se committuntur. Inditum nomen ab arcus celestis similitudine: dicitur aliter *σιφανη* & *σιφανος*. vide *σιφανη*. Huius partes quæ pupillæ proximæ sunt nigra, *μαστι* dicuntur: circulus vero qui candido proximus est, *αλως*.

*Ιρις*, nomen est pastilli croco, myrrha & alumine constantis, ut refert Aetius ex Herodoto lib. 5. cap. 129.

*Ιρις*, etiam gemmæ nomen quæ non est aliud quam crystallus candida, lympida, sexangula, quæ exposita solis radiis per rimam aut aliter subeuntibus, angulorum repercussu arcus celestis speciem in proximis parietibus imprimat. Sed & ipsa in se arcus ipsius imaginem habere videtur in vno aut altero sui angulo, si luci obuersa conspiciatur.

*Ιρις* *αλως*, dicitur à quibusdā *το αλως*, ut scribit Aetius lib. 13. cap. de conito.

*Ιρις*, *διφθερα*, *δερμα*, id est, pellem, eorum. Ita apud Galen. *εις τοις γαστρις*: apud Erotianum rectius *ιρις*, nam *ιρις* siue (ut Eustath. manuitt) *ιρις* dicitur *ιρις* *αυτος* *δερμα*, pellis capri ad inituram apti, seu (ut Erot. exponit) *αυτος*, adulti.

*Ιρις*, glastum, herba est fruticosa, duum fere cubitorum & ampliorem caulem gerens: folia platagini similia, sed pinguiora nigrioraque. Verum ea quidē *ιρις* satiuæ est, quæ insectores lanarum vtuntur, ut cœruleū inducant colorem. Sylvestris non multum ab ea dissimilis est, sed folia habet maiora laticucis, caules tenuiores, multifidos, quædamtenus rubetes, è quorum cacuminibus folliculi numerosi, linguæ speciem repræsentantes dependet, in quibus semen: flore præterea gracili, luteo. Ambæ vires easdem habet. Illita folia tumores omnes discutiunt, eruenta vulnera glutinant, sanguinis profusio sustinet, ignem sacrum, phagedænas, putrescentia vlcera & quæ serpunt, sanant.



Gallignadum vel gualdum appellant.

*Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, hoc est, zquales & mediz ætatis, apud Hippoc.

*Γαλλίνα*. *τὸ μεταξὺ τῆς σιμῆς καὶ τῆς σιμῆς* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, ut ait Galenus, hoc est, pars inter os & gulā media. Sic autem dicta est per metaphoram, quod isthmus proprie significet angustum quendam terre tractum inter duo maria. Idem in lib. de musculorū dissectione *Γαλλίνα* vocari dicit p̄xiuum quendam locum, gulæ gutturique communem, in quem utriusque osculum ascendit, nominis que rationem assignat, quod is angustus oblongusque sit. Sic idem etunt, *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, quam Galen. interpretatur *τὸ μεταξὺ τῆς σιμῆς καὶ τῆς σιμῆς* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, hoc est, quæ inter stomachum & laryngem interiaceret latitudinem.

*Γαλλίνα*, ificium. Est edulii genus ex carne diligenter intrita & minutissime incisa, quod nunc per se, nunc reticulo aut omento circumdatum, aliis etiam iunctis rebus & aromatibus aliquando, in sartagine cum adipe aut oleo burytoue frigebatur. fiebat ex diuersa materia, sicut Apicius docet lib. 2. cap. 1. Verum zgre id genus carnis concoquitur, quod sua leuitate fluitet in ventriculo, vt habetur apud Alex. Aphrodis. probl. 22. lib. 1. Author est Macrob. lib. 7. Saturnal. ificium dici, quod ab infectione ificium dictum erat: amissione enim literæ, postea quod nunc habet nomen obtinuisse. Gaza tamen apud Alex. ificium vertit. Videntur autem & Græci ex Latino nomine suum fecisse.

*Γαλλίνα*. herba est, sed quæ sit incertum est, nisi quod Aetius lib. 12. capite de medicamentis purgantibus ad arthritidem interpretatur *Γαλλίνα* chamæleonta nigrum.

*Γαλλίνα*. est emplastrum ad cruenta vulnera efficax, præsertim capitis, ad glutinandum, carnem inducendum, purgandum, & reliqua multa, vt habetur apud Aetium lib. 5. quo loco descriptionem eius habet, & dicit à quibusdam referri ad Hermonem sacerdotem, & appellari Hermonis viride. Habetur & apud Scriboniū Largum cap. 206. (sed viride Glyconis nominat) diuersa quidem ratione cōpositum quam sit ab Actio & Paulo, sed magna ex parte iisdem medicamentis constans. Est & *Γαλλίνα* alterum emplastrum quod Epigono inscribitur apud Aetium eodem loco. Est igitur huius nominis emplastrum triplex, *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*.

*Γαλλίνα*. sunt spongiosa quædā corpora in quercubus & corylis nascentia, quibus escharotica vis ineſt, & vtuntur barbari vice cauterii. Author Paulus lib. 6. cap. 49.

*Γαλλίνα*. est collyrium *Γαλλίνα* ad multa utile, cuius variz reperiuntur descriptiones: vna habetur apud Aetium lib. 7. qui ipsum alio nomine *Γαλλίνα* scribit appellari: altera apud Paulum lib. 7. multum & materia & ponderibus differens ab ea quæ Actii est, quam

ipse *Γαλλίνα* appellat, propterea quod malabathri portionem recipiat.

Est & *Γαλλίνα* antidoti nomen quæ describitur apud Galenum lib. 7. *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, ex Andromacho.

Est & *Γαλλίνα* nomen *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, cuius descriptio est apud Aet. lib. 8.

Est etiā *Γαλλίνα* nomen *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, quæ ad Nicostратum refertur, & describitur ab Aetio capite *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*.

Est & *Γαλλίνα* unguentum *Γαλλίνα*, hoc est, ad coxendicis dolorem efficax. descriptio habetur apud Aetium lib. 12. cap. 5.

*Γαλλίνα*. est herba in cuius summo cacumine capitula sunt tenuia, plena seminis exigui, quæ gustu melanthium sapiunt, folia velut anisi: aliqui vocāt *Γαλλίνα*, quoniam in summo caule folium eius in modum pampinorum phasioli torquetur. Spissandi & cohibendi naturam habet, valetque in primis ad vitia pectoris.

*Γαλλίνα*. membrum illud dicitur Hippocrati, quod forma est cylindro quam similitum. Voco autem cylindrum non quo pueri ludunt, sed figuram eam qua columnarū scapi præditi sunt: cuius pars nulla in neutram partem magis propendet: vt annotat Gal. comment. 2. *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*.

*Γαλλίνα*. genere neutro. herba est cuius Theophrastus duo genera describit, vnū nigrum, flore & fructu nigro, alterum candidum, iisdem scilicet candidis: quanquam & medio, inquit, colore fructus quandoque cernuntur, & flores in purpuram inclinantes, virgis & foliis tenuioribus atque lenioribus. Itaque tria eius genera recte constitui possunt, an sit idem cum *Γαλλίνα*, non satis animaduersum est.

*Γαλλίνα*. est nomen *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, cuius descriptio est apud Aetium lib. 8.

*Γαλλίνα*. vide *Γαλλίνα*.

*Γαλλίνα*. collyrii nomen, quasi dicas auro cōpar, ad multas oculorum affectiones. describitur à Galeno lib. 4. *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*.

*Γαλλίνα*. est *Γαλλίνα* *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, hoc est, eorum quæ sæpius iisdem de rebus experta sunt, enarratio, vt ait Galenus in libello de optimā secta. Est autem vocabulum Empiricæ sectæ proprium, de quo vide in dictione *Γαλλίνα*.

*Γαλλίνα*. medicamentum sanguinem sistens, paulo diuersum est *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*. hoc enim non sanguinem modo supprimit, sed & inflammationem arcet: illud vero rationem tantum habet sistendi sanguinis. Huius cum aliquot formulæ descriptæ sint apud Galenum lib. 5. *Γαλλίνα* *Γαλλίνα*, omnes constare reperiās vtentibus crustamque inducentibus medicamentis.

*Γαλλίνα*. herbar nomen est milio similis, per terram serpentis, foliis asperis & lanuginosis. supprimit sanguinem vnde cūque ruentem, vnde & nomen habet. aliqui milium agreste putant nominari.

*Ἰσχίαι, ἰσχάι*, hoc est tenues, apud Hippocrat. Similiter *ἰσχίαι*, tenue.

*Ἰσχίς*, carica, proprie dicitur ficis arida. quāvis aliquando *ἰσχίς*, tum recentes, tum veteres dici inuenias.

*Ἰσχίς* etiam alio nomine dicitur à quibusdam ἰσχυρὸς herba, propterea quod radicis suæ extremum in ficis effigiem turbinatum habeat dicitur & alio nomine *ἰσχυρὸς*.

*Ἰσχίον, ἰσχυρὸν*, apud Hippocratē hoc est, comprehendere.

*Ἰσχίς*, est arthritis coxendicis. nomen habet à parte læsa. Os enim quod femoris caput excipit, *ἰσχίον*, id est coxa, appellatur. Species est arthritidis coxæ articulum occupantis. Antecedit & quasi auspicatur hoc malum aliquando quidem vicinorum musculorū dolor & maxime lumborum: aliquando vero ab ipsa iunctura initium fit affectionis. Iam vero quandoque etiam contingit vt vertebri dolore fere sublato, circa poplitem solum afflictio hæreat, aliis autē iuxta talum. quibusdam verò totum crus æqualiter dolore affligitur: multis item circa inguina dolor figitur, & tum quidem vesica ipsa molestiam trāssamens, vrinæ difficultatem inducit, & tunc maxime totum crus à coxendicibus vsque ad calcaneum dolorem perferit, & non solum si ipsum crus moueatur conuulsiones infert, verum etiam si aliqua alia corporis pars agitur. Raro tumor inest conspicuus, rarius calor aut rubor, quod malum intimas articuli partes occupet. Generant hanc affectionem multæ cruditates, vnius immodica, deambulationes constrictiores, hæmorrhoides suppressæ, vomendi consuetudo intermissa, & purgationes mēstruæ aut aliæ familiares. excretiones impediri, neglectæque solitæ exercitationes.

*Ἰσχίον*, aliquando significat ligamentum ipsum quo femur coxendicis acetabulo colligatur, vt scribit Pollux: interdum vero ipsum articulum. Sed & *ἰσχία* dicuntur à quibusdam partes carnosæ ex utroque sacri ossis latere, quæ & *αισχία* à Græcis, à Latinis clunes, vt arbitror, appellantur.

*Ἰσχίον ὀστέον*, os coxendicis. Est apophysis ossis sacri, ad coxendicis acetabulum vndique pertinens. Habet enim os sacrum, vt scribit Galenus, tres *ἰσχυρὸς* rectas, hanc quæ τὴν ἰσχίαν, aliam quæ τὴν λαγόναν, tertiam quæ ἡ ἴσχος dicitur: Rufus tamen totum illud os *ἰσχίον* vocat, forte à primaria ischii actione. Nec tamen dubium est os sacrum diuersis sui partibus diuersa etiam sortitum esse nomina. Ea quidem parte qua femoris caput ei inseritur, *ἰσχίον* vocatum est. Id quod Homerus etiam testatur Iliad. i. hoc versu:

Τὸ βάλεν Ἀνείας κατ' ἰσχίον. ἔδα π' ἄμφο

Ἰσχίον ἰσχυρὸν κατὰ τὸν πῦρ καλῶν.

Quo loco interpret ait, *ἰσχίον* τὸ ὑπὸ τῶν ὀστέων ὀστέον, εἰς δ' ἰσχυρὸν τὸ ἰσχίον ὀστέον. hoc est, ischion appellant os quod infra lumbos est, cui incumbit os sacrum. Suidas autem scribit, *ἰσχίον*, τὸ κατὰ τὸν ἰσχυρὸν, ὃ ἐστὶν ἡ κατὰ τὴν σπέρσιν. hoc est,

ischion vocari causā partem femoris, in qua caput ipsius voluitur. De homine tantum dicitur auctore Aristotele libr. 4. cap. 10. de hist. animal. vbi habet: *ἰσχία δ' ἔχει τὴν πρὸς τὸν οὐδόν*: hoc est, ossa coxendicis nullum quadrupes habet. vnde etiam nomen inditum creditur, *ἰσχίον* κατὰ τὴν φύσιν, quod sedētes sustineat. Iulius Pollux appellat *ἰσχία* carnosas post lumbos vtrinque eminentias, his verbis: *ἰσχία μὲν ὄντι αἱ ἐκ τῆς ἰσχυρῆς μετὰ τὸν οὐδόν ἀρσενίδος ἀνθρώπου*. hoc est, ischia quidem sunt vtrinque post lumbos carnosæ eminentiæ. Idem pro neruo interpretatur, scribens: *κατὰ τὴν ἰσχίαν τὸ νέρων τὸ συνίστην τῶν κατὰ τὴν σπέρσιν* & *μυρὸν*, *ἰσχίον* ἐμῶν μόνον δὲ ὄντι αὐτοῖς καὶ τὸ ἀρσενίδος: hoc est, ischion autem appellatur etiam neruus qui detinet ad crus os sacrum: cui consimilem habet significationē etiā articulus.

*Ἰσχίος*, gracilis. qui longo & tenui corpore est, & minime carnosus. Talis autem est vel natura, vel præter naturam. Qui natura eiusmodi est, calido omnino siccoque temperamento est, latus habet venas in quibus copia sanguinis est: qui vero non est talis natura, is gracilitatem ex longa aliqua consuetudine contraxit, vt multa tolerantia, curis, vigiliis, exercitationibus, vacationibus & tenui victu. manent tamen in eo venæ angustæ, natui habitus indices.

*Ἰσχίος, σπέρματος* gracilis pulsus. Sic dicitur qui fit secundum solam arteriæ longitudinem, cum nulla manifesta latitudine & profunditate. Huic contrarius est pulsus *ἰσχυρὸς*, cuius latitudo & profunditas magnæ sunt. Causa pulsus gracilis est arteriæ siccitas & consumptio carnis circumstantis.

*Ἰσχυρὸς ὁ ὄμιλος*, hæsitantia linguæ. Est vitium pronunciationis quo syllaba syllabæ cito copulari non potest. Sic quidem Aristoteles in problematis interpretatur, docens quomodo *ἰσχυρὸς δ' ὁ πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος*, hoc est à blæfirate & balbutiæ, differat. Potest tamen & vitium vocis eo nomine intelligi nimium gracilis. Siquidem Gal. comment. 2. in libr. 1. τὴν ὁμιλίαν scribit τὴν ἰσχυρὸν fieri ob vitium cogenitum musculorum quia laryngem mouent, eaque in re differre *ἰσχυρὸς τὸν ὄμιλον*, quod hi tales propter angustiam asperæ arteriæ & laryngis euadant: utrosque tamen huiusmodi esse à primæ cōformatione ob imbecillitatem innati caloris. Vt autem *ἰσχυρὸς* fuerit propter vitiosam ab initio cōformationem musculorum laryngem mouentium, sic *ἰσχυρὸς* à vitio & nimia asperitate instrumentorum vocalium euadunt *ἰσχυρὸς*.

*Ἰσχυρὸς*, contenta. Dicuntur ab Hippocrate sect. 8. libr. 6. τὴν ὁμιλίαν, humores in solidis partibus (quæ ab eodem *ἰσχυρὸς* vocatur) spatiis & cauitatibus conclusi: qui tamen non hac tantum ratione contineri dicuntur, sed quod etiam ab ipsis solidis partibus regantur & gubernentur. Quod enim iugnantur, quodque vñbus corporis inserviunt, id habent à solidis partibus.

**Ἱερεμία.** continentia. Verbum est Hippocratis sect. 8. libri 6. *πῶς ἔστιν*. quo significat in primis corpus solidum cordis, arteriarum, & aliarum partium similiter canarum & aliquid suo in finem concludentium. Sic autem solidas partes vocant, quod sint totius naturæ & eorum quæ *ἰσχυρὰ καὶ ἐσθλὰ* appellat, bases, radices & fundamenta. Nam in ipsis singulis substantia inest triplex, veresolida, & ipsam ambiens, muniens, fouensque carnosa, & per utramque sparsa spirituosa, in quarum trium substantiarum, & maxime in solidæ quantitate idonea, & iusta qualitate seu temperamento, vitæ primum robur & firmitas residet. Hæc ob id omnium maxime continet ac regit reliquas duas, & huius præcipue beneficio corpora solida dicuntur *ἰερεμία* ab Hippocrate, à quibus singularum partium actiones proficiuntur. Nam ventriculi solidum corpus trahit, retinet, cõquit, expellit, calore suo & spiritu adiutum. Eadem hepatis solidum corpus præstat, suis duabus aliis substantiis similiter adiutum. Pari ratione & reliquæ partes. Ex quibus fit ut Hippocrates optimo iure corpora solida continentia vocauerit, non aliter quam frætum vini, vinosam & spirituosam eius substantiam fouere & continere videmus. Neque enim continere tantum significat loco aliquo & spatio concludere, sed etiam regere, moderari & gubernare, quo modo & præceptor discipulos, & imperator milites continere dicitur.

**Ἱσχυρία.** est vrinæ in vesica suppressio. Morbus est vesicæ proprius, cuius causæ geminæ statuantur, vna quidem imbecillitas vesicæ non potentis vrinam per contractionem foras excernere, nata vel ex intemperie, vel morbo organico, vel solutione continui, vel neglecta meiendi occasione, ut virgentibus negotiis, aut in concionibus aut senatu, aut foro aut conuiuio, indeque velut euerfa expultrice ob copiam vrinæ immodicam, aut meatu ita cõnuente, ut nihil per eum exire possit. Repleta enim tensaque vesica, quantū ipsa distenditur, tanto meatus eius arctior angustiorque euadit: altera vero, angustia & connientia meatus vrinarii collique vesicæ vel obstruicti à grumo, pure crasso, lapide, topho, tuberculo meatui innato, vel clausi ob tumorem præter naturam, ut phlegmonem, scirrhum, aut alium aliquem mole sua meatum opprimentem, vel multam siccitatem à febribus ardentissimis siccissimisque contractam. Hæc quamquam proprie *ἰσχυρία* dicatur, vulgus tamen medicorum nõ secus *ἰσχυρία* illud quoque symptoma appellat, cum vrina in vesicam omnino non venit renum vitio. Nota tamen est amborum affectuum differentia. Siquidem vera *ἰσχυρία* vesicæ morbus est vrina plenæ: hic autem affectus est renum aut vterum, vacuæque est omni vrina vesica, & nihil omnino in se continet.

**Ἰκτὴρ.** est nomen emplastri, quod sic fit auctore Paulo: etinei, id est sylvestris ficus, tenerum corticem proiecito, ceræ rursus quantum satis est in oleo liquefacio: sic enim *ἰκτὴρ* medicamentum efficitur. Vim habet purgandorum sordidorum vlcerum & inducendi carnem, atque in eum vsum Paulus ipsum adhibet lib. 4. cap. 40.

**Ἰλιά.** salix. est arbor contorto & breui caudice assurgens, ramis longis è trunco extremo velut à capite prodeuntibus, lentis, flexibilibus, foliis longis, subtus incanis, superne virentibus, flore seu nucamento squamatum cõpactili, lanuginoso, propendere, fructu qui facile ante maturitatem euanescat. A quolis letatur, etsi vitam agar ancipitem. Lentissima est & frigidissima. Eius folia, semen, cortex & succus adstringunt & exiccant, citra rosionem: sed cortex paulo siccior est, cuius perustis cinis vehementer desiccant, ut clauos & myrmecias cum aceto extretat.

**Ἰχθυὶν.** squamæ marinæ pellis arida. Potest etiam ferreum vnguem significare, quo in extractione sectioneque foetus vtiuntur, propter squamarum piscis similitudinem.

**Ἰχθυήματα.** dicuntur apud Hippocrat. *ἰχθυήματα*, hoc est corticum fragmenta, libr. *ἀπὸ ἐκτὸς*, quæ etiam ab aliis *πλεκήνια*, hoc est præsegmina, vocantur.

**Ἰχθυόστροφος.** nomen est primæ cyclamini, auctore Dioscor. ut autem scribit Plinius, tertiz: quam sibi monstratam asserit vno omnino folio, radice ramosa, qua pisces necabantur. sic enim è piscium venatu dicta est.

**Ἰχθυόκολλα.** est glutinum piscis qui eodem nomine *ἰχθυόκολλα* appellatur, quod alii ex eius corio, alii ex ventre purant fieri. Dioscorides scribit esse ventrem piscis ceracei: qualis puto est quem vulgus moruam appellat, è cuius glutinosa ventre & corio glutinum fieri inter omnes conuenit. vnde verisimile est piscem illum *ἰχθυόκολλα* fuisse olim dictum.

**Ἰχθυός.** dicitur cutis quæ pedi subiecta est, auctore Galeno comment. 2. in lib. Hippocrat. de fracturis.

**Ἰχθυό.** dicitur tenuis & aquosa humiditas cuiuscunque ea sit facultatis, siue in corpore adhuc contineatur, siue ab vlcere emanet, siue etiā à mortuis corporibus profluat. Habent enim singuli fere humores corporis, sed maxime sanguis, tenuis quādam & aquosus superfluitates eiusdem fere facultatis cum ijs humoribus à quibus proficiuntur. Id quod ex Diocle notum facit Paulus libri 1. capite 100. qui sub æquinocetium vernum *γλυκὴς ἰχθὺς τὸ σπέρμα*, hoc est, dulces sanguinis ichoras: & circa virgiliarum ortum *πικρὴς ἰχθὺς* augeri scribit. Et ex Galeno similiter, qui libr. 6. sanitatis tuendæ sic ait: *ὅτι μὲν γὰρ ἡ μὲν ὅλον τὸ σπέρμα πικρὸν καὶ γλυκὺ, καὶ ἡ μὲν ὅλον τὸ σπέρμα πικρὸν καὶ γλυκὺ, καὶ ἡ μὲν ὅλον τὸ σπέρμα πικρὸν καὶ γλυκὺ, καὶ ἡ μὲν ὅλον τὸ σπέρμα πικρὸν καὶ γλυκὺ.* hoc est, cum enim totius corporis temperamen-

tum biliosius fuerit, venter autem imbecillior, roborare ipsum oportet cibo conuenienti stomacho: qui si nō adfuerit, confluent ichores in ipsum, ijsque vniuersum corpus redūdar. Paulo post: *ἐὰν δὲ μὴ μόνον ἡ κεφαλὴ θερμὴ ἵχθῃς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα*. hoc est, si vero nō solum caput calidos ichoras remittit partibus ventris inferioribus. Rursum de frigidis in hunc modum: *ὅταν ἡ κεφαλὴ ὥς θερμὴ γαστέρα καὶ ἄρρῃσιον εἰς τὴν κεφαλὴν οἱ χυμοὶ ἐκπορεύονται εἰς ἵχθῃς*. hoc est, quoniam si in calidum ventrem influunt ē capite frigidi & pituitosi ichores. Hippoc. etiam l. 4. de ratione victus in morbis acutis, *δριμύτης & χολαδίας ἵχθῃς*, acres & biliosos ichoras, dixit: de quibus Galenus ait: *ὅτι ἡ ἵχθῃς ὀνομαζέται τὰς κεφαλὰς ὑπερθερμὰς, εὐδύλον*. Idem lib. methodi med. 3. *καὶ δὲ καὶ τὰς ἐκείων ἵχθῃς μὲν καλεῖται τὸ λεπτὸν περὶ πλάτος, ῥύπος δὲ, ἑλαφὺς τὸ παχύ*. hoc est, ac in vlcerebus quidem ichor vocatur tenue excrementum: sordēs autē, quod crassius in vlcere est. Præterea Aristot. lib. 3. de hist. animal. *ἵχθῃς* definit esse sanguinem crudum, qui vel nondum concoctus sit, vel in serum versus. A quo non discrepat Galeni sententia, qui lib. 2. de element. *ἵχθῃς* appellat id quod sero lactis responder. Itaque quid *ἵχθῃς* Græcis significet non est dubium, sed quomodo Latine dici debeat pau-

lo magis incertum est: alii serofos humores, alii aquosos, alii tennes, alii vero saniem interpretantur. Cornelius Celsus lib. 5. cap. 26. dicit *ἵχθῃς* sanici speciem esse tenuis, subalbida & ex malo vlcere exeuntis, maximeque vbi neruo laeso inflammatio sequuta est. Ego vero sic dijudicandum cenſeo, vt intra corpus quidem *ἵχθῃς* aquosa vel serofa humiditas, sine sanguinis, siue alterius humoris Latine reddi possit, extra corpus vero saniem verti debere. sic Plinius in afflati iecinoris saniem appellauit, eum humorem significans qui à iecinore, dum affatur, emanat. Itaque apud Galenum tenue in vlcerebus excrementum non absurde sanies exponitur. Et in capitis vitij, quæ *ἄχθῃς* vocantur, *ἵχθῃς* sanies non inepte verti possunt. Dicitur vero etiam *ἵχθῃς* in inanimatis, vt apud Dioscoridem capite de cornu: *ὁ δὲ τῶν χυμῶν φύλλον καλούμενον ἵχθῃς ἀρμύλλης ὡς καὶ χυμῶν κατὰ χεῖρ μένος*. hoc est, sanies, quam virentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur. quo loco non inepte sanies (vt diximus) verti potest, etiam si Plinius eum explicans sudorem verterit, lib. 23. cap. 8.

*ἱάδης*. & ruginosus. vide *ἱός*.

*ἱονία*. dicitur à quibusdam *ἱ χαμαινίης*, id est aiuga.

## IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

### T O K.



*Ἀγκυμῶν*. est lacryma Arabica arboris, myrrhe quodammodo similis & virosi gustus, quæ ad suffitus antiqui utebantur. Actuarij saepe laccam vocat, cum tamen lacca

Dioscoridi gummi sit, & odore careat.

*Κάρυον*. vel est cacalia, vel illi ram similis est, vt sub eodem capite vitramque Galen. comprehenderit in lib. de simplicia. facul. vide *καρύδια*.

*Κάρυον ἱ*

*Κάρυον*. proprie quidem & peculiariter dicitur semen seu fructus rosmarini, cui vis inest repurgandi, discutiendi & calefaciendi. Dicuntur tamen & *καρύωνες* quædam peculiariora parturientis arboris initia, quæ nec fructum nec florem proprie dixeris. Plinius vocat pilulas in medicina vtendi vim habentes: suntque sublonga paniculatum modo nucamenta quæ squamarum compacta propendēt ē ramis, veluti quidam foliorum conceptus, quibus arbores intumescunt grauidæ, germina parere gestientes. Ea vi-

dentur quædam pineæ nucis rudimenta, sed habitu multo longiore turbinantur. Crescunt hyeme, vere dehiscunt in flauescentes squamulas, & prodeunte folio caduca per eunt. Talia in larice, picea, platanō, iuglande, tilia, abiete & alijs permultis videre licet. *τὰς καρύωνες*. plurali numero Galenus interpretatur *πυρρὺς μένος καρύων*, id est tosta hordea. Oribasius libr. collectorum 4. dicit *καρύδια* (sic enim apud eum legitur sine γ) vocari sorbitionem ex hordeo tosto confectam, eamque ita fieri vt in semichenice hemina sex aquæ infuit. sed infirmissimam quidem esse scribit: si vero bis eoquatur vt creper, fieri præstantiorem. Cæterum in melioribus exemplaribus Græcis *καρύον* scriptum semper obseruauimus *ἢ γὰρ γ*, licet plerique sine eo *καρύον* scribant.

*Καδμία*. cadmia. Duplex est, natua & factitia.

Natua fossilis est & gemina reperitur, vna pura & expers metalli, ex qua cum ære mixta orichalcum efficitur (æri enim aureum colorem inducit) altera vero metallica, hoc est metalli fertilis, quam Plinius dicit lapidem esse ærosum, æque ex ea fieri es, quamquam ex ea non æs solum, sed etiam argen-

tum

tum fiat, & interdum æs pariter & argentum. Repertur sæpe in ætariis metallis, sed sæpius in argentariis, atque etiam proprias habet venas. Cadmiæ hanc Galenus se in montibus & riuis Cypri iuxta metallum inuenisse scribit. Color ei niger, aut fuscus, aut cinereus: species similiter formaque diuersa. Nam alia vix similis est, alia testæ, alia ex crustis videtur constare. Factitia vero cadmia in fornacibus perficitur, in quibus excoquuntur metalla. Ea enim materiæ metallicæ pars est, quam interea dum vena excoquitur flammarum & statuum vis egerit. Quanquam autem excoctis venis auri, argenti & plumbi nigri prodeat, tamen optima in ætariis fornacibus fit, & quidem ex pyrite & cadmia fossili, quam metallicam supra vocauimus. Nam ex reliquis æris venis pauca & non bona oritur, adeo vt ex pyrite, in quo inest plumbum nigrum & argentum, melior fiat. Sunt autem huius cadmiæ quatuor species, sed plura nomina. Etenim cum crassa materiæ pars egeritur, ea post diphryges parietibus fornacum insidens, in corpus concreuit. Quæ pars egesta, si multa fuerit, crusta fit crassior: sin pauca, tenuior. Quorū autem vicibus excoctio fit in fornacibus, tot oriuntur crustæ. Quæ cum crassæ concreuerint, fornaces citius erunt purgandæ: cum tennes, tardius. Atque hæc cadmia à Græcis, quibus hæc concretiones crustarū similes visæ sunt, vocata sunt *καλίνης*, quibus zonarium, *ζώνης*: quibus venarum onychis, ob diuersos colores *ὄνυχας*. Nam fracta intus videtur habere cinereas & candidas venas, cum in superficie plerumque sit cœrulea. In iisdem autem fornacum locis humilioribus ex crassa materia fit altera cadmiæ species, quæ quia terrena & dura est, *ἐσπαρμένης* à testa nominatur. At tenuis materiæ pars egesta, propter leuitatem magis in sublime fertur, & altioribus fornacum locis insidet, ibique similiter in corpus concreuit, cuius superficies, quod vuarum speciem gerat, *βοτρυήνης* vocatur. Ea etiam densa est, sed leuior infima, grauior suprema, colore spodio similis, fracta intus cinerem habere & æruginosa esse solet. Postremo vero tenuissima materiæ pars egesta propter maximam leuitatem fertur etiam altius cum fumo, vnde *καλίνης* nuncupatur. Ea est, vt ipse Plinius scribit, in ipso fornacum ore, qua flammæ eluctantur, exusta & similis fauilla. Sic quidem se habent cadmiæ differentię. Cæterum omnis cadmia desiccandi vim habet, sed longè maximam quæ in fornacibus gignitur. Contra vero fossilis maiorem erodendi vim habet, vt vdas fossorum manus & pedes exedat. Est autem omni animalium generi venenum lethale, ea præsertim quam chymistæ sublimaram nominant: siquidem illi cadmiæ perinde atque argentum vinum in sui generis vas imponunt, vt calore ignis in sublime fera-

tur. Inde enim corpus nigrum, vel fuscum, vel cinereum euadit, quod ab illis cadmia sublimata nuncupatur. Fit ex cadmia emplastrum, quod *ὀξυκαδμίας* dicitur, descriptum à Scribonio Largo, optimum ad inducendam cicatricem.

*Καθαίρων*, significat apud Hippocrat. idem quod *τὸ φαρμακικόν*, hoc est, medicamento purgante vacuare: cum tamen simpliciter significare possit detrahere aut repurgare, secundum quam significationem *καθάρσις* & *καθάρσις* dicta sunt.

*Καθάρσις*, detrahitio. hoc nomen ab Hippocrate usurpatum est libr. 6. *ἐν βίβλῳ*. quo loco Galenus scribit euacuationem esse corporis, quæ citra purgationem aut sanguinis missionem facta sit, ac dici quidem magis sole de solidis partibus, interdum vero etiam de humoribus. Itaque in eo manifeste differt *καθάρσις* ἀπὸ τῆς καθάρσεως, quod hæc proprie humorum sit à purgante medicamento, illa autem carnis præsertim & adipis, & ex consequenti succorum in corpore redundantium facta ab exercitatione, inedia, vigiliis & aliis eiusmodi quæ molem corporibus detrahare possunt.

*Καθάρσις φάρμακα*, sunt medicamenta quæ carnem supercrescentem tollunt, eamque ad modum statumque naturalem reducunt. Ea genere quidem & facultate *συνέχου*, hoc est putrefacientia, sunt, sed multo tamen iis imbecilliora. Siquidem extimam modo superficiem quam contigerint, detrahunt: in altum vero subire & penitus ferri nō possunt, mediam inter ea quæ valenter detergent & cicatricem inducunt fortiori conditionem. Huius generis est Asia petra flos, testacea omnia vsta, vterque herinaceus cum toto corpore exustus, diphryges, flos æris, & æs vstu non lotum.

*Καθαροί νοσοῦντες*, *ὅτι σποδρὸς ἀποδύμενοι*, hoc est, qui vehementer sentiunt, apud Hippocrat. sicut Galenus explicat *ἀπὸ τῆς γλῶσσης*, siue *ταπεινόμενοι*, hoc est perturbati, vt idem annotauit comment. in Prorrhet.

*Καθάρσις*, purgatio. Geminam habet apud Hippocratē & medicos significationem. vnam generalem, quæ dicitur esse humorū qui sua qualitate molesti sunt, vacuatio, vt definit Galenus comment. in aphor. 3. libr. 1. Sic purgationis nomine omnis vacuatio humoris designatur non à medicamenti modo, sed à natura etiam facta, vt Galenus annotauit comment. 4. in libr. 6. epid. Thucydides vero etiam vacuationes, quæ à natura symptomatice fiunt, morbi ratione *καθάρσις* atque *ἀνοκαθάρσις* appellauit. Cum vero purgatio simpliciter dicitur esse vacuatio vitiosi humoris, nec locus per quem eiusmodi vacuatio fit, designatur, non ea tantum quæ per aluum fit, sed etiam quæ per vomitum, per vias, per sudorem, per russim efficitur, purgationis nomine intelligi potest. Quam credo rationem sequutus Hippocrat. vacuationem eam quæ pleu-



riticis per spura fit, καὶ πρὸς δὲ ἀναγκάσαν ἀpellare consuevit, vt docet Gal. comment. in aphor. 8. lib. 5. & præter eū veteres quoque vacuationem eam quæ tumi mēstruo circuitu mulieribus peragitur, tum quæ partui succedit, non solum ἐκμυστὸν αἵματος & κίσησιν, verum etiam ἐκτάρσιν nūcupariunt, vt annotauit Galen: libr. de atra bile, & comment. 3. in l. 3. epid. Quāquam mēstruam illam purgationem plurali numero κατάρσιν frequentius videatur Hippocrates dicere, vt aphor. 60. & 61. lib. 5. Sic autem veteribus libuit appellare, propterea quod meliorem sanguinis partem fortius attrahens & absorbens, deteriore relinquit, quæ cum postea vacuetur, quia vitio non caret, merito purgari dicitur. Purgationem enim, vt author est Galenus, vocat Hippocrates, humorum vitiosorum vacuationem. Altera vero purgationis significatio particularis est magisque propria, quæ definiri potest esse humoris vitiosi per medicamentum vacuatio. Hæc proprie ab Hippocrate dicta est φαρμακεία, vt scripsit Gal. comment. in hunc aphorismum: οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακείᾳ ἐκτάρσιν. hoc est, qui bene corpore se habent, difficulter ferunt medicationes. fit enim ope purgantis medicamenti. Sic etiam visum est Aristoteli problemate 42. sect. 1. his verbis: τὰ φάρμακα ὅταν εἰς τὴν κοιλίαν εἰσέλθωσι ἐκ τῆς γαστρὸς, φέρονται καὶ οὐκ αἶψά ἢ ἐξ ὧν πρῶτος εἰς τὰς φλέβας ἢ περὶ τὰς δὲ, ἀλλὰ κρατῖσται, ἐκπῆναι φέρονται ἐμπόδια αὐτῶν καὶ χαλεπὰ τῶν κέντρων. hoc est, medicamenta quando in ventrem ingressa sunt & diffusa, feruntur in venas per eodem meatus, per quos etiam alimentum fertur. quæ si concoctionem non fuerint adepta, sed eam euicerint, tollunt ea quæ sibi sunt impedimento. atque id purgatio appellatur. Cuius quidem purgationis duplex potissimum differentia habetur, vna per superiora, altera per inferiora. Per hæc quamuis præcipue alui deiectio intelligatur, attamen & vrinæ & mēstruorum per medicamenta prouocatio designari potest, quod per eas partes non minus quam per aluum medicamenta humores attrahant & euacuent: per illam vero vomitus significatur. De his multa apud Hippocr. tum lib. 7. de diffinitionibus, tum primis fere aphorismis libr. 4. Rursum autē harum vacuationum vtrumque genus duplex est: nam vel ex vniuerso corpore, vel ex certa quadam parte purgatio ipsa procedit. Omne certe medicamento purgante peragitur. Cuius cum sit etiam triplex differentia (totidem namque sunt noxiorum humorum species) triplices quoque purgationes erunt, vna quæ bilem flauam, altera quæ bilem atram, tertia quæ pituitam euacuat. Quod qua ratione fiat, vide in deiectione κατάρσιν φάρμακον.

Κατάρσιν φάρμακον. purgans medicamentum. Duobus modis dicitur, vno omnium communi quæ quouis modo excrementa expurgans: altero, quæ κατ' ἐξέχοντα significat

quæ aut per vomitum, aut per alui deiectionem purgant. Illa indefinita & communi quadam facultate, & primis aliquando qualitatibus, vel per accidens etiam plerumque purgant: hæc vero per se, quia talia sunt, & facultate familiarium succorum attractrice. Primi generis sunt quæcunque vel calfaciendo, vel humectando, vel crassa lentaque extenuando & obstructa soluendo vrinam mensesque mouent, aut ex pectore spura eliciunt, aut aliud aliunde vacuat: secundi vero, quæ trahendi facultate vacuationem mouliunt siue per aluum, siue per vomitum, siue per vrinas, siue per vterum, seu alia quauis ex parte. Quæ enim vrinas mensesque mouent, aut spura, tum quæ naribus purgandi gratia infunduntur, aut ore colluuntur, aut dentibus maduntur, si trahendi humoris vitiosi facultatem possident, eaque vacuationem perficiant, eiusdem sunt generis cum ijs quæ per vomitum aut per alui deiectionem trahendo purgant. Purgantis namque medicamenti essentia naturaque in familiarium succorum attractione consistit, quam à totius substantiæ similitudine infit, etque familiaritate adeptum est. Medicamentum enim (vt scribit Hippocrates) cum in corpus fuerit ingressum, primum quod omnium maxime sibi natura respōdet atque simile est, deducit, deinde alia quoque trahit & purgat, in modum seminum & stirpium. Quæ vis cum purganti medicamento potestate insit, non exercitur tamen, neque in actum erumpit, priusquam à calore nostro excitetur. Dum enim ventriculi calore medicamentum teritur & calefit, eius facultas prius quasi sopita excitatur, viresque suas exercit, humorem eum attrahens qui sibi familiaritate substantiæ coniunctus est. Quare cum tres sint in hominum corporibus humorum differentiæ, ita medicamenta purgantia genere triplicia perhibentur, φλεγμασώδη, χολασώδη, μελασώδη, pro facultatibus quas habent trahendi pituitam aut bilem, tum flauam, tum atram: quāquam pleraque medicamenta habentur quæ non vnius modo, sed duorum atque etiam plurium trahendorum facultatem possident.

Κατεχὼν δύναμις. retentrix facultas, Est vis quædam nature per quam tamdiu retinet attractum alimentum, donec perfecte concoctum sit. Subseruit facultas ista concoctioni, nihilque omnino coqui potest, nisi quod exacte retentum fuerit. Quod dixi exacte, & tempus & modum designat. Debet enim id quod coquitur, tanto tempore retineri, quanto concoctio peragitur: & præterea tam arcte à concoctionis organis comprehendendi, vt nullum spatium vacuum relinquatur. Quamobrem ventriculus cibum optime concocturus eum debet omni ex parte ita complecti, vt nullo modo fluctuare possit, nullumque omnino spatium inter ipsum cibumque intercedat. Atque id reuera ventriculus toto concoctionis tempore præstat, vt qui

qui nō modo toto suo corpore cibus incum-  
bit, verum etiam ora sua sic occludit, vt nihil  
omnino per ea elabi sinat, nisi vel copia, vel  
flatibus, vel mala aliqua qualitate ea reclu-  
dere cōpellatur. Nec solus quidem vētricu-  
lus ea retinendi facultate pollet, sed omnes  
pariter corporis partes in quibus aliquid vel  
concoqui, vel aliter perfici debet, veluti ve-  
næ, iecur, habitus denique totius corporis,  
vbi tum chylum, tum sanguinem concoqui  
oportet atque alterari, adhæc vterus cui fœ-  
tus perficiendi munus, quod cōcoctio quæ-  
dam est, natura delegauit. Cæterum ea fun-  
ctio, in omnibus retinendi facultate prædi-  
tis partibus, fibrarum obliquarum ministe-  
rio perficitur, quarum proprium est retine-  
re, sicut rectarum attrahere, & transuersa-  
rum expellere, quanquam istis quoque plu-  
rimum adiunetur.

**Καθῆσθαι.** constans. quod suam naturam con-  
stanter seruat, & non immutatur. Dicitur  
ab Hippocrate de anni temporibus, vt κα-  
θῆσθαι καὶ χρόνος, anni tempus quod ordinatē tem-  
periem suam seruat. & καθῆσθαι ἐνιαυτός, annus  
bene ordinatus & constans, in quo signa  
quæ syderum ortus & occasus consequi so-  
lent, recte procedunt: autumnus pluui-  
osus est, hyems mediocris, nec valde serena,  
nec supra modum frigida, pluuiæque vere  
& æstate tempestiue descendunt: talis au-  
tem annus vt constans est, sic futurus est sa-  
luberrimus. Contra autem ἀκατάστατος dici-  
tur, quod in aliquo à constantis natura euar-  
iat. Nec vero dubium est quin de morbis  
etiam καθῆσθαι dici possit, quos εὐσταθίας Hip-  
pocrates appellauit.

**Καθετήρ.** catheter. Est instrumentum chirurgi-  
cum cauum & altera parte recuruum, quo  
vrina retenta elicitur & vesicæ vitia proban-  
tur. dicitur ἀπὸ τοῦ καθίσταται, id est, ab immit-  
tendo siue infundendo, quod eo instru-  
mento in vesicam injici solent quæ injice-  
re expediat, sicut Galen. tradit libr. 5. meth.  
med. quo loco καθητήρας εὐδυστήριους dicit. Cæ-  
terum καθετήρ ab Hippocrate non pro eo in-  
strumento vsurpatur, sed pro linamento tor-  
to quod intra vlcera inditur, vt Galenus ἐν  
γλάντης annotauit.

**Καθετήριος.** est administrationis chirurgicæ  
ratio qua injicimus per catheterem in vesi-  
cam id quod ad eius curationem conuenit:  
vel eximimus id quod impedit ne vrina red-  
datur, siue concretus intus sanguis sit, siue  
calculus, siue aliud quippiam, recto siphone  
immisso, quem Græci καθητήρ vocant.

**Καθάρσις.** appellatur fascia oblonga, quæ ca-  
pitis totum vinculum quod περιπλάσσειον  
dicitur, continet, & prohibet ne ipsum  
vinculum diducatur. Author Galen. lib. de  
fasciis.

**Καθημερινός πυρετός.** dicta est (inquit Galen. lib. 2.  
de differ. febr. cap. 7.) à quibusdam medicis  
recentioribus febris quotidiana, quæ nul-  
lam habet intermissionem, ad differentiam  
τῆς ἀμφομερῆς quæ quotidiana est intermit-

tens. Veruntamen apud nullum, vt idem  
ait, idoneum authorem verbum hoc καθη-  
μερινός reperitur, sed omnes quod singulis  
diebus eodem modo fit, ἀμφομερῶν appel-  
lant. Itaq; eiusmodi quotidianam nō inter-  
mittentem Galenus ἀμφομερῶν συνεχῆ appel-  
lat, non καθημερινόν.

**Καὶρός.** occasio & opportunitas rei cuiuslibet a-  
gendæ, quo modo apud Hippocr. καὶρός ὁξὺς  
dictus est. Significat & apud eundē τὸ προσω-  
πικόν, vt cum ἐν τῇ πρὸς διαίτης ὁξείαν scribit καὶρόδ  
μᾶλλον, ἀπὸ τῆς μᾶλλον τῆς προσωπικόντος. quod fami-  
liare esse Hippocrati, Gal. eo loco annota-  
uit, atque ab eodem interdum etiam vsur-  
pari ἀπὸ τῆς ὠφέλειας.

**Καὶρός.** tempus. Dicitur proprie pars anni, quæ  
& ὥρα vocatur, de qua suo loco agemus. Di-  
citur & in morbis, spatium id temporis quo  
infiges in ijs mutationes fiunt. Habent  
enim & morbi sua tempora, à temporibus  
anni & ætatibus non valde dissentanea, in-  
signioribus, vt & illa, mutationibus distin-  
cta, quæ quadruplices à medicis annotan-  
tur, à quibus totidem morborum tempo-  
ra statuuntur, ἀρχή, principium: αὐξησις, au-  
gmentum siue incrementum, quod & ἀνά-  
στασις & ἐπιδοσις vocatur: ἀσκή, vigor seu sta-  
tus: καθῆσις, declinatio. Hæc quatuor tem-  
pora non modo in vniuerso morbo, sed in  
singulis etiam totius morbi accessionibus  
spectantur: illa vniuersalia, hæc particularia  
appellantur. Non est autem ea facile in sin-  
gulis morbis definire, quia pro morborum,  
causarum, symptomatum, naturæ, virium &  
reliquarum circumstantiarum varietate va-  
riis quoque spatiis signisque distinguuntur.  
Summatim quidem & in genere circum-  
scribi possunt, vt principium dicatur primus  
morbi motus: incrementum tempus id quo  
non modo ipse morbus, verum eius etiam  
symptomata grauiora fiunt: status autem in  
quo ea quodammodo consistunt, neque au-  
gescunt, neq; se remittentia: declinatio ve-  
ro cum primum decretere incipiunt, donec  
morbus ex toto desierit. Particularim vero  
in singulis morbis cuiusque horum exordi-  
um finemque exprimere, & certos limites  
assignare non est facile, sed aliquot forte ex-  
empla hic proponere sufficiet, ex quibus ad  
reliquorum cognitionem veluti manu du-  
camur. Primum autem à febris defuma-  
tur, in quibus plerique omnes, propter ea-  
rum frequentiam, magis exercitati viden-  
tur, & in ijs temporum istorum differentias  
ex Galeni præcepto distinguamus. Ille ergo  
cum ea signis maxime cruditatis & conco-  
ctionis distingui scribat, febris principium  
est, quamdiu humor febrem paries, crudus  
est: incrementum est, vbi ille concoqui cœ-  
perit: cum maxime cōcoquitur, & in eo na-  
tura valde laborat, status seu vigor est, tem-  
pus totius morbi vehementissimum: decli-  
natio autem quando iam symptomata im-  
minui, morbi que causæ miscere incipiunt.  
Itaque concoctio humorum obscura, prin-

cipium: manifesta, incrementum: perfecta, statum: reditus ad naturalem habitum, declinationem distinguit, & propriis veluti limitibus determinat. Huius autem concoctionis propria signa, si quidem in vasis fiat, ex urinis: si in ventriculo, ex deiectionibus: si in thorace aut pulmonibus, ex sputis sumenda. Sic quidem febris tempora distinguuntur. Ad eundem vero modum aliorum etiam morborum tempora siue illi in interperie, siue in incommodatione, siue in continui solutione consistant, signis cuique propriis distinguere debent. Phlegmones enim principium est quamdiu pars inflammata sanguine repletur: incrementum, cum fluxio cessare, & sanguis in carnem effusus putrescere, indeque calor accendi, humor fundi, & pars, etiam si nihil amplius influat, distendi coeperit: vigor, dum pus conficitur, & pulsatio, dolor, febris, ceteraque symptomata summa sunt: declinatio vero cum pus effluit, aut digesto sanguine qui eo confluerat, tensio minuitur & tumor incipit subsidere. Sic ophthalmiae principium est, cum defluit in oculum humor copiosus, tenuis, incoctus: incrementum, cum idem paucus, crassior, & initium quoddam concoctionis adeptus est: vigor, cum ille adhuc parcius est & crassior, & iam palpebras per somnum conglutinat: declinatio, cum nihil fere eius humoris superest. Ulceris similiter principium sanies aquosa, tenuis & incocta ex eo manans: incrementum eadem parcius crassiorque: vigorem pus tenue: declinationem pus album, crassum & paucum definit. Catarrhi à cerebro per palatum & nares principium est quamdiu humor multus, aquosus, tenuis, acer distillat: eiusmodi enim maxime crudus est: incrementum, cum & copia, & crassities & acrimonia minor est: vigor, cum eadem magis cocta & meliora: declinatio vero quando perfecte concocta & optima videntur. Ex ijs patet cruditatis & concoctionis signis quae ab humorum qualitate & copia petuntur, quatuor illa tempora ab invicem distinguere: non in omnibus quidem morbis, sed ijs maxime qui à natura vincuntur. Hi namque soli quatuor ista temporum spatia emetiuntur, cum exitiales interdum in principio, saepe in augmento, saepissime in summo vigore aegros à medio tollant, quod nunquam in declinatione (quae morborum non lethaliū propria est) contingit. Ea nec certo dierum numero definiri possunt, nec semper inter se sunt aequalia, siue in morbis genere diuersis (sunt namque in breuibis & acutis morbis breviora quam in diuturnis) siue in ijs quae sunt eiusdem generis, ut in duabus tertianis, siue in vno & simplici morbo consideremus. Aliorum enim principium longum est, cetera brevia, contra aliorum declinatio longissima videtur, interdum incrementum, alias vero summus vigor aut ex ijs plura, cum reliqua multo minus diuturna fuerint. Vt autem totus morbus, sic & sin-

gulæ morborum accessiones quatuor ista percurrunt tempora, quorum & cognitionis & longitudinis ratio eodem prorsus modo in eunda est, quae ante in vniuerso morbo proposuimus. Ea exemplo à tertiana febre sumpto satis erit ob oculos ponere. Ergo principium accessionis tertianae est cum quis primum inhorruit, riguit, refrigit, oscitavit, pædiculatus est, coepitque omnino corpore commoueri, & à naturali habitu recedere: tunc autem arteria contrahitur & sanguis cum calore & spiritu ad interiora se recipit, pulsusque ob id durior minorque fit. Postea incrementum est calore sese exerente & per corporis habitum diffuso, ex quo pulsus maior, velocior frequentiorque euadit. Inde succedit summus vigor accessionis, tãdiu duraturus quãdiu calor eadẽ magnitudine & æqualis perseuerabit, pulsusque, quantum sensu indicari potest, æque magnus, velox & frequens manebit. Vbi autem decrescere calor videbitur pulsusque in melius verti, declinatio est cui finem halitus fuliginosi per cutem erumpentes, vel sudores, vel aliae excretiones imponunt. Hæc quidem accessionum tempora in febribus intermittentibus calore & pulsibus maxime definiuntur, verum in continuis quæ accessiones habet, etiam si eadem tempora habeantur, & proportionem quadam intermittentium febrium temporibus respondeant, eademque ratione distinguere debent, multo tamen sunt obscuriora, ut saepe principium cum incremento coeat & confundatur: vigor tamen semper adest & declinatio quæ perdurat usque ad principium sequentis accessionis.

*Κακὴ γλῶττις κακοήγηστος*, maledicentia & prociacitas, apud Hippocrat.

*Κακὴ λῆρα*, est herba foliis grandibus & albis, è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem. Nasitur in montibus, alio nomine λεοντινὴ dicitur. Galenus κακὴ λῆρα vocauit, aut tam similem τῇ κακὴ λῆρῃ putauit, ut vtramque coniungeret, nec sibi de vtraque seorsum dicendum esse videretur: Paulus non κακὴ λῆρα vocat, sed τῇ κακὴ λῆρῃ similem facit. Et substantiæ crassæ, emplasticæ & modice exiccantis.

*Κακὸν δὲ*, apud Hippocrat. τὸ κακὸν δὲ

*Κακὸν δὲ*, malignum. Id dicitur quod à simpliciū morborum consuetudine alienum, non facile curationem admittit. Siquidem τῇ κακὴ λῆρῃ Galen. lib. 1. cap. 3. de crilibus opponit τὸ ἀπὸ τοῦ: quod & ἐν δὲ ab Hippocrate dici idem multis locis prodidit. Itaque ut simplex morbus causam habet simplicem & facilem, & symptomata non valde à morborum eiusdem generis more abhorrentia, & curationem non valde difficilem: sic κακὸν δὲ habet malignam causam & multo deteriora symptomata, quam pro morbi specie, atque curationem similiter difficiliore. Sunt autem hæc duæ differentiæ in omnibus prope morborum generibus, exceptis ephemeris

menis febribus, & aliis quibusdam eiusmodi affectibus, in quibus nō potest esse κακότης, quin transeant in aliam morbi speciem, præsertim vero in iis qui habent originem à putrilagine quadam & venenosa qualitate. Verum hæc κακότης in vlcēribus maxime spectatur, quæ κακότης tūc appellantur, cum tanta καχέια partem exulceratam occupauit, vt bonum etiam alimentum quod in eā influit corrumpatur. Neque enim omnis humor putris & vitiosus inducit πτωχικότητα, sed is potius quem ἡ καχέια deprauauit atque corrumpit.

Κακόνια, dicti sunt ab Hippocrate οἱ ὀρθοὶ ἐλεπτοί, hoc est, alii sine affectu & tenuēs: vt scribit Erotianus, cum tamen Epiclēs μικροὺς καὶ εὐμεγέθεις, hoc est, magnos, interpretatus sit.

Κακὸν ῥυθμὸς σφυγμῶν, pulsus qui & ἄρρυθμος dicitur, de quo vide suo loco.

Κακοσιπτότα, ὁ πτωχικότητα, hoc est, nocentissima, apud Hippocr.

Κακὸς μαχά, alimentā quæ vel stomachus respuit vel stomachum offendunt. Celsus à stomacho aliena dixit: cuiusmodi scribit esse omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, omnia prædulcia, omnia pinguiā, item omnia quæ inflare consueuerunt, atque alia quæ inter coquendum ventriculo negotium facessunt, etiam si ex his non nisi probus succus dimanet. Ex quibus intelligi potest non quicquid boni succi est, proutinus stomacho conuenire: neque quicquid stomacho conuenit, proutinus boni succi esse. Opposita illis sunt καὶ ἐνόςμαχα.

Κακόχυμα, dicuntur alimenta mali succi. Ea sunt quæ sanguinem vel pituitosum, vel biliosum, vel melancholicum, aut alio quouis modo vitiosum gignunt. Inter quæ Celsus lib. 2. recenset omnia legumina, carnem omnem permacram, salam: pisces quoque saxatiles omnesque qui ex tenerissimo genere sunt, aut eos qui rursus nimium duri virosique sunt: item omnia salsa, acrida, acida, acerbā. De quibus etiam apud Galenum apertius in lib. de alimentorum facult. & lib. de euchym. & cacochym.

Κακοχμία, est redundantia vitiosi humoris in toto corpore. Oportet autem vnum aliquem esse malum humorem qui redundat: quoniam si pariter omnes redundarent, iam non κακοχμία, sed πλεθώρα esset. Hæc enim est copia omnium humorum æquabilis, illa vero, certi cuiusdam humoris vel ferosi, vel biliosi, vel melancholici, qui vna cum sanguine mistus efficit vt iam non amplius sanguis, sed sanguis ferofus, vel biliosus, vel melancholicus appelletur. Gignitur autem duobus modis: aliis quidem ex bilioso cibo, aliis vero ex quapiam in ipso corpore corruptela & putredine siue cachexia. Est vero permultorum morborum causa. Huius tollendæ ratio præcipua est per purgationem, sicut plethora misso potissimum sanguine curari debet.

Κάκτος, cardui genus est, quod statim ab radice caules repentes in tetram mittit, folio lato atque spinoso: castos caules eos appellant. Peculiarem cacton fuisse Siciliz Theophrastus prodidit, sed inde nunc non modo in vniuersam Italiam, verum etiam in Galliam dimanauit propter magnam saporis suauitatem. Scolymos alio nomine dicitur & cinaara.

Καλαδιανή, munus autumnii: violæ cæteræ, veris. Ea minuto est folio, violæ albæ non dissimili, in totum sine odore, calathi similitudine. ancholias Galli vocant.

Καλαμὸν κατήμα, est fracturæ ossis differentia, quæ & εἰς ὄνυχια dicitur. vide in dictione κατήμα.

Καλαμίνθη, calamintha. Herba est trium generum apud Dioscoridem. Vna montes plus amat, foliis ocimi candicantibus, surculis angulosis, flore purpureo, quam nunc officinæ calamentum vocant. Altera pulegio similis, quam ob id aliqui syluestre pulegium vocant, quoniam odorem eius æmuletur, aliqui vero nepetam. Tertia menthastri similitudine, longioribus foliis, caule & ramis quam superiora maioribus, quæ nunc officinis nepetā dicitur, & vulgo herba catiorum. Est autem calamintha calida & sicca, vtrumque tertio ordine. Tenui est essentia, acris & amarā. Ex ea medicamentum ἐξ ὑπόρον fit, quod ὁστὶ καλαμίνθης, dicitur & à quibusdam πικρὸν, id est, annosum, appellatur. Id in vniuersum corpus vsque ad cutem ipsam digeritur ac distribuitur, proindeque iis conuenit quibus crudorum humorum copia in solidis animalis partibus consistit. Huius compositionem & vires Galenus lib. 4. sanitatis tuendæ multis verbis persequitur, similiter & Aetius lib. 9. agens de cruditate.

Κάλαμος, arundo. frutex est aquaticus, caule geniculato, tereti ac fistuloso, in leue fastigium cacuminato, circa quod densius excrescit tomentum, foliis ex articulis alterno laterum gradu emergentibus. Gallis canna dicitur. Plures eius differentię traduntur à Dioscor. alius namq; κάλαμος βατός, id est, solidus factusque dicitur, quod toto internodio concretus sit & plenus, qui & alio nomine à Theophrasto πηχὺς dicitur, quod ex eo sagittæ factitari soleant: alius ἥλιος, id est, femina, quod tibiæ ligulas veteres componebant: alius περιήλιος, quia fistulis esset vtilissimus: alius κύμπερος siue δοναξ, crassus, concavus, apud annes nascens: alius φραχμίτης, id est, vallatorius, gracilis & candidans.

Κάλαμος ὑματικός, calamus seu iuncus odoratus, arundini similis est aspectu, nempe multis geniculatus nodis, fuluus, cætero tactu mollis, & cum frangitur scissilis, intus arenosus, casæ gustu, fragrantissimo odore, adeo vt locum in quo nascitur ingredienti spiritus suauissimus statim aspiret. Is est qui ab Hippocrate dicitur μωρεψικός, id est, vn-

guentarius, à Plutarcho Arabicus, à Cello Alexandrinus. Omnes officinæ calamum appellant. Leuiculam quandam adstrictionem & minimam acrimoniam possidet. magna ex parte essentia eius terrena est & aerea, in caliditatis frigiditatisque coniugatione temperata.

**Καλαύθρον.** sic dicta est ἡ ἀδάρων, quasi arundinum lanugo, quod in arundinibus concretæ lanuginis modo inueniatur. vide ἀδάρων.

**Καλέριον.** sic dictum fuisse à quibusdam τὸ κελύρον, hoc est, lilium, habetur apud Dioscoridem.

**Κάλλισ.** sic dictum fuisse à quibusdam τὸν καλλιστήριον, Dioscor. author est.

**Καλλίας.** à quibusdam dicitur ἡ ἀρσενίς, vt habetur apud Dioscor.

**Καμβέλαρον.** dicitur medicamentum quod ad ornatum & venustatem palpebrarum facit. Itaque cum pluribus modis deformari palpebræ possint, patet non vnum esse genus τὸ καμβέλαρον. Nam vel nimium piluli excrescunt vel decidunt, vel malo colore aut ordine proueniunt. Quæ tamen omnia cum ab vna fere prima causa excidentur, humore scilicet redundante: excrescunt enim nimio, decidunt vt plurimum ab acri, candidi sunt à pituitoso, rufi ab humore congenere: ideo τὸ καμβέλαρον magna ex parte constant medicamenti mediocriter deficcantibus & absumentibus humorem pilos vitiantem. Eo enim summoto natura ad proprias redit actiones, & pilos satis venustos per se producit. In eiusmodi medicamentorum genere est armeniacum, terra ampelitis, fuligo thuris, stibium, plumbumque ysta, squama ætis & reliqua huiusmodi facultate siccante & acrimonia prædita. Marcellus Dioscoridis interpretes καμβέλαρον inquit vnica appellatione & malorum remedia & formæ lenocinium in palpebris Græcos appellasse, ideoque Plinium quale erat malum in quo remedio opus esset, sic eam vocem varie vertisse, modo glutinandis, modo replicandis, modo honestandis, modo circumliniendis palpebris dicentem. Hermolaus vero & Ruellius circumlitiones dicunt, quibus palpebras ornat, coloremque mentiuntur.

**Καμβάλα.** olca satiuæ. sicut syhiestris ἀρχιδάλα dicitur.

**Καμίνερος.** dictum est cœnumgræcum ab eo qui ἀντιμαλινός descripsit remedium ad caluescentes præter naturam lib. 1. τὸ καμίνερος, vt Galenus eo loco explicat.

**Καμίνεας.** idem quod τὸ καμίνεας.

**Καμίντερον.** species est adianti, sed candidioris maiorisque tum foliis tum frutice, vt iure videri possit trichomanes. Id quod apparet ex Plinio lib. 2 cap. 21. qui duo adianti genera faciens, candidius & nigrum breuiusque, maius polytrichum: alterum trichomanes vocari tradit, & rursus libri 25. capite 1. r. polytrichum à callicricho distare scribit, quod iuncos albos habeat, & folia plura

maioraque, & fruticem item maiorem. Dicitur καμίντερον quod tingat capillos, eosque speciosiores reddat.

**Καμίνουλον.** dicitur ab Hippocr. καμίντερον δὲ ἀδάρων, vt annotat Gal. ἐν ταῖς γλώσσαις.

**Κάλυξ.** folliculus. Sic dicitur omne putamen in quo aliquid includitur: proprie vero rosa tumens, nondum expansis foliis.

κάλυξ, etiam dicitur à quibusdam ἡ ἀρχαῖος οὐόκρεα.

**Κάλυξ.** herbæ quoddam genus qua tingitur purpurea.

**Καμάρα.** locus est ad auriculæ cauum camera: atque inde sic dictus.

**Κάματος.** sic dictum est à quibusdam τὸ δελφίνιον, vt habetur apud Dioscor.

**Καμάρομα.** ἡ

**Καμάροσι.** est fractura cranii, in qua os fractum cameræ modo vtrinque exurgit. Paulus lib. 6. cap. 90. dicit esse caluariæ diuisionem in qua os affectum in sublime tollitur: vel ex Galeni sententia, ossis ad interna recessum & excavationem, quemadmodum in ecpiemate: sic enim Galenum existimasse Paulus scripsit. Hæc quidem Paulus τὸ καμάροσι satis obscure prodidit, quod videatur contraria scribere, & dicere καμάροσι à Galeno vocari ossis ad interna recessum, cum tamen idem in camaromate partem exaltari dicat. Locus Galeni habetur lib. 6. methodi med. ad hunc modum: ἐγγιστόματι dicuntur quæ in medio sui membrana innituntur: καμάρομα vero, quæ eandem ipsam partem exaltatam habent. Cæterum qua primum ab integris fracturæ partibus diduci ægra cœpit, intro magis recedunt ac membrana innituntur. Hæc Galenus: ex quibus apparet in camaromate ossis fracti extrema intus ad membranam vsque ferri & deorsum tendere, adeo vt ipsi membrana innitantur: reliquam vero vtrinque adiacentem ossis partem in altum attolli & à subiecta membrana recedere, & proinde in camaromate geminam esse ossis eminentiam ad vulneris latera sitam. Vidius comment. in lib. de vulneribus capitis fingit sibi vulnus quod καμάροσι appellat, in quo pars fracta & ad interna recedat & postea attollatur, scribens euenire interdum vt os quod fractum deorsum compellitur simul cum telo fursum reuertatur attollaturque, atque id malum auctore Galeno καμάροσι vocari.

**Κάμματος.** ἡ

**Κάμμος.** nomina sunt τὸ ἀκόνιτι. Ac cammori quidem cognomé manifestum est: sic enim recte dicitur acónitum, quod radicem modicam, inflexam & cammaro siue squillæ marinæ (est autem quædam cancrorum species) similem habeat. Id quod Dioscorides tertium acóniti genus facit. Verum τὸ καμμός appellatio non tam est vsitata apud authores veteres, nisi forte apud Nicandrum ἐν ταῖς ἀλκιφάρμακας, quo loco omnia eius exemplaria κάμμορον scriptum habent: quibus



**Xanthos**, est trabs quæ ab vna columna in alteram transfuersum pertingit. apud Hippocr. lib. de articulis.

Καρδιαρχία, dicitur à quibusdam τὸ καρδίας

ut habetur apud Dioscorid. ab aliis vero lepidium sylvestre. quod radix ei sit odore nasturcii: vel, ut apud Dioscor. legitur, radices binas habeat nasturcio similes.

**Καρδαμύνη.** dicitur à quibusdam *καρδαμύνη*, ut Gal. ait, quoniam cardamō, hoc est, nasturcio, simile quiddam gustu præ se ferat. dicitur & eodem nomine herba *καρδαμύνη* siue *λεπιδίον*, quod cardami, hoc est, nasturcii, odore, sapore & figura sit, ut scribit Aetius lib. 12. cap. 2.

**Καρδαμύνη.** nasturcium. Est herba coliculis sesquipedali, longe statim ab radice minorum foliorum pediculo, floribus, albis, femine per ramorum latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore: vulgus gallitum cretensem appellat. Huius semen vim habet adurendi, valenter crassos suecos incidit. Caput tentare & ferire dicitur, atque ex eo *καρδαμύνη* dictum quasi *καρπιδίον*.

**Καρδαμύνη.** palpebras assidue mouere & claudere, oculis nictare. proprium Atticorum vocabulum est, usurpatum ab Hippocrate. Sumptum à nasturcio est, quod *καρδαμύνη* dicitur, quō si quis utatur, assidue oculis conuiuet. dicitur & *καρδαμύνη*. Auctor Erotianus.

**Καρδαμύνη.** est frutex amomo non dissimilis, odoratus, oblongo semine & anguloso: optimum quod non facile tetitur, sacrum, oculisum, odore nares feriens, gustu acris & subamaro. Plura eius traduntur genera, vnumque eorum esse quod grahūm paradisi officinae vocant. Est cardamomon facultatis admodum calidae, sed adiunctam habet quandam amaritudinem qua deterget & lumbricos interficit.

**Καρδαμύνη.** etiam dici à quibusdam *καρδαμύνη*, Dioscorides auctor est.

**Καρδιά.** cor. Est viscus carne dura, fibrosa, caua constans, principium vitalis facultatis. Sunt qui musculum esse definierint, verum & minus rubet quam musculus, & longe durius, spissius solidiusque est, multoque aliter fibris intertextum: fibris namque validis & rectis caro eius circumfusa est (unde & *καρδιόμορφη*, nomine aliis quoque visceribus communi, ab Erasistrato appellatur) à basi ipsius in mucronem tendentibus. Habet præterea & transuersas, in eas ad angulum rectum incidentes, & aliquas earum medias. Ac rectis quidem per diastolas & venam caua sanguinem per arteriam venosam attrahit: transuersis autem per systolas in venam arteriosam & arteriam magnam expellit, fuliginosumque pariter excrementum in arteriam venosam: obliquis vero per quietes inter diastolen systolenque medias sanguine ex vena caua in ventriculum dextrum, & spiritu ex arteria venosa in sinistrum attracto retentoque perfruitur. Sunt namque cordi duo ventriculi seu sinus, *καρδία* Græcis dicti, carnis ipsius portione media cœu diaphragmate quodam distincti. Dexter multo amplior est, carne &

parciore & molliore circumseptus: sinister vero multo angustior, ut qui carne tum largiore tum densiore continetur. Vtriq; autem sua est auris nervosa, cana, ad ora vasorum materias in cor immittentium affixa, in quibus veluti in penur quodam sanguis & aer recondita sunt. Has Græci *αἰσθητήρες* appellant. Habet etiam uterque sua vasa, dexter quidem venam tum caua tum arteriosam, sinister autem arteriam tam magnam quam venosam, in quorum vasorum orificiis cœra quædam sunt membranarum epiphyse, quarum alie foris orae introsum feruntur (cuiusmodi tres habentur in vena caua orificio, duæ autem in arteria venosa, omnes inæquales & veluti lacerae) acri atque sanguini in cor immittendo destinatae: alie vero ab internis sedibus foras vergunt, tres quidem in magnæ arteriæ osculo, & totidem in vena arteriosa sitæ inter se æquales, per quas sanguis tum crassior ex dextro sinu in pulmones per venam arteriosam, tum spirituosus ex sinistro in magnam arteriam emittitur. Omnium autem orificiorum quæ in cor dehiscunt maximum est arteriæ magnæ, quod ut iuuenibus cartilagosum est, ita natu grandioribus, præsertimque senibus, ossium. Cordi porro sua est tunica, neruulum à sexto pari aut recurrente sinistro sortita. Venam etiam à vena caua habet, antequam eam dextrum ventriculum subeat, coronæ modo (*στέφανος* ob id dicitur) circa cordis basim implexam, & ramulis postea plurimis in cordis partem extimam distributam: duas item arteriolas inæquales ab aorta sub membranarum epiphysebus productas, & ut vena coronaria, varie per summum viscus dispersas. Interna namque eius caro à sanguine in ventriculis contento abunde nutritur & temperatur. Est autem cordis figura pyramidata, è lato in acutum tendens. Hunc in modum natura cor instruit atque exornauit, ut fons & principium vitæ esset, & calorem natium, quo vno vita continetur, conseruaret. Ea vis cordi insita à medicis facultas vitalis nuncupatur. Itaque nulla pars in corpore corde vehementius calet, non modo sua causa, sed vniuersi etiam corporis, cui perpetuo calorem suppeditare debet. Id quod præstat spiritum & sanguinem valde tenuem & calidum per arterias veluti per canales quosdam in omnes corporis particulas immittens, quem è ventriculo suo sinistro depromit multo tenuiorem calidioremque quam ante ex vena caua in dextrum admiserat. Verum cum mediocritate & temperatione quadam ipse etiam calor natium conseruari debeat, moderate refrigerari se postulat. Id quod duobus modis, proprie quidem aere frigido inspirato, per accidens vero fuliginosi excrementi vacatione. Quorum utrumque cor pulsus consequitur, per diastolas quidem aerem frigidum attrahens, per systolas vero halitus fuliginosos exprimens. Sed

vt cordis calor respiratione refrigeratur, ita reliquæ partes corporis arteriarum pulsu, quæ in eum finem & vsum originem à corde ducunt, & vim pulificam (cuius fons & principium cor est) ab eo accipiunt. Præter eas facultates alia etiam cordi inest, quam veteres philosophi *συνεσις*, Latini animosam & irascibilem appellant, quæ motus in nobis variis gignit, alios remissiores alios magis concitatores, prout ratiocinandi potentia res animo obiectas æstimauerit, sicut ante *πρὸ συνεσις διώγων* explicantes annotauimus.

*καρδία*: etiam dictum est à veteribus os ventriculi, propter affinitatem maximam quæ est illi cum corde, & mutuum consensum, vt longo sermone Gal. demonstrauit lib. 2. de placitis Hippocr. & Platonis.

*Καρδιαία*. dicuntur qui propter oris ventriculi languorem animo deficiunt & sudoribus resoluuntur. His pulsus densus est & obscurus, extremæ partes frigent, sudores circa faciem & ad pectus vsque glutinosi, odor corporis terrestris, pulsus circa cor vehementes & magni. Adhæc febris acuta, desperatio, angor animi & corporis iactatio. Est autem os ventriculi in his primario affectum: per consensum autem cor ipsum vehementer offenditur. Affectionem ipsam Celsus dicit nihil aliud esse quam nimiam imbecillitatem corporis, quod stomacho languente immodico sudore digeritur. Galenus huius affectionis genus statuit synopen, non eam quidem quæ corde primario affecto contingit, sed cardiacam, quæ vitio oris ventriculi fit (secundum antiquam *καρδίας* significationem) quam & stomachicam appellant.

*Καρδιαγία*. est dolor & morsus oris ventriculi ab humoris acrimonia. Symptoma est non cordis quidem, hoc est, visceris huius quod vitæ pulsusque principium est, sed oris ventriculi quod à veteribus *καρδία* dicebatur. Nec verò omnīs oris ventriculi dolor *καρδιαγία* appellatur, sed ille tantum quem humorum acrimonia irritando & mordendo excitat. Id quod fit in angoribus, vnde mœrore confecti bilem euomere consueuerunt. Neque dolore vexatis tantum, verum etiam iis qui diutius paulo ieiunium tolerarint, accidit vt morsus hos ventriculi sentiant, præsertim cum vehementi aliqua exercitatione fatigati cibum nullum assumpserint. Siquidem & mœror & vehementior exercitatio facit vt flaua bilis in ventriculum confluat, à qua postea irritati & morfi homines cordis doloreprehenduntur.

*Καρδιαγμός*. cordis morsus, seu rosio cordis, vel potius ventriculi. Est sensus quidam mordicationis in ventriculo ab humore acri os eius rodente & vellicante. Alii vero, vt scribit Galen. *καρδιαγμός* interpretantur cordis (hoc est, visceris eius quod palpitat, & cor proprie dicitur) motum quandam palpirationi similem. Itaque his quidem auctoribus *καρδιαγμός* ad cor pertinet, illis autem ad

os ventriculi. quibus & videtur Galenus assentiri, scribens lib. 3. de facult. nat. in ventre segregatricem expultricemque alienorum vim per *καρδιαγμός* manifeste indicari. Nondum quidem scio à veteribus definitum quomodo ab inuicem *καρδιαγμός* & *καρδιαγία* differant. Nam vt scribit Galen. comment. in aphor. 65. libr. 4. plerique apud Hippocratem *καρδιαγία* & *καρδιαγμός* pro eodem acceperunt, cum tamen ipse lib. 8. *ἢ καὶ τὸν* videatur ea diuersa esse dicere. Erotianus inter ea non distinguit, vtrumque eorum explicans, *τὸ μέγεθος καὶ ἰδιότης ἀνέσταν τὸν ὅμαλον*: hoc est, cum natæ & dolore stomachum affici. Alteram autem *καρδιαγμός* differentiam constituit quæ cor proprie dictum laborare potest, eamque definit *παλῶν ἀρρώστων καὶ σπασμῶν ἐν αὐτῇ ὕπνους*. hoc est, palpitationem conferunt & vehementer in ipso factam.

*Καρκίνος*. cancer. Est tumor malignus, inæqualis, durus, oris prætumidis, aspectu teret, linitus & indolens, cancro similis. Ab atra bile gignitur. Sed cum atræ bilis duæ sint differentie, Galenus lib. 2. ad Glauconem scripsit ex melancholico excremento generari, quod faci vinariæ proportionē responderet, & à liene repurgatur. Id enim si in corpore redaudauerit, sanguinem crassum, turbidum faculentumque reddit. quem sinec per hæmorrhoidas, nec per aluum, nec aliter natura extra corpus depellit, aliquando in varices, aut in aliam quandam partem ceteris imbecilliores interdum vero in vniuersam cutem (vnde elephas nascitur, quem alij qui cancrum vniuersum vocari volunt) deponit. In quam autem partem decubuerit, venæ in ea manifesto apparent sanguine nigro & crasso plenæ atque tumentes, itaque tumori circumpositæ, vt cancri animalis figuram referre videantur. Siquidem tumor ipse cancri corpus, venæ tumidæ crassæque eiusdem pedes oculis representant. Quæ quidem figura cum vbique cerni possit (oritur enim cancer in omni corporis parte, atque in ipso etiam oculo) in mulierum tamen mammis longe est euidentissima. Quamuis autem inde huic tumori nomen inditum fuisse plerique putent, potest tamen alia quædam similitudinis ratio assignari, quam Aetius ex Archigene & Leonida in librum vltimum transtulit. Sicut enim cancri animalia sunt aspera & dura, & si quid forcipibus suis ceperint haud facile dimittunt, ita tumor iste & prominet & tactui renititur & ægre tractabilis est, atque vbi semel radices egerit, difficillime auelli tollique potest. Est enim malignus, ferus, proteruus & quem curatio manuumque vel blandissima tractatio efferare potius quam mitigare solet. Sed cum sit duplex cancrorum differentia, quidam enim sine vlcere, quidam cum vlcere consistunt: qui sine vlcere sunt, à veteribus oculi fuere appellati, quamquam Philoxenus cancrum oculum pri-

uarim vocant qui in vtero atque intestinis esset. Est autem non vlceratus paulo mitior. qui namque vlcus habet, assidue erodit, nec sustinere potest, & saniem pessimam teretissimamque exudat.

**Καρκίνος.** cancer. Vinculi genus apud Galen lib. de fasciis, quod capiti conuenit: fascia scilicet in plures partes scissa, cancerorum pedum speciem referentes. Sic etiam à veteribus dictum fuit *ὀφθαλμικός*, vt habetur apud Pollucem.

**Καρκινώδης, οφθαλμικός.** apud Hippocrit.

**Καρκινώμα.** cancer. Idem prorsus quod *καρκίνος*, nisi quod mihi videntur Græci sæpius in oculo *καρκινώμα*, in reliquis corporis partibus *καρκίνος* dicere, quamuis etiam in oculo *καρκίνος* dixerit Aetius. Est autem in oculo affectus cornæ & tunicæ, ad quam vndique venæ sanguine plenæ & liuentes concurrunt, veluti in aliis reliqui corporis canceris.

**Καρπώδες.** sic dicitur Actuário quod est Serapii doronicum.

**Καρπύον.** carcenum dicitur vinum decoctum, ita vt tertia pars absumpta sit, duæ tantum remaneant. species est *τὸ σίρπις*.

**Κάρων**

**Κάρως.** herba est valde nota. Omnibus carui dicitur. Eius semen tertio ordine siccat & calescit & modice acre est, vt & planta. Habet autem quiddam aromaticum, & vsum aniso, ligustico, petroselinæ & cymino parem. Si quis tamen eo copiosius vtatur, succum aliquatenus vitiosum gignit, vt scribit Gal. lib. 2. de alimentis.

**Κάρως.** sopor. Est paralyssis imaginatricis facultatis, sensum morumque omnem, excepta respiratione, adimens. Huius causa, perinde ac multorum aliorum cerebri morborum, est crassus aut viscidus humor, qui ventrem præsertim anteriorem occupat. Ex quo Galenus *καρὼν* facultatis imaginatricis symptoma esse dicit in lib. de sympt. differ. Sed tamen & medius ventriculus sæpe consentit. Sequitur inde somnus profundus, oculis perpetuo clausis, & omnis sensus atque motionis priuatio, excepta respiratione quæ sola secundum naturam seruatur. Nec tamen ita periit sensus, quin si pungantur, sentiant, non tamen propterea vel loquuntur vel oculos aperiunt. Ex his patet in quo *ὁ καρὼς* à reliquis cerebri morbis differat. Ac primum quidem ab apoplexia, quod in ea cerebri corpus magis affici solet, eiusque partem anteriorem postior, sensusque omnis vna cum respiratione aboleatur: in caro autem ventriculus eius anterior magis patiatur, nec in totum sensus videatur perisse, maneatque libera secundum naturam respiratione. quodque sopore discusso bona valetudo magna ex parte consequatur, cum apoplexiæ paralyssis sæpissime succedat. Ab epilepsia vero, quod hæc conuulsio sit, & partem capitis vtramque, hoc est, anteriorem posterioremque, tenet, oculique aperti vt plurimum maneant: carus autem non habet

at adiunctam conuulsionem, consistat in parte capitis anteriore, perpetuoque per eum oculi claudantur. A catalepsi vero atque à carochæ, quod his posteriora cerebri magis afficiantur nec palpebræ claudantur, sed maneant apertæ. A lethargo vero, quod febris carum præcedat, eadem lethargum consequatur. Non enim solet putrescere humor carum committens, sicuti is qui lethargum parit, atque ex putredine febrem accendit. Adhuc carus multos morbos velut symptoma sequitur. Nam & accessionibus quarundam febrium, & comitialibus morbis & cerebri compressionibus & fracto cranio, vel oblatis meningibus superuenit: lethargus autem per se vt plurimum consistit. Gal. comment. 2. in l. 1. Prorrh. definit carum esse somnum longum, profundum, & à quo æger difficillime excitetur. Sunt etiam, inquit, qui vbi eger tum festu tum mori aliquantisper priuatur, etiam si stimules, ferias, inclames, carum appellent: qualis in quibusdam visitur, qui in temporibus vehementer percussi fuerint, atque in febrium etiam accessionibus.

**Καρπῆσιον.** carpesium. est festuca tenuis, surculis cinamomi similis, odore *τὸ σίρπις* sed valentior & magis aromatico. vires habet cinamomi, nec tamen tam tenuium partium est. namque ipsum duplo pondere pro cinamomo Gal. vsurpat. Serapio, Auicenna atq; Arabes omnes cubebas esse dicunt. Verum Dioscorides, Theophrastus & Plinius nihil de eo habent scriptum. Sunt qui crediderint *ὄξυμύρρινον* esse, quorum tamen erroré Herimolus Barbarus & Nicolaus Leoniceus redarguunt.

**Καρπώδης καρπός.** est fructus arboris quæ *βαλάουμος* dicitur, parum oblongus, in medio lator, rubens, grauis, plenus, gustu pipæris & odoratus. In theriacam inditur auctore Galeno.

**Κάρπης.** carpus. brachiale. Est pars manus quæ cubito per articulum coniungitur. Aristoteles lib. 1. de histor. animal. definit *καρπὸν* esse nodum quo cum brachio manus iungitur & coartatur, quo loco Gaza primus brachiale vertit. Celsus enim partem eam nullo proprio nomine appellat, sed primam palmæ partem vocat, quam dicit ex multis minutisque ossibus constare, quorum numerus incertus sit. Attamen Gal. octo ossibus constare scribit, duris quidē omnibus & paruis & sine medulla, differentibus autem non modo magnitudine, sed etiam figura, situ & vsu. Omnia ligamētis nerueis & cartilagine inter se per synarthrosim constringuntur, non (vt quidam putant) per symphyum. Sunt autem varæ & multiplicis figuræ: extra enim læuiter gibbosa, intus caua sunt. Omnia duplici ordine digesta sunt, quorum primus is dicitur qui & superior, tribusque constat ossibus in condyli vnus longi formam coagmentans, quæ in superiori brachialis sede ita secum iunguntur & protuberant, vt veluti vnum brachialis caput

capit. leue & cartilagine incrustatum constituant. Inseruntur autem in canitatem tum radii, tum cubiti, & cum radio, cubito & ipsius apophysi styloide per diarthrosim articulantur, ad inanus extremæ flexionem & extensionem, & motus eiusdem obliquos ab apophysi styloide iuuandos. Secundus ordo & inferior suis quatuor ossibus metacarpio per synarthrosim articulatur. Octauum autem os quod restat, ambigit quodammodo inter vtrumque ordinem. nam & quarto secundi ordinis ossi velut inclinaturn incambit, & inuehitur etiâ osse, quod sua glenoide cavitare, styloide apophysim recipit.

**Καρπός.** fructus. Est stirpium veluti soboles quædam. Idem reuera in multis quod semē, vt tritico, vicia, eruo, pis, fabis: in his enim fructus à semine exiguum quid discrepat. Quod enim ex siliqua & semine compositum est, fructus est, cuius tamen substantiæ maxima pars in feminibus inest. In aliis vero paulo plus semen & fructus differunt. etenim fici fructus sunt ipsæ ficus: quod vero in eo *κεχαμῆς* dicitur, semen est fici: sicut & acinus totius vitis est fructus, solum autem *γίδρπον*, vitis est semen. Pari modo in pyris, malis, cucumeribus & id genus aliis. Porro differentiam aperte explicauit Aristoteles libr. i. de generatione animalium: Fructus, inquit, dicitur quod ex alio est, semen autem ex hoc ipso aliud est, quasi semen à fructu secundum prius & posterius differat. Verbi gratia, pomum fructus ex arbore est, semen autem pomi ex eo ipso est, & quidem posterius fructu, hoc est, ipso pomo. Præterea & ratio inter vtrumque distinguit. Dicitur enim fructus quod ab alio est, semen vero ex quo aliud fit. Sed confunduntur magna ex parte, vt cum *λευκῶν καρπὸν* tum Hippocrates tum Dioscorides violæ semen appellant, vt scripsit Galenus *ὁ π' γλώσσης*.

**Καρπύφυλλον.** sic dicitur à quibusdam laurus Alexandrina.

**Κάρτα.** idem quod *λίαν καὶ σπόδα*, apud Hippocratem.

**Καρυδὸν κάταγμα.** fracturæ ossis differentia quæ & *ἀλφιδὸν κάταγμα* dicitur. vide *κάταγμα*.

**Καρυκία ἡ**

**Καρύκη.** species intriti seu cōdituræ ex variis obsoniorum generibus. Sūt quibus placet apud Hippocr. dici Lydium quoddam edulium ex sanguine variisque rebus apparatus. Sanguinis colorem referebat, proindeq; vt scribit Erotianus, plerique *αἵματιαν* esse censuerunt, colore forte decepti. Significat autem ἡ *καρυκία* omnem superfluam condituram. Quidam duplici *κα* scribunt.

**Καρυκόν.** medicamenti nomen apud Hippocratem quod ipse vlceribus admolet, ex nucibus & aliis quibusdam apparatus. Habetur apud eum lib. *πρὸς ἐλκῶν*.

**Κάρυον** nux. Dicitur omne pomum quod foris

duro tegitur, & intus habet quod esui est. Eius plura sunt genera: βασιλικόν, πυρρὸν ἢ ἡρακλειώτικόν, μυρσικόν.

**κάρυον βασιλικόν.** nux iuglans. omnium notissima est, fructu multis inuolucris occultato, calloso primum herbaceoque cortice, hinc compactili carinarum loculo, mox tenui tunica crispæ intus nucleī quadripartito digeruntur, lignea intercedente membrana.

**κάρυον εὐβοϊκόν.** nux Euboica. Idem prorsus quod iuglans.

**κάρυον ἡ ἡρακλειώτικόν.** nux Heracliotica, quæ & *λεπὴν* & *πυρρὸν* dicitur. nux auellana. Latini Prænestinam vocant. Hæc molli primum calyculo legitur, mox lignoso quidem sed fragili putamine, cui tenuis subest membrana rotundum operiens nucleum, in cuius umbilico quasi peculiaris alter includitur nucleus.

**κάρυον λεπὸν.** quod & *λεπτοκάρυον* vno nomine dicitur. Idem quod *ἡρακλειώτικόν* siue *πυρρὸν*. de quo supra.

**κάρυον μυρσικόν.** quod & cōposito nomine *μοσχάρυον* dicitur. est nux odorata quam nos moschatam dicimus.

**κάρυον σφοδρὸν.** nux iuglans. Eam enim reges ex Perside transfulere: vnde & regiæ & Persicæ nomen habet.

**κάρυον πυρρὸν** nux auellana, quam & *κάρυον ἡ ἡρακλειώτικόν* diximus appellari.

**Καρυόφυλλον.** longe abest ab eo quod nomine videtur significare. Cum enim dicatur quasi nucis folium, eius tamē neque naturam neque formam omnino habet. Est enim arboris fructus, vt placet Aetio & Simeoni, vel potius flos, authore Paulo, arboris cuiusdā Indicæ festucaceus, in clauī modum capitatus, niger, longus, acer, subamarus, odoratus, non ad obsonia modo, sed ad multa etiam medicamenta expetitus. Alii non flori modo & fructui, sed ipsi etiam frutici nomen hoc tribuūt qui depingitur sambuci forma, vel, vt aliis placet, buxi caudice, lauri folio, sed rotundiore.

**Καρφύλον κατὰ ξηρόν.** apud Hippocr.

**Καρφολογέειν.** colligere festucas verbum est de phreniticis dici solitum, vt habetur apud Galen. quemadmodum & *κρομυδιζέειν*, quorum vtrumque imaginandi vi læsa prouenit.

**Καρχήσιος σφόδρος.** carchesius laqueus. Deligaturæ genus est duabus habenis constans, vim habens æqualiter extendendi. Sic dicitur à fune qui in summo nauis malo habetur, quæ Græci *καρχήσιος* appellant. Eius meminit Gal. comment. i. *εἰς τὸ πρὸς ἀβύρον*. Geminus describitur apud Oribasium lib. de laqueis, simplex & duplex.

**Καρῶδες.** ἢ *καρχηρία*, ἢ *καρυκτὶνόν*, apud Hippocratem.

**Καρῶδες** siue

**Καρυκτὶ καὶ ἀρτηρίαι.** vide *ἀρτηρία*.

**Κασία ἢ Κασία.** casia, frutex est, sed multorum generum. vnū *ἄχυν* dicitur & *δαφνίτις*, nascens



in Arabia, sarmento crassi corticis, foliis piperis. In quo genere optimam fuluescit: pulchri coloris est, & coralii æmulum, perquam angustum, longum, crassum, fistulosum, gustu mordens, & cum aliquantō feriore adstringens, aromaticum vinoso odore. Aliud est quod ὕζιρ dicitur siue ὕζιρ, purpurea nigrañtis aspectu, crassiore sarmento, rosam spiras, præcipui in medicina vsus. Acritus ὕζιρ appellat; alii βαλαμωίδης, vt habetur apud Plinium. Aliud vocatur βαλαμός Μουσική, id est, germen Mosyeticum. Erhæc tria genera præcipue commendantur. Reliqua vilia sunt, inter quæ αουφήμων dicitur nigrum, insuaue, cortice tenui & timoso, & quod καὶ δὲ δάκρυ seu (vt quidam veteres codices habent) δάκρυ appellatur, vt scribit Dioscorides. Cæterum casia calfacit & siccat tertio ordine, partium tenuium est & leniter adstringit. Omnes eam officinæ ligneæ vocant. Nunc nisi rarissime, ad nos non conuehitur.

**Κασία συνεγγώδης**, casia fistularis. quæ ab Aetuario κασία μέλανα, id est, nigra, dicitur; ab aliis κάλαμος, id est arundo, seu potius Indica canna, est arbor magna, iuglandis folio, fistulis prælongis ac teretibus, vtrinque fastigiatis, colore rubro nigricantibus, duum fere pedū proceritate, nigra intus carne gustu prædulci, plane medicato, ligneis distinguentibus membranis, ossibus filiquarum; intercursantibus laminis intus carnosiss quas parietinæ discludunt. Ea & in India & in Ægypto nascitur. Ignota fuit Dioscoridis Plinique & Galeni ætatibus. Nunc nobis familiarissima est, cuius confecto atramento frequenter vtimur ad deiciendam aluum iis qui valentia medicamenta non ferunt.

**Κασσιός αἶνος**, forte vinum Syriacum, apud Hippocrat. à monte Cassio, vt scribit Erotianus.

**Κασσίτης**, Syriaca vox est, sed recentioribus Græcis vsurpata pro herba quæ sine radice, foliis vidua, flore albo, semine scatens tenui, cirris purpureis proxima quæque veluti clauiculis implicat. officinæ cuscutam vocant.

**Κάστανος**, castanea. Idem quod διός βάλαμος ἢ ἀρδγυή. vide διός βάλαμος.

**Καστέρον**, siue Κασόρεον, castoreum. Testiculi castoris animalis quod fiber Latinis dicitur. Est autem ancipitis vitæ animal, & plerumque cum piscibus & cancriis ex aqua victum capessit. Testes habet magni prorsus in medicina vsus, quos ab ipsis auelli & à sese abiici cum venatu urgentur, vanum est. Siquidē tangi nequeunt, ita vt in sue, substricti. Eligi autem debent qui ex vno ortu connexi sunt (fieri enim non potest, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti cerco, odore graui & virus redolente, gustu acri, mordente ac friabili, naturalibus tunicis circūdaro. Pontici cæteris præferuntur. calefacit & siccit, habetque magnam partium tenuitatem.

Itaque concoquit, discutit & suppressas vacuationes restituit.

**Κάστωρ**, sic quidam τὸ κράκον appellant, vt habetur apud Dioscoridem.

**Καταβλαπένουσι. κατολγγοῦσι**, hoc est, paruipendunt, apud Hippocr.

**Κατέλημα**, dicitur apud Hippocr. quicquid exterius parti superiicitur, siue fimbria siue aliud quid simile.

**Κάτγμα**, fractio, est solutio continuitatis in osse. Sicut enim in carne soluta continuitas ἔλκος dicitur, ita in osse κάτγμα. In cartilagine non habet proprium nomen, sed eam continuitatis solutionem Hippocrat. abusus κατγματος nomine appellauit, vt annotat Galenus cōment. 2. εἰς τὸ πρὸς ἀρδρων. Sunt autem κατγματος plures differentiæ. φαφάνηδον, quod est fractura ossis per eius crassitudinem transuersum facta. dicitur aliis nominibus σικνηδόν & καυληδόν, ex cucumerū & caulium fractorū similitudine. Aliud χαλακήδον quod est ossis fractura oblonga. Aliud τὸ εἰς ὀνύχα quod est ossis fractura, secundum partem lunata: dicitur & alio nomine καλαμηδόν. Aliud εἰς ἀλφινηδόν, quod est ossis fractura in multas tenues partes, quod & à quibusdam καρυηδόν dicitur. Aliud τὸ κατ' ὀστρούρασιν καὶ κατ' ἀποκόπῳ, quod est ablatio partis ossis per summitatis rupturam, vt pars ea quæ ablata est superinnatet. Sunt etiam qui fracturæ cranii differentiam constituerint quam ἀπὴγμα vocant, quæ fit quando percussa vna parte, ea finditur quæ contraria est.

**Κατγματικὰ φάρμακα**, dicuntur medicamenta caluariæ fracturis accommodata. Sunt autem ea abstergerendi, digerendi & siccandi potestate prædita, quibus plerique & paululum ex adstringentibus pharmacis admiscer. Sunt autem κατγματικὰ eadem fere cum κεφαλικαῖς, nisi quod hæc acrimoniam etiam quandam sortita sunt, vt ex alto in superficiem extimam non ossa modo, sed humorem etiam crassum & viscosum, si quis subest, vel omnino deprauatum attrahant: quanquam & hæc plerique etiam κατγματικὰ appellarint; vt scribit Galenus libro 2. τῶν κτ' ἁπλῶν. quo loco ipse aliquot Andromachi κατγματικὰ describit & aliorum veterum medicorum.

**Καταχρῆς**, enervat, debilitat, ad extremam imbecillitatem ducit apud Hippocratē.

**Κατὰ γίγινεν. ἀνέπαρ' ἢ ὀρεῖν**, hoc est, inuerrere & e-rumpere: apud Hippocrat. vt annotat Erotianus.

**Καταύνησις**, irrigatio, perfusio. Fit humore copioso in partē aliquā affuso. quo quidem remedii genere vtēdum cum aliqua de causa balneo excludimur. Sed præsertim capiti adhibetur siue ad somnum conciliandum, siue ad compescēdum delirium, siue ad soluendas conuulsiones: Archigenes namque proditur præceptorem suum Agathinum ex vigiliis delirantem, confestim delirio vi-

gillique liberasse latiore oleo & calente capiti affuso. Id quod etiam præstari potest chamæmelo vel calycib<sup>9</sup> papaueris in oleo decoctis. Similiter in caninis conuulsionibus caput oleo scyonio calente aut alio eiusdem facultatis perfundi irrigarique potest; sicut & aliæ corporis partes quas morbus aliquis occupat. Nam & podagrici & tremore laborantes & hepatici & splenici proprias habent & peculiare irrigationes. Caterum *κατατόνους* differt *καὶ τῶν ἐμφορῶν*, eo solo quod post *τὴν κατατόνουν* in parte aliqua factam, eidem lanam aut linteum aut aliud quid superponimus, quod post *τὴν ἐμφορῶν* non facimus.

*Κατακλιμένοι, ἐκλυτοί*, hoc est, resoluti, languentes, deficientes apud Hippocratem, ut annotat Gal. comment. in prorrhæ.

*Κατακλιθεῖς*, dicuntur ossa cartilaginosa in commissura omoplatæ cum clavi sita, vtrinque scilicet singula. Siquidem in ea commissura sæpe accumbit, sæpius media intercedit cartilago, uti in ea quæ clavi est cum sterni iunctura, & ea quæ genæ inferiori cum osse temporali, & cruri cum tibia. Hanc porro cartilagineam osseam Galenus os propter duritiem appellat (quanquam ob tenuitatem sit multum flexilis) & scribit in ea commissura, præter omoplatam & clauem, tertium os à quibusdam numerari, & in ipsis tantum hominibus Hippocratis testimonio deprehendi, qui eam homini propriam facit. hanc vero etiam ab aliquibus *ἀκρόμιον* vocari Gal. libr. de ossibus prodidit.

*Κατὰ καὶ οὐρά*, idem quod *καὶ οὐρά*, apud Hippoc. lib. de salubri diæta.

*Κατακορίης*, *καὶ οὐρῶν καὶ ἀκρόμυ*, utroque enim modo Galen. explicat comment. *ἀπὸ δὲ τῶν οὐρῶν*.

*Κατακορίης*, *ἀκρόμυ*, syncerus, ut *καὶ οὐρῶν κατακορίης*, bilis sincera: sic enim (inquit Galenus) *κατακορία* vocat Hippocrates recrementa puræ bilis, sed & *καὶ οὐρῶν κατακορία* dicit quæ eiusmodi humorem generant, quæ tamen quidam hirsuta interpretati sunt. Quin & *κατακορίης* homines eadem ratione vocat. Pharmacum quoque *κατακορίης* dicit, aut propter euacuatum ab ipso humorem, aut ob proprium suum colorem. vocat etiam suum *κατακορίης*, quæ vel gignitur propter talē humorem, aut quæ vehemens & intensa est. Ad eundem modum Galenus aliquando dicit *καὶ οὐρῶν κατακορίης τῇ χροίᾳ*, id est, bilem abunde coloratam, & velut ad plenum suo colore exaturaram.

*Κατακορίης*, tonsura per nouaculam, apud Hippocratem.

*Κατακορίης*, *κατακορίης*, hoc est, discindere; apud Hippoc. ut annotat Erotianus.

*Κατακορίης*, affectus est cerebri. Prouenit à vehementi refrigeratione cum quadam siccitate, & posteriora cerebri potius occupat, cum in caro anterior pars magis laboret: in apoplexia vero & morbo comitiali vtra-

que, ut scribit Gal. lib. 4. de loc. affect. Manet autem per catalepsim palpebræ apertæ, quæ per carum clauduntur, seruaturque secundum naturā spiratio. Huius frigidus ac crassus aut omnino viscidus humor causa est, quanquam & stomachi vitio aliquando incidere possit. Paulus Aegineta lib. 4. cap. 6. scribit affectum quem medici Galeno antiquiores *κατακορίης* appellauerunt, eundem à recentioribus *κατακορίης* & *κατακορίης* postea vocatum esse. Dicitur *καὶ τὴν κατακορίης*, quod eo affectu detentus æger repente in illo permanet habitu in quo correptus est, vide *κατακορίης*.

*Κατακορίης*, vocabulum est Empiricorum, quo significant veram & perpetuam cognitionem, ut scribit Galenus libro *ἀπὸ ἀρίστης*. Sunt autem *κατακορίης*, *κατακορίης*, *κατακορίης*, nomina ex Stoicorum schola profecta, nec Attica, ut scribit Galen. initio libri *ἀπὸ ἀρίστης διδασκαλίας*. & significat *κατακορίης* idem quod *γνώσις*, hoc est notum.

*Κατακορίης αἷμα*, menstruus sanguis. Est sanguis in muliere superfluous, alterum generationis principium. Sanguinem quidem esse ipse sensus indicat, superfluum autem ipsa per singulos menses excretio ostendit. Quia enim fœmina humidior frigidiorque mare est, iccirco sanguine magis abundat, conseqvens quidem alimentum quantum expedit, verumtamen propter caloris imbecillitatem non valens id quod redundat per halitum digerere. Proinde plus sanguinis quam illi sit ex usu accumulatur: cuius partem cum sibi concoxerit & assimilauerit, reliquam tanquam superfluum per veterum excernit. Videtur itaque id quod excernitur, eiusdem esse & substantiæ & qualitatis cum eo quod ipsa sibi referuauit, & ad sui nutritionem vlturpauit, ut quod & ab eadem facultate, eodemque calore natiuo genitum sit, iisdemque alimentis, & eodem postea calore regatur, & suis vltique ad excretionem venis locisque contineatur, in quibus vnumquodque optime conseruari solet. Quamobrem cum sanguis ille superfluous aut excrementosus dicitur, non ad qualitatem, sed ad quantitatem referendum est. Nam si quod illi vitium insit, idem & reliquo toti sanguini commune est, quale morbosum non fœminarum tantum, sed virorum etiam corpora conciliant atque contrahunt: proprium verò & peculiare nullum videtur possidere, excepto forte eo quod mox dicam. Cerrum est vteri in mulieribus permagnam esse vim, ut qui non modo morborum grauissimorum causa sit, sed totum etiam corporis temperamentum immutare possit. Is si à suo temperamento recesserit, si vitiosos humores aut in acetabulis, aut in cornibus, aut inter tunicas, aut suo sinu collegerit, tunc sanguinem menstruum, eiusque maxime partem quæ primum ad eum peruenerit, inq; eo diutius re-

federit, donec menstrui excernendi tempus aduenerit, eodem vitio inficitur atque deprauat: unde ea forte maleficia, quæ Plinius menstruo sanguini attribuit, consequuntur. Verum vitium hoc ex accidenti potius quam natura inest eiufmodi sanguini, qui alias in muliere bene sana omnis vitii expers gignitur, adeo ut alterum generationis nostræ principium existeret. Est enim foetus materia, atque etiam facultas perinde ac semē, sed tanto minorem vim & facultatem habet quam semē, quanto plus materiae in formando foetu subministrat. Nam ut docuit Gal. lib. 2. de semine, cum ex materia & facultate vnum quodque animal gignatur, & in semine & in menstruo sanguine vtrumque principium continetur, non æquis tamen viribus. Siquidem in semine effectuum principium validissimum est, materiale paucissimum: contra vero in menstruo sanguine materia plurima, vis autem & facultas longe imbecillior est. Ab eo carnosæ partes & materiam & formam accipiunt, attracto semē fruiuntur, conceptus foetus nutrimentum capessit, infans in lucem editus alitur. Est enim menstruo lac germanum, vnamque habent ambo substantiam. Sunt autem qui sanguinis menstrui duas vel plures etiā differentias, siue quod verius est, partes constituent, puriorem, sæculentam & mediam: puriori quidem beneficia illa omnia tribuentes quæ diximus, sæculentæ vero ea maleficia quæ vulgo recensentur. Cæterum menstrui nomen non à propria substantia, sed ab accidente inditum est, quod singulis mensibus eius excretionem natura molitur. Nec tamen siue naturā siue præter naturam supprimatur, ob id definit menstruus sanguis dici. Huius autem periodi causam nemo vel ad vitiosam qualitatem, vel ad sanguinis redundantiam referendam arbitretur, sed aut in naturæ vim, quæ omnia certis legibus administrat, aut in sempiternos & immutabiles Lunæ cursus, quæ ut luminum varietate tum crescēs, tum decrescens mensē dimetitur: sic hominis, maximeque feminæ, ut reliquorum etiam omnium humores, rata ordinis constantia regit atque moderatur.

*Καταμολυνέει*, sensum solui, Gal. apud Hippocratem in fine prothetici.

*Καταμόσις*, qui demittit aliquid causa inquirendi & inuestigandi: apud Hippocr.

*Καταπόνη*, herba est duum generum, vna folio coronopi longo, radice iunci modo præternui, capitulis lenis septenisque, in quibus erui semen inest. Altera mali parvæ magnitudinem explet, radicē habet exiguæ oliuæ magnitudine: folia quoque oliuæ colore & figura, mollia, diuisa, humi inclinata: semen ut cicer, minutim in virgulis dependet, puniceæ coloris, multis foraminibus pertusum. Hanc quidam bistortam esse arbitrantur.

*Καταπόνη*, *καταπόνη*, apud Hippocratem.

hoc est, vi cogitur & adigitur.

*Καταπόνη*, *καταπόνη*, consumitur, apud Hippocr.

*Καταπόνη*, *καταπόνη*, hoc est, contemnere & despicere: apud Hippocr. ut annotat Gal. commentum in 3. *βιβλίου*.

*Καταπόνη*, *καταπόνη*, hoc est expedis vel contedis: apud Hippocratem, ut annotauit Erotianus.

*Καταπόνη*, sericum crudum Aetio & Actuatio. Est autem lanificium bombycis, sed antequam cortinas vel colorem experiatur. Officinæ setam crudam nominant.

*Καταπόνη*, fractio. Est rei in magnas partes diuisio & separatio: *Σπασίς* vero est in qualisvis partes sine discrimine, & plures duabus, ut distinxit Aristoteles.

*Καταπόνη*, *καταπόνη*.

*Καταπόνη*, *καταπόνη*, dicuntur medicamenta arida, ex sicco medicamentorum pulvere conflata. Vt autem ipsa medicamenta viribus differentia sunt, sic variae *καταπόνη* differentiae. Alia enim ex aromatum pulvere parantur, quæ ad gratiam comparata sunt, & vestibus inspergi possunt. Alia ulceribus & cuti inspergiuntur, ad gignendam carnem, compescendam carnis excrecentiā, ducendam cicatricem, erodendum, vrendum, sanguinem sistendum. Cuti autem ad extergendum, repurgandum, attenuandum, discutendum & ad pluresque alios vsus, ut docet Paulus libr. 7. capit. 13, quo loco in omnibus fere exemplaribus male legitur *καταπόνη* pro *καταπόνη*. Eadem medicamenta inspersilia dicuntur à Græcis *σπασίς*, & *πόνη*, vide *σπασίς*.

*Καταπόνη*, *καταπόνη*, læsi, mutilati, apud Hippocr.

*Καταπόνη*, est medicamentum molle & consistentia mediocri, quod repellendo, concoquendo, digerendo, resoluendo, laxando, vacuando, detergendo, calfaciendo, siccando dolorique sedando adhibetur. Quæ crassiora siccioraque sunt, emplastra & cerata: quæ liquidiora, *συνχρίσματα* & vnguenta appellantur. Sunt autem variae cataplasmatum vires & diuersi vsus, propterea quod valde differente materia componi possunt, & variis partibus admoueri quæ peculiarem quandam habent indicationem. Cæterum ab antiquis magna ex parte ex melle parabantur: cui incocta essent vel mista medicamenta proposito conuenientia: sæpiissime vero & ex pane, oleo & farina, de quo apud Galen. multa libr. 2. ad Glauconem.

*Καταπόνη*, deglutitio. Est cibi potionisque ab ore in ventriculum descensus. Actio est facultatis attractricis, quam vi fibrarum rectarum agit, quas multas interna ventriculi tunica possidet, ad id munus natura comparatas. Id quod liquido cernitur deglutientibus nobis, larynge simul sublata sursumque in tantum currente, quantum gula deorsum trahitur. Cum autem complera iam deglutendi

tiendi functione laxauerit segula, tunc luculenter descendere cernitur summa arteria: siquidem interna ventriculi tunica quæ rectas habet fibras, quæque tum gulam intrinsecus vestit, tum os ipsum, ea super internis summæ arteriæ partibus extenditur. quo fit, vt cum ipsa à ventriculo deorsum trahitur, simul etiam summa arteria necessario attrahatur.

**Καταπόσις.** pilula. Est medicamentum, vt ait Scribonius Largus, quod non diluitur, sed ita vt est deuoratur. Formatur fere in pilulas, quo facilius deuorari possit, & in ventriculo dilui, indeque transire in venas. Est autem vsus catapotiorum multiplex, maximus ad purgandum corpus humore excrementoso, plurimus ad distillationes & tussim aliasque thoracis affectiones. Parantur & ad sedandam sitim, quale id est, quod *ἀδύσιν* à Galeno dicitur lib. 8. *ἢ καὶ τὸ πῶς*.

**Κατὰ πλῆσιν.** appellatur epilepticorum & apoplecticorum symptoma, quo repente in terram concidunt, vt ait Galenus lib. de totius morbi temporibus.

**Κατὰ πύργη κοιλία.** *ἀδρόως ἐκκρίβη*. hoc est, cōfertim & impetu excrementa profuderit, alius abunde descenderit. annotat Galen. comment. in prorrhæi.

**Κατάρρος ἡ**

**Κατάρρους.** catarrhus. Est descensus humoris è capite in os; sic enim proprie nominatur: quemadmodum cum in nares, *κάρυξ*: cum in fauces, *βραγχίτις*: cum in gurgulionem, *σαφυλή* & *κίων* appellatur. Nascitur eiusmodi distillatio à cerebri intemperie frigida & humida, & ab omnibus quæ replent caput.

**Καταρρομὸς:** est, inquit Gal. translatio officium à sede non naturali in sedem naturalem.

**Καταρχαί.** significat apud Hippocrat. non tantum per initia morbi, sed simpliciter primo, vt annotauit Gal. comment. 1. *εἰς τὴν πρῶτην διαίτην*.

**Κατάστασις.** constitutio. Apud Hippocratem eo nomine dicitur collocatio cuiusque rei in suam sedem, vt annotat Galeus comment. 3. *εἰς τὸ πρῶτον ἔργον*. Idem etiam sic solent vocare omnem cuiusque rei formam, vt scribit Gal. comment. 3. *ἢ ὅτινδε* sed peculiariter dicitur de aere & morbis. Ac in aere quidem dicitur *ἡ πρῶτη φύσις ἐν τῇ πρῶτῃ χρόνῳ*, hoc est, aeris præter naturam temperies: Quæ enim secundum naturam est, *ὥρα*, hoc est anni tempus, dicitur, suntque eius quatuor omnes differentię propriis temperamentis & nominibus designatæ: ver, æstas, autumnus, hyems, in quæ si aliqua præter naturam temperies inciderit, ea non iam *ὥρα*, sed *κατάστασις* proprie nuncupatur. In morbis vero *κατάστασις* vocatur quædam veluti forma morbi, secundum quam ex tantis & talibus constituitur vniuersalibus temporibus, seu qualiscunque ex totius morbi temporibus compositio, quemadmodum Galeus do-

cuit libro primo *ἢ ἀρίστην*. Hæc autem non aliud est quam totius morbi duratio circumscripta temporibus quatuor, quæ totius morbi tempora seu vniuersalia appellamus.

**Κατάστασις.** τὸ *ἢ κατὰστασις καὶ ἀποκατάστασις*, hoc est, veluti quædam confirmatio & animaduersio, apud Hippocr. lib. 2. *τῶν ὁπθιμῶν*, vt annotat Gal. *ἐν τῇς γλώσσῃς*.

**Κατασκαρὸς.** scarificatio. vide *ἐν γράμῃ*.

**Κατατείνειν.** verbum est ab Hippocrate vsurpatum, vt scribit Erotianus, *οὐκ ὅτι τῆς πίσεως, ἀλλ' ὅτι τῆς καταδύσεως*: hoc est, non pro tensione vsurpatum, sed pro dispositione: vt quo loco scribit, *τὸν δὲ ἀδύσιν, πρὶν μὲν καὶ τὸν ἐνδύχτην, πολλὰ θερμὰ λούσαι, καπειτα ὁρμήν κατὰ τεταμένον*, iacentem arque decumbentem significat. deinde paulo post vbi scribit, *καπειτα εἰ ἀρχὴ πρὸς ἔξωτον ὑποοιδήεις πρὸς δὲ ἐνδύχτην, ἀρμύζουσαι τὸ ρήκος τῇ ὑποτεταμένῃ, τοῦτο δὲ τῇ ὑποκατεμένῃ*. Similiter libro de fracturis, vbi dicit, *ἢ ὅτι εἰ ἀπὸ τῆς πλῆν ἑαυτῆς χεῖρας κατατείνειν, ὥς ἐπὶ ὀδόντων τὸ ῥῆμα*, hoc est, eo habitu & figura componens, supinamque collocans. Neque enim toto eo loco *κατατείνειν* aliud significat quam *καταπύδεσθαι*: vt & aliis quibusdam locis *κατάστασις* *αἰτὴ* & *καταθέσις* ab eo dicta est.

**Καταφορέα.** est magna & grauis somnolentia. Huius tamen Gal. libr. de comate duas facit differentias, vt probatissimos medicorum scriptum reliquisse asserit. Vnam somnolentiam vocat, alteram simpliciter cataphoram, vel cataphoram non somnolentiam. Cataphoram somnolentiam vocat, in qua æger profundo & diturno somno premitur. Alteram vero in qua ægri vigilantes manent, cum ipsis diuersæ varique imagines rerum semper succedant, quæ illorum mentem moueant intermumpantque somnum. Quam obrem infomes quidem extant vt plurimum, de lecto autem surgere, vigilantiumque opera exercere nequeunt. Oculi namque eorum maxime grauantur, suntque ad eo in somnum propensi, vt credere possis eos facile dormire posse. Verum non solum non dormiunt, sed etiam spem dormiendi nullam habent. Vtraque autem cataphora, tam ea quæ cum somno, quam ea quæ sine somno est, id habet commune quod ægri oculos attollere nequeunt, summa grauidine detentos, & quasi ad ineundum somnum cōparatos. Vtraque etiam fit grauata ob vtilis succi copiam cerebro, vt in ebriosis: interdum vero & propter pituitosum humorem, aut propter vehementem absque humore frigiditatem. Gal. lib. 13. meth. medendi videtur facere *τὴν καταφορέαν* genus quoddam omnium malorum quibus sine febre sopor quidam altus incidit, his verbis: *ἐπὶ γὰρ καὶ τὴν πρῶτην καὶ δευτέραν κατὰστασιν τὸ πάχος τῆς λυπητικῆς χυμῶς, ὥς ἐν αὐτῇ τῷ σπένδει, καταφορέα βλάβει ἐργάζεται, χωρὶς πυρεθῆναι, ἀλλ' ὁνομαζομένην ἀπὸ πλεονείας καὶ καρύος καὶ κατὰστασιν. εἰ δὲ καὶ σπένδει ποτὲ μετὰ πυρετῶν γίνεται τὰ τοιαῦτα*.

καὶ κατέειπεν τὸ πρῶτον νόσημα λήθαργος. hoc est, vt conuertit Linacer, in contrariis autem viciis excitare, ac noxi humoris qui citra putredinem & citra febrem altos sopores inuehit, crassitudinem incidere arque exālfacere. tales nimirum impetus soporis, apoplexias & caros & catochas Græce vocant. Quod si aliquando humor putrescat, vtique cum febri incidunt ea genera: vocaturque morbus Græce lethargus. His enim verbis videtur velle, apoplexiam, carum & catochen, species esse cataphoræ.

Καταφραστὰς deligaturæ nomen est, quæ iis adhibetur quibus deligare iuxta iugulum conuenit latum os scapularum, pectus, dorsum aut latera. nomen illi inditum est à similitudinē thoracis Romani quem cataphrastam vocant. vt scribit Galen. lib. de fasciis.

Καταφρονεῖν. καταφρονεῖν, apud Hippocr.

Κατὰ χλοα. ἄγαν χλωδόν, valde virentia, apud Hippocratem.

Καταπληθύνειν, ἀπὸ πλεονείας ἐξέρχεται. stupidus atque attonitus euasit, apud Hippocr.

Καταχόμενοι. idem quod κάπχοι, id est, catocho siue catalepsi laborantes, vt scribit Gal. lib. 4. de causis pulsuum.

Καταβαλῶσι. hoc est, circularibus principiis accessuum, apud Hippocr.

Κατὰ νόον. ἐστὶν φρόνησις, ἡ δὲ ἀνένετος, intelligebat, sentiebat, apud Hippocr.

Καταπιδανόν. κατὰ πιδανόν, infirmū, apud Hippocr. Nam & Homerus ἡ πιδανόν αἰὲν ἢ ἀδενού dicit Iliad. 8.

Ἡ πιδανός τῇ νό τοι σερεπὼν, βρεδές δέ τοι ἴπποι.

Καταδηόμεναι. συνδεδεμέναι, id est, colligatæ, apud Hippocr.

Καταπορήν. ἡ δὲ ἀπατήν, hoc est, non potuit. apud Hippocratem, vt annotauit Erotianus.

Κατῆρτητο. ἐστὶν φρόνησις, καθεστήκει, ad mentem rediit, sedatus est, apud Hippocr.

Κατονύεσθαι. idem quod ἀνένεσθαι, apud Hippocr. hoc est, per axem extendere.

Κάτοξυ νόσημα. peracutus morbus. Is dicitur qui intra septimum diem iudicatur. Qui enim longius procedit, simpliciter acutus est. sunt autem duæ eius differentiæ: qui namque exacte peracutus est, quarto die soluitur: qui non exacte, ad septimum vsque producit. Omnis ab initio maximos labores habet: in primos enim dies morbi vigor incidit, vel non longe post quartum differtur. Est autem gemina peracutorum morborum differentia. Alii velut vna quædam accessio sunt, nullo modo remittentes, alii vero vt scribit Galenus in aphor. 36. libr. 4. primam statim accessionem vehementissimam habent, & reliquas per diem tertium proportionē respondentes, sed quæ quartam rarissime excedant.

Κατοχήρ. instrumentū chirurgicum apud Hippocratem. quod aliter ἐσφραγιστὴς dicitur à se de aperienda. sic & quod vteros muliebres diducit, διήσει vocatur. Erotianus τὴν μολπὴν interpretatur.

Κατορχίτης οἶνος. vinum catorchites, quod & fycites alio nomine dicitur. Fit enim è fico, quæ alii, vt scribit Plinius, palmiprimum, alii catorchitem vocant. Habetur eius compositio apud Dioscoridem lib. 5.

Κατοχήν

Κάτοχος. est in somnum, sed sine somno & febre, propensio, per quam & oculi manent aperti & seruatur secundum naturam spiratio. Hic affectus cerebri posteriora magis occupat. Eo qui detinentur, κάτοχοι & καταχόμενοι dicti sunt. Habent autem tenso apertosque oculos, non vt comatosi & cataphorici clausos. In his siquidem humiditas affectionis causa est, neruorum firmitatem roburque dissolvens: in illis vero propter siccitatē tensio oritur, vt annotat Gal. comment. 2. in libr. 1. prorrh. quo loco hanc affectionem exemplo idem scite depingit. Quidam enim ex suis condiscipulis, cum assiduo disciplinarum studio se fatigaret, malo hoc correptus est: iacebat, inquit, veluti lignū prorsus inflexus rigidusque atque extensus, videbaturque oculis apertis nos ita intueri, vt ne conuieret quidem, nihil tamē loquebatur. Is quoque tempore eodem quæ loqueremur audiuisset dicebat, quamquam non euidenter clareque, nonnulla item & memoria tenens referebat, præsentisque omnes sese conspexisset, ita vt quorundam actiones recordatus exponeret, sed neque loqui tunc potuisse neque membrum vllum mouere. Adeo varia erat & differentia huius ægri symptomata, vt partim somno premi, partim vigilare videri potuerit. Itaque composito quoque nomine à quibusdam ἀγρυπνὸν κῶμα appellatur; hoc est, sopor vigilans. Cuius vt symptomata, sic etiam causæ contrariæ esse dicuntur. Nam ex bilioso humore & pituitoso simul in cerebro redundantibus prouenit. Atque vt mistam habet originē, sic nomine composito ἀγρυπνὸν κῶμα appellatur, mediāque affectio statuitur inter phrenitidem & lethargum, & species quædam delirii siue amentię esse, vt habetur apud Aetium. Sunt tamen qui κάτοχον & ἀγρυπνὸν κῶμα differre velint, dicentes τὴν κατὰ φύσιν non compositam, sed simplicem causam esse, frigidiorē scilicet sicciorēque humorem obstruentem ventriculum posteriorem cerebri, quo detentus æger repente in illo permanet habitu quo correptus est, siue stans, siue sedens, oculis etiam vel clausis, vel apertis. Ego tamen multis apud Galen. locis κάτοχον, κατοχὴν, κατὰ φύσιν & ἀγρυπνὸν κῶμα idem significare, & eiusdem affectus diuersa esse nomina deprehendi.

τὴν Κάτοχα. apud Hippocratem. in prorrh. quidam interpretantur ea quæ morbum κατοχὴν vel κάτοχον dictum inferunt: alii vero morbos stabiles firmosque ac veluti hærentes, ἀπὸ τῆς κατὰ φύσιν.

Κάτοχοι. prominentes pinnae quæ vertebris insunt: ἀπὸ τῆς κατὰ φύσιν.

Κάτοχος.



**Καρύς.** dicitur fascia longior quā in orbem faciei & capiti circumdatur, vt *καρὶ περιεσπασμένη* (quod operculum capitis est tribus fasciis constans) comprehendat contineatque sicut docet Gal. lib. de fasciis.

**Καταμυσμός.** modus vnus est reponendi restituendique humeri prolapsi, quo super summum humerum alterius qui maior sit, hominem ægrum collocant, vt summo suo humero æger ala suspendatur, sicut aperte declarat Hippocr. lib. de articulis.

**Καταπεκνὰ φάρμακα.** dicuntur medicamenta deiectionaria, quibus viscera vitioso succo repleta expurgantur: Galen. lib. 7. Methodi sub finem. Proprio & vsitato nomine *καταπεκνὰ* appellantur.

**Κανκαλὶς.** caucalis. Est herba cauliculo dodrantali, interdum altiore, subhirsuto, foliis apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis hispidiisque, umbella in summo candida odorataque. Dioscorides & Galenus apud aliquos syluestre daucum tradunt nominari, non à similitudine, vt aliqui credunt, quasi rudimentum quoddam esset nascentis dauci, sed quod & gustu & viribus id imitetur, cum, vt inquit Galenus, eodem modo excalfaciat, exsiccat & propellat vrinam. Quod vero extremum folium in Gallinæ pedem conformatur, gallinaceum pedem, vt inquit Dioscor. appellantur. Est & *κανκαλὶς* species quædam myrrhæ præter modum exoleta, nigræ & retorridæ: vt author est Dioscor. cap. de myrrhâ.

**Καυλὸν κατὰ μῆκος.** Est fractura ossis per transversum facta, fracti ossis partes ita separans, vt è directo non iaceant, quemadmodum lib. 6. meth. med. Gal. scribit. Idem vero & comment. 2. eis τῆς ἀπὸ σπιν. vbi, inquit, comminuto osse nihil integrum relinquitur partibus inter se recedentibus, ita vt nullo pacto cohereant, huiusmodi fracturæ speciem recentiores medici *καυλὸν* à fracti caulis similitudine appellant, imitati ea in voce Hippocratem qui lib. de articulis de maxilla loquens scripsit *ὡς ἡ κατὰ μῆκος ἡ γὰρ καὶ μὴ κατὰ μῆκος πρὸς πᾶσαν, ἀλλὰ ἑκατέρωθεν τὸ ὅσιν.* hoc est, si vero maxilla rupta fuerit, si non prorsus quidem in caulis modum fracta sit, sed adhuc os continetur. Hoc enim in loco τὸ ἀπὸ καυλὸν δὲ manifestum est opposuit τῆς συνεχέει. Paulus Ægineta author est τὸ καυλὸν κατὰ μῆκος dici etiam *παρὰ μῆκος* & *συνμῆκος*, à similitudine fractæ radiculæ & eucumeris.

**Καυλός.** dicitur in plantis & oleribus in altum surgens veluti virga. Dicitur & *καυλός* ab anatomicis pudendum virile, quod vulgo virgam appellant, Latini penem. vide *αἰδίδιον*. sic etiam ostium vteri vocatur in mulieribus.

**Καῦμα.** æstus. sunt qui interpretentur apud Hippocratem febrem, quam & *πῦρ* appellauit, alii vero ambientis aeris feruorem, alii cauteria & eschārās. quos omnes verum dicere annorat Gal. comment. in aphor. 13. lib. 7.

**Καύσις.** ardens febris. Est febris continua, tertio quoque die acerbior cum ardentissimo calore & siti immensa. Continuum dico quā Græci *συνεχὴς*, non quam *συνόχης* appellant. Est enim ὁ καύσις species febris τῆς συνεχέως, vt quæ habeat tertio quoque die exacerbationes, quas nullas habet *συνόχης*, ab initio ad finem vnica accessione constans. Est autem ὁ καύσις tertianæ febris intermittenti *διασπῆς*, vt qui ab iisdem causis eodem humore, eodem anni tempore, & iisdem corporibus proueniat, à quibus & tertianæ febres excitari solent. In sola accessionum longitudine atque in rigore discrimen est. In tertiana intermittente primum rigor, deinde *ἀνδροβία* est. Verum ardentis febris exacerbationes nullo cum rigore fiunt, nec vnquā integre soluantur, sed modice tantum remittuntur, semperque noua præhendit priusquam prior resederit. Proueniunt enim in febribus intermittentibus rigores, quod per venas & per totum corpus humores ferantur: qui quoniam per arduas febres immobiles sunt, & vna in parte collecti, ideo in ea nullum rigorem inducunt. Quemadmodum autem intermittens tertianæ gemina differentia est, sic & τῆς καύσις. Alius enim exquisitus est, vehemens & biliosus, alius notus, mitior, & pituitosus. Legitimus est, qui ob solam flauam bilem manentem adhuc intra vasa, sine aliquo visceris affectu accenditur. Eius causa est, vt scribit Hippocr. lib. *περὶ διατῆς ἐξέων*, sanies tenuis, quam *ἰχρὴς* vocat, acris & biliosa, à venis per æstatem siccatis attracta, & toto in corpore accensa, vel à partibus robustioribus depulsa in imbecilliore. Neque enim biliosum humorem qui causum facit, colligi in toto corpore necessarium est, vt qui aliquando vel in ventriculo & maxime ipsius ore, vel in pulmonibus, vel parte siua iecinoris, vel ieiuno etiam intestino concludatur. Ac in his quidem locis putrescens, præter febrem, alia quoque multa symptomata generat, è quibus duo præcipue sunt *πασθησμονία*, hoc est, propria & perpetua, calor deurens & sitis inexplebilis, si in parte humor constiterit, à qua sitis solet excitari: alia vero *συνεδρεῖνός*, hoc est, assidentia, vt lingua sicca, nigra & aspera, ventris dolor mordax, deiectio interdum liquida, pallida, vigilia, delirium, & alia pleraque quæ ab Hippocrate lib. 1. epidem. exponuntur.

**Καυστὰ φάρμακα.** adurentia medicamenta. sunt medicamenta calida & sicca quarto gradu, quæ extrinsecus imposita vrunt, subiectasque partes diducunt & aperiunt. Eadem & *ἐκαρσυνὰ* appellantur, quod crustam vstis partibus inducant. Eorum materia sunt: lixiuium, calx viua, auripigmentum, sandaracha, sory, chalcitis, misy & alia id genus.

**Καῖσθημα πύρωσις.** hoc est, inflammatio & ardor, apud Hippocr.

**Καυτήριον.** cauterium. Est quod vrendi vim ha-

bet. Vt supatur tam pro medicamento quod potestate vrit, quam pro ferro candente, cuius vsus plerumque necessarius est, vel ad sistendum sanguinis profluvium, vnde cumque manauerit, vel ad intercipiendas defluxiones, vel ad ossa cariola & maligna vlcera. Id ferrum *καμφορα* Hippocrates appellauit. Erat autem, vt scribit Galenus, æreus calamulus perforatus in fundo, per quem paruum ferrum adurens demissum adurebat.

*Κάμφορα*. camphora. Quid sit non satis constat, propterea quod longe post Dioscoridis, Plinii & Galeni sæcula inuenta sit. Aetius, Astuarius & Simeon & Arabes mentionem eius fecerunt. Ausi etiam ex his quidam sunt quid esset dicere, maxime Aetius in libro quem scripsit de facult. alimentorum: scilicet Camphoram esse gummi aut lacrymam arboris Indicar valde parulæ, nascentis in montibus mari vicinis, cuius lignum sit album, ferulaceum, leue, intra cuius fungosam medullam camphora contineatur. Eius autem facultates idem Aetius describit, dicens maxime eam prodesse acutis morbis, & doloribus capitis à calore contractis: valere etiam cum ad omnium partium inflammationes, tum maxime iecinoris. Cæterum renes & vasa spermatica impense refrigerari, & in iis genituram cogi. Nec tamen omnes eam affirmant arboris esse gummi, sed quidam ex iis quasi dubiam rem proponunt. Alii vero quibus nouissime accessit Georgius Agricola, Arabas & recentiores Græcos male de camphora sentire dicunt, quod eam gummi aut lacrymam esse arbitrentur, sed bituminis speciem esse contendunt. Cuius quidem rei hæc fere sunt argumenta. primum quod mercatores interdum quasdam bituminis particulas simul cum camphora ab Indis ad nos apportent, deinde quod si linum xylinum aquis madidum, cum ex succino conficitur oleum, imponitur in operculum, fumum camphoram olentem emittit: vt non sine ratione dixerit Auicenna, in succino odoratam camphoræ vim inesse. Præterea non minus quam reliquum omne bitumen & facile ignem concipit & ardet. Ad hæc vero accedit Arabum quorundam autoritas, nempe quod Auerrois lib. 5. collig. dicat ambaram, quam non est dubium in bituminis genere contineri, camphoræ speciem esse, quæ in fontibus marinis oritur: quodq; Serapio icriserit camphoram copiosam gigni cum terra crebris motibus conuegitur. Sic enim per terræ motus non aliter quam sulphur & reliquum bitumen profunditur. Est autem duplex camphora, vna natiua, altera factitia. Natiua nō est coloris vnius: nam aut alba est & dilucida, habēs maculas subrubras, aut alba & obscura, aut fusca est. Factitia autem omnis alba est. Vtraque autem acri & amaro sapore est, & odore iucundo. Factitia omnis fere est quæ ad nos defertur in pastillis, atque hoc modo parari dicitur: Bitumen Indicum,

ex quo natiua efflorescit camphora, in vase subiectis carbonibus ardentibus coquitur, eiusque partes tenuissimæ in candidum colorem versæ in operculum feruntur, quod ipsis collectis eam quam videmus dar figuram. Quod si camphora bituminis genus est tenuissimum & subtilissimum, male iudicant qui eam in tertio gradu frigidam esse afferunt. Est enim bitumen calidum. Proinde rectius ille qui scripsit eam in secundo gradu esse calidam & siccam, præsertim vero factitiam, vt experientia docet & sapor comprobatur.

*Καχέξια*. malus habitus corporis. Species est τῆς ἐξέας, contraria τῇ εὐξέῃ. Est autem solidorum corporis partium deprauatio, qua alimentum omne corrumpunt. Habitus enim corporis ipsæ solidæ partes appellantur, quas continentia Hippocrates appellauit. hic ubi permultum recessit à naturali temperamento, tertiam alimenti concoctionē quæ in ipso, hoc est, in solidis partibus, peragi debet, male perficit, alimentum corrumpit, & in qualitatem à natura alienam deprauat. Inducitque cacochymiam (quam perpetuo illa coniunctam habet, cum e contrario non sit necesse, vbi cacochymia sit, illic esse protinus & cachexiam) atque omne excrementi genus. Corrumpi enim potest alimentum, non in aquam modo, vnde hydrops (quod vitii genus lib. 1. de aliment. facult. de lente agens, aquæ καχέξια appellat ad aliarum differentiam) sed & in bilem vtramque ex quo interdum icteri, psora, lepra, elephantiasis, vitiligo: hi enim morbi à malo habitu proueniunt. quia vero corrupto alimento non potest probe nutriri corpus, fere fit, vt cachexiæ atrophia succedat: quare inductus Celsus lib. 3. καχέξια definiuit esse tabis speciem vbi malus corporis habitus est, morbum per symptoma definiens. Est autem cachexia non vniuersi modo corporis vitium, sed & singulari partium: namque incolumi reliquo corpore cerebrum quibusdam melancholicis καχέξια est, & ex longa lippitudine, vt ait Galenus, oculis καχέξια inducitur. Ea euenit quoque iecinori, deque ea præcipue medici egerunt, quod multorum morborum origo sit: siquidē de hac intelligendum est quod scripsit Paulus lib. 3. cap. 47. τὴν ἀρχὴν τῆς ὑδρωπικῆς πάθους, καχέξια καλεῖται εἰσὶν αὐτῆς. hoc est, principium hydropicorum morborum, cachexiam vocare consueuimus. Solam enim iecinoris καχέξια intelligit. similiter & Aetius lib. 10. ex Archigene dicens καχέξια à Græcis appellari eum corporis habitus in aquositate diffunditur. id enim & quæcunque postea dicit, ad eam modo καχέξια pertinent quæ iecur occupat. verum iecur tantæ est in corpore nobilitatis, vt malus eius habitus protinus in vniuersum corpus abeat, totique communetur, & vniuersalem cachexiam inuehat. *Κάχλα*. dicitur à quibusdam τὸ βύρραλον, vt habetur apud Dioscor.

**Κάρυος.** vide **καρύος.** est autem legumen frum-  
taceum. Dicitur à quibusdam hordeum in  
furno tostum, vt facilius commoli possit &  
in farinam redigi. Significat etiam rorisma-  
rii semen apud Dioscoridem. Similiter &  
Theophrastus histor. plantarum lib. 9. cap.  
12. scribit **καρύων** duo esse genera: alte-  
rum **καρύον**, alterum **καρύον**, & huius **καρύον**  
vocari **καρύον**. etiam si nonnulli **καρύον**  
nominari volunt ipsam **καρύον** **καρύον**  
da. vt & fructus & planca eodém nomine  
appellentur.

**Καρυόν.** sic dictum est à recentioribus Græcis **καρυόν**, quod in eo semina per ordinem  
digesta, quibusdam thecis inuoluentibus  
quasi capsulis congerantur.

**Καρυά.** **δέναν.** apud Hippocr. vt annotauit Ero-  
tianus. hoc est, vincire & deligare.

**Καρυά.** apud Hippocr. **αὐτὴ καρυά.** hoc est, scinde-  
re & diuidere.

**Καρυάδες.** dicuntur grana seu semina fici.  
Hæc sicca sunt & quodammodo adstrin-  
gentia, deiorataque permeant non altera-  
ta, non in chylum veria, nulla denique in re  
immutata, qua in re similia sunt acinis vua-  
rum.

**Καρυά.** miliaris. species est herpetis. sic dici-  
tur à similitudine quam habet cum milio.  
Quippe non protinus vlcus facit, quemad-  
modum alter herpès, sed admodum exiguas  
pustulas ad speciem milii, quæ ipsæ interpo-  
sito spatio in vlcus abeunt. vide **ἐρπη.**

**Κάρυος.** milium. Est frumenti genus stipula cu-  
bitali, geniculata, folio arundinaceo, semine  
in longis paniculis tereti & pendulo, radice  
numerosa altaque ac multiplici fruticante  
culmo. Eo, inquit Galenus, in panes abutun-  
tur quibus cæterarum frugum inopia est:  
sed hi corpus parum alunt, atque etiam re-  
frigerant, suntque natura siccissimi & fria-  
biles. Sunt autem flarulenti & concoctu dif-  
ficiles, prauumque succum gignunt. Cæte-  
rium milium primo ordine refrigerat, refica-  
cat vero tertio exoluto, aut certe secundo  
intenso. Paululum etiam habet tenuitatis.  
Ventrem sistit, & sacculis impostum citra  
morsum desiccatur.

**Κάρυος.** à Strabone dicitur **καρύος**, id est, mi-  
lium.

**Κάρυος.** dicuntur ab Hippocrat. ex defluxione  
diurni affectus, cum in omnibus articulis,  
tum præcipue citrà coxendicem. Affert Ero-  
tianus ex eodem Hippocrate, **καρύος** appel-  
lari **καρύος** **καρύος** **καρύος**. hoc est,  
verustas in articulis affectiones.

**Κάρυος.** idem quod **καρύος**, de quo postea. Nam  
apud Galenum & Paulum per **καρύος**, A-  
pud Dioscoridem & alios fere omnes re-  
perio scriptum per **καρύος**: apud Paulum rursus  
etiam **καρύος**.

**Κάρυος.** oleum cedrinum, quod fit ex malis  
cedri, vt Plinii verbis vtat. Columella cedriū  
liquorem nominat, Galenus **καρύος** vocat,  
viribus **καρύος** mitiorem.

**Κάρυος.** sic dicitur cedrus maior, cuius duæ et-

iam traduntur species. Quæ florèt, sterilis  
est: fructifera, flore vidua, semine & corticē  
cupressi. Triplici dotatur fructu iam manu-  
ro, adolescente & recens nato.

**Κάρυος.** cedria. dicitur modò pix cedri, modò re-  
sina cedri, è magna cedro quæ **καρύος** vo-  
catur, emanans, ita vt si propriè sit loquen-  
dum, nihil aliud sit quam cruda cedri lacty-  
ma. Hanc dicunt quidam à cedrio differre,  
quod **καρύος** liquidius sit & magis oleosum.  
Indifferenter tamen authores & cedriam &  
cedrium dicunt, & pro eodem **καρύος**, **καρύος**  
**καρύος**, **καρύος** vsurpant.

**Κάρυος.** est oleum quod è cedro nascitur, suæ  
succus est cedri è ræda eius concisa furnis,  
qui primus aquæ modò fluxerit in canali.  
Namq; sequens liquor iam pix, quam **καρύος**  
vocant, non cedrium appellatur. Sed nunc  
pro resina, nunc pro sudore rædarum, nunc  
pro pice confundunt authores cedriam &  
cedrium indiscriminatim nominantes. Eo  
reliquæ res cum sunt vnctæ, vt etiam libri,  
quantum Vitruuius placet, à tincis & carie  
non læduntur. Huius tamen vsum Plinius  
damnat propter ancipitem naturam viuen-  
tia corrumpendi, & defuncta conseruandi,  
cum vitam auferat spirantibus, defunctisq;  
pro vita sit. Cuius quidem diuersitatis ratio-  
nem Galenus docet, quia tametsi adurat, ita  
vt ordine quarto calfacientium censeri me-  
ruerit, inter omnia tamen erodentia medi-  
camenta, infirmissimum sit. Proinde viuen-  
tibus ad motum vitali calore adiuncto ac-  
quirunt vires & quasi accenditur, atque ita iu-  
gulat: sed defunctis additum, putrilaginem  
exerit & vitiosos humores depascit, qui-  
bus detractis corpora à labe corruptionis  
asserit.

**Κάρυος.** cedrula. est frutex cedro similis, in Phry-  
gia nascens authore Theophrasto. **καρύος**  
autè Nicander, Galenus & Dioscorides fru-  
ctus cedri appellant, quemadmodum **καρύος**  
de fructus lauri dicuntur. quibuscum sen-  
tit & Græcus Nicandri interpres in Theria-  
cis, scribens etiam eos oleoso humore abun-  
dare; quo aduersus serpentes commodissi-  
me corpus perungitur. Minus hi vrunnt quæ  
cedrus os gustantis, vt mandi quòque pos-  
sint. Si tamen copiosius edantur, caput, vt  
ait Galenus, tentant, & dolorem creant, &  
interanea velicatu torquent.

**Κάρυος.** cedrus. est arbor iunipero non absimilis,  
radicibus ratis, per summa terræ dispersis,  
folio duro, acuto mucrona, capillato, spino-  
so, pungente, ramoso, ligno contorto, nodo-  
so, frequentibus alis, medulla rubere, odora-  
ta, baccis myrti flauis, hilarib; odoratis, escu-  
læis, nono fructu per autumnū cū anniculis  
pendere. Saxosis & frigidis locis gaudet, so-  
lumq; consimile quærit. Nobis præterquam  
nomine omnino ignota est. Perpetua coma  
viret. Galenus duplicem esse scribit, alteram  
fruticosam iunipero adsimilem, alteram ve-  
to arborem non exiguum: vtramque vero  
& calidam & siccam esse tertio ordinem.

**Κεδρόν** ἐλατον. ἢ κεδρία, apud Hippoc.

**Κεδρόμυλα.** sunt mala quæ & **Μηδία** vocantur: Latine Medica mala & Citra. In arbore cresunt omnibus anni temporibus pomifera, aliis deciduis, aliis subnascentibus.

**Κεδρώς.** sic dicta est à quibusdam ἢ ἀμπρολέων. hoc est, vitis alba.

**Κερίαι.** sic dicuntur lumbrici lati, apud Hippoc. qui & **ταρίαι** dicti sunt. vide **ἐκρήγες**.

**Κεράκται.** φωνηπαί, hoc est, vocales, apud Hippocratem, ἀπὸ τοῦ κρᾶζον, hoc est, à clamando.

**Κερωμόει.** ἐκώματι ἴψ, hoc est, comate teneri, apud Hippocr.

**Κενεαγγείη.** vasorum inanitio. Id enim proprie & primum significat, eoque nomine Hippocrates omnem vacuationem appellat ab accidente, quod ab omni vacuatione vasa vacua reddi soleant. Quidam tamen ex interpretibus Hippocratis, vt refert Galenus, **κενεαγγείω** interpretantur **πλὴν φλεβοπρίαν**: aliqui vero, inter quos ipse Galenus est cum plerisque in locis, tum comment. **εἰς τὸ ἀεὶ διαίτης ὀξέων, πλὴν αἰσίων**, id est, in ediam, tanquam nomine generis etiam in specie designanda omnes homines vti consueverint.

**Κενέβεια.** morticinæ carnes. **τὰ θνητὸν δὲ καὶ νεκρὸν κρέατα**, apud Hippoc.

**Κενών.** vocatur pars ea corporis quæ inter thoracem est & os quod ad ilia pertinet. sic dicta est, quod inanis sit & desidat, vt annotavit Galenus commentar. 2. **εἰς τὸ κατ' ἰσχυρεῖν**. Idem commentar. 3. **εἰς τὸ ἀεὶ ἀπὸ θανάτου** scribit ilia ab Hippocrate vocari **κενῶνα**, eamque regionem ab eo intelligi quæ est inter ossa coxarum & costas nothas, quæ omnino sine osse est. Similiter comment. 2. **εἰς τὸ ἀσθενεῖν**, vbi scribit Hippocratem eas quæ in in spatiis alui inanibus (Latini ilia vocant) continentur partes, vno communi vocabulo complexum esse. Has autem esse ieiunū, lactes tenuiaque intestina. Namque verisimile esse omnes eas partes ab Hippocrat. **κενῶνας** appellari quæ inter extremam thoracis costam & coxendicis ossa continentur. Siquidem inanis tota ea regio videtur, si tam cum inferis quam cum superis partibus, vtrisque ossibus conferatur. Alio nomine **λαγόνες** dici videntur.

**Κνήκη** & **Κύρον**. vide **ἀκνίς**.

**Κενὸς σπυγμός.** pulsus vacuus. Qui digitorum impressione confidet, seu qui aeris modo arteriam excitat, vt digitorum impressione loci inanitas occurrat. Contrarius est **τῷ πλήρει**. sumptaque est tota hæc differentia à quantitate infusionis humorum arteriæ, seu à contentis in capacitare arteriæ. vide Galenum lib. 4. de pulsuum dignotione.

**Κενταύριον.** Centaurium. herba est duorum generum: vnum maius, alterum minus dicitur. Est autem Centaurium maius folio nucis suglandis oblongo, viridi brassicarum colore, ferratis in ambitu, caule rumicis, binum ternumque cubitorum, agnatis multiplici

sobole fruticantibus ab radice, in quibus capita ceu papaverum è rotundis oblonga: flos in cæruiesum inclinatus, semenque cnico simile, floccis innolutum, vt in lanigeris solet floribus, radice vasta, solida, ponderosa bicubitalique, succo madida, acri cum adstrictione quadam, nec citra dulcedinem rubescente. hæc est quæ nunc ab officinis, quam falso nomine, Reuponticum nominatur. Est autem dictum Centaurium quod ipsum Chiron Centaurus inuenit habet facultates contrarias: acris enim est eius radix simulque adstringens cum leui dulcedine. Itaque & menses & fœtum prouocat, & vlcera glutinat sanguinemque reicientibus prodest. Atque etiam spirandi difficultati & inueteratæ tussi cōuenit. Centaurium vero minus origani hypericiue simile est, caule sesquipalmum alto, fruticanti, anguloso, lychnidis floribus è puniceo purpuratis, foliorum prælongo & minuro, partu triticeo, radice tenui, supernuacia & prorsus inofficiosa, succo herbæ efficax. Idem aliqui **λεβάνιον** vocant, quoniam secundum fontes nascitur: alii **λεμνίστιον** quod propter lacus in riguis vberim proueniat. Latinis fel terræ propter amaritudinem summam, & febrifugia, officinis Centauria minor dicitur. In foliis eius vincit qualitas amara particeps cuiusdā adstrictionis. Itaque exiccant, & citra morsum. Glutinat vulnera, & vetusta includit cicatrice, sed & iecinoris obstructions expedit, forisq; impositum lienes emollit.

**Κενταύριος ῥίζα.** sic dicta est à quibusdam ἢ **ῥυπανή**, vt habetur apud Dioscoridem, forte propter radicis amaritudinem.

**Κένωσις.** vacuatio. Est humoris è corpore, aut aliqua eius parte detractio. Detractionem appello **καταίρεσις**, quæ quoniam tum de liquidis, tum de solidis dicitur, recte genus vacuationis statui potest, vt quæ liquidorum tantū sit, vt scribit Gal. com. 3. in lib. 6. **ἢ δὲ διὰ τὸν αἶμα**. Itaque non omnium quæ in corpore continentur euacuatio proprie dicitur, sed humorū tantum. Spiritus enim proprie euacuatio non dicitur, sed vel **διὰ φόρησις**, vel **λύσις**, vel si lubet alio nomine appellare, quo ipsius resolutio dissipatioque significetur. Neque similiter si quid intrus solidum contineatur, quod eximi debeat, vt **ὑποσφύρισμα**, porus inutilis, ossium ruptorum fragmenta, id **κενῶν** dicitur, sed **καταίρεσις**, hoc est, tolli aut auferri. Cum vero humores, de quibus proprie vacuatio vsurpatur, multiplices in corpore contineantur, & cuiuslibet eorum vacuatio possit contingere, attamen vt scribit Gal. in aphor. 17. sect. 2. Hippocrat. **κένωσις** simpliciter dicere cōsuevit, quādo æqualis sit omnium humorum vacuatio: **καταίρεσις** vero quando ii vacuantur qui vitiosam adepti sunt qualitatem. Sumptum tamen est à Galeno & posterioribus medicis vacuationis nomen generalius, vt quicquid siue naturæ sponte, siue arte medici ex toto corpore, vel aliqua parte quouis modo expellitur, vacuari dicatur.

Cum

Cum Quicquid dico, non spiritus, non flatus, non vllum excrementi genus, non denique factum ipsum excipio, quod ipse etiam partus, ipsaque lactis in mammis generatio, species quædam sint vacuationis, sicut Galenus lib. de venæ sectione aduersus Erasistratum prodidit. Ex quo apparet multas esse vacuationis differentias. Ab humore quidem, quod alia sit humorum omnium equalis vacuatio, quæ quidem exquisitissima sit per venæ sectionem, vt scribit Gal. commentar. aphor. 17. lib. 2. & secundum eam quæ per malleolorum scarificationem perficitur, vt ipse facere consueuerat, & quæ per exercitia, vel frictiones, vel balnea, & præterea ex accidenti per inedia. Neque enim per se ipsam inedia euacuat, vt singula ante dicta, sed ratione transpirationis. Nullo enim ingesto cibo in vacuati locum, tunc manifeste apparet facta vacuatio, quæ ante latens & cæca fuerat. Alia vero vnius tantum humoris sit, aut excrementi, vt pituitæ, aut bilis tum fluxæ tum atræ purgatio, aut vrinæ, vel sputorum, vel aquarum in hydropicis prouocatio. Ab efficiente vero causa vacuationis, quod alia spontanea sit, quam *ἀνήμελον* appellat Hippocrates, alia arte fiat. Illa rursus duplex, naturalis & præter naturam, vt est apud Gal. comment. aphor. 2. lib. 4. Naturalis, quæ à natura bene valente & munera sua optima fungere citra vim vllam perficitur. Nam quicquid superfluit aut vitiosum est, id omne per se reicit deiectione, mictu, vomitu, sudore, ruffi, sreatu, & aliis id genus modis. Præter naturam vero, quæ vel retentricis facultatis imbecillitate sit, vel humorum copia, aut acrimonia eam etiam valentem irritant. Quod genus vacuationis etiam symptomaticum appellatur, & potest in omne genus vacuationis incidere. Per artem vero vacuatio fieri dicitur, cum natura vi aliqua externa sollicitatur ad excretionem. Nam hæc quoque nō minus quam reliquæ omnes, naturæ opus est, sed præstidiiis externis coactæ & irritatæ. In id autem ars naturam sibi in eo maxime imitandam semper proponens, multâ auxiliorum genera comparauit, venæ sectionem medicamenta, *φλεγματῆρά, χολαγῆρά, μελαναγῆρά, δισπηλικά*, & alia quo venarum vteri, aut ani orificia aperiant, vel vomitiones etiam excitent. Similiter vero & à subiecto à quo aliquid vacuatur, duplex est vacuationis differentia. Aut enim illa à toto corpore proficitur, vocaturque à Galeno *κατὰ*, hoc est, communis, vacuatio, in lib. artis medicæ, vt quæ contingit per magnas & copiosas vomitiones, alui deiectiones, sudores & sanguinis effusiones: aut humoris est aliqua parte contenti, quæ *ἰδίᾳ*, hoc est, propria, vacuatio vocatur. Huius generis sunt apoplegmatismi, errhina, & per nares mediocris *αιμορραγία*. His enim cerebrum ipsum vacuatur: Item vomitus mediocris & eorum modo quæ in ventriculo continentur, &

balani atque clysteres intestina vacuantur: similiter menstrua naturali modo procedunt, & sanguinis per hæmorrhoidas moderata profusio. ad hæc scarificationes, hirtudines, & quicquid etiam impactum in parte humorem potest reuellere. Quod enim à parte aliqua reuelliatur, id ab ea vacuatur, etiam si corpore non excefferit. Præterea vacuationum alia sub sensum cadunt, alia sensibus usurpata non possunt. Sensibilis quidem est quæ sit venæ sectione, purgatione, sudore, apoplegmatismis, vomitionibus, clysteribus: sub sensum non venit quæ quotidie per *τὴν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν*, hoc est, insensibilem transpiratum, in nobis peragitur, & quam balnea, frictiones & medicamenta *ἀπορροῦν* cuti adhibita moliantur. Hæc enim humores attentant & per halitum digerunt, ac flatus similiter, qui quamuis generali vacuationis significatio vacuari dicatur, magis tamen proprie ita dicuntur, si sensibiliter & cum sonitu erumpant. Sed & humoris reperiussio quæ frigidis & adstringentibus medicamentis perficitur, species quædam vacuationis censeri potest, quod humorem loco pellat, partemq; eo vacuum relinquat.

*Κεράια*. cornua. Sunt duæ vteri apophyses exiguæ, à lateribus ad ilia, papillæ seu cornibus exorientibus similes quas ob id *κεράϊες* Dioscles appellauit. In hæc duo cornua semen muliebrem excernitur, & contractæ allantoidis extremitates desinunt. Herophilus horum cornuum figuram dimidii circuli reuolutioni comparauit. Eudemus *κεράϊας*, id est, citros, vocauit, à citris polyporum similibus. Praxagoras & Philotimus *κόλπας*, id est sinus nuncuparunt: vnde & mulieris vterum *διόλπον* dixerunt.

*Κεράτις*, sic dictum est à quibusdam fœnumgræcum, quoniam fructum corniculis similem habeat: à quo etiam idem Hippocrates *ὀπίκερας* appellauit.

*Κεράμιον*. mensura est quæ Atticis *μετρητής*, Romanis cadus appellatur. vide in dictione *μετρητής*. Eius nota fuit apud Græcos κρ, cum m desuper imposito.

*Κεράβολον*. dicitur à rusticis semen quod serendo bubula cornua attingit, perque ea decidit in terram. Quod quidem genus seminis, fructum gignit *ἀπὸ κεράβου*, vt scribit Plutarchus in Sympliciis, hoc est, rebellem nec coctiuum.

*Κερασμα*. apud Hippocr. significat aquæ mixturam, quæ aquæ frigiditatem calidiore addita frangimus, vt annotat Gal. comment. 3. *εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ διαίτης ἐξέειν*.

*Κεράσις*. cerasus. Arbor est folio mespili, prædura, latiore: corticis læuiore, colore, crassitudine tilia similis, flore albo, pyri vel mespili, pluribus flosculis racematim congesto, subaceo, fructu rubro, diospyri figura, magnitudine fabæ: quanquam acinus diospyro prædurus, ceraso mollis. Fructus qui Græcis *κεράσια*, Latinis cerasia vel cerasa dicuntur.



tur, non semper parisi & eiusdem facultatis prouenit. Nam & in harum, sicut etiam malorum granatorum & malorum quibusdam austera qualitas, in quibusdam vero dulcis, nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum cocta sunt ac matura, quædam admodum sunt acerbæ, quædam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasis non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt, subducunt, sed minus grata stomacho sunt. Contra austera, acida pituitosis excrementisque stomachis sunt apta. Siquidem magis quam austera desiccant, & nonnihil etiam incidunt.

**Κερα.** cornua. Numerantur inter affectus præter naturam. sunt autem duæ eminentiæ offese quæ prope tempora nascuntur. dicuntur & *διουριστοι*.

**Κεράνια.** siliquæ. ubi *κεράνια* simpliciter dicuntur, significant siliquas, hoc est, fructus arboris, ceratoniz, digitorum hominis longitudine, interim falcata, pollicari latitudine, prædulces, sed concoctu difficiles & mali succi. Eas recentiores Græci *ζυροίερα* vocant. Quæ vero *κεράνια ἀκαλής* dicuntur, significant, ut ait Galenus, fructum acaciæ, quam spinam esse aborescentem Dioscorides tradit.

**Κεράιον.** siliqua. Est arbor siliquas, quæ *κεράνια* appellantur, ferens. Est enim *κεράιον* & arboris & fructus nomen, quanquam Galenus arborem ipsam *κερατωνίαν* scribit nominari.

**Κεράιον.** siliqua est dimidia pars lupini, pendens grana quatuor hordei: lupinus enim pondere suo octo grana hordei exuat. Huius nota apud Græcos fuit *κ* cuius apex inferior linea recta per obliquum sectus esset, & desuper imposito.

**Κερατιδής χιτών ἢ ὀφθαλμῶν.** cornea tunica seu membrana. Est tunica oculi secunda, hoc est, proxime subiecta adnatæ tunicæ, quam *ὀφθαλμική* appellant. Oritur à crassa cerebri meningē, multo tamen quam ea euadit durior atque firmior, totumque oculum circumdat. Prætenditur enim humori crystallino veluti operimentum & propugnaculum aduersus ea quæ extrinsecus possunt accidere. Ideoque non modo densam, sed etiam prætenuem, albam & pellucidam fieri oportuit, ne villo pacto visionem, humori crystallino (quod primum est visus instrumentum) prætersa impediret. Itaque non aliter quam cornu prætenuē & quam accuratissime deorsum condita & humorem eum tuetur, & splendorem nihilominus transmittit. Græci etiam *κερατιδής* appellarunt, siue propter firmitatem, siue quod per eam, qui illi adiacet internus humor, tanquam per cornu trasluceat, siue quod cornus instar veluti in laminas dissoluatur, ut scribit Rufus Ephesus. Pluribus enim seu corticibus constare dicitur à Galeno lib. de oculis. Ut autē

illa sic composita aptissima est ad visionem, ita cum eius pars, quæ pupillæ antestat, crassior, aut spissior, aut humidior est facta, visionem impedit: similiter si colorem mutauit. Nam crassior & spissior visus hebetudinem creat: humidior non eam tantum, sed etiam ut quasi per caliginem, vel nebulam, vel halitum quempiam, vel fumum cernatur, efficit. Mutato autem eius colore, sicut per regium morbum contingit, pro natura coloris error in visu responderet. Rugatur & ipsa iis qui ad extremum senium perueniunt, tum propter senectæ imbecillitatem, tum propter spiritus superne affluentis penuriam. eoque fit utri, seruata etiā pupillæ magnitudine, imbecillius, aut nullo etiam modo videant.

**Κερατοφύλαξ,** herba est foliis seriphii, vel potius rorismarini aut lini quoque, capitulis arenitibus, citris subluteis. Sic dicta est quia partem oculorum *κερατιδής*, hoc est, corneam, defendat, salutique percussam restituat. A vulnerariis cartophilago corrupte dicitur.

**Κερατώνα.** dicitur, ut scribit Galenus, arbor siliquas ferens, quæ *κεράνια* appellantur. Cui & vim siccandi & adstringendi inesse scribit.

**Κεράννα.** sic dicitur à quibusdam *τὸ αἰχρῶν*, siue sedum minus, quod fulminibus aduersari credatur, nec iis domum vnquam percuti, in cuius tegulis vireat.

**Κεράνιος.** deligaturæ nomen est, quæ medio pettori & dorso deligandis conuenit. Galenus libro de fasciis duas eius differentias describit.

**Κῆρυς.** radius. est os alterum cubiti superius, sed minus & breuius. Nam cum cubitus generatim dictus duobus ossibus constet, vno quidem inferiori & subiecto, sed grandiore, altero vero superinsidente & breuiore, illud Græci *πῆχυον*, eodem cum tota parte nomine, hoc *κερίδα* à figura rotarum paruorum radios imitante nuncuparunt. Iunguntur inuicem hæc duo ossa utroque sine validis ligamentis, verum radii finis superior leuiter cauus externum brachii condylum amplectitur, hacque diarthrosi manus tota nunc in primum, nunc in supinum adducitur. Est autem radius non rectus, sed in arcus modum inflexus adeo ut vtrique parte cubito coniunctus, in medio tamen dehiscat.

*κερίς* etiam significat pistillum, quod sæpe & *διδύχ*, cochleare alias significans, itemque *κελιδόν* atque *ὕψος* à Græcis medicis appellatur.

**Κέρκωσις.** cauda. morbus muliebris. Est autem carnosa quædam substantia, ab ore vteri incipiens, & muliebre pudendum replens, interrim etiam foras caudæ modo procidens, vnde & nomen habet.

**Κῆρυξ.** *τὸ κέρχυν ποικίλον*, hoc est, asperitatis effectiuum, ve annotat Galenus in interpretatione vocum Hippocratis.

**Κέρχυνος.** est lenis quædam ad tussendum propensio, similitudinem cum nausæa habet. Ut enim

enim nausea vomitum præcedit, ita *κέρχρος* tussim. Itaque vt non semper post nauseam vomitus sequitur, ita neq; post *κέρχρον* tussis propter causæ paruitatem. Nam sæpe ex parua faucium aspredine *κέρχρος* fit, sæpe vero ex tenui aliquo exiguoq; profus humore, siue is à capite descendat, siue in asperis arteriis collectus sit. Hoc autem symptoma sic appellatur *κέρχρον* significat enim *κέρχρος* apud Ionas idem quod *κέρχρος*, id est milium. Itaque cum in faucibus asperitates quædam parua veluti granorum milii sentiuntur, id *κέρχρον* nominatur, à quo *κέρχρως* dicitur, quod fauces exasperat, & exiguum tussim mouet, vt annotat Galen. comment. 3. *εἰς τὸ ἀπὸ τοῦ ἀσπιδίου*.

*Κέρχρως* dicuntur, inquit Eronianus, apud Hippocratem *τὰ τραχείας ἐπιδαστάς ἔχοντα*, aspera, inæqualia: vt & apud Articos *κέρχρως ἀγρία*, *τὰ τραχείας ἀνωμαλίας ἔχοντα*, quæ asperas inæqualitates habent. sunt tamen qui apud Hippocratem non *κέρχρως*, sed *καρυκὼν* & *κερυκὼν* scribant.

*Κέρχρον*. Beronica. herba est caulem habens tenuem, cubiti altitudine vel maiorem, quadrangulum, folia longa & mollia, frondis quernæ modo in ambitu diuisa, ad radicem maiuscula, odore iucundo. In summis caulibus semen veluti satyreæ spicatum inest. Radices vt veratri exiles. Verones, vt Plinius tradit, in Hispania eam inuenere quæ in Gallia Beronica. dicitur in Italia ferratula, Græcis *κέρχρον* vel *κέρχρως*, quoniam frigidis locis reperiatur. Amariuscula est & subacris. Incidit, calculos in renibus rumpit, pulmonem, pectus & iecur expurgat, menses ciet, comitialibus prodest.

*Κεφαλαία*. est inueteratus & ægre cedens capitis dolor. Hic vel continuus est vel ex interuallis repetit & exacerbatur, suntque interualla vel ordinata vel inordinata. Intermitunt enim aliquando eiusmodi exacerbationes, velut in comitali morbo, interceditque aliquando tempus quoddam dolore vacuum. Verum repetit facile & leui de causa proritur dolor, adeo vt neq; strepitus, neque vocem vehementiorem, neque splendorem, neque vini potum, neque odores quibus caput repletur ferre possint, neque item motum. Itaque in quiete & tenebris ægri ob dolorum magnitudinem decumbere cupiunt, quod tanquam à malleo caput sibi pertundi videatur. Quidam enim veluti contusionem quandam aut distensionem sentiunt, non paucis vere vsque ad oculorum radices dolor progreditur, quod signum est cerebri membranas dolore affectas esse. Nam quandoque in pericranio tantum est, qui quidem ad oculos non peruenit, sed in superficie tantum hæret. Cæterum ex doloris qui in cephalæa sentitur vehementia & diurnitate, debilitas magna per eam facile accedit, vt prompte ab omni re afficiatur, & in eo differt maxime à cephalalgia.

*Κεφαλαία*. est dolor capitis nec diurnus nec vehemens, nec cum magna capitis imbecillitate coniunctus, sed qualis à crapula, à sole, à labore aut febribus excitari solet. Ea enim in re *κεφαλαία* differt *κέρχρον* *κεφαλαία*, quod hæc inueteratus & ægre cedens dolor sit, & propter coniunctam capitis imbecillitatem facile irritabitur: illa autem nihil horum sit, sed omnia habeat multo mitiora.

*Κεφαλή*. caput. Appellatur id totum quod collo suprapositum est. Cuius pars quanquam facies tota existat, attamen duabus potissimum partibus constare dicitur, cranio & cerebro. in quorum alterutro si quis aut vulnus acceperit, aut sentiat dolorem, capite laborare dicitur. Ex quo fit, vt quæ cerebri aut cranii propria sunt, etiam toti capiti tribuantur. Est autem caput virtutis animalis domicilium, & sublime positum propter oculos, cum nullius alterius sensus, & nullius denique principis actionis gratia ipsum in summo collocatum esse oporteat. Collo suprapositum est, eique gemina diarthrosi coniunctum, vna quidem qua processus duo occipitis quorum vnus dexter alter sinister est, cum duabus primæ vertebræ supernis cavitatibus articulantur: altera vero per quam accliuus & prælongus secundæ vertebræ processus quem *ὀδόντα*, hoc est, dentem Hippocrates, alii *πρὸς πρῶτον* nominarunt, cum prima vertebræ & cum occipitis cavitare, inter duos illos occipitis processus iungitur: subit enim ille dens in cavitatem primæ vertebræ, & deinde in occipitis cavitatem inter dextrum sinistrumque eius processum mediam inseritur, & rotundo robustissimoque ligamento illic connectitur, sic fit vt circa ipsum dentem caput cum prima vertebra, non aliter quam ostiorum verticilla circa ipsos vectes, circumagatur. Hæc prima & præcipua est capitis diarthrosis & omnium etiam securissima, tribus scilicet ligamentis validis, & octo, vt scribit Galenus lib. 12. v. part. musculis munita. Id quod non est temere à natura factum, quod sola hæc diarthrosis non dico luxationem magnam, sed ne deflexionem quidem vel temporis momento ferre potest, quod animal repente motu omni & respiratione priueretur. Habet autem vtrique diarthrosis suum vsum. Nam cum sint duo tantum capitis motus, rectus, qui firmanuendo & renuendo, seu flectendo & extendendo, & obliquus quo caput in latera circūagitur (is enim quo in humeros caput inclinatur, vertebrarum totius colli, non autem capitis articulationū motus est) rectum quidē perficit illa diarthrosis vertebræ secundæ cum prima & cum occipite, per processum illum facta quem *ὀδόντα* diximus vocari: obliquum vero illa prima de qua diximus. Quod tamen non est ita accipiendum, vt non etiam iuuetur ille quidem prima, hic vero secunda diarthrosis: sunt enim sibi inuicem

adminiculo. Cæterum quæ capitis figura sit, quæ magnitudo, quæ futuræ, *ἐν τῷ κεφαλίῳ* explicatur, quod ad ipsum propriè hæc pertineant: quæ verò sint functiones, *ἐν τῇ ἐνέργειᾳ*, de quibus vide suis locis.

*Κεφάλι* etiam dicitur in ossibus, quod in illis extremum est crassius & rotundum, à similitudine quæ illi est cū vero capite. quāquam non sit necesse partem illam extremam ossis plane rotundam esse & capitis modo eminere, siquidē in illis etiam caput dicitur, quod cavitatē glenoide depressum est, in modum capitis semipurati, quale in publicis sectionibus anatomici cerebrum ostensuri, serra diuisum exhibent.

*Κεφαλικά φάρμακα*, dicuntur medicamenta capitis fracturarum quæ ad crassæ membranæ duplicaturam vsque peruenere. Emplastra sunt. Eorum virtus est, vt ossium squamas sursum attrahant, ac in pristinum locum reuocent, & fragmenta tum in capite, tum in aliis corporis ossibus educant. Habent enim acrimoniam quandam, vt ex alto in superficiem extimam non ossa modo, sed iis quoque multo magis humorē crassum aliquem & viscosum vel omnino deprauatum attrahant. Ea autem catagmaticis valentiora sunt. Siquidē cephalica abstergerendi, digerendi, & siccandi facultate prædita sunt. horū materia est, iris Illyrica, erui farina, manna siue purgamentum thuris, aristolochiæ, panacis radicis cortex, cadmia elora, squama aris: in summa omnia quæ extergere citrà morsum possunt. Quibus plerique paululum ex adstringentibus admiscuerunt, tum vt quod partibus male affectis influit repelleretur, tum vt abstergentium facultatem in profundum vsque deduceret. Verum nisi adstringentia elaborentur tritura quo ad vsque in puluerem redigantur, noxam magis quam præsidium afferunt iis quæ trahendi vim obtinent. Optime autem elaborantur, si ex aceto acri lauiā reddantur.

*Κεφαλὴν*, vocatur ea linguæ pars quæ est ad fauces, quam & *γλῶττι* pleriq; nuncupant, quod in ea gustus putetur esse acutior.

*Κεφαλὴ τοῦ κεφαλίου ἔχον*, hoc est capite præditum, apud Hippocr.

*Κεφαλάρων*, sic à quibusdam dicitur *πρὸς ὤμους*, Dioscorides scribit: nec dubium quin 2 capitellis, quæ gerit specie complicatarum formicarum.

*Κηρί*, galla. Est pilula inæquali superficie, salebrosa, in glandiferis arboribus præter legitimum fructum proueniens. Eius multiplex differentia est, solida, perforata, nigra, candida, maior, minor. Omnis noctu semper vniuersa erumpit mense fere Iunio. Quæ glandem ferunt, omnes & gallam, sed quercus optimam. Earum aliqua *ὀμφακίτις* appellatur, parua quidem sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. Est & alia grandior & fungosa, quam Galenus *ὀνομαδία*, quasi alinam gallam, vocari scribit à rusticis, quod ignaua sit & minus efficax, quam tamen

Galenus interpres *οἰσμηκία*, quasi vinigallant, nominat: de quo vix certo quicquam statui potest. Cæterum galla, præsertim *ὀμφακίτις*, admodum acerba, terrena frigidaque est. quare desiccatur, repercutitur fluxiones, cōstringit contrahitque laxas partes. Desiccatur autem tertio ordine, & refrigeratur secundo.

*Κηλί*, dicitur apud veteres tumor omnis quacunque in parte fuerit, siue in scroto, vt quæ vocatur *ἐπιπροκίλη*, siue in inguinibus, siue etiam in gutturo: cuius generis sunt *βουβανικήλη* & *ερωχικήλη*. Postea veto magis dici cœpit de scroti tumoribus, quod illi tum frequentiores sunt, tum multo magis diuersorum generum. Recensentur autem hæc fere eius generis apud medicos, *βουβανικήλη*, *ερωχικήλη*, *ἐπιπροκίλη*, *ἐπιπλοκήλη*, *ὀφροκήλη*, *πνευματικήλη*, *σπινικήλη*, *πυροκήλη*, præter alia quæ duobus generibus constant.

*Κημός*, herba, vt Dioscorides ait, *λεοντοπόδιον* dicta. Nomen inditum à floris siue calycis figura, quod *κημός* Athenis pyxidiculum significaret, per quam suffragia in subiectum vasculum, quod cadiscum vocabant, demitti consueuerant. Marcellus vero aliam credidit nominis esse rationem, & *λεοντοπόδιον* *κημῶν* dictam quasi frenum. Est enim *κημός* inter cetera reticulatum aut ex viminibus textum freni genus, quo vt iumentorum ora vinciuntur, sic in amore amantium animi leontopodii radice corpori adalligata, quam amorum veneficiis vtilem esse veteres crediderunt, retinerentur.

*Κημός*, dictus est à quibusdā hoc nomine *ἐκινώτε*, vt habetur apud Dioscor.

*Κηρίνη*, herba portulacæ similis, sed nigrioribus foliis, radice tenui. folia contra vesicæ scabiem vtiliter bibuntur, contraq; vrinæ stillicidia.

*Κηρόλον*, cerinthe, herba folio candido, in curuo, capite concauo, mellis succum habente. est apibus gratissima, nomen habet à fauis.

*Κηρίον*, fauus, est tumor in cute consistens, eamque maioribus foraminibus perodens, ex quibus humor mellis similis excernitur. Itaque tum ob foraminum figuram, tum propter excreti humoris speciem *κηρίον*, hoc est fauus, appellatur, & alio nomine *μυρμηκίς*, vt scribit Acrius lib. 6. Differt foraminum magnitudine *πρὸς τὴν ἀχρῶν*, qui vlcis etiam in cute genus est, sed minimis foraminibus præditum per quæ humor dimanat. Cæterum *κηρίον* frequenter in musculosis partibus, in articulis & plantis pedum oritur, sæpe etiam sextam colli vertebra occupat, & aliquando etiam costas inuadit. Si vero in capite generatur, primum reliquis partibus, deinde caluariæ etiam putredinē transmittit, vt sæpe dissecto pericranio os ipsū deradere conueniat. vide *μυρμηκίς*.

*Κηρός*, cera. Est expressorum fauorum recrementum. Medium quodammodo tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium & desiccantium: habet vero quiddam etiam essentia crassæ atque emplasticum. quare

non modo exiccat, sed per accidens etiam humectat, perspirationes prohibens: foris autem imposta debiliter concoquit. Retinet & paulum quiddam digerentis calidæque facultatis quæ melli inerat, præsertim noua: sed habet & quiddam acre & mordax, quod tamen facile aqua eluitur. Habet autem & pro fauorū viribus à quibus exprimitur varias facultates: siquidem ex præstantissimo melle cera præstantissima colligitur. Gal. l. 10. meth. med. vel albam Ponticam, vel eam quæ ex Articis fit fauis, omnibus prætulit, etiam si mel Ponticum venenatum esse veteres memoriæ prodiderint. Nihil enim intus & foris eandem habet facultatem. Itaque quamuis cera Pontica intro quidem sumpta potest offendere, exterius tamen quæ candida est vim habet medicamentosam. Nam valde abstergit, propter amaritudinē quam ex absinthio contraxit, & quā nulla vnquam lotionē deponit.

**Καρφύριον.** ἢ ἀρχύριον καὶ πύριον. palearum & furfurum, apud Hippocratem, vt annotauit Eriodorus, qui Articam esse dictionem scribit.

**Κεράτιον.** ceratum vel cerotum. Est medicamentigenus ex oleis, gummis, succis aliisque liquoribus cera vnitis constans, & substantia medium inter emplastrum & vnguentum. Quamquam non perpetuo vna eius forma est: siquidem aliquando humidius, aliquando siccius fieri potest. Ac humidum quidem est, vt ait Galen. lib. 10. meth. medendi, ceratum rosaceum describens, quod triplum aut quadruplum ad ceram oleum habet. Sic dictum est quod magna ex parte cera constet.

**Κλάριον ἢ**

**Κλάριον.** Nomen est Aegyptiæ fabæ, quasi dicas arculam. sic dicta est quoniam seratur ipsa, humenti glebæ mandata, & ita in aquā demissa. Author Dioscorides cap. de Aegyptia faba.

**Κρυμνίς ἢ**

**Κρυμνίδος.** significat apud Hippocr. breuem & exiguum morum, vt annotat Galen. comment. 1. & 4. αἰς τὸ ἀπὸ ἀρσενίου. Sic dicitur ἀπὸ κρυμνίου. Est autem auis quam motacillam ab assidua caudæ agitatione Latini appellant, à Græcis autem etiam ἰνυξ & σισυγγίς & κινυδός dicitur.

**Κίβητος.** dicitur à quibusdam ὀκιάδος, atque etiam ὀκιάδος, vt habetur adud Dioscor. Gal. vero ὀκιάδος γλῶσσος. scripsit ab Hippocrate τὸ γλῶσσος, hoc est pectus, sic appellari.

**Κίμινος.** ricinus. Dicitur & κρότων, & οἰσμητὸν ἄχνη, & οἰσμητὸν κρότων. Frutex est parua fici magnitudine, folio platani, læuiore, nigriore, maiore, ramis & caudice arundinum modo concanis, semine vuarum aspero quod purgarum effigiem ricini animalis repræsentat. Ex hoc preminur oleum quod κίμινος dicitur, cibus quidem frædum, sed lucernis emplastrisque vtile. Nec vero oleum tantum ad claritatem, sed etiam eius medulla

ad ellychnia præcipue commendatur. Eius fructus quemadmodum expurgat, detergit & digerit, sic quoque folium, sed vnde quæque debilius: oleum autem quod ex semine conficitur, tum calidius est tum tenuiorum partium quam est oleum commune, ac proinde potentius quoque digerit. Cici recentiores herbarii cataputiam maiorem, vulgus Gallicum item, officinæ palmam Christi appellant, quod folium in humanæ manus effigiem articuletur.

**Κίμων.** ἢ λατὼν. cicinum seu ricinum oleum. Quomodo paretur docet Dioscorides libr. 1. Id in Aegypto vetustissimum & fere primum fuit. Tenuius calidiusque est communi oleo, & naturam habet sabini inueterati, proinde potenter digerit, rarefacit & discutit.

**Κιμολία γῆ.** Cimolia terra est terra modice pinguis, rara, mollis, candida: aut in candido purpurea. Cum sub tactum cadit, frigida sentitur. Galenus scribit eam siccare, refrigerare & parum quæ coierunt digerere, atque ita vtraque facultate agere, non aliter ac plurima medicamenta quæ digerunt & reprimunt. Est autem vt idem scribit paulo efficacior quam vel Chia vel Selinusia, nec tamen mordet, sed quia magis quam illa abstergit, ea fullones vtuntur. Ob vim abstergendi qua pollēt, ομαλὴς, etiam siue ομαλῆς, dicta est. Olim adferebatur de Cimolō, vna Cycladum insula. vulgo terra saponaria appellatur.

**Κινάρα.** carduus altis, foliis albæ spinæ vel sylvestris cardui, caulibus altis, quorum summi vertices in squarosum extuberant globum, corticosis vnguibus turgentem, spicisque squamarum compactilibus coagmentatum, quorum orbis exterior viret, interior niueo candore nitescit. Hac struētili nucleorum serie piceam nucem videtur exprimere, quare & strobilum Romanis dici Dioscorides assueuerat. Flos purpureo rutilat colore, qui tandem euanesceat in pappos. Caput vetustate dissilit in corticeas laminas, semen ostendens cnici figura. Est autem gratissima cibus cinara, & passim adhibetur conuiuiis, sed melancholicum, vt ait Galenus, succum gignit. Sunt qui οκλινύμων interpretentur. Paulus tamen & Aetius inter illa distinxerunt, cinaram nocere stomacho, scolymum eidem prodesse scribentes. Sed non aliud habetur discrimen quam quod scolymus ferus est & syluester: cinara vero edomita cultu, mitior & altis, cuius cibus licet sit stomacho quodammodo grauis, non tamen in totum à scolymi natura viribusque degenerat. Cinaram nunc vulgus Gallicum articolem appellat.

**Κίμος.** motus. Est prioris habitus immutatio. Ea dupliciter incidere potest, nempe aut in qualitate aut loco. Quæ in loco agitur mutatio, latio dicitur, quæ aliud non est quam prioris loci immutatio. Quæ in qualitate, alteratio, quæ non aliud est quam mutatio

eius quæ præfuit qualitatibus. Sed latius quidem motus tum actiuus tum passiuus esse potest, alteratio vero motus tantum passiuus est eius quod alteratur. Patitur namque quod alteratur. Actiuus autem motus is dicitur, qui à se editur, idemque prius est quod ipsa actio, velut volatio & incessus: illa enim animalis volatilis, hic vero gressilis actio est, pariterque motus. Similiter actiuus motus eius est qui ex Gallia in Germaniam perfectus est. Quippe motus actiuus est, hoc est ex seipso, siue propria natura, siue ab interno motus principio. Passiuus vero motus ille dicitur, qui ab alio extrinsecus posito excitatur. Qui enim ab alio sic calefit aut refrigeratur, vt alteretur: aut sic agitur, vt locum mutet, id vtrique non agit, sed patitur: sic qui ex Anglia in Galliam nauigauit, non ex seipso id egit, sed navi vectus est, & priorem habitum qui in loco positus erat, immutauit. Vterque motus in ipso fieri essentiam suam possidet. Dum enim quid alteratur, mouetur: cum à motu cessauerit, iam alteratum est, non autè amplius alteratur, id quod in loci mutatione pariter accidit. Habet vero & motus vterque geminas differentias: aut enim naturalis est, aut voluntarius. Naturali quidem motu ventriculus, intestina, venæ alimentum attrahunt, excrementa depellunt, cor atque arteriæ continenter pulsant: voluntarie autem muscoli & nerui mouentur, atque ab his corpus vniuersum. Cuius quidem motus variaz sunt etiam differentiaz. Alius velox est aut tardus, alius robustus aut imbecillus, alius vehemens aut lenis, sicut Gal. in lib. de sanit. tuenda demonstrauit. Est vero & apud physicos alia motus species quæ generatio dicitur, non tam in qualitatibus quam substantiaz mutatione posita & consistens, sed quæ à medicis sub alteratione comprehenditur, qui in hoc rerum potius qualitates quam substantias inueniunt. Sensibus namque magis patent alterationes quam substantiarum immutationes, neque hæc omnino sine illis fieri possunt. Medicis enim alimentum in chylum mutatio, chyli in sanguinem, sanguinis in propriam cuiusque partis substantiam, generatio physica censetur: eam tamen medici alterationem nuncupant, quod formæ mutatio fieri nequeat sine euidenti multarum qualitarum alteratione. Quod si quis volet generationem corruptionemque ab alteratione distinguere, motusque diuersos facere, quorum illi ad substantiam vel ex substantia sint, hæc vero ad qualitatem, triaque propterea motuum genera statuere, non sine ratione fecerit: quemadmodum & si motus speciem quandam ex alteratione locique mutatione compositam, cuiusmodi auctio diminutioque est, constituat, Galenum auctorem sequetur, à quo etiam ista scripta sunt in initio lib. i. de facult. natural.

*Κιννάβαρι.* cinnabaris. Græci neutro, Latini feminino genere efferunt. Sed quid sit vari-

ant sententia. Dioscorides scribit quoddam cinnabarim eandem esse cum minio existimasse, alios vero sanguinem draconis, quod intento colore nec diluto prædita sit. Plinius dicit cinnabarim Indicum nomen esse, & sic appellari sanieram draconis elisi elephantorum morientium pondete, permixto vtriusque animalis sanguine, neque aliud esse colorem qui in picturis proprie sanguinem reddat: cui & Iulius Solinus in varia historiarum lectione, cap. 28. assensitur. Contra vero medici fortiter reclamant, dicentes id commentum esse mercatorum. Leoniceus quiddam metallicum esse censet, forte quod eius mentio inter metalla à Dioscoride & Galeno facta sit, cum tamen ille quid cinnabaris sit taceat, quid non sit dicat. Aetius lib. i. cap. 12. in descriptione emplastri quod *πορφυρεον* appellat, scribit sanguinem Draconis in India ex herba Dracunculo dicta, colligi. Arabes succum esse volunt, vt Serapio ait cap. de sang. draconis, sideriudis Achilleæ, persuasus vna ratione, quod vis vtrique par sit in glutinandis vulneribus. Video doctiores in eam nunc ire sententiam, vt veram cinnabarim non aliud esse putent, quam gummi cuiusdam arboris in Africa nascentis, colore sanguinis, pellucidum, leue, & fractu minime contumax, fidem iis habentes quæ Aloysius Cadamustus Venerus, nauigationis suæ lib. i. cap. 4. scripsit in hunc modum: Est, inquit, in insula, cui nomen Portus sanctus, sanguis Draconis, qui lacryma est arboris. Nam stato anni tempore arbores ferro sauciant, quæ ubi incisæ sunt, anno sequente gummi per incisiones emittunt. Id ahenis coctum defecatumque sanguis efficitur, quem Draconis appellant. Eius arbor producit fructum instar ceræsi mense Martio, gustu eximio, coloris veneti. Sicille. Quæ quidem omnia cum Dioscoridis cinnabari mire consentiunt. At vero cinnabarim minium esse Dioscorides aperte negat, dicens minium in Hispaniis ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto temperari solere, alioqui non dignosci. fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumque colorem permutari: in metallis vero stragulantem halitum eructare. itaque incolas faciem vesicis obuelare, vt per illas spectent, nec respirando noxium aerem attrahant, & eo pictores ad sumptuosam parietum ornamenta vti. Cinnabarim vero ex Africa deferri, & magno constare, atque hæcenus inueniri, vt vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat. Itaque cum minium venenum sit & cinnabaris utilissima sit antidotis, vt scribit Plinius, pater non esse eandem cinnabarim cum minio. Verumtamen idem ipse Dioscorides cap. de argento viuo, minium etiam cinnabarim appellatum fuisse testatur. verba eius sic habet: *ἡ κιννάβαρις ἢ ἀργυροῦς ἢ χρυσοῦς ἢ ἀπὸ τοῦ ἀργύρου ἢ ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ*. hoc est, argentum viuum sit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur.



Kippon fuluum. sic dicitur quod ex igneo seu  
ruffo pallor, ut fcribit Galenus libr. 12. meth.  
med. Sic enim ait, de vinis edifferens,  
εἰ δὲ ἄλλος ἐδίδωκεν ὀνομαζέειν τὸ κίπρον χρώμα, δι-  
καίει αὐτὸ λεγόντι κίπρον ὡς χρώμα. hoc est, fi vero aliter  
velis fuluum colorem nominare, dicere po-  
teris ruffum pallidum. Idem tamen tum eo  
loco, tum libro s. fanit. tuend. videtur idem  
facere cum χαλιδῶ, de vinis pariter agens his  
verbis: σικκινὸν ἔχον αἶμα κατὰ μὲν πλὴν συστασιὸν αὐτῆς  
λεχθῆναι αἰρείου. κατὰ δὲ πλὴν χρίαν, διὸ ἴππο-  
κράτης εἰσαπὲρ κίπρον καλεῖν. διώματι δὲ αὐτὸ καὶ χα-  
λιδῶν ὀνομαζέειν αὐτόν. hoc est, huc scilicet omni

consilio vini pro senibus deligendi directo, ut in substantia sit tenuissimum, colore quod Hippocrates *κρίνον*, hoc est fuluum, appellare solet, poterat vero & *ξανθόν*, id est, flauum, id appellare. Nec tamē reuera fuluum idem est cum flauo. Est enim fuluum inter album flauumque medium. Sic vina quæ principio alba sunt, vetustate fulua redduntur, & tandem flaua, ut scribit Galen. comment. 3. *αἷς* *ῥοῖ* *διαφύει*. Dioscorides libr. 5. de vinis agens, scribit vinum *κρίνον* medium esse inter album & nigrum, & medias inter utrumque vires habere. Quo loco varie vox ista vertitur ab interpretibus, Barbaro rubrum, Ruellio giluum, Marcello vermiculum vertente. Appellat autem vermiculum, coccinum, rutilum, siue rubens. Verumtamen *κρίνον* medium esse inter album & nigrum ita accipi debet, ut multo magis ad album quam ad nigrum inclinet, sicut rubrum quod magis ad nigrum vergit.

*Κρίνον*. caulis est tener duorum cubitorum, triangulo similis. ab imo foliola rose speciem referētia, anguli spinosi, per intervalla molles, folia buglossio similia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata, cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluiuntur in lanugines.

*Κρινοειδής*. varicosus rameus. Est dilatio seu amplificatio vasorum quæ testiculum nutriunt. Sic paulus definiuit libr. 6. cap. 64. Celsus libr. 7. cap. 18. scribit integris tunicis ramicem innasci. *κρινοειδής* Græci appellant, cum venæ intumescunt. Hæ autem intortæ conglomerationeque ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam: interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculum (ut idem est author) neruumque eius increscunt. Ex quib. verbis Celsus quatuor huius morbi differētiās pro locorum varietate constituit, quarum etiam & notas & curationem sigillatim persequitur. Itaque siue interiora, siue exteriora tumor iste occupet, à Cello *κρινοειδής* nuncupatur: nū item à Paulo, qui vasorum quidem in seroto aut dantis dilationem, *κρίνον*, hoc est varices, simplici vocabulo appellat: eorum vero quæ testiculum nutriunt, tumorem & conglomerationem, *κρινοειδής* ex veterum sententia. Meminit & Aetius *κρινοειδής* inter mulierum morbos, Aspasiam authorem sequutus, dicitque venarum esse dilationem, varicibus crurum similem, inque pudendi alis nasci solere.

*Κρίσις*. varix. Est venæ dilatio, seu vena dilatata. Id quod contingit venæ non etiam arterie, propter tunicæ mollietatem. Arterię namque tunicæ crassiores sunt atque robustiores. Distentionis causa est sanguis multus & crassus qui non facile cedit, sed cui contra cedere vena cogitur, præsertim vero stans, qualis melancholicus est, proindeque ab eo varices ut plurimum fieri medici omnes prodiderunt. Fiunt tamen interdum

à pituitoso atque à puro etiam sanguine, præsertim quidem in cruribus propter eiusmodi sanguinis gravitatem: aliquando vero etiam in temporibus & in ima parte ventris sub umbilico, & circa testiculos & scrotum, atque in ipsis etiam inguinibus. Nascitur & in palpebris auctore Aetio, atque, ut semel dicam, in omni parte quæ venas habeat, maxime si prona est, & longius diffusa à fonte caloris natui.

*Κίσκος*. est frutex in saxis emicans, ramosus, frondosus, nec præ altus: foliis circinatæ rotunditatis, hirsuto, gustu acerbo. Duo eius genera: flos masculo rosaceus, forminx albicās. Sub cistho ad radices nascitur *κίσκος*, malo granato immaturo similis. cisthus adstringit & desiccāt, sed præcipue flores secundo ordine absoluto. Est & aliud genus cisthi ladaniferæ, à quibusdam ledum vel lada vocatum, frutice ab altero non abhorrente, nigrioribus tantum & longioribus foliis, quæ verno tempore quippiam pingue rosicidum contrahunt. Est autem hic cisthus eiusdem cum superiore generis, sed quia nascitur in calidis regionibus, eximiam ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus est. Ex coladanum provenit quod est veluti eius gummi. Repertur & *κίσκος*, atque *κισκός*: sed minus recte, ut alphabetica apud Hesych. series ostendit.

*Κισκίμυτος*. dicitur *κίσκος*, digerendi facultatem habens, ut scripsit Galen. & Dioscor.

*Κισκιδεύς*. dicta est similiter à quibusdam *κίσκος*, ut habetur apud Dioscor. ab aliis vero cyclaminus altera, ut idem author est.

*Κισσός*. dicitur à quibusdam *κίσκος*, ut habetur apud Dioscoridem: vel *κισσός* ab Hippocrate, ut scribit Erotianus.

*Κίμπος*. pumex. videtur dubitare Galenus in quo genere pumicem reponere oporteat, an inter metallica, an inter lapides. Lapidem esse omnibus fere placet, eumque reperiri in locis qui olim arserunt, aut nunc etiam ardent, atque propter visionem absumpto omni humore leuem atque fistulosum enasisse: neque enim à spongia multum distat, ideoque, ut Vitruvius author est, à quibusdam etiam spongia dictus est. Græci *κίμπος* ob fistulosas concavitates vocarunt, nomine sumpto à verine frumenta erodente, qui Græce *κίμπος* nominatur. Ut enim is frumenta perforat, ita natura pumicem. Theophrastus vero etiam alcyonium, quod ex maris spuma concrevit, *κίμπος* appellat. Sunt autem varii pumices, nigri, cinerei, candidi, molles, duri: sed omnes rari & leues ob fistulas quæ aerem in se continent, eaque de causa omnes innatant aquæ. Probatur, inquit Dioscorides, pumex qui lenissimus, fistulosus, scissilis est, nec in attritu arenosus. In medicinæ usu cremari solet, rationemque idem ostendit. Adstringit, deterget, calfacit, reprimat, crustas inducit & depilat. Verum acrimoniam eam quam visione acquiritur, rursus lotionem deponit.

**Kicm.** nomē emplāstri, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 17.

**Kicm.** sic dicitur à quibusdam à *καλαμαί*, vt habetur apud Dioscor.

**Kicm.** hederæ frutex est genere triplex: candidus, fructu candido: niger, nigro, aut croci æmulo: *ἐκ*, nullo fructu, sed albis viticulis, foliis parvis, angulosis & concinnioribus. Constat hederæ contrariis facultatibus, refrigerans adstringensque, item calfaciens & acris, maximeque eius lacryma quæ inter *ψιλλοειδὲς* numeratur.

**Kicm.** sic dicta est à quibusdam à *καλαμαί*, vt habetur apud Diosc. non dubium quin à foliorum hederæ similitudine. A qua etiam idem alteram cyclaminon cissophyllon cognominari scribit.

**Kicm.** vide supra *κιδες*.

**Kicm.** nomen est malagmaris, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 18.

**Kicm.** malum Medicum, hoc est fructus mali Medicæ. Sic enim, inquit Galenus, malum Medicum appellatur ab ijs qui id agunt, vt quæ loquuntur nemo intelligat. ex quo apparet temporibus Galeni nouum nomen fuisse. Constat autem is fructus tribus partibus: acida quæ in medio ipsius sita est, carne quæ medium ipsum ambit, & cortice exteriori suaueolenti & aromatico. Eius semen resiccat & refrigerat tertio ordine: cortex desiccatur quidem secundo excessu, habetque non parum acrimoniæ, non tamen frigidus est, sed aut teporatus aut paulo infra. Caro eius crassi succi est & pituitosa frigidaque. Nucleus qui in semine inneditur amarus est, & digerendi siccandique facultatem obtinet, secundo fere ordine à temperatis recedens.

**Kicm.** symptoma est deprauatæ vitiosæque appetentiæ, cum stomachus vitiosus & à natura alienos cibos concupiscit. Causa est vitiosum quoddam recrementum, ventriculi tunicis impactum, sed cuius virium facile explicari non possit. Pro diuersis autem eius qualitatibus varia appetuntur, sed imprimis acida, acerbæ, atque etiam acia, & aliquando terra, testæ, carbones, panni veteres, putria coria & alia eiusmodi à natura abhorrentia. Maxime autem hoc malo mulieres grauidæ infestantur ad extremum vsque secundum tertiumue mensem. Quarto namque eo fere liberantur, partim vitioso humore per vomitum vacuato, partim concocto atque etiam absumpto crebris vomitionibus, fastidio & ciborum quibus vitium ali debuisse abstinentia, quodque auctior eo tempore fortis vna cum sanguine vitiosum pariter humorem attrahat atque conficiat. Verumtamen viros quoque idem affectus aliquando exercet, cum & ij vitiosum deprauatumque eiusmodi humorem in ventriculo collegerint. Vocatur hoc vitium à Græcis *κίμα*, vel à picæ varietate (est enim auis varia, nec sibi concolor, sed quæ alias plumas & pennas candido, alias nigro

colore præferat) vel quod forte affectu consimili picam laborare obseruatum sit. Ceterum quamuis *κίμα* picam auem significet, nõ tamen de affectione ista loquens picam recte vertere poteris, nisi quadam Græcorum imitatione, sine tamen idoneo autore, quod nemo vnquam Latine picam pro eo affectu dixerit. Plinius certe nunquam picam, sed granidarum malaciam sæpe dixit. Quidam vero non picam, sed picationem interpretantur.

**Kicm.** Attice à Theophrasto dicitur à *κίμα*.

**Kicm.** nomen est barbarum apud Diosc. significans genus vnum vilis calix.

**Kicm.** nomen est Ægyptium, vsurpatum tamen à Græcis. Est autem id herbæ genus quod Græci *κίμα*, Latini inrubum erraticum vel ambubeiam appellant. Artamen Galenus lib. 8. *κίμα* videtur discrimen ponere: cichoria, inquit, & seris cibarii generis existunt. Apud nos namque agrestes ijs coctis crudisque in cibo vtuntur. Quin & Erasistratus plurimum ea commendat in curatione affectionum ventris. Est autem horum olerum facultas subfrigida, subamara & modice adstringens, & propter has qualitates præstantissime medentur iecinori supra modum calido. Non enim solum moderate refrigerant: verum etiam quia adstringunt visceri robur addunt. Præterea commissuras osculorum venarum in sima visceris parte cum ijs quæ in gibba sunt extergent. Neque vero frigidas intemperies valde offendunt, veluti ea quæ frigido humore scatent citra adstrictionem aut amaritudinem. His quidem laudibus Galenus cichorium effert. Dioscorides alio nomine *κίμα* appellari tradit.

**Kicm.** est curgوليو præter naturam auctus & oblongior tenuisque æquabiliter factus. Tunc enim *κίμα*, hoc est columbæ, similis euadit. Latini fere omnes columellam interpretantur. Quod autem æquabiliter auctus sit, in eo differt *κίμα* à *κίμα*, quæ vna dicitur, per quam curgوليو ima tantum parte crassus rotundusque est. tumor is oritur à distillatione in ipsum è capite descendente.

**Kicm.** sic ab anatomicis vocatur interseptum carnosum quod ad labrum vsq; descendit, vt ait Rufus.

**Kicm.** etiam, vt annotat Galenus à *κίμα*, significat apud Hippocratem bestiolarum congregationem quæ tritum comedunt, quarum etiam vnaquæque *κίμα* nuncupatur.

**Kicm.** vocabulum est vsurpatum ab Hippocrate, in cuius explicatione scribit Erotianus Demetrium existimasse sic dici oculos valde immobiles, sed cum grauiter aberrare, quod *κίμα* ad oculos nõ pertineat, cum eo nomine certa quedam vocis species & *κίμα* designetur, qualem maxime vomitus *κίμα* conicit. Esse enim vocem quæ à græco inchoata in acutum desinit, vt in cantu plerumque fit. Bacchium autem interpre-

ratum esse *καταρτήσιον*, *καὶ συνεχὴ καὶ ἀσπλην*, hoc est continuam & indefinentem: Apollonium autem intercisam, inæqualem & obscuram, eique maxime similem quam temulenti edunt.

*Κλαυδίου*. nomen collirii, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 16.

*Κλαυδίου*. *καὶ αὐτὸς μετ' ὁμοίων ὁμοειδὴς*, hoc est flere magna spiritus contentione, apud Hippocr. ut annotauit Galen. continent. in progn. Inde *καλυμμένη* *ἐν πύλαις* dicuntur etiam ab Hippocrat. ijs similes quæ cum fletu fiunt, quasi suspensæ. quamquam Erotianus *συνεχὴς* interpretatur, sumpta, ut ait, à flentibus pueris metaphora.

*Κλειδίου* *ἀποδιαισίου*. vel, ut habetur apud Paulum, *ἀποδιαισίου*, est pastillus conueniens hæmoptoicis, celiacis, dysentericis & quibus stomachus fluxione tentatur. Magnopere enim adstringit.

*κλειδίου* etiam epithematis nomen est eiusdem omnino cum superiori pastillo facultatis. Id geminum describitur ab Actio lib. 9. vnum Cyrilli, alterum Mnaseæ nomine. Vtrumque autem dysentericæ adhibet.

*Κλεις*. est os tortuosum & inæquale, omoplatâ cum sterno alligans. id geminum est, dextrum & sinistrum. Vtrumque à sterno usque ad apophysim *κατακλυσθὴν* in exteriora curuatur: ab ea, contra. Est enim receruum & figuram S Romanæ literæ imitatur. Fistulosum quoque est & crassius inæquali præditum, parte quidem superiore quæ sterni inarticulatur, crassius & rotundius, postea verò longe gracilius, adhuc tamè rotundum: procedens verò quò propius lato scapularum ossi sit, eo plenius latiusque. Sic à Græcis dictum est *καὶ τὸ κατὰ τὴν ἀσπλην*, *καὶ τὸν πρὸς τὴν ἀσπλην* & *καὶ τὸν πρὸς τὴν ἀσπλην*, hoc est, quod cervice & humerum concludat: ex quo etiam Latine quidam clauem & clauiculam dixerunt. Siquidem clavis modo omoplatam cum sterno, & per illam brachium firmat atque connectit. Sunt qui iugulum à Latinis dici putent etymologia nixi, quod ea vox à iungendo profecta videatur. Certe Corn. Celsus iugulum liquido appellauit lib. 3. capite de iuguli fracti curatione. Iungitur autem summo quidem sterni per diarthrosim, omoplatæ verò per synarthrosim. Dicitur ab Hippocrate Ionica dialecto *κλεις*, ab Aristotele autem *κατὰ τὴν ἀσπλην* de hist. animal. lib. 1. cap. 14.

*Κλειδίου*. dicitur pudendi muliebris superficiei. Rufus Ephesius tradit in medio pudendi muliebris esse carunculam quandam quæ *καρυνκὴ* & *μυρτίς* & *καρυνκὴ* & *καρυνκὴ* appellatur. vnde *καρυνκὴ* dici *τὸ ἀσπλην* *καρυνκὴ*, hoc est lasciuus hanc carunculam contrectare. Repertur & *καρυνκὴ*.

*Κλειδίου*. idem quod *καρυνκὴ*, de quo vide suo loco.

*Κλειδίου*. *καὶ αὐτὸς μετ' ὁμοίων ὁμοειδὴς*, fallit, decipit, apud Hipp. ut lib. 5. *καὶ αὐτὸς μετ' ὁμοίων ὁμοειδὴς* *καὶ αὐτὸς μετ' ὁμοίων ὁμοειδὴς*

*καρυνκὴ*, *καὶ αὐτὸς μετ' ὁμοίων ὁμοειδὴς*. hoc est, fefellerant autem animum meum futuræ, reli in se vestigium habentes.

*Κλειδίου* *καλίου*. Cleonis collyrium, ex genere *καλίου* *καλίου*, hoc est mollium, & eorum quæ sine mortu sunt. describitur à Celso, ab Actio & à Paulo eadem omnino materia, sed mensura inæquali.

*Κλίσπη*. arbor est, quam Gaza apud Theophrastum alnum vocit. Est autem arbor sterilis, caudicerecto, ligno medullaque molli, adeo ut graciliores virgæ conueniant, foliis pyri sed ampliore nervosioreque, cortice scabro rufoque intus, radice summa, nec maiore quam laurus. Nascitur in aquosis. Nec tamen omne alnum sterilem esse Theophrastus prodidit, quādam fructiferam esse scribens, Aristotelem in eo sequutus, qui inter naturæ miracula retulit alnos in sola Creta non esse steriles. Ea semen autumnio reddit. Materies alni ad naualia commendatur, & ædificiorum fundamenta palationibus fulcienda, in quibus permanet immortalis ad æternitatem.

*Κλίσπη*. ingula locus sub consillis, apud Hippocratem, ut scribit Galenus *καὶ τὸν πρὸς τὴν ἀσπλην*.

*Κλίσπη*. dicitur *καὶ τὸν πρὸς τὴν ἀσπλην* à quibusdam, sicut habetur apud Dioscoridem.

*Κλίσπη*. herba est duorum generum. vna, quæ *καρυνκὴ* & *καρυνκὴ* & *καρυνκὴ* cognominant, sarmentis prælongis & in terram sparsis in uice crassitudinis, foliis lauri figura & colore, multo minoribus, obuia quæque viticulis suis vinciens, atque ideo Latinis vincaperuinca appellata. Ea semper virescit & pinguibus locis nascitur, sed in Ægypto præsertim, vnde clematis Ægyptiæ à Plinio cognominatur. *καρυνκὴ* altera ramos habet rubentes & viticulos, quibus proximis adhæret, folium vehementer acere & exulcerans, & omnis fere similaci similia: ab officinis dicitur volubilis maior. hæc quidem duæ sunt præcipue *καρυνκὴ* species, quæ nomine plures etiam aliz stirpes designantur, communes videlicet quæ suis viticulis per terram serpunt, & cum possunt clauiculis propinquas stirpes scandunt. Est enim *καρυνκὴ*, vnde nomen habent, palmes, pampinus, sarmentum siue flagellum quo proxima quæque stirpes eiusmodi apprehendunt. Numeratur enim & *καρυνκὴ* tertia Plinio, qui etiam tradit vnam clematidem aliis echitem, aliis lagine, aliis tenuem scammoniā, quod pedales & foliosos non dissimiles scammoniz ramos, minora nigrioraque folia habet, cognominari.

*Κλίσπη*. dicta est tertia species aristolochiæ, quasi sarmentaria, quod eius radix longissima sit veluti vitium nouellarum. huius fructus putatur esse, qui vulgo Gallorum cocculus Orientis appellatur, piscibus stupefaciendisefficax.

*Κλίσπη*. sic dicitur in muliebri sinu suborta vel uti ca-





*τὸν καὶ τὸν καὶ*, chameleam vocari scribit, Dioscor. vero thymelzam, quanquam ipse scribat folia *τῆς θυμολζης*; priuatim *κρίανον* appellari.

*Κρίανον*, sic dici à quibusdam *τὸ καὶ τὸν καὶ*, Dioscorides author est.

*Κρίανος*, vide *κρίανος*. sunt enim qui per *κ* malint scribere.

*Κρίανον*, *θυμολζα*, hoc est rasur, apud Hippocr. & *κρίανος*, *τὸ θυμολζα*, radere.

*Κρίανον*, crus, tibia. Ambiguit est significationis.

Interdum totam eam partem significat quæ inter astragalum genuque posita est, ossibus geminis cõstatem, quam crus Latini dicunt. Interdum vero id os peculiariter designat quod est eorum maximum, Latini tibiam vocant: nam quod minus est, *πρόν*, id est supra, appellatur. Sic *πρόν* modo vtrumque os cubiti, aliquãdo eorum longissimum significat, vt annotat Gal. comment. 4. *ὅτι τὸ πρὸν*. Certum tamen est *τὸν κρίανον* partem esse *τὸ πῆλον*, quod Galenus diuidit in tres partes, *μυρὸν*, *κρίανον* καὶ *πῆλον*. Est autem os tibia crassissimum & interiori in parte situm, eique soli femur per diarthrosin articulatur. Nam *πρόν* tenuior multo est & exterius sita, nec tam alte assurgit, vt genu possit contingere. Inter se autem hæc duo ossa membranofo ligamẽto sursum deorsumque colligantur, in medio multum ab inuicẽ discedunt, vt se habet etiam in cubito & radio.

Qua parte vero tibia cum femore copulatur, magnam habet epiphysim, & in ea cavitates duas, in quas duo femoris condyli inseruntur. Inter eas autem corpus quoddam *υποχονδρῶδες* eminet, ipsas etiam cavitates adaugens, & inter duos illos femoris condylos attollitur. Habet aut & tibia inferiore in parte epiphysim internam in parte prominentẽ & gibbam, sicut & aliam *πρόν* externam in parte, quæ quidem dicitur apophyses *σφυρῆς*, id est malleoli, proprie appellatur. Est autem tum tibia tum perones figura prope triangularis. Ac tibia quidem anterior angulus, quia multum acutus est, à quibusdam *σφυρῆς*, quia vero veluti frons est & *κρίανος*, *ἀντιπρῶτον* nominatur.

*Κρίανος*, apud Hippocratem significat pannum rarum quo aliquid percolatur, vt annotauit Erotianus.

*Κρίανος*, pruritus, prurigo. Est excrementi acris sub cute sensus sine asperitate & exulceratione. Sensus quidem est, non etiam motus, sicut & in plerisque aliis affectionibus contingit, vt in vlcerosa lassitudine & in æqualitate quæ febres aliquas antecedit. Humor enim immotus in cute vel subdita illi parte impactus, vt in psora lepraque, sensum talem doloris inuehit quem pruritus appellamus. Sed in psora lepraque valde crassum & nonnunquam lentum id genus excrementi est, adeo vt quibus malis laborat, nihil prorsus iuuetur, etiam si sese totum scalpando excoriat, in pruritu vero paucius tenuiusque est, nec tam tenue tamen

quam in vlcerosa lassitudine. Acute autem sitid excrementum necesse est, in quo genere nitrosum, salsum amarumque continentur. Quod si vtratur & melancholicus enadat, ex pruritu psoram, & ex hac lepram excitabit. Sic enim gradibus quibusdam tria hæc vitia gignuntur, sed in psora lepraque vel asperitas cutis est, vel exulceratio, atque ex ea vel furfures, vel squamæ etiam decidunt: in pruritu vero cutis læuitas est. Exercent autẽ eos potissimum qui sordidi sunt nec lauantur, eos item qui cruditate laborant, & vitiosis cibus aluntur, multoque magis scabiosos & leprolos. Est enim pruritus vnum ex præcipuis eorum symptomatis, sed multo in lepra quam in psora vehementius, adeo vt leprosi impatientia scabendi cutem sibi plerumque dilacerent, & vlcera, pustulas atque etiam phlegmonas aliquando accersant. Significat & *κρίανος*, interprete Galeno, frictionem motumque per ungues effectum: quod in prurientibus particulis animalia naturaliter faciunt comment. 5. in lib. 6. Hippocratis de morbis vulgaribus.

*Κρίανος*, *τὸ κρίανον*, apud Hippoc. quod & *θυμολζα* à quibusdam dicitur, vt habetur apud Dioscor. Vsurpat & Hippocrates *κρίανον* *ἀπὸ τῆς ποικιλίας*. Sic autem dicitur cultellus quidam quo caseus deraditur.

*Κρίανος*, *κρίανος*, cnidium granum. Est semen *τῆς θυμολζης*, myrti simile, paruum, rotundum, initio virescens, postea rubens, foris durum nigrumque, intus candidum. Theophrastus ait maius pipere haberi, quod est longe validius. Detrahunt per aluum bilem, pituitam & aquas, maxime si viginti granorum nuclei sumantur. Verum fauces adurunt: quare cum farina aut polenta, aut in acino vix inclusi, aut melle cocto obducti dantur deuorandi. Tradit Dioscorides id à quibusdam *κρίανον*, ab aliis *κρίανον* appellari. Reperitur & *κρίανος* sine diphthongo.

*Κρίανον*, oleum ex cocco cnidio præparatum, cui vis inest purgandi si bibatur. Author Dioscor. lib. 1.

*Κρίανος*, dicta est à quibusdam *τὸ κρίανον*, vt habetur apud Dioscoridem: *ἀπὸ τῆς κρίανος*, quod vrtica proprium sit cum dolore pungere. Vide & *Α' κρίανος*.

*Κρίανος*, dicuntur ab Hippocr. puncturæ quædam & pruritus, quales ab vrtica, quam *κρίανον* vocant, excitantur.

*Κρίανον*, dicitur à quibusdam *τὸ κρίανον*, vt habetur apud Galenum.

*Κρίανος*, cnicus, herba est folio procero, scabro, diuiso, aculeato, cubitalibus cauliculis, quibus in summis capitula oliuæ magnitudine. flos croci, semen album, alioqui rufum, longum, angulosum. Differentia prima syluestris & satiuæ. Syluestrium duæ species, vna minor est, simili caule, tantum rigido, quo pro colu antiqui utebatur, exilis, quam quidam *αττατυλίδα* vocant, vt habetur apud Dioscoridem & Galenum: semen eius candidum,

candidum, grande, amarum: nunc carduus benedictus & sylvestris carthamus dicitur. Altera hirsutior, torosior canle, & qui pene humis erpat, minuto semine. Sativa vero durior spinosiorque est, & carthamus aut crocus hortensis siue Sarracenus vocatur. Omnes diuulsis ramulis cruentum fundunt liquorem. Ex cnico vnum semen ad purgationes usurpatur. Excalfacit tertio ordine, si quis foris eo uti volet. Sunt qui *κνήμιον* malint scribere, nam & in flore croceum colorem, & in semine candidum, *κνήμιον* Græci appellant, ut scribit Helychius.

*Κνήμις* *κνήμις*, hoc est pruritus, apud Hippocr. quidam autem *κνήμις* *κνήμις* eo nomine intellexerunt. ut scripsit Galenus *κνήμις* *κνήμις*.

*Κνήμις*, nomen creditur fictitium ad significandum certum quendam sonum aut strepitum. Usurpatur & in ijs qui leuiter suspirant, & in ijs similiter qui prurigine vexantur. Vnus est etiam voce Hippocrates.

*Κόρυς*, vocatur ab anatomicis cavitates auriculæ *κὼρὸς τῆς ἀνδρείας*. Ea namque anthelice clauditur, estque anthelix veluti ora *τῆς κόρυς*. Nomen à conchæ similitudine inditum est.

*Κόρυς*, etiam quidam vocant genu patellam, *ἐπὶ τῇ ἀνδρείᾳ* & *ἐπὶ τῇ γυναικί* & *ἐπὶ τῇ* proprie dictam, quam tamen alii masculino genere *κόρυς* appellant.

*Κόρυς*, mensura est liquidorum, apud Atticos, *κὼρὸς* duo continens, siue sex drach. ponderales.

Significat & *κόρυς*, concham, testaceum animal.

*Κόρυς* etiam usurpat Hippocr. pro figlino vase, ut annotauit Galen.

*Κόρυς*, conchula, est concauitas illa quæ spectatur in auriculæ cartilagine, ut scripsit author introductorii siue medici. Dicitur & *κόρυς*, de qua ante.

*Κόρυς*, vocat Hippocr. *κὼρὸς*, hoc est hiatalam. Dicitur etiam *κόρυς* *τῆς κρανίου* Lycophroni, hoc versu: *Τυπὶς σκεπτήρη κόρυς ἐστὶν* *δὲ τῶν μέσων*.

*Κόρυς* *φλέψ*, caua vena. vide *φλέψ*.

*Κοιλία*, venter. Aristoteli dicitur illa corporis cavitates in quam cibus deuoratur & prima concoctio peragitur. Latius tamē patet hoc nomen, nec receptaculum modo ciborum significat, sed omnem etiam cavitatem in profundo positam, ut cerebri, cordis, iecinoris & reliquarū partium. Id quod testatur Philotheus comm. in aphor. 15. sect. 1. scribens: *κοιλίας λέγεται τὸ ἐν τῷ στήθεϊ καὶ ἐν τῷ κοιλίᾳ καὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ, ὅτι ἐν κοιλίᾳ, καρδίας, ἥπατος καὶ ὅτι ἄλλων*. hoc est, dicit eam quæ cibos capit, & omnem cavitatem in profundo positam, ut cerebri, cordis, hepatis arque aliorum. Sed cum de ventre inferiore tantum dicitur, articulo innigitur præpositiuo, ut annotant Gal. & Philotheus aphor. 20. sect. 6. Id quod obseruare debent qui vocis *κοιλίας* reformidant: ut quum de omni cavitare loquimur, *κοιλίας*:

cum de ventre inferiore, *τὸν κοιλίαν* & *τὸν κοιλίαν* cum adiectione dicamus, ad ventriculi differentiam qui à Græcis *ἡ ἀνω κοιλία*, & à Latinis alnus superior dici potest. Erotianus annotauit *τὸν κοιλίαν* ab Hippoc. dici *κοιλίαν* & *τὸν κοιλίαν* *ἐν τῷ στήθεϊ*, hoc est, omne quod sub diaphragmate est spatium latius. & interdum thoracis internum spatium & ventrem ipsum & vlcus cavitatem.

*Κοιλία*, dicuntur quibus excrementa læuita, humentia & semicocta, alio continenter fluida redduntur aliquāto postquam assumpta fuerint tempore. Symptoma est facultatis ventriculi & intestinorum languētis & imbecillæ, ut perfecte coquere & digerere alimentum nequeat. Inde assidua deiectio sequitur, quæ duabus potissimum notis à lientericorum deiectione discernitur. Siquidē lientericis alimenta prorsus cruda protinus ut sumpta sunt infernè prodeunt, tanta tamque manifesta cruditate, utimenti assumpti genus aperte cognoscatur. Verum in coeliacis iam adepta sunt aliquam coctionē, & diutius in ventriculo morantur, neque tam cito per aluum descendunt. Cruda tamen sunt & aliquando fœtida & sæpe animi deliquium inducunt, sed non sunt mordacia. Causa huius mali est assidua cibi corruptio & cibus cacochymus, ad hæc frigiditas, aut vehemens ardor, aut plagæ ventri infligitur. Ex longis quoque morbis facile hic morbus contrahitur.

*Κοιλία*, vide *κοιλία*, de quo mox.

*Κοιλία*, quamquā eo nomine cavitates omnes designari possint, attamen specialiter *κοιλία* vocatur *ἡ ἀνω κοιλία* *τῆς ἐπὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ*, hoc est superioris palpebræ superfices, sicut *κοιλία* pars inferior quæ ei respondet. Illud tum in aqua intercutitur, tum in alterius generis malo habitu, tum in diuturnis hæmorrhoidibus, & longis mulierum profluuiis, & sæpe inchoantibus ophthalmiis intumescit. quod ubi accidit, *κοιλία* dicuntur qui sic laborant, propterea quod *τὸν κοιλίαν* *οὐδὲν* sit, ut scripsit Rufus *ἐν τῇ ἀνω κοιλίᾳ* *μορβία*. Sunt autem qui *τὴν κοιλίαν* *ἐν τῇ ἀνω κοιλίᾳ* interpretati sunt, cavitates quæ sub oculis utraq; nasi parte cernuntur, quæ tamen *κοιλία* melius dicerentur.

*Κοιλία*, est vlcus in cornea oculi tunica rotundum & amplius latiusque boethio, sed minus profundum. Nascitur circa irim.

*Κοιλία*, vide *κοιλία*.

*Κοιλία*, communitates, hoc est, communes & vniuersales quædam notionēs ex quibus Methodici omnem remediorum indicationem petendam censebant, neglectis reliquis omnibus indicationibus: tres autem in vniuersum statuebant, adstrictum, fluens & mixtum ex utroque. Ac in adstricto quidem relaxandi, in fluente vero comprimendi indicationem desumebant, in mixtis vero ab eo quod magis vigeret. vide in dictione *κοιλία*.

*Κοιλία*, ab Hippocrate libr. *ἐπὶ διαίτης* *ὡς* significat nucē pineam, quæ ab antiquis me-

dicis *κύνες*, à recentioribus propemodum omnibus *σπίλους* dicta est, vt annotat Galen. comment. 4. in eum librum. Dioscorides tamen, vt scribit Galenus, eo nomine apud Hippecrat. *κύνιον κνίδιον*, diminutina forma intellexit.

*Κύνιος*. granum acinus. *γάρμν*.

*Κύνιος βαφικνί*. granum tinctorium, siue coccum infectorium. frutex est, vt ait Dioscor. surculosus, paruus, cui grana ceu lentes adherent, quæ leguntur ad vsus reponunturque. Hæc *κύνιος βαφικνί* dicuntur, attamen fruticem ipsum qui eiusmodi grana fert, Diosc. videtur *κύνιον* appellasse. Est autem illex aquifolia, quæ solo cocco cunctis valde pretioso omnes roboris dotes prouocat. Est enim illi color rubeus, qualis in rosa micat, imperatorum tantum paludamentis apud antiquos dictus. Galli squarlatum, Narbonenses vermilionum, officinæ grana tinctorum appellant. Adstringit, amarum est, & sine morfu siccatur. Eius species vna est quam *κύνιον* veteres vocant, quod celerrime in vermiculum se mutet, & in Attica fere atq; Asia olim nascebatur.

*κύνιος* etiam, vt inquit Diosc. à veteribus granum dictum est quod nascebatur in Cilicia à quercubus, cochlearum siue limacum exilium similitudine, tingendi quoque vim sed minus insignem habens.

*Κύνιος κνίδιος*. Granum Gnidium. Sic dicitur semen thymelææ, id myrti in modum rotundum est, & inter initia viret, ac tandem rubescit. inuolucrum eius durum, foris nigrum, intrus album. Granum Gnidium vim habet acrem & adurentem. purgat etiam bilem & aquas. Ex eo *κύνιον κνίδιον* paratur, apud Dioscoridem lib. 1.

*κύνιος κνίδιος*, vt inquit Dioscor. dicitur à quibusdam chamæleo niger. hallucinantur tamen, inquit, qui coccon Gnidium fructum esse chamæleæ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

*Κοκκυμυλνία*. prunus. arbor nota. Eius fructus ventrem subducit, recens quidem plus, aridus minus. Plurimæ sunt eius species, & valde inter se differentes.

*Κύνυξ*. est os in imo sacri ossis positum, tribus propriis partibus constans. Sunt autem partes illæ ossicula, etiam si Galenus ita non audeat appellare, propterea quod pueris adhuc sunt cartilagineæ, quæ quauis aetatis spatii ossæ euadant, in ambra tamen & commissuris & sine adhuc cartilagineis permanent, vt & epiphyse omnes solent. Vniuntur autem inter se symphyli, quamquam coccygis tertium os (quod proprio nomine & *σπονδυλόν* & *ἰσθμὸς* & *σπονδυλὸς* appellatur) vt ossis sacri primum persæpe synarthrosi iungatur, & in ijs foramina intrus ampliora, foris angustiora, vt in osse sacro, nisi quod ad coccygis ossis secundum cum tertio commissuram, pro foraminibus futura tantum est. E coccyge tria veriorum paria prodeunt per eius foramina, non

lateralia, sed antica & postica. Quorum prima coniugatio ex ea oritur parte, quæ coccyx sacrum os attingit: secunda, vbi prima huius ossis pars cum secunda committitur: tertia, medio inter secundam & tertiam spatio.

*Κύνιον*. significat apud Hippocr. simpliciter *κύνιον* vulgo dictum, non Cnidium, quem tamen licet sine addito *κύνιον* nominare, vt scribit Galen. in *τῆς γλώττης*.

*Κολέσας*. apud Hippocratem lib. *περὶ διαίτης ἐξέτης* significat *καθελόν καὶ ὑπερῶσαι*, hoc est imminuere, mitigare, castigare, retundere, vt annotat Galenus comment. 3. in eundem librum.

*Κίμα*. gluten sen glutinum. alii *ζυλοκόμης*, alii *ζυροκόμης* appellant. Id dicitur quo sicca corpora secum vniuntur. Præstantissimum fit ex auribus taurorum & genitalibus. Fit & ex quibusvis pellibus inueteratis & decoctis. Rhodiaceum cæteris prætulit Dioscorides: id candidum erat. & translucens. Auro-glutinum est lanterna, ferro argilla, ætis massis Cadmia, laminis alumen, stannum aramentis, stanno argæum, marmor & plumbo resina, plumbum nigrum albo, album sibi ipsi, vitro mastiche. Habetur & gluten librarium ex simila & polline, emplastica, vt ait Galenus, & concoquendi vi præditum quibuscumque ipsum partibus illinas.

*Κομάειον*. sunt qui ita dictam putent *ἀνθαλλίδα* flore puniceo micantem, propter siccandorum vulnerum & glutinandorum facultatem, atque ita contendant legendum esse apud Paulum in ea compositione quam podagra dicunt *δυσμακρίον* cognomine lib. 7. cap. 11. ideoque censent *δυσμακρίον* appellandam esse.

*Κολλητικὸν φάρμακον*. glutinatorium medicamentum. Est quod coniungit & vni diuisas partes vt in pristinam vnitatem reducantur. Quidam *ἐναίμιον* & *τραυματικόν* etiam appellant, quod cruentis & vulneribus adhibeatur. Verum non in cruentis modo protinus glutinandis eorum vsus est vbi sanguinem ex plaga adhuc profluentem spongia deterferimus, deinde suturis aut fibulis coarctauerimus, sed etiam in sinibus veteribus cum ab omni inflammatione eos vindicauerimus, puerosque medicamentis reddiderimus. Cæterum quod glutinandi facultatem habet, plus siccet quidem oportet quæ quod carnem producit, nec tamen detergeat, nec expurget, sed contra prorsus substantiam omnem in idem cogat, cuiusmodi facultatem habeant medicamenta ea quæ austera & adstringentia vocantur: hæc namque in idem cogendi ac stipandi, non detergendi neque purgandi facultatem habent. Eorum namque finis est, prohibere ne vlla inter coituras partes subnascatur humiditas. Est autem glutinantium materia diuersa pro corporum varietate quæ glutinari debeant. Quæ ex argenti spuma, oleo & acet-

to præ-

to præparantur, imbecillam mollemque carnem glutinant: quæ bitumine, ærugine, squama, aloë & myrrha constant, robustam & duram.

*Κίρκου*. si *σπογγίου*, id est pastilli, apud Hippocr. sic & Paulus appellat libr. 1. cap. 27. Scribit autem Erot. speciem esse τῆν ἀρσενίαν, in modum placentarum, & aliquos τὴν ἐνείαν interpretatos esse.

*Καλλύειον*, est medicamentum oblongum, rotundum ex liquoribus, succis, seminibus, fructibus & metallicis ad varios usus compositum, compactum coherensque, in modum fere eius quod vulgus pharmacopolarum magdaleonem appellat. Sic enim olim reponiebantur & asseruabantur collyria, cumque vtendi occasio esset, ea vel integra sicuti condita erant, adhibebantur in usum, vel soluebantur in puluerem, qui aut siccus aut humore aliquo dilutus affectæ parti vel oblinebatur, vel linamento exceptus indebatur, vel suffusionibus aut alio modo inferuebat. Namque τὸ καλλύειον antiquis figuratum fuisse & certam habuisse formam, ex veterum medicorum lectione cognoscitur, qui pleraque medicamenta in collyrii formam fingenda præcipiunt. Corn. Celsus libro 5. docens quomodo callum fistularum erodere oporteat: Satis (inquit) est vel papyrus intortam, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum medicamento Megetis illinere. Idemque non aliam fuisse eius figuram, quam quæ antè exposita est, paulo supra testatus fuerat, his verbis: Satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam æris, vel æruginem, vel ex metallicis aliquid: exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. idque ea parte qua tenuius est antedecente demitti oportet in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. quæ in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Similiter Gal. libr. 3. *τῶν καλλύειων*, differēs de narium affectibus, docet ex certis medicamentis contusis læuigatisque collyriorum formas effingendas esse, quæ congruam ad nares ægroti proportionem habeat, easque in naris affectæ meatum immittendas. Ad hæc Oribasius collect. medic. libr. 10. cap. 23. ex Antyllo collyrii figuram tribuit caudæ muris similem, quatuorque digitorum longitudinem, & præterea soliditatem firmitatemque, vt oleo aliquo, non secus atque balani, inungi possint. Ac figuram quidem talem iis fuisse, ipsa nominis ratio videtur ostendere, dictum enim τὸ καλλύειον videri potest, quasi καλοὶ ἐνέει, quia sit instar mutilatæ caudæ. vel quia rotundum sit. Si quidem καλαυράειν τὴν ἑρπὺν dictam à Callimacho Suidas *σπογγίλιον* interpretatur. Ex quo apparet καλλύειον vnico & per diphthogum principio scriptum fuisse. verum postea obtinuit usus vt duplici scriberetur, & apud Latinos inualuit, apud quos semper collyrium scriptum

reperias. sunt autem ex Græcis qui καλλύειον, sine diphthongo scribant. Sunt etiā qui malint καλλύειον dictum esse *καλλύειον τὸ καλὸν τὸν πόιν*: hoc est, quod comprimat fluxionem. alii vero *καλλύειον*: vtrique credo existimantes, eam modo vnā esse collyriorum facultatem, ad sistendas fluxiones. Verum tamen non ad eam rem modo, sed ad omnes omnium partium affectiones quibus admo-ueri possunt, comparata sunt à medicis collyria, diuersarum omnino facultatum: fistulis enim induntur alias ad conglutinandum, alias ad detergendum, alias vero ad extirpandos earum callos, vt patet ex Aetio libr. 14. cap. de fistulis. imponuntur & naribus ad polyporum & ozenarū curationem, itemque auribus vlcere affectis, auctore Galeno lib. 3. *τῶν καλλύειων*. Adhibetur & vterque tum ad ciendas purgationes, & ad fortum atque secundas expellendas, tum ad sistendum etiam immodicas sanguinis excretiones, aliosque vteri affectus medendos. Induntur & collyria in anum, quæ etiam glandes appellat Aetius in cura dysentericæ, quæ Scribonius Largus ad tenesimum effingit ad instar nuclei pinei, ex medicamentis adstringentibus vino austero vnitis. Item Columel. lib. 6. cap. 6. ex falis sextante cum cepis decem contrito & admisto melle decocto collyria componit, quæ bouis cruditate laborantis aluo immittatur. Vtitur etiam collyriis Aetius lib. 8. ad suffusionem, docēs ex certis medicamentis collyria effingenda, quæ ad rufum & orthopneam per infundibulum suffiri debet. Verum collyria in oculis præcipuum usum habent, qui quanto sunt reliquis corporis partibus præstantiores, tanto magis medici veteres in eorum collyriis elaborarunt, & eorum copia quodāmodo luserunt. Quorum cum plures reperiantur differentiarum, tres tamen præcipuæ & summæ habentur. alia enim καλλύειον simpliciter, alia *ἐπιτολύνειον*, alia *ὕδατος καλλύειον* compositis nominibus vocantur. Differunt autem ab inuicem sola materia: siquidem quæ collyria simpliciter dicuntur, ex omni materia indifferenter constant, liquoribus, succis, seminibus fructibus, stirpium & animalium particulis, aromatibus, metallicis, cuiuscumque ea sint facultatis. Atque vt omnem materiam comprehendunt, sic nullus morbus est qui eorū aliquo inuari non possit. In quibus præparandis istud scire oportet, quod Celsus in Philonis collyrio, & Oribasius libr. 10. collect. monent, omnia medicamenta quæ collyrium constituunt, singula primum per se terenda esse, metallica quidem longo tempore, succos autē exiguo, deinde mixta iterum, adiecta aqua (præsertim pluuiali, tum quod tenuis sit omniaque permeet, tum quod modice adstringat) aut vino aut alio liquore non copiose affuso ne metallica sublidat, aromata supernatet, verum paulatim, vt fordidum modo teri possint. Quæ omnia postquam satis læuia euaserint, gummi adiciens

dum est, quod cum alias quasdam facultates habear, hoc maxime præstat, ut ubi collyria facta inaruerunt, glutinata sint neque fricentur. Deinde vero in formam redacta, valis maxime æreis vel vitreis reponenda sunt. Quum autem usus postularit, ea vel intacta, ut aliquando in sede, vtero & fistulis, adponuntur: vel humore aliquo diluuntur & affectæ parti delinuntur, quæ ex eo *μασά* à medicis aliquando vocata cõperies. Quæ vero *ἑρπικία*, hoc est arida collyria, dicuntur, metallicis præsertim constant, seminibus, fructibus aromatis & alia sicca materia; humore aliquo vel gummi collecta & coherente. Ea verè parari debent, quod per ætatem nimia tritura portio eorum puluerulenta quæ purissima est facile euaporet: per hyemem vero bene misceri simul nequeant, mistaq; non bene secum vniantur & viribus contemperentur. Postea autem perinde ac alia reponuntur, sed maxime in æneo vase; quæ sunt oculorum gratia comparata (ea namque meliora ab ære fiunt) quibus non statim uti expedit, quod vetustate præstantiora reddantur. At *ὀφθαλμικία*, hoc est humida collyria, componuntur ex liquoribus, succis, oleis, melle, animalium felle & aliis compluribus similiter humidis & variâs etiam vires habentibus. quibus protinus uti licet, quoniâ vetustate euanescent. Habent autem & horum collyriorum singula per multas differentias, quæ ut materia & viribus diuersis constant, sic varia sortita sunt nomina: *μυνομίαι*, *ἀδελφαί*, *πατρικαί*, *Νεογὰρ*, *πρεσβυταί*, *ἀνδρῶν*, *ἡσπέρδα*, *ἡσπερμιαί*, *χλωραί*, *κίρκαι*, *ἡσπερμιαί*, *σίβια*, *νάρθηα*, *ἡραχουμαί*, *καμινίαι*, *ἰοδία*, *ἰοδονία* & alia pleraque, quorum singula ut celebratiora sunt & à veteribus medicis vsuipata, passim hoc opere suis locis exponuntur.

*Κομύειον*. Sic dicta est à quibusdam altera species Samie terre, quod commodissime oculorū collyriis miscetur, vel ipsa per se collyrii vsum præstet. Est autem pinguis, tãra, mollis, candida; in pingui dulcis, glutinosa, levis. Eam Dioscorides *πρὸ ἀγνῆς* prætulit. Exsiccat, modice refrigerat, sanguinis eruptiones compescit. vide *σμήμα γν*.

*Καλίσμια*. mūtillum, siue curtum. Id dicitur à Græcis quod in labiis aut narium alis aut aure deficit. Huius generis sunt & quas in maiore oculi angulo *κοιλάς* vocant, eo utique vel impenius extenuato minoreque facto, vel prorsus abolito.

*Κοιλάριον*, dicta est à quibusdam faba Ægyptia: quamquam sunt qui non totam plantã, sed eius modo radices sic dictas ab Alexandrinis fuisse existiment. In Ægypto nobilissima est, eamque à Nilo metunt, caule cum coctus est araneoso in mândedo, thyrsio autem qui inter folia emicat spectabili. Sunt qui eam *κίμινον* vocent. Dicitur & *καλίσμινον*.

*Καλαγίστον*. idem quod *ἡ καλαρία*. sic autem etiam à quibusdam dictum fuisse *τὸ ἄρον*, Dioscorides author est.

*Κοκκυμῖον*. cucurbita. Est olus hortense cum cucumete satiuo floribus, folio reptantibusque flagellis conueniens. Verum cucurbita sublimitatis audior est, scandens parietū aspera in rectum vsque, dependente à tenui pediculo enormis ponderis fructu, coloris herbacei, pyri figura turbinato. Frigida & humida est, utrumque secundo ordine. Galenus eam non damnat in cibis, quod, ut ait, non sit mali succi, si optime prius cocta fuerit. Coquendi autem rationem ipse explicauit lib. 2. de aliment. facult.

*Κοκκυμῖον ἀγνῆον*. ἢ *καλαμῖον*. apud Hippocratem.

*Καρδικῖον*. cucurbita fyluestris. frutex est cui palmites & folia per humum strata repunt cucumeri satiuo similia, diuisurisque scissa. fructu in orbem circumacto & in medio-cris globi speciem glomerato, fungosa candidaque intus medulla; ingenti amaritudine. Plena ipsa est nec inanis, minor quam satiuâ, primum herbacea, mox pallida. Vim habet purgadi maximam & valde subitam. Viridis ipsius succus intritus ischiadibus prodest.

*Καλυνία*. arbor est magna, fructum ferens in siliqua magnitudine lentis. folium habet fœnogræco nō absimile. Sunt qui eam à Mauritaniis Sene vocari putent.

*Κολοφονία*. dicta est antiquis resina pinea, quod Colophone præcipua apportaretur. nam & ex Gallia & ex Tyrrenia etiâ adferebatur. Eadem quoque alio & simplici nomine *φρυκτι* dicebatur. Erat autem olim omnium ferè resinarum maxime parabilis & in penuria mastiches substituebatur. Præter hanc autem quæ *φρυκτι* dicebatur, aliam insuper fuisse colophoniam, Chiz mastichæ persimilem & molliens aliquid habentem Gal. scribit lib. 7. *πρὸς χρ. γλῶσ.*

*Κολοφονία*. à quibusdam dicitur *τὸ σκαμνίσκον*, ut habetur apud Dioscoridem.

*Κόλπος*. sinus. significat proprie spatium quoduis in corpore, sed particulariter designat dextram aut sinistram vteri partem, ut passim legitur apud Galenum lib. 14. vsus part. ut cum dicit: Homo geminus est dextris & sinistris in toto corpore, & mammis & vteri sinibus, vno dextro & altero sinistro: hic enim pro vteri dimidio sumitur. In quâ etiam significatione Praxagoras & Philotimus vterum muliebre, *δικλῶτον*, & animalium *τὸν πλῆκτον*, *πλῆκλον* vocarunt. Priuatim vero *κόλπος* dicuntur cornua vteri, præsertim in animalibus multiparis, quæ in cornibus fœtus suos continent, mulieribus nō item: quoniam non in cornibus, sed in vteri capacitate fœtum gerunt.

*Καλινία*. arbor est rara inuentu, circa Idam fere solam ptoueniens, fruticosa, ramosa multis alis concaua, folio vltimi longiore, latifoliz lauri proximo, sed ampliusculo & rotundiore, supra viridi, infra cano nervosque, & renuibus neruulis fibrisque prædito, de medio callo in costarum speciem adductis ma-



teris solida, cortice non lævi & quasi virgineo. Radicibus per summa gracilibus & solutis, sed fibratis & valde flauis. Sterilis est & flore vidua, surculos tamen gemmasque circa folia pingues, læues, candidos, amantacea facie fundit. Præcisa vel ignibus exusta, ab imis rediuiua resurgit. Colycea alia est apud Theophrastum, folio facilis, comosa, ramosa, in totumq; ampla valvulis leguminum more non angustis, in quibus semine latum, paruum, durum non nimis nec abunde pro magnitudinis ratione frutificat. Hæc aliqui Plinio staphylodendrum dici existimant.

*Καμυβάδης*, dicuntur oliuæ muria condite inque ea innarantes. Condiendi ratione Constantinus Cæsar explicat lib. 9. cap. 3. 3. de agricult. Referuntur autem plures à Ruellio lib. 1. cap. 104.

*Καλχυν*, sic dicitur *καλχυν* quod venenatum est, quoniam apud Colchos plurimum nascatur. Sunt etiam qui agrestem sic bulbum vocant, ut author est Dioscorides.

*Κομαγην*, vide *κομαγην*.

*Κόμπος*, arbutus, vnedo. Species pomi agrestis & inhonori, ut ait Plinius, ut cui nomen ex argumento sit vnum tantum edendi. Appellant & Græci *μυμύκων*, ut scribit Galenus. Est autem infensum stomacho, & capitis dolorem mouet.

*Κομν*, sic vocatum à quibusdam *καμν* hoc est, barbulam hirci, scribit Dioscor.

*Κομάτης*, sic dicitur à quibusdam *καμν* hoc est, ut habetur apud Dioscor.

*Κομαγην*, Comagenum. Vnguenti genus fuit apud antiquos, quod in Comagene Syriæ parte fiebat, à qua etiã sic dictum fuit, itemque *συμαγην*. Sic enim Gal. lib. 2. τὸν καμν, Syriacum Archigenis vnguentum interpretatur, quod Comagenum ex Syria apportaretur. Fiebat autem ut docet Plinius, ex adipe anserino cum cinnamo in vase æreo multa niue obruto, ac rigore gelido macerato: aut, ut idem postea ait, ex adipe anseris cum cinnamo, casia, pipere albo, herbaque Comagene vocatur, obrutis niue valis odore iucundo. Vim habuit calfaciendi, relaxandi & emolliendi. Apud Gal. lib. 3. sanis. tuendz, ubi de curatione *καμν* agitur, metio sic vnguenti cuiusdam comacini cui pares ille vires tribuit. Sed Comageni legendum esse existimo, quod facilis lapsus sit, quodque a libi nusquam comacinum legatur.

*Κόμμη*, gummi. Exoticum quidem nomen est, à Græcis tamen vsurpatum. Est lacryma arborum quarundam congelata in ipsarum truncis. Speciem quidem resinæ habet, differt tamen, quod gummi substantia aquea magis est, resinæ vero oleaginosa, proinde illud aqueis promptius miscetur, oleaginis ægerime, hæc è contrario: præterea resina flammam facile concipit, gummi vero in igni crepitat. Sed cum multa sint eius genera ex diuersis arboribus prodeuntia, ut cerasis, pinu, cupressu, hedera, pruno, amygdalis, iunipero, cum simpliciter *κόμμη* dicitur, id

quod ex acacia spina provenit intelligitur, in vermiculorum speciem contractum, vitri modo pellucidum, purum, quod & gummi Arabicum, & à quibusdam acanthinum appellatur: Nascitur enim ex acantha, ut scripsit Dioscorides primamque landem apud antiquos meruit, quod & Plinius testatur scribens, Gummi optimum esse ex Ægyptia spina, vermiculatum, colore glauco, purum sine cortice, dentibus adhaerens: Acrius vero *κόμμη σπώνη* τὸ λευκὸν commendauit. Scribonius inter ocularia pharmaca gummi Alexandrinum probauit, & in hæmatitino collyrio gummi Thebaicum laudatur: quæ omnia nihil aliud sunt quam ipsam gummi Arabicum. Vim habet refrigerandi & densandi, ocularibus medicamentis & arteriacis commodissime miscetur.

*Κομμάτιον*, comptoria æris, quæ fuso ascititiam pulchritudinem inducit. Eâ medicinz partem esse Galenus negat, sed lenionum, mangonum & maleficorum hominum esse dicit, neque à viro bono & integro medico exercendam, nisi à regibus aut principibus coactis. Nam & ea apud quasque laudatissimas gentes viris præcipue probrosa fuit. A Philippo Macedonum rege Plutarchus tradit quendam capillorum tinctura superbientem ex ordine iudicum motum esse, hoc etiam addito apophthegmate: non sperandam integritatem ab eo in gerendis rebus, qui etiam capillis facum prætenderet; Ouidius quoque eam compturam exectatur his versibus:

*Sint procul a nobis iuuenes, ut facina, cõpti.  
Fine colis modico forma virilis amat.*

Attamen veterum etiam plerique, ut refert Galenus, etiam honestissimi, huiusmodi artem sibi notam esse voluerunt. Sed & Archigenes vir doctrina & gravitate insignis de ea scribere non est veritus. scripsit & Heraclides Tarentinus & Cleopatra etiam tum cum minus luxui & deliciis homines indulgerent. Et post eos omneis Crito, quem maiori venia dignum Galenus censet, quod in Imperatoriis ædibus medicinam exerceret. Cuius libri quamuis perierint, eorum tamè summa capita Galen. recenset lib. 1. τὸν καμν. Nec vero tam tetricus & severus fuit Galenus, ut omnem prorsus ornatum è medicina summoueret. Recepit enim inter medicinz partes τὴν κομμάτιον, hoc est exornatoriam, eamque medicinz partem esse perhibet, ut quæ naturalae corporis pulchritudine custodiar atque tueatur, neque quicquam adscititium inuehat. Additque verum ornatum capillorum & nõ fucatum non solum ad pulchritudinem, sed etiam ad ipsarum partium robur & sanitatem conferre.

*Κομμάτιον*, comptoria æris, apud Hippocr. Atticorum more, qui τὸν κομμάτιον καμνῶν vocant, & τὸν σπώνη καμνῶν, ut annotauit Erotianus.

**Conditum.** Est vinum cum aromatibus sacco percolatum. Sic enim veteres vina condiebant & commendabant. Id quod ex Plinio intelligitur, dicente de Aniso, saccis ipsum addi & cum amaris nucibus vina commendare, non diverso arbitror modo à vino quod Phàrmacopolæ Hippocraticum appellant. Aromata autem quibus condiebatur erant; piper, cinnamomum, zingiber, garyophylli, nux muscata, galanga, flos rosmarini, spica, folium Indicum, arque etiam absinthium nonnunquam, ex quo idem vinum absinthiatum etiam dictum est, addito plerumque & melle. Eiusmodi conditi compositionem vnam describit Constantinus Cæsar lib. agricult. 8. cap. 30. hunc in modum: Piperis loris, siccari & probe triti scrupulos vii i i. mellis Artici sextarium vnum, vini veteris albi sextarios v. aut i i i i. Sed plures Aetius lib. 3. ad purgandam tum bilem vtramque, tum pituitam, & extremo etiam lib. 6. quâquam illi non pereolent vinum sacco, contenti aromata in vinum indidisse. Erat autem huius vini varius vsus, vt ad robur ventriculi, ad cruditates, ad flatus, ad frigidam humidamque intemperiem, atque ad emolliendam aluum & purgationem, vt docet Aetius. Est vero conditi nomen merè Latinum, sed tamen à Græcorum recentioribus usurpatum, vt etiam ex Pallade epigrammate notum esse potest quod habetur lib. i. epigram. Græcorum.

**Kardipina.** species est oleris frigidi quidem sed amari, & acri in radice succo. Caulem, folia & flores habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli syluestris intubi speciem esse dixerunt: verum tenuior tota est, in cuius ramulis gummi mastiches simillimum tuberculo fabæ inueniri solet. Reperitur hæc scriptura apud Plin. & Dioscor. apud Gal. & alios *κάρδιον*, rectius, vt alphabetica series apud Helych. indicat.

**Kardiorum.** digitorum & brachiorum articuli & iuncturæ. Rufus tamen in partium hominis nomenclatura ait *κάρδιον* dici medios digitorum articulos, à quibus *κάρδιον* appellantur qui ante eos sunt, proximi scilicet metacarpi: qui autem post eos habentur, *μικρόν κάρδιον*, postremi videlicet.

**Kardionoma.** est carnis excrescentia callosa in digitis manuum ac pedum, in sede item ac vterique coalescens. sic dicitur quod prominet in modum articuli quem *κάρδιον* appellant. Sed hic affectus in sede præcipue oritur, ruga aliqua corporum in ano reduplicatorum insurgente ac præter naturam intumescente. Quum enim sinuosus sit anus, rugas eo agmentatas habet: vbi vero amplius intumuerit, tunc fit condyloma. Et aliquando quidem citra inflammationem fit & molle est: quandoque vero cum inflammatione, tumque durum est & dolorificum.

**Kalis.** tria potissimum significat, calcem, cinerem, lixiuium, sed aliquando additur quod ipsum quæ de re intelligi debeat, interpre-

retur, vt *κalis aëreas*, calx viua, *κalis aëreas*, lixiuium calcis. similiter *κalis saxæ* & *κalis dronij*, lixiuium stillatitium & excolatum, ex loco & percolato cinere factum: cuiuscunque generis ille sit, vitis, fici, mali, tithymalorum, lapidum, partiumue animalium. Ex reliquiis enim quorūlibet corporum vstorum ablutis lixiuium fieri potest præditum diuersis facultatibus, pro eius quod eluitur, natura. Eius enim quod empyreuma, seu igneam naturam habet acerrimam, ipsum quoque acerrimum est, eius quod tale non est, etiam moderatius. Idem vero etiam simpliciter *κalis* appellatur. Quod si cineri cuiusque calx addatur, id lixiuii genus *κalis* appellari Paulus Aegineta auctor est lib. 7. Sunt & alia lixiuiorum genera, varias sortita appellationes ab artificibus, quibus illa inferuiunt, vt *κalis dronij* & *κalis saxæ*, quorum illud figulis, hoc vero saponariis in vsu est, nisi quis malit paratum ex sapone lixiuium intelligere.

**Kalis.** lens, dis. Est veluti pediculorum ouum, pilis adherens. Neque enim pediculi coeunt, vt parere ouum possint, neque ex eo pediculus vnquam excluditur. Signum tamen est morbi pedicularis. Ex eadem enim materia & lens & pediculus oriuntur, sed hic animatur, illa inanimis manet. Nam cum humor generandis pediculis accommodatus sub cute consistat, parte quadam animatur & pediculus fit: parte vero alia qua pili oriuntur, radicibus pilorum adhærens vna cum propria pilorum materia foras à calore pellitur & circum eam concrescit: aut pilorum materia vi foras erumpens, per medium eum fertur, & eum secum rapit. Len-des enim pilos circumstant, eidemque pilorum parti semper inhzrent, quantumque ipsi pili augentur, à radice tantum recedunt.

**Koniza.** est fruticosa planta duum generum, vnum quod femina dicitur; minoris odoratiorisque: alterum quod mas, maioris, frutice altiore, latioribus foliis, odore grauiore. vtrique folia oleæ, sed hirsuta & pingua. Alitudo maiusculæ cubitorum binum, pedalis minori: flos quoque squalidus, colore luteo ac subrufo; qui in pappum & lanuginem abit, radicibus surperuacuis. Addit & Dioscorides tertium genus conyzæ cui crassior & mollior est caulis, folia media inter maiorem & minorem amplitudinis, cæterum minime pingua, odoris multo foetidioris. Reddit & Plinius quartam speciem quam appellat satiuam, serpyllo similem, è cunilagine montana factam. Cæterum *κονίζα* tum maior, tum minor assimilis sunt, tum temperaturæ, tum facultatis, gustu amaræ & acres, excalfaciuntque admodum luculentæ, calfaciunt & exiccant tertio ordine: genus vero tertium à Dioscoride proditum in locis humidioribus proueniens, imbecillius est. Conyzam vulgo pulicariam, quod pulices necet, rura cimicariam appellant, quod folia

folia cimicibus quibusdam aut bestiolis volucribus eis proximis frequenter onusta reperiantur. Latinis cunilago dicitur.

**Konion.** sylvestre origanum auctore Dioscoride & Galeno. Sic dictum putant, quod Conylos quidam homo eam inuenisse proditur. vide *de pte. par.*

**Konios.** species thuris in Arabia & Smilo nactis quod Indico minus multo & fuluius est. Ei secundum locum Dioscorides assignat.

**Konios.** lassitudo. Est corporis affectio, male acce exercitatiōi succedens. Habet enim suas leges exercitatio, ex quarum præscripto intelligitur non modo quæ in ipsa exercitatiōe fieri debent, verum etiam quomodo ante ipsam corpus præparari debeat, tum quæ sit post eam absolutam apothera-piz ratio. in quibus si quid peccatum sit, lassitudo maxima frequentissime consequitur. Sunt autem qui eius notionem intelligentiamque accipiant, dum vsti extenti-que post exercitatiōem sibi esse videntur, idque aut omnibus corporis partibus, aut iis tantum quibus laborarint: quidam vero cum tristi molestoque sensu dum sese mouent afficiuntur (quem alii indicibilem dixere, alii vlcerosum appellauere) nonnulli cum membra ceu contusa & phlegmone obfessa sentiunt. Si quid horum vel simplex, vel cum altero duorum aliorum coniugatum post exercitatiōem inciderit, *konios* Græce dicitur, hoc est lassitudo. Itaque triplex in vniuersum omnis lassitudo est, *ex vsti, extenti, & phlegmonis*. Quæ quidem corporum affectiōes sicut ab inuicem sunt differentes, sic varia etiam habent symptomata pathognomonica. In vlcerosa lassitudine vlceris sensus, cum mouentur, se exhibet: in inflammatoria, inflammationis: in tensua, incendi tendique sibi videntur qui laborant. Vlcerosa quidem oritur ab excrementorum tenuium copia & acrimonia, quos ipsa exercitatio nimia & celeres ac multi motus pariunt, eo excremento quod crassius erat, fuso & attenuato, nectamen toto expulso, aut adipe molliue carne liquata. Nec vero solus exercitatiōis excessus eam gignit, sed sponte etiam aliquando prouenit, & maxime in ea incidit corpora quæ & mali succi sunt & excrementis abundant. Succedit vero & recentibus cruditatibus. Qui ea lassitudine laborant, iis vlceris sensus, cum mouentur, adest, fatenturque inter mouendum dolore sibi vlceris ricu alii cutim tantum, alii subiectam etiam carnem. Necesse enim est abs tali humore ceu tenui atque acri in vacua spatiola effuso, ea que replente, pungi & quasi vulnerari cutem atque carnem, sic vt etiā horror interim oboriarur, imo etiam quadamtenus concussio commotioque totius corporis in aqualis quod *pyrexia* dicitur, si modo is humor copiosius fir mulrumque actis. Ta-

lis quidem est vlcerosa lassitudo. Tensua vero à nullo quidem excremento gignitur de quo magnopere sit curandum, sed residet in musculis & nervis ex nimia tensione, quam exercitando admiserunt, affectus quidam effectricis causæ potestatem testificans. Accidit namque in vehementi tensione omnes musculorum fibras contendi, non tamen similiter omnes lassari, sed eas maxime quæ per longitudinem tensionis porriguntur. Quippe quæ obliquiores quodammodo iacent, minus in directum aguntur, quare his nullum instar periculis. In iis vero quæ immoderatus sunt extensus, ita vt parum à rumpendo absint, relinquitur affectio quædam similis ei quæ inter agendum fiebat. Quippe tendi adhuc videntur, cum tamen nulla iam tensione vigeantur. Incidit huiusmodi lassitudo iis quibus salubris succus est, post robustas potius quam celeres exercitatiōes, redditque lassatos ipsos pigros admodum, egreque flexibiles. Non tamen densi horrentesque apparent, cæterum contracti aridique. Tangentibus vero calidiores videntur, nō solum iis quos vlcerosa lassitudo detinet, sed etiam quam ipsi met, cum sani essent. Tertia autem lassitudinis differentia quæ *phlegmonis*, hoc est inflammatoria, seu inflammationi similis, dicitur, in qua nimirum ceu contusas aut phlegmone obfessas partes sentimus, cum maxime soler incidere, cum musculi nimium excalacti attrahere quippiam ex circumfusis sibi excrementis. Ex vehementissimis nascitur motibus, sola que supra naturale habitum musculos attollit, sic vt phlegmone persimilis affectio sit. Itaque & leui tactu offenduntur, & calidiores apparent. Dolent vero etiam, si ipsi per se moueri conentur. Incidit hæc lassitudo iis plurimum qui assueti exercitatiōibus non sunt, nam exercitari assuetis raro incidit, etiam ex vehementissimis plurimisque motibus. Sed putet fortasse quispiam lassitudinem hanc nec simplicem esse, nec à duobus iam traditis tertiam, sed ex his cōpositam, nec aliunde constantem quam ex nervosarum partium tensione & vlceris sensu. Calorē namque qui in eiusmodi lassitudine sentitur, in aliis quoque naturaliter inesse, veluti in memoratarum vtraque, nec tamen complendē notionis substantiæ ne partem vllam esse. Verum illud huic vni præter cæteras egregie inest, nempe maior quam pro naturali habitu tumor, nec doloris ipse sensus idem in hac atque in tensua lassitudine habetur. Quippe in illa tendi, in hac contrusos esse vsque ad ossa nervos putant, qui ipsa laborant. Quare in his saltem proprium à reliquis duabus discrimen habet, nec est composita tantum. Præter has tres proprias lassitudinis differentias alia est, quæ ceu lassitudo fit, nonnullis imponit. Hæc incidit cum supra iustum musculi siccantur, sic vt igualens contractumque corpus appareat, atque ad

motus quodammodo pigrum, non tamen ei vel vlcis, vel tensionis, vel phlegmones sensus inest: sed nec horrorem vllum doloremne, nec pigritiam ad motus ei similem infert quam lassitudines inuehant, sed gracilitatem tantum ariditatemque facit. Incidit quidem hæc in corporibus boni succi & exercitationi assuetis, ubi immodice exercitata parum rite apotheraia sunt vsa. Quippe ita & digeruntur excrementa, & quæ tensa fuerant laxantur, nec aliud in corpore relinquitur præter siccitatem quam ex immodico motu contraxerunt. Hæc quidem sunt lassitudinis simplices quatuor differentiæ ab immodicis motibus genitæ, quibus aliz totidem respondent sponte venientes, quas *ἰσχυρὸς νόσος*. Hippocrates appellauit, & dixit morborum esse prænuncias. Vt enim quæ immodicas exercitationes lassitudo excipit, sanorum symptoma est: ita quæ sine his consistit, morbosum. Ac lassitudo quidē vlcerosa spontanea eadem prorsus est cum ea quæ exercitationi superuenit, siue ipsum affectum, siue eius symptomata spectemus, causa tantum differt. Huius enim externa, illius interna causa est, acrimonia scilicet tenuis & calidi humoris corpus erodentis, stimulantis ac pungentis, qui imprudentibus nobis in corpore succreuit. Tensua vero quoties sua sponte incidit, plethoris superuenit. Tertia verò quæ phlegmones sensum affert, ex ambobus oritur, tum nimia boni succi abundantiæ, tum acri illo & vitioso succo, non vti que in venis cum bono sanguine misto, sed ab his translato, atque in carnibus & ad cutem solo hærente.

**Kompia.** faui expressi apud Hippocr.

**Kompoc.** stercus. Excrementum est siccum primæ concoctionis. Vbi enim ventriculus cibum concoxit, chylum omnem, hoc est, quicquid tenue liquidumque in eo est, venæ mesaraicæ tam quæ ventriculum ipsum circumstant, quam quarum orificia ad intestina pertinent, exugunt atque absorbent, donec nihil penitus liquoris super sit, siccumque euadat excrementum. Id autem à ventriculo profectum & per tenuia intestina dilabens, tandem in crassioribus subsistit & figuratur, *ἰσχυρὸς* alio nomine nuncupat. Quod quamquam ob foetorem abominandum sit, multos tamē vsus habet. Siquidem Asclepiades, cui cognomen fuit *Ἀσκληπιάδης*, ipsum multis sæpe affectibus accommodauit, non modo medicamentis quæ foris imponuntur commiscens, sed iis quoque quæ intro per os sumuntur. habet autem omnem vim vel maxime digerentem, nullum tamē omnino stercus refrigerat, sicut nec vllum humectat. Plures sunt eius differentiæ. Stercus hominis præsertim pueri, qui lupinis & pane optimo alius sit, resiccatur & in puluerem solum & cum melle Attico ad leniorem tritum, anginas etiā ante missionem sanguinis persanat. Stercus canis durū, candidum & minime foetens, resiccatur & ad

leniorem redactum angine medetur & dyentericæ & vlcibus extreme malignis. Stercus lupi candidius, quale ubi ossa ederint solent excernere, non modo potum ex vino albo sed etiam suspensum colicos iuuat, tum in paroxysmis tum in intervallis. Stercus caprinum, Græci *ἀνέγδοι* proprie nominant, digerentis & acris facultatis est, scirrhis lienis & aliarum partium conuenit, & aquæ inter cutem, & alopecis, & lepris, & ploris, & lichenibus, & parotidibus, & bubonibus. Est enim vis eius tum vsti tum non vsti absterforia & valde digerens. Stercus bouis exiccat, atque etiam attrahit, valetque ad chæradas & tumores omnes scirrhosos, ex aceto in cataplasmaris formam compositum. Stercus ouillum ad acrochordonas, myrmecias, rhymos, furunculos duos quos clauos nominant, vtiliter adhibetur aceto dilutum. Stercus columbinū valde exalfacit, & cum semine nasturcii contrusum, cribratumque siccum vice napyos conuenit iis quæ rubrificari debent, vt coxendici, hemicranicæ, scotomati, vertigini, cephalicæ, doloribus lumborum inueteratis & podagricis ante tophorum generationem. Stercus gallinaceum colubino minus calidum est, valetque ad eos qui ab esu fungorum suffocantur, tritum & inspersum tribus vel quatuor oxycrati aut oxymelitis cyathis: item ad colicos ex ænomelite aut vino aqua diluto. Stercus crocodilorum terrestrium absterget & desiccet, proinde cutem faciei intendit & splendidam reddit: ephelidas, vitiliginem & lichenastollit. Aliorum animalium stercora fere inutilia sunt.

**Koridæon** *ἡ κωρίδιον*

**Koridion.** dicitur pharmacum ad placentulæ formam cōtundendo redactam, huius aliquot exempla habentur apud Gal. libr. 7. *τὸν κῶριν* *νόμος*, vt: Seminis lini, vuz passæ, ana sextarium vnum. nucumpinearum, nucum Pōticarum, ana heminā vnam. pipēris albi sextantem. myrrhæ, croci, ana vnicam vnam. mellis Attici libras 11. contusa vt oportet tritaque reponito. Non valde abhorret hæc compositio ab ea quam vulgo mazapanem aut pastam regiam appellant. Conueniunt enim præcipue pectori, quamquam & alio emolliendæ, adhibentur, vt scribit Dioscorides libr. 4. de cnico, & ad excitandam venerem lib. 2. de lino. Sic dictum est hoc medicamen quod non coqueretur sed tunderetur.

**Koridion opexyis.** nomen est pastilli quem ex Asclepiade Gal. recitat. libr. 5. *τὸν κῶριν* *νόμος*.

**Koridionis ἀποφύσις.** est processus omoplaræ exiguus & acutus, ab interna eius parte oriens. sic dictus est quod eius finis, vt cornicis rostrum foras inclinet. Dicitur & alio nomine *ἀνυπόσις*, quod suo extremo anchoræ similis videatur.

**Koridionis ἡ**

**Kicamos.** corallium. Est lapis, in mari expingui succo

succo arboris in modum cōcretus. Vt enim ex pingui succo qui in mare influit, *ἡλεβρον*, hoc est succinum, nascitur, ex salso autē, qui maris est proprius, *ἀλαριν*: ita ex eo qui in lapide inuratur, *καρχήμιον*, siue, vt Theophrastus vocat, *καρχήμιον*: alii *καρχήμιον*, alii *καρχήμιον* appellant. Nam, vt res ipsa demonstrat, frutex est sub aqua marina viridis & mollis, baccas habens similes cornis natiuis specie & magnitudine, item molles sed candidas, *καρχήμιον* appellant: resectus autem statim in aere duratur, vt scire Ouidius his versibus declarauit:

*Sic est corallium, quo primum contigit auras  
Tempore, durefcit, mollis fuit herba sub undis.*

Quoniam vero, quam primū in aerem profertur, solet lapidescere, Gorgonia etiā nominatur vt ait Plinius, quod Gorgonas in lapides versas fingant poetæ. Ceterum corallio non vnus color est, sicuti nec aliis lapidibus qui ex id genus succo cōcrescunt. Et enim si succus fuerit ruber, corallium rubrū nascitur, si candidus candidum, si niger nigrum, quod Dioscorides proprio nomine à quibusdā *αἰνιπιδίς* vocari scribit: si denique subuiridis, subuiride. Attamen omnē, priusquam rebus fuerit euulsum aut ferro præcisum, viride videtur esse. Interdum vero ramos gerit diuersi & variū coloris: Omne refrigerat, siccāt & modice adstringit, vt egregium sit ad sanguinis profluvia medicamentum. Quoddam est durum, vt Gallicum: quoddam molle, vt Campanum. Omne cum decidit in terram, frangitur. Aliud præterea est solidum, aliud fistulosum, aliud scabrum, nascitur multis in locis:

*Καρχήμιον*, sunt qui sic vocari putent *πύλον αἰνιπιδίς*. Et Paulus in compositione quam aduersus podagram instituit *στυγακαμίν* cognomine, *αἰνιπιδίς* flore puniceo micantem *καρχήμιον* videtur appellasse, à qua nomen est indicum medicamento, non alia forte de causa, quam à similitudine floris anagallidis cum corallo rubro. Quanquam non desint qui existiment mendosa eo loco exemplaria esse, & scribendum *καρχήμιον* non autem *καρχήμιον*: quoniam glutinam facultatem à *αἰνιπιδίς* habeat auctore Hippocr. & Gal.

*Κορχήμις*, bacca corallii, hāc Plinius, nescio quē auctorem sequentis, in gemmarum numero posuit, & cerasum repræsentare dicit.

*Κόραξ*, pastillus perutilis ad putridorū vicerū, præsertim pudendorū nomas, cuius descriptio bis habetur apud Aetium lib. 14.

*Κορδίνια*, *ἡ καρθαία* apud Hippocratem, vt interpretatur Erotianus, *καρχήμιον*, hoc est, quod caput vellicet & contorqueat. Scribitur & *κορδίνια*.

*Κόρη*, pupilla. Est minor oculi circulus intra iridem comprehensus per quem cernimus. Hic autem non aliud reuera est quam tunice quæ *παρσίδης* dicitur, foramen, in eum vsum à natura factū, vt per ipsum res visibiles humori crystallino facilius parerent. Per pupillam enim cernimus, non quod ea sit præcipuum

videndi instrumentum, sed quod spiritui visorio per eam via pateat, nec possit aliter visio fieri: Argumento sunt hypochymata. Est autem locus ille qui ad pupillam est, totus spiritu plenus & præterea cæruleo viridique colore aut aliis etiam præditis quibus & ipsa vicia, cuius ille pars quodammodo dici potest. Rufus *πύλον κόρη* definit esse τὸ ἐν μέσῳ ἑὸ φθαλμοῦ βλέποντων: hoc est, quod in medio oculi inspicitur. Scribitque eandem alio nomine *ἑλῶν* vocari: *γλήνη* autem simulacrum quod in pupilla cernitur, quam tamen multi etiam pupillam interpretantur. Alio vero loco idē scripsit *καρχήμιον* dici τὰς ὀφθαλμοὺς, τὰ μέσα τῶν ὀφθαλμῶν δὲ ἐν ὀφθαλμοῖς. hoc est, glenas vocari quæ in medio oculo sunt, per quæ videmus, vel, vt aliis placet, *πύλον* *μὲν*, ὃ βλέπομεν, *κόρη* δὲ καὶ *γλήνη*, τὸ εἰδωλὸν τὸ ἐν τῇ ὀφθαλμῷ. visionem quidem id esse quo videmus: pupillam autem & glenam, simulacrum esse quod in ipsa visione est:

*Κόρη*, τὸ ὁπθάλμου apud Hippocratem, vt scribit Gal. habet enim fructum *καρχήμιον* similem.

*Κόρημα*, medicamentum quod cutim extērit & læuigat. Alias pro scopis ponitur: quo significatu & *καρχήμιον* dicitur.

*Κοριανδρον* ἢ

*Κόριον*, coriandrū, frutex est caule exili, sesquicubitali, ramoso, folio adianti, rotundo capite, cicuta odore graui, semine rotundo nudoque, radice lignosa, breui neque adeo fibrosa. Verustiores Græci, inquit Galenus, *καρχήμιον* nominabant, ac recentiores medici omnes *κόριον* appellant. Dioscorides vim illi refrigeratoriā tribuit, ideoque illitum scribit cum pane aut polēta ignibus sacris mederi, & alia permulta præstare: verum vt Galenus prodidit, contrariis facultatibus costari habere enim plurimum essentiae amaræ, nec parū etiam atque humiditatis, quibus & adiunctum sit adstrictionis paucillū, ideoque calfacere, incidere, attentiare, adstringere, reprimere & refrigerare, atque ex tam variis facultatibus ea omnia præstari quæ Dioscorides coriandro tribuerit. Sed præterea certum est si maiore copia sumptum sit, ab eo mentem non leui periculo tetari & insaniam prouocari à temulētis non abhorret: ideoque copiosiorē contrariumque eius vsum vitandum esse. Nūc omnem eius noxam abigimus infuso eo in acetum & postea exiccato. Sic enim apparatus tantum abest vt mentem lædat, vt vix aliud præstantius remedium sit ad repēcutiēdos vapores qui in cerebrum feruntur. Crediderunt aliqui sic vocatum à cimicibus, quod folia & caules eos olent. Sūnt qui *ἀπὸ τῆς κόρης*, hoc est à pupilla, dictam velint quasi coriambon, id est, hebetantē oculorū pupillas. Dioscorides etiam hypericum scribit à quibusdā *κόριον* vocatum fuisse.

*Κόριον ἑνυχρον*, sic dictū est à quibusdā τὸ *ἐξ ἑνυχρος*, vt habetur apud Dioscoridem.

*Κόριον*, frutex est folio erice, rubro, pinguiore ac minore, non altior dodrāte, suavis, odoratus,



actis. Aliqui hypericon vocant. Significat & cimicem.

κέρως. nouum & recens germen apud Hippocratem, quod ramis adnascitur.

Κέρως. ciborum repletionem significat apud Hippocr. lib. *αὐτὴ διαίτης ὀλίγη*, vt comment. 4. Galenus annotauit.

Κόρυς. κρόταροι. hoc est, tempora.

Κόρυζα. grauedo. Est crudi humoris ē capite in nares distillatio. Hic cerebri morbus est praesertim vero priorū eius ventriculorum. Sunt enim eo humore repleti plenique. est autem hic humor non qui proprie κίρκος siue crudus dicitur, sed qui ἀπυλός, hoc est liquidus & tenuis. verū tamen non locorū modo qui ad nares habentur obstructio fit, sed etiā tū spiritui ipsi qui in ventriculis est, tū cerebro quod hos cōtinet intēperies quā dā accedit, qualis ab obstructiōe soler cōtingere. Causa eius est solis aestus, vini potus largior, balnea calidiora, perfusio capitis ex aqua calida, maxime si caput calidius existat, & cibus in vētre incoctus manens, neque per inferna descendens: his enim caput humorem superfluum colligit & repletur. Sed immodice refrigeratū cerebrū coryzam creat. Sic enim caloris penuria male cōcoquit alimētū, patiturq; idem quod ventriculus diarrhœa laboras. Quod enim in vētre diarrhœa est ex mala cōcoctione, talis in cerebro est catarrhus & coryza: sed coryza quidem dicitur cum in nares humor distillat, catarrhus vero cum in os defluit per palatū. Cornel. Celsus libr. 4. cap. 2. auctor est & distillationem & grauedinem κούρας Hippocratem nominare.

Κόρυλος. arbor cuius fructus nux auellana & λεπτοκάρπου dicitur.

Κορυμβόδρα. dicitur à quibusdam δίκωος, vt habetur apud Dioscor.

Κορυμβία. edulii genus ex ferulæ caulis, vel etiam racemis quos κορυμβες vocāt decoctis, & muria melleque conditis.

κορυμβιον. dicta est à nonnullis ἡ λυχνίς σεφανωματική, hoc est lychnis coronaria. vt habetur apud Dioscor.

Κορυφή. vertex. Sunt autem qui eo nomine intelligāt capitis partem inter synciput & occiput mediā & summā. Ea σεφανή proprie dicitur. Sunt vero qui partem eam capitis interpretentur, in qua capilli alii ad dextrā, alii ad sinistram inuertuntur, vt non sit aliud κορυφή quam linea illa quę capillos in duas partes distinguit. Vnde & δικρήφοι, id est biuertices, dicuntur, nō ii quidem quibus os summum capitis geminū sit, sed illa potius linea discrimenque capillorū. Rufus κορυφῶν definit τὸ ἐν μέσῳ, καὶ ὃ δὴ μάλιστα εἰλουμέναι αἱ πείχες: id quod in medio est per quod maxime voluntur capilli. Id quod etiam sequuti Latini verticem dixerunt à vertendo, nimirum propter flexum capillorum, quod illic velut in gyrum ii vertantur. Quam etiam ob causam quidam ex Græcis ἐλγμὸν & πόλον ἀπὸ τῆ πάλιν, hoc est à vertendo, eandem partem

appellarunt, vt auctor est Pollux.

Κόρχος. sic à quibusdam dicta est ἡ ἀναγανίς, auctoribus Dioscoride & Plinio, quo nomine venit in adagium Græcis, κόρχος ἐν λαχαρίσ. quod est, Corchorus inter olera, trāsferturque ad frugales quosdā & indignos qui sua fortuna maiores sibi quarant honores, & gloriam quam se deceat clariorem aucupentur, cum humilis nec palmum excedens herbula, inter grandissima quæque olera sibi locū destinet & internasci lætetur. Quāuis in aliū sensum detorserit Theophrastus libr. 7. histor. volens corchorum ob amaritudinem prouerbio dicatum esse, taxarique eos potius qui gratiam voluptatem & suauiore nonnullorum consuetudinem qua frui possent, tristi vel amarulento conuentu turbant.

Κορώνη ἢ

Κόρωνον. est ossis apophysis in finem acutum desinens, cuiusmodi habetur vna vtrinque in osse genæ inferioris, tēdinem à temporali musculo descendente excipiens. Sic autem dicitur, quia ἡ κορώνη, hoc est cornicis, rostro similis sit. Quæ autem apophysis in caput crassum & rotundum desinit, non κορώνη sed αὐχλὼ nominatur.

Κορωνόμος. medicorū vox est, significās id quod κύβωλον & ab Hippocrat. κύβων nominatur. Pollux lib. 2.

Κορωνόπους. herba est oblonga, per terram strata, fissis foliis & aculeatis, radice gracili. Leoniceus capriolam vulgo dici censet, nonnunquam etiā sanguinariā, quod naribus indita sanguinem eliciat. Nostri nunc olitrores dentem canis vocant, quāquā eodem nomine gramen appellent. Sed coronopū quoque generibus graminis Plinius assignauit. falluntur qui coronopū coruinū pedem esse existimant. Pes enim coruinus exulcerandi vim habet maximā: coronopus autē estur, & adstringit. Sic dictus est quod eius stylus ē mediis foliis exurgēs, in cornicis pedem conformatus articuletur, reliquam exhibens cruris effigiem.

Κοσμητική. ars exornatoria. Pars est medicīnæ, vt ait Galenus, quę naturalem corporis pulchritudinem custodit & tuctur, neq; quicquam adscititium inuehit, in quo ἀπὸ τῆ κοσμητικῆς differt eodem auctore. de qua vide suo loco.

Κόσμος. dicitur ab Hippocrate ordo cum in re omni, tū maxime in diebus criticis. Vt enim τῆς ἀνοσμητικῆς propria est ἡ ἀπαξία: sic etiam ἡ τῆς κοσμητικῆς, vt annotat Galenus comment. εἰς τὸ περὶ γεννητικῶν. Dictio autem Attica est, secundum quos dicuntur κοσμοὶ οἱ εὐτακτοὶ καὶ κοσμηταί, οἱ δ' ἐφ' ἑαυτὸν ἐνταξίας περνούοντες. hoc est, κόσμοι qui bene ordinati sunt: & κοσμηταί qui præerant ordinationi epheborum.

Κοσμοσάδελος. flos hyacinthi apud Hermionenses, vt refert Pausanias.

κόστος. costus siue costum. frutex est in Arabia, India & Syria nascens, sed præcellit Arabicus, cādidus, leuis, eximia odoris suauitate.

Secundum

Secundum locum sibi vendicat Indicus. Ienis, vber, vt ferula niger. Tertius autem Syriacus est, granis, colore buxeus & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredinibus non orosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Modice amaram, plurimum autem acrem & calidam qualitatem facultatemque obtinet, adeo vt etià exulceret. Sollet eo corpus ex oleo confricari ante accessionem quibus per circuitum rigor innadit: item resolutis & ischiadicis. vrinæ mensæque prouocat, & propter amaritudinem lumbricos necat. Herbarii faciunt huic affinem nomine costum hortensem, quem vulgus coquum, alii Mariæ herbam appellant.

**Κόπος.** oleaster, qui & *ἀργεῖα* dicitur, hoc est, sylvestris olea.

**Κόπης.** *ἰνὸν καὶ παρεγκεφαλῆς*, hoc est occiput & cerebellum apud Hippocr.

**Κοιλαῖσμός.** remedii nomen cuius mentio fit à Paulo Ægineta in curatiōe *τῆς κεφαλῆς*. Quale autem fuerit, non est facile dicere. Potest intelligi eo nomine aquæ superfusio, eo ferre modo quo veteres Athenienses in illo cōuiniali ludicro, qui *κοίλας* dicebatur, facere solebant, vt Athenæus & Suidas scriptis suis prodiderunt. Potest & *κοιλαῖσμός* simpliciter accipi *ἀντὶ τῆς ἀποσυρσίμου*, hoc est, ablutione deterfioneque per spongiam facta auctore Phauorino qui in lexico suo *κοιλαῖσμον ἀποσυρσίον* interpretatur.

**Κοπύλη.** est mensura liquidorum apud Atticos capiens *πέντε δύν*, hoc est, quartaria duo, siue Italicas vncias nouem mensurales, quæ ad septem & dimidiam pōderales reducuntur, vt author est Galenus lib. 5. *τὴν καὶ ἥμισυ*. Alio nomine Græcis *πενδλίον* dicitur & *ἡμίξισον*, id est dimidiū sextarius. Siquidem ὁ ξίστος duas κοπύλας continet. Sunt qui *κοπύλην* Latine heminam interpretentur. Et satis quidem bene, quia nulla sit Latinis mēsurā que propius ad *κοπύλην* accedat. Nec tamen eadem mensuræ sunt. Κοπύλη enim vncias Italicas nouē capit, vt diximus: hemina autem Romanorum vnam præterea continet. Verum aduertendum est Romanos medicos alios *τὴν κοπύλην* aliquando pro libra vsurpasse, vt videre licet apud Galenum lib. 4. de tuenda sanitate; *μετρήσαντες οὖν εἰς τὰς εἰκοσι καὶ πέντε κοπύλας μέδου καλῆς τὸ σπέρμα καὶ ἰσχυρῆς οὖτον δὲ τὴν κοπύλην ἰσχυρῆς, αὐτὴν καὶ ἡμισυ τρας ὀνομάζουσιν.* hoc est, coniciis autem in quinque & viginti heminas seminis abietis modium Italicum. Esto autem & hemina ipsa Italica, quam vtique & librā nominant. alios vero minorem, alios etiam libra maiorem existimasse, sicut ex ipso Gal. apparet libro 6. *τὴν καὶ ἥμισυ*. his verbis, *οἱ μὲν οὖν πέντε τὴν καὶ ἥμισυ πέντε μέτρον καὶ αὐτὸν, ὃ φασι ὅτι τὴν αὐτὴν ἡμισυ μέτρον, τὴν δὲ τὴν ἡμισυ τὴν αὐτὴν ἡμισυ μέτρον. βίβλινος γὰρ ἡμισυ τὴν κοπύλην. ἄλλοι δὲ τὴν ἡμισυ φασι ὅτι τὴν αὐτὴν τὴν ἡμισυ, καὶ αὐτὴν ἐν ἡμισυ τὴν ἡμισυ τὴν ἡμισυ*

*βίβλινος ὀνομάζουσιν.* *ὅτι δὲ πέντε ἡμισυ μέτρον ἡμισυ τὴν αὐτὴν ἡμισυ μέτρον, τὴν δὲ τὴν ἡμισυ μέτρον, τὴν δὲ τὴν ἡμισυ μέτρον.* hoc est, plurimi igitur qui conscripserunt de mensuris & de ponderibus, nouem dicunt vnciarum quæ sunt in Romana libra, esse eam quæ à medicis dicitur in libris de medicamentis, coryle. Alii autem dicunt duodecim vnciarum ab ipsis dici, quemadmodum Romæ libram olei cōmuniter appellant. Audiui vero etiam ex quodam dicente sedecim vncias Romanas continere eam quæ in libris de medicamentis dicitur à medicis coryle. Significat autem proprie *ἡ κοπύλη* cauum. vnde *κοπύλην* appellauerunt non modo vasis genus & mensuram, sed sinum etiam in quo caput femoris voluitur, & cavitatem manus quam volam Latini dicunt. Verum proprie ab anatomicis dicitur *ἡ κοπύλη* cavitās ossis profundior, in quam alterum os inseritur. Quæ vero non est rām profunda sed superficialia, γλῶττι ab Hippocrate appellatur.

Sed & *κοπύλη* aridorum mensura fuit apud Atticos. Cōtinebat autem *ὀξύβα* quatuor, siue vncias nouem mensurales. Eius nota fuit apud Græcos K per cuius apicem inferiorem linea recta per obliquum dicta esset, & desuper imposito.

**Κοπυλάδην.** umbilicus Veneris. herba est folium habēs acetabuli figura, vnde & nomen, orbiculatum, & incuidenter concuum: cauliculo breui qui è medio prosilit, in quo & semen inest, radice oliuæ modo rotunda. Est & alterum *τῆς κοπυλάδης* genus quod ab aliis *κομυλάδην* appellatur, pinguibus foliis latioribus, ligularum modo densis, circa radicem medium oculi ambitum describentibus, vt in maiori semper uiuo. adstringentis gustus. cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici, radice maiuscula. Est autem *κοπυλάδην* mistæ facultatis, nempe humidæ, subfrigide & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amara. Quare refrigerat, repercutit, abstergit & discutit.

**Κοπυλάδης.** sunt ora venarum & arteriarum intra vterum eminentia & quodammodo nodosa, non multum ab hæmorrhoidibus an dissimilia, aut *τῆς κοπυλάδης* herbæ foliis orbiculatis & parum concavis. Seruatur namq. in medio ipsorum orificiorum parua cavitās in coryles modum. Per hæc sanguis menstruus vel vacuatur foras, vel in foetum nutritur vel assumitur: siquidem apertis his effluit, sicut cōiuentibus suppressitur. His etiam orificiis foetuum secundæ vterō inherescunt, vālorum vteri finibus ita secundas subeuntibus atque illigatibus, vt eadē prorsus vteri & secundarū vasa esse videantur. Si quidē in quibus orificiis vteri vasa desinūt, ab iisdē secundarū vasa incipiūt: onibus enim inuicem vniuntur, venæ quidem venis, arteriæ autem arteriis, vt illæ sanguinem, istæ spiritum foetui subministrent. Nec verō id tantum ea vasa præstant, sed etiam secundas

vtro ita colligat, vt fortius haud temere ex-  
cidat. Alii vero, vt refert Gal. nullas prorsus  
vtro mulieris *καταλιδνας* inesse crediderunt,  
quos tamen ipse & doctissimorum virorum  
testimoniis & ipsa anatomia reuincit. Insunt  
enim & mulieribus, quauis minores quam  
quæ in vaccis, capris, ceruis atque aliis eius-  
modi animalibus apparent.

*Κοιλίς. ἡ κοιλία ἢ ἰσχίον.* hoc est, concutitas coxen-  
dicis, apud Hippocratem *ἐν τῇ μοχαλκῷ*, & lib.  
2. de morbis.

*Κύβης.* culeus. Est mensura liquoris tantum, om-  
nium maxima qua Romani vsi sunt. Con-  
tinebat viginti amphoras auctore Plinio  
libr. 14. cap. 4. Quando & postea sæpenu-  
mero septenos culeos singula iugera, hoc  
est amphoras centenas quadragenas, multi  
dedere. sic Plinius. Idem docet Rhemnius  
Fannius his versibus:

*Est & bis decies quæ cōfici amphora nostris  
Culeus. hoc nulla est maior mēsurā liquoris.*

Ac quamquam iusta hæc esset culei mensu-  
ra, vasa tamen quæ culci, propterea quod  
quam proxime ad eam mensuram accede-  
rent, vocabantur, plus minusue aliquando  
continebant, vt apud Catonem de re rustica  
capite 148. à quibus tamen veram culei mē-  
suram æstimare non decet.

*Κρεῖν.* dictus fuit à quibusdam eo nomine  
*κρεῖναιον*, apud Dioscor.

*Κοῦρι.* genus est portionis, inquit Dioscorides,  
ex hordeo factæ, cuius potu sæpe pro vino  
veteres vsi sunt. Non videtur esse nomen  
Græcū, sed eius gētis in qua apparabatur:  
verum, vt idem ait, dolores capitis inducit,  
noxium humorem gignit, & neruorum vi-  
res resoluit.

*Καταλύειν.* λύειν καὶ παύειν τὰς πόδας, apud Hippoc.  
hoc est, soluere & sedare dolores.

*Κύχιν.* cochlearium siue cochlear. Est li-  
quoris mensura apud Romanos quartam  
cyathi partem capiens, sicut ex Columella  
patet libr. 12. cap. 21. Et ex eo molito post  
saluturam musti cochlear cumulatū, vel si-  
mile genus poculi eius, quod est quarta pars cy-  
athi, adducitur ad binas urnas. Latini ligu-  
lam vocant à linguae similitudine in catum  
intra dentes palatum versus contractæ. Est  
& *κοχλιάριον* tum liquidorum, tum etiam ari-  
dorum apud Atticos mensura, omnium quod  
sciam minima, quartam & illa cyathi par-  
tem continens, siue drachmam vnam, scri-  
pulum vnum, grana duo, & duas quintas  
grani.

*Κοῦρι.* significat apud Hippocr. iūcturam co-  
xendicis ad sedem. vocatur autem & eo no-  
mine tota circa sedem regio.

*Κοῦρι.* συνὴς οἱ ἀκρίμωνες. hoc est, fici rami, apud  
Hippocr. vel etiam folia, vt annotauit Ero-  
tianus. Nec tamen fico soli, sed vlmō etiam,  
robori plantanoque gignuntur.

*Κραταί.* κραταίον, βασιλείον, apud Hippocr.  
hoc est, dominantur & regunt.

*Κραπαλή.* crapula. dicitur auctore Galeno o-  
mnis noxa è vino contracta. Philumenus,

vt habetur apud Aetium, scripsit cruditates  
ex vino multo obortas crapulas appellari sic  
dicitur *κατὰ τὸν ἑκάστον πάλεσσαι*, quod temulen-  
tis cerebrum concutitur.

*Κεῖμα.* vinum dilutum & aqua temperatum,  
quomodo vti homines decet: dicitur *κατὰ  
μερίαν*, quod miscere & temperare signi-  
ficat. Id videtur esse quod Celsus lib. 1. dilu-  
tam potionem appellauit.

*Κεῖμα.* brassica. Est olus simplici & amplo sti-  
pite, leuiter rubenti, crasso folio, prægrandi,  
læuo, crispo, carnoso, ex cæsis candicante, in-  
latus vtrinq; diffuso, prominulis venarum  
thoris fruticæte, patula cyma, flore tum lu-  
teo, tum albo. vulgo caulis dicitur, quoniam  
nulla fere herba caule sit amplior. Plura eius  
genera veteres statuerunt. Syluestre sati-  
uo simile, sed candidius, hirsutiusque & a-  
marum, vt ait Dioscorides. Item marinum  
quod *θαλασσοκράμβη* dicitur, & vulgo solda-  
na, à satiuo, vt idem ait, prorsus abhorrens,  
folio aristolochiæ, acce & in totum stoma-  
cho inimicum. Est & *ἀλμυρὴ* & *καρφοῦς* &  
*σπινθία* siue *σπινθοῖς*. Ex multis authoribus  
constat quam nunc *κράμβη* dicimus, olim  
vocaram fuisse *ράφανον*, præsertim ex Aristo-  
tele libr. 5. de histor. animal. vbi de erucis  
in brassica nascentibus agit, his verbis: *αἱ δὲ  
γίνονται ἐκ τῶν φύλων τῶν χλωρῶν, καὶ μέλαινα  
ἐπὶ τῇ ραφάνῳ, ὡς καλεῖται πρὶς κράμβη.* hoc  
est, hæc autem gignuntur ex foliis viridibus,  
præsertim autem raphani, quam quidam  
cramben vocant. Similiter ex Galeno libr.  
2. de aliment. facult. sed suo tempore sic vo-  
cati defuisse. Cæterum brassica deficcet &  
cuiusdam acrimonie particeps est. habet &  
vim aliquam abstergendi.

*Κραμβή.* ἢ *κράμβης ἀφ' ἡμῶν*, id est, crambes de-  
coctum, apud Hippocr. Dicitur & eo nomi-  
ne à quibusdam *καπρόνους*, vt habetur apud  
Dioscoridem. Erotianus annotauit ab Hip-  
pocrate, vt & à Siculis, *τὴν κώνωρον* sic vocari.

*Κεῖμα.* cornus. Est arbor duodecim fere cubi-  
torum, cortice neruoso, tenui, caudice haud  
ita crasso, neque semper recto, atque etiam  
nodoso, sed ita solido, vt cornibus spissitate  
non absimilis respōdeat. folio amygdali; sed  
crassiori pinguiorque flore & fructu oleæ,  
dulci, grato odoratu, pluribus cornis singu-  
lari pediculo dependentibus. Talis quidem  
mas est. nam fœmina quæ Theophrasto *δρ-  
υκράνια* dicitur, caudice fungoso & inutuli  
virgulis instar amerinæ fruticat, autumnali-  
bus baccis perquam acerbis & cunctis a-  
nimantibus gustu intactis. Mas Gallis cor-  
nelia dicitur: fœmina dumeris & nemorib.  
familiaris, sed quod neglectas & ingustabi-  
les ferat baccas, indignam quæ corni nomi-  
ne vocaretur, rura purauerunt. Nam & ma-  
ris fructus et si esui aptus, tamen admodum  
acerbus est. valenter ventrem adstringit, sic,  
ut & mespila; & valde deficcet, ideoque ma-  
xima vulnera glutinare potest.

*Κεῖμα.* cranium. calua. caluaria. Est os capitis  
crassum, rarum, rotundum, ossibus septem

compactum futurisque distinctum, cerebrū continens. Crassitudo quidem illi magna est, ut validum sit, nec obnoxium externis iniuriis: solidum vero esse non expediebat, tum ne iusto grauius euaderet, tum ne ineptū esset transmittendis cerebri excrementis. Itaque rarum & canernosum fieri oportuit. Idem vero si recte à natura conformatum est, rotundum quidem est, & sphaerae simile, ita tamen ut sphaeram non omnibus numeris æquet. Siquidem oblongum est, & à lateribus quidem vtrinque parum depressum: anteriore autem ac posteriore parte parumper extuberans & gibbosum, inferiore autem planum. Constat ossibus septē, quorum primū parteque anteriore situm, frontem constituit: *μετωπον* Græci vocant. Id parte supernā, *τη στεφανιαία ραφή*, hoc est, sutura coronali, quæ transuersum ab vno temporum ad alterum excurrit, inferiore, ossibus maxillæ superioris, à lateribus vero osse *της σπονδυλίας* concluditur. Ac quamquam id os fere semper vnicū sit, euenit tamen aliquando ut geminū sit, recta sutura quam *βελαν* vocant, ad nasum vsque descendente. Ab eo duo ossa sunt quæ *βριζια*, hoc est, synciput, componunt. diuiduntur & ab invicem separantur sutura illa recta, quæ à posteriore capitis parte in anteriorem per verticem procurrit: vtrumque autem terminatur anteriore quidem parte sutura *τη στεφανιαία*, posteriore autē ea in sutura quæ transuersum in occipite sita figuram  $\Delta$  literæ representat, & *λαμβδωδής* ideo nuncupatur: inferiore vero futuris iis quas *λεπιδωδής* appellant. Alia præterea duo sunt ossa *της προπιου*, hoc est temporum, & ea quidem vtrinque singula, ad vtramque aurem sita. Distinguntur parte superiore futuris *της λεπιδωδής*: posteriore, laterum *της λεμβωδής* appendicibus: anteriore, futura quæ ossi *της σπονδυλίας* communis est. Sextum cranii os occiput constituit: *ινιον* Græci vocant, distinctum sutura *της λεμβωδής*. Septimū autem *σπονδυλίας* est, quod in basi positum, cunei modo (unde & nomen inditum) inter omnia cranii ossa genamque supernam medium adigitur: omnia namque contingit. His septem ossibus addi etiam octauum potest *ιδιουδής* dictum, paruum, in frontis basi positum, & multis, in cribri modum, pertusum foraminibus. verum id frontis ossi vel *της σπονδυλίας* accensetur, etiam si interdum, sed maxime in pueris, separari facile possit: similiter & *αδωνδής* à Galenō proprie vocatum, nisi pars ossis temporum plerisque videtur. Insunt autem omnibus his ossibus crebra foramina per quæ tum nervi è cranio prodeunt, tum venæ atque arteriæ intra ipsum admittuntur. Constant & propemodū omnia squamis duabus, quas *δπλαϊας* vocat Galenus. Ex his satis apparet quor qualesque sint in cranio future. Tres ex quidem sunt maxime in cranio secundum naturam se habente: duæ quidem transuersæ, quarum

vna in syncipite, altera in occipite est, tertia vero quæ à media syncipitis futura ad mediam suturam occipitis secundum capitis longitudinem porrigitur. Anterior *στεφανιαία* dicitur, hoc est coronalis, quod ea capitis parte coronæ imponi soleant. Posterior vero *λαμβδωδής*, à literæ Græcæ similitudine. Tertia vero quæ per verticem recta excurrit, *βελαν* atque *λεπιδωδής*, quod instar veru aut virgæ recta procedat. Hæ tres future ita se habent, ut figuram literæ  $\Gamma$  referant, sicut ab Hippocrate proditum est in libello de vulneribus capitis, & à Galenō explicatum lib. 9. de vsu partium. Præter has aliæ geminæ sunt à recta futura æquidistantes quæ secundum capitis longitudinem à parte posteriore in priorem super aures procurrunt. Fiunt autem ex duobus inter se coherentibus ossibus non per suturam quidem, quæ species est *της σινυαρθρωδους*, sed veluti conglutinatione quadam. Siquidem syncipitis os squamæ modo attenuatum sensim descendit seseque in os ab auribus ascendens insinuat: ideoque eas nonnulli non simpliciter futuras, sed vel futuras *λεπιδωδής*, vel *σινυαρθρωδής λεπιδωδής* appellant. Sic quidē compositum conformatumque cranium cerebrum continet, eiusque firmissimū munimentum est, ut quod non aliter quam galea, quæ *κρανις* Græcis dicitur, ab omnibus externis iniuriis ipsum tueatur.

*Κερατεις*. genuini dentes, qui omnium nouissimi nascuntur, sic dicti *αφ' ου το κρανιον ητοιμασθαι τω ηνικια*: lidem etiam *συνσπονδυλεις* appellantur, de quibus vide suo loco.

*Κερατις*.

*Κερατις*. arbor neq; adeo magna neque valde crassa, materie versicolore, robusta, flaua, cortice læui, simplici, radice in profundum acta, folio mespili, sed promissiore amplioreq; fructu rotundo, qui maturescens siccatur atque nigrescit, gustu & succo mespilaceo. Quapropter sylvestris mespilus, ut Theophrastus scribit, putatur esse. Quidam *χαμαίκεσσον* intelligi posse crediderunt. Plinius in Italia dici aquifolium putat, quod quidem nō aliud veteribus fuit quam ilex.

*Κερατις*.

*Κερατις*. herba est foliis melampyro similibus, multis calamis ab vna radice emicantibus, multorumque geniculorum, semine milii. Nascitur in opacis & fruterosus. Eius fructus, ut ait Galenus, milio similis, acris gustanti est & venti frigidus.

*Κερας*. sic dicitur à quibusdam *ο πεπος*, hoc est, pars ea manus quæ sub digitis est.

*Κεραρον*. friabile. id dicitur quod nec lentoris nec pinguedinis quicquam habet. opponitur *της γλίσσης*. Dicitur & *δρακον* & *ιδρυον*.

*Χρημα*. nomen fictitium apud Hippocratem, dictum de molesto & odioso sono.

*Κριμα*. *απ' ου το κριμασσον*, apud Hippocratem. hoc est, suspendito.

*Κρυματις*. sunt musculi duo, vtrumque scilicet

vnus, à quibus testes sursum trahuntur. Eorum vterque gracilis est & longus, & cum vasis spermaticis à musculis hypogastri descendit ad ipsos testes, eos releuans. Contrariis carent musculis qui contrarium motum efficiant: nullus enim est qui testes ad inferiora reuellat, quod satis sua grauitate impetât, ægris præsertim & senibus. Errat Paulus lib. 6. cap. 61. qui *ἡσπέρη* & *ἡσπέρη* eisdem putat.

*Κρημύς*, *κρημύς*, apud Hippocratem, *κρημύς*, vt apud Homerum.

*Κρημύς*, herbula est fruticosa & vndique foliosa, cubiti fere altitudine, foliis pinguibus, multis, albicantibus, vt portulacæ lauioribus & longioribus, salso gustu, floribus candidis, semine cœu rosmarini odorato, molli, rotundo, quod siccatum rumpitur. Habet intus tritici modo nucleam. Radices digiti crassitudine tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Salsum est & modice amarum, itaque abstergit & siccatur. Scribitur quidem passim apud Dioscor. *κρημύς* *ἡσπέρη*, scribendum tamen esse *ἡσπέρη*, colligitur ex Galeno in lib. simpl. medic. & præterea Helychio.

*Κρημύς*, apud Hippocr. dicuntur *κρημύς* *ἡσπέρη* *ἡσπέρη*, hoc est, labra vlcera, vt lib. de locis in homine, sic etiam vocantur *κρημύς* *ἡσπέρη*, hoc est alæ muliebris pudendi, vt annotat. Erot.

*Κρημύς*, dicitur tertium genus aristolochiæ quam proprie *κρημύς* vocant.

*Κρημύς*, *κρημύς*, cretica terra creta. Species est terre albæ, siccæ, macræ, levis & extergentis. Talis quidem vt plurimum creta est. Euariar tamen aliquando, vt & nigricans, & viridis (quam *κρημύς* quidam nominant, quod in Theodoti cuiusdam fundo id genus cretæ primum inuentum sit) reperiatur discurrentibus per eam lineis vniuersi coloris. Est & in substantia discrimen: siquidem non semper macra, sed & aliquando modice pinguis est, vt apud quasdam gentes stercoreandis agris inferuiat. Multum viribus superatur à Chia, Samia Selinusia, Lemnia & Cimolia terra. Est enim admodum imbecilla, multum habens substantiæ aeræ. Inest tamen ei vis extergendi & citra morsum. Quam ob causam argentarii ea vrantur ad vasorum splendorem, & proinde *κρημύς*, hoc est, argentaria, appellatur. Vnus eius in medicina fuerit ad ea omnia, ad quæ aliæ omnes sine morfu extergentes facultates valere possunt.

*Κρημύς*, sic dictum à quibusdam *κρημύς* fuisse scribit Dioscorides.

*Κεσπύς*, hordeum, vulgo notum est, culmo tritici, fragiliore, minorique, sed octonis geniculato articulis, simplici instipula folio, & eo quidem scabro latoque, grana fere nuda longiore capillamento, mordaci arista striatim spicantur, radice frequenti, coma fibrata, refrigerat, siccatur, extergit. Ex eo saluberrima illa ptisana, & tot laudibus ab Hippocrate celebrata conficitur, refrigerandi detergendi que facultate insignis.

*Κεσπύς*, hordeum vel hordeolum. Est tuberculum paruum, oblongum, palpebræ cilio, quæ pili sunt, admalescens. Externum est & foris prominet, atque in eo, sicut Celsus ait, tunica quiddam quod difficulter maturefcit, comprehensum est. Ex quo patet plurimum pituitæ in eo contineri, vel simplicis vitzque, vel cum alio humore mistæ. Sic dicitur ab hordei similitudine. Græci alio nomine *κεσπύς* appellant, vt scribit Gal. extremo lib. 4. *κεσπύς*.

*Κεσπύς*, herbula est fruticosa & vndique foliosa, cubiti fere altitudine, foliis pinguibus, numerosis, albicantibus veluti portulacæ, latioribus & longioribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semen cœu rosmarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur, habet intus tritici modo nucleum, radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Nascitur in maritimis & petrosis. Apud Helychiū est *κρημύς*, apud Galenum *κρημύς*.

*Κεσπύς*, crassior farina apud Hippocr. quæ effracto hordeo inuenitur graduscula, nec perfecte molita est. Dioscorides autem dicit esse crassiorem ex zea triticoque farinā, ex qua pultem faciunt, abunde autem alere, sed ægre confici, aluum vehementius adstringere, si zea ex qua sit, prius torreatur. Cum autem Hippocrates dicit *κρημύς* *κεσπύς*, crassissimam farinam intelligit. Fieri autem ex olyra crassiorem farinam, quam Græci *κρημύς* vocitant, idem Dioscorides auctor est.

*Κεσπύς*, *κεσπύς*, dicitur farinæ crassiori similis. Fit autem, vt ait Galen. lib. 1. de crasib. aut propter vehementem colliuationem, aut calorem ardentem à quo sanguis aduratur. Itaque omnis eiusmodi hypostasis mala est, vt scribitur in prognost. Nam si per exaltiales morbos inciderit, breui futuram mortem significat: si vero in morbis non mortiferis apparuerit, morbi longitudinem porrexit, vt habetur aphor. 3. r. lib. 7. Sed plurimi quidē per eiusmodi morbos cito pereunt, aut si euadāt diutissime ægrotant. vide *κεσπύς*.

*Κεσπύς*, sic dictum esse à quibusdam *κρημύς*, hoc est lilium, Dioscorides auctor est.

*Κεσπύς*, vnguentum liliaceum quod & *κεσπύς*, & *κεσπύς* *κεσπύς* *κεσπύς* hoc est, Egyptiū vnguentū, album, & sulfinum vnguentū, appellatur, vt auctor est Galenus in explicatione vocū Hippocratis. Costabat lilio & quibusdā aromatis, vnde vnguenti non etiam olei nomen habuit.

*Κεσπύς*, lilium, herba est caule simplici, tritubitali, comoso, foliis longis, satyrū effigie, ex herbaceo nitentibus, radice bulbosa, flore emaculati candoris, calathi forma, extrinsecus striato, resupinis per ambitum labris, luteis emicantibus, ex fundo calycis apicibus, alterius quam flos odoris. *κεσπύς*, à quibusdam dicitur, vt scripsit Dioscorides, ex quo vnguentum fit *κεσπύς* siue *κεσπύς* vocarum, discutiendi molliendique viribus præditum.





aut plane ad interitum indicant. Mala vero fere in sextum, octauum, decimum, duodecimum incidit: quorum omnium rationes Galenus in libr. de diebus criticis explicauit. Ceterum cum hæc quatuor sunt *crisis* genera, in ea tantum quæ optima est cognoscenda definiendaque medici operam suam posuerunt, quod ea agnita facile sit imperfectas malasque crises diiudicare, quorum vestigiis insistentes, omnem eius naturam, vim, proprietates, differentiasque paucis exponemus. Cum varii sint morbi, ad eos tantum crisis pertinet, quos humor committit. Hic quia fere semper crudus est & qualitate vitiosus, nisi totus concoctus & mitificatus fuerit, sanitas integre restitui non potest. Concoctionem autem intelligere oportet, non conuersionem in corporis substantiam, sed moderationem quandam & alterationem malignæ qualitatis in aliam benigniorem & naturæ minus molestant. Quia ergo ne sic quidem concoctus humor nutrire potest, sed naturæ onus est superfluum, eum natura à corpore expellat necesse est: id quod si paulatim & longiore spatio fiat, concoctio non crisis dicitur, morbusque ipse concoctione finiri, non crisi. Siquidem in crisi illam vacationem sine mora & confertim fieri oportet. Itaque si, ut vniuersus humor subito vacuetur, necesse sit eum totum perfecte concoctum esse (cruda enim non facile expelluntur, naturæ contumaciter resistentia) patet optimam illam crism non alio tempore quam in morbi vigore contingere, in quo solo humor perfecte concoqui solet. Cum autem vacuatio humoris duobus modis contingat, vno vere & proprie humore à corpore depulso, & excreto: altero vero, eodem in alteram partem translato, utroque modo fieri potest crisis, quorum illum *crisis excretionis*, hunc *crisis translationis*, hoc est per translationem siue per abscissum, nuncupant. Siquidem humores relicta parte in qua morbum excitabant, locum mutant & alio abscedunt. Quæ criseos ratio etiam *crisis excretionis* appellatur. Sunt autem eius quæ *crisis excretionis* dicitur tot differentia, quot habetur & vacationis, per alium, per vrinas, per hæmorrhoidas, per vomitiones, per sputa, per profluuium sanguinis è naribus, quod proprie Græci *αἱμορραγία* nuncupant, per sudores. Nectamen omnes ex æquo bonæ habentur. Nam longe melior perfectiorque est, quæ *crisis excretionis* sit, quam quæ *crisis translationis*. Hæc enim magna ex parte imperfecta est, nec morbum plane soluit. Deinde vero quæ per inferiorem vacationem contingit, melior quam quæ per superiorem. tum per quam noxius & redundans humor, melior est ea per quam alius humor vacuatur, tum quæ *crisis excretionis*, ut ait Hippocrates, quam quæ aliter sit, tum quæ per meatus conuenientes, ad hæc quæ antea die *συνεργία* indicata die decretorio obuenit. Fit autem in tam repentina mutatione magna in corpore agita-

tio perturbatioque, adeo ut præcipuum ferre futuræ crisis signum Hippocrates dicat noctem, quæ crism præcedit, valde molestanti delirio, vigiliis, comate, doloribus, lacrymis, difficultate spirandi, tenebris ante oculos obortis, summa in quietudine & aliis id genus malis, quæ quidem sicut maxime sunt formidanda & plena periculi, si per initia morbi & ante humoris concoctionem appareant: ita in ipso vigore & post signa concoctionis tuto breuique futuram crism pollicentur.

*crisis* etiam præter superius explicatas significationes sumitur aliquando apud Hippocratem pro ipsa accessione, ut aphor. 1. lib. 1. sicut Galenus & Philotheus in explicatione eius loci scripserunt.

*crisis* à quibusdam vocatur medium spinæ foramen, quo omnes spinæ articuli sibi iunguntur, & spinæ medulla à cerebro descendit: magis visitato nomine *σπίλαι* dicta. Iulius Pollux id spatium inter scapulas cauum quod secundum longitudinem ad lumbos porrigitur, *crisis* nuncupari scribit, dicens: τὸ μέσον τῆς μήκους ἀρχαῖς ὀστέων, ἐν τῇ νύκτι καὶ ἀπορροή, κρίσις καλεῖται. hoc est medium id secundum longitudinem quod excurrit usque ad lumbos in dorso cauatum, crisis nuncupatur. forte quod dextram partem à sinistra *ἀπὸ κριπῆς*, hoc est discernit & determinat.

*Κρίσις*, dicitur ab Hippocrate libr. *ὅτι διατρίβειν, ἢ κρίνειν πρὸς τὴν νοσήσαντος*, hoc est, quod facit crism morbi. quod idem est ac si dicas *ἀφέναι*, id est vtile, ut Galenus annotauit. ut autem idem scribit comment. in prorethetico, *κρίσις* duobus modis accipitur apud Hippoc. ut signum, & ut causa per se *κρίσις*. Signum quidem id dicitur, quod futuram crism prænunciat. Eorum duplex est differentia: alia signa tantum sunt, alia non modo signorum, sed causarum etiam rationem habent. Signa tantum sunt, colli dolor, temporum grauitas, tenebre, oculis obuersantes, vertigines, capitis dolores, lacrymæ inuito obortæ, facies & oculi rubentes, labiorum motus, vigiliæ, somnus gravis, asthma, dyspnœa, præcordiorum retractione, stomachi fastidium, nausea, æstus, sitis ingens, rigor, cardialgia, molestus decubitus, lethargus, delirium, vociferatio. Signa vero & causæ sunt, vomitus, excrementa alui, copia vrinæ, sudores, sanguinis eruptiones, parotides, & abscessus quos *σπασμωγία* vocat. Nā si quædam ex ijs die *συνεργία* apparuerint, eadēque proximo die critico grauiora magisque euidencia sint, non est dubium eodem die futuram esse crism. Qualis vero futura sit, ex aliis notis petendum tum ijs quæ concoctionem cruditatemque significant, tum aliis quibusdam incertis & ambiguis quidem, sed magnam tamen vim habentibus, qualia sunt, mente constare, bene se habere ad ea quæ offeruntur, facile respirare, facile ferre morbum, pulsus bonus, facies sanis simillima, decens

decens accubitus, totius corporis æqualitas, & alia de quibus ab Hippocrate scriptum est in prognosticis. Nam pro horum signorum viribus illa superiora bonam malamve crifim & perfectam vel imperfectam fore ostendunt. *κρίσιμος* autem vt causa, dicitur omnis vacuatio & abscessus per quem crifis ipsa perficitur, vt vacuatio per aluum, per hæmorrhoidas, per vomitiones, per sputa, per *αἰμορραγίας*, per sudores. Omnes præterea abscessuum differentia, post aures, in alas, in inguina, in articulos, in cutē (est enim quidam icterus criticus) & in alias omnes corporis partes. Hæc quamuis *κρίσιμος* vt causa proprie dicantur, signorum tamen etiam rationem quandam habent, sicut paulo ante diximus.

*Κρίσιμος ἡμέρα*, indicatorius siue decretorius dies. Dicitur dies, in quo crifis morbi contingit. Itaque vt crifis omni die fieri potest, sic & omnis dies *κρίσιμος* esse potest. Nunc autem appello crifim omnem morbi solutionem, in qua quidem significatione etiam febris ephemeræ crifis est. Atque vt sunt multæ *τῶν κρίσεων* differentia, sic & dierum criticorum: alii enim *καὶ ἐξ ὧν κρίσιμος ἢ κρισιμὸς* appellantur, in quos sæpissime & securissime crises incidunt. Alii mali sunt, in quibus magna ex parte fiunt crises malæ: alii vero mediæ & incidentes, quibus crises contingunt imperfectæ. Est autem omnium fortissimus perfectissimusque septenarius, & qui septenario concluditur, vt septimus, qui morborum peracutorum terminus est, decimusquartus, qui morborum simpliciter acutorum, postea vigesimus, vigesimusseptimus, tricesimusquartus, quadragesimus, qui postremus est eorum quibus solent acuti ex decidentia morbi iudicari: & post eum sexagesimus, octuagesimus, centesimus, vigesimus & centesimus, qui, vt Galenus scribit libr. 1. de diebus criticis, constituitur ab Hippocrate omnium dierum criticorum finis supremus. Deinceps non diebus, sed mensibus & annis crises numerat. Et hi quidē dies quibus certa firmaque vis inest discernendi, *κρίσιμα ἡμέραι*, hoc est principes dies, ab Hippocrate appellantur: Hi autem quanquam præcipui sunt inter criticos, sunt tamen & alii quidam quos *παρεπιθόριος*, hoc est incidentes, vocat, quibus & sua vis inest ad iudicandum, vt tertius, quintus, nonus. Hi omnes vere & proprie critici appellantur. Dicuntur autem & eo nomine aliquando illi dies qui singularum hebdomadarum mediū sunt, easque in duas partes diuidunt, vt quartus, vndecimus, decimusseptimus & reliqui eodem modo, quod sæpe in eos crises bonæ incidunt. Hi tamen proprio nomine non *κρίσιμος*, sed *ἀνδράσι* & *θυσίαις*, hoc est indices & contemplabiles, nuncupantur, quod maiorem vim & proprietatem habeant ad præfagiendam contemplandamque futuram crifim quam ad iudicandum. Quarta autem criticorum dierum differentia est, in quibus

vt plurimum mala crifis euenit. Hi fere à quarto pares sunt, vt sextus, octauus, decimus, duodecimus, decimussextus, decimusoctauus. Inter eos autem decimusquartus & vigesimus non numerantur, quod ille secundæ, hic tertiæ hebdomadis terminus sit quæ impari numero concluduntur. Itaque reuera impares numeri sunt, sicut Galenus demonstrauit. Eorum vero pessimus est sextus, qui, quod eo plures pereat, tyranni nomen meruit.

*Κρισηγοί*, dicuntur ab Hippocrate libr. 1. *περὶ διατῆς ὁρίων*, omnia quæ magis ad crifim faciunt, eamque magis promouent, vt comment. 2. Galenus explicat.

*Κροκιδίον*, verbum est, inquit Gal. ab omnibus medicis de phreniticis dici solitum, significat autem tomentum legere & euellere subtegmina: sicut *καρπολογεῖν* euellere festucas, vt annotat comment. 1. *εἰς τὸ ἀπορριπτεῖν*.

*Κροκίς*, tomentum, floccus siue hapsus lanæ quo medicamenta excipiuntur. Apud Aetium libr. 3. dicitur medicamenti genus *κροκίδιον*, quod tomento exceptum ano inditur vice glandis.

*Κροκιδίον*, herba est chamæleontis nigri figura. radice longa, aliquatenus lata, gustu nasturcii, aspero, semine rotundo, clypeoli forma, duplici. Semen calefacit, digerit, exicat, & acrimoniam habet. Galenus & Aetius etiam *κροκιδίον* appellant, eaque ad cephalas vtuntur.

*κροκιδίον* etiam dici à quibusdam *πρὸς δισκον*, Dioscor. author est.

*Κροκίμαγμα*, est recrementum crocini vnguenti. Sic autem dicitur quod expressis vnguenti crocini odoramentis & in formas digestis paretur. *μαγματα* enim appellantur quæ expressa aliqua materia supersunt crassa, feculenta & lignosa. Ad differentiam autem additur materiae nomen, vt *κροκίμαγμα*, *ροδόμαγμα*. Verum cum vnguentum pluribus modis præparatur, palam est varias etiam haberi crocomagmatis differentias. Vnam Dioscorides recenset, Paulus duas, Aetius item libro 6. quartam, ab aliis differentiam quæ eadem est cum ea quam Gal. recenset libr. 2. de antidotis ex Damocrate, nisi quod amyli & gummi pondere variant. Optimi eas esse notas scripsit Dioscorides, vt odoratum sit, modice myrrhâ olens, graue, nigrum, ligni expers, læue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumque vehementer dentes ac linguam inficit, aliquot in horas permanente colore, quale quondam fuit quod à Syria deportabatur. Hoc oculorum claritati plurimum conferre dicitur, caliginem discutere, vrinam ciedere, excalfacere, concoquere, mollire & respondere aliquatenus croco, vipore cuius plurima parte sit particeps.

*Κροκός*, crocus, siue crocum. Herba est foliata pene in capillamenti exilitatem, cauliculo angusto & breui, florē producente cærulei calycis in quo flammea croci stamina, radice

bulbosa copiosaque & visaci. Galli Mauritanos imitari sistrum appellant. Calfacit secundo ordine, primo exiccat, paulum etiam quiddam adstringens habet quod tertium frigidumque est. Ceterum ex croco hæc medicamenta conficiebantur, erantque medicis in usu, quæ sequuntur.

*κρόκον μέρον.* crocinum vnguetum siue ex croco paratum. Quomodo conficeretur Dioscorides explicauit libr. 1. Aliam vero eius compositionem, unde ab ea differentem Paulus recenset libr. 7. Dioscorides suo vires tribuit calfaciendi, somnum alliciendi, siue naribus admoneatur, siue illinatur, pus mouendi, vlcera purgandi, contra vuluæ duritias atque præclusiones, præterea concoquendi, emolliendi, humectandi & permulcendi.

*κρόκον καλούμενον.* croceum collyrium, cuius triplicis mentionem facit Galenus libr. 4. *ὅς ἐστι πέντες, πικτικαρόν, παϊδικόν, ἁσόντιον.*

*κρόκον πέντες.* qui describitur à Paulo libr. 7. cap. 24.

*κρόκον ἔχθρας.* cuius compositio habetur apud Paulum & Aetium.

*Κρόκας,* herbæ genus. ἡ ἑξήντης βοτάνη, inquit Helychius.

*Κρόμμυον.* cepa. Est olus foliis fere porraceis, intus concavis, caule tereti & rotundo, per cuius festigium semen in orbem spargitur, radice capitata, pluribus cartilagineis compacta tunicis, quæ summam præteruibus rufisque vestitur membranâ, nigricante vertice, à quo fibræ capillitii modo fruticant, odore lacrymoso: plura sunt eius genera: excalfacit quarto ordine. Est autem crassarum partium, proinde flatuosa est & concoctu difficilis. Quod si tandem coquatur, malum succum gignit & valde acrem & qui facile febrem accendat. Itaque potius inter pharmaca quam inter alimenta censei debet. Incidit enim & attenuat humores crassos, aperit obstructions & hæmorrhoidas, & ex utero strangulatas olfactu excitat.

*Κρόνος.* sic dici à quibusdam ἡ δαλφινον, author est Dioscorides.

*Κρότφοι.* tempora. Sunt ossa duo cranii, vtrinque singula ad aures sita, trilatera, parte superiore suturis *λεπιδωδεις*, posteriore, laterum *ἡ λαμβωειδεις* additamentis, anteriore sutura quæ cranio & ossi *σπλωσιδεις* communis est, terminata. Sunt autem omnium cranii ossium infirmissima, tum quod tenuissima sunt, tum quod pertusa meatui auditorio & cauata partim ad genæ supernæ diarthrosim, partim ad venæ iugularis ramos intus & foris excipiendos. Non sunt vero simplicia sed multiformia. Namque portio eius est os *ἀσπιδειδεις*, hoc est petrosum, quod protensus suturæ *λεπιδωδεις* finibus terminatur, in eaque apophysis inest quam à styli scriptorij specie *χαρμυιδεις* & *στυλοειδεις*, ab acus autem similitudine *βελωνοειδεις* vocat: alii vero etiam *καλκας*, quod galli calcar referat. Sunt & in iisdem ossibus geminæ apophyses, papillis

mammarum præsertim vaccinarum similes, & ob id *μασσοειδεις* dictæ, musculis inserendis seruientes, & canæ atque extuberantes quo aer amplius & anfractuosis earum cavitatibus conclusus magis resonaret auribus. Habent præterea aliam, quæ meatui auditorio dedicata est. Exit præterea & ab his apophysis vtrinque vna ad oculi angulum excurrēs & dimidiam partem ossis constituens quod *ζυγμον* nuncupatur. Ceterum esset hæc omnia musculus à tota temporum cavitare exorians contegit, innixus ossi iugali, quo solo à cerebro ipsiusque membranâs dirimitur. Est autem ille valde sensibilis, ut qui oblatius conuulsiones & stuporem inducat. motus autem duos habet: homini namque firmanti dentes & os claudenti atque contrahenti, tenditur, hianti vero laxatur. A partis nomine cui incumbit, *κροτφοίτης* dicitur.

*Κρότων.* Latinis ricinus, vtrumque à similitudine animalis canibus præcipue infesti. Olim apud Ægyptios dicebatur *κίκας*, de quo supra dicuntur & *κρότωνος* apud Hippocr. cartilaginea pulmonis bronchia, ut libr. 1. de morbis. Dicitur *κρότων* & oleæ morbus, qui ceu quadam solis inustio est.

*Κρόνιον.* medicamenti compositi nomē est quod vim habet vehementem mouendi vrinam. quare sic dictum est à torrentis similitudine. Eo quondam Esdras & Asclepiades vsi sunt. Compositio refertur ab Aetio libr. 1. 2. ubi agit de ijs quæ ad ciendam vrinam hydropicis bibuntur.

*Κρυσταμινον.* crustuminatum, genus est potionis quæ ex crustumini pyris præparatur in modum *ἡ ὑδρομαλλον*, ut docet Aetius extremo libr. 5. Vox Latina mere est quam recentiores Græci vsurparunt.

*Κρυσιδης πυρετος.* est species febris continuæ & ardentis accensæ ab erysipelate circum pulmonem consistente, quemadmodum scriptum est apud Aetium libr. 5. cap. 89.

*Κρυσταλλινον.* sic dictum est à quibusdam *ἡ ὑδαρ*.

*Κρυσταλλοειδης υγρον.* crystallinus humor. Est humor oculi duriusculus, purissimus & pellucidissimus. Sic dictus est à similitudine crystalli, siue eo nomine glaciem, siue crystallum proprie dictum intelligamus. Nam & mediocriter durus est, & exquisitissima præterea puritate, pelluciditate claritateque perspicuus. Est autem ei eiusmodi durities, ut per sectionem à cæteris oculi partibus solutus non destuat, sed instar molliusculæ cere per se consistat, suamque asseruet figuram. Nec vero eo durior humor vllus in oculo continetur. Candidissimus autem est & splendidissimus, quoniam sit primum videndi instrumentum. Solus enim à coloribus alteratur, & in eiusmodi corpore omnes colores facile citroque suscipiuntur & relucet, neque propter puritatem & coloris syncentarem vitiantur adulteranturque. Figuram habet rotundam sed depressam anteriore



teriori posteriorique parte & latiusculam, nec tam rotundam & protuberantem quam à lateribus, & superna infernaq; parte, quod ad perfectiorē visionem sic formatum esse expediret: figura enim exacte rotunda, paucioribus sui partibus, plana autem pluribus cum suis obiectis communicat. Situs est in medio oculo, estque eius veluti centrum, propter dignitatem & præcipuum in videndo usum. Nutritur humore vitreo quem habet à tergo, non per venā quidem, quæ nulla inest, sed per *σφαδρον* alimenti.

**Κρύσταλλος.** crystallus. est succus intra terram frigore cōcretus. Itaque ex marmorum saxorumve canalibus effoditur, vel venis fibrisque detectis: aliquando aratro excitatur & torrentibus deferitur. Sunt qui dicant esse aquam cœlestem gelu vehementiore duratam. Vim habet crystallus refrigerandi & siccandi atque etiam adstringendi: ideoque dysentericis in vino conducit.

**Κρύσταλλος.** olus apio simile, apud Hippocr. nascens iuxta mare, vt scribit Erotianus.

**Κτύπος.** cummus. totus ipse sinus pudēdi muliebris.

**Κτύπος.** dicuntur à quibusdā dētes primores acuti, qui & *δυσσπύρες* & *χελαινοί* vocantur. Sunt etiam qui *κτύπος* vocent partem manūs externam, *πρὸς Σίναα* oppositam, quā propterea alii *ὀπίσθεν*, alii *αὐτοκρῆνον*, alii *δύπον* appellant.

**Κυάσιος.** sic dicitur chirurgici specilli pars altera cōcaua, in parui cyathi modū, quā aliquid vel extrahi vel infundi potest. vide *μήλη*.

**Κύαθος.** cyathus. Est & liquoris & rei aride communis mensura apud Rom. ligulas siue cochlearia quatuor cōtinens. Erat aut sextarii pars duodecima. apud Atticos autē & ipse tā liquidōrū quā aridorum mensura erat, capiens *κύχας* 11. siue *μύτρα* 111. siue *χίμας* v. siue *σεσκυνία*. id quod notum esse potest ex Gal. l. 2. *τὸ κὺ ποῖος* c. 5. scribenti ē Critone remedia ad varos. Mellis, inquit, Attici cyathum 1. siue drach. x11. Apud Rom. quidē cyathi nota erat ista, Cū. apud Græcos vero K per cuius apicem inferiorem linea recta per obliquum ducta esset, v. desuper imposito.

**Κύαμος.** faba. Est legumē valde aliquando procerum scapo recto, folio carnoso, portulacæ simili, flore cristato, versicolore, hirtio, siliqua plerumq; semipedali, fructu intus lato humani vnguis effigie. Eā autē maior etiam est faba Ægyptia, quam alii Colocasiam, alii Pōricam vocant, vt quæ calamo sit quatuor cubitos longo, folioq; latitudine concauitateq; spectabili: ita vt aquā cōtinere possit, & Alexandrinis poculorum & catinorum usum præbeat, qui adeo Nili sui dotibus gaudent, vt implexis colocasiæ foliis in variā speciem vasorum, potare gratissimum habēant. Ex ijs autem factum poculum Athenæus, Strabo, Helychius *κυβέρον* dici testantur, Quo factum est, vt sæpe apud medicos *τὸ κύαμος* nomen occurrat pro mensura, non quidem certa, sed simpliciter rei alicuius mensurabilis capaci, quæ & *κυβέρον* & *κύωνος* vocata fuit, qualiquores metiuntur, vt apud

Actium, vbi de picta exhibenda ait, *ἢ δόσις κυάμων συν μετρίαν κούμας δ'.* & *ὁππότερὶ τοῦ δόσις θυμὸς κυάμων β'.* hoc est, dōsis cochlearium, cum aquæ nullæ cyamis quatuor: & sorbear aquæ calidæ cyathos duos. Similiter apud Gal. lib. ad Pamphilianum de Theriaca, vbi scribit eā ex passio aut aqua multa exhibendam fabæ Ægyptiæ magnitudine.

**Κύαρος.** caruleus. lapis est, siue succus in metallicis concretus. Duplex est, natiuus & factitiuus. Natiuus fossilis est, & in venis fibrisque ortus, aut per se reperitur sabulo arenæ duræ similis: aut abraditur à materia metallica, plerumq; similis arenæ. hic tantopere amar chrysocollam, tantaq; illi naturæ familiaritate coniunctus est, vt hi duo succi concreti frequentissime simul nati vni eidemq; glebæ metallicæ adhæreant, videaturque alter propē appositus alterum inclusum sepiere atque complecti. Factitii autem plures sunt species, atque ex his aliquæ natiuo præciosiores, quarum præstantissima sit hoc modo. In vasculum quernum infundunt libras tres acerrimi aceti, in quo factitii salis ammoniaci in puluerem triti quadrans fuerit dissolutus, atque in vasculi medio bacillum stabiliunt, deque eo laminas argenteas rimulis plenas suspendunt, vt modò non attingant acetum, rimulas autem prius argento viuo oblinunt, deinde vasculum operculo obturant, & fimo terrave obruunt. Post viginti dies vasculum aperiunt, id quo laminæ veluti situ squalent, deradunt, atque vasculum secundo tertioque fimo & terra obruunt, vicissimque deradunt, vsque dum laminæ deficiant: tum nouas de bacillo suspendunt, quæ vbi etiam ipsæ fuerint vi aceti consumptæ, id quod collectum est in catinum intus spuma argenti obductum inijciunt, subiectisq; carbonibus ardentibus paululum vrunt, mox ablatum & refrigeratum lauā aqua pura. Postquam vero omne subfederit, aquam effundētes in sole exponunt vt siccet, faciuntque hoc modo cæruleum longe præstantissimum. Cæterum pictores tam natiuo quam factitio vtuntur, medicī natiuo tantum, cui vis est reprimendi, erodendi, & exulcerandi.

Est & *κύαρος* floris nomen in frumentario agro nascentis, calice rosarum, sed squaroso atq; tristi, plurimis stipantibus cæruleis barbulis: eo pueri ad coronas vtuntur.

**Κύαρ.** acūs foramen: Hippocr. Anatomicis *κύαρ* est auriculæ foramen internum & penitius.

**Κύβητος.** τὸ ὀλίκρανον. os cubiti: Hippocr. quod & *ἀγκών*. Dioscorides autem *τὸ κυνδύλον τῆς βραχίονος*, iuncturam brachii, sic nominari dixit, vt scribit Galen. At Bacchius, teste Erotiano, interpretatus est *κυβειδές ὀστέον καὶ τὴν πτέρην*, hoc est os cubicum & calcem: sed longe plures *τὸν ἀγκώνα*, id est cubitum.

**Κυβειδές ὀστέον.** os cubicum. Est os vnum ex quatuor tarsi ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus. Id calci articularur ipsamque excipit, cum reliqua



tria tarsi ossa scaphoidi coniuncta sunt. Sic dictum est quod cubo simile sit. Verum lateribus omnibus est admodum inequalibus & fere asperis, vt vix quicquam aliud quod latera sex habeat cum cubo communia. Sed & internum eius latus geminum apparet. Est autem os *κισσοειδές*, vt & reliqua tarsi ossa, intus cauum, foris gibbum.

*Κεφαί*, sic à quibusdam vocantur spinæ vertebræ & præsertim colli.

*Κοτονία*, cotonea malus. Arbor est omnibus nota, malo vulgari haud quaquam absimilis, sed minor, folio angustiore, mala ferens varia, omnia adstringendi vi prædita & stomacho utilia. Quæ in eorum genere incisuris crispantur, colore ad aurum inclinato; *χρυσόμυλα* appellantur: quæ aurea mala dicta fuisse Maroni, multorum opinio est. Quæ vero minori amplitudine sunt, & serotino prouentui odoratiùs vibrant, *σφοδρά* nuncupantur à plurimis, cura tamen Actio struthia dicantur quæ magna sunt & suauiora, minorque placent acerbitate. Ea cæteris præferuntur quæ chrysomela diximus vocari, deinde struthæa: postremo loco miluiana habentur, quæ nothaplarisq; cæsentur, quod insitione proueniant. Omnia tenui pubescunt lanugine. Experuntur in medicina ad varios vsus, quos notauit Dioscorides. Fit ex ijs vinum, vt ipse docuit, atque oleû quod *μήλινον* appellatur: item τὸ *ἔλαιον κοτονίαν*, siue *κοτονία* dictum, carnē cotoneorum & melle quondam, nunc autem saccharo conditum, quod tempore Galeni ex Iberia & Syria Romanam conuehebatur. Nec vero minima cotoneorum laus est, quod in ijs scammoniū præparandum esse Gal. lib. 1. de aliment. facult. docet, ne stomacho nocëat.

*κοτονία*, herbæ nomen est apud Gal. lib. 1. τὸν *κῆρ* *πῆπις*, qua Galenus odorata reddi medicamenta scribit. Sic videtur dicta à similitudine odoris ad mala cotonea. Quæ sit tamē incertum mihi est: nisi ea forte sit quam Plinius à Gallis Halum vocari, à Venetis cotoneam scripsit.

*Κυκλωόν*, emplastri nomen apud Galenum lib. 4. τὸν *κῆρ* *χρη*, refertur & ab Actio lib. 1. 5. magnique omnino vsus ab eo esse proditur.

*Κύημα*, conceptus, sic dicitur foetus duobus primis mensibus, vt declarat Galenus his verbis lib. 1. de sympt. causis: *κῆρ μὲν πρὸς τρεῖς μῆνας ὁρίσας ἐπὶ τῇ μήτρᾳ τὸ αἷμα τοῦ εἰς αὐτὸ τὸ ἐμβρυον, εἰς αὐτὸ ἐπὶ μικρότερον ὑπάρχον ὅταν εἰδῇ ἐμβρυον ἢ δὴ πῶς καλεῖται κατ' ἐκεῖνον τὸ χρόνον, αὐτὸ ἐπὶ κύημα*, hoc est, primis quidem duobus mensibus attrahitur nonnihil sanguinis ad ipsum foetum, tanquam minor sit: quoniam nondum quidem foetus vocatur eo ipso tempore, sed adhuc conceptus. Quamquam autem *κύημα* animalium proprie sit, in ijs tamen quæ florent præsertimque in brassica tum à Græcis, tum à Latinis etiam authoribus vsurpatur. Cymara enim in ijs quasi *κύημα* vocantur scaporum delicatiores tenerioresque coliculos quos apperente vere in prima flo-

rum germinatione & in summa stirpe hoc olus profert, discretis, verum clausis adhuc, florum calycibus, quales quotannis videre licet, in quibus floris primum, mox feminis foetus clauditur. Theophrastus l. 7. de plantis scribit à Græcis *κύημα* dici, in quo flos ad semen clauditur. Latini non tantum cymata neutro genere dicunt, sed etiam foetum in cymas.

*Κύσιον*, nomen est collyrii quod à cinereo colore etiam *πικρὸν* dicitur, describitur à Cornelio Celso lib. 6. cap. 6.

*Κυκέων*, est potio constans variis alimentis vino mistis. Sed varia quidem & diuersa secum misceri possunt, omnia tamen in cyceone cum vino temperantur. Est enim τὸ *κυκέωνος* nomen commune omnium potionum vinum habetum. Homerus cyceonem suum ex mista farina caseo apparauit in sorbitionis usum. Alius herbarum, aut hordei succum vino miscuit. Etymologici autem mel cum vino cyceonem dicit vocari. Habent nunc & Flandri suos cyceonas. Itaque *κυκέων*, vt ait Galenus comment. 6. in lib. 6. τὸν *ὀσμυμῶν*, non est potio simplex, sed in seipso cibum continet, ideoque cerebrum minus quam merum offendit, præsertim si ex mediocri mistura cibi vinique constet. Erotianus scribit apud Hippocr. *κυκέονα* dici *πῆμα μετὰ αἰσίου πιεσόμενον*.

*Κυκλάμνος*, herba est foliis hederæ purpureis, variis, in quibus susque deque albicant macule, caule nudo, quaternos digitos æquant, floribus in eo purpureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, vt rapum videri possit. Exterget, incidit, aperit, attrahit, digerit. Est & altera *κυκλάμνος*, foliis & ipsa hedere, sed minoribus, genicularis caulibus crassisq; circa vicinas arbores capreolorum modo se voluentibus, flore candido, odorato, acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Priorem panem porcinum, alteram sigillum Maris vulgus, authorem Ruellio, appellat. Præterea cyclaminum tertiam Plinius sibi demonstratam; asserit cognomine chamæcisson, vno omnino folio, radice ramosa quæ pisces necabantur, quod Dioscorides nomine tenus primæ cyclaminæ attribuit, *ἰχθυόγηρον* à piscium venatu appellans.

*Κυκλόειντα*, *περικυκλόειντα*, hoc est, conuoluentem & circumvenientem: apud Hippocratem.

*Κυκλίος*, idem quod *ὄχλος*, orbiculus, pastillus, de quo vide suo loco.

*Κυκλίσκος*, est scalper excisorius cauius, sic dictus est quod ima sui parte ad circuli figuram accedit. Eius vsus est in fracturis capitis potissimum, quum illæ vsque ad membranas peruenerunt: eo enim quod contusum est, excidi debet. Verum tamē quod per eos opus administratur, vitio quidē omnino non caret, cum quæritur immodice caput. Si tamē magnæ sint fracturæ, & ossa quæ fracta sunt vehementer mota, commodum est cycliscis

vti. Sicut autem plures eorum differentia. Alii enim latiores, alii angustiores fieri possunt.

*Κύριοι μερόσπι. π. μάλα*, hoc est male, apud Hippocratem.

*Κυρίασπι*, albugo oculi. totum illud dicitur quod in oculo albicat. Aristot. *λευκός* vocat. Dicitur etiam *σπινθήρ* per metaphoram, quod non aliter pupillam quam pala annuli gemmam includat.

*Κυρίασπι* siue

*Κύριοι*, sunt collyria quaedam *ἀδολέ* multorum generum. Ex his enim alia dicuntur *κύριοι* simpliciter, alia cum addito, vt *κύριος* reginae apud Galenum & Aetium. & *κύριος* ex terra Samia apud Galenum libro quarto *κατὰ πηκτις* *κύριος* *κάρρος* & *κύριος* *λευκός* apud Paulum Aeginetam: nec dubium est à colore sic appellari. Præualebat enim in ijs amyllum, & terra Samia & cerussa Rhodiaca. erant mordacitatis expertia, & longiori tempore affectæ partis vitiatum humorem consumebant. Eadem vero etiam *λευκὰ* dicebantur.

*Κυλόν*, dicitur apud Hippocratem crus varum, id est, in exteriorē partem luxatum vel conuersum, adeo vt suræ processus qui talum exterius complectitur, sine stabilitamento vilo suspensus relinquatur: quamuis proprie mutilum & imperfectum significet, vt scribit Galen. lib. 3. de diebus criticis, dicens in ea significatione vulgo menslem *κυλόν* appellari qui diebus viginti nouem constat: alios autem perfectos, qui triginta habeant.

*Κύλινσις*, significat apud Hippocratem distortionem cruris in exteriorē partem, vt Galenus annotauit comment. 4. *ὅς τὸ ἐξ ἄρθρου*. Idem tamen comment. 3. dicit nonnullos de omni lōgorum membrorum distortionē *κύλινσις* intelligendam censere, generaleque ei tribuere significarum. Alios vero eo nomine distortionem tantummodo intelligere, in qua in interiorē partem membrum inclinatur.

*Κυματώδης σφυγμός*, vndosus pulsus. Est pulsus inæqualis in vna pulsatione & diuersis arteriæ partibus, in quo non rota simul distenditur arteria, sed pars post partem, in modum vndarum. Cum enim fluctuationis initium à supernis duci perspicuum sit, atque ad arteriæ fines terminari, pars arteriæ superior & cordi vicinior primum distenditur, deinde alia secundo digito tacta, mox alia tertio, postremo quarta pollicis ægri vicinior, motu tamen manente continuo, instat vndarum sese attollentium, secunda vnda priorem semper excipiente. Neque enim in hoc pulsu interruptus motus est, sed prioris partis arteriæ distentionem secundæ partis distentio ita consequitur, vt nulla pars à motu libera sit. Sunt autem vndosi pulsus variz differentiz, quod quibusdam recta, quibusdam in obliquum vnda ferantur, præterea in longum, latum

& profundum. Cæterum cum vndoso pulsu coniuncta magnitudo est, quod si accedat paruitas, *σπινθήρ* dicatur. Ambo enim cum in eodem genere positi sint, sola quantitate distinguuntur, causarumque magnitudine. Sunt autem eorum causæ, facultatis imbecillitas, vel copia humorum, vel summa organorum mollities. Nam cum à principio in singulas arterias permeans contentio pari firmitate totum vas attollere nequeat, quæ propinquior principi parti est, motum orditur primum, quæ remotior, ferius. Minor tamen in vndoso pulsu imbecillitas, maiorque humorum abundantia, quam in vermiculante.

*Κυμβάκιον*, est alterum genus *τὸ κοτυληδόνος*, id est vmbilici Veneris, vt habetur apud Dioscor. vide *κοτυληδόν*.

*Κύμβρον*, dicitur à quibusdam *τὸ σπινθηρόν*.

*Κύμινον*, cuminum. frutex est vnicaulis, frequentibus ramulis, folio pene fœniculi, semine nudo, copioso & canaliculato, radice subrotunda, quasi bulbosa. Id autem satium cuminum est, cuius semen tertio ordine excalfacit, vrinam inde mouens & flatum extinguens. Est & alterum cumini genus quod sponte nascitur, & syluaticum vel agreste nuncupatur, frutice modico, caule palmum alto, prætenui, quaternis quinifve foliis veluti ferratis, gingidii diuisura. Capitula in cacuminibus quina senave sustinet, rotunda, mollia, paleaceum semē complexa. Acrius efficaciusque multo est quam satium.

*Κύμινον ἐξ Ἰθιοπικόν*. Id dicitur quod in Æthiopia nascitur, ori valde gratum, primumque bonitatis locum in satiuo cumino obtinens. Id Hippocratem *βασιλικόν*, hoc est regium, appellasse Dioscorides scribit: licet quidam *τὸ ἄμμι* interpretentur.

*Κύμινον ἡβαϊκόν*, sic dicitur à quibusdam cuminum agreste.

*Κύμινον λαγρόν*, sic dictum fuisse à quibusdam *τὸ λαγρόπιδον*, Dioscor. author est.

*Κυνάγχη*, angina. Est morbus acutus in gutture consistens cum angustia sensu & spirandi difficultate. Id quidem videtur *τὸ κυνάγχης* nomen apud Hippocratem significare, etiam si nullus tumor in gutture appareat, sed sola spirandi difficultas, nullo existente vel in pectore, vel in pulmone vitio. Qua quidem in re differt anginae concursus à petipneumonia & laterali morbo, atque ex eo quod angustia sensus in gutture est. Sic enim scribit *ὅς τὸ περὶ γαστρίδος*: angina periculosissima est, & celeriter enecat, si neque in faucibus, neque in ceruice quicquam appareret, si dolor vehemens est, si vix spiritus trahitur: etenim eodem die iugulat, licet interdum vsque ad alterum, aut tertium, aut etiam quartum diem protrahatur. Quæ vero in reliquis, non minore quidem dolore afficit: in faucibus vero tumorem ruboremque excitat. superiori non minus periculosa est, sed longius spatium habebit, præcipue si

vehemens fuerit rubor. Sed tum præcipue malum prolongatur, cum non solum fauces, sed cæuicem quoque rubor occupat. Maxime vero potest ab ea secunda valentia contingere, si rubor simul & cæuicem & pectus comprehendat, neque ad interna reuertatur erysipelas. Igitur ex his verbis haud dubia coniectura est omnes affectus qui huic loco accidunt, si spirationem quoquo modo reddant deteriore, ab Hippocrate *κυνάγχη* nominari, cum nondum curæ esset medicis vel *κυνάγχη*, vel *συνάγχη* scribere, multoque minus *σφαγμύνη* vel *σφαγμύνη* dicere. Hæc enim nomina à posterioribus medicis inuenta sunt, quibus totidem angine species designarent. Sunt autem hæc quatuor, quas hoc modo Paulus enumerat. Prima cum interni & *σφαγμύνης*, id est faucium, musculi inflammari sunt: voco autem fauces internum oris locum vbi simul conueniunt gutturis gulæque extrema: atque hæc proprio nomine *συνάγχη* appellatur. Secunda, cum exteriores faucium musculi patiuntur inflammationem, quæ *σφαγμύνη* dicitur. Tertia, quando interni musculi *πῆς λάρυγγος*, id est gutturis, inflammantur, quæ peculiari nomine *κυνάγχη* vocatur. Quarta, cum externi eiusdem gutturis musculi laborant inflammatione: atque hæc *σφαγμύνη* nominatur. In quibus quidem differentiis describendis libuit Paulum potius sequi quam Galenum. Est autem præter eas etiam quinta angina species, luxatis & prominentibus colli vertebra in anteriora, pueris præsertim ex casu eueniens & fere incurabilis. Itaque abscedentibus ad anteriora vertebra, locus quidem cavius in ea apparet, qui sine dolore non attingitur: musculi, qui cum ipsis communicant, intumescunt, atque interdum alii, tum qui proprii sunt gutturis & ipsum aperiunt, tum qui gulam gutturi coniungunt: aliquando vero obnascitur tuberculum, aut gula quoque ipsa interdum vitiatur. Et hanc quidem angina speciem Hippocrates multis verbis lib. 2. *πῆς λάρυγγος* persequutus est, ut refert Galen. lib. 4. de locis affectis, deque ea aphorismum 35. lib. 4. conscripsit. Eam scribit Aetius proprie *κυνάγχη* à veteribus appellatam fuisse, quod lingua propter luxatum verticillum à sua radice mota, & propriis sedibus excedente, factaq; multum difficili respiratione, cogantur ægri, apertis semper ore hiare & respirare, & canum in morem linguam exerere. Est autem omnibus angina differentiis communis deglutendi difficultas, adeo ut potus sæpe per nares remeet. Ceterum quæ de angina prodidit Corn. Celsus, non sunt valde consentanea ijs quæ modo retulimus, propterea consulo sunt à nobis prætermissa. habentur ea lib. 4. cap. 4.

*Κυνάγχη*. sic dicitur à quibusdam *πῆς λάρυγγος*, ut habetur apud Dioscor.

*Κυνάγχη*, n. morbus qui & *λάρυγγος* appel-

latur siue *κυνάγχη*, de qua suo loco.

*Κυνία*. herba est cuius cauliculus duum plerumque palmorum est, folia herba mercurialis aut hederæ, subcandida ex interuallis, semine apud folia paruo & rotundo. Græci aliis nominibus *κυνόκραμβιον* & *κυνόστιγχιον* vocant. Officinæ nostræ syluestrem atriplicem, ut vult Ruellius. Sunt qui existiment sylvestris esse blici genus.

*Κυνόσπασμος*. canina conuulsio. Est affectio musculorum maxillarium per quæ os, nasus, oculus, atque adeo dimidia faciei pars in obliquum torquetur. Pertinet præcipue affectio hæc, ut ait Gal. ad musculus latum, quæ *μυοδυσπάτομα* appellant. Celsus lib. 4. scribit *κυνόσπασμον* non aliud esse quam distentionem oris. Hanc nonnunquam videas dici conuulsionem, nonnunquam vero paralytism. Sunt enim huius duæ causæ, spasmus & paralytis. Sed spasmus quidem eius partis quæ apparet distorta: paralytis autem partis oppositæ quæ videtur naturalem habitum seruare. Omnis enim pars quæ conuellitur, siue id ab inanitione perpetiatur, siue à repletionem, sursum primum contrahitur, deinde secum connexarum quoque partium musculos attrahit. In paralyti vero aliter contingit. Siquidem propter musculorum resolutæ partis imbecillitatem impotentiamque, nervi qui in opposita habentur parte illis prævalentes, perpetuam actionem exercent, ad principium suum recurrentes, neque ab ea desistunt, quod à nervis oppositis non reuocentur. Vbi enim nervorum quos aduersis in partibus numero, magnitudine & robore æquales natura inferuit, quædam *ἀντίποις* & veluti æquilibrium est, si hi resoluuntur, illos perpetuo solos agere oportet, atque ita ad originem suam recurrentes musculos etiam eo adducere.

*Κυνόγλωσσον*. lingua canina. herba est sine caule, humi strata, foliis latifoliæ plantaginis arctoribus, minoribus, lanuginosis: provenit in sabuletis. Non est ea quæ officinis lingua canis vocatur.

*κυνόγλωσσον*. etiam dici plantaginem quæ nomine peculiari *ἀντίγλωσσον* vocatur, Dioscorides author est, non quod quæ vere *κυνόγλωσσον* dicitur, plantago sit, sed non dissimilem foliorum figuram habeat. Quæ quidem appellatione minor potius quam maior intelligi debet, quod *πῆς λάρυγγος* proprie dicto similior sit quam maior.

*Κυνόδεσμον*. dicitur vinculum quo membri genitalis cuticula cum glande colligatur. Id etiam *κυνία* appellant. Latini canem aut caninum vinculum dicere possunt.

*Κυνόδοντες*. canini dentes. sunt dentes quatuor inter incisivos & molares singuli sitii. duo superna in gena, & totidem in inferna sunt, singulares radices fortiti. Hi à basi rotunda in acutissimum mucronem fastigiati desinunt. valent ad ea frangenda quæ à primis dentibus incidi non possunt. Siquidem ut incisorum dædium munus est cibos mol-

les diuidere, ira horum est duos valenter confringere. Sic dicti sunt etiam in homine, quod sint canum dentibus quam simillimi. vide in dictione *ιδδόντες*.

*Κυνειδής*. dicitur à quibusdam τὸ *κύων*.

*Κυνόζαλον*. dicitur à quibusdam chamæleo niger, vt habetur apud Dioscor. propter grauitatem odoris.

*Κυνόκροδαυον*. sic à quibusdam dici τὸ *κρόδαυον*, Dioscorides author est.

*Κυνόκεφάλων*. dicitur à quibusdam τὸ *κύων*.

*Κυνόκράμην*. brassica canica. cauliculum binum dodrantum altitudine emittit, mollē, subalbidum: folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitiis subalbida. semen foliis adhaeret, paruum, rotundum. dicitur etiam à quibusdam τὸ *κύων*, vt scribit Dioscorides & Galenus. Dioscor. *κύνια* alio nomine vocari scripsit.

*Κυνόκυνος*. dicitur à quibusdam τὸ *κύων*, vt scribit Nicander in Alexipharmacis. Canes enim, si ab his edatur, interficit.

*Κυνόμαζον*. dicitur à quibusdam chamæleo niger, vt habetur apud Dioscor.

*Κυνόμειον*. dicitur à quibusdam τὸ *κύων*, vt habetur apud Dioscor.

*Κυνόμορος*. dicitur à quibusdam τὸ *κύων*, quod & alio nomine *κυνόκράμην* vocatur. Sic autem & Ephesius Rufus ænigmatice appellauit τὸν *κυνόβατον*, vt scripsit Galenus lib. 1. τὸν *κύων*.

*Κυνόμορφος*. sic quidam τὸ *κύων* appellant, vt habetur apud Dioscor.

*Κυνόμυα*. dicitur à quibusdam τὸ *κύων*.

*Κυνόρροδον*. species rosæ est, florem roseum ferens, & spongiolas habens quibus δ *κυνόβατος* caret, atq; ab eo distinguitur. Plinius author est florem lilii nascentis in Italia cynorrhodon vocari: quod & Hippocr. accepit cum rubetia cynorrhoda foeminarum purgationibus commendat in vino.

*Κυνόβατος*. rubus caninus, vel fentis canis: est frutex multo amplior rubo, arboris instar, foliis longe quam myrtus latioribus, aculeis circa virgas robustis, flore albo, fructu oblongo, simili nucleis oliuarum, & cum maturarescit rubentē, lanēā intus natura. Columella fentem canis nominat: Galli vulgo englenterium vocant. Vini habet adstringendi, sed maxime fructus, qui *κυνόβατα* appellantur.

*κυνόβατος*. dicitur à quibusdam capparis, vt habetur apud Dioscor.

*Κυνός ὄρχος*. testiculus canis: dicitur & simpliciter ὄρχος, de quo vide suo loco.

*Κυνόδης ὄρχος*. canina appetentia. vide ὄρχος *κυνόδης*.

*Κυνελαιος*. genus vnum est tithymali, caule palmeo aut etiam proceriusculo, subrubente, foliis pinus tenerioribus exilioribusque, omnino vt nouella pinus possit existimari: hic lacteo succo manat, cui eadem vis que & aliis tithymalis. *κυνελαιος* vocant propter foliorum similitudinem caule gemino aut triplici nascentem in campestribus.

*Κυνελαιος*. cupressus. Est arbor procerā, candidē oblongo & tereti, folio pini, sed magis carnoso, amaro, neque ita pungenti: fronde indecidua, odore vehemēti. Semen comis innascitur prætenue, exile & quasi laticis fructui proximum, quod pilula sua fatiscēte labitur. Nomen in officinis retinet, adstringit & resiccāt, neque acrimoniæ & caloris expers est, sed ea proterius habet moderatissima. Dioscorides refrigerandi vini illi tribuit.

*Κύπρος* ἢ

*Κύπερος*. cyperus. Herba est folia ferens porraceis proxima, sed longiora & exiliora, caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur, radices coherentes inter se oleis oblongis similes aut rotundas, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. in officinis nomen retinet. Rura soutchetum vocant. Corn. Celsus iuncum quadrarum nominat. Eius radices magno in vfu sunt, calefacientes & exiccantes circa morsum. Habent & quippiam adstringens atque incidens. Aliud præterea cyperti genus Dioscorides tradit in India nasci, gingiberis effigie, quod manducarum croci vini reddit, gustu amaro sentitur, & illicitum præsentem psilothri vini exhibet. Id Ruellius contendit esse quod ab officinis terra merita appellatur.

*Κυνίς*. dicitur auctore Plinio cyperti radix quum oblonga est.

*Κύπρος*. cypirus dicitur à Plinio gladiolus, ac quamuis multi cyperum à cypiro non distinguant, vicinitate nominis fallente, nos, inquit, vtrumque distinguemus. Non tamen Græci videntur aliquam eius mentionem fecisse.

*Κύνος*. ligustrum. Est arbor foliis oleæ latioribus, mollioribus, colore viridioribus, flore muscæo, candido, odorato, semine atro, nō ab simili sambucino acino, effigie coriandri. Arbor ipsa à Gallis vocatur trœna, in dumeris frequens. huius folia summaque germina vim quandam digerendi cum aqua substantia modicè calida, habentque etiam adstrictorium quiddam ex terrena & frigida substantia. Eius flos coquitur in oleo premiturque, fitque quod *κυνόβατος* oleum vocatur, modicè adstringendi facultatē, & maiore quadam vi calefaciendi præditum.

*Κυνόβατος*, ἢ *λεγομένη πύρα*. apud Hippocr. quam quidam pileum barbaricum dicunt.

*Κυνόβατος*. vide in *Κυνόβατος*.

*Κυνία ἡμέρα*. dies dicitur ab Hippocr. qui aliquid certo indicat & decernit, & in quo iudicia rata firmaque sunt.

*Κυνελαιος ὄρχος*. pastilli nomen est ad nomas & putredines vtilis, vt scribit Oribasius. hic alio nomine *ασκληπιδος* appellatur. Refertur ab Aetio.

*Κυνόβατος*. paleæ, furfures, & hordei purgamenta, apud Hippocratem. sic scriptum legitur apud Pollucem: apud Galin *γλαυκός*, itemque

apud Hefych. & Suidam *καρβίλιος* apud Erotianum vero transpositis vocalibus *καρβίλιος*. *Καρβίλιος* *καρβίλιος* hoc est turbatur, apud Hippocratem.

*Καρπός*, podex, apud Hippocr. teste Galeno pro quo paulo infra *καρπός*.

*Καρπιδίς*, sic dicitur auricula parte sui extrema, qua ab anteriore in posterius vertitur, & quasi refectitur.

*Καρπύμια*, Hippocrates in progn. appellauit *αἰδύμια*, hoc est tumorem omnem præter naturam, generali significatione, sicut Galenus comment. 2. annotauit.

*Καρπύσις*, gibberositas, siue gibbositas, est spinæ dorsi distortio in posteriorem partem. Hæc & *ἐκτονωσάν* appellatur, vel simplici etiam nomine *καρπύσις*, vt annotauit Galenus initio comment. 3. *ἐκτονωσάν* *αἰδύμια*. Opposita huic contortio dicitur *καρπύσις*, spinæ vertebri in anteriorem partem conuersis.

*Καρπός*, Hefychio *καρπός*, Nates & Podex. Item *καρπύσις* *αἰδύμια*, pudendum muliebre.

*Καρπός*, podex apud Hippocrat. lib. de natura foetus: *ἐκτονωσάν* *αἰδύμια* *καρπός* *αἰδύμια* *καρπός* *αἰδύμια*, hoc est, ad podicem via fit à ventre & intestinis extra, dicitur *καρπός* & *αἰδύμια*.

*Καρπύς*, *καρπύς* *αἰδύμια*, hoc est parua vesica, apud Hippocratem.

*Καρπύς* *αἰδύμια*, dicuntur venæ gemellæ sibi que valde vicinæ quæ à trunco venæ portæ seu propagines quædam exortæ, inferuntur in collum & corpus vesicæ bilem continentis, quam *καρπύς* *καρπύς* appellat.

*Καρπύς*, vesica. Est pars membranosa, urinam à renibus excipiens & foras excernens. Duabus constat tunicis, vna propria & interna villis valde intertexta, intus rectis, foris transuersis, mediis inter hos obliquis: altera vero exteriore, ex peritonæo pubis osintus vestiente orta. Vtraque latissime distendi & rursus in breuissimum spatium contrahi potest, eamque ob causam vesica à plerisque nervosa dicta est ex quadam similitudine, vt & reliqua omnia alba & exanguia, quoniam plurimum extendi, rursusque in se ipsa retrahi & subsidere videntur, quamuis ex nullo nervoso corpore originem ducant, vt nec vesica ipsa, quæ nervulos tantum recipit partim à ramo sextæ coniugationis qui per costarum radices ad partes ventris inferni tendit, partim ex infima spinali medulla derivatos. Præter hos autem nervos etiam venæ & arteriæ inter vesicæ tunicas à colli lateribus ad vsque fundum sparsæ sunt, à ramo per foramen ossis pubis in crus descendente. Illæ sanguinem & spiritum vesicæ subministrant, cum ipsa aliqui exanguis sit. Ex earum partium numero habetur, quæ extremorum sunt receptacula. Etenim in eam renes tanquam in lagenam urinam deponunt per meatus *καρπύς* dictos, qui à renibus prodeuntes, oblique itinere delati inter ipsius tunicas, paulo supra ipsius os inferuntur. Eam ubi

continuerit donec vel quantitate vel qualitate molesta sit, excernit: in foetu quidem quamdiu vtero continetur, per *καρπύς* in cavitatem tunice allantoidis, editis autem in lucem foras per *καρπύς*. In hos enim meatus urina fertur à vesica per ipsius cervicem, quam musculus ambit transuersis constans fibris, quibus vndeque constrictis, vesicam claudit, ne urina effluat.

*Καρπύς* *καρπύς*, folliculus fellis, vesica bilem continens. Est vesica in canis iecinoris sita, inter venæ portæ & canæ radices, bilem ex iecinore attrahens. Constat simplici tunica, villos habente intus rectos, nec ita multos, foris transuersos, & medios horum obliquos. A rectis quidem bilem trahit ex hepate, obliquis retinet, transuersis vero expellit. A collo enim suo stomachos habet duos, vnum in hepar inter venæ portæ & canæ radices numerosis furculis distributum, quibus bilem in se allicit: alterum vero raro geminum, sæpius simplicem in ecphyli delapsum, quo in ipsum & intestina bilem flauam expellit, euerfa facile gemina membrana eius osculum in ecphyli claudente. Maximo illa hepatis lobo dimidia mergitur, reliquam simæ hepatis tunica tegit ad venæ portæ exortum, à qua venulas duas, quas *καρπύς* quibusdam appellare placuit, & à vicina hepatis simæ arteria arteriolas in imum vsque fundum admittit. Recipit vero etiam vna portionem quædam nervi qui à sexta coniugatione per costarum radices dextra parte ad partes ventris inferni peruenit.

*Καρπύς*, dicitur, vt Plinio placet, primus partus mali Punice florere incipientis. Dioscoridi flos est mali Punice, ipsius Punici inuolutum, siue capitulum, quo flore decusso semen concipitur. In hoc ipso cytino flosculi sunt antequam scilicet malum ipsum prodeat erumpentes, quos balaustrum vocat Plinius. Adstringit & siccat.

*Καρπύς*, dicitur à quibusdam *καρπύς*, ea enim malo granato immaturo similis est. Sunt & qui futura mori, poma cythos dicant: quanquam alii ricinos non cythos vocent.

*Καρπύς*, cythos, frutex est incanus totus, vt rhamnus, cubitalibus ramis, sæpe maioribus, circa quos folia fœnigræci aut loti trifoliz, sed minora, dorso in mediis tumente. Odor erucæ si digitis terantur, commanducatis gustus cicercis recentis, vim habent digerendi, aquez & temperatæ mistam, sicut & maluz. Cytium Romani trifolium maius appellant.

*Καρπύς*, Egyptium nomen est. eo thymiamatis compositio designabatur dicata dijs, quam sacerdotes vespere quotidie cremabant. Erat autem miscella, vt Plutarchus ait commentario de Iside & Osiride, propter quadratum numerum sedecim literis sacris cõtenta, ex melle, vino, vna passa, cypero, resina, seseli, aspalatho, myrrha, iunco, bryo, calamo,



calamo, vtraque iunipero, lacaphtho, cardamomo, bitumine. Id autem *κῶφι* *ἱεροῦ* hoc est sacerdotale seu sacrificum, appellabant. Dioscorides proximam condendi huius rationem explicauit, scribēs & alias plurasque eiusdem confectiones tradidit. Neque enim religionis tantum causa, sed etiam ad sanitatem vsurpabantur. Siquidem valebāt & ad conciliandum odorem gratum, & naribus ab antiquis admovebantur, vt catharticos concoquerent, soluerent obstructions, purgarent cerebri ventriculos & morbis pestilentibus resisterent. Per os quoque assumebantur, vt pectori inherētia concoquerent, & iecinoris frigiditatem emendarent. Ac quanquam perimulta ad eos vsus compositiones essent, duz tamen præcipue fuerunt cognomentis insignibus, & à Paulo & ab Actio descriptæ, quarum vnā *κῶφι ἡλιακόν*, siue *τὸ δῖον ἥλιος*, hoc est Solare, siue ex triginta sex rebus compositum: alteram vero *κῶφι σελήνιακόν ἢ τὸ δῖον τῶν καί*, id est Lunare, siue ex viginti & octo rebus apparatus, vocabant, vel quod illud Soli, hoc Lunæ priuatim incenderetur & inseruiret, vel quod maxime probabile est, quia illud in Solis formam, hoc in Lunæ figuram effigiatum esset. Solebāt enim antiqui thymiamata ista specie quadam effingere, quod & hodie in istdem videmus observari: formantur enim etiam nunc in auicularum modum quas cyprias auiculas, corrupto nomine pro cyphias vocant, vestigio tamen veteris nominis adhuc relucēte.

*Κυρῶσις*: dicitur medicamentum in formam *κῶφης* compositum. Idem tamen reuera est quod *κῶφι*, sed quia *κῶφι* proprie ad Deos & sacrificia pertineret, antiqui medici in eo superstitiosi, medicamenta quorum usum à Diis ad homines transferebāt, maluerunt *κυρῶσις* quam *κῶφι* appellare, vt Andromachus, cuius aliquot huius nominis compositiones referuntur à Galēno.

*Κίρως*: gibbositas. Est vitium in spina, cum eius vertebra loco motæ sunt & in posteriorem partem conuertuntur. Sunt autem hæc tria vitia in spina, *κίρως*, *λάρυγξ*, & *σκολιωσις*: quib⁹ additur & *σύνκλις*. Galēnus scribit Hippocratem *κυρῶσις* solitum nominare, quos omnes *κυρῶσις* appellant. Est *κίρως* vitium spinæ quod à casu, ictu & tuberculis duris anteriorem thoracis partem distendentibus pulmonemque prementibus aliquando contingit, vt docet Gal. comment. eius aphor. quo scribit Hippocrates gibbos ex asthmate aut tussi factos ante pubertatem mori.

*Κυβήρις*

*Κυβήρις*, sic dicitur proprio nomine aurium fordes.

*Κύν*: canis, canicula. Est sydus octodecim stellis refulgens canis similitudine, in cuius madibula stella est quæ *σείριος* & *πρωγύων* quasi anticanis appellatur.

*κύνιον*, *κύνιον*, sic dicitur vinculum illud quo

membrum virilis cuticula glandi colligatur, vocatur & *κύνιον*, quasi caninum vinculum.

*Κυρίος*, dicitur à quibusdam *ἐξουμῶτος χάριτας*, vt habetur apud Dioscor.

*Κόστα*: caput papaueris. vim habet refrigerandi, somnumque conciliat. Ex eo medicamentum fit quod *δῖον* celebri nomine dicitur. Cuius compositio varia fuit, non modo apud veteres sed etiam apud neotericos. Quidam enim ex veteribus, inquit Galēnus, ad capita papaueris cxx. aquæ sextarios xx. infundendos censent, vt quilibet sextarii mensura sex papaueris capita recipiat. Quidam vero in lxxx. sextarios octingenta papaueris capita iniiciunt, vt singuli sextarii capita decem accipiant. Quidam ita tempesterunt, vt sextario in vno octo capita miscerent. Alii vero in aquæ sextarios tres capita papaueris lxxx. coniiciunt. Alii capita cxx. in eosdem tres sextarios addunt. Omnes ferè aquam pluuiam deligebant, vt & papauer agreste & *ἀγρὸν* dictum. Quibus quidem sigillatim expositis, Galēnus eam quam maxime probat confectionem scripto prædixit, hunc in modum: Capita papaueris recentia minime aquosa octo nouem in aquæ pluuiæ sextario vno macerata per vnum diem, incoquantur dum tabescant: deinde expresso liquore & excolato mellis optimi despumati dimidia aquæ mensura miscetur & coquitur ad compagem mellis Attici. Et hæc quidem simplex decoquendi ratio est. Præstat autem cum dulcis radiculæ vicia primum cocta, deinde madefacta in sapæ sextario rursus incoquere. valet ad viscerum inflammationes, deliria, vigilias & tussim. Alii vero simplici illa quidem & antiqua salubritate, quæ papauere & melle constabat, non contenti, multa præterea addiderunt, myrrham, crocum, hypocisthidem, acaciā, rhœm, melilotum, aliaque eiusmodi quæ vim adstringentem alui & fluxionum haberent. Appellat id officinæ diacodion compositum, siue diacodion cum speciebus. Reperitur & *κύνιον*, siue diphthongo. At *κύνιον* Eustath. esse vult caput ciborij.

*Κόλα*, dicuntur in homine longiora maioraque membra à thorace separata, & quasi dependentia, vt brachia & pedes: verum Pollux *κῶλον* (quod & *κῶλον*, inquit, vocatur) ex femore tantum & crure consistere scribit.

*Κολικά φάρμακα*, colica medicamenta, hoc est, ad sedandum coli dolorem comparata. Siquidem præter sedationem doloris vix aliud in colicis affectibus præstare possunt: idque satis esse Galēnus initio libr. 6. de locis affectis scripto prædixit. Itaque colica medicamenta genere quidem *κῶλον* sunt, à communi tamen *κῶλον* forma differunt, quod quæ proprie colica appellantur, aromatis & odoratis ac vrinam cientibus seminibus mista sint, propterea quod

stupefaciendi vim illis inesse oporteat. Constant enim magna ex parte, hyoscyami semine, & cicuta & papaveris succo, & cortice radicis mandragoræ, quibus in colico affectu uti cogimur ob magnitudinem doloris. hæc medicamenta etiam *καταλιν* medici appellant. Ac quanquam *καταλιν* vocentur, non tamen ad colicos tantum sed ad alios etiam morbos adhibentur sedandi doloris causa: quo factum est, inquit Galenus, ut antidotos omnes dolorem sedantes *καταλιν* veteres nuncuparint, appellatione videlicet ab affectu, qui maximos dolores habet, deducta.

**Κόλον.** colon intestinum. Et intestinum crassum ordine à ventriculo quintum, inter cecum & rectum medium. Id dextra prius ilia præterectum ad sinistram renem emergit, perque ventriculi fundum & iecinoris cauum exporrectum descendit ad rectum intestinum. Abscedit longissime à cætro mesenterii, quod non expediat venas mesaraicas valde exugere, ea quæ continet excrementa: cæco autem, ut ait Galenus, ad portionem respondet. Sicut enim cecum valde extruberat globosumque est, ita & colon tota sui longitudine multos habet medios globos, & veluti cellulas, exiguas quidem, nec tantas quantum cecum est (hoc enim totum veluti quidam venter est) sed ad portionem eius similitudinemque factas. In eo crassiores fæces diutius commorantur, donec excernendi tempus appetat. Itaque fit ut sæpe ab his male afficiatur, variisq; morbis tentetur, pro contenti excrementi qualitate vocatur autem eius morbus *κολλη*, qui quamvis variis de causis oriri possit, sic tamen potissimum dicitur qui à frigido crassoque aut viscoso humore, aut flatuoso spiritu excitatur. Eum consequuntur nausea & vomitus, pituitosi atque corrupti humoris multo grauiores & magis assidui quam per nephriticos affectus, adhæc excrementorum retentio, ut ne flatum quidem neque etiam ructum possint emittere. Sæpe etiam veluti circuire videtur dolor atque plurima loca occupare, & modo in hac modo in illa parte vehementior fieri, cum nephritici dolores eodem in loco stabiles iugiter infestent. Difficile tamen est discrimen, adeo ut non modo plebeij sed ne medici quidem discernant, omnesque eos dolores, siue renes, siue yreteras, siue mesenterium, siue tenuia etiam intestina occupent, *κολλη* indifferenter appellent.

**Κόλον.** idem quod *καλον* apud Pollucem. Alias Impedimentum significat.

**Κόμα.** marcor. veternus. Est deficiens & imbecillus motus facularis imaginatricis à frigido & humido, magnam somni cupiditatem inducens. Apud Hippocratem duplex eius differentia legitur, ut annotauit Galenus: vnum enim somnolentum, alterum insomne statuit. medici *αγνιν* *κομα*, hoc est vigilanti soporem, appellant: hoc phreniti-

cis, alterum lethargicis proprium. Somnolentum dicitur in quo æger profundo & diuturno somno premitur, insomne in quo ægri vigilantes manent, clausis tamen fere semper oculis nisi excitentur. Tunc enim oculos attollunt & tangentem respiciunt, libereque tum sentiunt tum mouentur; atque etiam desipiunt, quod ipsis variet rerum imagines obuersentur, quæ illorum mætes mouent & somnum abrumpunt. Verum è lecto surgere & vigilantium opera exercere nequeunt. Variz, inquit Galenus, fuerunt interpretum Hippocratis sententiæ quid *κομα* apud eum significaret: alii *εἰς ὑπνὸν κατὰ φύσιν*, alii somnum ipsum, alii somnolentiam: cataphoram interpretati sunt. Galenus initio comment. 1. *εἰς τὸ ἀπορρητικὸν* scripsit se in libello *περὶ κόμας* pluribus testimoniis demonstrasse Hippocratem cataphoram omnem *κομα* appellare. Fuerunt qui *κομα* *καὶ τὴν κομῆσιν* veteribus dictum fuisse scripserint, quod est crapulæ & comestationibus indulgere: siue à communi utrorumque symptomate: nam tum ebriosi tum qui comatis altera specie laborant, magna ex parte vigilant: siue quod *οἱ κομῆσιν* omnium facillime in eum morbum incidunt. Siquidem ex immodico vini potu in primis contrahitur. Quam, ut verisimile est, sententiam sequutus Linæus *κομα* vertit marcere: marcere enim torpere significat atque languore & incertia teneri, præsertim cum Celsus de lethargo, in hoc, inquit, marcor & inexpugnabilis prope dormiendi necessitas. Eronianus *κομα* interpretatur *τὸ ὕπνιον, καὶ τὴν κομῆσιν*: & *κομῆσιν* *τὴν πρὸς τὴν πύλιν καὶ τὴν πύλιν*, hoc est somnum & veluti torporem: & comatosos eos qui cum pigritia quadam magna & graui somnolentia premuntur.

**Κονάριον.** conarium. Est glandula in cerebro, à basilata in tuernonem fastigiata: gloutis innixa. Glandulam esse non tantum substantia eius declarat, verum etiam usus. Siquidem oppler firmatque diuisionem vasorum petentium plexum choroide, & ventres anteriores, quæ fere glandularum omnium communis est utilitas. Plurique eundem usum etiam illi tribuere in cerebro quem habet pylorus in ventriculo. Nā ut pyloron aiunt esse glandulam, prohibereque ex ventriculo cibum, prius quam coctus sit, in tenue intestinum trāsire, ad eundem modum conarium in principio meatus positum custodere quendam esse aiunt, & velut œconomum esse quantum spiritus mitti oporteat. Quorum tamen opinionem Galenus lib. 8. de v. su. paruum reprehendit. Est autem conarium figura cōno, id est nucis pinæ, simile, unde & nomen habet. Situm est ad principium meatus qui ventriculū medium cum posteriori coniungit, & gloutis supra & ante sustinetur. Non est autem cerebri pars, neque ab internis partibus ventriculi, sed extrinsecus ipsi adhæret.

**Cicuta.** Cicuta herba est caule geniculari ut forniculi magnoque foliis ferulæ; angustioribus, græcolentibus; cacumine ramoso & umbellas sustinente, flore subcandido & semine candidiore aniso, radice concava nec profunda. Dum pubescit, apio simillima est & pro eo nonnunquam fallit, lethali alentium periculo. Est enim lethale venenum propter refrigeratoriæ viæ quæ semini & folio magna inest, ut videtur licet ex Alexipharmacis Nicædri quæ nos Latina fecimus. Recentiores tamen faciunt cicutæ duo genera, aquaticæ frigentis naturæ, terrestris calidæ, sed nullo idoneo authorē. Cicutæ tamen vis est, si Celso credimus, exedendi corpora, ut forsitan feminibus & foliis frigida sit potestas, cauli feruida. Auerroes & Conciliator nullo habito discrimine, eam calidam & siccam tertio gradu scripserunt, magno, ut mihi videtur, errore.

**Kavia.** vinum picatum apud Hippocratem. Inicitur cum cortice picæ semihemina in vas figlinum, & aliqui quidam excolant postquam ebullit, alii vero relinquunt, ut scribit Galenus in 7. *ὑπερμετρίῳ*.

**Kanēdis.** *καὶ νηδὺν*, processus est secundæ vertebrae, sic dictus à similitudine nucis pineæ: alii *καρπώδης*, appellat, Hippocrates *ὀδὸν* vocavit, vide in dictione *ὀδόντι*.

**Kōnos.** inëta, inuërsum turbo, pyramis. Ex hac similitudine pineam nucem significat, quæ Hippocrates *καρπώδης*, recentiores medici *σπύλον* vocant. Sed & Dioscorides prodidit picem liquidam hoc nomine à quibusdā vocatum esse.

● **Kōs oīpōs.** Cōm vinum, quātrā vini salis species secundum Plinium, cuius ex Italico vino faciendi rationem scribit à Catone demonstratam fuisse, super omnia in sole quadriennio maturandum præcipiente: de quo Constantinus Cæsar agriculturæ lib. 8. cap. 23. Aliqui (inquit) musti partes tres & aquæ marinæ partem vnā ad tertias decoquunt. Alii salis drachmas x i i, defructi congiū, musti congiū vnum, spicæ Celticæ drachmas xvi i. in vini albi metretas duas ammiscunt.

**Kōpō.** verbum est tertiæ personæ apud Hippocratem, significās idem quod *ἀπαυροῖ καὶ ἀμύρω*. Id est, languefacit & retundit. sunt qui scribant *κωπῶ*, quod est Leuat.

**Kōpōs.** *ἀπαυροῖ καὶ ἀμύρω*, hoc est, languidus & inualidus, apud Hippocr.

**Kōpōs.** surditas. Est actio auditus abolita à causa aliqua præter naturam. Affectio est auditui opposita, ut habitui priuatio. Quare quæcunque auditum abolent, ea pariter surditatem inducunt. Ea autem genere duplicia sunt, consistuntque omnia aut in ipsa audiendi facultate, eiusque primario instrumento quod est animalis spiritus in autem affluens: aut in ipsis organis quæ natura ad audiendum comparauit. Ad primum genus

pertinet causæ omnes quæ ipsum sensuum neruorumque principium, hoc est cerebrū, male habent, præsertim qua parte ex eo neruus auditorius producitur: cuiusmodi sunt intemperies aut vitiosus aliquis humor vel sensum in cerebro cumularus, qui habitualē aliquando & incurabilem surditatem facit: vel confertum & subito in ipsum irrumpēs, sicuti per febres acutas accidit, de quo celeberrimis habetur apud Hippocratem aphorismis: Quibus biliosæ deiectiones, superueniente surditate cessant, & quibus surditas superuenientibus biliosis deiectionibus cessat: item qui non multo postea scriptus est, Quibus in febribus aures obsurduerūt sanguis ex naribus fluens, aut alius turbata soluit morbum. Pleno enim eiusmodi humoribus cerebro, usque ad aures maxime vergentibus, fieri non potest quin & audiendi potentia vel hebetetur, vel etiam in totum auditu priuetur, & ipse animalis spiritus impurior, crassior & sæculentior redditus, ad audiendum prorsum ineptus euadat. Possunt tamen & hæ ipsæ causæ organis auditus esse communes, & in ipso auditorio neruo, præsertimque meatu eius interno talem intemperiem tantamque obstructionem excitare, ut nec sonus in aures aditus pateat, nec interno spiritui in ipsum neruū via. Id quod etiam à sorde, callo, aut alio tumore præter naturam meatuum nerui auditorii occupatē accidere potest. Hæ quidem causæ si magnæ sunt, surditatem inducunt: sin autem exiguæ, auditum vel obtusiorē reddunt, vel deprauant, vel in eo dolorem etiam mouent. Sunt enim harum omnium affectionum communes causæ, sola magnitudine ab invicem differentes. Præter quas tamen aliud quoddam discrimen asserri potest, quod læsus aliis instrumentis auditioni vltimū aliquem præbentibus, his scilicet quæ aurem foris circūstant, Intemperie aut tumore præter naturam aut continui solutione, aboteri quidem in totum auditus, surditasque fieri non potest, sed tantum hebetari vel etiam depruari. Quod autem ad dolorem attinet qui in auditus sensu aliquando mouetur, nō est dubium quin à proprio sensibili fiat, ut voce aspera, grauissima, maxima, celerissima, qualis sonus est tonitruī, à quo sæpè numero inductam esse surditatem animaduersum est diuulso audiendi instrumento, sicut è contrā vox lenissima tardissimaque: sano auditui solet esse grata: fatigato autem gravior, si præterea sit perexigua, egrō vero longe grauissima, eaque etiam magis ipsum silentium.

*καὶ οὖν*, quamuis proprie ad auditū pertineat, Hippocrates tamē dixit de oculis *καὶ τῷ ὁπτικῷ*, hoc est pro impedimento, sicut annotauit Erotianus: ut & alio loco *καὶ οὖν* ipse dixit *καὶ τῷ ὁπτικῷ* hoc est, læsus est & impeditus.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM TO A



**Αἰ.** ἡ *ἐπιτομία*; apud Hippocratem: sed ea maxime quæ per circuitus repetit, vt explicat Gal. ἐπὶ τῷ γλῶσσῳ.

**Αἰθεράδα.** quæ vocat Hippocrates libr. 1. τῶν ἐπιδημῶν, Galenus interpretatur ἐκαιφιδία σφοδρά τε καὶ ἀντοχρόνια, hoc est, repentina, vehementia, & quæ parum durat.

**Αἰχμῶν.** species est τῶν ἰσθίων, hoc est placentarū & bellariorum, sed deterior, crassique succi ac tarde commēantis, vt quæ ex similagine constet. Quæ enim ex melle parabatur, ῥυήματα Græci vocant, multo erat præstantior, sicut scribit Galenus libr. 1. de aliment. facult.

**Αἰγυμία** significat aliquando apud Hippocratem etiam ipsum semen, vt in lib. de nat. pueri.

**Αἰγόνες.** ilia pars inter coxas & pubem in imo ventre posita, κατέωνες alio nomine dicuntur. **Αἰγόνων ὀστέον.** os ilium: Est apophysis ossis sacri superna & ampla, continens intus ventris imi partem plurimam, tangensque ilia.

Os enim sacrum tres apophyles rectas habet, vt ait Galenus, hoc est, nec deorsum nec sursum repentes, hanc quæ τῶν λαγόνων dicitur, aliam quæ dicitur τῶν ἰσθίων, & tertiā quæ ἡ ἑβὴ: hoc est, ilium, coxæ, & pubis. Tamen os otorum saepe os ilium vocamus, quod id inter cætera magnitudine & crassitie præpolleat, vt scapulam totam vocamus omo-platam quamuis id nomen sit proprie par-tis in scapula latissimæ.

**Αἰγώπις.** lagopus. herba est nascens in legetibus, leporino pedi similis, nec plura antiqui de ea scripserunt, nisi quod porta sistit aluū, & ad alligata inguinum inflammationes discutit. Dicitur alio nomine λαγῶν κύμπος, vt habetur apud Dioscoridem.

**Αἰγώπιον.** sic Hippocrates τὴν λαγώπιδα herbam nominauit, quasi leporis triticum, furfuribus cum inaruit simillimam, folio paruo quasi oleagineo, longiore tantum, cruentis vulneribus imponens.

**Αἰγρόθαλαμος.** dicuntur quibus superior palpebra sursum reducta est, adeo vt oculum totum contēgere non possit, sed per foveam etiam oculus apertus maneat, sicut & leporibus. Id vitii aliquando naturaliter prouenit: aliquando à causa præter naturam, vt vitione, cicatrice, sutura latiore & male facta: interdum etiam senectute. Idem si inferiori palpebræ contingat, ἐκτροχίον appellatur.

**Αἰδάριον.** ladanum. Est succus pingis & ros-cidus cisthi, quem ladonā Cypri vocant, foliis adhærescens. Huius colligēdi ratio multiplex fuit: præcipua tamē ex capellis atque hircis; siquidem folia cisthi carpentes insidentem iis succum villo barbarum & femorum abstergunt, qui suapte natura tenax & lentus facile sequitur visci modo ad contactum. Detractus hic postea expurgatur atque in offas conuolutus reponitur. Optimum prouenit in Arabia apud Nabathæos Syriæ conterminos. Recentiores ex authoribus σρόβον nominant. Est medicamentum præstantissimum, in secundo fere abscessu calidum; natura tenuē, emolliens mediocriter, discutiens & concoquens: sed tamen habet etiam aliquam adstringendi vim.

**Αἰδυίς.** putatur à doctis esse cicercula, folio non rotundo vt plurima leguminum, sed oblongo. Caulis humi repit vt piso, quaterni & inæquales grano sunt anguli, vt ait Plinius. Galenus ochris & phatelis non longe dissimili natura constare prodidit, & Asiaticos suos eo cibo plurimum vtī in modum τῷ φασκολισσάνης, Officinæ cataputiam vocant.

**Αἰλαπτις.** dicuntur à Græcis venti repente excitati & vehemētes, maxime si pluuiam multam & subitam habeant, vt annotauit Gal. comment. eis τῇ ἀπὸ ἐπιδημῶν. Erotianus interpretatur ὁμοῖον μετὰ σφοδροῦ ἀνέμου γένεσιν: hoc est, pluuiam cum vehemēti vento factam.

**Αἰμὸς.** gula. dicitur aliis nominibus σόμαχος, σόφαρος, λενκανία.

**Αἰκαφθόν.** quid sit incertum est, nec saepe etiam à medicis vsurpatur. Meminit eius Paulus in magni cypheos compositione. Ruellius existimat esse nascaphthum siue narcaphthum, aromatis genus quod ex India deportabatur fumentis optimum.

**Αἰκονικόν.** pars fuit prima balnei apud antiquos quæ constabat calidi aeris tribus differētiis, & solā fere ex toto balneo nobis superest, testudo scilicet illa thermarum quæ igne concalescēta vaporem sicum continet, à quo sudor in corporibus mouetur. dicitur alio nomine λακωνικόν, & πνευματικὸν ἔρπον, & ὁλος ἔρπος. Latini pariter Græcis Laconicum appellant.

**Αἰμειδοειδὴς ραφή.** sutura lamboides. est sutura transuersa in posteriore crani parte, quam si à tergo spectes, figuram literæ Λ imitari videbitur. Illi ex omnibus futuris soli addita-menta tribuuntur ab anatomicis. Sunt autem huius futuræ extremæ partes, quæ propter occipiti humiliora non amplius exactam

exactam futuræ compagem exprimunt, & versus capitis basim protenduntur, sensimque sibi mutuo appropinquant. Cæterum *λαμψιδης* futuram Galenus deesse scribit quibus eminentia occipitis nulla est. vide *κρουνος*.

*Λαμψιδης* etiam appellatur ab Actuario diuisio venę canę inferioris, qua in duo crura abit paulo supra initium ossis sacri, non dubium quin à forma literæ Λ. Eandem diuisionem Gal. lib. de anat. venarum elemento comparat.

*Λαμπα*. sic dicta est à quibusdam *ἡ λυχρὸς ἀρχαία*, vt habetur apud Dioscor.

*Λαμπή*. apud Hippocratem lucerna, lampas. Apud Atticos etiam, vt scribit Galen. id significat in quo ligna vrebantur lumen præbentia. Sed & fax & lychnus eo nomine designatur, vt ipse explicat in lexico Hippocratis.

*Λαμπρὰ*. τὸ ἀφρώδης, hoc est spumosa, apud Hippocrat. Spuma enim quodammodo splendida est.

*Λαμπρὸς*. apud Hippocrat. τὸ λαμπερὸν καὶ καθαρόν, hoc est, splendidum & purum, vt interpretatus est Bacchius, non recte tamen Erotiani iudicio: *λαμπή* enim cum significet spumam vino innatantem, & veluti pingue quoddam glutinosum quod cõditis oleis supernatat, *λαμπρὸς* intelligere oportet in cuius summo innatat quippiã τῇ λαμπῇ simile.

*Λαμλάμ*. lapsana. olus est sylvestre, cuius folia, inquit Dioscorides, caulesque coquuntur in cibo, & plus alit quam rumex, estque stomacho vtilius, prauum tamen, vt ait Galenus succum gignit. Illitum autem abstergerendi digerendique facultatem possidet. Inter sylvestres brassicas censetur, pedalis altitudinis, tribus hirsutis foliis napi similibus, nisi candidior esset flore. A Romanis napum sylvestrem vocari Dioscorides scribit. Rura nostra sanuas albas, quasi sylvestres napes, vocant.

*Λάπαθς*. rumex. olus est multos habens caules, ramosum, radice singulari, alta, vt quæ nonnunquam descendat ad tria cubita, quæ tamen sylvestri breuior esse cõsuevit. Cum perfecte adoleuit, figura betæ proximum est, & corpore carnoso atque madido. Multa eius genera produntur apud Dioscoridem, quorum quartum genus *λάπαθς* vocari prodit.

*Λαπαρή* ἡ

*Λαπαρή*. dicitur pars ea corporis quæ posita est inter costas nothas & ossa quæ ad illa pertinent. ratio nominis est, quod inanis sit & defideat. Proprie enim τὴ λαπαρὴ significat inane & vacuum, sicut *λαπαίσει* exinanire, vt apud Homerum:

Ἰλίου ἐλαπαίσει ἐπαίμενον Πηλεΐδης.

Sed & omne quod defidit, *λαπαρὴ* Græci appellant, translato vocabulo ab eo quod cõmuniter accidit. Siquidem omne quod vacuum est, necessario defidit. Annot. Gal.

comment. 2. *εἰς τὴν κατ' ἰσχυρὰν*. & similiter initio comment. 2. *εἰς τὸ περιγαστρὶον*, scribens eã partem omnino vacuum videri, si cum supernis infernisque partibus, vtriusque ossis cõferatur. Idem vero comment. 2. *εἰς τὸ ἐπὶ ἀρτῶν* scripsit, se de vocabulo *τὸ λαπαρὸς* dicere posse, adductum experimento & Hippocratis ac poetæ vsu, cum ipso morbo, eam significare partem quæ inter ossa pectoris, & quæ proprie appellantur ossa ilium, est interiecta. Attamen idem comment. 3. *εἰς τὸ πρὸς ἄρδραν* ait id quod inter ossa singularũ costarum est, ab Hippocrate eo libro *λαπαρὸν* appellari, qua parte mûscoli sunt dicti *μοσθηεύειν*. Erotianus autem non quod inter costas medium est, sed ipsam costam *λαπαρὴν* dictam fuisse ab Hippocrate scripto prodidit. Verum Hippocrat. libr. 6. *τῷ ἐπὶ δμῶν λαπαρὸν* vsurpauit vt nomen adiectiuum, dicens *ὀδυρὸν λαπαρὸν*, id est, dolorem mollem & laxum: qui fit sine phlegmone & tensione.

*Λαπαρὸς*. κατὰ τὸ γὰρ κατὰ τὸ λαπαρὸν σημαίνεται, vt scribit Galenus comment. *εἰς τὸ γὰρ ἐπὶ δμῶν*.

*Λαπαρὸν*. proprie quidem vacuari, inde vero mollescere significat apud Hippocrat. vt annotat Galenus *ὅτι τῆς γλῶττις*, qui etiam comment. *εἰς τὸ περιγαστρὶον λαπαρὸν πλὴν γαστρίας* interpretatur *κενοῦ καὶ περιγαστρὶον τὸ τὸ γαστρός οὐδὲ μαλα*: hoc est, vacuare atque imminuere vëtris tumores. Dictum *κατὰ τὸ λαπαρὸν*, hoc est, à rumice, cui vis inest emolliendæ alui & laxandæ.

*Λαπαρὸν λαμλάμ*, apud Hippocrat. vt annotauit Erotianus.

*Λάρυγξ*. est finis superior asperæ arteriæ, tribus constans cartilaginibus, præcipuum vocis instrumentum. Eandem autem partem etiã *φάρυγξ* appellari author est Gal. libr. 5. vsus part. cum tamen proprie, vt ait, pharynx ante laryngem consistat. Est autem larynx suprema arteriæ pars, seu principium faucibus continuuum, seu asperæ arteriæ caput. Componitur ex tribus cartilaginibus. vna *σφυροειδής* dicitur, quæ anterior veluti scutum quoddam aliis præposita est: alia *ἀρυταρνοειδής*, ori vasis olearii adsimilis, cartilagines tamen duas sortita: tertia vero innominata, infima, os ænophori (quod brochum Galli vocant) referens: harum autem, *ἀρυταρνοειδής* καὶ *σφυροειδής* mobiles sunt, sola autem innominata immobilis est. Ob eam causam in ea firman- tur aliarum duarũ mûscoli. Nam cum duodecim sint mûscoli laryngis proprii, duo quidem prodeũt à thyreoide media interna in anteriorem arytænoideam quam claudũt, duoque similiter ab arytænoideis posteriore basi in eiuſdem basim anteriorem quam comprimunt: reliqui vero octo omnes ab innominata, partim anteriore, partim posteriore parte, partim etiam lateribus. Cæterum hõrum musculorum beneficio totus larynx præcipuũ vocis organũ est, quam tamen acutam vel grauem præcipue facit ary-



tenoides, adiuta cartilagine epiglottide, arytenoidem magis minusue claudente, laxatis aut contractis duobus musculus ipsam releuantibus, adiuta quoque gargarone, vocem ipsam plectritu modulante.

*Λάσινον*. linteam apud Hippocr. forsan villosum & veluti hirtum.

*Λάχανον*. olus: sic dicitur omnis herba satiuā quē edendo est. inter quas quoniam beta non postremum locū obtinet, factum est vt beta *λάχανον κατ' ἑξῆς* ab Atheniensibus diceretur. Secundum quam significationē Dioscorides plantaginis foliū *λάχανός τις* dixit; hoc est beraceum. Non enim olus intelligere potuit, cum in exprimendā similitudine speciatim loqui, non generatim, conueniat.

*Λάχανον βασιλικόν*. olus regium. Hoc nomine quondam dictam fuisse artemisiā Dioscorides author est, & Græcorum exemplo Romanos herbam regiam appellasse.

*Λίσσινον*. emplastri nomen, quod in lænæ modum malum penitus extirpar adhibitum ischiadicis & hemicranicis. Describitur ab Aetio lib. 1. 2. inter epithemata & malagmata ischiadicorum.

*Λέχνης*. exuium siue senecta serpentis apud Hippocratem. quidam autem concham vacuum interpretantur. Erotianus simpliciter *ὑμνωδὸς σαύουρμα*, hoc est, membranosa desquamationem. alii vero animalis genus dicunt eo nomine significari, paruo lepori simile, quod forte Galli liebre vocant.

*Λέστα*. dicuntur per metaphoram extremitates oris vuluæ apud Hippocratem. sic enim proprie vocantur extremitates & oræ vestimentorum. Eas ipse etiam alibi *ἀμυδία* appellat.

*Λέσση*. *δελφίνιον, καπελομύμενος*, apud Hippocratem. hoc est, diiudicans & dinumerans.

*Λευπεία*. læuitas intestinorum. Est continua & equabilis intestinorum superficies, cibos incoctos elabi sinens. Sic dicta est quasi *λευκότης τῶν ὀφθαλμῶν*, hoc est, læuitas intestinorum. Cæterum vt omnis læuitas, ita hæc geminam habet causam, vnam quidem cicatricem aliquam perpetuam, qualis etiam forinfecus in corporis cuticula contingit ex cicatrice ortam quam dysenteria magna & profunda exulceratio inuenerit: alteram vero humorem quandam glutinosum, internez toti tunice intestinorum obductum. Si quidem ad vtramque causam lubricitas & continendi cibi impotentia consequitur, qui proinde priusquam concoctionem adeptus sit, ex intestinis elabitur: retentio enim siccitate quadam & asperitate partium, continentium perficitur. Ad hæc duabus illis de causis venarum, qui ad intestina pertinent meatus clauduntur, à cicatrice quidem continentes, à lento autem humore obstructi: itaque cibi per corpus digeri non possunt, sed per intestina necessario vacuantur. Est enim hoc lienteriz præcipuum symptoma, cibi crudi per aluum excretio. Postea vero

id ipsum symptoma morbi nomen promeruit, omnisque eiusmodi excretio lienteria dici coepit, à quacunque causa nata esset. Oritur autem præter superficiariam intestinorum exulcerationem & cicatrices à facultatis etiam cibum in ventriculo vel continentis vel concoquentis imbecillitate. Inde enim cibi crudi nulloque modo immutati descendunt, siue à dysenteria, siue ab ileo aut diarrhoea aut alia quacunque de causa imbecillitas ea prouenerit. Verum hæc lienteria (inquit Paulus) quam ventriculi imbecillitas accersit, videtur cū cœliaca affectione confundi (in hac enim, quemadmodum & in lienteria, venter nequit præ imbecillitate cibos vel concoquere vel distribuere, tibi que ideo læues, crudi & perliquidi redduntur, aluo omnino fluida) nisi quod lientericis celeriter quæ assumpta sunt egeruntur, tamque intensa est cruditas, vt alimenti assumpti genus aperte cognoscatur, atque hac potissimum nota à cœliacis discernuntur. Ex quacunque autem causa lienteria orta sit, ægri cibum non sentiunt, & in cachexiam incidunt, cruda assidue excernunt, colore subalbida, inæqualia atque aquosissima, nullo prorsus sanguine aut bile perfusa. Ardor præterea tota præcordia occupat, cibi que fastidium consequitur.

*Λευπρόν*. herba est foliis betæ, tenuioribus & longioribus, decē & sæpe pluribus, caulem habet tenuem, rectum lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Nascitur in pratis & palustribus. Eius semen, utpote austerum, cœliacis, dysentericis & sanguinem spuētibuscum vino exhibent.

*Λέον*. læue. Id dicitur quod continuum est nulla ex parte diuulsum, sed sibi vndiq; coherens æquabili superficie. Contrarium est *τὸ πρᾶχόν*, hoc est, aspero. *λέον* etiam apud Hippocratem Galenus interpretatur *ἀπειρον*, comment. *εἰς τὸ γ' αὖ ὀφθαλμῶν*.

*Λευκοδὲς*. planci. dicuntur apud Hippocratem quibus medius pes ab interiori parte non est cauus, sed planus quasi tabella quæ planca dicitur. Hi vitiosam habent pedis structuram & valgis similem. Annotat Gal. comment 3. *εἰς τὸ ὅδε ἀρσεν.*

*Λευκός*. læuitas. morbus est primi generis in formatione consistens. Fit à pingui & lento humore partem aliquam plus æquo madefaciente, aut à cicatrice. Contraria illi est *πρᾶχτης*.

*Λευκοφύλλος*. species est brassicæ apud Athenæum, quæ sic dicitur à læuore foliorum. hanc tradit ubique nasci, & nullam respicere regionem.

*Λευκοδερμὸς*. dicuntur quibus præputiū ex morbo vel sectione deest, aut ita contractum est vt glandem amplius regere non possit. Romani apellas & recutitos vocarunt.

*Λευκοδυσμία*. defectus animi. quid proprie sit, & quomodo differat tum à syncope, tum à lipopsychia, non est exacte definitum à veteribus.

tribus. Itaque in re ambigua si quid mihi licet statuere, primum quidem videri potest *ἡ λεπτοθυμία* nomen accepisse *καὶ τὸ θυμὸν ἢ θυμίδιον διὰ μέγεθος*, & proprie dici coeptam de defectione animosæ facultatis. Quæ quoniam in corde sedem habet, ideo *καὶ τῇ λεπτοθυμίᾳ* cordis facultas præcipue laborat. Ergo *ἡ λεπτοθυμία* defectus est facultatis vitalis. Verum cum huius tanta sit dignitas ut ea incolumi vita seruetur, deficiente vero vita pariter deficiat, & reliquæ facultates protinus cum ea concidant, quod non est aliud quam syncopen pati, necesse omnino est, quo discrimen inter ea seruetur, statuere non tam magnas tamque vehementes esse defectionis causas in lipothymia, quam sunt in syncope: ideoque ut cætera quidem habeat inter se communia, ut causas quas Gal. libr. 1. ad Glauconem diligentissime persequutus est, non tamen ita dissipantur resoluiturque per lipothymias spiritus & calor nativus, quibus duobus tanquam vinculis vita nostra contingitur, ut mortis periculum, velut in syncope, immineat. Languent quidem ægri, pulsus deficit, & procedente malo nec moventur nec sentiunt, sed citra sudorem, qui veluti limes quidam lipothymias à syncopis disternit. Vbi enim is oritur, præterquam quod summam naturæ non valentis humorem corporibus ingentem & radicalem continere, imbecillitatem significat, solidas etiam partes eo expoliari, adeo ut omni virium substantia dissipata nihil reliqui natura habeat quo earum robur conseruet, sed vna cum iis, si immodici sunt, ipse simul animus è corpore emigret. Habet igitur lipothymia & mitiores causas & minora symptomata quam syncope. quo factum est ut Galenus eodem in libro scripserit à lipothymia syncopes initium fieri, ut quæ syncopen præcedere consueuerit, tanquam leuior quidam affectus grauiorem. Id quod etiam pater ex libr. 1. 2. meth. med. ubi scribit crudos humores si & copia sua vires premant, & propter tum multitudinem tum crassitudinem exiguos animalis meatus obstruant, iam multis nominibus exitialem affectum inducere, ac syncopen opportunos reddere: quod si nec obstruant nec onerent, syncopen eos quidem non inferre, sed animi deliquia, quas lipopsychias vocant. Ex iis enim intelligimus non esse tam magnam lipopsychiæ causam quam syncopes, neque par periculum. Quanquã autem, ut initio proposuimus, ex ipso nominis etymologia *ἡ λεπτοθυμία* ad vitalis facultatis defectum, ut & *ἡ λεπτοθυμία* animalis, pertinere videatur, attamen per eam facultatum omnium exolutio contingit, ut sensu motuque destituantur ægri non minus quam animo.

*Λεπτοθυμία*, idem quod *ἡ λεπτοθυμία*, nisi quod à defectu & exolutione animalis facultatis dicta est, notis scilicet eius exolutæ apparentibus, cum tamen sit eadem ratio utriusque quam ante diximus.

*Λεπτοθυμία* *καὶ πυρετός*. Est febris continua, in qua simul externa frigent, interna vrutur. Genere quidem putrida est, sed cuius calor non sit æquabiliter fusus per vniuersum corpus. Extrema enim per eam frigent, siue extremorum nomine pedes manusque tantum intelligas, siue totius corporis eximiam cutim. Siquidem vtrumque aliquando accidit per febres lipyrias, adeo ut cum intus ipsa viscera vrantur, venter tamen ipseque etiam thorax frigida ad manum sentiantur. Ceterum inæqualitas ea mala est si credimus Hippocrati libr. 2. prognost. non quidem in febrium intermittentiū accessionibus, sed in continuis & acutis febribus, cuiusmodi lipyria est. Huius causam fere semper Galenus retulit ad magnitudinem phlegmones viscera obsidentis. Ardoris namque vehementia sanguinem, & quæ in eo continentur spiritum atque calorem ad se ex toto corpore instar cucurbitulæ attrahit, ideoque summæ corporis partes exangues redduntur & frigida. Aetius ab erysipelate circum ventrem consistente febrem lipyriam dictam accendi scripto prodidit, ut ab eo quod in iecinore creatum est, *καὶ πυρετός*, & ab eo quod in pulmonibus, *καὶ πυρετός*. Diuersi ab ea generis est quæ pestilens & maligna dicitur, in qua quamuis extrema frigere soleant, non est tamen necesse interna aduri, propterea quod malignitatis & pestilentie essentia non posita sit in calore, nec vlla alia qualitate, sed in totius substantiæ contrarietate.

*Λίλιον*, sic dicitur lilium ab Hippocrate, quod alii *κρίνον* vocant. Sunt vero qui scripserint *τὸ κρίνον* à quibusdam sic vocari, ut refert Erotianus & Dioscorides.

*Λείψανον*, sic proprie dicitur *οἱ ἀχνοί*, id est decolores: sed non ita tantum, verum omnes quibus minus est sanguinis quam oportet, ita vocantur, etiam si colore nondum prorsus sint destituti. Eos vero qui aliam ob causam corpore sunt male affecto, *καὶ ἀχνοί* medici vocant, ut scribit Galen. comment. *ἀπὸ τῆς διαίτης ἀχνοί*, quo loco eam vocem Hippocrates vsurpauit.

*Λειψύς*, est summæ cutis asperitas cum leni pruritu. Deterior quidem est pruritu, ut qui sine asperitate sit, sed lenior quam psora aut lepra, adeo ut si ieiuna salina quotidie defricetur, sanescat: increscens vero & extremam cutem in furfures resoluens, in psoram transiit, atque inde in lepram, ubi pro furfuribus, piscium quasi squamulæ concrevunt. Gignitur, ut ait Galenus, ex misto quopiam humore, serosis nimirum ac tenuibus & acerbis succis cum crassis permixtis. Quare non in psoram modo, sed etiam in lepram degenerat, tanquam in peiores morbos vetustate discussis illis tenuibus aut vstione incrassatis, tuncque non solis valde siccantibus medicamentis, sicut per initia, sed præterea repurgantibus etiã & exterforis curari debet. Cæterum *λεῖψος* nomine illum etiam impetiginosum morbum, metagrá Romanis

appellatū, sed multo magis ferū & agrestē ob id dictū, Plinius comprehendit, qui definitur ab eo non squamis, vt lepra, sed scōdo cutis fursurē, totos primum vultus; deinde vero & colla pectusque & manūs occupante, oculis tantum immūibus. Fuit autem, vt idem auctor est, nouus morbus, & ante Tiberii principatū penitus incognitus: nec vero in iis tantum notis feritas eius erat, sed quod admodūm contagiōsus esset, soloque osculo vel contactu nō humilem aut mediā plebē, sed solos procēres inuaderet. *λεῖψα* omnes ferē impetiginem interpretantur. Cornēlius Celsus nō ita, sed papulam videtur vocare; cuius duas, quas habet & lichen, differētiās statuit, feram & mitiorem. Nam quā ab eo describitur impetigo, sine dubio lepra est.

*Δελῦν*, dicitur callus in equorum genibus & supra vngulas in flexu earum partium duratus, fertur comitialibus prodesse.

*Δελῦν*, herbæ species quam aliqui *βρόον* appellāt, saxi enim adheret vt muscus. Sunt qui putent esse Hepaticam in offic. dictam. Extētit, purgat, siccat, refrigerat.

*Λεύκος*, à quibusdā dicitur quam Hippocrates *ἀργυρία* appellauit: quidam vero *λευκός* ad pisum & aracum genus esse defendunt. Galenus apud Hippocrat. pro lente cui detracta sunt putamina, videtur interpretari. Significat & pulmentarium ex leguminum farina, siue leguminū lomētum elixatum. Tantum autem *λευκός* & *έννος* inter se differunt, quantum ipsa leguminum farina ab ipsis leguminibus fressis differt. Itaque quoties *κνῆμιν έννος*, dicitur, pro faba fressa elixata intelligitur: sed *κνῆμιν λευκός*, fabæ farinā elixatam significat. sic *πρωτάνης λευκός* & *όρός λευκός*, aliorumque leguminum dicitur.

*Λεύκος*, dicitur etiam Qui luteum, de quo vide *ών*. Sunt & qui Putamen interpretentur. At guttum olearium seu ampullam vocant *λευκός*.

*Λέμμα*, ή *όπιδέρματος* apud Hippocr.

*Λεονήσας*, dicta est à quibusdā ή *έλεφαντίας*, vt habetur apud Arētzum & Aetium, propter rugarum extēmi frōtis similitudinē quam elephantici cum leonibus habent.

*Λεονήδα*, à quibusdā dicitur ή *καρχαρία*, vt habetur apud Dioscor.

*Λεονότος*, apud Arētzum idem quod *λεονήσας*.

*Λεονόβουτος*, sic dicta fuit à quibusdā ή *όροβά*.

*Λεονόπιλον*, herbe est caule dodrantali aut altiori, plurimis alis concauto, in cuius cacumine semina parua duo aut tria in siliquis ciceris modo, flores habet anemonæ similes, punicei coloris, folia brassicæ, sed papaueris diuisura, radices nigras rapæ similes, strumosas. Calfacit & siccat ordine tertio.

*Λεονότιον*, herbula est duum digitorum, folio angusto, tres quatuorue digitos longo, hirsuto, & iuxta radicem canescente. In summo eius caule capirula quasi perforata; flo-

res nigri, semen vsque adeo spissa lœuagine inuolutum, vt sæpe fallat. Radice partia coheret, quā tradunt appensam ad amatoria prodesse. Ignota nunc est omnibus.

*Λεπίς*, dicitur apud Hippocratē petris adherentes conchæ.

*Λεπίδιον*, herba ea est quæ *έκνης* appellatur Galeni Paulique testimonio, etiam si de vtroque seorsim Dioscorides differuerit. Proditur fruticosa, foliis lauri sed maioribus, actis, exulceratoria & optima tollendo coxendicum dolori. Scribit autem Dioscorides etiā hoc nomine ή *γερνιδιον* à plerisque vocatum fuisse.

*Λεπιδόειδης*, sunt duæ lineæ in cranio, vtinque singulæ, à recta sutura quam *όβελος* dicunt æquidistantes. per capitis longitudinem à posteriore parte in priorem super aures feruntur. Fiunt autem duobus inter se coherentibus ossibus, non per suturam quidem, quæ species est *συναρθρότης*, sed sincipitis osse descendente, paulatim in squamæ speciē attenuato, & in os subingrediente quod ab auribus ascendit. Proindeque eas nonnulli non suturas simpliciter, sed vel suturas *λεπιδόειδης*, hoc est squamarum modo compactas, vel *συναρθρήματα λεπιδόειδης* vocant. Sunt autem hæ suture, inter ossa temporum & os sincipitis mediæ.

*Λεπίς*, æris squama: sicut enim absolute appellatur aliquando, quanquam & ferri squamam similiter significet. vide in dictione *χαλκός*.

*Λέπος*, *λέπιον*, apud Hippocratē, cortex & squama.

*Λέπρος*, Est asperitas cutis profundior cū pruritu, eam in squamulas resoluens. Eius causa melancholicus humor est multus, viscosus, crassus, sed tamen acris & immorus sub cute & subiecta carne latens, sensumque eum doloris excitans qui pruritus dicitur. Est enim pruritus à lepra, vt & à psora, inseparabilis, sed tantus in lepra vt æger etiam vehementissime scabendo nullo modo inuetur, sed omnis potius genetis vlcera & phlegmonas præterea accersat. Humor autē ille terrestris & siccus cutem exasperat, sed multo quā in psora profundius, vt subiectæ quoque carnis partem aliquam occupet. Verū ea omnino perexigua est, adeo vt lepra ob id non definat solius cutis affectio dici. Ab eadem humoris qualitate & malignitate, piscium instar, squamulæ, ex summa cute discedunt, materiam semper subministrante colliuatione quadā subiectæ carnis & totius corporis facta à calore præter naturam. Squamulis autem illis inter cætera differt à psora, quæ non squamulas, sed fursuracea tantum corpora ex se remittit, vt quæ à minori gignatur intemperie & humore minus crasso, terrestri & maligno. Sunt enim hi duo affectus valde affines & congeneres, vt non aliud fere psora sit quā mitior lepra. Est enim psora ad lepram præuia, vt & lepra ad elephantiam, si magis humor vratur & malignior

malignior euadat, & morbus diutius perseueret. Est igitur lepra inter pforam atque elephantiasim media, sed ea tamen latitudine prædita, ut in quatuor distincta sit differentias, seu gradus quosdam, prout magis minusue humor vititur & malignus euadit. Prima minime mala est, ruber & similitudine scabiem repræsentat: distat autem ab ea, quia magis exulcerata est, & pustulas bullulasque habet, ex quibus postea squamulæ resoluuntur. Altera peior est, similis papulæ fere, sed asperior, rubicundior, figuris variis, squamulis ex summa cute discedentibus, rosione maiore, & celerius latiusque procedente: rubrica cognominatur. Tertia crassior est & durior & magis tumet, in summa cute finditur & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit. In temporibus aut oritur aut desinit: nigra cognomen est. Quarta curationem omnino non recipit: subalbida est & recenti cicatrici similis, squamulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes, quibus demptis nonnunquam profluit sanguis. Alioquin vero humor eius albidus est, cutis dura atque fissæ est, præceditque latius. Hæc omnia maxime genera oriuntur in pedibus & manibus, atque vngues quoque infestant. Commune etiam omnibus est quod squamulas remittant, a quibus *λεπιδος* nomen factum esse putant. Sic enim dicitur quasi *λεπιδος*, id est squamosa; *λεπιδος*, hoc est squama. Quamquam sunt qui quartum lepræ genus ante expositum solum proprie eo nomine vocandum censent, propter albedinem: quod apud Græcos *λευκινιδος* significet idem quod *λευκινιδος*, hoc est dealbati. A Latinis *leprosa* dicitur impetigo, non ea quidem quæ *λεχλω* dicitur & mentagra, sed quæ à Cornel. Celso descripta est libr. 7. & in supradicta genera quatuor distincta: id quod multis euidentibus argumentis patere potest si quis diligenter velit attendere. Ab Auicenna dicitur Albæras nigra & impetigo excorticatiua, quod cutis per cortices squamasque resoluatur.

*λευκινιδος*. duo significat, *λεπιδωδης* καὶ *λευκινιδωδης*, hoc est, exasperari & albescere. Vtrumque sumptum *λεπιδωδης*, quod qui ea laborent vtrumque perpetuantur. Hinc & *λεπιδωδης* dicitur generali quadam significatione *ἢ ἐν τῇ σπιγνῇ* ὅθεν φησὶν *λευκινιδος*: hoc est, albedo quæ in corporibus est præter naturam: ut in Theriacis Græcus Nicandri interpretes annotauit.

*λεπιδωδης*. tenuis seu gracile intestinum. Dicitur superior intestinorum pars membranæ, teres, à ventriculi fundo incipiens, & desinens qua cæcum incipit. Sic dicitur ad differentiam crassi intestini. Sunt enim intestinorum duæ summæ differentię, vna gracilium, altera crassorum: illa magis membranosa, hæc magis carnosa sunt. Diuiditur autem, rursus tenue intestinum in tres partes, ecphyum, ieiunum & ileon. Verum postre-

um totius nomine etiam *λεπιδωδης* absolute dicitur à Galeno libr. 7. vsus partium, de quo vide in dictione *λεπιδωδης*.

*λεπιδωδης*. *τὸ ἀραιόν* aliquando apud Hippocratem hoc est, rarum, ut in libr. de locis in homine, quæ admodum Galenus *ἐν τῇ τριτοῦ ἰατρικῇ* interpretatus est.

*λεπιδωδης*. *τὸ ἀραιόν*, hoc est sedi, species, quæ alio nomine *αὐδραχὴν ἀγρία*, Romanis Illecebra appellatur a iunioribus Dioscoride.

*λεπιδωδης*. attenuantia. dicuntur tam cibi quam medicamenta, quæ acti & calida facultate prædita crassos succos tenuant & incidunt. Sunt autem ea longò vsu nobis nota, & ratione explorata. Nam olfactu & gustu satis instruitur ad eorum cognitionem. Quæcunque enim olfactui aut gustui aut utrique simul actia & mordicantia & calida apparent, ea facultatem habere attenuandi atque incidendi certum est. Quæ etiam largius æquo sumpta, ventriculum mordent, & nauseam à cibo magnam inducunt, & halitus acres emittunt, non modo cum manduntur, sed etiam postquam à corpore fuerint egesta. Ad hæc si quid olfacti odorem bonum inferens, aromatis speciem gustui repræsentet, id quoque calidum viribus esse oportet & attenuans, quamuis non perinde atque ea quæ mordicant & rodunt & insigniter calida sunt. Attenuant præterea & incidunt quæ saporem habent nitrosum aut salum, nec minus quæ amara sunt, item quæ acida: ut acetum & quæ eo constant, alia quidem magis, alia vero minus. Multa enim attenuandi vim hebetant & imminuunt, ut oleum, cibi omnes aquei & mucosi, præterea olera plurima hortensia propter superfluum humiditatem. Ex quo patet attenuantia omnia, non calida modo sed sicca etiam facultate esse, & tanto magis attenuandi vi pollere, quanto fuerint sicciora, & ex iis similiter quæ sicca non sunt, maturiora, aliis minus maturis, & quæ siccis locis proueniunt & montibus, iis quæ in paludibus & campis crescunt. Cæterum primi inter attenuantia ordinis sunt allium, cæpæ, nasturtium, porrum & sinapi: post illa autem smyrnium, pyrethrum, origanum, calaminthe, sisymbrium, pulegium, satureia, thymus. Quibus ordine proxima sunt capparis & terebinthi fructus: postea eruca, sium, apium, petroselinum, orminum, raphanus, brassica & betæ.

*λεπιδωδης*. extenuatio, gracilitas & macies corporis. Est, ut diffinit Galenus comment. 3. in libro sexto *ἢ ἐν τῇ δυνάμει, ὅθεν τὸ ἔγκυ κατὰ τρεῖς τῆς καὶ σπινθῆρας ἢ σπινθῆρας*. Id est, totius molis detractio & collapsus vel subsidencia, siue vitiumque ipsam nominare libuerit. Huius præcipuum signum est cutis laxitas, quod mangones etiam nouerunt, ex eo coniicientes tū quæ corpora crassiora reddi non queant, tum quæ & quantum possint. Ipsam enim curam summis digitis sursum trahentes, quantum ea recedit à carne subiecta, in tan-

tum emaciata corpora refici & impleri posse sperant. Sunt autem extenuationis multæ causæ: alimentum penuria, exercitationes plures, vigilia, cogitationes, dolores, morbi colliquatiui & *ἀσπερστικοί*, euacuatio copiosa per aluum, per vomitum, per sudores & per sanguinis profluvium. His adde & *ἀσποφίαν*, cuiusque omnes causas, de quibus suo loco dictum est, vide in dictione *μυρμηρίς*. Vide & Galenum in comment. aphor. 7. libr. 2. quo scribit Hippocr. Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, lente reficienda esse: quæ vero breui breuiter. Et comment. in aphor. 28. lib. eiusdem.

*Ἀσπεννομένον*, *ὀμολογῶν*, hoc est conuersantis, apud Hippocratem, vt interpretatur Erotianus.

*Ἀσπιδί ἐμπλαστὰ*, dicuntur emplastra quædam alba, lenia, fere non grauibz vulneribus accommodata, præcipueque senilibz. Quale est quod habet, cerussæ p. xxxxi. seu vitulini curati & ceræ, singulorum p. xlv. i. i. olei hemmas tres, ex quibus ea cerussa coquitur. Author Celsus lib. 5. cap. 19.

*Ἀσπιδάριον*, frutex est radice cyperi, valida & amara. Is diuisis nominibus etiā *ἀκανθα λευκή* dicitur, de qua suo loco dictum est. Sic etiam vocatum à quibusdam *φιδάριον* siue *φιδάριον*, Dioscorides author est.

*Ἀσπιδάριον* ἢ *λευκάριον*, sic à quibusdā dicta est ἢ *ἀσπιδίς*, vt Plinius testatur, non tamen omnis, sed illa modo cui flores candidi sunt. hæc reliquis vehementius vrinam ciet.

*Ἀσπιδάριον*, *ὀσμυρὸς καὶ ὀσπιδάριος*, sunt & qui αὐτὸ τοῦ ἀσπιδάριου, hoc est pro mento, accipiant.

*Ἀσπιδάριον*, herba duum generum, montana & vrbana: sed quæ sit, nemo descripsit. Hermolaus & Ruellius scripsere herbam quandam esse in vineis nascētem Mercuriali similem & congenerem, sed nullum, quod sciam, authorem sequuti.

*Ἀσπιδάριον*, ἢ *δρακοντίου ῥίζα*, apud Hippocr. hoc est, draconitii radix.

*Ἀσπιδάριον*, vitiligo alba. Est cutis carnisque subiectæ præter naturam albedo: Neque enim ad solam cutem, sed ad subditam etiam carnem vitium hoc pertinet. Fit errore facultatis nutritoriæ, sanguinem pituitosum, lentum & viscosum gignentis. Nam cum tali sanguine caro diutius alta regenerataque fuerit, facillime albedo in alta carne contrahitur: talemque habitum accipit, vt omnia facile in album conuertat, & non iam simpliciter caro, sed alba caro sit. Cum enim diutius ea affectio perseverarit, caro quidē adhuc manet, mutatur tamen eius forma & in alteram speciem vertitur, mediā inter sanguineam carnem & exanguem, proque naturali habitu cachexia inducitur. Sic quidem leuce carnis habitum transformat, cumque talis euasit, tota fit pituitosa albaque, nec magis nititur alimentum in rubram carnem vertere, quam polypodes & locustæ, ceteraque crustacea, exanguis & alba carne prædita.

Nec vero dubium est quin sensus, præsertim autem tactus, in ea affectione obtusior sit, propter humoris frigiditatem & crassitiem qui cutem subiectamque carnem possedit. Id malū videtur esse quod vulgo nostri homines lepram albam vocant, quodque Auisenna albaras album nuncupauit. Differt autem *ἀπὸ τῆς λεύκης καὶ ἐλέφαντος*, quod hæc sunt cum asperitate cutis, rosione, pruritu & squamulis: *λευκή* vero cutim habeat læuem sine vlla aspredine & rosione. Nomen habet *λευκή* vel *ἀπὸ τῆς λευκότητος*, vel à quadam similitudine cum populo arbore quā itidem *λευκὸν* appellant. Vt enim foliis & cortice candida est, sic & cutis eius quem is morbus occupauit.

*Ἀσπιδάριον*, populus alba, arbor est, notior quidem Dioscoridi quam vt ab eo describeretur. Theophrastus tamen eam descripsit lib. 3. cap. 14. vide in dictione *ἀγριος*.

*Ἀσπιδάριον*, dicitur à quibusdam *τὸ αἰ δρόσικον*, vt habetur apud Dioscoridē. Mercurialis esset, nisi per medium folium huic alba linea transcurreret.

*Ἀσπιδάριον*, lapis est in Ægypto nascēs, qui cum subuiridis appareat, tamen si ad cotem affricetur, aut asperius pallium, locum dealbati eo etiam lintea illustriora reddūtur. Author Aetius lib. 1.

*Ἀσπιδάριον*, viola. quo nomine etiam cādida proprie designari videatur, tamē & pro lutea & cærulea & purpurea solet vsurpari. Est autem planta cubitali fere altitudine, ramosa, caule brassicæ exiliore, folio logo, molli, canescente, flore quadrifolio, non vnus coloris: nam alii purpurei sunt, alii nirei, alii lūrei.

*Ἀσπιδάριον* sicutur à quibusdā *ὁ χαλκῆρος*, hoc est atramentum sutorium, quod candidum est & albæ violæ simile.

*Ἀσπιδάριον*, vocatur hoc nomine glutinum auri cum ligno inducitur. Ex pluribus compositum est, Sinopidis Ponticæ selibra, filis lucidi pondo decem, & melini Græciensis duobus mistis tritisque vna per duodecim dies.

*Ἀσπιδάριον*, nomen malagmatis, quod habetur apud Galenum lib. 7. *τῆς καὶ ἡμῶν*.

*Ἀσπιδάριον*, hydropis species, qui & *ἀσπιδάριον* dicitur & *ἀσπιδάριον* siue *ὑποασπιδάριον*, vide ὁ δρασ.

*Ἀσπιδάριον*, est species *τῆς ἑρμύρου*, hoc est, vnguenti sicci, cuius vsus præcipuus ad collam & axillas est, quo illis odor gratus concilietur. Descriptio habetur apud Aetium extremo libro.

*Ἀσπιδάριον*, est species vini falsi, ex passis prius vuis, mox calcatis & aqua marina maceratis, deinde in album mustum cōiectis, compositi.

*Ἀσπιδάριον*, cicatrix oculorum altior magisque profunda: nam quæ superficialia est, *νεφέλη* dicitur.

*Ἀσπιδάριον*, dicitur à quibusdam *ὁ ἐλεφαντίας*, vt scripsit Arctæus Archigenes, vt habetur apud Aetium, *λεοντίας* appellauit.



*Ανδρ.* dicitur à quibusdam alterum genus cisthi, ex quo scilicet ladanium provenit.

*Ανθραξ*, siue *ανθραξ*, est frigida & humida cerebri intemperies à pituita frigidior & humidior cerebrum madefacere, febrem lentam, obliuionem, marcorē, inexpugnabilem pene dormiendi necessitatem inducens. Gignitur hoc vitium in capite in quo scilicet princeps animi pars residet, contrarium quodammodo secundum speciem phrenitidis, & ratiocinatrici animæ omnino noxā adfert. Ac humorem quidem à quo fit necesse est frigidum esse, quoniam memoria non nisi à frigiditate offendi potest, quem simul humidum esse oportet: alioqui non iam *ανθραξ*, sed *κατοχ* siue *κατάληψις* excitatur, medius inter phrenitidē & lethargum affectus: quem tamen Alexander Trallianus breuitati consulens, magisque *θεραπεύειν* quam *τις φυσιολογίας* studiosus, sub lethargo comprehendit, & non legitime lethargum appellat. Quamuis autem humor iste natura sua frigidus sit, attamen in lethargico affectu semper putrescit & incalcescit, febremque accendit, sed eam quidem omnino lentam non impensē acrem & erodentem, propterea quod cum natura talis humor est, tū in parte frigida putrescit. Consequitur autē illa lethargum, ut veteres medici prodidēre, quā in re (præter alias differentias) *ἀπὸ τοῦ καύρου ὁ ἀνθραξ* discrepat: febris enim *τὸν καύρου* solet præcedere, eaque vehementior. Itaque sopores qui per febrium circuitus *συμπνομαπικας* agrotos premunt, magis *καρποτικοί* sunt quam *ανθραξικοί*. Est enim *ὁ καύρος* velut symptoma quoddam: *ανθραξ* per se consistit & cerebri actiones labefacit. Verum quemadmodum sæpe ex morbo morbus nascitur, sic plarisque morbis lethargus succedit, sed sæpissime ex phrenitide impensus refrigerata nascitur: frequenter etiam in illum continens febris transit, morbi que alii permulti, quibus immodica vacuatio cōtigit. Sunt autem lethargicorum quædam differentię. Alii vnā continuamque habent lethargi accessionem, alii per circuitus quosdam in somnum ruunt & rursus reuocantur ut excitari audiant, moxque in somnum relabuntur. Sunt autem omnes obliuiosi, stupidi, mente capti, crebro oscitant & hiant, ac sæpe hiant ore persistunt, velut os claudere obliui. Urinam reddunt iumentorum lotio similem, ac sæpe in manus sumpta matula, eam se tenere non meminerunt.

*Ανθ.* obliuio. Est memoria abolita. Namque debilis, veluti torpor: deprauata autem, delirium memoriæ est. Causæ autem obliuionis plures statuntur, succus frigidus & pituitosus in cerebro collectus, & ipsius corpus refrigerans. Morbi in abscessum declinantes, pestilentia, senectus, medicamenta frigida vel sumpta vel capiti admota, ut habetur apud Galenum extremo libro 2. de sympt. causis.

*Ανθ.* lippitudo, fordes oculorum. Est pituita

crassior & semicecta circum oculos concrevens propter infirmitatem membrarum oculi, ut scripsit Galen. comment. 3. *εἰς τὸ πλεονέκτην*. Dicitur & *γλήμ*, Dorice *γλήμα*.

*Ανθραξ γλ.* Lemnia terra. Legitur in Lemno insula, tumulo quodam prope Hephestiada. Est terra pinguis, spissa, mollis, rubricæ colore, adstringens. De hac quæ scripta sunt à veteribus, videntur etiam nunc ei conuertere quæ hodie ad nos deferuntur. Eam Galenus scripsit esse pinguem mollemque, dum ait sacerdotem pingue lutum eo vsque desiccare, dum mollis cæra simillimum euadat. Spissam autem esse idem declarauit, dicens altera Samium ea leuiorem esse, cum Dioscorides ipsum altera spissum esse prodiderit. Rubricæ vero colore est, ut idem Galenus scribit: sed differt ab ea, quod hominis qui ipsam contrectat manus, ut rubrica, non inquinet. Tres eius differentię traduntur. Terra sacra, quam nemo, inquit, Galenus, attingit præter vinam sacerdotem: altera rubrica, qua fabri vtuntur: tertia, qua fullones, propterea quod extergit. Prima vtuntur medicis. Glutinosum quid habet, adstringit & citra mordacitatem resiccat. Hanc alii *μύκρον ανθραξ*, alii *σπέρμα ανθραξ* appellant, quod olim in ea Dianæ sigillum, quod creditur fuisse capræ effigies, imprimeretur: sicut hodie eius loco Turcicæ literæ ex quo eam quidam *σπέρμα ανθραξ*, hoc est sigillū capræ, appellauere, ut habetur apud Dioscor.

*Ανθραξ*, linamentum in longitudinem implicatum & oblongum, quod vulnere inditur auctore Celsō, vide *μετρί*.

*Ανθραξ*, torcular. Nomen est profectum primum ab Herophilo, deinde usurpatum ab anatomicis, quod designat locum quendam in capitis vertice vacuum, instat torcularis aut lacune, in quem coeuntēs in vertice meningis duplicationes, sanguine quasi in cisternam deducunt, atque inde velut ab arce quadam, omnibus subiectis partibus riuos mittunt, alios quidem in totum cerebellum, alios vero in partem anteriorem, tanquam vinum ē torculari promentes.

*Ανθραξ*, significat apud Hippocratem multis in locis *μετρίαν ανθραξ* ἢ *ανθραξ*, hoc est, moderatam dementia siue delirium: ut annotat Galenus initio comment. 3. in librū 3. *ἀπὸ τῆς ανθραξ*, similiter extremo libr. 3. *ἀπὸ τῆς ανθραξ*, per *ανθραξ* eos significas qui leuiter desipiunt. Verum Aetius *ανθραξ* videtur facere speciem quandam certam delirii, scribens libr. 6. *ανθραξ* differre *ἀπὸ τῆς μετρίαν*, quod *μετρίαν* consequentia dicit & facit, *ανθραξ* autem nullo consequio verba faciat, sed sine vlla connexionē ex hoc trāseat in aliud: quodque *μετρίαν* pueris præsertim & adolescentibus accidat, *ανθραξ* autem senibus. Oritur cerebro frigidiorē factō siue interna siue externa de causa.

*Ανθραξ*, dicitur à quibusdam centaurium minus, quando secundum fontes nascitur.

*Αλβανός πικρός.* pessus libaninus. celebris ad emolliendum scirrhosum vterum. Recipit ceræ albæ quadrantem. olei nardini, gleucini, suffini, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorum sextantem. cœsypi, butyri, nitri, singulorum drach. i i i i. has aliqui oui affati vitellum adiiciunt.

*Αλβανόν.* collyrii nomen est, cui Paulus lib. 3. cap. 22. vim tribuit leniendi, concoquendi & pus digerendi. Descriptio eius habetur apud eundem lib. 7. cap. 16. Censetur inter *επιλαλῆ καὶ ἀδολῆ*, hoc est, inter lenia & morfu carentia, collyria, itaque dicitur à thure quod recipit.

*Αλβανός.* thus. Arbor est Arabiæ familiaris & propria, sed à nullo descripta, nisi q̃ Theophrasto & Plinio placuit eam lauro similem esse. Ab ea manat lacryma pinguis quæ cuncta densatur, odorata, sacrificiis dicata, quam Græci *λευκανὴν*, Latini arboris sui nomine thus appellant. Masculū dicitur quod ex eo rotunditate guttæ pependit, vel cui testium species est, cum in hærente lacryma priore consequuta alia se miscuit, quod & mammosum à similitudine vocatur. Græci *καρυίας* & *ἀλμυρ* vocabant, sicut minores guttas *ὀφθαλμίας*. Micas autem thuris concussu elisas, mannam vocamus.

*Αλβανός.* rosmarinum. herba est duorum generum. vnum est secundum frugiferumque, cuius semen *καρχύκει* vocatur. folia scæniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucunde olentia: caulem cubitali altitudine aut maiorem, multis concanum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylis simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. radix thus redolet, candida prægrandis. nascitur in saxosis & asperis. Est & alterum genus quo coronarii vtuntur, quod ramos mittit tenues, & circa eos folia minora, densa, longa, exilia, subter incana, superne virentia, grauius odorata. Vtrumque excafactoria videtur præditum est.

*Αλβανός.* dicta est à quibusdam masculæ conyze radix.

*Αλβανός, τὸ ὄψος.* hoc est, humido, apud Hippocr.

*Αλβός.* stillario humoris ex oculis apud Hippoc. Dicitur *ἡ δὲ ἡλβός*, quod proprie *αἷζον*, hoc est, stillare, significat.

*Αλβόν, σκοτεινὸν καὶ μέλαν.* hoc est, obscurum & nigrum, apud Hippocr. vt annotat Erotianus.

*Αλβανὰ καὶ λευκὰ.* Sic dicta sunt (inquit Galenus) collyria *ἀδολῆ*, id est, mordacitatis expertia, quæque longiori tempore affectæ partis vitiatum humorem consumunt. Ea multorum sunt generum, quæ partim à Gal. lib. 4. *ἡ χυτὸς*, partim ab Aetio lib. 7. describuntur. Appellantur eadem & *λευκὰ*, ab albo colore, vt in quibus præualeat amyllum & terra Samia ac cerussa Rhodiaca. Est & vnum apud Paulū *Ἐγινετὰ*, sed falso inscriptū *λευκόν*. debet enim scribi *λευκόν*, constat enim eadē materia quā & alia omnia *λευκὰ* appellata.

præterea non reperias id nominis vnquam à medicis collyrio datum. Nam quod thure constat, non *λευκόν*, sed *ἡλβόν*, nuncupatur. Sed neque in eo thuris quicquam est.

*Αλβανόν.* sic quidā appellant syluestre asparagū. *Αλβανόν.* vocatur à Galenō vnus literæ mutatione quod alii *αλγανόν* dicunt.

*Αλβανόν.* dicitur à quibusdam *λευκὸς ἀλγανός*, authore Dioscoride, quod plurima nascatur in Libya.

*Αλγανόν.* vide in *Αλγανόν*.

*Αλγανός.* fuligo. dicitur & *ἀσβήλη*. Est terrestris tenuiumq; partium substantia summis caminorum parietibus adhærens, ex multo rerum pinguium vstarum halitu & vapore crescens. Vel, vt diffinit Galenus, est vapor terrestris, ex materiis immodice assis vtilisque. In hoc enim fuliginem differre scribit à fumo, quod fumus mistio sit ex terrestri atqueq; substantia materiis tantum semivitis. Cæterum differentie fuliginis multe sunt, pro varia materia ex qua colligitur: ex aciore enim & calidiore acior calidiorque fuligo, ex mitiore mitior. In vsu habitæ medicis fuerant, ex thure, terebinthina, myrrha, styrace, pice liquida, cedro. Omnis exicat, totaq; natura terrena est, tenuiumque partium, sed modicum ignei caloris retinet qui materiam aduffit. Ab eius similitudine etiam in nobis fuligo fuliginosusque humor aut vapor aut halitus dicitur, ex vitione proueniens, quā calidior quidem sicciorq; in temperies inducit, motus vero multus & vehemens, vigilie, ira, dolor, cura, inediaque augment. Eiusmodi excrementa medici *αλγανόν* vocarunt, parique ratione Hippocrates lib. 3. *τὸν ὀφθαλμὸν, ἡλβανόν αλγανόν* dixit, linguam halitibus iis fuliginosis obductam, nigramque in modum fuliginis.

*Αλγανόν, ἀσβήματα.* fuliginosa excrementa, de quibus superius in dictione *αλγανός*.

*Αλγανόν.* herba est cauliculum ferens anethi, geniculatum, tenuem & in circuitu folia ferula Campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora & longe magis diuisa: in cacumine masculium, in quo semen dependet nigrum, solidum, & oblongum, scæniculo proximum, gustanti acre, & aroma olens. radix candida, Heracleotici panacis (ex quo alii *πανάκειον*, alii *πανίκιον* eam vocarunt) similis, odorata. Radicis seminisque vis excafactoria & concoquens. Errant qui id essentent quod vulgo Leuisticū dicitur, quod potius legitimum hipposelinū est. Plurimū in Liguria nascitur, in monte Apennino Alpibus contermino: vnde nomen traxit. Panaces ab incolis non abs re appellatur, quoniā & radice & caule Heracleotico panaci simile sit, & viribus iisdem præditum. Apud Galenum pro eodem *λευκανόν*.

*Αλβέργυρος.* argenti spuma. medicamentum est metallicum non sponte quidem nascens, sed in secundis fornacibus emergens dum plumbum vel eius arena ab argento aut auro discernitur. *αλβέργυρος* Græci appellantur nomine ex argento & lapide composito, ortæ

rei duritiem designantes: Latini vero argenti spumam, nascentis rei naturam magis explicantes, & cocturæ potius euentum contemplari, quæ ex plumbo & argento eam veluti recrementum spumam redderet, non quod ex argento solo eiusmodi spuma prodeat (siquidem spuma hæc plumbi maxima pars est, quod totum partim in spumam, partim in plumbaginem vertitur, cum de ipso argento nihil fere depereat) sed quod ex plumbo & argento nata, fuerit apud antiquos frequentior quam vllum aliud lithargyri genus. Triplicem enim lithargyri differentiam Dioscorides exponit, vnam ex arena quam *μαλὸν δὲ πη*, vocant, in fornacibus excocta donec perfecte igni incandescat, & tota versa sit partim in hanc spumam, partim in plumbaginem: alteram ex mistura plumbi & argenti, quam *ἀργυρίτη* nominant: tertiam ex mistura plumbi & auri, omnium optimam, quæ *χρυσίτη* dicitur. Sunt autem hæc duo, non materiæ tantum, sed & colorum nomina: *ἀργυρίτη* enim dicitur non tam quod facta sit ex argento, quam quod candida sit in modum argenti: & similiter *χρυσίτη* tum quod ex auro prodierit, tum quod ab igne fulvum colorem contraxerit. Meminit præterea Plinius argenti spumæ quam *stereotida*, & alterius quam *pneumenen* appellat. Quibus tamen nominibus non alia quam quæ dicta est huius spumæ materia indicatur, sed spumæ tantum conformatio. Illa enim in solidiores massas, hæc in tubulos concreta intelligitur. Cæterum argenti spuma nec calida nec frigida nec humida manifestum est, sed exiguam habet siccandi vim in primo abscessu ab his quæ ad amussim media sunt inter humida & sicca: nec similiter vis eius est obstruere, sicut nec aperire: item nec abstergere nec inquinare, sed paululum à mediis ad crassius quodammodo recessit. Quamobrem in varios vsus administratur & miscetur emplastris, ut docet Gal. lib. 1. *ἡ τῶν*.

*Λιθίασις*, dicitur calculi generatio in vesica: quamvis ille etiam in renibus creari possit, nemo tamen *λιθίασιν* & *λιθιῶντι* vsurpauit nisi de iis quibus in vesica molestus est, urinæ suppressionibus, vesicæ & imi ventris distensionibus, ardoribus urinæ, & summis multis doloribus.

Dicitur tamen etiam *λιθίασις* in oculis morbus exteriori palpebrarum parte, in quo alba quædam & crassa callis aut lapillis similia apparent oculum pungentia, ut scribit *ἡ εἰσαγωγὴ* author, apud quem tamē incertum est partene palpebrarum exteriori, an potius interiori insideant.

*Λιθιδένδρον*, dicitur à quibusdam *πικρὸν ἔχον*, ut scribit Dioscor.

*Λιθιδίς*, petrosus, ossis nomen, sic dicitur pars ossis temporalis, protensis futuræ *τῆς λαμβανούσης* finibus terminata. In eo osse apophysis est *φυλοειδής*, quam Galenus *βελονοειδὴς* & *χαφιοειδὴς* appellat: & alia præterea quæ

meatum auditorium continet. Sic dicta sunt quod petra seu rupi videantur similia, non duritie modo, sed etiam specie.

*Λιθοκόλλα*, glutinum quo lapides coniunguntur, conflat, inquit Dioscorides, ex marmore, lapide Pario & taurino glutine.

*Λίθος μύλας*, lapis molaris apud Hippocratem, quem *κίχλας* appellant.

*Λιθόσπερμον*, foliis est oleæ longioribus & latioribus, mollioribus, (iacent humi quæ ab radice exiliunt) ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent. foliis longis inter quæ paruum semen, rotundum, cuius magnitudine, duritie lapidea. Nascitur in asperis & editis locis. Calidum est & tenuium partium. Nomen accepit à seminis duritia.

*Διμακίετροι λιμνῶδες καὶ καλὰ φύλοι*, *Θυμαλὶ πῖπτι*, hoc est, palustres, & confiti, & æquabiles loci, apud Hippocr. ut explicat Erotianus.

*Διμακίδεις*, *οἱ ὕγροι καὶ βοτάνῳ δεις*, hoc est, humidus & herbosus, apud Hippocr.

*Διμυήσιον*, dicitur à quibusdam centaurium tam magnum quàm minus, ut habetur apud Dioscoridem, quod propter lacus vbertim vtrumque profiliat.

*Διμυήσις*, sic dicitur *ἡ ἀδάκη*, ut scribit Aetius lib. 3. Dicitur & à nonnullis centaurium vtrumque, ut habetur apud Dioscor.

*Διμοκτονία*, *ἀσπίς παρὰ λῆς*, hoc est, abstinencia omnimoda, vel certe *ἡ ὅτι τῆς πόμας ὑποῦς διαίτα*: hoc est, victus ratio quæ fit solis portionibus: ut explicat Gal. Vsurpatur hoc nomen ab Hippocr. *ὡς καὶ ὅτι διαίτης ὀλίαν*.

*Διμός*, fames. Est, ut ait Galenus, *πείνη εἰς ἄκρον ἡ κῆρα δὲ ἀπειλὴ σίτης*, hoc est, extrema fames à ciborum penuria: siue ea voluntarie, siue præter voluntatem feratur. Idem ergo genere *λιμός* καὶ *πείνη*, solaque magnitudine differunt. Est enim *πείνη* modicæ suctionis in ventriculo sensus, *λιμός* vero magnæ & vehementis. Sic enim apud Hippocratem intelligitur tum eo aphorismo, quo scribit, *ἐκ λιμός, ἢ δὲ πείνη*: hoc est, ubi fames, laborandum non est: tum altero qui ita scriptus est, *πῶς σῶμαί τι πῖν ὕδατος τὰς σφύρας ἔχουσιν, δὲ λιμὸν ἐμπίπτειν* *λιμός* γὰρ ἐπὶ τῶν τὰ σῶμα τῶν. hoc est, corporibus humidis carnes habentibus, famem adhibere oportet. fames enim exiccat corpora. His enim aphorismis *ἀσπίς* proprie significat, sicut & lib. 2. *τῶν ὀπιδημάτων*, ubi ait, *ὡς ἂν ὁ ἀποροφάγοντες ὡς λιμὸν σκελετὸν ἀκρατίες ἐλθόντων*. hoc est, in Aeno qui legumina comedunt in fame, imbecillitate crurum laborant. Significat vero etiam apud Hippocratem vehementem & insatiabilem ciborum aviditatem, quæ *κυνώδης ὄρεξις* appellatur. ut aphor. 2. lib. 2. *λιμός γὰρ ὁρεξις λύει*. hoc est, famem thorexis soluit. Neque enim hæc secundum naturam, ut ait Galenus, fames est, sed morbosa, quam vini potus soluit.

*Διμοδέτης*, *μεγάλη ὄρεξις ἀπειρία*, apud Hippocratem, magna prorsus ciborum inopia. Erotianus.

*Ανίσχυς*. sic dicitur à quibusdam *ἡ χαμαίςχυς*, vt habetur apud Dioscoridem.

*Ανίσχυς*. Mercurialis. herba foliis ocimi, minoribus, helxinæ cognatis, ramulis duplici geniculorū nodo cinctis, alarum canis multis, fructu in foemina copioso, quandam racemorum speciem præbente: in mare è foliorum sinu pendere, paruo, rotundo, cebinis testiculis vna coherentibus, frutice dodrantali aut maiore. Vtraq; olerum modo manditur ad ciendam aluum, & illita discutit.

*Αἶνον*. linum. herba est vulgo nota, tenui dodrantalique aena, tamarisci foliis, flore cæruleo, specioso. Eius semen primo gradu calidum est, inter humectantiâ siccantiâque medium, ex quo propterea fiunt eclegmata extrahendis à pectore pituitis, finiendisq; tussibus cum melle ac pipere. Similiter & emplastrum quod ad Polletem refertur, ad pectoris affectiones & ad neruorum partium inflammationes ac dolores. Describitur ab Aetio lib. 1. §. cap. 14.

*Αἶνον* à quibusdam dici *πὸν κρίδεον κόκκον*, habetur apud Dioscor. quoniam frutex ipse, qui granum cnidium profert, similis satiuo lino sit.

*Αἶμα*, τὸ ἔλαιον, apud Hippocr. hoc est, oleum: in secundo de morbis mulierum.

*Αἱμαρὰ ἔμπλαστρον*. lenia emplastra. dicuntur apud Celsum lib. 5. cap. 19. quæ medicamentis pinguibus constant, differentia in eo *ὅτι ἢ δι' ὕπνινον*, quæ constant ex medicamentis nō pinguibus. Plura vtriusque generis exempla Celsus eo loco recenset.

*Αἱμαρὸν*. pingue. saporis genus est secundum Theophrastum, à Platone tamē de propriis linguæ sensoris differente prætermisum, quasi ad gustum nihil attineret. Sic autem dicitur quod vnguinis modo sublinat & replet, mitigatque exasperatas & quasi erosas linguæ partes, sed absque vlla delectatione. In hoc enim à dulci differt, quod manifesta cum suauitate idem præstat. Est vero fortassis & pingue ipsum dulce, aut certe ex dulcium genere sicut putarūt quidam qui pauciores quam octo gustus differentias esse cōtendunt. Succedit id saporis genus acerbū, vt scribit Gale. lib. 4. cap. 8. de simpl. medic. Cum enim corpus acerbū, quod terreum est & frigidum, tribus modis exoluatur, aut incalescens, aut humescens, aut vtrumq; simul perperiens: si incalescat duntaxat, solam acquireret dulcedinem, vt glādes & castaneæ: si tantum humescat, austerum euadet aut acidum. si vero pariter humescat & calefiat, humiditate quidem aquea in dulcedinem, aerea vero transibit in pinguedinem: sicut accidit tum oleæ tum fructibus omnibus ex quibus oleum conficitur, qui exacte pingues sunt. Nam id genus omnia vetustate prorsum efficiuntur pingua, quod in iis aquea quidē & excrementitia humiditas digeratur, propria vero à calore nativo elaboratur atque exacte concoquatur. Est autem

pingue idem cum oleoso, vt & dulce idem cum melleo. vt non intersit pingue *ἀν ἐλαίῳ* voces. Dicitur & *πῶν*, quanquam Galen. comment. 5. in lib. 6. *τῷ ὀπιδυμῶν*, videatur τὸ πῶν genus constituere *τὸ λιπαρὸν καὶ τὸ γλυκύος*: quo loco scribit Hippocrates τὸ χολαῖδες *ἐκ τῶ πῶνος* procreari.

*Αἱμαρὸν*, pinguitudo. Ex iis quæ ante *ἔλε* *τὸ λιπαρὸν* dicta sunt, satis patet esse gustabilem qualitatem, quæ sine voluptate aut ea longe minori quam dulcia exhibent, linguam linat & subungit. Valde affinis est dulcedini, de qua vide *γλυκύτης*. Dubito an apte Latine dici possit. Pinguēdo enim & pinguitudo nō sunt vera huius qualitatis nomina, sed potius substantiæ, quam *πυμελίω* appellant.

*Αἱμαρὸν*. herbae nomen cuius meminit Aetius, Alexandria sic vocante, quanquam aliqui, inquit, cnestron nominant, ad vlcera capitis manantia vehementer vtilis. Nec indicat is author qualis ea sit, vtrum eandē cum thymelæa cneorouē, an diuersam putarit.

*Αἶλεον*. lilium. Oleum autem ex eo aliqui *λίεον*, cum litera scribunt, aliqui vero *λίεον* sine v. vocatur autem non solum *κρίνον*, id est, lilium, sed susinum & anethinum. vt annotat Gal. *ἐν τοῖς γλυκύοις*. Frequentius *λίεον* per di-phthongum scribitur.

*Αἱμαρὸν*. libra. mensuræ & ponderis nomen fuit apud Romanos, sicut etiam nūc apud pharmacopolas, cuius ambiguitatem illi tollere volentes, libræ *μέτρον* ἢ *σάβμω*, id est, mensura aut pondo, adiciebant, sicut apud Plautum habetur: Et laserpitili libram pondo diluunt, & passim in libro Scribonii Largi quod tamen non perpetuo faciunt, libram tantum aliquando dicentes vbi de pondere agitur. Libra autem tam mensura quā pondus fuit vnciarum duodecim, quæ & ipsa similiter in ponderibus & mensuris usurpabatur, quarum etiam qui meminerunt auctores, vt omnem dubitationem tollerent, iis *σάβμω* ἢ *μέτρον* addiderunt, vt ex Galeno constare potest lib. 1. *τὸ πῶν καὶ ἡμῶν*, vbi albi emplastri compositionem enarrat: *καταργήσας μὲν καὶ ἡμῶν καὶ λίπας ἐκάτερον σάβμω*. διὸ δὲ λίπας ἐκαὶ μέτρον. hoc est, lithargyri quidem & cerussæ, libras vtriusq; ponderales, duas autem libras olei mensurales. Verum id scire oportet, libram & vnciam mensuralem, atque adeo mensuram omnem certam, atque immobilem semper fuisse, pondera autem rerum omnia fere varia esse, pro eorum quæ expenduntur varietate. Sciendum tamen est quod sicut Plinius pro mina vertit libram, quæ tamen quatuor drachmis est minor, ita Græci contra, nonnunquam centum drachmis libram non minam expriment, vbi quatuor drachmæ redundant. vnde Galenus lib. 6. *τὸ πῶν καὶ ἡμῶν* scribit: *πῶν μὲν δὲ αὐτὴ τῆς λίπας, ὁ δὲ δραχμὰς τεσσάρων αὐτῇ πῶν ὅτι αὐτὴ τῆς μινῆς*. hoc est, aliquando quidem pro libra, centū drachmas ipsi scribunt: aliquando vero pro mina. Et similiter eiusdē operis lib. 1.

lib. 1. ὅτι ἡ αὐτὴ ἀνελόγια σφίεται μηδὲν μῆγε δια-  
φύροντος, ἐπεὶ ταῖς ἑκατὸν δραχμαῖς ὅτι μεταλλικῇ,  
ἐπεὶ ταῖς ὀνείκω ἐξ αἰδύου κοπύλας τῷ ἐλαίου μνην-  
ται, hoc est, Itaque eadem proportio seruatur,  
cum parum a se inuicem diffideant, siue cē-  
tū illis drachmis metallicis, siue illis nona-  
ginta sex, duæ ὀλci corylæ misceantur. Sed  
quid dicemus ad Scribonium Largum? qui  
scribit: Quæ enim in librâ denarii octoginta  
quatuor apud nos, quot drachmæ apud  
Græcos incurrunt. Largus plaræque medi-  
camenta vertit ex Græcis, qui libræ vocabu-  
lo vsi sunt in suis compositionibus, diuiden-  
tes eam more Romano in duodecim vñci-  
as, vñciam vero in septem drachmas, dena-  
rios intelligentes. Itaque more illorum lo-  
quutus Scribonius videtur. alioqui libra  
drachmarum est sex & nonaginta.

Διχῶν, index, secundus est digitus pollicis pro-  
ximus. sic dicitur διχῶν τὸ νῆαν χαίνειν, id est,  
quod longo spatio à pollice distet. hæc au-  
tem distantia διχῶν ab eo digito appellatur,  
vt author est Pollux. Alio nomine δεικνὸς  
vocatur, quod eo indicamus, exprobramus,  
minamur. Salutaris olim dictus est à Lati-  
nis, vel quod nisi visa & indicata salutemur,  
vel quia apud priscos eo digito ori admotò  
silentium, quo nihil ad salutem melius indi-  
cebatur.

Διχῶν, metiſura est apud Græcos qua rerum in-  
terualla metiuntur. Constat autem eo spatio  
quod inter pollicem & indicem est, cum quam  
maxime fieri potest distenduntur. Inquit e-  
nim Pollux: ἐν τῷ μέγαν δακτυλον τῷ διχῶν ὡς  
πέντας, (i. μέγας) τὸ μέτρον διχῶν, hoc est, si verò  
magnum digitum indici opponens metia-  
ris, metiſura διχῶν dicetur. Est autem hæc  
metiſura duorum palmorum & dimidii, si-  
ue decem digitorum.

Διός. πάλαιος, hoc est perfecte, apud Hippocr. vt  
annotauit Erotianus.

Δόλιον, ὁ δόλιχος, qui & δόλος vocatur.

Δόλος, una aurii pars & carnosâ, quam fibram  
Gaza interpretatur apud Aristotelem lib. 1.  
cap. 11. de historia animalium. vide ẽs.

Dicitur & δόλος ὁ δόλιχος, vt placer Aetio,  
quasi siliqua, quod solus leguminum cum  
theis suis mandarum in patinis.

Δόλιος, τὸ λευκὸν τὸ ὀφθαλμῶν, hoc est album oculi,  
quod etiam alio nomine ὀφθαλμῶν dicitur &  
λευκὸν ὀφθαλμῶν.

Δόλιος, sic dicti sunt medici qui ratione & me-  
thodo propria morborum remedia inuesti-  
gabant. Hi medii quodammodo fuerunt  
inter Methodicos & Empiricos, & ab vtriſ-  
que multum diuersi: ab his quidem, quod  
non solam experientiam, sed præterea ratio-  
nem in curandis morbis adhiberent, ab illis  
vero quod non tantum quæ cõmunia sunt,  
sed etiam propria consideranda censerent,  
nihilque omnino negligerent quod ad cu-  
rationem facere videretur. Iidem etiam δό-  
λιμαῖοι dicti, quorum princeps fuit Hippo-  
crates. vide δόλιμαῖοι.

Δόλιος, herba foliis porri similib. latiusculis &

modice rubentibus, ad radicem plurimis &  
in terram conuexis, paucis in caule. flores in  
eo cœu galericulis habet, comicis personis  
similes parua exerentibus linguam, nigros:  
siquidẽ minutulis iis hiantibus albugo quæ-  
dã inferiore labro prominens specie linguæ  
repræsentat. Semen in inuolucro clausum,  
cum primò exit triangulum, simile cuspidi,  
vnde ducta est & λωγίπιδος appellatio. Radi-  
ces Gallicæ pastinacæ. Dicta quondam est à  
Romanis Veneria aut lanceola. Ab ea alte-  
ra lonchitis est quam asperam cognominat,  
Romani longinam aut colubrinam, foliis  
scolopendrii, scabioribus, amplioribus, di-  
uisuris quoque maioribus: vulneraria her-  
ba, quæ plagis inflammationes abigit. Pota  
cum aceto lienem absūmit, crediturque à  
multis esse scolopendria.

Δόλιος, pestilentia. Est morbus epidemius, con-  
tagiosus & omnium perniciosissimus. Est  
enim communis & è communi causa natus,  
non tamen patrius & familiaris, sed potius  
aduenticus. Verum contagiosus est & præ-  
sentis periculi, vt qui maligna & venenata  
putredine vitalem cordis facultatem sub-  
stantiamque pessundet. Continens eius  
causa putredo est, tam spirituum quam hu-  
morum, non vulgaris quidem aliqua, &  
qualem reliquæ febres habere solent, sed  
venenata qualitate imbuta. Putredinem  
excitat interdum obstructio sola, interdum  
sine obstructione aer tota sua substantia pu-  
tris & corruptus, sed maxime quidem si ad-  
iuncta sit obstructio. Sed vtrobiq; acce-  
dere oportet causam illam sine qua non;  
hoc est, afficiendi corporis præparationem,  
ex plethora vel cacochymia cum ocio, cibo  
& potu largo, crasso, lento, Venere immodi-  
ca & intempestiua, vnde & cruditates plu-  
rimæ & obstructions cumulantur. Putre-  
do hæc humorum pestilentia continens  
causa, sæpe in nobis nascitur per se, sæpe  
ab aere vel calido humido, vel magis pesti-  
lente & putri. Putret autem aer tum qui  
conclusus non diffilatur, tum qui inquinat-  
ur ab halitibus & vaporibus putridis siue  
illi ex cloacis, barathris & specubus, siue ex  
lacubus & stagnis non motis nec diffilatis,  
siue à mortuorum animalium insepulcis ca-  
daucribus excitentur, siue vllam aliam ob-  
causam. An vero & corporum cœlestium  
influxus quidam (vt astrologi loquuntur)  
pestilentem reddant aerem, dubitare mal-  
lim quam credere, præsertim cum medico  
sensus magis sequenti, aeris mutationes pro  
omni sint Astrologia, vt ex Hippocrate con-  
iicere licet lib. 3. aphor. initio prognost. &  
lib. de aere, locis & aquis. tamen ibidem;  
vt locis aliquot aliis, quorundam syderum  
in signum ortus & occasus obseruari vo-  
luit, & post eum Galenus & Aetius lib.  
3. quod circa hos magnæ in aere mutatio-  
nes fiant. Nulla tamen ex his quas superior  
ætas commemorat, in pestilentem fuit con-  
ditionem. Porro aer ille siue putris, siue im-



moderate calidus & humidus, siue alio quouis modo vitiosus, inspirando attractus & in cerebrum cordisque ventriculum sinistrum receptus, in corpore excrementitio & perspiratu carenre putredinis occasionem ilico præbet spiritui primum vitali & animali, deinde & humoribus contentis in vitroque cordis ventriculo, à quibus in reliquum corpus vitium facile serpit. Hinc grauissima illa pestilentia symptomata quæ Rufus recenset, deliria, biliosi vomitus, præcordiorum contentiones, labores, sudores copiosi, extremorum frigiditas, alui profluvia biliosa, tenuia & flatulenta, vix aquosæ, tenues, biliosæ, nigra, in quibus pessima sunt quæ tum subsident, tum pendent, pectoris ardor, lingua torrida, siticulosa, remissa, vigilia, conuulsiones, syncopæ, & alia multa deterrima, pro natura corporum pestilentia affectorum & reliquis circumstantiis à quibus symptomata exoriri varia solent. Porro λοιμὸν dicere an λοιμώδῃ πυρετῷ siue νόσῳ, nihil interest. Non enim aliud febris pestilens est quam ipsa pestilentia.

Λοιμώδης πυρετός. pestilens febris. Idem quod λοιμός. de quo supra.

Λόπημος. (Ι. βάλαμος) castanea. vt patet ex Galeno lib. 2. cap. 38. de aliment. Eadem dicitur ὀρ-  
θην βάλαμος: à Nicandro λόπμον κάρυον.

Λόπος, significat apud Hippocr. alutæ extimam partem quæ interiōri fere semper durior densiorque est. Erotianus φλοῖον καὶ λεπτόμα interpretatur.

Λόρδωσις. vitium spinæ, cum eius vertebræ loco suo motæ sunt, & in priorē siue anteriorem partem conuersæ. Vel inclinatio seu incuruatio in anteriora, cum homo vitiosa dorsi spina semper capite prono est & cernuo. Sunt autem in spina hæc vitia, λόρδωσις, κύφωσις, σκολίωσις, σείσις, vt author est Galen. comment. 3. εἰς τὸ πρὸς ἀρθρῶν. Erotianus apud Hippocr. λόρδωσιν interpretatur τὸ ἀποσιμωμένον καὶ ἐκείνην τῇ κατὰ.

Λοῦν. significat apud Hippocr. non solum τὸ λούειν, hoc est lauare, sed etiam τὸ αἰνᾶν, hoc est aspergere, vt scribit Galen. ἐν ταῖς γλώσσαις. qui λοῦξ quoque easdem habere significationes apud eundem tradit.

Λουτρον. nomen est medicamenti ophthalmici quod à Hermiam authorem refertur, cuius descriptio habetur apud Galenum lib. 4. ὅβ' καὶ πέπυς.

Λοφία. sic proprio nomine dicitur prima dorsi vertebra, sub atlante proxima: vocatur & à quibusdam λοφάδια.

Λόχεια. τὰ. dicuntur omnia quæ à puerpera post fœtum & secundas exeunt. Ea Gaza apud Aristotelem purgamenta vertit. Sunt autem reuera τὰ κατὰ μίμια, à quibus tamen sola ratione differunt, quod hæc ante partum, illa post partum sic appellantur.

Λυβιανὰ κολούεα. sæpe occurrit p. Λυβιανὰ, quod vide supra. Sic Λυβιανὸν pro Διουκόν.

Λυγισμός. artuum contractio, contortio, luxatio. Est enim λυγίσεν idē quod σπέρφεν, κάμπτειν

καλίσεν, hoc est inuerrere, flectere, curuare. vt in ea voce Dioscorides agens πρὸς τὸ ἀρ-  
κεῖν.

Λυγκῆς. collyrii nomen callos & cicatrices oculorum exterentis, visumque exacuentis. Descriptio eius habetur apud Galenum lib. 4. ὅβ' καὶ πέπυς. Habetur & apud Paulum lib. 7. cap. 16. ex quo Galeni descriptio emendari debet.

Λυγκύεον. linguriū. idem plane quod τὸ ἡλεκτρον, id est succinum. sic autem dictum est, quod aliqui, cuius opinionis Demonstratum authorem ferunt, crediderint succinum esse glaciaram lyncis urinam. Multi tamen ex Arabibus videtur à succino distinxisse. Sunt vero qui dicant lingurium dictum esse quasi Ligurium, quod Theophrastus in libello de lapidibus inscripto in Liguria effodi prodiderit, & Strabo Ligures lingurio abundare dicat.

Λυγρός. ὁ λυγρός. apud Hippocratem, teste Erotiano. Apud Galen. vero comment. 4. εἰς τὸ πρὸς διαίτης ὀξείων, vbi legitur, πρὸς λυγρὰς εἰσάγει ὁ λυγρὸς νομαίzen, pro λυγρὸς forsan scribendum λυγρὸς, πρὸς τὸ λυγίσεν.

Λυγρώδης πυρετός. singultuosa febris. Sic apud Hippocratem dicitur authore Galeno comment. 4. in lib. πρὸς διαίτης ὀξείων, quæ à principio ad crism̄ vsque adiunctum habet singultum, sicut & ἀσπασμῶδες πύκνός, hoc est conuulsoria passio, apud authorem prothetici affectus dicitur qui ab initio aut non multo postquam fieri cœperit, conuulsionem accersit. Cui enim circa crism̄ tantum singultus oritur, qui acris & mordacis humoris vomitione statim leuatur, ea nequaquā singultuosa appellari debet. Quæ autem huius febris causa esse possit, intelliges si legeris quæ mox de singultu dicentur. Idem & λυγρώδης dicitur ab eodem. vt paulo ante, ἐκείνην ἀσπασμῶδης γίγνεται ἡ λυγρώδης. Illud à λυγρὸς hoc à λυγρὸς deriuatum, vnum idem significantibus.

Λυγίσεν. apud Hippocr. Contorquere, implicare, inflectere. ἀπὸ ὅβ' λυγίσεν: propter eorum flexibiliterem.

Λυγμός ἢ

Λυγξ. singultus. Est motus conuulsivus ventriculi vitium quod tunicis suis inest, expellere tentantis. Hic motus quidem est facultatis expultricis, sensu tamen percipitur & cum motu voluntario communicat, ideoq; à Galeno inter symptomata facultatis siue actionis animalis morticis numeratur. Ac quantum sit naturæ solius opus, hoc est facultatis corpus regentis, vt horror, sternutamentum, ruffis, oscitatio, vomitus & ructus, atamen quia causa aliqua præter naturam est quæ naturam ad singultum excitat atque compellit, ob id symptomatis præter naturam annumeratur, vt & ea de quibus supra dictum est, quæ causam pariter aliquā habent morbiferam, per quam natura ad eiusmodi motus cogitur. Cum autem alij sint in ventriculo deprauati moti, vt ructus, nausea, vomitus,

mitus, ab his hoc vno maxime differt singultus, quod illa nihil conuulsioni simile habeant, hic vero conuulsioni, persimilis sit. Vt enim pars quæ conuellitur, ad principium suum contrahitur, idque duabus omnino de causis, inanitione vel repletionem patitur, ita ventriculus singultiendo contrahitur, & ab iisdem, vt scripsit Hippocr. causis quibus & conuulsio, excitatur. Veruntamen singultum conuulsionem dicere non licet, quoniam hæc solis accidit musculis (ventriculus autem nec ipse musculus est, nec os eius) sed veluti conuulsionem aut verius motum conuulsium. Est autem, vt scribit Gal. facultatis tum reentricis tum expultricis commune symptoma: illius quidem quod ventriculus, dum singultit, prauæ & non naturaliter cibos complectitur: illius vero propterea quod ad ipsam primum propriæque pertinet motus ille prauus, dum cupit quod molestum est expellere. Ex quibus Galeni verbis intelligimus singultum motum esse non simplicem, sed ex duobus contrariis compositum, dilatatione scilicet & constrictione. Sicut enim fieri assolet in omnibus functionibus corporis, quæ magno conatu viribusque egent, ita in singultu ventriculus quo valentius possit vitium ad se excutere, primum se dilatat (quod dum agit, cibos deserit, nec naturaliter complectitur) deinde velut collectis viribus seipsum adstringit, magnaue totius sui corporis compressione singultum edit. Ex quibus apparet non eundem esse vomitionibus & singultientibus motum, propterea quod nec idem sit affectus. Quippe in vomitionibus ea quæ in ventriculi capacitate sunt reiciuntur, non magno adeo conatu: in singultu vero, quæ in ipso ventriculi sunt corpore, simili tum affectu tum motu, qualem ii perpetiuntur qui ex intemperie tussunt, omnibus nimirum ventriculi partibus id quod se contristat expellentibus. Est enim singultus virtutis expultricis validus motus; sicut & sterutamentum & tussis, vomitusque multo validior, quod nisi magna vi eius causa quæ penitus eius tunicis oritur; infedit excuti non possit, quemadmodum Galenus in comm. aphor. 39. lib. 5. demonstrauit, etiam si contra visum sit Auicennæ. Cæterum quum singultus affectio ventriculi esse dicitur, non est ita intelligendum quasi ad totum ventriculum semper pertineat, cum sæpe os eius duntaxat afficiatur: aut solus etiã œsophagus qua proxime stomachum attingit. Siquidem horum trium corporum affectione singultum excitari proditum à Galeno fuisse video, ventriculi, stomachi & œsophagi, conante semper natura quod penitus iis in partibus impactum est, altiusque in earum tunicis infedit, exprimere atque abigere. Hæc quidem fuit Galeni de singultu sententia, in quam omnes postea medici descenderunt. An vero eadem Hippocrati fuerit, equidem dubito. Ille namque singul-

tum non motum conuulsium, non veluti conuulsionem, sed conuulsionem esse existimauit, sicut Galen. comment. in aphor. 4. lib. 5. annotauit. Neque vero causa vlla est, quæ nos ab ea opinione reuocare debeat. Cum enim ventriculus atque os eius maxime magnorum nervorum sit particeps, non quo ille quidem moueatur, sed exquisitissime sentiat, si in eos causa aliqua præter naturam inciderit, quæ in aliis partibus nervos ita offendit, vt ad suum principium sese recipere cogantur, eadem in stomacho talem affectionem excitare potest, quæ & in aliis partibus excitatur. Est enim conuulsio omnium partium in quas nervi descendunt, propria, quæ vt in quibusdam partibus peculiariter sortitur nomina (in oculo enim *σπασμὸς*; in mandibula *τετράς*; in ore *κρίσις*; in pudendo *ἐκτρεχία* appellatur) sic in ventriculo *σύνελξις* vocata fuit. Feruntur autem illi in stomachum atque ventriculum à sexta coniugatione, insignes, & sicut scripsit Hippocr. lib. 2. epidemion breuissimi. Hi quamuis ventriculum aut stomachum non moueant, quia tamē à cerebro (quod vt sensus, sic etiam motus principium est) oriuntur, à causa præter naturam offensi, in principium suum recurrere reuertique possunt, & secum partem in quam inserti sunt, conuellere. Neque enim ea coniugatio motionis expers est, sed multis diffusis ramulis in aliquos colli & laryngis & sterni & costarum musculos; deinde in laryngem recurrens iis partibus sensum motumque conciliat. Quoties igitur tale iis nervis qui ad stomachum à cerebro recta feruntur, vitium infederit, quale in aliis partibus conuulsionis excitandæ vim habet, id in stomacho proculdubio conuulsionem pariter inducet, quam proprio nomine singultum omnes appellarunt. Et reuera si omnes omnium tam particularium quam vniuersalium conuulsionum causas; siue generales, siue speciales contemplerur; eadem singultus etiam causæ videbuntur. De illis quidem diserte pronunciauit Hippocrates aphor. 39. lib. 6. conuulsionem scribens fieri ex repletionem, vel inanitionem, atque eodem modo singultum. Porro inanitionis nomine summam siccitatem denotari Galen. nos docuit, cuiusmodi ea est quam febres ardentes, purgationes, sanguinis excretiones, vigilæ immodicæ inuenerunt, quæque etiam chordas potest abrumpere: Repletionis autem nomine non aliud hic intelligendum pure, quam humiditatem quandam superfluum atque à natura alienam. Ea namque siccitati siue inanitioni reuera opposita est. Quo fit vt eo aphorismo non aliud velit Hippocr. quam statuerē omnem conuulsionem fieri vel ab aliquo humore vitioso, vel ab inanitione summaque siccitate. Repletio autem gemina est eodem Galeno authore, vna quidem ad vasa; altera vero ad vires: illa quidem cum nervi adeo replentur, vt necessario contrahan-

tur brevioresque fiant: hæc vero cum ipsi humore grauantur, non multo quidem sed vitiosa qualitate præditi, quem cum auerfentur & excutere cupiant ab eo demorfi, puncti & lacerati, in principium suum recurrunt. Itaque repletionis nomine non summam modo plenitudinem, quæ ad vasa dicitur, Hippocrates intellexit, verum acré etiam aut serosum aut medicatum humorem nervos mordentem, à quo conuulsiones sapissime oriri nemo est in arte medica vel reuiter institutus atque versatus qui dubitet. Proinde miror quid Galenus venerit in mentem, dum ista scriberet libro 8. *Ἐν ὅτῳ*, his verbis: Hippocrates quidem conuulsionem fieri dicit ex repletionem & euacuationem, & additum est ad aphorismum ferme in omnibus exemplaribus, Sicut autem & singultus. Ego vero in conuulsione (inquit idem) tertiam aliquam causam supra euacuationem & repletionem nondum reperi. Singultum etiam sine his fieri video, ac tribus humoribus aut serosis & medicatis stomachum mordentibus, quos ubi vomitu reiecerint, statim singultu liberantur. Quin & multi deuorato pharmaco ex tribus piperis generibus constante, si statim vinum insuperbibant, omnino singultiunt, ex quorum numero etiam ego sum. Amplius autem & cibo in mordacem qualitatem corrupto aliqui singultiunt, & quod à vomitu statim liberantur, omnibus notum est. Quidam etiam ex rigore oris ventris singultiunt. Verum pueros maxime frequenter singultire contingit, tum ob corruptionem alimenti in ventre, tum ob partis frigiditatem. An vero & ob nimiam euacuationem fiat singultus, veluti etiam conuulsio, dignum consideratione est. Hæc quidem Galenus, parum memor eorum quæ locis prope infinitis docuit, ut conuulsiones interdum fieri demorso ore ventriculi ab acri aliquo humore: grammaticum quendam conuelli solitum aura quadam tenui à crure sursum ascendente: ab humore aut semine putri in vtero cum distentiones nervorum tum conuulsiones oriri, & à veneno similiter mole quidem exigua, sed facultate maximo quem venenata animalia morfu infuderint. Sunt autem hæc causæ prorsus eadem cum tertiis illis causis, à quibus præter inanitionem atque repletionem singultum fieri Galenus paulo superscriptis se observasse. Sed & ex frigore conuulsiones non minus quam singultus oriuntur. Id quod docet Hippocr. aphor. 17. lib. 5. & 18. atque etiam ipse Galenus prodidit comm. 3. in prognostica agens de conuulsione, quam scribit etiam sine febre in forti admodum frigore enasci. Hæc quidem qui diligentius expendierit, certo intelliget verissimam esse Hippocratis sententiam de causis conuulsionis atque singultus, & repletionem intelligendam non eam plenitudinem modo quæ ad vasa est, sed omnem vitiosi humoris

affluxum à quo nervi offendi possunt. Iam quod pertinet ad alias causas, omnes quidem sunt singultui atque conuulsioni communes adeo ut quæcunque de conuulsione dicta sunt, etiam de singultu commode intelligantur. Cum enim singultus genere conuulsio sit, eandem quam & illa habet tum causam, tum generationem, tum etiam significationem. Itaque ut conuulsio ex helleboro, ex vulnere, ex sanguinis multo profluvio, ex superflua purgatione, ex vomitu, ex ileo, ex iecinoris inflammatione mala est, ita & singultus qui talibus de causis ortus erit, quemadmodum ex aphorismis Hippocratis & Galeni in eos commentariis perspicere licet. Siquidem symptomaticus est omnis eiusmodi singultus, in aliis quidem summam siccitatem, in aliis vero humoris vitium cum magna stomachi & nervorum qui ad ipsum pertinent imbecillitate. A quo quidem symptomate *λυσσάδην πυρεπὴν*, hoc est, singultuosam febrem, ab Hippocrate dicta fuisse legimus, sicut supra à nobis ostensum est. Fit autem singultus alias per ventriculi *ἰδιονόθειαν*, alias vero per *σπυρπύθειαν*: ut in meningibus inflammatione laborantibus, aut intestinis, aut vtero, aut aliis quæ vspiam sint nervosis partibus, aut hepate inflammato provenit. Sed cum maxima ex parte singultus omnis præter naturam sit, & malus aut lethalis, fieri tamen potest aliquando criticus, signis concoctionis manifesto iam apparentibus, crismique vomitione mox futuram indicare, quod stomacho offenso natura in superiorem partem ducere videatur.

*Ἀλγύς*. vitex. Est frutex in arborem assurgens, qui ut plurimum nascitur in fluminum ripis ac torrentium alueis, ramis prælongis, fractu pernicacibus, foliis oliuæ, sed mollioribus. Duo eius genera habentur: vnum album florem mittit cum purpureo, alterum tantum purpureum, & semen instar piperis. Calefacit & siccatur tertio ordine. Tenuium est partium, flatusque ideo discutit. appellatur alio nomine *ἀλγύς*, quasi castus. Creditur enim conferre ad castitatem non modo comanducatus potusque, verum etiam in cubile substratus. Dicitur autem *ἀλγύς* à viminum & vincendi usu. Id enim Græcis *ἀλγύς* significat, quanquam *ἀλγύς* vox est communis omnibus, quibus in rustico opere ad vincula utimur: quales salices omnes sunt, geniste, erice, vlni, in quarum genere vitex etiam numeratur, ideoque communi illa appellatione etiam nominatur.

*Δυνασθραπία*, siue *ἡ δυνασθραπία*. species est melancholiz, qua qui laborant luporum de more noctu domo egrediuntur, & donec illucescat circa mortuorum sepulchra versantur (quo loco visum mihi est annotare legendum esse apud Aetium, *καὶ μετὰ τὴν ἡμέραν ἀπὸ τῶν μνημάτων μάλιστα διαγύουσι*, hoc est, & in diem usque circa monumenta mortuorum versantur. ut patet ex Paulo, qui pro eo dixit *διαγύουσι*)

Sunt

Sunt autem eorum notæ istæ: facies pallida, oculi sicci & canī, visus hebes, lingua siccissima, saliuā in ore nulla, sitis immodica, tibię perpetuo exulceratæ propter frequentes calūs: atque vt canes mordent, ex quo arbitror morbum ipsum etiam *κυναιθροπία* siue *κυναιθροπία* vocatum fuisse veteribus. Is traditur mense potissimum Februariū inuadere.

*Αυχάν, ή κυναιθροπία*. morbus scilicet supra descriptus.

*Αΐνιον*. arbor est spinosa, ramis trium cubitorum aut longioribus, foliis buxi, densis, fructu piperis, nigro, læui, amaro densoque, cortice pallido, non dissimili lycio madafacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia & Lycia. Dicitur alio nomine *πυξιδανθα*, quasi dixeris buxeam spinam: in officinis lycium dicitur. Facultatis est exicatoriæ, constatque diuersis substantiis, vna quidem tenuium partium digerente & calida, altera terrestri & frigida, ex qua adstringendi vim habet. Paratur ex eo medicamentum quod *λίμιον* dicitur. id non est aliud quam succus eius coctione expressus extractusque. Extrahendi autem eam fuisse rationem Dioscorides docet: Coquebantur in aqua tursi tami cum radicibus æreo vase, sed ante permultos dies maceratum abiectis lignis iterum liquor, donec mellis crassitudo fieret. Alii vero, vt idem ait, lycium faciebat semine eius expresso & in solaro. Vim habebat digerendi & desiccandi non parua, nempe secundo ordine, præterea abstergendi & contrahendi. Optimum erat quod vri poterat, restinctumque rubentem spumam ostendebat, glebis extrinsecus nigris, intus cum fractum erat, rufis odore minime viroso, cum amaritudine adstringens crocino colore, cuiusmodi Indicum erat cæteris præstantius.

*Αυκοκτόν*. sic dicebatur *τὸ αὐκτόν*, quod lupos qui id forte in cibo obiectum deuoratint interficiat.

*Αΐνος*. nomen est pastilli desiccantis & adstringentis, ad dysentericos comparati. Descriptio habetur apud Aetium lib. 9. Dioscor. etiam author est sic à quibusdam araneum vocari, & ab aliis *δακόν*.

*Αυκοσινάριον*. sic dictum est à quibusdam *τὸ σινάριον* dicitur, sic habetur apud Dioscoridem.

*Αΐνοψ*. secundum Dioscor. vel *λίνοψ*, vt habetur apud Galen. & Paulum, est quarta anchusæ species, de qua vide *αρχύση*.

*Αΐμας: καθαρίμας*. apud Hippocr. vt interpretatur Erotianus: hoc est, purgamenta.

*Αυτὰς*. nuda & arida loca apud Hippocr. vt explicat Galen. *ἐν ταῖς γλίσσταις*.

*Αΐρον*. sic à quibusdam dicitur *τὸ αἶμα* siue *δαμάριον*, vt habetur apud Dioscor.

*Αυσιμάχον* siue *Αυσιμάχον βοτάνη* frutex est caules emittens cubitales aut altiores, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim foliis

tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus, flore rufo aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. sanguinis reiectione supprimit. Superantem habet adstrictoriam facultatem.

*Αυσάνιον*. est nomen *τῆς αὐτῆς φαρμάκου*, cuius descriptio est apud Paulum lib. 7. cap. 19.

*Αὐσις*. dicuntur apud Hippocr. interualla quibus articuli ab inuicem disiuncti sunt, vt annotat Galenus *ἐν ταῖς γλίσσταις*.

*Αῦσα*. rabies, proprie quidem de canibus dicitur, significat furorem illum in quem sub Canicula maxime aguntur, omnium animalium soli, scribit Galen. lib. 6. de locis affectis, differens de vteri affectionibus. Transfertur tamen cum ad homines tū ad reliqua animalia, quæ per contagionem ex rabidi canis morfu mente abalienantur & furorem pariter animo concipiunt. Id quod vt plurimum enenit die post canis morfum quadragesimo, quemadmodum Dioscor. lib. 6. copiosissime explicauit. Eam affectionem in homine ita contractam à venenata quadam qualitate, non *μανία*, non *φρενίδα*, sed *λύσσα* perinde atque in carne medici appellarunt. obseruatum autem fuit tantam esse eius veneni perniciem, vt non morfu modo, verum solo etiam contactu rabidi canis saliuā rabiem excitare possit.

*Αυσάντης, ή θυροσπινθ*, hoc est, furibundum, apud Hippocr.

*Αὐτὸν*. sic à quibusdam dictum esse *τὸ αὐτὸν* dicitur, Dioscorides prodidit.

*Αυχνίον*. nomen est medicamenti ad inunctionem oculorum. Describitur à Galeno lib. 4. *τῆς καὶ τῆς*.

*Αυχνίς*. herba est duum generum, apud Dioscoridem, vna dicitur *εὐφανωμάχην*, hoc est, coronaria, Romani genicularem siue ballariam vocant, florem habens violæ albae magnitudine, sed purpureum, neque vnquam excedens quinque folia: Plinius quodam loco flammeam cognominat, alibi rosam Græcam. Altera autem *αρχία*, hoc est, syluestris, vocatur, omni ex parte saliuæ similis, excepto natali solo: cum enim illa in humidis locis proueniat, hæc in aridis nascitur. Calidum est & siccum eius semen tertio quodammodo ordine.

*Αυχνίς αρχία*. dicta est à quibusdam *τὸ ὑπὸ γλίσσῃ*, sicut habetur apud Dioscor.

*Αυχνίς*. tertia species *τῆς φλεμίδων*, hoc est, verbasci: foliis ternis aut cum plurimum quaternis, crassis, pinguibus, ad lucernarum lumina aptis: qua de causa *θρυβή* à quibusdam dicta est.

*Αὐάδες*. insanies. vt explicat Galenus *ἐν ταῖς γλίσσταις*.

*Αωπμίτης*. species loci satiuæ, semine simillimo porri.

*Αωπ*. & arboris & herbae nomen est. Arbor quidem ipsa proprie valde magna est, foliis per ambitum serratis, fructa magnitudine fabæ, colore vario, vuarum modo maturescere, prædulci suau, & stomacho salubri.

Numerosa est in Pharide insula, ideo Loto-phagia vocata. Herba autem triplex à Dioscoride statuitur, sativa, sylvestris, Ægyptia. Sativa nascitur in viridariis, caule tantum foliata. Sylvestris, quam Romani trifolium minus vocant, assurgit caule bicubitali aut etiam altiore, alis pluribus concavo, foliis loti trifoliz, semine fœnigræci, minutiorē multo, medicati gustus. Ægyptia pegulia-

ris est Ægypto, campis flumine inundatis proveniens, caule fabæ, flore parvo & candido simili hordeo, qui sole oriente patescit, traditur & occidente comprimi. Calycem habet papaveris capiti similem, in quo grana ceu milii, ex quibus siccatis fiunt in Ægypto panes.

*καὶ τὸ μέγας*, dictus est à quibusdam ὁ κρόνος, ut habetur apud Dioscor.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

### T O M



*Μάγμα*. Galenus apud Hippocratem interpretatur *μα, π, α, μάγμα & φ, ε, μα, καὶ τὸ χειροποίητον μάγδαλιαν*, hoc est, vnguenti faciem, & materiam, & purgamentum magnum.

*Μάγμα*, proprie quidem vnguenti fac, quæ expressa reliqua liquidiori materia relinquitur. Ab eius vero similitudine ipsum vnguentum & spissamentum omne, pauco liquore subactum, ut nō diffuset, etiam *μάγμα* dicitur. sic *μάγμα ἡδύχρον* ab Andromacho primum, deinde à reliquis medicis dictum est, non ab ullo quidem expressum, sed per se ita comparatum.

*Μάγος*, emplastri nomen quod quidem etiam *ἡφαίστιος* nuncuparunt, egregium prorsus ad suas & fistulas conglutinandas & resicandas, ad hæc ad hydropicos & aquosum rami- cem. Descriptio eius habetur apud Aetium lib. 10. cap. 24.

*Μαγύδαεις*, caulis silphii, ut scripsit Galenus quamvis & semen eodem nomine aliquibus dicatur: aliis autem radix. Verum quibusdam sic libuit appellari alterum laterpitii genus quod in Libia nascitur; radice silphio simili, minus crassum minusque vehemens, fungosum, sine succo, cui sit natura eadem quæ silphio.

*Μαδάρσις* ἢ

*Μαδάρσις*, est defluuium pilorum ex palpebris, alio nomine *μυλφοσις* dicitur. fit ab acri fluxione.

*Μαδελαν*, dicitur hoc nomine à quibusdam *μαδελαν*, ut author est Dioscorides.

*Μαδελαν*, Instrumētum est quo glabratur cutis: vel id quo cutis redditur laevis & depilis: quod Græci alio nomine *περχολαβίδα* & *περχολαβος* vocant, à pilorum prehensione. Latini Vulsellam siue Volsellam dicunt, itidem ab euulsione pilorum.

*Μαδρα*, dicuntur ab Athenæo quæ à Galeno *βεχβυλα*, pruna scilicet, ut putat Damascena.

*Μαζα*, Latinum nomen non habet, nisi quis, ut Plinius, offam interpreteretur. Sic autem ap-

pellari polentam hordeaceam quæ sit humido conspersa, Aetius author est, sed quæ videlicet mandatur cruda cum defruto, vel melle, vel alio huiusmodi. Multa eius genera & nomina produntur à Græcis. Ceterum *μάζα* apud Hippocratem significat farinam hordei tostam aliquo liquore subactam, siue oxymelite, siue mulsa, siue posca, siue aqua pura, ut annotauit Erotianus.

*Μαμνικυλον*, fructus arbuti quam *κίμαρον* Græci vocant. Plinius lib. 15. cap. 24. vnedonem Latinis dici putat, eo nomine non fructum modo, verum ipsam etiam arborem dici scribens. Galenus tamen non comati, sed epimelidis arboris fructum vnedonem vocari prodidit. Vis eadem utrique tribuitur, acerbata, *κακόςμαχος* & *καρβαεσθ*.

*Μακεδονίαν*, medicamenti nomen, cuius descriptio habetur apud Aetium lib. 15. in hunc modum: Ceræ, colophoniz, picis, adipis taurini, thuris, æquales portiones. Liquabilibus liquatis & ab igne amotis thus inspergitur & infarcitur. Id medicamentum tetrapharmaco simile est, soloque thure ipsum superat, ut scripsit Gal. libr. 13. meth. med. Describitur & ab Aetio aliud Macedoniticum Azanitzæ, ad multa, ut ait, commodum & insigne.

*Μάκρ*, macer. Est cortex flauescens Dioscoridi vel Plinio, rubens: nomine suæ arboris, sed nobis incognita, crassus, gustu perquam adstringens, vel, ut scribit Galenus, multum acerbus, cum leuicula quadam acrimonia, odoratus sicut plæraque alia aromata quæ ex India inuehuntur. Videtur mista constare essentia, plæraque terrena, frigida: paucula vero calida & tenuium partium. Siccat tertio ordine, in calore & frigore temperatus est. Non est dubium quin macis Arabum ab eo differat. Est enim extrema membrana nuncem moschatam vestiens, & diuerso temperamento prædita.

*Μακρίπυς*, qui multum spirat, vel qui spirat, ut interpretatur apud Hippocr. Galenus.

*Μαλαβαντον*, medicamenti nomen quod oculis dolore vexatis conuenit. Descriptio habetur apud Galen. lib. 4. *πρὸς τὴν πύκν*, & apud Paulum



Paulum lib. 7. cap. 16. qui scribit etiam *is-*  
*sen* à quibusdam dictum fuisse.

*Malabathron*, arbitrantur aliqui esse Indici nar-  
 di folium, falsi quadam odoris cognatione.  
 Per multa vero nardum olent, ut *phu*, *asa-*  
*rum*, *niris*, quæ multum ab eo differunt.  
 Verum malabathrum folium sui generis est  
 quod Indicæ gignunt paludes, lentis palu-  
 stris inodo innatans aquis sine radice. Id  
 collectum statim linò transluitur, & sicca-  
 tum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo  
 feruore aquis humum aridis fruticibus vri,  
 quod ubi non euenerit, ne amplius quidem  
 renâsci. Laudatur recens, ex candido migri-  
 cans, integrum, nec fragile, odore caput fe-  
 riens, quod diu insuauis odore permaneat, &  
 nardum sapore imitetur, nullo falis gustu.  
 Ut autem nardum odore, ita & viribus re-  
 præsentat.

*Malagma*, sic proprie vocant medici quod par-  
 tes præter naturam induratas emollit. Tem-  
 peramento id omne mediocriter calido  
 præditum sit oportet, nec tamen manife-  
 ste aut siccet, aut humectet: sic enim parti-  
 um induratarum, quibus admotum fuerit,  
 veluti fusionem quandam molietur. Is e-  
 nim est malagmatis usus, ut quod in duris  
 partibus concreuit, fundatur. Quod cum  
 effectum fuerit, tum digerentibus medica-  
 mentis locus est, ut quod calore fustum fue-  
 rit, resoluiatur. Verum nescio, inquit Ga-  
 lenus, quia ratione inducti Asclepiades &  
 Andromachus omnia pharMACA quæ foris  
 imponuntur, siue emolliant, siue adstrin-  
 gant, condensent, indurent, malagmata ap-  
 pellarunt. Quos postea sequuti alii medi-  
 ci, tres maxime eorum differentias, ut ex  
 Antyllo refert Oribasius, statuerunt: alia  
 ex quibusdam siccis radicibus, herbis, se-  
 minibus: alia ex metallicis aut iis quæ me-  
 tallicis proportionè respondent: alia ex suc-  
 cis, lacte, lacrymis, & iis quidem omni-  
 bus diuersa facultate præditis. Sic fit ut *μα-*  
*λάγμαλα*, *εμπλάσμα*, *εξήλεκτοι* confundantur in-  
 ter quæ tamen Celsus libro 5. distinguit,  
 scribens *μαλάγμαλα* maxime ex floribus eo-  
 rumque etiam surculis parari, sed *εμπλάσμα*  
*καὶ Εξήλεκτοι* magis ex quibusdam metallicis  
 fieri: deinde verò *τὸ μαλάγμαλα* contulâ ab-  
 undemollescere, laboriose verò conterea  
 ex quibus *τὸ εμπλάσμα καὶ οἱ Εξήλεκτοι* compo-  
 nuntur, ne lædant vulnera cum imposita  
 sunt. Est vero & malagmatum in iis admo-  
 uendis differentia: aut enim medius corpo-  
 ris regionibus (quæ proprie *ἐντὶ σπλάγι*, inquit  
 Paulus, appellant) ut ventriculo, iecinori, lie-  
 ni imponuntur: aut extremis partibus, ut ca-  
 piti & articulis.

*Μαλάθρα*, dicitur hoc nomine *νέβηδρον*, ut ha-  
 betur apud Dioscor.

*Μαλάκια*, vocantur ab Hippocrate pisces spi-  
 nam non habentes, ut polypus, loligo,  
 sepia, vrtica. Hæc vero & sanguine &  
 visceribus carent. author Galenus *ἐν τῷ*  
*γλαύματι*.

*Μαλακία*, molle. Secundum Platonem defini-  
 tur id esse quod cedit carni nostræ. At Ari-  
 storeles multo elimatius, qui non quod  
 cedit vocat molle, sed ei adire quod in se-  
 ipsum, vel quod loco non mouetur. Siue  
 enim dicamus, Molle est quod in seipsum  
 cedit: siue, Molle est quod cedit, nec de lo-  
 co migrat: siue, Molle est quod cedit in se-  
 ipsum, nec migrat: bene definierimus,  
 quod duobus propriis symptomatibus ob-  
 oculos ponamus molle. Nā tum in seipsum  
 cedit, tum loco non mouetur: quorum v-  
 trumque soli illi accidit. Cedere namque  
 commune symptoma est mollis & imbecilli,  
 at in seipsum, solius est mollis, ut non in se-  
 ipsum, imbecilli tantum. Itemque ut in locū  
 vicinum migratio, proprium infirmi est, ita  
 non demigrare, vnius mollis. Proinde quod  
 cedit in seipsum, nec migrat, omnes vocant  
 molle, quemadmodum id quod eo illud ad-  
 igit, durum: Dicitur autem molle triplici-  
 ter, sicut & durum: absolute seu in summo,  
 ut aer & aqua mollis, terra dura: in victo-  
 ria seu excessu, ut caro mollis, os durum: in  
 collatione ad symmetrum sui generis aut  
 speciei, vel quoduis obuium, vel seipsum  
 dum habebat secundum naturam: in quo  
 quidem significatio non simpliciter molle,  
 sed mollius aliquid esse dicitur. Inter secun-  
 das quantitates mollities habetur, & ab hu-  
 miditate nascitur, adeo ut quicquid molle  
 est, idem etiam humidum dici possit, etiam-  
 si non sit necesse ut è contrario quod humi-  
 dum est, id etiam molle existat. Id enim dis-  
 criminis inter mollitiem humiditatemque  
 esse Galenus docuit, quod mollities ipsorū  
 corporum propria qualitas sit, humiditas  
 vero qui in eo continetur humorum. Dif-  
 ferentia tactu cognoscitur. Nam humiditas  
 cum madore est, mollities sine hoc. quan-  
 quam est profecto & molle corpus humi-  
 dum suis ipsius partibus.

*Μαλακὸς ἀρτηρίας* mollis pulsus. Sic dicitur quem  
 mollis arteria facit, seu in quo arteria digi-  
 to occurrens, tenera ac carnosior sentitur.  
 Huic contrarius est durus, cum siccior & in  
 modum corii rigidior arteria occurrat. Sum-  
 pta est autem hæc tota differentia à consi-  
 stentia instrumenti, seu statu corporis arte-  
 riæ, siue à qualitate tunicarū arteriæ. Est er-  
 go causa mollis pulsus mollities, siue ea in-  
 ducta sit à causis secundum naturam, ut cibo  
 humido, balneo frequenti, somno multo,  
 vita molli & delicata, voluptati otioque de-  
 dita: siue etiam ab iis quæ sunt præter natu-  
 ram, ut comate, cataphora, lethargo, hydro-  
 pe, œdemate & aliis id genus morbis.

*Μαλακὰ*, mollificabilia. Sic dicuntur terrea,  
 quæcumque concreuerunt. Sed non omnia  
 quidem quæ concreuerunt, emolliiri possunt,  
 Nam cum ea genere duplicia sint, alia aquea,  
 alia terrea, aquea non possunt *μαλακὰ* dici:  
 liquantur enim, non emolliuntur: exemplo  
 est glacies. Quæ vero terrea sunt, si ita con-  
 cretione adeptæ sunt, ut nec eorum humor

vinerius, perinde vt in sale & nitro, inaruerit, nec in iis pori inæqualiter se habuerint, vt in latere & in omni fictili, mollescere possunt, idque ab igne, vt ferrum, tornu & ligna quædam. vide *πυρρὸς*.

*Μαλακίαι φάρμακα*. emollientia. Dicuntur medicamenta quæ corpus durum in naturalem statum reducunt. Itaque quot modis durum corpus efficitur, tot fere sunt emollientium differentia. Nam quod siccitate durum euasit, humectando remollitur: quod vero copiosi vel superflui humoris affluxu, vacuando per frigida, calida, sicca, verumtamen sicut hæc non proprie dura dicuntur, sic neque medicamenta emollientia proprie sunt quæ humectant vel euacuant, sed peculiariter sic vocatur, quod ea emollit quæ congelatione induruerunt, præsertim si in iis contentus sit humor præter naturam, veluti in scirrhis. Siquidem ea proprie dura nuncupatur. Ergo quæ verè emolliunt, calida esse oportet, secundo aut tertio ordine. Nam quæ minus calida sunt, ea potius in genere pus mouentium habentur: quæ vero sunt calidiora, potius digerendo vacuandoque indurant, quam emolliunt. Itaque facultas quoque emplastica in iis inesse debet. Quod vero pertinet ad aliam primarum qualitarum coniugationem, minus sicca esse conuenit, sed primo ordine: quamquam si quis forte ea humida dicat, non repugnandum: nam parum absunt ab iis quæ ne humectant nec desiccant. Medici præterea, vt scribit Gal. lib. 11. *πρὸς γίν*, in huiusmodi pharmanis, quod emollientius est, pinguius appellare consueuerunt: hoc autem videlicet humidius quoque est. Cæterum velut in corporibus, induratis non parua est maioris minorisque duritiei latitudo: sic & medicamentorum ea curantium non paruam esse latitudinem oportet, quam Gal. lib. 7.

*πρὸς γίν* exponit.

*Μαλακίαι*. quibusdam herba est virens, hederæ simillima, in riguis nascens, lenta atque mollis, quæ ubicunque loci fuerit inuenta, subesse aqua significat. creditur ea esse quæ officina sigillum diuæ Mariæ vocant.

*Μαλάχη*. malua. herba duorum generum, hortensis & sylvestris. Illa sæpe grandescit in arborem, foliis amplis, circumata rotunditatis, rarioribus in ambitu segmentis. Caudex simplex, altus, à medio fere ad verticem floribus decoratus, breui admodum pediculo dependentibus, qui venustate rosas non cedunt, sed odore carent. Funduntur inde rosæ à quibus plantam ipsam vulgus transmarinam rosam cœpit appellare. Eius folia cum sole circumagi traduntur, sequæ eodem inclinare quo sydus feratur. Sylvestris autem folio est rotundo, pingui, paucis in ambitu segminibus intercepto, caule magno, purpureis floribus prædito, radice candida. In eo genere cui grande folium & radices albae, *ἀλβία* vocatur, & à quibusdam *ἀεὶ πάλαι* ab effectus excellentia. Dicta credi-

tur *μαλάχη* ab emolliendo ventre, hortensis præsertim, quæ vt est humidior sylvestri, ira & imbecillior.

*Μαλακίαι*. sic à quibusdam dicitur *πρὸς βελλινον* auctore Dioscoride. nisi forte *μαλακίαι* scribendum sit: quo nomine donari potuit propter molliem.

*Μαλακίαι πλεῖραι*, costæ molles. sic vocantur costæ nothæ.

*Μαλακίαι ἔλας*. mollis & lenis annus, apud Hippocrat. lib. 3. *τῶν ἐπιδημιῶν*. hoc est, *ἐπιδημιῶν*, vt interpretatur Galenus: id est, sine flatu & calidum.

*Μαλακίαι φάρμακα*. sic vocantur ab Hippocr. pharmanæ generis oleosi, vt quæ constant adipibus, cætyo, resinis, butyro, cera. sic differunt *ἀπὸ τῶν μαλακίων*.

*Μαλακίαι*. dicuntur ab Hippocrate, *μαλακίαι ἢ κηράδι*: hoc est, emollientia vel cerea. *μαλά* enim ceram significat, eam præsertim quæ mollis est. Auctor Galenus *ἐν ταῖς γράμμασι*.

*Μαλιστα*. apud Hippocrat. multis in locis idem quod *ὡς ἐστὶν τὸ πλεον*: hoc est, vt plurimum. vt coniecturam eius rei, de qua dicitur, proxime ostendat. sicut *ἐν τῇ ἀφροδίτῃ*. *Οὗτοι ἐν καὶ δέκα τοῖς μαλιστα*. id est, circiter decimum diem: ita vt quamuis non o die vel undecimo intereant, vera tamen oratio sit, quemadmodum Galenus in comment. annotauit. Eadem in significatione alii etiam Græci vsi sunt, apud quos *μαλιστα* significat idem quod sæpenumero.

*Μαλίστη*. malua maior, quæ & satua est.

*Μαμράς*. radícula tenuis & parua, foris subflaua, intus alba, dulcis, calamo aromatico similis, prædens & extuberantibus nodis, quasi geniculis distincta, dulcis primum saporis, sed postea leuiter amari. Valet contra venenatorum morsus, oculorum cicatrices, & albugines exterit. Calfacit & siccatur ordine tertio. Sunt qui doronicum apud offic. & herbar. vocari existiment: alii mannam esse volunt, nullam rationem, nullum auctorem sequuti.

*Μανδραγόρας*. planta est cuius duo genera statuantur. Vnum nigricans, quod & scemina, angustioribus & minoribus foliis quam lactuca, odore viroso & graui. Gerit mala virellis xui similia, pallida, odorata, in quibus semen pyrorum. Radices habet magnas, binas ternasue, implicatas, extra nigras, intus albas. Alterum candidum est, hoc marem existimant, ingentibus foliis, latis, albenibus, laxibus. Mala huius duplo maiora quam scemina, croci colore, odorata. Radix quidem supradictæ similis, sed amplior & candidior. Refrigerat mandragoras ordine tertio. eius mala soporem grauem inducunt. A Romanis canina malus aut terrestris dicitur.

*Μανία* furor. infania. Species est *ῥαβδωροσύν*, vt scribit Galen. lib. 2. de causis sympto-  
rum. Est autem *ῥαβδωροσύν* *σφοδρὰ ἀνέν-  
πετῆ*, hoc est, mentis ab alienatio vehemens

circa febrem. Hippocrates etiam *μελαγχολία* aliquando appellat. Habet autem magnitudinem & vehementiam, ut ferarum modo in eos insiliant qui imprudenter ipsis occurrerint, & vinciri propterea debeant. Quod autem delirium paruum miteque est, Hippocr. *ἁπλοῦς* consuevit appellare. Fit autem circa febrem, nullaque alia re differt à phrenitide. Mentis siquidem vitiaque noxa est: sed proprium est *τῆς μελαγχολίας* febre carere, ut febricitate *τῆς φρενιτικῆς* excitatur ab iis causis quæ in *τῇ ἀφροσύνῃ* recitantur; cerebroque accidit vel per se, vel per consensum affesto. Nunquam pituitosus humor eam parit, sed eum acrem & mordacem omnino esse oportet, cuiusmodi est omnis flaua bilis, & aliquando melancholicus humor, si plurimum usus est aut computruit. Fit etiam aliquando à copia sanguinis, ut Hippocrates aphor. 40. libri 5. scriptum reliquit, & Aetius ex Archigene & Posidonio recitat. Sed Galenus feruidiorem ipsum fieri oportere dixit. hi vero nonnunquam à sanguine copioso nec putrente, sed bene temperato, solaque copia, ut in temulentis, molesto, *τῷ μελαίῳ* oriri pronunciant: suaque illi signa symptomataque tribuunt, risum, vultum hilarem & perpetuum cantum. Verum generalius hi videntur uti nomine *τῆς μελαίῃς*, & omnino *αἰὲν τῆς ἀφροσύνης* usurpare, præter morem Hippocratis & Galeni, qui *μελαγχολία* & *ἀφροσύνη* non nisi in vehementi delirio ab acri & calido humore excitato usurpant & *μελαγχολία* & *ἀφροσύνη* appellant, *τὰς σφοδράς δὲ τῷ κενῷ ἢ τῇ μελαίῃς χολῇ*, ut habetur comm. 1. in Prorethet. hoc est vehementes, propter malignitatem atræ bilis. Hippocr. certe uno tantum loco *τῷ μελαίῳ* non proprie pro eo delirii genere accipit, sed pro ea mentis abalienatione quæ proprie *μελαγχολία* appellatur. Is est aphor. 21. lib. 6. quo scribit *τίσι μαρτυρήσονται περὶ τῆς αἰμορροϊδῆς ἐν τῇ χυμῶνι, τῆς μελαίῃς δὲ ἐν τῇ γύμνῳ*. hoc est, insipientibus, si varices aut hæmorrhoides superuenerint, insaniz solutionem significant. Hic enim aperte *τῷ μελαγχολίῳ* proprie dictam intelligit, sicut in comment. Galen. annotauit.

*Μάννα*. mel toridum vel aerium dici potest. Est enim mellis species non ignota veteribus, Galeno, Plinio, Dioscoridi, sed mellis nomine & titulo comprehensa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam proditamque fuisse putet. Sic enim de ea scriptum reliquit Galenus: in foliis (inquit) stirpium adnascitur quippiam, quod nec eorum succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sen torulentum quiddam, nec tamen continenter, neque copiose progigni solet. Nec me præterit per æstatem in arborum, fruticum, herbarumque foliis plurimum fuisse inuentum, sic ut à ludentibus rusticis Iupiter diceretur melle pluisse. Præcesserat tum nox frigidior, pridie calida siccaque cœli conditio, diluxerat. Quapro-

pter inter naturæ rerum peritos conueniebat, halitus quos terra vel aqua prospirasset, extenuatos & excoctos, nocturni frigoris beneficio coaluisse. Id in regione nostra rarius euenit, in Libano monte quorannis adeo ut extensis pellibus arbores succutiant, receptoque quod profuit, ollas & fictilia compleant, priuatoque nomine vocant *ἀποστῆμν*, id est, roscedum mel, vel etiam *ἀερίμν*, id est, mel aerium. Hæc Galenus. Mellis speciem esse ipsa dulcedo sufficienter testatur, quæ gustu prorsus mellea sentitur. Concrefcit maxime Vergiliarum exortu, vel sydere Sirio splendente. Vim habet modicam ciendi aluum & flauam bilem pellendi, tutoque pueris & sceminis vterum gestantibus exhiberi potest.

*μάννα*. præter significationem superius explicatam, etiam accipitur pro granis seu mitis thuris concussu elisis. Cum enim thus gestatur, vehitur, agitur, aut quouis modo tractatur, multa ex eo fragmenta decidant necesse est, quæ manna, inquit Gal. proprie appellat. Hanc nihil à thure differre aliqui existimarunt, quos tamen Gal. reprehendit, quod hæc manna non solo thure, sed eius etiam corticis fragmentis quibusdam simul elisis mistisq; constet. Proinde differt à thure, quod propter corticis mixture thure sit adstringentior, thus autem ea magis emplasticum. Sed exigua quidem differentia est, adeo ut Galenus lib. 5. meth. med. scribat se mannam pro thure interdum sumere. Dicitur aliquando simpliciter *ἡ μάννα*, aliquando vero cum addito *ἡ μάννα τῷ λιβανῷ*.

*Μανικὴ*. ab Hippocrate appellatur *διουιντικὴ*, hoc est, ars diuinandi quæ fit per aues. *ἱεροσκομία* vero, *διουιντικὴ* à plerisque dictam, antiqui etiam alii ex eo vocant, quod *ἱερὰ*, id est, hostias, inspicientes, qui in ea scientia graues & præstantes sunt, ex ipsis ventura prænunciant. *ἱερὰ* autem scimus appellari omnia quæ diis ad honorem exhibebantur. quales sunt quæ litantur victimæ. Eos vero qui ex auium volatu augurantur, quos *διωνεῖς* & *διουινεῖς* appellant, *μανῆς*, id est, augures, appellauit Hippocrates. quanquam *μανῆας* nomen & *μανικὴς* de omnibus quæ ita prædicant, artibus præferatur.

*Μαίης*. brassica apud Nicandrum;

*Μαρίσις*. dictum est à quibusdam syluestre fœniculum, sicut habetur apud Dioscor.

*Μαράβρον*. fœniculum. Planta est ferulacei generis, caule geniculato, fungosa medulla, læui cortice & herbaceo, folio abrotoni, sed longiore mollioreque, iucundo odore, muscario rotundo, amplo, luteo, in orbem raditim circinato, in quo semen nudum dependet, radice candida, crassa, longa, odorata. Excalfacit tertio excessu, siccat primo, proindeque lac generat, suffusus auxilio est, vrinæ mensq; mouet. Est & syluestre fœniculum, magnum, semen ferens simile carchryi. *ἱερμυαχῆρος* à Græcis vocatur, à Latinis fœniculum erraticum.

*μαρasmus*. marcor. tabes. Est immodica totius corporis ariditas & consumptio. Quo fit ut facile morbus hic innotescat, oculorum ingenti cavitare veluti in foveis quibusdam reconditorum, & vniuersi corporis squalore; caloris vitalis flore destituti, cutis circa frontem siccitate & tensione; palpebris instantibus & tanquam somno grauiatis ab impotentia quadam vigilandi: sunt & tempora collapsa atque caua. Breuiter totus homo non aliud est quam ossa & cutis. In ventre nulla intestina; nulla viscera inesse credas: adeo contracta sunt praecordia & consumpti ventris muscoli, ut nihil ex iis praeter fibras & cutem superfit. Hae autem symptomata aut adhuc fieri intelliguntur, aut iam plane facta absolutaque esse. Inde duplex marasmi differentia existit, vnius quidem nondum perfecti, sed adhuc ad maiorem consumptionem tendentis: alterius vero iam plane consummati. Hic prorsus immedicabilis est, illi remedia quaedam possunt adhiberi. Est & gemina rursus differentia. nam cum omnis marasmus ex siccitate fiat, ea interdum calorem, interdum frigiditatem habet coniunctam. Ex quo fit ut marasmus alius siccus & calidus sit, alius siccus & frigidus. Qui calidus est, non aliud prorsus est, quam febris hectica iam longe progressa ad solidam vsque similitudinem partium substantiam, appellaturque *μαεσμαδus πυρετις*. Hic ergo quatenus febris est, caloris est particeps. Frigidus vero marasmus duplex est, vnus qui senium ex morbo dicitur, alter ipsa mera senectus. Neque enim senectus aliter definitur quam frigiditate & siccitate: sed senectus quidem ipsa aetatis cursu prouenit, senium vero ex morbo non item, sed praeture a violenta causa. Succedit autem febribus ardentibus & hecticis cum sua sponte, tum frigidorum usu. Per se quidem, quod febris hectica non humidum modo primigenium, verum calorem etiam natium populetur & depascit, eoque pereunte cor etiam frigidius quam secundum naturam reddi necesse sit. Indicium est pulsus paruus & rarus, similiter & respiratio parua, rara, atque etiam frigida. ex quibus manifestum est refrigeratum esse principium vitale. A frigidorum vero usu aliquando senium ex morbo inducitur, quod medicus saepe cogatur febre hectica & marasmode laborantem diu multumque refrigerare omni ciborum, potionis & remedium genere, ut eum ab hectica febre, a qua praesentis periculum imminet, in senium ex morbo transferat. Nam cum hecticis spes tantum posita sit in conseruando humido substantifico, & iis arcendis quae ipsum absumunt, certe senium ex morbo hectica febre tolerabilius est, quod refrigerato principio vitali cordisque substantia humidi minus consumatur quam per hecticae febris calorem. Itaque eam rationem Galen. lib. 10. meth. med. se-

quutus, consulit eum quem marasmus plane iam occupauit, non esse a medicis nisi cum praefatione sanandum, & in alterum transferendum marasimum qui senium ex morbo nominatur. Traditur & a Gal. alia marasmi differentia, in verum & non verum. Verus quidem est per quem omnes corporis solidae partes similiter marcescunt, initio ab ipso corde facto: non verus autem, qui in certa quadam parte consistit, ut in ventriculo & iecinore, in quibus Galen. magna ex parte hecticas marasmodeque febres se contemplatum esse scribit. Superueniunt aliquando & pulmone, sed rarius, tum propter eius humiditatem, tum quod spirando refrigeretur. Incidunt & pectori & mesarzo & ieiuno & colo, interim vero & vtero & renibus. In septo autem transverso marasimum se nunquam vidisse Galenus scripto testatur est, sed hecticam sane febrem vidisse, & hac semel quidem plane absolutam, saepe vero citius interimentem quam plane esset completa, quod eam & spirandi difficultas & delirium excipiat.

*μαεσμαδus, ισοφεις*. apud Hippocr. ut interpretatur Erotianus. hoc est obstreptus.

*μαεσμαδus*. dicitur ab Hippocr. quam multi *σημομαδus*, hoc est cinerem calidum, vocant, ut annotauit Galen. *επι ταις γλωσσαις*. Sunt autem, inquit Erotianus, qui *φρυγανιδες και μικρους αυθρακας*, hoc est arentes & paruos carbones, interpretantur.

*μαρμασμου*. nomen est malagmatis ad articulorum dolores & resolutiones comparati. Describitur ab Aetio libr. 12. cap. 44. & apud Paulum lib. 7. cap. 18.

*μαρμαδρυγαι*. apud Hippoc. *λαμπηδones πυκναι, και εσπραται πυκναι, αιφνιδιος, πορωδεις*, hoc est splendores crebri, & veluti fulgura frequentia, subita & ardentia. Sunt autem nihil aliud quam splendores oculis obuerfantes.

*μαρον*. herba surculosa, flore origani, foliis multo candidioribus, flore odoratiore & natura silymbrii, subadstringens & modice calfaciens. Sunt qui mentham syluestrem esse putent.

*μαρωνη*. sic dicitur a quibusdam Centaurium magnum, ut habetur apud Diosc. quasi Maronia herba, a monte Thraciae, quo loco probatum forte & copiosum nascitur Centaurium. Sic vero & *πελαγονιας* nominatur, a more Thessaliae Centauris & Lapithis nobilitato.

*μαδανς*. *εστι θερμους*, id est caliditatis, apud Hippoc. ut scribit Galen. *επι ταις γλωσσαις*.

*μασσυδου* *η*

*μασσυχας*. nomen est thymiamatis, cuius descriptio habetur apud Paulum libr. 7. capit. 23. habetur & apud Aetium libr. 13. sed diuersa, ad suffitus tamen etiam comparata in modum *εστι κυφειον*. Aegyptium nomen videri potest.

*μασσυον*. significat apud Hippoc. miscere & subigere atque etiam exprimere, ut scribit Gal. *επι ταις γλωσσαις*.

**Mamma** idem quod *lactis*, id est, *plac.* apud Hippocratem. ut Galenus. *et* *quod* *explicauit*. Bacchius tamen contrario sensu *lactis*, hoc est, minus, interpretatus est, sicut annotauit Erotianus.

**Mastiche**. Est resina quam lentiscus in Chio fere tantum fundit. Cum enim lentiscus resinam ubique sudet, in Chio tamen sola mastiche proprie dictam, quæ non est aliud quam lentisci resina optima tenuissimaque. Importatur quidem & ex India quadam & spina mastiche, item ex Arabia, Asia, Græciaque sed omnibus præstat Chia. Cuius tamen etiam duo genera ibi proueniunt, nigra & candida. Nigram Ægyptiam, candidam Chiam vocari Galenus prodidit. Illa siccat magis & discutit minusque adstringit, hæc vero calfacit & siccat moderatius, primo, ut scribit Paulus, ordine. Est autem mistæ facultatis adstrictior simul & emollientis, per quam stomachi, ventris intestinorum, iecinoris inflammationibus recte adhibetur.

**Mandibula**. *mandibula* manforii musculi. Sunt musculi duo (vtrinque scilicet vnus) bicipites & triangulares maxillam circumagentes. Habent enim singuli duo capita, quorum vnus exiens *ad* *tr. mandibula*, fibris in partem genæ infernæ posteriorem emissis eam mouet antrosum, alterum autem à zygomate, fibris istas intersecantibus in similitudinem *x* literæ, & in genam anteriorem immixtis eam mouet retrorsum. At cum vtræque fibræ simul agunt, motu medio inferna ipsa gena tollitur. Tria vero singulorum latera sunt, quorum vnus versus zygomatis extremitatem porrigitur, aliud versus inferiorem mandibulam, reliquum vero ac tertium velut basis quædam prædicti vtrinque latus partibus maxillæ inferioris coniungens, secundum ipsius longitudinem extenditur. Cæterum hi musculi carnosam quoque maxillarum partem constituunt, suntque subter malas quam alibi nervosiores, quo loco habent velut vtricem. A mandendo *mandibula* appellati sunt, etiam musculi quoque temporales ad mandendum plurimum conferant. Hi enim præstant, ut commissis inter se dentibus cibi comminuantur: illi vero fractum cibum leuigari, atque in minima conterri à molaribus faciunt. Hæc enim actio eorum propria est, non etiam temporalium, qui à superiori parte exorti sursum tantum maxillam adducunt, non tamen in latera mouent.

**Mandibula**. medicamentum aridum, auctore Demosthene Massiliota. Valer ad carbunculos. Describitur à Galeno lib. 5. *et* *Paulo* lib. 7. cap. 13.

**Mammilla**. mammillaris est apophysis ossis temporalis, papillis mammarum, præsertim vaccinarum, similis. Exuberat & cauus est, quo æt ampla & anfractuosa eius cauitate conclusus, magis resonet auribus. Inseruit inferendis musculis. Dicuntur & à quibusdam

veteri cornua (*cornua* vocant) *mammas* *et* *propter* similitudinem quam habent cum mammis.

**Mamma**. mamma dicitur & *propter*. Est, ut ait Rufus *et* *propter* *propter*, hoc est, in pectore carnosa eminentia. Definuitur autem pars ad latus pectoris glandulosa, semicircularis, in cuius medio papilla protuberat, gignendi lactis vim à natura habens. Verum glandulosa illa substantia admodum varia est. Viris namque (in quibus proprie *mas* dicitur, ut *mas* sine *mas* in mulieribus) calidioribus scilicet & siccioribus, penè nulla est, eademque arida, ut etiam admodum puellis. Iuenculis vero compactior est & duriuscula, vetulis vero flaccida. Eam autem mulæ sed paræ glandulæ constituunt, sibi mutuo incumbentes, & inter se commissæ adipis & fibrarum interuentu quæ ex carnea membrana in curem pertinent. Semicircularis illi est forma, non tam quò minus pateret iniuriis quam quò plus lactis contineret. Est enim rotundum omnium capacissimum. In eius medio *mas*, hoc est, papilla, veluti apex & tuberculum siue papula eminet, de qua suo loco dictum est, quam ambit circulus quidam subniger, qui *propter* dicitur. Sic quidem condita mamma aptissimum fit gignendi continendique lactis organum, quod quia è sanguine gignitur, iecirco natura venas magnas & frequentes mammis largita est, alias quidem externas, à ramo venæ cauæ axillam iam petentis descendentes: alias vero internas à venâ caua pariter descendentes ex iugulo summoque sterno. Hæ partim absumuntur in mamas & musculos pectoris internos, partim vero ad xiphoidem cartilaginem & musculos rectos delapsæ, inque eos & vicinas partes distributæ, paulo supra umbilicum, surculis aliquot suis occurrunt surculis totidem venarum epigastrii: indeq; fit consensus ille mammarum cum vtero. Habent & hæc venæ arterias aliquot comites, sed per paucas & graciles.

**Mamma**. *mas* siue axilla. locus est sub humero concavius, multis glandulis scatens. Hic ad suscipienda pectoris extremata creandamque phlegmonem valde opportunus est propter glandularum *propter*, ut scribit Hippocrates lib. *et* *propter*. quo etiam loco ipse nervos sub alis existentes non communi vocabulo *propter*, sed *propter* propter eorum firmitatem appellauit, ut illic Galenus annotauit.

**Mamma**. *mas* axillaris seu interna vena. Est ramus venæ cauæ magnus amplasque, qui ab ea antequam thorace excedat productus, per axillam in internam brachii sedem expanditur. Ex eod. *et* *propter*, id est, interna vena, vulgari & usurato nomine à medicis omnibus appellatur. Eadem & ab Hippocr. & à Galeno lib. *et* *propter*, & à *et* *propter* & ab eodem Galeno



in anatom. venar. ἡ δὲ πρὸς μαγάλαν, ἢ καὶ πρὸς μαγάλαν. Multo maior ampliorque est quam humeraria, & in soboles longe numerosiores diuiditur. Huic per totum arteriam subici, Paulus Aegineta scripsit lib. 6. cap. 10. περὶ φλεβοτομίας. per morbos qui infra iugulum consistunt, secatur in cubito, quod supra cubitum sub musculis delitescat: alioqui non est dubium quin saepe altius eam secare utilius foret.

Μαγάλαν, sic vocatur à quibusdam proprio nomine secunda dorsì vertebra quæ πρὸς λωρίαν subest.

Μαγνὸς, ὕψιστος, id est, questio, apud Hippocr. & Galen. ut scribit Gal. ἐν τῇς γράμμασι. itemque Erotianus.

Μαγνὸς, sunt ossa nucleorum Persicorum, sicut recitat Galenus ex Archigene lib. 5. πρὸς τὴν 13.

Μαγνὸς, gladiolus quo chirurgi vtuntur, apud Hippocr. quem ille geminum facit, ὁ δὲ ὀξύς καὶ σφινδὴς siue μαγνὸς, hoc est, acutum & ventosum.

Μαγνὸς, φάρμακον, emplastrum est ad multa commodum. Recipit, Aristolochiæ rotunda, galbani, æruginis, opopanacis, iridis Illyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, ana drachmas octo, terebinthinæ, cæteræ, olei omphacini, ana septuncem & vnciæ dimidium. Olei dimidium cum ærugine terendum, & reliquum cum cera & terebinthina coquendum, opopanax cum aceto dissoluendus, tum demum omnia simul subiungenda atque vnienda.

Μαγνὸς, dicitur à quibusdam ἡ ὑπό, ut author est Dioscor. quod & alio nomine φάρμακον eandem ob causam appellatur.

Μαγνὸς, vnguentum quod & mendesium alio nomine vocari Galen. author est. Dioscor. vero diuersum à Mendeseo videtur existimasse, scribens πρὸς μαγνὸν suo tempore defecisse, quo tamen vigebar Mendesium.

Μαγνὸς, est collyrium diarrhodon quod ad Diagoram refertur, atque alio nomine χλαρὸν siue πρὸς τὴν 13. appellatur, quoniam rosarum vncias 72. capiat. eius triplex compositio habetur apud Galen. lib. 4. πρὸς τὴν 13. quæ & à Paulo & ab Aetio consimili materia referuntur. Sed aduerte in primâ compositione quæ est apud Galen. croci drach. quadraginta contineri, iniusto & absurdo prorsus pondere.

Est & ἡ μαγνὸς διόστειρος, cuius descriptio refertur ab Aetio ad finem lib. 7.

Μαγνὸς, dicta est à veteribus ἡ ὀδοντοφυΐα καὶ ὁδοντοφυΐα, ut author est Galenus.

Μαγνὰ φλέξ, magna vena. Sic vocata est à medicis vena quam anatomici portam appellant, sicut caua magis dicta est. vide φλέξ.

Μαγνὰ πύλη, sic dicitur ὁ σπέν, hoc est, vinum, apud Hippocratem, ἐν τῇς 13. πρὸς τὴν 13. quod Galenus interpretatur viscera in molem attollens, seu magna viscera faciens. Id quod ipse in primis tribuit vino dulci. Accipitur tamen aliquando etiam passive, & signifi-

cat hominem qui magna habet viscera, siue à natura, siue ex morbo, ut phlegmone, scirrhus, œdemate.

Μεγὰς δάκτυλος, magnus digitus. Sic pollicem Hippocrates vocavit, ut scripto Galen. prodidit lib. 1. de vsu partium.

Μεγὰς σφυγμός, magnus pulsus. Est pulsus longus, latus, simulque profundus. Pulsuum differentia est sumpta à quantitate diastoles. Cum enim in longum latum & profundum arteria distenditur, pulsus magnus fit. Huic oppositus est parvus, id est, brevis, strictus & humilis simul, arteria in has tres dimensiones parum distenta. Dicitur autem reuera magnus pulsus ad aliquid, quemadmodum & moderatus. Est enim magnus moderato maior. Itaque non est simplex & vnus pulsus magnus, sed varius pro magnitudinis incremento. Talis autem euadit solo calore aucto, sed quo tempore nec facultas male affecta sit, nec instrumentum. Ex quo fit ut solius caloris excessum proprie significet, idque eo magis, quo secum habet antecellam maiorem celeritatem & frequentiam. Hæc enim duo magnus pulsus secum solet adsciscere, sed primum quidem celeritatem, quando scilicet vsus in tantum auctus est, ut maximam distentionem superet. Tunc enim cum magnitudo nulla maior potest contingere, pulsu ad summum aucto, natura necessario inducit celeritatem quam potest maximam, quæ ubi etiam tanta est, ut augeri amplius nequeat, concitat simul cum celeritate frequentiam.

Μεγὰς ὄγκος, pastillus magnus, sic dictus à simplicium medicamentorum copia quam recipit. Commodus est dysentericis. Prodest & ad caua crustosæque vlcera. Descriptio habetur apud Aetium lib. 9. cap. 49.

Μεγὰς νόσος, magnitudo morbi. Dicitur etiam ὁδοντοφυΐα, id est, vehementia. Id dicitur à quo magnum periculum ægro impendit. Tribus autem modis æstimatur à Galeno, per lætæ partis aut actionis præstantiam, ex propria affectus essentia, ex facultate nostrum corpus gubernante. Partis aut actionis præstantia bifariam consideratur, vitæ scilicet aut sanitatis respectu. Itaque si cor offensus sit, si ventriculus, si iecur, si motus, cerebri actio, perierit, quia hæc partes earumque actiones ad vitam necessariæ sunt, non potest earum morbus non esse magnus: similiter si testiculi, si ren alter, si bilis vesicula, si sensus aliquis male affectus sit, quoniam, si non ad vitam, certe ad sanitatem partes illæ omnino necessariæ sunt. Propria vero morbi essentia duobus quoque modis spectatur, per se siue ex propria substantia, & ex declinatione à naturali habitu. Per se quidem siue propriæ substantiæ ratione morbus omnis cacoethes, febris pestilens, semitertiana, causus, cholera & permulti alii magni sunt, nam tota substantia totoque genere siue idea periculum ægris æcerunt, non alia de causa, quam quia tales. Ratione

vero declinationis à naturali habitu magnus est morbus, qui cum tota substantia totoque genere non sit magnus, tamen in tantum auctus est & recessit à naturali habitu, ut plenus sit periculi. Sic phlegmone quæ in non momentaneo etiam musculo permagnū spatium occupat & in immensum excreuit, magna est: sic febris continua quæ multis gradibus recessit à mediocritate temperamentis. Ex facultate vero nostrum corpus gubernare, nervi punctura magnus est morbus, quod eo pūcto, tenuissima protinus symptomata facultatis animalis excidentur: item omnis morbus venenati animalis, quacūque corporis parte factus sit, magnus est, tum propter vitalem facultatem, in quam propterea syncopæ incidunt, tum propter naturalem, ex qua icteri, hydropes, sudores & gravissima omnino symptomata oriuntur. Itaque ex facultate nostrum corpus gubernante, siue ex symptomatis magnū morbum censeret, idem est. Sed aliquando reperias Galenum ab idea magnitudinem distinguere specialius sumptam, aliquando magnitudinem intelligere solam à naturali habitu declinationem & excessum, aliquando vero duobus tantum metiri magnitudinem, ratione scilicet propriæ substantiæ & declinationis à naturali habitu, aliquando vero, ut libr. 4. meth. medendi, tribus, propter partis affectu præstantiam, propter affectus magnitudinem, & propter cacoethiam, quæ non mihi videtur aliud esse, quam propria cuiusque affectus substantia.

**Mejor vena.** maxima vena. Sic dicta est à Galeno vena cava, ex parte gibba hepatis nata, ut in anat. venarum & in libello de format. fœtus. vide *phlegmone*.

**Medimus.** medimnus, siue medimnum. Est mensura aridorum Attica, sed agricolis frequentior quam medicis ob magnitudinem. Continet chœnicas quadraginta octo, v. ait Suidas, hoc est, centum & octo libras mensurales, seu modios sex nō medicos quidem sed georgicos. Eius nota apud Græcos fuit  $\mu$ , eum & desuper imposito.

**Mejor vena.** sic à iunioribus medicis, ait Gal. dicta est febris quotidiana quæ ad integritatem non desinit. Eadem etiam *Mejor vena* dicta fuit. Nam quæ perfecte desinere & integre, *Mejor vena* appellarunt.

**Methodus.** medici methodicæ sectæ additi, quā illi definiebant esse cognitionem apparentium communitatū ad sanitatis finem spectantium. Stabant autem ad curationis indicationem nihil conferre cognitionem loci affecti, causæ, ætatis, regionis, anni temporis, considerationem virium ægotantis aut naturæ aut habitudinis ipsius, neque consuetudinem, sed à solo morbo convenientis remedii indicationē sumendam censebant, neque ab eo secundum speciem, sed ab eius communi & vniuersali notione, quam quidem appellabant *Mejor vena*, hoc est commu-

nitate, ut quæ in singulis particularibus spectaretur. Constituebant autem in vniuersum treis *Mejor vena*: adstrictam, fluentē, & mixtā ex vtraque. Atque in adstricta quidem relaxandi, in fluente vero comprimendi indicationem sumebat, in mixtis vero, ab eo quod magis vrgeret. Præter hæc tria nihil medico considerandū indicabant, quod ad remedii inuentionem pertinere videretur. Ecquid enim (aiunt) iuuat refrigerationes, æstus, ebrietates, cruditates, plenitudines, defectus, lassitudines, otia, ciborum qualitates, consuetudinum mutationes tam anxie rimari? Eane, contemptis his qui in corpore sunt affectibus, sananda suscipimus, quorū nullum prorsus superest? Nam illa quidem abeunt: quod autem ab illis excitatum est, in corpore manet. Id ipsum curare oportet. hoc enim morbus est. Considerandum est igitur qualisnam ille est. Si namque adstrictus est, laxare: si fluidus est, reprimere oportet quacūque tandem ex causa vterque originem duxerit. Quid ergo iam causa valet, cum nec quod fluidū est laxari, nec quod adstrictum est adstringi vnquam debeat? Atque ut reliqua similiter expendamus, proponatur phlegmone, in qua cum adstrictionis vitium sit, non si æstate acciderit, relaxantia remedia postulat: hyeme autem alia, sed vtroque anni tempore iisdem percuratur: nec puerili ætate relaxantibus, senili vero reprimentibus: nec in Ægypto quidem laxatoriis, Athenis autem comprimentibus. Similiter si phlegmonē contraria fluida affectio statuatur, ea nunquam relaxantibus sed perpetuo adstrictoriis remediis medicanda est, hyeme, æstate, vere, autumno, pueris, ætate florentibus, senibus, siue Thraciam, siue Syriam, siue Æthiopiam incolant. Itaque si nihil horum ad curationem conducit, frustra in his omnibus studium ponitur. Quid vero corporis partes? nonne & hæc supernacaneæ sunt ad indicationem curationis? Vel audeat aliquis dicere phlegmonem in parte quidem nervosa relaxandam, sed in arteriosa, aut venosa, aut adiposa, aut carnosa adstringendam esse? Vel si aliqua sit in corporis quadam parte adstricta affectio, audeat dicere eam non esse comprimendam, vel quod fluidum dissoluumque est, constringendum non esse? quam obrem si partis natura non immutat curationis modū, sed auxiliorum inuentio ex ipso affectionis genere dependet, in vanum partis ipsius ratio habetur. His quidem atque aliis eiusmodi rationibus Methodici nullam rei cuiusvis habendam esse rationem existimant ad remediorum inuentionem, præterquam communitatum, ut appellabant, hoc est notionum quarundam vniuersalium, quibus, sicut dictum est, adstrictū laxandum, solutum vero adstringendum esse indicari putant. Itaque ab ea methodo nimium compendiarie *Mejor vena* dicti fuere. Quorū princeps p̄ditur Themison Laodiceus Syrus qui ab Asclepiade

Rationali institutis, ad methodicæ sectæ inuentionem se contulit. Hinc est quod illum Galenus multis in locis communitatum repperit nomen. Eam postea Theſſalus Trallianus abſoluit, contra quem Gal. tam acriter sæpe debacchatur.

*Μαίωπος ἀνὴρ μὲν. vide μαιώπος.*

*Μαιώσις.* adolescens, scilicet qui ætatem agit à decimo octauo anno, vsque ad vigesimum quintum, vt annotat Galenus comment. in aphor. 9. libr. 5. hoc enim annorum spatium *ἡ μαιώσις ἡλικία*, hoc est adolescentia, definitur. Est autem media inter *ἡλικίαν καὶ ἡλικίαν*, id est, pubertatē & florē ipsam ætatis, vt idem ait in aphor. 29. libr. 3. quibus cum multa habet communia, sed maxime quidem proprium in maribus sanguinis ē naribus profluuium, quod à pubertate incipiens in adolescentia plurimum est, & ad virilem ætatem prouectis imminuitur. Cæterum quum à puberibus adolescentes euadunt, & semē & pili locis genitalibus erumpere incipiunt, testes subito increscunt, virginibus mamme extuberant, & menses ferri incipiunt, & mares præsertim, vocem manifeste immutant, vt docet Galenus comment. 4. in libr. 6. *ἡλικία δὲ μαιώσις*, hæc ætas omnium optima est, & maxime apta ad omnem voluntariam actionem. Vide in dictione *ἡλικία*.

*Μελανχολία.* Species est palustris iunci fructum ferentis in modum vuarum coherentium, in quibus cuspidatum semen clauditur. Sic dicitur à nigro cacuminis colore.

*Μελανχολία.* trochisci nomen cuius compositionem Paulus habet libr. 7. cap. 12. eo Paulus vitur ad expurgationem sordidorum vlcera libri 4. capit. 41. Est & emplastri nomen apud Paulum descripti libri 7. cap. 17.

*Μελανχολία.* Est desipientia sine febre, timorem & mœsticiam sine causa inducens. Species est *ἡ μαιώσις*. Habet enim depravatam facultatis imaginatricis & ratiocinatricis motionem multa vana animo voluens quæ metuatur, magnūque inde mœrorem concipiens. Sunt enim timor & mœsticia duo perpetua communiaque omnium melancholia laborantium symptomata, vt habetur apud Hippocrat. aphor. 23. libr. 6. In causa est humor melancholicus, qui, veluti externæ tenebræ omnibus pauorem inducunt, nisi vel audaces admodum, vel philosophiæ præceptis instructi confirmatique fuerint, in colore suo atro & tenebris simili timorē parit & mœsticiam, multa quæ eūsmodi falsa animo repræsentat, quæ tamen verā ob facultatis ratiocinatricis deprauationem reputantur. A quibus si quis volet melancholicos distinguere, infinitas prope reperiet eorum differentiās. Tot enim erunt quotetiam cogitationū & spectrorum animo obuerſantium. Itaque non ex his, sed potius ex sedibus in quibus humor ille melancholicus & gignitur & redundat, medici melan-

choliæ species distingetur, quod sic ad curationem maxime pertinet. Quod quia tribus locis cōtingit, ideo tres in vniuersum melancholiæ differentiæ existunt. Siquidem ille gignitur & abundat vel in cerebro solo vel in solis hypochondriis, vel in vniuerso corpore. Qui in cerebro per se gignitur, & non aliunde in ipsum influit, melancholiæ eam speciem creat quæ primario & per se facta dicitur, alterato scilicet cerebri temperamento, & inde nato melancholico humore corpus eius replente. Quæ ex hypochondriis humore eō scatentibus oritur, hypochondriacæ & flatuosa appellatur, quod ex iis, sed maxime sinistro, humor atque vapor cerebrum perant, quodque status plurimi in ventriculo, intestinis, abdomine, totoque etiam corpore moueantur. Ea omnium mitissima esse solet, secundum eam quæ totius corporis vitio prouenit. Pessima vero & fere incurabilis quæ ex priuato cerebri affectu oritur. Cum autem duæ sint potissimū humoris melancholici differentiæ, vnus frigidus & siccus, vinorum facci respondēs, alter calidior, acrior & vſione redditus ferocior, qui *μελαγχολία* proprie appellatur, ille morbum istum de quo agimus parit, idēque febrem non habet, qui vero ab illo fit, nō simpliciter *μελαγχολία* sed *μελαγχολία καὶ πυρετός*, hoc est *πυρετός καὶ μελαγχολία*, nuncupatur, febremque habet adiunctam tanquam phrenitidis & inflammationis cuiusdam particeps. vide *ἡ μαιώσις*.

*Μελανχολικός χυμός.* ater & melancholicus succus. Est humor omnis frigidus & siccus. Hic est naturalis & benignus, crassus, faculentus & niger, sanguinique mistus ad corporis nutritionem. Siquidem habetur inter quatuor humores, ex quibus tanquam elementis constamus & nutrimur. Hic vinorum crassorum facci similis est, & à lignē attrahitur secer niturque à sanguine. Quod namque in sanguine crassum nigrumque, velut fax in dolio, subſidet, sic appellatur. Est autem mitis & placidus succus, nec habet aliquid acidi, acris aut erodentis, neque in terram effusus ebullit, neque eam fermenti & aceti modo attollit, neque teret est odore, neque erodit, neque vſtus est neque in perniciem semper excernitur quemadmodum *ἡ μαιώσις καὶ χυμός*, id est attrahibilis exquisita, quæ omnia hæc maleficia præstat. In hoc enim *μελαγχολικός χυμός* differt *ἀπὸ τοῦ μελαγχολίου*, quod hæc præter naturam sit, & vſta ab immodico calore & valde maligna: ille vero dimis sit sanguinis, ad corporis nutritionem comparatus. Huius substantia, quemadmodum & aliorum trium humorum in alimentis quidem continetur, producitū vero à temperatura siue totius corporis siue hepatis frigida sicca, qualis est ætate declinante & autumno, & ex alimentis similiter frigidis & siccis, aliisque omnibus sumendis, ad mouendis, faciendis, educendis frigidum, siccum, crassumque succum gignentibus.

Nam

Nā & ipse temperamēto suo huiusmodi est. Verum tamē si diutius in corpore retinetur adeo ut incalasciat & putrescat, facile in atrā bilem exquisitam, quam *μέλανη χολή* vocari diximus, degenerat, & simile quiddam feci vini vsti patitur, quæ cum ante vstionē frigida & sicca sit, post vstionem tam calida redditur, ut carnem urat, liquet & corrumpat.

*Μέλαινα*. sic dicitur ab Hippocrate morbus ex nigra bile conflat, ut scripsit Galen. *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

*Μέλαινα ῥίζα*. sic dicitur ab Hippocrate aspalathi aromatici vocati radix, ut habetur apud Gal. *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

*Μέλαινα χολή*. atra bilis. sic proprie dicitur quæ talis exquisite est, hoc est, supra modū vsta, calida, sicca, acris, erodēs, acerba, acida, splēdens & terrā fermenti & aceti acerrimi modo eleuans, eoque distincta *ἀπὸ τῆς μελαχολικῆς χυμῶς*. vide *χολή μέλαινα*.

*Μελάνης*. cum accentu circumflexo. Dioscorides legendū putat, ut *μελάνης* capra, *μελάνης* vacca, & significari ait ex Melanis. ea autē vrbs est ad Crisæum campū sita ante Cripium, pascua bona habēs & lac bonum gignentia, ut inquit Dioscorides. Author Galen. *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

*Μελάνπελος*. sic dicta est à quibusdam *ἡ ἐλάνη*, ut habetur apud Dioscor.

*Μελάνπερασι*. dicta est à quibusdam *ἡ βόδιον*, siue marrubium nigrum, ut Plinius tradit.

*Μελάνπιπρον*. herba est tripedanea, surculosa, foliis rubiæ pallidis, cui semen colli figura, oleosum. Tritici vitium esse Galenus scribit. Rustici camelinam vocant.

*Μελάνφυλλον*. dicitur *ὁ ἀκατός*, authoribus Dioscoride & Plinio, nec dubium quin à nigro foliorum colore.

*Μελάνπιδιον*. sic dictum est veteribus veratrum nigrum à Melampode vare, vel eiusdem nominis pastore, quod is cum animaduertisset eò purgari capras, dato postea lacte eius sanauit Prætidas furētes.

*Μέλαινα γραμμὴ*

*Μέλαινα ὀξυζόρμεν*. atramentum scriptorium, seu atramentum librarium: quid sit notum est. Dioscorides scribit ipsum colligi fuligine è tædis coacta, & in singulas libras gummis ternas fuliginis uncias adici. Fieri etiam è refinarum & pictoria fuligine, assumi autē fuliginis minā, gummis seiquilibram, glutinis taurini, atramenti furorii, singulorū sesquunciam. Ea de causa nō est dubium quin erodēdi vim habeat, valde deficcet, & multo magis si acrum habeat, quomodo apud nos preparari solet.

*Μέλαινα κύπριον*. sic vocat Hippocrates Cyprium cinerem quo ad oculos vtimur, inquit Gal. *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

*Μέλαινα ὑποχρῆματα*. nigra deiectiones, à veteribus medicis (inquit Galenus comment. in aphor. 2. i. libro 4.) dicuntur, quæ nigra bilis exquisite non sunt. Nam illa nihil habent acris, nihil acidi, nihil erodentis, neque

in terram effusa ebulliunt, terramque fermenti & aceti modo attollunt (quod atræ bili proprium est) sed sunt veluti sanguinis limus, feci vinorum crassorum similis. Hūc, si in corpore redundat, expedit vacuari, eiusque excretionem non raro salubrem esse Galenus obseruauit, cum atræ bilis exquisitæ excretio Galeno semper visa sit perniciofa.

*Μελάνδρον*. Plinio herba est in segete ac pratis nascens, flore albo, odorato. Dicitur & *μελάνδρον* peculiari nomine medulla roboris. Est etiam *τὸ πείχρον*, hoc est falsamenti, nomen, quo cæteræ thynnorum partes præter ceruicem & ventrem sale conditæ designantur, ut scribit Oribasius lib. 2. sic autem vocantur, ut idem ait, quod sint similes nigrantibus quercus radicibus: appetitum autem excitant sinapi adiuncto, & quia sunt expertes pinguedinis, difficilius quam imus venter corrumpuntur. Plinius vero id falsamenti genus ex piscibus melandryis vocatis fieri docet, atque ita dici, quod quernis assulis simillima sint. Est autem *μελάνδρος* thynni genus grandissimum, quod veluti in assulas dissectum ita condiri sale consueuerat.

*Μελάντιον*. vox est ab Hippocrate usurpata in prognostico, quam quidam coniunctim legunt *ἀπὸ τῶν μελανῶν*, quod significat denigrans: quidam diuisim; *χλωρὸν ἢ μέλαν ἔον, ἀπὸ τῶν*.

*Μελάνθρον*. sic dicitur à quibusdam *ἡ αἰθήρις*, ut habetur apud Dioscor. pro quo forte scribendum *μηλάνθρον*, propterea quod mali odorem flores eius spirant.

*Μελάνθρον*. gith. frutex est exilibus surculis, sæpe binos dodrantes excedens, foliis ut senecionis, minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurfantibus intus membranis, quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Calfacit, siccatur, tenuium est partium, flatus difficit, absterget atque incidit. Fit ex eo errhinum præstantissimum quod piritam detrahit.

*Μέλαινα τὸ κύπριον*. Cyprium cinerem, quo ad oculos vtimur, ut explicat Gal. *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

*Μελανόρριζον*. sic vocatum fuisse elleborū nigrum Dioscorides author est: distinguitur enim ab albo radicis colore.

*Μελαντιμία*. dicitur etiam à Latinis melanteria: quidam tamē atramentum metallicum nominant. Succus est in metallis concreescens. Geminæ originis proditur à Dioscoride. Alia concreescit salis modo in fodinarum, unde æs eruatur, cuniculis: alia vero in eorum locorum superficie, quæ terrena est. Omnis nigra est, etiam si exiccata plærumque euadat cinerea, & eam commēdet Dioscorides quæ sulphuris colorem trahit. Vim causticā eam obtinet quā & misy: valde adstringit, ita tamen ut omnia adstringentia tenuitate exuperet.

**Μέλα φάρμακον.** nigrum medicamentum. quomodo autem pareretur, Hippocrates docet in libro de h ulceribus. Galenus *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

**Μέλας.** nomen est trochisci, cuius descriptio habetur apud Aetium libr. 5. Est & huius nominis emplastrum nigrum quod proprio nomine *μέλας* appellatur; de quo suo loco diceretur.

**Μελεδαιμονία.** *ἐπιμελεδαιμονία*. *διεσπένοντι*, curam gerenti; curanti: *μελεδών* namque apud Hippocratem curam & sollicitudinem significat; non autem tristitiam, quemadmodum apud Homerum; sicut scripsit Galen. *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

**Μελέτων.** Hippocrates libr. 1. *πρὸ ἐπιδημίων* usurpauit *αὐτὰ τὰ ἀσθενήματα*. vt Galenus comment. 2. annotauit. & *μελέτων αὐτὰ τὰς ἐπιμελείας*, hoc est diligentia; pro consuetudine Ionum; comment. 2. *εἰς τὸ ὁδεύειν αὐτὰς*. Erotianus *τὴν μελέτην* interpretatur *ἐνέργειαν*, hoc est actionem.

**Μέλι.** mel. Est succus dulcis, calidus & siccus in ventriculis apum elaboratus, & ore redditus: Ex matutino rore fieri, vt & cera ex floribus, proditur. Est autem initio vt aqua dilutum; & primis diebus feruet, vt musta, seque purgat. Vigesimo die crassescit, mox obducitur tenui membrana, qua feruoris ipsius spuma concreuit. Ipsum in ventriculis suis apes concipiunt ex frondibus & pabulis odoratis maxime, & suauibus, quem postea elaboratum ore reuomunt, cera & propoli mistum. Optimum est quod dulcissimum est simulque acre, colore vero pallidum; consistentia neque crassum neque concretum neque valde dilutum; sed pellucidum & vnitum in omni parte & tenax, ita vt si eius particulam digito sustuleris & defluere permiseris, sibi ipsi continuum extendatur, & perinde ac viscum non abscissum, non in particulas dissectum descendat. Plures eius differentiae cum ex plantis e quibus colligitur, tum a naturali solo desumptae celebrantur a veteribus. Quod ex absinthio apes colligunt, amarum gignitur. e rhododendro venenatum prouenit. ex cytiso optimum quidem; sed quod acrimonia careat, nimiaque dulcedine nauseam facile concitet. Praecellit omnibus ubi thymi copia est, ita tamen vt thymum plane non redoleat, quod ipsum alienae qualitatis prorsus expers esse oporteat. Atticum, quod Atticae regionis est, praecipue ex Hymetto, omnium praestantissimum, & Hymettium appellatur. Ab eo Calymnium quod ex Cycladibus affertur; & Hyblaenum siue Symblum, quod ex Sicilia. Deinde Chium, Syrium, Scythicum, Siphonium. Id omne a veteribus bonum habitum est. Mel vero Colchicum, Heracloticum siue Ponticum, quodque in Sardinia atque in Carnia Creta monte nascitur (cuius generis est quod *μαρμαριον* appellatur ab insania quam gignit) item Milesium & quod in Marathone sit, virosum creditum est. Narbonense atque Hispanum apud nos commen-

dantur, cum reliqua nobis sint incognita. Nam quod in Belgica nascitur, frigidum, crudum excrementosumque est, totumque coctione resoluitur in spumam. Sed in quocunque tractu terna mellis fastigia veteres statuere: *αἰθρον*, quasi dicas floridum, quod vere fit ex floribus constructo fauo: *αἰραιον*, hoc est, aestiuum, a tempestiuitate praecipua, ipso Sirio splendente post solstitium. Est autem id omne rutilum, vt diebus editum siccioribus. *βελυγιον*, syluestre & minime probatum; quod conuehitur post primos autumnii imbres, cum erice sola floret in syluis. Haec Plinius. Quas quidem tres mellis differentias et si Dioscorides propriis nominibus non appellauit, designauit tamen, vernum, aestiuum & hyemale appellans. A mellis huius similitudine, etiam manna & saccarum inter mellis species numerata sunt a veteribus. Et mannain quidem *δροσμήν*, & *αἰερήμεν* Galenus aperte nuncupauit, mellisque speciem esse testatus est. Saccarium vero Dioscorides sub mellis titulo comprehendit, de quibus suis locis.

**Μελιθεά.** dicitur ab Hippocrate de vino non eo tantum quod suauis est, sed eo etiam quod est cum melle mistum: quod & ipse *μελίχρυν* nominat: vt Gal. *ἐν ταῖς γλώσσαις* annotauit.

**Μελικήεις.** Est apostema humorem melli similem membrana conclusum habens. Species est apostematis; vt & *αἰθρήματα* & *στάσιμα*. Quorum hoc ab adipe, illud a pulicula intra membranam conclusa nomen habet. Sic & *μελικήεις* humorē continet melli Hymetto, vt scribit Galenus, similem, eumque membrana comprehendit, qui ea secta non aliter quam mel e fauis disfluunt. Sed dicitur eodem etiam nomine aliud vlcus genus quod proprie *μελιον* appellatum est, vt habetur apud Aetium libr. 6. cap. 68. similiter apud Celsum libr. 5. cap. 28. Neque enim dubium esse potest quin duae illae meliceridis species, quas Celsus descripsit, sint species *τὸ μελιον*, non autem *μελικήεις* a nobis prius descriptae, quae apostema est quaeque dissecta caputatem vnam habet, & intus vno loco atque spatio humorem suum continet, eumque non multis foraminibus, vt *μελιον* sed vno ore effundit, posteaquam ferro aut medicamento aperta fuerit. Est igitur *μελιμήκης* nomen aequiuocum; proprie quidem & frequentius tumorem prius definitum significans, interdum vero vlcus illud genus quod *μελιον* peculiari vocabulo diximus nuncupari, quodque a proprie dicta meliceride differt non modo notis prius explicatis, sed etiam quod *μελιον* non nisi pilosis locis, magisque ad cutem; *μελικήεις* vero pro more reliquorum abscessuum in omni musculculo possit excitari.

**Μελικρός.** legitur apud solum Celsum libr. 5. capite 28. pro vlcus genere quod non sic, sed *μελικήεις* solet vocari: & libr. 5. capite 26. pro saniei specie, quae crassior, glutinosior, sub-



albida, mellique albo subfimilis est, quamque ille scribit ferri ex malis vlceribus vbi nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca maxime ex genibus. Sed nihil simile apud alios auctores scriptum reperio, nec *μελικράτον* omnino dici animaduerti, vti neque *μελιμαίαν*, quemadmodum in quibusdam Celsi codicibus reperitur.

*Μελικράτον*. aqua mulla. Est aqua melle mista. Sed misturæ ratio multiplex est, nec vna certaque tradi potest. Quoniam enim non admodum vtilis est iis qui amaram bilem coaceruant, & facile in iis vertitur in bilem, nisi prius per intestina aut vesicam transeat, eiusmodi naturis diluitor dari debet, vt nec sitim adferat, nec bilem gignat. similiter iis quibus viscera scirrhus aut phlegmone, aut œdemate tentantur, aut aliquo morbo acuto laborant. Nam cum mel in iis tum propter moram quam in obstructis visceribus trahit, tum propter eorum ardorem protinus in bilem vertatur, eamque ob causam noceat, aqua autem tarde penetret & nimis diu moretur in hypochondriis, ex vtrisque mistum melicratum idoneum redditur ita temperatū melle & aqua, vt & facile distribuatur in corpus, & bilem non gignat nec sitim. Meracius vero exhibere conuenit, si alui deiectionem inolumur. Paratur autem vtrūque duobus modis: vnum crudum est, alterum decoquitur. Crudo vtimur cum aluum deiicere aut vomitionem incitare volumus. Probe autem coctum valentius alit. Coquitur autem ad hunc modum: Primum multum aquæ melli indimus (Paulus libr. 1. in octo partes aquæ vnæ mellis miscet) deinde tantisper coquimus, quoad spumare desinat. Spumâ autem, cum primum emergit, tollere ab eo oportet. Conuenit microsphythicis, tussientibus, peripneumoniacis & iis qui immodico sudore digeruntur. Est autem sciendum *μελικράτον* ἀπὸ τοῦ ὑδρομέλιτος sola vetustate differre. Est enim melicratum aqua nulla subita & recens, hoc est, ex tempore parata, hydromeli autem inueterata & recondita. vide *ὑδρομέλι*.

*Μελιμαίαν*. fertula Campana, siue ferta Campanica, herba est in Campania Italiae laudatissima nascentis. Triæ eius produntur genera: vulgare, statim ab radice fruticosum, cubitale, flagellis exilibus, comæ trifolii, minuta ac lente simbrata, flosculo melino, odoris eiusdem cuius & herba, nempe suavis, tereti ac per ramos diffuso semine: alterum aspectu cano, croci odore ac flore, pinguisimis ac breuissimis foliis: tertium simile fœnogræco, folio raro, semine in lunata siliqua, glauco, rotundo, infra sinapis amplitudinē, flore luteo, odorato. Nascitur vbiq; Græco nomine Gallis, nedum officinis, nobilior quam Latino. Diuerfis facultatibus pollet, adstringēdi, discutiendi & concoquendi. Ex ea epithema ad hepaticos præparatur, cuius descriptio habetur apud Aet. lib. 10. c. 6.

*Μελιμυλον*. pomum dulce. ventrem emollit, &

ab eo animalia expellit: sed stomacho negotium exhibet. Idem *γλυκύμυλον* etiam vocatur. A sapore melleo sic dictum est. Sunt tamen qui non omne quod dulce est, sed quod natum sit ex malo inserta pyro syluestri aut cotoneo, sic appellent. ex qua miscella creati dicunt quæ proprie Athenienses *μελίμυλα*, hoc est dulcia & mellita poma, nominant.

*Μελίμυλον*. sic dicitur interdum à Theophrasto & aliis quibusdam *ἐλάμυλον*, hoc est panicum, vt habetur apud Dioscoridem.

*Μελανόφυλλον*. herba est cauliculis & foliis ballote similibus, maioribus tantum tenuioribusque nec perinde hirsutis. ea citrum redolent: ex quo citraginem Romani vocauere, alii apiastrum: Galli melissam dicunt. vires easdem habet quas & martubium, sed imbecilliores.

*Μελανόφυλλον* etiam à quibusdam *πείλον*, hoc est apium, dici Dioscorides auctor est.

*Μελίτηνα*. herba est quam alii *μελίτθαναν*. alii *μελανόφυλλον* vocant.

*Μελιτιον*. nomen est *ἐπείου φαρμάκου*, hoc est aridi medicamenti, cuius auctor dicitur Oribasius à Paulo lib. 7. cap. 13. Eo Paulus lib. 4. cap. 40. vtitur ad implenda caua vlcera quæ pura fuerint.

*Μελιππίς*. est lapis dulci & mellito sapore præditus, sicut & galactites, sed plus quam hic caloris habet, atque ideo magis etiam abstergit. Dicitur fieri ex ramentis saxi calcarii in lapidem concretis, vt & galactites. Colore rufo flauoque est sicut chalcitis vsta & auripigmentum & sandaracha.

*Μέλκα*. edulii quoddam genus fuit apud Romanos, auctore Galeno, refrigerantis & humectantis. nec dubium quin lacte constaret, vt ex Paulo patet, atque Constantino Cæsare libr. 18. de agricultura, qui præterea docet melcam non aliud esse, quam lac repositum & reconditum in fictile nouum, feruenti aceto prius perfusum atque imbutum. Inde autem secretionē feri à crassiore lactis substantia fieri constat, quam per grumos con crescere verisimile est, eamque obsonii speciem fieri quæ Parisius *du lait caillé* dicitur. Species igitur est *τὸ ἐξ γάλακτος*, de quo suo loco.

*Μεμασμένον*. *μεμολυσμένον*, hoc est fœdatus, apud Hippocrat. sicut Galenus scripsit *ἐν ταῖς γλώσσαις*.

*Μεμολυσμένον*. collyrii nomen est quod habetur apud Celsum lib. 6. cap. 6.

*Μεμολυσμένον*. quidam refrigeratos, quidam induratos & lapideos interpretatur apud Hippocrat. vt refert Galen. *ἐν τῇ γλώσσῃ*.

*Μεμωρηκεν*. *συνέκλινεν*, id est conuoluit, apud Hippocrat. sumptum à lanis quæ nentur. Sicut apud Galen. *ἐν ταῖς γλώσσαις*. sed perperam. scribendum enim *μεμωρηκεν*, à verbo *μωρη*.

*Μεμωρημένον*, *τὸ ἀνιδόχτον*, id est, sensu carens, apud Hippocrat. vt scripsit Gal. *ἐν ταῖς γλώσσαις καὶ τὸ μωρησθὲν ἐμπροσθὶ τῇ ἀσπείρῃ*, hoc est, quod stultitiam mentinehit: vt explicat comment. *ὡς τὸ ἀνερρηκνόν*.

**Medicamentum.** vnguenti genus est Ægypto peculiariter, dictum a capro, qui ea Ægypti parte, vbi primum vnguentum istud repertum est, colebatur, quique *μῦσος* vernaculo sermone dicebatur. Dictum est & Ægyptii vnguentum, vti habetur apud Galenum lib. 2. *ἡ ἰατρικὴ*. Dioscorides scribit constare balabino oleo, myrrha, casia & resina, similemque metopio vim obtinere, sed inferiore multo. Cum Dioscoride consentit & Paulus Ægineta, qui eius compositionem apertius explicat, nisi quod ipsum inter malagmara recenset lib. 7. cap. 18.

**Μετακείμενα.** medicamenta localia: quæ & *πλάσμα* nominantur.

**Μέρη.** pars. Id dicitur quod totum complet atque integrat: vel; id quod totum diuiditur. Hæc quidem simplicissima est partis definitio: Est enim pars ex iis quæ ad aliquid dicuntur: quippe pars totius integrique pars dicitur, æque profecto vt totum & integrum per relationem ad proprias partes nominatur. Quicquid ergo totum complet atque integrat, id totius corporis quod complet particulam siue pars nominatur. Patet autem eam cum toto vnitam coniunctamque esse oportere. Cum autem aliz sint partis significationes, vt pro specie, proque differentia, de ea proprie agimus quæ totum integrat, vt ante diximus. Itaque cum totum quod medicus præsertim expendit & in suas partes diuidit, homo existat, partes proinde à medico dicuntur quæ totum hominem componunt, quas tamen non tam *μέλη* quàm *μέλα*, hoc est membra, priuatim quidam vocandas censent. Hinc quidem Hippocratis *ὅλον μέλη*, hoc est, integra & absoluta totius corporis ex membris compago, siue natura, cuius ille *ἡ φύσις ἀπὸ τῶν μελῶν* meminit. Verum cum nomen hominis æquiuoce dici possit, scilicet pro homine sano & vita fructe, proque humano corpore, siue ipsa corporea mole & structura, nulla habita vitæ ratione, primum id conuenit distinguere, quod diuersa sit ratio partium in homine sano aut ægro, viuente aut mortuo. Qui volet, ipsam tantum humani corporis formam & speciem contempletur, vt videtur fecisse Galenus lib. de vñ part. liceat tamen & totius hominis vitæ fruētis partes speculari, & eas reputare, quæ viuētem hominem componunt atque integrat, præsertim cum omnium partium actio atque vsus ad vitam referatur. Sic autem quicquid in humano corpore inest, sine quo viuere aut bene viuere non licet, id corporis humani partem vocare possumus. Quod enim à toto demere non licet siue totius dissolutione; id merito totius pars dicitur. Itaque humores & spiritus, quod iis demptis totus homo constare non possit, inter partes corporis humani annumerari quodammodo poterunt. Quod qui negant, humani tantum corporis speciem ipsam oculis subiectam intuentur, non etiam totum hominem, cuius non minima pars sanguis

videri potest: de spiritu indicium paulo difficilior est; quoniam totius corporis partes quoque corporeas esse oporteat. Sunt namque naturæ partes eiusdem cum toto suo generis. Fren tamen Hippocratis auctoritate eos etiam inter partes corporis habere possumus, qui totum diuisit in continetia, contenta, & impetum facientia. Sed iam humoribus & spiritibus omissis reliquas partes contemplemur, quæ corporis omnis tum viuētis tum vitæ carentis communes sunt. Eas in duo summa genera medici distinxerunt, vt aliz simplices, aliz compositæ, siue, quod idem est, aliz similes, aliz dissimiles dicerentur. Similes, *ὁμοειδή* dictæ à Græcis, in sibi similes perpetuo diuiduntur; partesque omnes tum totum tum inter se similes habent, vt os, cartilago, ligamentum, membrana, tendo, neruus, arteria, vena, caro, cutis: quibus adde si placet adipem, medullam, lac, semen & alia quæ sunt eiusmodi, si quicquid in corpore continetur, inter partes referri debeat. Eas Galenus propria hominis elementa quædoque nominat, alias prima corpora, quod scilicet ex iis consistit, quæ compositæ & dissimiles & organicæ nuncupantur. Compositarum autem maxima prorsus diuersitas est, & varia admodum ratio, siue ipsam compositionem spectemus, siue earum vsum atque actionem, quæ utique ipsis propria est, & à qua organicæ appellantur. Nam quamuis omnes æque ex similaribus partibus conflata sint, ipsarum tamen aliz ex seipsis etiam constituuntur, & sæpe organicam partem totius organi portionem quandam esse apparet. Sunt enim organicarum partium alia aliis magis composita. Quam rationem sequutus Galenus lib. de morb. differ. quatuor organicarum partium ordines siue differentias constituit, primo ordine eas collocans, quæ ex similaribus partibus coalescentibus vnus operationis gratia sunt compositæ, secundo vero quæ ex his rursus componuntur, etsi vni totius instrumenti actioni quam maxime deseruiant, tertio autem quæ iis adhuc magis compositæ sunt, demum quarto quæ totum ipsum organum comprehendunt. Verbi gratia, musculus, vena, arteria, neruus inter prima instrumenta connumerantur, digitus vero inter secunda, pes ex digitis constans inter tertia, postremo crus inter quarta, vt quod sit membrum summe absolutum. Pauca igitur eiusmodi sunt quarti generis instrumenta, caput, thorax, venter, duæ manus & totidem crura. Terti generis aliquot plura: ea autem sunt in quæ prima proxime resoluantur, vt in capite cerebrum, oculi, os, aures: in thorace, pulmō, cor, diaphragma, & quo ea concluduntur, thorax: in ventre, ventriculus, iecur, lien, renes, intestina, vesica, vterus: in manu humerus, brachium, manus: in crure, femur, tibia, pes. In secundo autem ordine permulta collocantur, ea scilicet in quæ tertii generis instrumenta pro-

xime resoluntur. Verum tamen difficillimū est vnicuique particulæ proprium ordinem assignare, præsertim in primis secundisque ordinibus. Quippe sunt aliqua quæ ambiguas vtrinq; notas habent, vt videantur tū ad primum tū ad secundum ordinem pertinere: oculi enim, ne longius abeas, proxime partes sunt humores & tunica. Sed hæc quo ordine locati debeant, incertum. Siquidem videntur simplicissimi generis esse, nec resolui posse in alias partes, proindeque primo ordine esse collocande: quia tamen partim ex meningibus, partim ex pericranio, partim vero & ex optico nervo coaluerunt, putare quis possit secundo ordini tribuendas esse. Verum in iis omnibus diuidendis diiudicandisque poterit quis per otium occupari. Ex his autem facile iam licet videre de quibus Galeni definitio intelligenda sit, qua instrumentum vocat quamlibet animalis partem quæ perfectam actionem edere potest. De iis enim quæ ad tertium, quartumque ordinem pertinent intelligi debet, non de iis quæ ad primum secundumque referuntur: nec proinde debemus ex ea de omnium partium natura iudicare, atque ad eam, veluti ad regulam, earum examen reuocare. Sic quidem se habet partium in similes & dissimiles diuisio. Præterea vero alia est à Galeno tradita in arte parua omnium partium communis, ad hunc modum: Partium, inquit, quadruplex est omnis differentia. Nam aliæ principia quædam sunt, aliæ ab his sunt ortæ: quædam nec aliarum gubernationi præsumunt, nec ab aliis gubernantur, vt quæ ingenitas vires habeant quibus reguntur, nonnullæ vero natiuas simul & aduentitias facultates habent. Talem quidem partium ab earum usu & actione distinctionem Galenus tradidit. Pro cuius explicatione notandum est, singularem partium secundum naturam usum aliquid esse, usumque ad actionem referri: actionis autem causam facultatem dici, eamque nihil aliud esse quam vim aliquam parti insitam, per quam agit id quod agere nata est. Adhuc notandum est gubernare siue regere, non aliud dici quam actionem aut opus edere per quod vita est, aut sine quo ea esse non potest: gubernari autem siue regi, esse ab aliquo primo & per se iuari ad eam actionem seu opus. Iam ergo facile est videre, quatuor illas principes partes à medicis celebratas, cerebrum, cor, iecur & testes gubernare, non autem gubernari. Sunt enim earum operæ toti corpori communia, tamque necessaria, vt per ea vita nostra sit, quæ tamen vt præstent, ne mutuis quidem operibus indigēt. Cerebrum enim sine aliarum partium subsidio à propria atque insita facultate spiritum animale gignit, cor vitalem, iecur sanguinem, testes semen. Quod si quis obiciat & cerebrum & cor & testes nutrum oportere, & proinde egere sanguine & ope iecinoris, satis illi fiet si intelligat cerebrum quidem beneficio iecinoris indigere ad sui conser-

uationem, nec eo tamen iuari primo & per se ad opus quod agit. Siquidem nutritio non est causa per quam spiritus animalis gignatur, sed potius per quam cerebrum & eius actio conseruetur. Similiter autem de reliquis principibus partibus iudicandum. Ac quoniam eorum opus tam est ad vitam necessarium, vt toto fere corpori debeat communicari, ideoque secunda partium differentia constituta est, ab iis scilicet ortarum iisque ministrantium, per quas veluti per canales quosdam partes reliquæ principum beneficio fruenterentur. Hæc sunt nervi, arteriæ, venæ, vasa spermatica, quæ reguntur quidem, non etiam regunt: præstant enim operam suam principibus partibus, estque earum opus pars quodammodo operis nobilium partium. Tertia vero differentia est earum quæ nec aliarum gubernationi præsumunt, nec ab aliis gubernantur, quod scilicet earum actio nec communis toti corpori habeatur & ad sustinendam vitam necessaria, nec primo & per se egeat partium principum beneficio. Ad eam referuntur, os, ligamentum, membrana, glandulæ, pinguedo & caro simplex. Ossium quidem præcipuus usus est partes sustinere & firmare, ligamentorum autem ea secum vincire atque continere. Quod quamvis corpori commodissimum sit, non tamen opus est toti commune, & ad vitam necessarium, vt eius causa ab iis putetur corpus gubernari. Sed neque ad id iuantur aliarum ope partium, vt quæ ingenitas vires habeant, à quibus munere suo fungantur. Quod enim os partem firmat, & ligamentum ossa coniungit, à se ipso habet, non autem quia nutritur, vt ante de cerebro & corde diximus: est enim earum omnium eadem ratio. Quarta demum differentia est earum quæ natiuas simul & aduentitias facultates habent, cuiusmodi sunt pulmones, ventriculus, lien, renes, vesica. Quod enim earum vnaquæque actionem propriam edat, à se ipsa suoque nativo temperamento habet, ita tamen vt principis alicuius partis subsidio indigeat. Quippe pulmones aerem expirant atque inspirant ab ingenita quadam facultate, quæ eorum temperamenti proprietatem consequitur, eaque propria est eorum actionis causa, ad eam tamen præterea vis quædam à cerebro accedit, quæ quamvis rationem causæ per quam respiratio est non habeat, obtinet tamen eius sine qua prorsus esse non potest. Est enim illi omnino necessarius thoracis motus. Idem de reliquis partibus iudicandum, quarum aliæ à corde, aliæ à iecinore influentem vim excipiunt, vt ad eas pertinentes nervi, venæ arteriæque declarant. Itaque ex partium gubernant, vt quæ usum habeant toti corpori communem, & sine quo vita esse non possit, partium etiam gubernantur, quod vim à principibus partibus manantem recipiant, sine qua opus suum perficere nequeant. Sic quidem partium diuisionem

à Galeno traditam multis explicatu difficilem interpretari visum est. Præterea vero alix quædam sunt earum diuisiones, vt in solidas & carnosas, sumpta ab earum substantia: sanguineas & spermaticas, à cuiusque origine, quod alix à sanguine, alix à semine gignantur.

*Μεσεντερικὴν μίρον.* species est œnanthatii anthore Possidonio, à quo hoc nomen adepta est. Describitur à Paulo lib. 7. cap. 21.

*Μεσέρριον.* idè quod *μεσεντεριον*. Siquidem *ἐρατὴ γαστήρ καὶ λεπτή ἐστί*, inquit Helychius: hoc est, venter & tenuia intestina. Dicitur & *ἐρατὸν τὸ λεπτὸν καὶ στενὸν*, id est tenue & angustum. Itaq; *μεσέρριον* dicitur, quasi in medio intestinorum tenuium vel ventre positum, non autem à raritate, vt quidam existimant.

*Μεσεντεριον.* Est corpus membranosum in medio intestinorum situm, venarum portarum ramos connectens. Nam quo firmitus esset, ex dura membranaque substantia constituitur. Est autem illigemina tunica, quarum vtraque à peritonæo iuxta lumbos exoritur & conuascitur, nisi qua venas & arterias continet, aut qua adeps multus intercessit, aut quæ ipsa intestina conuestiunt. Nam ecphysis à peritonæo, colon, quæ fundum ventriculi superuehitur, ab epiplooo posteriore vestitur. Illis autem in partibus intercedentia vasa, adeps & intestina, tunicas mesarum conuasci prohibet. Cæterum per eas venarum dispersæ sunt prope infinitæ, quibus tanquam manibus iecur succum ad se trahit, quæ in sanguinem vertat, easque tunicæ illæ fulciunt, ne dum homo salit, aut cadit, aut vehementius feritur, confundantur aut disrumpantur. Nec vero mesenterium venas modo continet, verum etiam arterias à magnæ truncæ, quæ secundum lumbos fertur: eas enim omnes simul amplectitur, conuestit & tuetur. Nec tamen eo contenta natura, ad maiorem horum vasorum munitionem adipem multum mesenterio indidit, præterque adipem glandulosum corpus, quod *μυρρίδιον* vocant, machinata est, eoque medias eorum vasorum scissuras comuniuit, ne propter infirmitatem motionibus violentis læderentur. Gaza mesenterium passim apud Aristotelem lactes interpretatur. Id quod ab eo nimis licenter factum esse Hermodæus Barbarus scribit Plinium secutus, qui lactes appellauit molliora intestina, quæ primum in homine & oue occurrant, per quæ cibus labitur. Sed Gaze Budæus patrocinarur. Siquidem lactes non tam intestina, quam pingue illud quod ea ambit, significant. Nostrates in piscibus lactantias vocant. Alio nomine *μεσεντεριον* à Græcis *μεσέρριον* dicitur: vtroque nomine, vt scribit Gal. lib. 6. *ἢ ἀπὸ μέρους ἢ ἐκ ἐξουσίας*, ab accidentibus ipsi indiro: *μεσεντεριον* quidem à situ, *μεσέρριον* autem à peculiari substantia, quod & medium inter intestina situm est, & omnes venas ex iecore ad ipsum descendentes vna

cum vicinis arteriis & nervis in orbem conplectitur, quemadmodum intestina singula.

*Μεσόδμη.* significat apud Hippocr. obstaculum trabis lignæ, domum vnâ in duas partes separantis, veluti columnam quandam in medio positam. Quidam autem & superpositum testum *μεσόδμη* vocant, vt scribit Gal. *ὡς ἡ γυνή*.

*Μεσίσταρον.* ἢ κεροφῆ. hoc est vertex.

*Μεσεντερικόν.* nomè est ab Hippocrate usurpatum lib. 6. *ἢ ἐπὶ τῇ*. quod Galenus mesenterium interpretatur, partis vocabulum protoro accipiens. Sed proprie eo nomine videtur designari pars ea mesenterii, quæ crassius intestinis continua est, vt quæ pertinet ad tenuia intestina: posset, si vltus ferret, *μεσεντεριον* nuncupari. Et reuera sicut duæ summe sunt intestinorum differentie, tenuium & crassorum, ita bipartitum videtur mesenterium, vt eius loci comment. Galenus ostendit.

*Μεσολύκον.* sic dicta est à quibusdam ἢ λέοντι herba, quod per medium eius folium cæcida linea tranfcurret.

*Μεσμφαλον.* idem quod *ὀμφαλός*, vmbilicus.

*Μεσεντερικαὶ μύες.* sunt musculi inter medias costas siti. Hi numero sunt quadraginta quatuor, vtrinque videlicet duo & viginti. Horum autem vndecim interni, & totidem externi sunt, bini scilicet in singulis costarum interuallis, quæ vndecim in alterutro latere sunt. Externi quidem singuli in singulis costarum interuallis oriuntur, & fibras habent ex superiore costa in inferiorè oblique deductas. Interim vero contrario & oriuntur & procedunt modo originem quidem ex inferiorè costa ducentes, & oblique sursum in superiorem protensi, & externos vbiq; in X literæ formam interfecantes. Cum autem eiusmodi fibras eoque modo protensas habere hi musculi dicuntur, intelligendum est de spuriarum quidem costarum interuallistotis: verarum autem costarum nō totis, sed ad eam tantum costarum sedem vbi in cartilaginem degenerant. Siquidem inter verarum costarum cartilagineas, vtrique musculi intercostales villorum situm prædicto contrarium sortiuntur, vt propterea vnus idemque musculus inter verarum costarum cartilagineas situs, non vnus sed geminus plarisque existimatus fuerit. Cæterum vt gemina est musculorum intercostalium differentia, ita & geminus vsus. Externi thoracem dilatant ad inspirationem: interni vero eundem contrahunt ad expirationem.

*Μέσος δακτύλος.* medius digitus. Hic habitus est apud veteres omnium despectissimus. Nam cum reliquis sit longior & in medio situs, velut deses & ignauus notatus est. Ideo prisci motus fuit, vt, si quos aliqua contumelia aut conuulsio afficerent, iis medium digitum reliquis contractis protenderet: vnde Martialis



*Rideto, & digitum porrigito medium*

Idem impudicus ab eo dicitur alio versu,

*Ostendit digitum sed impudicum.*

& infamis apud Persium. Eadem ratione *καταπόνη*, quasi cinzedus & scortum, ab Atheniensibus appellabatur. Similiter quidā ex Latinis verpum, à verrendo podice, eum nuncuparunt.

*Μετωπρος*. dicitur, auctore Rufo, pars ea quæ inter ambo supercilia media est, ad frontis finem supra nasum sita. Ea etiam *μετωπιν* dicitur. Virumque nomen à situ inditū: Martianus Capella lepide glabellam vocavit, quod ea pars glabra sit & depilis.

*Μεσπλος*. mespilus. Arbor est mali vulgaris altitudine inferior, ramis in gyrū comosis, spinosisque, folio promisso, tenui & longo pediculo, flore subherbaræo, amygdalæ forma, fructu dum pubescit viridi & duro, ubi maturuit fulvo ac molli, circa verticem cristato, tribus quatuorve intus nucleis, radice numerosa, materie dura, solida, cariei minimum obnoxia. Plinius Theophrastum sequutus, tria eius genera recenset, anthedona, serania, & (quod degenerare tradit) Gallicum: intelligens forte quod apud nos invenitur pumilus, cum veteres mespilo proceritate tribuerint. Dioscorides duplici genere contentus est: quorum tamen primum longe discrepat à nostrate mespilo, crediturque à Marthiolo in Italia azarolo nominari. Serapio sorbum esse putavit. Mespilorum fructus admodū acerbus est, vixque edi potest, ventrem strenue coercens. Quin & in germinibus & foliis acerba hæc qualitas non pauca reperitur.

*Μετ. præpositio* est qua Hippocrates omnibus in libris *μετὰ τὸν* utitur Ionum more, ut Galenus annotavit *his τὸ μετὰ διατὸς ὅλιν*, comment. 3.

*Μετακαρπιον* vide in dictione *εμπυριον*.

*Μετακαρπιον*. postbrachiale vulgo: Latiniis palma. Est pars summæ manus inter carpum & digitos sita. Ea Aristoreli, Rufo & Celso quinque constar ossibus: Galeno autē quatuor. Verum illi tertium os pollicis metacarpio adscribunt: hic vero pollicem, quem eodē modo quo & reliquos digitos tribus ossibus constare par est. Verum non sine ratione id os pollicis infimū tertiumque metacarpio annumeratur, propterea quod non aliter quā reliqua quatuor ossa metacarpii (nisi quod hæc per synarthrosim, illud vero per diarthrosim) carpo inarticulatur, cum tamen infima aliorum digitorum ossa metacarpio per diarthrosim alligentur, non etiam carpo. Sunt autem quatuor illa metacarpii ossa reliquis digitorum ossibus longiora, & magna ex parte teretia. Discedit autem ab invicem satis longis intervallis, in quibus plures musculi collocati sunt, qui digitos moveant. Ceterum metacarpii duæ sunt partes, interior & exterior. Interior, ut videtur Rufo, *ἡσας* dicitur ab Hippocrate, ab aliis *κατὰ τὴν*: exterior vero *ἐκτὸς*.

*Μετακαρπιον*. τὸ μετὰ τὸν *καρπὸν*. hæc est commissio, apud Hippocratem *μετὰ τὸν καρπὸν*, ut annotavit Galenus *ὁ τὸ μετὰ τὸν καρπὸν*.

*Μετακαρπιον*. dicitur, ut scribit Rufus, postremi digitorum articali, vnguibz proximi. Nam medios digitorum articulos *κατὰ τὸν καρπὸν* ait vocari. Itaque quod his illi posteriores sunt, *μετακαρπιον* appellatur, ut & primi *κατὰ τὸν καρπὸν*.

*Μετακαρπιον*. est species una tensionis quæ à superiori laqueo glossocomi perficitur, de qua vide in dictione *γλωσσόκομος*.

*Μεταλλικά*. dicuntur ea quæ in metallis generantur, siue sponte naturæ siue per fornacem producantur. Omnia dicuntur duobus constare principiis, sulphure ut patre, & argēto viuo ut matre (chymista spiritū foetentē & aquam viuatam seu siccam *ἀργυροειδὴς* appellant) vario modo secum mistis & in terræ visceribus concoctis. Perfectissime quidem commista coctaque aurum gignunt, deinde argentū: quorū illud, maris, hoc formæ ratione habere dicitur. Cōtra vero si ipsa principia impura sint aut *ἀνέλεος* mista, si minūs recte in parentis visceribus coquantur, aut affluente visioso humore alatur, pro auro & argento cuprum, ferrū, stannū aut plumbū pro creabitur. Hæc sunt quæ metallica maiora appellantur à cōtericis, omnia ductilia & liquabilia: quorum aurū & argentum, perfecta, reliqua quatuor imperfecta dicuntur. Ab iis vero etiam alia sunt quæ media seu remota vocantur, nec habentur inter verè metallica, sed veluti quædam subuentanea aut molæ censentur, quod sulphur & argento viuo consent non exacte secum mistis: ut sal ammoniacus, arsenicum, auripigmentum & sulphur quæ non tam metalla quam metallorum summi vel spiritus dicuntur, propterea quod facile in spiritus & aerem visiginis solvantur, & rubro aut albo colore corpora inficiant. Ab his præterea sunt alumen, vitriolum & alia pluraque quibus etiam accedit tertium genus metallicorum quæ ex illis homines conficiunt, velut est cerussa, ærugō, sandyx & istis similia.

*Μεταμορφωσις*. est exiguorum meatuum status mutatio. Nomen est Methodicorum proprium, idem plane indicans potestate quod *μεταμορφωσις*, de qua vide paulo post.

*Μεταμορφωσις*. meatuum statum transmutare. *μεταμορφωσις*.

*Μεταμωσις*. transitus siue transmutatio in aliam speciem. Sic dicitur plæræque febres & *μεταμωσις* factæ, ut quæ ex acutis non acutæ fiunt, nec febres modo, sed omnes etiam alii morbi qui ex priorē specie in aliam degenerant & transeunt, & *μεταμωσις* fieri dicuntur.

*Μεταπρην*. ὑψάλον, hoc est sublime, apud Hippocratem, ut annotavit Erotianus.

*Μεταπρην*. est exiguorum meatuum in naturalem statum mutatio. Nomen est à Methodicis, ut ait Galenus, nec clare nec prudenter usurpatum, idem plane indicans potestate quod *μεταμορφωσις*. Cum ergo illi



existimarent ex corpusculis & meatibus corpora nostra constare, & in exiguum meatuum symmetria sanitatem, in ametria morbum constituerent, reditum ad pristinam meatuum symmetriam *μετασχηματισμὸν* appellabant. Nam & ipsam meatuum compositionem *συστήματα*, & *συστήματα* *τῶν σωματικῶν ἀναπνεύσεων*, quasi misceri secernique corpora, dicebant. Medicamenta vero quæ id præstaret, *μετασχηματισμὸν* nominabant: quod nomen quamvis à Methodicis profectum, postea celebres etiam medici usurparunt. Sunt autem ea primis quidem qualitatibus caliditas & exsiccantia: secundis vero cutem relaxantia, ex profundo attrahentia, & habitum corporis aut partis cui adhibentur immutantia. Eius generis est thapsia auctore Dioscoride, & sinapi, & plerique dropaces, singinaria ptilothra: ad hæc varia gestationum genera, deambulationes, vociferatio,unctiones, cucurbitula, vomitus à radícula, & alia quæ à Paulo Ægin. recensentur lib. 3. cap. 63. de fluxu muliebri.

*Μετὰ πρῶτον*, quid proprie sit, non satis est à veteribus explicatum. Verisimile est ex ipso erymo, eam dorsum partem significare quæ ad septum transversum sita est, quasi *τὸ μετὰ τὰς φρένας*. Sic enim veteres septum transversum appellarunt. Rufus in libello quem edidit de partium hominis nomenclatura, definit *μετὰ πρῶτον* esse *τὸ μετὰ τὸν κόλπον καὶ τὸν σπλῆν*, id est, partem inter dorsum & lumbos mediam, qua renes adiacent. Nectamen inter partes spinæ numeratur, quam veteres totam diuiserunt in cervicem dorsum, lumbos & os sacrum.

*Μετὰ δεύτερον*, idem quod *ἴσπιν*, apud Hippocratem *τὸ μετὰ τὸν σπλῆν*. Erotianus tamen *ἰσπιν* interpretatur, citatque authorem Herodotum *ἰσπιν* scribentem, *τὰς ζυγὰς μετὰ δεύτερον καὶ τρίτον*.

*Μετὰ τρίτον*, sublime, quod nomen doloribus accommodauit Hippocr. aphor. 7. libr. 6. scribens, *ἀνὰ πλάτος τῆς κοιλίας μετὰ τρίτον*: hoc est, dolores ventris sublimes. Sic autem dicuntur non in imo ventre cõditi, sed qui externas partes, vt musculos epigastrii, exercent, & sunt positi extra peritonæum. Idem vero etiam *μετὰ πρῶτον πνεῦμα* dixit *τὸ μετὰ πρῶτον πνεῦμα*, & in libris 7. *Ἐνδομυῖον* cum multis in locis, tum lib. 3. in historia mulieris angina laborantis, de quo in eius loci explicatione ita Galenus edisserit: Primum quidẽ Sabinum interpretatum esse *τὸ μετὰ τὸν σπλῆν*, hoc est, summa nare factam respirationem. quam tamen interpretationem Galenus non probat. deinde vero *τὸ μετὰ πρῶτον πνεῦμα*, duobus modis intelligi posse. vno quidem inspirationem toto thorace facta, siue in qua totus thorax attollitur & *μετὰ πρῶτον πνεῦμα*, qualis contingit asthmaticis & morientium plerisque, diaphragmate iam non valente inspirationem perficere, sed omnibus musculis vna operam suam dilatando thoraci dicantibus, altero vero eam quæ nõ

nisi recto thorace fieri potest. tunc enim ægri coguntur *μετὰ τρίτον πνεῦμα*, hoc est erigere sese, quia nisi recta ceruice spirare non possunt: secundum quam significationem *μετὰ πρῶτον πνεῦμα* non est aliud quam *ἰσπιν*, ab Hippocrate in lib. progn. explicata. Tertiã ab his *τὸ μετὰ πρῶτον πνεῦμα* interpretationem, videtur Galenus ponere lib. 3. *ἀπὸ διέσπινος*, sed eam quidem ex sensu potius quã medica ratione depromptam: vt sic dicatur ab Hippocrate spiritus qui ad fauces modo penetrare, atque in iis subsistere, non autem in imum thoracem subire videatur. Est autem ea inspiratio *μετὰ τρίτον* ab Hippocrate dicta, parua atque frequens, vt Galeno placet, non autem magna, sicut plerique iudicant, ex magna thoracis dilatione: quanquam nihil vetat eam etiam magnã esse, vt ex scriptis Archigenis apparet, quæ Galenus *ἰσπιν*, libr. 9. cap. 1. recitat, quibus ille suadet certum quoddam pharmaci genus istericis exhibendum esse post deambulationem & frictionem, *ἐν μετὰ πρῶτον πνεῦμα*. Nam quamvis asthmaticis, orthopnoicis & synanchicis propter meatuum obstructionem spiritus necessario paruis & frequens est, attamen ubi partes ex libera sunt atque ab humore vacuæ, aucto post exercitatione calore, necesse est magnam fieri respirationem, nec ad eam solum diaphragma sufficere, sed præterea opus esse omnium musculorum auxilio, vt thorax multum dilatari atque in sublime attolli possit.

*Μετὰ πρῶτον*, autumnus. vide *φθινόπωρον*.

*Μετρητὴς*, metreta, cadus. Mensura est liquidorum apud Atticos maxima capies *χάας* duodecim, siue libras mensurales centũ & octo. Eam Fannius Atticam amphoram appellauit his versibus:

*Attica præterea dicenda est amphora nobis,  
Sen cadus. hanc facies, nostra si adisceris vrnã.*

Ex quibus apparet Atticam amphoram capere amphoram Romanam & vrnã, & Romanam ab Attica magnitudinis differentem esse. Itaque qui accuratius scripserunt, non simpliciter *μετρητὴς* dixerunt, nisi cum Atticam intelligerent. cum enim Romanam intelligebant, Romanam vel Italicam addebant: sicut Dioscorides in descriptione vini scillitici, *καὶ ὁ σκίδης ἀπὸ τῶν μέτρων καὶ ἀναστρέφεται μὲν τὴν ἰταλικὴν εἰς γλῆκους καὶ τοῦ μετρητῆν ἰταλικὸν καὶ μὲν εἰς ἑξήκοντα*, hoc est, scillitice dissectæ & repurgatæ tres minas in Italicam metretam multi demittito, & sex menses finito. hic enim metretem Italicam appellauit amphoram Romanam. Idem & *μετρητὴς ἰταλικὴ* dixit in vino absinthite. A Latinis metretem dici cadum ex Dioscoride & Plinio perspicuum est. Vbi namque apud Dioscoridem *μετρητὴς* legitur, Plinius cadum conuertit, vt quo loco Dioscorides vinum è labrusca factitium describit, qui totus locus à Plinio in Latinum versus est. libr. 14. cap. 16. In quo tamen aduertendum est, non omnem ampho-

nam cadum dici, sed Atticam modo, cum Plinius cadi nomen non soleat usurpare, nisi Græca in sermonem Latinum transferens, vel de vinis Græcis loquens. Eadem mensura etiam alio nomine à Græcis *μεδίου* appellatur, ut author est Hesychius: & *σάμπος* siue *σάμπος*, ut habetur apud Aristophanis interpretem in Ranis. Nec vero semper, ubi metretæ nomen apud authores occurrat, mensuram hanc modo isto definitam intelligere oportet, sed simpliciter aliquando vas magnæ cuiusdam capacitatis, nulla certa definitum mensura.

**Μετρη.** mensura. Est quæ tum liquorum, ut olei, vini, aceti: tum rerum aridarum, ut frumenti & leguminum molem metimur. Verum non simplices, sed variegatæ olim fuerunt mensuræ, singulis videlicet nationibus suæ, sed nullæ tam secum cōgruentes quam Romanæ cum Græcis. Differunt tamen & illæ inter se plurimum, quod aliæ humidiorum tantum, aliæ siccorum, aliæ amborum indifferenter existerent. Erant autem apud Romanos liquidorum mensuræ istæ: Culeus capiens amphoras viginti. Amphora vinas duas. Vrina congiōs quatuor. Congiō sextarios sex. Sextarius heminas duas. Hemina quartarios duos. Quartarius acetabula duo. Acetabulum sesquicyathum. Cyathus ligulas siue cochlearia quatuor. Ambigua autem siue communes tam liquidorum quam aridorum mensuræ erant: Libra, quæ siue mensura siue pondus esset, vncias duodecim continebat: & vncia, quæ duas semuncias: adhæc sextarius, qui libram & bessem, hoc est, vncias viginti mensurales, comprehendebat. Aridorum vero mensuræ istæ fuerunt: Modius capiens duos semodios, Semodius sextarios octo, Sextarius heminas duas, Hemina acetabula quatuor, Acetabulum sesquicyathum, Cyathus ligulas quatuor. Apud Græcos autem etiam diuersæ fuerunt. Si quidem aliæ Atticæ, aliæ Ephesicæ, aliæ Alexandrinæ: tum aliæ Medicæ, aliæ Georgicæ, aliæ etiam Hippiatricæ. Verum Atticæ & celeberrimæ & frequentiores in authoribus occurrunt, præsertim autem in medicis, cum fere Attica obseruatione, ut scribit Plinius libr. 21. cap. ultimo, medici utantur. Itaque Atticæ siue medicæ mensuræ, sicut & Romanæ, duplices fuerunt, liquidorum & aridorum. Erant autem istæ liquorum: *μετρητής*, capiens *χάρις* duodecim: *χάρις*, capiens *ξίνας* sex. *ξίνας*, capiens *νοτιάς* duas. *νοτιάς*, capiens *νίπλε* duo. *νίπλε*, capiens *ἑξήκαρον* duo. *ἑξήκαρον*, capiens *κιάδος* vnum & dimidium. *κιάδος*, capiens *κάρχας* duas, siue *μίστρα* quatuor, aut *χάμας* quinque. *χάμας*, capiens *κοχλιδέα* duo. Rerum vero aridarum hæc quæ sequuntur: *μείδιον*, continens *χάριτας* quadraginta octo. *χάρις*, tres *νοτιάς* aut *ξίνας* vnum & dimidium. *ξίνας*, duas *νοτιάς*. *νοτιάς*, quatuor *ἑξήκαρον*. *ἑξήκαρον*, sesquicyathum. *κιάδος*, decem *κοχλιδέα*. Atque hæc in usu medicis maxime fuerunt. Præterea vero et-

iam rusticis peculiare quædam mensuræ fuerunt dictæ Georgicæ, & hæc duplices, liquorum scilicet & aridorum. Ac liquidorum quidem istæ: *μίστρα*, capiens *ἀμφορίδας* duos: *ἀμφορίδας*, capiens *χάρις* quatuor: *χάρις* *ξίνας* nouem, siue *νοτιάς* duodecim: *νοτιάς*, *ἑξήκαρον* quatuor: *ἑξήκαρον* *κιάδος* vnum & dimidium: *κιάδος* vero, *μίστρα* quatuor. Quæ quidem omnes Georgicæ mensuræ videntur ad medicas proportionem habere sequaliteram, ut scriptum est à Georgio Agricola. Aridorum vero fuerunt hæc apud agricolas mensuræ. *μείδιον*, capiens *ἡμισάμπος* duos, *νέκας* tres, *ἑκτάς* sex, *ἡμίκα* duodecim, *ἡμισάκα* viginti quatuor, *χάριτας* quadraginta octo: *χάρις*, capiens *νοτιάς* tres: *νοτιάς*, capiens *ἑξήκαρον* quatuor: *ἑξήκαρον*, cyathum vnum & dimidium: *κιάδος* *μίστρα* quatuor. Reliquas mensuras persequi inutile fuerit, nihil ad propositum nobis scopum pertinentes.

**Μετρη.** à nonnullis dicitur galbanum, ut scribit Dioscorides: dicitur & eodem nomine, ut idem scribit lib. 1. vnguenti quoddam genus in Ægypto, quod ab Hippocrate *αἰνυλίον μίσρον* dicitur, ut scribit Galenus in explicatione vocû Hippocratis, atque sic appellatur propter galbani mistionem: nam lignum, inquit, in quo galbanum nascitur, metopium vocant. Est igitur metopium tum arboris tum succi ex ea manantis nomen. Ponitur etiam aliquando *μετρητός* *αἰνυλίον* *μετρητός*, hoc est, pro fronte.

**Μετρη.** frons. Est pars faciei supra oculos sita & ad tempora vsque protensa, substantia musculosa & osse subiecto constans. Omnibus quidem frontem supra oculos situm esse constat, & utrinque ad ossa temporum desinere, verum quam altus sit, non item. Aliis enim frons tantum dicitur quantum inter supercilia & capillos patet pilis nudum. Alii vero totum id spatium quod ab oculis ad coronalem vsque suturam interiaceret, frontem appellant, quod totum illud os frontis nominetur. Id à superiore quidem parte suturæ coronali, ab inferiore vero ex suturâ quæ capiti cum gena superna communis est, à lateribus autem osse sphenoidæ terminatur. Non est autem vniûsmodi, sed in superna oculorum regione, quam totam constituit, tenuissimum, duabus tamen squamis coagmentatum, ad supercilia & nases canum, aere plenum, ad tempora tenue, solidum, in fronte crassius, densius ossibus bregmaticis prope quæ tenuius & ob raritatem infirmius quam in fronte. Ad conuersum autem obelæ suturæ cum coronali mollissimum rarissimumque est, ceu corporis totius infumibulum, ut etiam pueris mandentibus & respirantibus diu mobile appareat. Est autem ei superposita substantia quædam musculosa, siue carnosa membrana dura & sicca ex multis carnosissimis fibris confata, cutem habens ita secum unitam, ut vna eademque sit amborum substantia. Pars enim substan-

et illius musculosa superficialia, ipsi cutis efficitur. Id quod nulla alia in parte totius corporis contingit, ut docet Gal. libr. 11. de usu partium. Itaque cutem ab ea eximere non licet, sicut ab aliis partibus, in quibus cutis à subiecta carne diuersam habet substantiam. Ob id sunt qui substantiam illam non musculum, non carnem, sed cutem musculosam appellant. Ceterum inter eam & os frontis tunica pericranios intercedit, verans ne illa cranio adhærescat: neque enim adhærescere oportuit, propterea quod cranio immobili existente, ipsam moueri oculorum gratia conducebat. Itaque ea sola cutis motu voluntario prædita est, neque fere in toto corpore alia est, quæ osse suo quiescere motreatur. Græci *μεσημεριδιον* & *μεσημεριδια* peculiari vocabulo nuncupant, & quæ in ea rugæ sunt, *μεσημερια*.

**Medica.** herba est foliis & caule trifolio praten- si similis, procedens vero folia contrahit, cau- les edens trifolii & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis ma- gnitudine dependet. Galligrande tresson, quasi trifolium vocant, alii Burgundien- se fenum.

**Medica sativa.** sic dicitur malum Citrium, quod in Media præstantissimum nascitur. arbor est pomifera omnibus anni temporibus, aliis pomis deciduis, aliis subnascens. ma- lum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum, semine habet pyri.

**Medica.** medium, planta est folio iridis, caule cri- cubitali, in quo flos grandis, purpureus, ro- tundus, semen habet crisci, minutum: radi- cem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Eius radix vires semini contrarias præ se ferre proditur: austera enim est & ad- stringens, cum semen tenuis incidentisque sit facultatis.

**Medica oppidica.** *μεσημεριδιον*, hoc est, papauer spu- mosum, commendatum ab Aetio in potu contra viperas, fortasse quia vomitionibus probetur.

**Medica.** papaver. herba est, cuius quatuor pro- duntur differentie: vnum sativum siue hor- tensense est, quod *σατιβιον* vocant, cuius tria ob- seruant genera: primum capitale longo & semine candido, quod panibus sanitatis usu inspergitur, vel tostum in secunda mensa bel- larii modo editur: secundum cui caput infi- dens demissumque est, & semine nigrum, quod *μεσημεριδιον* vocatur & *μεσημεριδιον*, quoniam eius scapo lacteus succus emanat: tertium magis sylue- stre, multo hoc longius & productiore capi- tulo. Alterum genus papaveris erraticum est, quod *μεσημεριδιον* proprie vocat, quia flos eius proinus decidit. Id in aruis cum hordeo nascitur foliis eruce, aut origani, aut cicho- rii, aut thymi, sed longioribus, diuisis, scabris: iuueus ei caulis, rectus cubitalis, asper, flos sylvestris anemones, puniceus, interdum al- bus, oblongum caput, sed quam anemones minus: semen rufum, radix longa, subalbida,

minoris digiti crassitudine, gustu amara. Tertium est quod *μεσημεριδιον* siue corniculatum dicitur, folio candido, hirsuto, verbasco si- mili, in ambitu sylvestris papaveris more ferrato, caule non dissimili, flore pallido, ca- lyculo fœnigræci in corniculorum modum inflexo, semine papaveris pusillo nigroque radice per summa cespitum nigra, crassa. Quar- tum *μεσημεριδιον*, hoc est spumeum, dictum est, foliis admodum parvis, radicula similibus, fructu inter ea candido. Totum colore can- dido spectatur & spumeum, vocatur ab aliis *μεσημεριδιον*.

**Medica.** succus papaveris, qui etiam *μεσημεριδιον* alio nomine vocatur. Sunt tamen qui ea distin- guant, Plinium sequuti qui libr. 20. cap. 18. scriptum reliquit cum capita ipsa & folia pa- paveris decoquantur, succum meconium vocari, multo opio ignauiores. vide *μεσημεριδιον*.

*μεσημεριδιον*, etiam apud Hippocrat. significat *μεσημεριδιον*, quem etiam *μεσημεριδιον* appellat, ut annotauit Gal. in *μεσημεριδιον*.

**Medica.** lactuca atræ, amaræ & lactetis quod- dam genus, sic dictum à copia lactis sorpori- feri, quo somnum inducit non aliter quam *μεσημεριδιον*. Quamquam enim omnes lactuce somnum parere credantur, hoc tamen illa potissimum præstat. Apud antiquos Italix, inquit Plinius, solum hoc genus lactucarum meconidum fuit, à quibus omnes lactuce nomen adeptæ sunt.

**Medica.** apud Aetium libr. 15. lactuca est quæ supra *μεσημεριδιον* diximus nominari.

**Medica.** *μεσημεριδιον*, hoc est oites, apud Hippocr. sicut Gal. in *μεσημεριδιον* annotauit.

**Medica.** fraxinus. Arbor est procera, caudicete- reti, læui cortice, spisso, tenui, rubro, ramis utrinque pinnatis, foliis lauri, per ambitum leniter serratis, non sine quodam marginis vel cacuminis aculeato callo, porracei colo- ris, semine minuto foliis ipsis incluso, ama- ro, radice multa, crassa, & sublimi. Græci duo genera eius fecere, excelsum procerumque ligno candido, molliore, crispiore, neruoso, enodi: alterum humilius, scabriore, duriore, fuscior. Valla apud Homerum *Ιλιάδ. v. μέλας* prunum reddidit, nescio quem authorem sequutus. Galli fresnam nominant,

**Medica.** specillum, instrumentum chirurgicum quo aliquid illinitur, vel finditur, vel extra- hitur, vel infunditur. Quæ cum varia sint, eorum varietas adiuncto distinguitur. ut *μεσημεριδιον*, specillum latum, seu potius specilli al- tera pars lata, instar spathe siue gladii, quo chirurgi vel vnguentum diluit, & miscent, vel ægris oblinunt, vel super alutam aut lina- menta expandunt. id Hippocrates *μεσημεριδιον* nuncupauit, *μεσημεριδιον* vero, quod priuatim auribus repurgandis destinatum est, & quod quidam ab Hippocrate *μεσημεριδιον* dictum esse scripserunt. *μεσημεριδιον* *μεσημεριδιον*, specilli extremum cōcauum in formam *μεσημεριδιον*, quo aliquid vel extrahi, ut per auriscalpiū, vel etiam infundi potest. Nam cum specillū duob. extremis cōstet, alterum fere

fere semper latum est, alteram vero diuersa figuræ. Si concanum est, *καδίκος* appellatur: si rotundum est, *πυλω μάλης*, hoc est specilli nucleus: si fissum est, vt aliquid apprehendi & extrahi possit, *εγχε* nuncupatur. Celsus omnem eam partem vno nomine auersum specillum dicit. Quod vero priuatim vulneribus accommodatur specillum, Hippocr. *μάλιον ἰσχυρὸν*, hoc est specillum vulnerarium, appellauit, sicut Gal. *ἐν ταῖς γλῶσσαις* annotauit.

*Μελίαι*, ἢ *ἀπὸ Μήλης τῆς γῆσου*. quæ est à Melo. Cognomen *ἡ χαλκίπρος ἢ εὐπληείας* apud Hippocratem. Eiusmodi enim alumen secundum Ægyptium valentissimum erat. Est autem Melus insula Coo proxima.

*Μελίνη ἢ μπιπασρος*. melinum emplastrum. sic dictum à colore mali cotonei, cuiusmodi esse solet in quo ærugo mediocriter coquitur, vt docet Galenus. Nam ex cruda viridis color, ex ea vero quæ plus æquo cocta est emplastrorum genus emergit quod & *δραχμην*, & *διωρόσμεν*, & ab aliis *κίρρον* vocatur. Verum plurima emplastra à veteribus *μήλικα* appellata æruginem non habent: itaque sic ea dicuntur vel quod ex varia mistura coctionisque modo prædita sunt eodem colore, vel quod vires habeant easdem, quas Galenus libro 1. *τῶν κατὰ τῆς* definit, vt non adeo magna vulnera glutinent, & vlceribus cicatricem obducant, quæ à medicis *ἀμελίσματα* dicuntur, quæque ex rosaceo liquefacta, caua vlcera carne replent. Crito à coloris similitudine eadem emplastra *πῆληα*, hoc est buxea, appellauit. Vt autem is inducatur, vbi bene solutis reliquis medicamentis cacaibus ab igne eximendus est, immitti ærugo debet, & tantisper postea coquendum lentissimo igne, dum melinus color representetur, sicut Menætus & Serapio docuerunt.

*Μελόχαρπις*. cognomen est aristolochiæ longæ quæ mascula dicitur, propterea quod florem ferat, cum dehiscere cœperit, pyro similem.

*Μήλον*. malum. Id est quod Galli quoque & Itali pomum vocant, cuius flores, folia & germina adstringunt. Plures eius species recenset Dioscorides: quas commemoratas ab eo videre licet lib. 1.

*Μήλον*. mala gena. Pars est faciei, inter nasum & aurem sub oculo leuiter eminens. Ea pilis nuda est, non modo propter os subiectum, sed etiam ad ornatum & decorem vultus, quodque natura voluerit eam esse sedem pudoris, ibique maxime ostendi ruborem. Sic dicta est à mali similitudine, siue rubeam mali colorem spectemus, siue rotunditatem, quam illi natura donauit, vt sic oculum ab externis iniuriis infra taretur: ideoque Hippocr. lib. 1. de morbis non illepide malas *κίρκους* *μεσώσμεν* appellauit, vt author est Galenus *ἐν τῇ ἐξηγήσει*. sub ea laxior pars est quæ bucca dicitur à Latinis, à Græcis autem *παρὰ τὴν ἔσχατον μέσος, ἥμισυ*. Pol-

lux etiam author est *μήλα* vocari tonsillas duas penitiores, in intimo ore positas ad radicem linguæ.

*Μήλον*. est oculi procidentia iam inueterata, atque adeo aucta vt etiam palpebras excedat. Sic dicta à mali similitudine, quod ita promberet oculus, vt malum extertum appareat. vide *μεσώσμεν*.

*Μελόπεποις*. melopepones. Species sunt cucumerum, qui cum magnitudinem excessere, pepones Plinio vocantur: cum vero rotundi formam & effigiem mali referunt, tunc facti ex pepone & malo nomine, melopepones dicti sunt. neque enim aliud inter illa discrimen quam ex figura quondam fuit. Totum autem hoc genus in Martio & Aprili melones, quasi *μήλανας*, à malorum figura Palladius appellat. Est vero eadem melopeponibus vis quæ & peponibus: de quibus vide suo loco.

*Μελόπικαιώπη*. confectio quædam est ex malis cotoneis in vino coctis, adiecto postea melle, pipere, aniso, atq; aliis pro arbitrio pharmacopœi. quæ deinde omnia mista instar semunciarum formantur, & cum lauri foliis componuntur. Species est cydoniari.

*Μήλοσπον*. sic dicitur ἡ ἀμπρολόκη, id est vitis alba, authore Dioscoride & Theophrasto: forte quod fructu eius ad cōcinnanda dempsandaque coria *οἱ βουρσοὶ* *ἐφ' ἃ* vterentur. Græci enim *μήλοσπον* dicunt *τὰ βάρματα καὶ κακίασηματα*, hoc est, infectiones & concinnationes. Eadem ratione etiam *ψιλοσπον*, eadem ἡ ἀμπρολόκη vocata est. Apud Hesych. minus recte *μήλοσπον* scriptum est.

*Μήλοσις*. Specillum auriculariū, quo ad repurgandas aures vtitur. vide *μήλον*.

*Μῶν*. mensis. Eius duo sunt genera, aliis ciuilis, aliis naturalis dictus est. Ciuilis mensis est numerus quidam dierum quos vnaquæque ciuitas vel regio suo instituto obseruat. Hic nusquam par erat, sed singulis gentibus sui menses fuerunt, vt ait Galenus. Naturalis autem est quem certo cursu solis vel lunæ metimur. Sunt enim eius species duæ, quod partim solis, partim lunæ esse dicatur. Secundum solem fit mensis, dum sol vnūquodque in zodiaco orbe signū percurrit. Quare cum duodecim in eo signa sint, totidem etiam in anno menses statuuntur, qui tamen nec peræque inter se pares esse, nec dies habere totos dicuntur. Quippe sol in auario moratur dies vnde triginta, in pisce fere triginta, in ariete vnum & triginta, in geminis prope triginta duos, & sic in cæteris inæqualiter, sed vsque adeo non totos dies in singulis, vt annum suum, id est dies 365. & portionem nescio quam adhuc astrologis inexplorata in duodecim suos diuidat menses, sicut Iulius Cæsar partitus est, & nunc vbique obseruatur. At medici menses non solis, sed lunæ cursu metiuntur, secundum quam menses definitur spatium quod ab vno lunæ coitu cum sole vsque ad

alterum intercedit. Id autem expletur diebus vndetriginta circiter & dimidiato, quibus adijci etiam quandam particulam, quæ sit totius diei quingentesima septuagesima sexta, demonstrant Hipparchus, ut Galenus auctor est. Quod non ignorans Hippocr. scripsit in lib. de septimestri partu, sexaginta diebus vno dempto quam proximè duos menses constare. Diuiditur autem is mensis in quatuor hebdomadas, quæ cæu tempora quædam partibus anni quatuor proportionè respōdent, & paribus, ut ex Antyllo scripsit Orbasius, prædix sunt temperamenti. Siquidem luna perinde atque sol cum per zodiacum expariatur, aerem varie afficit. Ac prima quidem hebdomas incipit à nouilunio, & durat dum ea *δυσμηνος*, hoc est per medium secta, appareat, estque veri similis, aeremque calidissimum & humidissimum reddit, unde humores non aliter quam vere plerumque scaruntur & impetu feruntur. Secunda ea desinente incipit, & ad plenilunium vsque procedit, æstati similis, vel eo argumentò quod fructus quam maxime maturēt. Hebdomas tertia est à plenilunio, donec luna in duas partes æqualiter diuisa sit: sicca & autumnò similis perhibetur. Quarta vero quæ ab ea ad nouilunium est, hyemi comparatur. Harum autem hebdomadam singulas Hippocrates rursus in duas *ημερας* diuidit, & hebdomadas quidem *ημερας*, *ημερας* vero *διημερας* pronūciat. De quibus vide in dictione *ημερας* & *διημερας*.

*Μελιαις*. sic à quibusdam vocari nō *Σίφωνα*, Dioscorides auctor est.

*Μελιρροφιαξ*. membranz custos. Describitur à Corn. Celso libr. 8. cap. 3. Lamina ænea, firma, paulum resima, ab exteriori parte læuis, qua chirurgi in vulneribus capitis vruntur quoties excidendum os est & attollendum, metusque imminet ne in ipso opere cerebri membrana, negligentius & ultra quam res expostulat premendo, ledatur, ex quo sopores & graues inflammationes cum periculo mortis oriuntur. Ea de causa Græcis *μελιρροφιαξ*, Celso membranæ custos appellatur. Huic autem simile quoddam ferramentum habet chirurgi nostri, quod vetchem dicunt, dum eo attollant os quod ferè totum excisum est & iam labat, non secus quam grandiores lapides vetchibus impelluntur, quamquam eodem ferramento cerebri membranam custodiant. Est enim lamina ferrea angustior, ab ea parte quæ os tangit aspera, ab altera læuis, non recta, sed media duobus locis recurvata.

*Μηνις*, meninx. Est tunica gemina, vna tenuis, altera crassa, vtræque intra cranium sita, maximi sensus, & cerebrum foris integens. Tenuis cerebrum omne cui coheret, anticum scilicet geminum, & posticum continet, atque ab his omnibus ortam rhachitidem totam & nervos opticos & alios cerebrales vndique per cranium conuestit. Est autem

pluribus venis & arteriis intertexta, quibus partes, quas integit, nutrit atque temperat: estque ea in re *χοειν* atque etiam *μυδαπαις* similis. Propterea etiam in cerebri in æandros altius insinuat, & in ventres, iisdem vasis intertexta, vbi inembranam *χρονδρι* efficit. Crassa vero meninx cranio quidem contrigua, sed ei non adhærescens, & cribri instar perforata, tenui propemodum toti circumposita, & cranio ad propulsandam eius durtiem & impressiones opposita, vasis etiam pluribus abundans, & quæ cerebrum dextrum à sinistro, & vtrumque à postico cerebello diuidit, duplatæ similis, portiones sui multas & magnas tum in cranium, tum per craniū suturas in pericranium, & per ossa ethmoidia in nares, perque nervorum in cranio inferno foramina, nervis & toti rhachitide vestiendæ & muniendæ impertitur. Ab ea pericranios membrana originem ducit, similiter & dura oculi tunica, quæ anteriore sui parte iam inde ab iride, sit *επιεμυδρις*. Cæterum vtræque meninx à cerebro in totam spinam descendit, eamque conuestit & munit, & præter eam nervos quoque omnes tum à cerebro tum ab ipsa rhachitide exortos.

*Μυελον*, vel (ut quidam codices habent) *μυελον*. in Galeni Lexico exponitur *μυελος*, *εδον*, mædete, edere. perperam fortasse pro *μυελον*, ut sit comminuere dentibus, nam *μυελον* est irasci: at *μυελον*, indicare.

*Μυον*, meon. meum frutex est anetho foliis & caule similis, sed crassior: binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquū rectumque radicibus longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Calidum est tertio ordine, siccum secundo: ideoque vrinam citet & menses: sed capitis dolorem mouet. Officinis anethum sylæstre dicitur, ab aliis tortuosum.

*Μυροχαμ*, nomen mulieris, apud Hippocr.

*Μυρος*, femur. Est os omnium maximum, supra ischio, infra tibiz articulatū. Vtræque autem parte per diarthrosim iungitur. Est autem huius forma eadem quæ & brachij. Anterior enim & foris vtrumque est gibbum, intus & post, cauum. Quæ cavitās vtrobique est ad apprehensionem, ut equitantes, nauis, funirepi, sutores & alia pluraque ministeria comprobant: gibbositate autem cauitatem necessario sequente abusa est natura ad dyspnothiam. Tria autem id os habet capita, superius vnum, inferna duo. A superni vertice ligamentum rotundum & robustum in basim *επιεμυδρις* & in latus infernū firmiter inseritur. Os autem femoris infernum antequam in duo capita findatur, paulatim læscit & crassescit, ut basim aptam his capitibus præstare sufficiat. Est autem inter hæc duo inferna capita sinus atque intervalum, vnum ab anteriori parte, alterum à posteriori: sed anteriori quidem molæ tuberculum insidet, in posteriori vero ligamentum validissimum, neruus, vena, arteria, cruris



tristotius maxima continentur. Ceterum in superiori femoris ceruice apophyses duæ sunt, vna externa, & omnium corporis processuum nulli alteri ossi commissorum facile maxima: altera interna multoque inferior, sed magnitudine nequaquam externæ comparanda. harum vtramque *Garnice* appellant, quasi cursoriam, quod femoris motus cursusque per musculos his apophysibus insertos perficiantur. Verum externam quod ampla sit multumque gibbosa, quidam peculiari vocabulo *γαστήρ*, id est natem, appellant, siue à similitudine, siue quod muscoli nates ipsas constituentes præcipue inseratur. Sunt qui *μυρ* verterunt crus: quo tamen nomine Celsus *τὸν ὀπίσθιον* proprie intelligit, scribens lib. 8. cap. 1. crus ex duobus ossibus constare, ex tibia & sura. Idem autem femoris nomine manifesto *μυρ* intelligit, scribens tibiam os cum femoris inferiore capite committi, sicut cum humero cubitum.

**Mētrix.** vterus. Est pars mulieris tunica constans velut ex duabus diuiduis coagmentata, concipiendi gerendique fœtus instrumentum. Illa fibras habet rectas intus, nec ita multas transuersas, foris paulo plures, obliquas, harum medias & plurimas & valentissimas. Et hæc quidem vteri propria est, eiusque naturam & substantiam constituit. Verum ad vteri perfectionem multa alia concurrunt, tunica altera, venæ, arteriæ, ambarum cotyledones, nervi, cornua, testes, & præter hæc omnia connexio cum partibus vicinis, situs, magnitudo, numerus, figura, adhuc vteri os & collum, & ipsius colli os seu pudendum. de quibus breuiter ordine dicemus. Tunica illa altera nervosa est, nascitur à peritonæo hypogastrii propinquo. in recens fœtis & parturientibus, ut & propria tunica, est tenuissima: in virginibus, sterilibus & parere cessantibus, crassissima. Venæ & arteriæ ad vterum feruntur duplices, primæ à spermaticis vasibus, quæ mulieri ut viro nascuntur, dextra quidem à venâ cava & aorta, paulo infra renalia: sinistra vero à renalibus, nisi quod arteria sæpe ab aorta exit. Hæc vasa ramulum valde flexuosum testibus largita, in vterum absumuntur, inter tunicas eius duas varie dispersa: secundæ vero à ramis vasorum quæ sunt ad os sacrum, per ossis pubis foramen in crus descendentes prodeunt, & partim in vterum ascendunt, partim in eius collum descendunt. Horum vasorum ora in internum vterum penetrantia *αἰσθητικὰ* appellantur, de quibus suo loco diximus. Nervi in vterum distribuuntur quemadmodum & in viri penem à ramis sextæ coniugationis qui ad costas feruntur, & ab infima spina. Cornua *ῥομφαία* vocat. sunt duæ vteri apophyses exigue, à lateribus ad ilia, papillæ seu cornibus exorientibus similes, in quæ semē muliebri excernitur, & contractæ allantoidis extremitates desinunt. Testes vteri lateribus ad fun-

dum adiacet, vtrinque vnus, multo minores virilibus, recti tum peritonæo, vasa in hos ipsos cum sanguine seminali varicosius eductente, tum epididymide propria tunica: sed erythroide & scroto & darto carent. A testibus vasa semen in vterum per cornua deferunt, initio ampla ut virilia, deinde angusta, rursus ad vterum laxata. Connexio vteri cum partibus vicinis maxima est per tunicam à peritonæo exortam, quæ vterum firmissime alligat ossi pubis, ilium, & sacro. per venas quoque & arterias præcipue spermaticas & peritonæi apophysum eas deducentem magnis vasibus alligatur, ut per nervos spinali medullæ: per quoddam quoque fibras tenues intestino recto: per alias vesicæ, sed plures & laxas: per vincula etiam laxa ossis pubis & sacri & lumborum musculis. Magnitudo mediocris vteri longa ut plurimum est vñdecim digitos, à fundo ad pudendum. Ad ilia autem præcipue cornibus extenditur. Distinguitur autem vterus sinu duplici, quem *κατὰ* appellant, dextro & sinistro, per illam tunicam propriam in medio glutinatione futura quadam, qualis scroto inest, obscuriore tamen foris designatam. Vteri os in virginibus & vtero gerentibus & sterilibus & parere cessantibus est glandi virili persimile: parturientibus vero & recens enixis adeo extenditur & patet, ut nihil eius supersit, sed cavitas vna prope æqualis à fundo vteri ad pudendum appareat. Id os à conceptu multum contrahitur teste Hippocrate, mediocriter autem aperitur, dum semen recipit aut ipsum excernit vel menses: idem os epiploon inter vesicam & vterum illapsum in valde obesis comprimit & conceptum impedit, ut scribit Hippocrates. Vteri collum est corpus musculosum carne dura & cartilaginosa constans, in annos semper magis durum & cartilagosum euadens, ita ut vetulis iam sit simile summitati asperæ arteriæ, ut recte comparauit Herophilus. Colli autem vteri os, cunnus Latinis dicitur.

*Ματρὸς ὄργανα.* instrumenta quibus in vterum medicamenta infunduntur clysteris modo.

*Μισθριδιον.* antidotus à Mithridate rege composita, quæ se à venenis rarum seruauit. Verum eius varietates feruntur compositiones. Quintus Serenus poeta simplicissimam descripsit, constantem rutæ foliis viginti, nucibus iuglandibus duabus, salis grumo vno cum caricis aliquot, ut his versibus cecinit:

*Antidotum vero multis Mithridatium fertur  
Consociatum modis, sed Magnus Serenus regis  
Cum reperet victor, vilem deprendit in illic  
Synthesin, & vulgat a satis medicamina risi:  
His denum ruta foliis, salis & breue granum,  
Iuglandesque duas, seruo cum corpore sicus.  
Hæc oriente die parco conspersa Lyæo*

*Suæbæ st. metuens dederat quod pocula matri.*

Eadem etiam apud Plinium describitur lib. 13. cap. 8. Sed ut sunt hominum ingenia, quæ in aliorum inuentis minime possunt acquiescere, primæ huic compositioni

magna postea miscella accessit, adeo ut permulta eius nominis antidoti extiterint. Referuntur plures à Galeno ex variis authoribus, Antipatro, Cleophante, Damocrate, Xenocrate, Andromacho. Alias Paulus & Aetius describere, valdeque ab his omnibus diuersas Arabes, & quas non sit facile intelligere. Adeo ut in tanta huius præstantissimæ antidoti compositione non sit facile pharmacopœo deligere quam sibi concinnandam proponat. Optimæ habentur quas Galenus lib. 2. de Antidotis tum ad Andromachum, tum ad Antipatrum refert. Itaque eas tanquam synceriores atque vetustiores in usum potius reuocandas censeo. Vocatæ sunt hæ simpliciter antidoti Mithridatæ, aduersus multa venena efficacissimæ, & plus quam ipsa etiam Theriace valentes, sed sine viperarum carnibus (quibus solis Mithridatium videtur à theriacâ differre) factæ & proprierea aduersus viperæ ictus non tam præsentem remedio. Quæ tamen etiam postea addi cœperunt, unde theriacâ illa Mithridatios emerfit quam Galenus ex Andromacho recitat, si dicta quod viperæ carnes recipiat. Præter has etiam à Galeno libr. 7. τὸν ὀπίσθιον, alia duæ *μυρδαταινὴ ἀντίδοσι*, ἀρρηκτικὴ καὶ πυρρὴ, inter arteriaca medicamenta numerantur.

*Μικρὸς σφυγμὸς*. paruus pulsus. Est pulsus differentia sumpta à quantitate diastoles, magno pulsui opposita. Itaque cum magnus pulsus dicatur quando arteria tribus dimensionibus, hoc est longitudine, latitudine & profunditate naturalem habitum, & mediocritatem excedit, palam est eum qui deficit, hoc est breuem, strictum, simulque humilem pulsus, paruum vocari. Dicitur autem ad aliquid, ut & moderatus: est enim paruus pulsus moderato minor. Talis euadit solo calore infra modum imminuto, fereque secum perpetuo annexam habet paruitatem & raritatem, velut & magnus frequentiam & celeritatem adsciscit. Diuerso tamen vterque modo. Siquidem aucto calore pulsus primum magnus euadit, postea celer, inde frequens. Imminuto autem atque refrigerato, primum raritas, secundum eam tarditas, postremo paruitas apparet, sicut Galenus lib. 1. de causis pulsuum demonstrauit. Hic pulsus proprie vsum deficientem significat, hoc est caloris, qui in corde & reliquo corpore est, refrigerationem & spiritus animalis consumptionem.

*Μελανία*. genus est alcyonii quod figura vermi simile est, purpurei coloris & compage substantiæ molli, omnium alcyoniorum tenuissimum.

*Μαύρη*. rubrica. Est terra rubens. Cuius tamen penes colorem tres produntur differentiæ, valde rubra, in rubro candida, & inter eas media. Omnis inuenitur aut in metallis auri, argenti, æris, ferri: aut non raro in propriis venis. Omnium præstantissima censetur Sinopica, quæ ex Cappadocia in Sinopen

Ponti urbem venialis defertur, triplici quoque differentia. alia enim mollis, alia dura, alia mediocris est. Maxime probatur grauis, densa, iecinori similis, calculorum expers, concolor, cum diluitur valde fusilis. Ea vel bolus Armenia est, vel proxime ad eam accedit non tantum nouis omnibus, sed & viribus & natali etiam solo, quod Armenia sit Cappadociæ confinis. Post eam Dioscorides *μικτὴν περὶ πύλον*, hoc est rubricam fabrilē, recenset, in omnibus sinopide inferiorem, qua fabri ad lineas protrahendas obductis ea funiculis vtuntur. Ea forte fuerit quam veterinarii pro bolo Armenia, & chirurgi plerique vulneribus cruentis adhibent. Ac quamuis duo ista tantum rubricæ genera Dioscorides exponat, sciendum tamen est omnem terram rubram, dici posse rubricā, vt Armeniam, Lemniam, Samiam, Alanam: atque eam omnes non tantum rubricæ nomine, verum etiam minii, veteres comprehendisse, adiecto semper gentis aut vltus cognomine.

*Μυράρι*

*Μυράρις*. est defluuium pilorum è palpebris. dicitur alio nomine *μυδάρις*.

*Μίμνησις*. imitatio. Tertium erat genus *τῆς ἱμνῆσεως*, quo ea quæ aliquando profuissent vel noeuissent, siue naturæ, siue fortunæ, siue consilio oblata fuissent, rursus in experimentum ducebantur, aliorum qui ea prius experti essent imitatione. Ea quidem potissima pars medicinæ empiricorum fuit, eaque vna artem suam maxime constituerunt. Non enim bis tantum aut ter, sed sæpius id quod profuit imitati, idemque in iisdem affectibus vt plurimum proficere inuenientes, ac eiusmodi memoriam *διαρρημα* vocantes, eam vnam artis partem maxime fidam ratamque habebant.

*Μισόσφαρον*. sic dicitur à quibusdam *τὸ μαλακᾶν*.

*Μάνειν*. *μαστῆξαι*. *ἰδέναι*. hoc est mandere & edere, apud Hippocratem. In Galeni Lexico perperam est *μυῖναι*.

*Μισιδυλός*. sic quidam *τὸ ὀσμυρὸν* dictum volunt.

*Μίσυ*. Est succus in metallis concretus in glæbz formam vel pollinis aliquando, finitimus chalcitidi. Ex ea namque efflorescit, quamquam non ex ea tantum, sed ex sory. etiam atque melantheria, omnique atramento sutorio. Nascitur in iisdem metallis in quibus & chalcitis, atque in se inuicem aliquando temporis spatio transeunt, quemadmodum narrat Galen. chalcitidem per triginta propo annos domi suæ asseruatam, in misy verisam se vidisse, crassius nimirum chalcitidis partibus attenuatis naturæ & temporis ope. Est enim misy partium multo quam chalcitis tenuiorum, alioquin genere cum ea cognatum. Dicitur & supra chalcitidem omni, non aliter quam xugo supra zs. Proindeque vires non admodum habet dissimiles. Calcificat, excicat, acre est, erodit, adstringit, extergit, expurgat. Luteum est, & micæ habet auri colore intermitentes.

*Mina.* dicitur apud Hippocr. tegmen vel tanquam inuolutum quoddam, aut epididymis, quæ est varicosus quidam tumor, summo didymo insidens. author Galenus in *πρὸς Ζηζεκίου*.

*Mina.* pondus est quod apud medicos vnciarum sedecim fuit. Id quod patet ex Dioscoride, qui sic scribit in libello de ponderibus & mensuris: *ἡ μίνα κατὰ τὸν ἰατρικὸν ὄγκον ἄρτι οὐγγίας κ'. πνίσιον ἑκατάρεκν.* Id est, Mina secundum medicorum usum habet vncias sedecim, hoc est drachmas centum viginti octo. Verum *ἡ ἀσικὴ μίνα* multo leuior est Romana, nam centum modo drachmas pendit, ut ex Suida apparet, qui scribit *ἡ ἀσικὴ δραχμῶν πεντήκοντα μίνας μίαν.* hoc est, centum drachmæ minam vnam efficiunt. Item ex Plinio, qui lib. 2.7. cap. vlt. *Mina*, inquit, quam nostri minam vocant, pendet drachmas Atticas centum. Quinetiam ex Fannio sic scribente:

*Minam vocitant, nostriq; minâ dixere priores: Centum hæ sunt drachmæ.*

Proinde quum Plinius verba Dioscoridis in Latinum vertens, *μῖναν* libram reddidit, proculdubio Atticam intelligit, seu drachmis tantum quatuor differentem à libra Romana, quæ drachmarum est nonaginta sex. Sic quoque videtur vsus mina Philoxenus medicus, cuius emplastrum est apud Asclepiadem, ut scribit Galen. *ἡ κατὰ ὅσον* libro 4. *καὶ ποδὶ δραχμῶν ρ'. ὁ μῖνα ὅτι καὶ ποδὶ. στατὺς ταυρείου δραχμῶν ρ'. ὁ πνίσιος περιδίντης δραχμῶν ὀκτ'. ὁ πνίσιος ἡμισυ καὶ ὅτι καὶ ποδὶ. hoc est, centum drachmas centum: quod minam inscribit. seu taurini drachmas centum, resina terebinthinæ, drachmas septuaginta quinque: quod tria quaterna inscribit. Videtur autem Asclepiades hanc interpretationem per drachmas posuisse, cum Philoxenus scripserit minam, ne quis eum de Alexandrina aut alia putaret sensisse. Galenus vero cum Crito minam scripserit, dubitat quamnam intelligat: locus est lib. 7. eiusdem operis, cum inquit *καὶ νῦν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ρ' δραχμῶν βυζαντινῶν ἢ τὴν μῖναν.* hoc est, apparet autem & in aliis centum drachmarum voluisse minam esse. Quoniam vero Romæ egisse Critonem constat, ut qui Celsæus medicus fuerit, dubium est an cum drachmas scribit, ut alii, denarios intelligens, voluerit minam esse centum denariorum. Tunc enim ab Attica mina multum à medica parum differret. Sic autem ait Galenus: *ἡ ἀσικὴ μίνα κατὰ τὸν ἰατρικὸν ὄγκον ἄρτι οὐγγίας κ'. πνίσιον ἑκατάρεκν. ὁ μῖνα ὅτι καὶ ποδὶ. στατὺς ταυρείου δραχμῶν ρ'. ὁ πνίσιος περιδίντης δραχμῶν ὀκτ'. ὁ πνίσιος ἡμισυ καὶ ὅτι καὶ ποδὶ. hoc est, diserte quidem scriptum est ab ijs qui de ponderibus & mensuris tradiderunt, quantum esset pondus minæ: aliis quidem dicentibus minam vnciarum esse sedecim, aliis autem viginti: aliis vero etiam distinguentibus, & dicentibus Alexandrinæ quidē haberi vnciarum viginti, alibi vero sedecim. Idem vero etiā l. 1. dicit**

*πρὸς μὴν οὐδὲν ἀποσυντομῆς ἔχει καὶ ρ' μίνας, ὅτι δὲ ἐκαστὸς δὲ.* hoc est, alii quidem minam viginti vnciarum esse dicunt, alii vero sedecim. Quod autem Alexandrina medicis in vsu fuerit, Galenus indicat, recensens ex Asclepiade emplastrum Moschionis veteris medici sic scribentis: *καὶ ποδὶ μῖνα καὶ ποδὶ μῖνα ὅτι καὶ ποδὶ. στατὺς ταυρείου δραχμῶν ρ'. ὁ πνίσιος περιδίντης δραχμῶν ὀκτ'. ὁ πνίσιος ἡμισυ καὶ ὅτι καὶ ποδὶ. hoc est, litar-gyri mina vna. Mina autem in hoc medicamento pendet vncias centum sexaginta. Itaque Galen. addit: *καὶ καὶ ποδὶ τὸ φάρμακον ἔχει τὸ ἐπὶ τῷ αὐτῷ γένη μῖναν ρ' δραχμῶν φησὶ ἔχει ρ' μίνας.* ἰσχυρὸν οὖν ὅτι ἀλεξάνδρειαν τὴν καὶ μῖναν, οὐγγίας ἔχουσαν ὅτι καὶ ποδὶ ἔχει δραχμῶν κ'. οὗτο δὲ οὐγγίας καὶ ρ' δραχμῶν ἔχον τὴν μῖναν. hoc est, & secundum id medicamentum, atque aliud quod ab ipso describitur, centum sexaginta drachmas minam dicit continere. Itaque manifestum est Alexandrinam minam ipsum dicere habentem vncias viginti: ita ut singulæ vnciæ pendeant drachmas octo. Sic enim fiet ut mina centum sexaginta drachmas contineat. Hinc videmus medicis aliis in vsu fuisse Atticam minam, aliis quam nominant medicam, aliis Alexandrinam. Atticam potissimum his qui vel antequam populi Romani nomē & res florent scripserunt, vel in Græcia agentes Romana pondera ignorarunt. Alexandrinam vero his qui Alexandria medicinam exercuerunt. Medicam autē quibus res Romanæ non fuerunt ignotæ. Sed cum à Gal. nulla ratio sit indicata, cur hæc mina constituta sit, poterit forte ratio ista afferri, quod medici qui Romæ egerunt, quia vterentur Romanis ponderibus, utpote libra, vncia, denario, quem drachmam appellare solent, & scirent Atticis minam esse centum drachmarum, scripserunt quoque minam esse centum drachmarum, denarios intelligentes. Sic Crito videtur accepisse minam. Alii referentes ad drachmam Atticam quæ denarius quinta parte grauior est ex Cleopatæ sententia, drachmas inuenerunt Atticas centum viginti quinque tot denarios efficere: quæ drachmæ in vncias collectæ conficiunt sedecim minus tribus drachmis, quas non curarunt. Sic natam arbitror medicam minam, quæ eadem & centum sit denariorum, & drachmarum Atticarum centum viginti octo. Porro Alexandrinæ ratio est aut quod drachmas grauiores habuerint, si Polluci credimus, minas omnibus fuisse centum drachmarum, ipsas vero drachmas pro earum grauitate vel leuitate variasse: aut quod mina, si Pollucis sententiam non probamus, plures apud eos quam centum drachmas habuerit. Itaque si grauiorem drachmam fuisse putauerimus, non semper quinque drachmæ Alexandrinæ efficient octo Atticas: habebit enim vna drachma Alexandrina sesquidrachmam Atticam & decimam ipsius partem. Sin mina plurimum fuit drachmarum quam centum, nemo quot fuerit, nisi granitate drachmæ*

prius cognita, scire potest. Illud nobis satis sit, Alexandrinam minam drachmas Atticas pendere centum sexaginta.

*Μαστίχου φάρμακον*, emplastrū est auctore Mnasæa, secundo ordine remolliens. Constabat, vt scripsit Galenus lib. 1. τὸν χῆ' ἥν, portionibus æqualibus spūmæ argenti, adipis & olei. Atque sic quidem Galenus. Mnasæas vero, vt Paulus & Aetius prodidere, ceram, colophoniam resinam & passum adijciebat, vel æqualibus, vt habet Aetius, portionibus, vel inæqualibus, vt Paulus. Est illi non modo emolliendi, sed etiam discutiendi facultas.

*Μολύβδον*, qui difficulter ex aliquo linguæ morbo loquuntur, vt ij quibus ab vlcere & cicatrice dura sub lingua relicta lingua incuruat, & impeditur libera vocis prolatio. Dicuntur & ἀγνώστους, nisi quod Aetius *μολύβδους* videtur intelligere eos modo qui ex aliqua affectione impeditur loquuntur: ἀγνώστους vero tum hos, tum illos qui ex vtero & à natura id vitij habent.

*Μόδιος*, modius, mensura sedecim continens sextarios.

*Μολόχ*, idem quod ἡ μάλαχ, hoc est malua. Alii non omne quidem maluæ genus, sed satiuâ modo sic dictam volunt.

*Μολόχην ἐμπλαστος*, describitur à Galeno libro 2. τὸν χῆ' ἥν, cap. 2.

*Μολύβδαμα*, plumbago. Est medicamentum metallicum ex plumbo feruescente factum, cum iam id ipsum superior catinus combibit. non est idem cum ferri scoria, sed multum ab eâ differt. Siquidem ferri scoria sit tantum in primis fornacibus vbi plumbi lapis metallicus funditur. Eo namque probe fuso artifices plumbum aqua frigida perfundunt quouſque scoriam deponat, densam, fractu contumacem, colore in luteum vergentē, & vitri splendorem præseferentem. Plumbago vero in secundis fornacibus excoquitur, neque aliud est quam purissimum plumbum, vſione in cinerem redactum. Fit autem vel ex plumbeis laminis, vel ex lapide plumbario aut arenâ, vsque dum hæc tota versa fuerint vel in lithargyro vel in molybdænâ. Non est vnius coloris. Suprema eius pars colore propius ad spūmiam argenti accedit, infima ad cinerem, media ex vtriusque mista est. Suprema bonitate præstat, aliquantulum splendet: cum in puluerem teritur, rutila: in oleo coctâ icoris colorem contrahit. Vires, vt ait Galenus, similes habet lithargyro, quod mediè temperaturæ est: ab ipso tamen partim ad frigidum inclinât, neque absurgit, estque densarum magis partium proinde ad reprimendas fluxiones apprimè conducit.

*Μολύβδαμα*, herba, inquit Plinius, vulgo nascens folio lapathi, crassa radice, hispida. Ea multis esse creditur maior persicaria, aut omnino nobis ignota est.

*Μολύβδης*, plumbaris, species lithargyri, vide in dictione *Λιθάργυρος*.

*Μολύβδος*, plumbum, præsertim nigrum: quod enim candidum est, Græci peculiari nomine κασσίτερον appellant, Vim habet refrigerandi. Siquidem non modo multum habet humidæ substantiæ à frigore congelatæ coactæque, sed etiam aeræ, & pauca terrestres: vt ostendit Galen. lib. 9. πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν διωκτικῶν. Reperitur & *μόλυβδος* per i. itemque in deriuatis.

*Μολύβδιδης*, lapis plumbarius, sic dictus à plumbi similitudine, viribus iisdem præditus, quibus & plumbi scoria siue recrementum. Quid vero sit, nemo veterum explicauit.

*Μόλυσσις*, inquinatio dicitur ab interpretibus Aristotelis. Non est aliud quam inchoata tantum & non absoluta elixatio, cum humidum externum calidius quidem est quam vt vlllo modo mouere possit humidum in eo quod elixatur contentum, sed tamen imbecillius quam vt perfecte concoquere possit, & ad æqualitatem reducere. Aristot. scribit lib. 4. τὴν μετέωρον, μόλυσσιν esse inconcoctionē contrariam elixationi. Itaque si elixatio est concoctio indefiniti humoris à circumfuso calore, μόλυσσις erit inconcoctio humoris in corpore indefiniti ob defectum caloris in circumfuso humido. Nec tamen propter caloris defectum putredinē induci est necesse, quod μόλυσσις ab alio quam putredo motu fiat. Defectus autem ille caloris prouenit, vel propter copiam frigiditatis quæ in humido est, hoc est, cum humidum quod circumfusum est rei quæ coquitur, frigiditatis plus habuerit quam caloris: vel propter copiam humoris, qui in eo est quod coquitur, tantam, vt à calore circumfusi humoris vincit & mirificari non possit.

*Μολυβδαμῶν*, dicitur Hippocrati quod cito moueri & mutari desit, refrigeratumque est, vt explicat Galenus comment. 2. εἰς π' τ' ὅτι δὴν δὴ μόνον.

*Μονομήρεα*, sunt collyria quæ cum oui candido, aut muliebri lacte, aliquando vero etiam aqua simplici illita oculis inflammatione laborantibus eam statim mitigant. Constant magna ex parte ijs quæ mediocriter adstringunt, concoquunt & discutiunt. Cuiusmodi sunt acacia (quæ quidem quæ habent collyria, *ῥυτίδον*, hoc est faculentæ, appellantur) aris squama, æs vſtum, crocus, myrrha, lycium Indicum, castorium, thus. Verum in quibus adstringentia prædominantur, plurimo oui candido diluenda sunt, præsertim si quid ex metallicis complectantur. In quibus autem crocus, myrrha, castorium, thus, lycium prævalent, in his parcius oui candidum commiscendum. Cæterum vitari oportet vſum ὅτι μονομήρεων καλουμένων in plenitudine totius corporis. Nam quia facultatē frigida sunt, obstruunt densantque meatus, ac si copia humoris in oculis fuerit, in causa sunt plerumque vt tunica καραπίχθης rumpatur. Sunt autem dicta *μονομήρεα*, quod intra diem vnum curationem absoluant.

*Μονοκλωνος*, sic dicitur genus vnum artemisiæ quæ



quæ singularē famum habet, ad alterius, dif-  
ferentiam quæ plurimum appellatur.

*Μονοκωνιον.* est collyrium *μονοκωνιον*: sic dictum  
quod ex vnica specilli (quod *μυα* Græce ap-  
pellatur) inductione oculorum inflama-  
tioni medeatur. habet hunc in modum: Ca-  
dmiz drach. xx i i i i. zris drach. x i. chalc-  
tidistofz drach. x i. opii drach. x i. piperis  
grana xx i i i i. mellis fclquinniam. gummi  
drach. xx i i i. Excipiuntur aqua: mel postre-  
mum adijcitur. Aetius.

**Morua.** morus. Arbor est notissima, cuius fructus maturus quidem aluum subducit, & medicamentis stomaticis aliisque, quæ moderatam requirunt adstrictionem, vtiliter miscetur: immaturus autem ubi exaruerit perquam adstringens fit medicamentum, ex quo nobilis illa *di&g&uor&uor* confectio præparatur, ad tonsillarum orisque inflammationes vtilissima, siue illinatur, siue gargarizetur. Ea gemina prædita est: vna simplex, altera composita. Simplicem Paulus descripsit hunc in modum: Mororum succi sextarii tres, prius excoquuntur dum tertia portio fuerit absumpta, adiectoque mellis sextario rursus incoquuntur ad mellis spissitudinem. Composita autem primum authorem habuit Eras, & refertur à Galeno lib. 5. *cap. xi.* Succi mororum heminas sex, ad strigmentitiam spissitudinem coquito. Deinde tritam croci drach. i. myrrhæ drach. i. i. omphacii drach. i. aluminis scissi obol. i. i. mellis heminam vnâ in dîto: Coctura fit vsque ad compagem mellis. Ipse autem Eras aliter etiam præparauit, hoc modo, vt croci drachma dimidia iniiciatur, & passi hemina vna, & vini maris expertis austeri hemina vna.

Μήριος. lapis in Aegypto nascentis, quem aliqui  
 χρῖς, nonnulli λευκοχρόδιον nuncupant. Sic  
 scriptum est apud Gal. lib. 9. Simpl. med. v.  
 bi agit ~~ἐπὶ τῷ χρῖ~~. Apud eundem alibi, item  
 que apud Dioscor. ~~μήριος~~.

*Μαρόντιος.* ficus *Ægyptia*, quam alii *συκάμινος* appellant.

Μολίωνος ἀρτηριακή. describitur à Galeno libr. 7:  
τῶν ἰστίοντι.

*Megistosus epichaspeus*. describitur à Galeno libr. 2.  
 3<sup>o</sup> 13<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>. atque etiam ab Aetio libr. 14. in-  
 ter emplastra cephalica, multisq; ab eolau-  
 dibus ornatur.

Μοσχάριον. nux moschata. dicitur & μοσχάριον  
 & μυρρίκη, hoc est vnguentaria, quod dum  
 recens est, tota succo pingui & oleoso ma-  
 deat, sic ut in vnguentum exteri possit. Cal-  
 facit & siccat ordine secundo.

*Moschus*. est preciosissimum odoris genus quod ex umbilici animalis cuiusdam Indici vomica erumpit. De quo Aetius lib. *ἑξήκοντος* *διὰ τὸ μωσχος* scripsit hunc in modum: Moschi diuersa sunt genera. Primarum tenet qui nascitur in ciuitate quadam dicta Toupur, quæ magis quam Chorasa ad Orientem spectat. Colore subflauo est. Eo deterior habetur qui ab India deferretur, colore in nigritiem

vergente. Sed & cognatior est qui à Senitis deportatur. Ominis in vmbilico cuiusdam animalis gignitur vño cornu præditi, maximi, caprea similis. Siquidem cum Veneris stimulis agitur, ei vmbilicus intumescit congesto inibi crassiore sanguine: quo tempore & pabulo & potu fera abstinèt, in terramque crebro voluitur, & vmbilicum exprimit sanguine refertus, qui post aliquod tempus concrefcens, magnam odoris suauitatem adfciscit. Est autem calidus & siccus ordine tertio, ac partium tenuitate pollet. Imbecillas partes roborat, caput frigidum firmat, sed calidum offendit. Renocat quos animus defecerit. Cardiacis affectibus opitulatur, quoniam cor confirmet, sed pallore vtrèrium membra decolorat. Probandi quibusdam ea est ratio: In peluim humore perfusam post examinatum trutina pondus immittunt, postea iterum æqua lance ponderant: si ad stateram reductum superferatur, syncetum & legitimum putant: sin degrauctur, sputium. Hæc Aëcius.

## More

Μοτὸς, linamentum seu linteum carptum quod  
vulnetibus inditur. Sūnt autē τριμύτης quin-  
que differentiae, quas ἡ εἰσαγωγή, auctor re-  
censet, σπειθὸς, ζυγὸς, πλάτης, ἐλλυχνίου, ἀφραπτοῦ  
viti: hoc est tortile, rasile, conceptum, elly-  
chnio, pudendoque simile. Inferuiunt au-  
tē hae linamentorum species vlceribus, vul-  
neribus, & reliquis apertionibus corporis,  
seu sicca indantur, seu medicamentis, quae  
ob id ἑμμοτὰ vocantur, oblita, quae intro mittere  
oporteat, vel ad sistendum sanguinem,  
vel ad detergendum, siccandū, exedendū.  
Indita vero sunt his differentiis nomina par-  
tium a formis ac figuris quibus effinguntur,  
partim a materia ex qua constant. σπειθὸν, hoc  
est tortile a formā nomen habet: ζυγὸν ἢ πλά-  
τῃν, hoc est rasile conceptumque, ab ipsa  
linteolorum materia: hoc quidem concepta,  
illud vero derasa: quare etiam aliquan-  
do simpliciter ζυγία ἢ πλάγια θρόνιον, hoc est, ra-  
sura aut vulsura linteolorum; appellantur.  
ἐλλυχνίου vero dictū est, non quod ad lychni  
seu funiculi lucernarum similitudinem cō-  
torqueretur, sed quod ex ellychnio fieret.  
id quod ex Galeno apparet libro 13. methi.  
med. vbi ait: ἐξ ὧν ἡ ἀρχὴ μοτὸς, ἡ πρὶς ζυγὸς ἢ ἐξ αἰ-  
νῆ, καὶ μάλιστα ὁ οὐκ εἶς μαλακίων ἐλλυχνίον, οὐδ' ἂν  
παραποικῆ. hoc est, extrinsecus autē cōue-  
nit linamentum, vel siccū, vel ex vino, prae-  
sertim autē quod ex molli ellychnio est,  
cuiusmodi sunt tarsica. Subdit autē, cuiusmo-  
di linamenta etiam vim quādam habere ad  
superexcrefcentem vlcerum carnem cōsu-  
mēdam. ἀφραπτοῦ viti autē vocatū fuit a  
pudendi humani similitudine. Verūm prae-  
ter hae quinque linamentorum nomina, alia  
etiā apud veteres leguntur, vt apud Celsūm  
λαμίσκος, quod ille in longitudinem implici-  
tum linamentum interpretatur, & aliquan-  
do linamentum inuolutum & oblongum:  
& apud Aetium σπληνίσκος, quod linamentum



significat ad cunei parui similitudinem intortum, vel quod cunei modo ea quæ coniunguntur & adhærescunt separet.

*Μουσάριον*. pastillus apud veteres celebris, cuius descriptio habetur apud Paulum libr. 7. cap. 12.

*Μοχλίσια*. est ossis vel ossium à loco qui præter naturam sit, ad naturalem reductio. sic definit author def. med.

*Μυάριον*. herba fuscifolia, tripedanea, folio rubic pallido, semine fornigra ci figura, oleoso. Alio nomine *μελάμπουρον* vocatur, quasi nigritum triticum. Galli vocant camelinam vel camaminam.

*Μυράριον*. sic dicitur sylvestris asparagus, qui & *παραρτίος* & corruda vocatur à Latinis.

*Μυδνήσις*. putredo. Vitium est omnium partium commune, quæ putrescentes humore aliquo madent & desuunt: venit *ἀπὸ τοῦ μύδατος*, quod grammatici & *μύδατος* & *δινυδατῶν* interpretantur. adeo ut *μυδνήσις* nomē ijs competat quæ putrefacta liquecunt & stillant. Ac quamquam omnibus, sicut *ἐν τῇ εἰσαγωγῇ* habetur, partibus communis sit *ἡ μυδνήσις*, in oculistamen ante omnia usurpatur, eorumque præsertim palpebris, quæ adipe tumētes humorem assidue remittunt. Vfus est ea *ὑπὸ* Dioscorides libr. 1. cap. de nardo, dicens eam conferre *αὐτῷ τῷ ἐν ὀφθαλμοῖς μυδνήσις ἥτις βλεφαρόν*. hoc est, aduersus putredines palpebrarum quæ sunt in oculis. Ruellius glabrās oculorum genas interpretatus est, habira potius symptomatis ratione quā essentie morbi, propterea quod remedii causam statim subiungat Diosc. scribens, *εὐφροσύνη & δισκιδύουσι τὸν βλεφαρίδα*. hoc est, adstringentes & densantes palpebras. Nam cum propria *τῆς μυδνήσις* natura cōsistat in superfluo humore, facile fit ut inde pili desuuant: eos autem nardus retinet adstringendo & densando, & proinde humorem illum superfluum atque vitiosum, in quo morbus positus est, siccando: Mallem dicere, superfluo humore redundantes palpebras.

*Μυδρίασις*. morbus est pupillæ, quæ cum à naturali colore nihil euariet, multo tamen quam consuevit, latior est atque effusior, adeo ut aliquando ad iridis circulum pertingat. Eo malo visus quandoque in totum adimitur, nonnunquam impeditur, ut omnia minora quam sint esse videantur, diffuso scilicet eo spiritu per quem videtur. Causa huius est humorū influxus siue paulatim factus siue repente coaceruatus, à quibus tunica *ἡ παρὰ τοῦ οὐλοῦ* distenditur, & pupilla effunditur, atque dilatatur, aciesque eius hebescit. Non multum à pupillæ resolutione morbus hic distat, & non nisi difficillime eliditur. Cum enim tunica *ἡ παρὰ τοῦ οὐλοῦ* membranosa sit, ubi semel distenta fuerit, induratur, neque facile postea contrahi potest. Accidit præsertim pueris propter tunicarum mollitiem atque imbecillitatem. Sed & qui natura nigros oculos habent, magnis sunt pupillis, ideoque in hanc affectionem promptè incidunt. Ea-

dem vero etiam *μακρομία*, hoc est pupillæ dilatatio, appellatur. Cæterum *μυδρίασις* dicta est, vel *ἀπὸ τοῦ ἀμυδρῆς ὄψεως*, à visu obscuriore, quasi *ἀμυδρίασις*: vel *ἀπὸ τοῦ μύδατος*, *πυρρίσιν ὑδατῶν*, quod pupilla superfluo redundet humore.

*Μυελός*. medulla. Est substantia simplex, humida, pinguis, alba, sensus expers, in canis ossibus contenta. Ipsa licet exanguis sit, ortum tamen habet ex sanguine in ipsas cauitates per venas illabente. Euadit autē candida & veluti spermatica, quod ab ossibus eiusmodi mutationem accipiat. Sic mammæ lac generant candidum, & adenes humorem dealbant quem intra se continent, testesque similiter. Est enim benignum ossem excrementum, quod illa intra suas cauitates reponunt, nō tam ut excrementum, quam ut aliquando sibi vsui futurum. Siquidem & proprium ossem nutrimentū est, & ossa motibus aut aliis de causis violentis incallescuntia & arefacta reficit: tunc enim illa medullam suam veluti resorbent. Ex quo plane intelligitur medullam, quæ calore & siccitate ossem absumitur, eorundem frigiditate & humiditate fieri & coaceruari. Cuius rei hoc etiam argumentum est, quod corpora quæ multo sepe & pinguedine abundat plus medullæ coaceruent quam sicca. Ob eam enim causam leo omnium animalium calidissim⁹ siccissimusque, omnium ossem medulla carere creditur, quod sicut scripsit Aristoteles histor. animal. libr. 3. cap. 7. ossa tam dura densaque habeat, ut attritu ignem, silicis modo reddant: alia vero fortia ferociaque animalia pro caloris siccitatisque ratione, ossibus duris densisque esse, & parum medullæ continentibus. Hinc etiam factum arbitror, ut ossa digitorum quæ Galeni seculo solida & camitatis medullæque sensui manifeste erant expertia, nūc propter corporum & ossem præsertim imbecillitatem & laxitatem, parum caua & nonnihil medullata videantur. Talis quidem medulla est proprie appellata, namque spinalis dicitur, improprie dicta est.

*μυελός ἐγκεφαλίτις*. medulla cerebialis. sic dictus est à quibusdā *ὁ ἐγκεφαλος*, id est cerebrum, quod eius substantia, ut ait Plato, medullæ quædam species sit. Alii vero nō *ἐγκεφαλίτις*, sed *μυελός ἐγκεφαλῆς* maluerunt appellare, vide *ἐγκεφαλος*.

*μυελός ραχίτις*. medulla spinalis. Est substantia medullosa, cerebro similis & cerebello continua, per rhachim totam descendens & neruorum prope omnium principium. Hanc *μυελόν* improprie veteres appellauerunt: sola enim quæ in ossibus continetur sensus expers, proprie medulla dicitur, hæc vero improprie scilicet ob id solum quod intra spondylos tanquā intra ossa contineatur, & substantia coloreque sit medullæ similis. Itaque medulla quidem dicta est propriæ substantiæ nomine, ut ait Galenus, hoc est, substantiæ similitudine (licet propriè dicta

dicta ossium medulla, sit dorsali medulla & cerebro humidior, mollior, dulcior, pinguior, iucundior) ad alterius autem: differentiam ab aliis *ναιατος*, aliis *παχύντης*, aliis *διανέχοντος*, aliis *φαίνης*. Illa namque per cernicem; dorsum, lumbosq; descendit, & totam rhachim implet, semper seipsa & durior & minutior reddita. Oritur ex cerebri totius basi, eique corporis substantia similis est, & eiusdē cum eo generis, nervosque ut & cerebrum producit, donec velut effocta desinat in finem breuem, acutum, simplicem cum coccyge. Nervi autē hi subiectas cerebro partes movent & sentientes efficiunt ut planē constet spinalem medullam partibus capiti subiectis tanquam cerebrum esse, & multa cum cerebro habere communia; substantia similitudinem, principium nervorum, sentiendi vim prope parem, & præterea meningas duas, vnam tenuem à tenui meninge cerebri ortam, quæ vasa ipsam nutritura colligat, & substantiam eius admodum mollem, cerebro tamen non paulo duriorē constringit, alteram crassam, à crassa similiter cerebri meninge prædeuntem; quæ tenuem ambit & munit contra spondylorum duriem. Nec tamen propterea medullam hanc cum cerebro eandem esse censendum est: habet enim utrumque quædam propria & discrepantia. Nam cum cerebrum pulset atque moueatur, quāquam osse immobili contineatur, medulla tamen non mouetur, tametsi à spondylis mobilibus continetur, nullumque habet medium interuallum; ut cerebrum, sed præter meningas duas; tertiam, quæ cerebrum caret, tunicam nervosam, validam, crassam, asperam, humore circumfusam viscoso. Hæc non modo duas illas meningas, sed etiam spodylos & totam rhachidem vestit, & contra motus violentos & iniurias alias omnes tum internas tum externas tuto communit. Nascitur autem ab osse occipitis, quo loco spondylis committitur, & ad imam usque spinam, sicut & ipsæ meningæ, excurrit.

*Μυοκέφαλον*. species est *πῆς κεφαλῆς*: sic autem dicitur parua adhuc & incipiens, & capiti muscæ similis, unde & nomen habet. Nam cum vlcera, quæ erosa vel rupta cornea tunica accidunt, profunda euaserint, portio vucæ excidit, quodque prolapsum est nigrum aut cæruleum apparet, in circuitu vero circa fundum eius partis quæ procidit, labra erosa ruptæve corneæ candida apparent, eoque magis si quod prolapsum est induruerit, & corneæ funicæ labra callum contraxerint. Cæterum prolabeñte vucæ, pupilla omnino diuellitur, adeo ut vel nullo modo appareat, vel alio prorsus situ & figura. Et his quidem notis τὸ μυοκέφαλον ἀπὸ τῆς φλυκταίνης distinguitur.

*Μυοχών*. epitheton est hiantis apud Hippoc. Si vero legas *μυριοχών*, significabit in millibus laxatam, ut annotat Galen. in suo Lexico. Apud Erotianum est *μυριοχών*.

*Μυῖς*. sic dictum fuit à quibusdam *μυῖ*, sic ut legitur apud Dioscor.

*Μυῖς*. dicitur à quibusdam *μυῖ*, ut habetur apud Dioscor.

*Μύκη*. *μύκη*. præcussio, conuiuentia, apud Hippocr. sicut Galen. annot. *ἐν ταῖς γαστέρις*.

*Μύκη*. fungi. Sunt corpora quædam spongiosa, leuia, mollia, intus & foris cædida, è limo & acrescente succo madetis terræ in ipso crepusculo excitata. Nicander eos *ζυγίσματα γαῖης*, hoc est fermenta terræ; appellauit in Alexipharmacis, quæ nos aliquando versibus Latina fecimus. Est enim fermentum aciditatis cuiusdam frigida particeps, habetque tantam cum fungis naturæ similitudinem; ut si caudice populi nigre iuxta terram conciso, aqua resolutum infundatur, ilico fungi enascantur, quos *ἀγροεῖται*, ab ipsa arbore appellant. Est autē fungorum duplex differentia: aut enim edendo sunt, aut lethales. Inter illos præcipui sunt *βακτῆραι*, hoc est boleti, deinde *ἀμυδιταί*. Ab his nutriendantur, ægiritæ, lacinia, & ab ouorum similitudine ouati; sicut & à spongia spongioli. Omnes tamen succum gignunt pituitosum, frigidum, crassum; præuū & suffocantem, etiam si quantumuis optime præparentur. Vitiatur autem multis de causis & euadunt venenati. Si enim rubiginosus clauis, si putridus aliquis patinus; si arbor noxia; si serpentis cauerna iuxta fuerit, & patescens primum adhalauerit, pernicioles sunt. Namque strangulationes laqueis similes inducunt, & animi deliquia & sudores frigidos, aut choleram, sicut Galenus lib. de euchy. & cacochy. prodidit.

Cæterum ab horum fungorum similitudine *ἐπιφύσκει*, hoc est adnata & excrecentiæ quædam, *μύκητες* siue fungi appellantur in vlcerebus. Eas Galenus initio lib. 1. de locis affectis meningi læsæ fracto cranio accidere dicit, scribens ex his quæ adnascuntur rebus, sedis affectæ notas periri, quoniam res adnascens essentia proprietatem obtineant: quemadmodum, inquit, fungi, si fracto capite meninx fuerit affecta. Quibus & consentiunt ea quæ ab Alex. Aphrodisæo scribuntur problem. 86. libro 2. fracto scilicet cranio humores affluere, qui ossis frigore cōdensati in speciem fungi concresecunt, superiori parte ampliusculi, infra vero præternues. Idem tamen Galen. commen. 3. in lib. 3. τῶν ἐπιδημίων videtur fungos communes facere omnibus partibus exulceratis, ut palpebris, pudendis & reliquis, humorum crassitie eiusmodi efficiente, inquit, excrecentias quas vulgo fungos vocant.

*Μυοτῆρες*. nares. proprie dicuntur concauæ nasi partes vtrinque positæ, quæ meatum præbent spiritui & odoribus. Verumtamen quandoque totum etiam id membrum *μυοτῆρ* à medicis vocatur.

*Μύλαι*. sceminino genere dicuntur molares dentes à Gal. l. de Ossib. & l. 9. de vsu partium. Ab Aristot. vero l. 2. de hist. animal. & à Ru-

fo lib. de partium hominis nomincl. dicuntur *μῆλαι* genere masculino. vide *ῥαμνός*: hoc enim nomine etiam vocantur.

*Μυοειπίς*, ἢ *μύκη*. hoc est mola, seu parvella, de qua mor.

*Μόλη*. mola. Est os latum & rotundū tori genū suprapositum. Ob figuræ similitudinem sic dictum est. Siquidē, vt mola pistrinensis, & rotundū est, & ab anteriore parte lateribusque asperum. A quibūdā & parvella & rotula Latine vocatur. vide *ἄρρηκτος*.

*μύλη*. mola. Est caro informis & inutilis in muliebri utero concepta. Ea interdum rudimentum cuiusdam formæ obtrinet, sed inchoatum duntaxat. Cute vel membranis obducta, intus venis abundat compluribus, sine ossibus, sine intestinis, sine visceribus. sic à semine imperfecto atque infœcundo, vt cui calor desit quantum adesse expedit ad fortis conformationem, non tamen plane frigido humidoque. Siquidem ex eo nihil omnino effici potest. Quo fit vt mulier sola citrà viri congressum molam non gignat, quoniam viri semen frigidius atque humidius sit, sed semen viri præterea accedere oportet, naturali tamen frigidius, atque vbi id infœcundum, nec eo, vsque progredi valens, vt hominis formam effigiet: id enim vegeti caloris nativi spiritusque opus est. Sed non sic gallinæ. solæ namque sine coitu oua *ὄρνις*, id est subuentanea, concipiunt, quæ plane muliebri molæ respondent. In causa est siccior volucrum temperatura, humoris frigidi redundantia in semine absumens. Attamen mola, quamvis prorsus inutilis, concepti fœtus speciem per initia exhibet, menses sistit, nauseas & vomitiones excitat, vterum attollit. Postea vero naturam prorit ad sui excretionem. Id quod sæpe quadragesimo die, interdum autem tertio mense contingit, vel multo etiam serius, adeo vt præterque nouem decemve menses, aliæ totò etiam vitæ spatio eam in vtero gestauerint. Alimentum namque per venas vteri non aliter quam fœtus attrahit, eoque nutritur & augetur, vitæ perinde atque placentia prædita. Ab excretionē vero puerperia citantur quæ *μύκη* vocant, lac in mammis colligitur, cæteraque contingunt vt in legitimo partu.

*μύλη*. mola. herbæ nomen, cui Gal. lib. 7. medic. simpl. radicem paruo bulbo similem assignat, vimque tribuit, Dioscoridis fretus autoritate, laxiorem vterum comprimendi. An sit eadem cum *μύλη*, nemo certo affirmare possit.

*Μύλη*. medicamentum dentium dolores sedans, inditum in dentem vel oblitum. sic dictum est à dentibus molaribus.

*Μύλη*. *πύλη*. indurare apud Hippocratem: medici enim *μύλη* siue *μύλη* appellant scirrhum in vtero concretum, vt annotauit Erorianus.

*Μύξα*. mucor, mucus. Dicitur ab Hippoc. humor pituitosus, lenrus & albus. Is in partibus ex-

anguibus, ossibus & cartilaginibus colligi consuevit, cum ad eam imbecillitatē pertenerint, vt alimentum suum nequeant cōcoquere: sic enim veluti semicoctum quid relinquitur, non secus atque in oculis membranz laborantes sordem eam reponunt quam *μύλη* appellant. Nec tamen is humor qui *μύξα* dicitur, perpetuo contra naturam est. Siquidem in omnibus articulis mucosum quendam humorem videre licet, vt inde & magis promptior & articulus iniuriis minus esset obnoxius, quod quæ sicca sunt abrupti in motionibus facile soleant. eamque ob causam vertebrarum vincula *μύξα* Hippoc. lib. de articulis appellauit. Sed contra naturam in iuncturis plerumque ille succrescit, de quo scriptus est Aphor. penultimus sectionis sextæ, atque etiam in vtero, vnde abortus sequitur, quemadmodum Aphor. 45. sect. 5. scriptum est. Quamvis autem humor ille qui *μύξα* vocatur eiusdem plane generis sit cum eo quem *βλεννα* ipse etiam Hippoc. appellare consuevit, differunt tamen, quod *μύξα* dicatur ille proprie qui est in articulis, aut in spatiis internis cōtinetur: *βλεννα* vero, qui è cerebro per palatum & nares descendit. quamquam Galen. lib. 8. de usu partium, quam antiqui *βλεννα* & *μύξα* dixerunt, à iunioribus *μύξα* vocari scripto prodiderit.

*μύξα*. prunorum species Galeno & Dioscoridi incognita, Actuario, Psello & Aetio frequens ad compescendas febres, leniendas pectoris asperitates, sedandas tussis & vrinæ difficultates, quas bilis aut æstus excitat. Eius arboris ligno cortex dicitur esse albus, ramus virens, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis & candido lentore plenus cum interiore nucleo quasi olivæ siccat. Ex eo lentore mucoso videtur illi nomen inditum fuisse: sed per diminutionem etiam *μύξα* appellatur. vulgo febesten dici videtur.

*Μυοειπίς*. idem quod *μυοειπίς*, à muco, arbitror, qui per nares exit. Et nares Sophocles etiam *μύξα* appellauit.

*Μυοειπίς*. cognomen *ἑλμύτης*, quod mures, si ab ijs edatur, necer.

*Μυοειπίς*. dictum fuit à quibūdā *τὴν ὀδόν*, sicut habetur apud Dioscoridem.

*Μύς*. *ῥίνα*. vel *μύς*. *ῥίνα*. muris auricula. herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubentibus & concavis, foliis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus per interualla assidue geminatis atque in mucronē desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus, flosculo vt anagallidis cæruleo. radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Sic dicta est quod foliis aures muscutorum imitatur. Eadem *ῥίνα* vocatur, quod lucis opacisque gaudeat. Desiccatur ordine secundo, nulla euidenti caliditate.

*Μύς*. sic dici à nonnullis *τὴν σιμύλην*, Dioscor. author est.

*Musculus*

*Musculus* est *σπέρμος*. decurrens, aut mutilus, aut decrefcentis pulsus. Est pulsus systematicus decrefcentis. Esse quidem systematicum palam est, siquidem in pluribus pulsationibus magnitudine imparibus inæqualis est. Decrescit autem, quod in eo secundus primo, tertius secundo, quartus tertio, quintus quarto minor euadat, & sic deinceps plurimi. sic dictus est à figuris quæ in acutum desinunt, ut ait Galenus, vel quod similitudinem referat caudæ muris, vel *ὡς τὸ μὲν ὑπὸ τῆς ἀκροῦς*: hoc est, quod minuat in fine caudæ, unde quidam *μεινός* per diphthongum scribunt. Est autem pulsus *μεινός*, hoc est decrefcentis, duplex differentia. Nam vel non cessat decrefcerere atque minui donec omnino aboleatur, & desinat prorsus moveri, qui *ἐκλείπων μείνους* appellatur: vel cessat decrefcerere & minui, qui etiam duas habet differentias. alius enim in qua desinit paruitate, hanc perpetuo seruat, alius vero rursus augescit, quem *μεινός παλινδρομικός* vocant, & redit ad aliquam magnitudinem, eamque vel priori parem, vel maiorem, vel etiam minorem: ac nonnulli quidem quæ ante proportionem sunt imminuti, eadem rursus augentur, alii vero maioribus vel minoribus accessionibus utuntur. Pulsus omnis *μεινός* provenit ab imbecillitate facultatis pulsificæ, quæ tanta est ut ei oneri sint admoti arteriæ digiti. Verum ea imbecillitas in eo qui *μεινός ἐκλείπων* dicitur, maxima est, neque enim se recipit & recolligit, postea in eo qui in qua desinit paruitate hanc seruat, minor vero ubi magnitudinem recuperat. Cæterum alii etiam à prædictis pulsus differentia *μεινός* à medicis appellatur. Vna est cum in vnicâ pulsatione & diuersis arteriæ partibus talis inæqualitas apparet, ut parte superiori arteriæ magnus, inferiori vero iuxta agri pollicem parvus pulsus sentiat, & hic *μεινός* in vno pulsu dicitur. Altera vero est cum in vno pulsu diuersisque arteriæ partibus inæqualitas sentitur, pulsu circa duos medicos digitos medios magno, circa extremos vero minore apparente: hic ab Archigene *μεινός ὁμιλικός* siue *ὁμιλικός* dictus est, quo nomine voluit indicare eam quæ in diastole est breuitatem cum vtriusque extremi quadam conniuentia. Neque enim omnino interciditur, sed veluti reflexis vtrinque partibus in breue contrahitur magnitudine, estque *μεινός* secundum vtrumque extremum.

*Muscus* medicamenti genus ex acopi cum vnguento temperatura confectum. Id ergo sicut acopo liquidius, ita vnguento crassius est: recipit enim aut ceram aut resinam, aut aliquid eiusmodi, quorum nullum in vnguenta admittitur. Habet præterea *μύσος* quandam odoris suauitatem, per quam præstat acopis. Eius confectionis exempla habentur præterea apud Galenum libr. 7. *τὸν καὶ ὅτι*.

*Muscus*. myrice, hoc est tamatice. Arbor est sen potius humilis frutex amerina ramis, folio angusto, carnosio & fete pinnato. Duo eius genera, sylvestris & sativa, illa omnino sterilis, hæc fructum ferens gallæ similem. Sylvestrem Gallia bryariam vocat & ramaris. Vires habet incidendi extergendique, nec tamen manifeste siccat, sed adstrictionem quoque nonnullam obtinet. quæ de causa decoctum ipsius lienosis prodest.

*Muscus* sic dicitur à quibusdam *ἀμύσος* *σπέρμος*, ut habetur apud Dioscor.

*Muscus* millefolium aut supercilium Veneris. Caulis est tener singularisque, radice vna, foliis fœniculi, læuibus, plurimis, vade & nomen accepit. præterea subrubicundus & quasi arte expolitus. Exsiccat, adeo ut vulnera glutinet.

*Murmiæ*. formica. Est cutis excrementia exigua, callosa & plerumque teres, basi latiore crassioreque. Hæc cum reliqua omnia habeat cum acrochordonæ similia, sola basi differt, quod ea acrochordonæ angustior sit, in tantum ut pedere videatur instar summæ chordæ. Celsus *μυρμικία* genere neutro vocans scripsit verrucis esse similia (non distinguens verrucarum genus, sed acrochordonas, ut arbitror, intelligens) humiliora thymio durioraque, quæ radices altius exigunt maioremque dolorem mouent, infra lata, supra autem tenuia, minus sanguinis mittunt (namque acrochordon pro sui magnitudine sanguinem, si secetur, copiosum remittit) magnitudine vix vnquam lupini modum excedunt, & nascuntur aut in palmis aut in inferioribus partibus pedum. Paulus vero totum corpus præsertimque manus myrmecis infestari prodidit. Ea si vel deradantur, vel constringantur, vel aliter attrahantur, sensum mordentis formicæ inducunt. Inde illis inditum nomen est. Aetius vero addidit & coloris similitudinem, eaque atro colore perinde ac formicas videri. Plerique *τὸν μυρμικίαν* sessilem verrucam, quod basi suæ tota insideat, dicunt, ad differentiam *τὴν ἀκροχόρδον*, quem pensilem verrucam interpretantur.

*Murmiæ* *σπέρμος*. formicans pulsus. Est pulsus inæqualis in vna pulsatione & diuersis partibus arteriæ, formicarum motui similis. Hic pulsus est omnium minimus, & cum motus multos amiserit, in vnum eumque prorsus paruum desinit. Quocirca nec inæqualem omnino dicas, quanquam esse ex genere inæqualium verisimile est, sed inæqualitas tam parua est, ut sensum fugiat. Nomen inditum est, ut quidam volunt, quod perinde paruus sit atque formica: alii vero, quod eodem quo formica modo agatur, sicut & *σπέρμος* & *σπέρμος* à motionis specie appellantur. Sunt qui vtramque ob causam sic nuncupatum censeant. Ut vermiculans ab vndoso paruitate differt, sic formicans à vermiculante. Nō enim aliud est formicans pulsus, quam vermiculans imminu-

**mus:** sicut vermiculans non aliud est, quam vndosus diminutus. Tres enim hos pulsus distinguit quantitas & magnitudo, non qualitas. Est autem formicans mire paruus. nec eo minor alius, iuxtaque languidissimus plane ac creberrimus, non tamen, ut Archigeni visum est, celer, sicut Galen. lib. 2. de pulsuum dignotione demonstrauit.

**Myrobalaris.** glans vnguetaria. De eorum veteres & recentiores diuersa scripserunt veteres fructum esse arboris tradidere, magnitudine auellanae nucis, vel ut alii, magnitudine & aspectu capparis. Stomacho aduersatur. Cum hydromelice pota carnis eius drachma vna est vomitoria. Sed cum oxycrato iecur & lienem purgat. Cum aceto, quo maxime ad agendum excitatur, lepras, psoras, vitilignes, pruritus extergit, hepatis & lieni indurato illinitur. Apud antiquos cortex eius premebatur odoris gratia, nucleis, anthore Theoph. inutilis erat, caro autem ab aromatatis expectebatur. Cum enim eius succus in odoratus sit, omnibus suscipiendis odoribus aptissimus est, ut inspidum saporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum balaninum Dioscoridi dicitur. Oleo expresso quod reliquum est magna terreum & amarum, incidit, terget, contrahit, stipat, videturque id esse quod *μυροβαλανί πικρία*. Graeci appellant, quo saepe utitur Galen. ad scirrhus. apud quem aliquando *μυροβαλανί tantum*, aliquando *μυροβαλανί αριστεύει*, aliquando *βαλανί μυροβαλανί* leges: aliquando vero *μυροβαλανί αλευρον* & *μυροβαλανίου λεπτόχαρα* & *μυροβαλανί λεπτόχαρα κραιμμία* & *σπιγμύνα*. hoc est, myrobalani corticem casum & relectum. Ceterum veterum myrobalanorum tres praecipuas differentias Plinius recenset, Syriacam, quae in Arabia proueniret, & erat candida, & a qua quod manabat oleum, optimum habebatur, quamuis paucum flueret. Thebaicam, nigram, quae olei copia praeferebatur. Tertia Troglodyticam omnium vilissimam. At Arabes recentiores quinque generibus myrobalanos distinxerunt, quae veteribus ignota fuisse putantur & prunorum generi potius quam balanorum, id est glandium, assignanda, & quae non facultatibus modo, sed alia ex aliis etiam arboribus nasci putantur. Sunt autem haec: Lutea, quae ex herbaceo colore flauescunt, spissa, ponderosa, exili nucleo, cute crassa. Refrigerant & bilem ducunt, vulgo citrina appellantur. Corulea, quae vulgus a colore Indae nominat, solida sine nucleis, oliuae forma: atram bilem deiiciunt, & exhilarant. Tertio ordine collocantur Cepula, ceteris ampliora grauioraque, ex fusco rufescens, carnosa, phlegmagoga sunt, visum illustant, coctione iuuant, pectus purgant, hydropicis conferunt. Ab his Empelica censentur, cute ossibus haerente, lapillorum penes figura. Ea pituitam trahunt, ventriculum purgant & roborant, appetitum reuocant, vomitum sistunt. Ab Actuario *εμπελικα* & *εμπελ* dici videtur, vulgus Emblica vocat. Postrema sunt Beletzi-

ca, eadem quasi forma qua Empelica, vulgus Bellirica appellat: iuuant empyos, haemorrhoidas & capilli defluuium.

**Myron.** vnguentum. Est medicamentum liquidius quo externae corporis partes inungi possunt. Constat medicamenti diuersi generis, ut liquoribus, adipibus, medullis. quae si ita cum oleo misceantur, ut exactam olei spissitudinem acquirant, simplici vocabulo *μυρον* vel *αλοιμυρον* appellantur: si autem ceram aut resinam, aut aliquid eiusmodi recipiant, & crassitie *βίς αλοιμυρον* similia euadant, compositi nomine *μυροεχον* nuncupantur.

**Myronios.** medicamenti compositi nomen est alopecias sanantis, cuius meminit Soranus in pharimaci compositione quam citat Gal. lib. 1. *τὸν καὶ τὸν*. Nectamen quale id ipsum fuerit, Galen. certo videtur scire, scribens se existimare picem fuisse & ceram vnguento quopiam, ut gleucino, lautino, nardino, lentiscino, cedrino, eliquatam.

**Myrica.** apud Hippocratem Aelico idiomate dicitur *ἀνὰ τῆς σμύρης*, ut Galenus *ἐν τῇ γλῶσσῃ* annotauit.

**Myrris.** herba est simillima cicuta caulibus & foliis, radicem habet modice oblongam, teneram, rotundam, odoratam, cibo non insuauem. Herbariis & officinis cicutaria dicitur. Calfacit secundo ordine, & non nihil etiam extenuat. Radix mensibus mouendis & humoribus e thorace pulmoneque repurgandis idonea est.

*myrris:* etiam a quibusdam dictum fuit *νυκκιν*, ut habetur apud Dioscor.

**Myrtus.** myrtus. Arbuscula est duorum generum. Vna, latius, duplex, candida & nigra: altera sylvestris. Satiua maior est, ramis flexilibus & lētis, rubro cortice, foliis longiusculis, perpetuoque virentibus, puniceis & mulis, quamquam in nigris nigriora, in candidis candidiora spectentur. Flores omnibus insident candidi, odorati: ex quibus, praesertim in Aegypto, aqua manat odoris suauitate eximia. Satiuarum utrumque genus baccas fert oblongas, agrestibus oleis quodammodo similes, inultoque quam sylvestres myrti maiores. Ceterum sylvestris myrti nomine non est intelligendus fuscus, qui & Diosc. & Plin. sylvestris & acuta myrtus appellatur, sed vere sylvestris myrtus, quae sua sponte sine cultu oritur: in cuius genere alba quoque & nigra reperitur, ita tamen, ut alba pura non sit, sed in purpuram inclinet. Fuerunt & alia veteribus myrtigena, nobis quoque non ignota, Tarentinum & exoticum, quorum Plin. meminit l. 15. c. 29. his verbis: Satiuarum genera topiarii faciunt, Tarentinam folio minuto, nostratam patulo, exoticam diffusimam, senis foliorum versibus: Haec non est in usu, ramosa utraque alia. Constat myrtus contrariis substantiis. Vincit quidem in ea frigidum terrenum, habet verò etiam quiddam tenue calidum, unde valenter desiccatur. Ex ea paratur emplastrum quod *μυροειδης* vocant, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 17.



**Myrtus**, sic à quibusdam dicitur prima species & *καμαρίδος*, quod foliorum magnitudine myrto similis videatur. Eadem etiam *δαρυνός* appellatur.

**Myrtidaron**, appellatur Dioscoridi virgultu myrto adnascens, nodosum, inæquale, verrucosum, concolor, quod myrti candicem perinde atque manus amplectitur. Adstringit vehementius myrto. Plinius quod sylvestris myrti bacis factum est vinum, myrtidanum appellat. Earum libra in tribus multi congiis deferrescit, donec duo supersint. Galenus virgultum & sobolem myrti ab eius radice erumpentem *μυρτίδαρον* appellauit: alii *μυρτίδα*. Idem vero *ὁ τῆς γλαύκος* scripsit plerosque apud Hippocratem *μυρτίδαρον* piper dici existimasse, verum Hippocratem eo nomine fructum appellare eius plantæ, quem ab aliis piper nominari scribit.

**Mypor**, sic à quibusdam dicitur in muliebri pudendo medio suborta veluti caruncula, quæ & *νύμφη* & *καθόεις* vocatur, atque ubi multo magis increuit, *κέρκως*.

**Myxarides**, extremæ pudendi muliebris margines carnosæ, quæ etiam *ἀσπρὸς μάλαι* appellantur.

**Mus**, musculus, lacertus. Est motus voluntarii instrumentum, prima simplici que carne & fibris constans. Propria enim musculorum substantia his duobus, carne & fibris, constituitur, vt scribit Gal. lib. art. med. Sunt autem fibræ positu simplices & secundum longitudinem vt plurimum exorrectæ. Idem vero in initio comment. 1. in lib. de fract. ait corpus proprium musculi esse fibras à nervis & ligamentis prodeuntes, quas caro simplex cingit. Ob id Hippocr. eodem lib. musculos carnem appellauit. Quæ vero ad musculos vasa perueniunt, velut riuus quidam sunt, qui non eorum substantiam complent, sed eis alimentum subministrat, vt nutriantur & viuant. Tres igitur tantum propriæ musculi partes sunt simplices, nervus, ligamentum (à quibus membrana musculos ambiens oritur) & caro simplex, ambobus in villos diuisis vndique circumdata. Compositæ vero & totius musculi maximæ partes sunt, caput, quod & principium appellant, in quod nervus & ligamentum inserti solent, venter carnosus magis & musculus, præcipue circumscribens, & finis ex quo tendo, & aponeurosis oritur, atque in partes mouendas inferitur. Nec tamen facile est tres istas partes in quibusdam musculis discernere, vt sphinctere & intercostalibus. Est autem musculus instrumentum motus voluntarii, qui in eo perficitur à nervo in eius caput inserto, & in varias fibras diducto sparsoque per vniuersum musculi corpus. Siquidem his contractis in se ipsas versus caput suum musculus mouet, quæ est propria musculi actio. Si enim contractæ, partem in quam tendo inferitur, versus caput attrahunt, sed sæpe multum varie, pro vario fibrarum situ. Musculo prope omni aduersus alter muscu-

lus, contrariæ actionis author attributus est, vt flexori tensor, adductori abductor, lenzatori depressor, clausori apertor. Pauci enim omnino sunt qui antagonista careant, vt sphincteres & diaphragma. Nec tamen numero, aut magnitudine, aut robore pares semper sunt musculi actionum contrariarum effectores, pro partis mouendæ pondere aut actionis vehementia. Sunt autem musculorum differentiarum plures: aliquæ ab ipsorum substantia carnosæ, nervosæ, magis membranosa: aliæ à magnitudine, magnus, longus, latus: aliæ à numero partium, biceps, triceps, siue gemelli & trigemini: aliæ à figura, deltoides, rhomboides, scalenus: aliæ à partibus corporis, crotaphitæ, rhachitæ: aliæ à situ, anteriores, posteriores, interni, externi, recti, transversi, obliqui: aliæ vero ab actione, vt sphincter & masseter, de quibus omnibus suis locis. Cæterum dictus est musculus, vel quod excoriatum murem forma imitetur, vel quod pisces (quod mihi videtur probabilius) quem musculum appellant similis sit. Dicitur alio nomine à Latinis lacertus, à quo lacertosus musculorum significat. **Musæ**, pars est faciei quæ supra labra est & infra nares. sed & barba ibi exorients eodem nomine dicitur.

**Musæides** *πλάγιος*, musculosa extensio, seu musculus latus. Est substantia tenuis & membranosa, faciem prope totam & totum collum regens atque mouens. Huic originem dat membrana quædam nervosa toti nostræ cuti subnata, hic vt in fronte & capitis parte aliqua carnosior effecta. Prodit autem ab aurium radice, occipite, spinis omnibus cervicis, spina omoplatæ, acromio, clavi & sterni, totusque tenuissimus in faciei partes prope omnes fibris à tam diuersa origine variis inferitur, easque ob id in omnem prope partem mouet. Nullus ab hoc musculo detinetur articulus, quoniam nec in articulum etiam inferitur, verum buccas & cutim, quibus coalescit, solas mouet. hic in iis qui spasmo corripiendi sunt, primus omnium intenditur, & qui *κυνήσις*, hoc est, canini, vocantur spasmi, huius præcipue musculi affectio sunt.

**Musci**, vide *μύσων*.

**Muscheron**, antidoti nomen quæ & *πτεροφάρμακον* dicitur, propterea quod ex quatuor rebus constet: Gentiana, aristolochia, baccis lauri & myrrha æquali potestate mixtis. Commendatur ad arthritidem ex humore pituitoso contractam. Descriptio eius habetur apud Aetium lib. 12. cap. 47.

**Muspor**, mensura est liquorum apud Atticos, tres drachmas ponderales capiens siue cochlearia, duo & dimidium, siue *χάλυς* vnam & quartam ipsius partem. Eius nota apud Græcos fuit *μ*, cum à desuper imposito.

**Musarion**, est intritum, siue pulmentum ex alio & nigra oliuâ compositum, quod in cibo mouet urinam, ossa venarum patefacit & hydropticis vile est, sicut habetur apud Dioscoridem cap. de alio, & apud Galenum *ὁ τῆς*

**γλώσσας.** Alii, ut scribit Erotianus, placentas interpretantur ex olera confectas: alii autē *τὸ λεγόμενον γλῶσσαν*. Dicitur, inquit, *ὅτι τὸ μυστικὸν αἵματι πλεονεκτήσαν, ὡς τῇ μυστικῇ*. est enim gustanti aspernabile.

**Μύς.** vocatur ab Hippocrate quod est in ore sepis atramentum, & piscis quidam, sicut Gal: *ὅτι τὸ γλῶσσαν* annotauit.

**Μυσδὶς, χλαμύδα.** vide post *μύς*.


**Μύσος.** is dicitur qui à primo ortu oculis propius admodum videt eaque prope oculis contingit, & limis semiclusisquē oculis aspicit, etiam si parua sint: remota verò, quamuis magna videre non potest. Virium oculorū est congenitum ab imbecillitate spiritus visui, eamque ob causam incurabile: eo differt *ἀπὸ τῆ νυκτεπλάνης*, qui non natura, sed ex morbo talis euasit. *μύσος* Græci vocāt quasi minus vidētes, Latini lusciosos & luscitiosos & nuscitiosos appellāt, ut Budzus annotauit. Affectio ipsa *μυστία* nuncupatur, & aliquando *μυστιαισις*.

**Μύλον,** frutex est folio graminis humi sparso: flore albæ violæ simili sed minore, lactei coloris, caule candido, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod alii speciem referat. radix est oblonga, bulbosa. Hoc verum est moly, idem cum *τῇ μύλῃ*, cuius Galenus libr. 7. simpl. medic. meminit: Ab eo diuersus est frutex ab vna radice coplures virgas fundens, foliis multo longioribus & tenerioribus quam rutæ, graui odore, cædido flore, capitellis amplioribus paulo quam satiuæ, tripliciter diuisis, in quibus semen triquetrum, subrufum & amarissimū sapore. Hoc quidem genus quidam nuncupant moly, ut Cappadoces & Galatæ, quoniam à vero moly non omnino discrepet eius facies, radice videlicet pulla & candido flore. Alii armela, Arabes harmel, Syri besafam, Græci *πύρρον ἀγρίον*, hoc est sylvestrem rutam, vocant. Eiusmodi est *μύλον* Homericum, ab eo decantatum Odys. x.

**Μόλυξ.** apud Hippocratem significat allium, simplex caput habens & non diuisum in spicas, ut explicat Galenus *ὅτι τῆς γλώσσας*. Apud Erotianum *μολύξ* scribitur. Sunt qui *τὸ μολύξ*, inquit Galenus, interpretentur:

*Μολύμενα* dicuntur apud Hippocr. *τὸ καὶ βραχὺ διαμαρτυμενα*, hoc est, paulatim extabescencia, sicut Galenus annotauit *ὅτι τῆς γλώσσας*.

**Μόρος,** fatuitas, stultitia, stoliditas. Est deficiens seu infirma motio facultatis ratiocinatricis. Ad eam quidem facultatem proprie pertinet fatuitas, non tamen reliquæ principis facultatis actiones integre sunt, sed pariter imperfectæ: nam & parum apte imaginantur, nec probe meminisse solent fatui, quippe qui cerebrum non habere vulgo dicantur. Atque ita rem se habere declarat Paulus Aeginetā libr. 3. cap. 1. i. scribens dici *μόρῳ*, cum & ratio & memoria male fuerint affecta, & ab iisdem causis eam fieri à quibus & memoriam & rationem laedi contingit. Similiter & Aëtius ex Rufo & Galeno scribit *μόρῳ* esse, quādo vna cum memoria etiam ratio perit. Quibus quidem authoribus *ἡ μόρωσις* non est simplex affectus, sed rationis primum, deinde verò & memoriæ. Quæ eam inducunt, in Prothet. sect. 2. dicuntur *μαρωμένα*, hoc est, *πὺ μόρωσιν ἐμπροσθε τῇ διανοίᾳ*, sicut Galenus explicat. Eiusmodi sunt vel minus idonea decensque cerebri conformatio, vel frigida intemperies, aut frigidus aliquis & pituitosus humor in cerebro collectus, vel medicamēta quæ foris imposta caput modice refrigerant. Neque enim *μαρωσις* causa tam vehemens magnaue est quam *τῆς ἀνοίας*, quæ eiusdem facultatis abolitionem priuationemque significat. Eo enim discrimine *ἀνοία* καὶ *μόρωσις* distinguuntur. Iam verò differt *ἡ ἀνοία* ἀπὸ τῆς *μόρωσις*, quod ut scribit Galenus, illa quidem abolitio sit, hæc vero functionis ratiocinatricis aut imaginatricis etiam deprauatio, quodque, ut ait Aëtius, *ἡ μόρωσις ἀπὸ πολλῶν καὶ ἀπορίας*: hoc est, stultitia consentanea dicit & facit: delirium autem, quod & *ἄγρος* & *ἄγροισις* vocatur, non seruata rerum consequentia, alium alii sermonem implicet qui nihil ad rem faciat. & delirium quidem vt plurimum senibus, *μόρωσις* autem & pueris & adolescentibus & reliquis ætatibus à morbo accidat.



# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

### TO N.



*Nardus*, dicebatur apud veteres *ἀμυγδαλῆς*, vt scribit Athenæus, quod in Naxo insula amygdalæ præstantissimæ nasceretur. *Nardus*, idē quod *σινδύς*, sic dictū quasi *νάρκω*, vt interpretatur Athenæus,

quoniā nō sine natura sit, sed acti & proinde incōmoda donetur. addit, vel quod pusillo sit corpore: sicut *ἀπὸς* Græci dicunt quod natura priuātū sit, vnde piscis *ἀπὸν* denominatur. Alij *νάρκω* per priuationem, videlicet *νάρκω*, quasi immite dici volunt, quoniā, acimenti vehementis particeps sit. Est enim feruidum sinapis semen & acerrimum.

*Nardus narbonneus*, sunt differentię quædam collyriorum, sic dictæ quod nardo constet. Eorum & diuersi modi sunt, sic diuersæ facultates habentur quædam eorum formulæ apud Paulum & apud Aetium.

*Nardus*, sic magis quā *νάρκω* vocatur nard<sup>o</sup> montana, q̄ apud nos, inquit Gal. nascitur, vt quæ multo sit inferior Cretica, Celtica & Indica.

*Nardus naxos*

*Nardus*, est frutex grami & crassa radice, sed breui ac nigra fragiliq̄, quamuis pingui, situm redolēte, vt cypēri aspero sapore, folio paruo densioriq̄, cæminibus in aristas spicatis. Duo sunt eius genera, vnū Indicū dicitur, alterū Syriacū, non q̄ in Syria proueniat, sed quod montis, in quo ille nascitur, altera pars Syriæ, altera Indiæ spectet: parte autē ea quæ ad Indiā vergit, quia Gæges fluit, quæ nardus circa eū nascitur, *νάρκω* siue *νάρκω* dicta est, procerior quidē reliquis propter loci humiditatem, sed minus odora. Est & alia nardus *ἑρπυλῆς* vocata, quod virulētū expiret odorē. Dicitur etiā nardus alia *συμφυεσσα*, à regione in qua oritur, pumilo fruticē, grādi spica, cādida, odore hircino, quod aliqui *ψευδοnardus* esse suspicati sunt. Fuit etiam apud antiquos celeberrima *νάρκω νάρκω* (de qua inter se Ruellius & Marcellus dissident, si nē ea quam Latini saluicam appellāt) foliis longiusculis, flauescētibz, flore luteo, nascēs, in Liguriæ alpihus. Nascitur autem cum ea semper herba quædam quæ *νάρκω*, hoc est, hirculus, appellatur, à granitate odoris, sed sine cauliculo est & candidior, minoribus foliis, radice neque amara neque odorata. Est & genus nardi montanæ, quæ aliquibus *συμφυεσσα* aut *νάρκω*, Galeno *πυκνὴ* appellatur. ramulis & folio eryngii, sed minoribus, neque scabris & aculeatis, sine caule, sine flore, sine semine, radice nigra, duobus aut pluribus hastulæ regię bulbis, sed gracilioribus & minoribus, cui vires cū Celtica pares sūt.

*Nardus azeia*, à quibusdam dicitur *νὰ ἀζορ*, vt Dioscorides scripsit.

*Nardus*, dicitur apud Theophrastum genus vnum ferulæ humilioris.

*Nardus*, ferula. frutex est caule assurgens triculari vt plurimum & multum leui, fungosa medulla pleno, folio grandi, molli, multifido, caulem amplectente, vt in arundinibus. Duo ei genera Theophrastus reddit, *νάρκω* vocat assurgentē recte, *νάρκω* semper humilem, quæ ab aliquibus ferulago dicitur. Semen eius exrenuat calfacitque, medulla viridis adhuc adstringit.

*Nardus*, ex India desertur corticosum, simile sycomorī libro: quod iucundi odoris gratia suffatur. Vide & *Nardus*.

*Nardus*

*Nardus*, torpor. stupor. Est sensus motusque diminutus neruolarū partiū. Symptoma est tactus nō exquisiti in partibz. sensu præditis, sed debilis, cū motu pariter debili & languido. Galenus in 2. lib. de sympt. causis inter deprauati motus symptomata recēssit, quæ naturæ & morbo cōmunia existūt, hoc est, quæ citra naturæ operā fieri nō possunt. Est enim stupor ex morbo & facultate mistū symptoma, ita vt morbus quidē vrgeat, sed facultas aliqua ex parte reluctetur. Quo fit vt quibus membrū aliquod stupidū est, si quicquid tetigerint, obscuro & hebeti sensu percipiāt, neq̄ perfecte & sine dolore moueri possint. Si nāque morbus virtutē prorsus superet, nullo modo corpus vel partē eius stupore correptam sustinere poterit: si virtus vincat, nulla in re laborabit. At si veluti pugna quædā sit, mouebitur quidē membrū, sed ægre, atque si iubeas vt, cum læsum membrum extendunt, ipsam extensum seruent, nequeunt: siquidem propter sustinentis virtutis imbecillitatem, naturali pondere deorsum decidit. Vt autem in moru, sic & in sensu media dubiaque affectio est, eo nō prorsus extincto, sed admodum obscuro & hebeti. Ex quo patet stuporem ab apoplexia & paralyfi differre, in quibus propter causarum magnitudinem sensus motusque in totum abolentur, cū in stupore aliqua tantum ex parte minuantur. Qua in re magna in excessu defectuque differentia est, pro causarum inæqualitate. Magna namque causa magnum stuporem, parua paruum, mediocris mediocrem mouet. Quamobrem non immerito dictus est via qua ad paralyfim itur, vel parua etiam paralyfis, propterea quod sola causarum magnitudine differre videantur. Sunt autē corporis plures causæ. Ac in primis quidem refrigeratio ab intemperie aut frigidis me-

dicamentis inducta durities ac crassities immodica ab alimento multo, crasso, lento, aut frigore violento & adstringente: aut vitæ ignavia, aut solitæ excretionis suppressione. Compressio ab aliquo corpore duro nervis extrinsecus appresso, ut vinculo, sessione, iniuriâ, compressu manuum, vicinæ partis phlegmone, scirrhus, osse fracto vel luxato: adhuc obstructio nervorum vnde cumque inducta. Siquidem ob eas causas animalis facultas à cerebro in nervo transmitti solita per illos penetrare nequit contractos, crassos, pressos, obstructos, ut foliis radi per ærem tenebrosum, caliginosum, humidum, & per aquam limosam splendorem syncerum transmittere nequeunt. Eadem autem causæ, ut ante diximus, si maiores fuerint, pro stupore paralyticum excitant: utriusque enim causa continens est nervi affectus maior minorve ex harum causarum aliqua natus, animalem facultatem à cerebro in eum descendere impediens. Præter eas autem alia causa est, contactus videlicet torpedinis marini, quæ non tam earum causarum aliqua quam occulta quadam & indicibili proprietate stuporem tangentibus inducit, à quo effectu *νάρκη* pariter à Græcis, ut & torpido à Latinis dicta est. Est autem torpor interdum totius corporis, hoc est *νάρκη* interdum vero certæ cuiusdam partis, ut qui in ore & dentibus fit, quem peculiari nomine *αἰνιδία* nuncupant.

*Νάρκη* dicitur à quibusdam Centaurium magnum, ut habetur apud Dioscoridem. Quoniam vero Centaurium à quibusdam dicta est Gentiana, quidam ipsam etiâ Gentianâ *νάρκη* vocarunt, ut scribit Dioscorides, *Νάρκη* planta est cui folia porro similia, tenuia, multo minora & angustiora, caulis vacuus & sine foliis supra dodrantem attollitur: flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica nigrum, logum. Radix siccatur vehementer, adeo ut maxima vulnera conglutinet, simul tamen abstergendi & attrahendi vim quandam possidet.

*Νάρκη* dicitur etiam stupidus dolor. vide *ἰδμν*.

*Νάρκη* dicitur etiam stupescientia medicamentorum. Sunt medicamenta frigida, doloris sensum adimittentia. Cum enim plures sint stuporis causæ, quas ante exposuimus, attamen medici in medicamentorum usu ad movendum stuporem solâ frigida usurpant, quæ calorem nativum spiritumque (quibus duobus omnia vitæ munia peraguntur) vel extinguendo vel repellendo, partem cui fuerint admoda, sensu privant. Nam sine spiritu animali nihil omnino sentire potest. Id autem non omnia frigida præstare possunt, sed ea modo quæ quarto excessu eiusmodi sunt, vel ut minimum tertii refrigerantium ordinis mediâ superant, ut mandragoræ radix, alterci semen & papaveris succus. Itaque quam sit periculosus eorum usus, nemo non intelligit, ut quæ partem cui admoventur,

nisi diligenter medicus provideat, mortificent. Quod ne accidar commodissimè his calida quædam miscentur, quibus non modo tale periculum declinatur, verum etiam ipse affectus mitigatur, aut humores concoquantur, discutiantur, inciduntur, attenuantur, aut tota substantia alterantur, præterquam quod efficiunt ut vis etiam stupefacientium penitus subeat, quæ propter partium quam frigida habeat crassitiam in summo tantum corpore subsisterent. Ex his ergo patet plures esse sopientium medicamentorum differentias: primum quidem quod alia simplicia sint, alia calidis mista: & horum rursus alia plus, alia minus calidorum medicamentorum continere. Omnia mitigando dolori adhibentur, si ex eo vires resolvuntur, atque inde vitæ periculum impendit. Interim enim dum doloris cessatio est, vires robur recolligent, quod & morbo resistere, & curationis spatium sufficere valeant. Est enim in usu eiusmodi medicamentorum scopus & terminus, ut vires custodiatur, in quo consistere debet optimus medicus, qui ut crudelis est, si ægrum doloribus confici patiatur, nihilque eos faciat, ita si eius deliciis nimium indulgeat, & ad levissimos dolores commoveatur, adulator habendus est. Ergo veluti in rebus omnibus, ita hic quoque consilium illud sapientis qui, nequid nimis, dixit, complectemur. Quippe si remediis morbi propriis ægrum curatum speramus, abstinendum ab eiusmodi medicamentis est: si ex vigiliis & viribus resolvendis discrimen est, his uti licet. Quamvis enim certo constet corporis habitum nonnihil ex his laedendum, lesionem tamen quam mortem potius eligere oportet. Hac nimirum persuasione Galenus, tametsi omnium maxime, ut scribit, ab usu graviter sopientium abhorrens, aliquando tamen ea & colicis exhibuit. Sunt autem hæc omnium valentissima, vimque stupefactoriam prædominantem habent, cum in aliis aromata, & odorata atque urinam cientia semina plurima continentur & his qui vel oculorum, vel aurium, vel aliarum partium vehementissimo dolore cruciabantur, cumque æger ex tenui destillatione, vigiliis & vehementi tussi urgeretur, facile noxam eorum, si quis semel esset usus spatium emendatum iri ratus. Sed cum ea inter se dissideant, quæ plurimum sopientium in se habent, ea ad præsens quidem magis sunt efficacia, ceterum valentem & remediis rebellem in ægrotantis corpore frigiditatem relinquunt. Quæ horum in se habent minus, calfacientium vero sibi admistorum plurimum, ea quanto sunt ad præsens minus efficacia, tæo in futurum minus sunt noxia. Omnia tamen id genus magis sunt salubria, si post annum à compositione sumantur. Philonis vero medicamentum etiam si duorum triumve aut quatuor annorum sit, multo sane est melius, sed nec ipurilè tamen sequentibus annis ad decimum usque,

que sed tanto minus stupefacit, quanto est vetustius. Eorum usus inquit Galenus, optimus est, ubi mordens humor est qui affligit. Cui ut aduersissima sunt quæ extenuant & calfaciunt, ita commodissima quæ eorum tenuitatem cogunt atque crassant, & præterea vehementem calorem refrigerat. Vbi vero crassi glutinosique humores exuperant, alienissima sunt quæ torporem inducunt, cauendusque magnopere in eiusmodi affectibus eorum usus est, modo ne æger ex dolore periclitetur.

**Nāpā** ἡ ἡ νάπαρδον. Inter aromata recensetur quæ ex India olim deportabantur, corticosum natura, & putaminibus arboris mori. nūc solo nomine nobis cognitum est. Paulus lacaphthi meminit inter ea quæ magnū cypri heliacum dictum constituunt, & corticem picæ vel alterius arboris existimat. Idem forte est cum nascaphtho.

**Nāsi**. nomen est eius generis arundinum, ex quo sagittæ factitari solent, ut Dioscorides scribit.

**Nauisibens**. dicuntur ab Hippocrate effusiones sanguinis, quas etiam ἀναιμίας appellat. Translatum nomen est ab iis qui in nausea sanguinem vomunt, ut scribit Galen in πύλιν.

**Nausia**. nausea. Est deprauatus motus facultatis expultricis, quo nititur per os excernere quæ ventriculo sunt molesta. Id quamuis præter naturam symptoma sit, tamen naturale dicitur à Galeno lib. 7. de locis affectis, quod scilicet natura eo donauerit animalia, ut & tussi & sternutamento, quo noxia à se depellerent. Sed sternutamentum quidem cerebri est, tussis pulmonum, nausea vero pertinet ad ventriculum, nec eum quidem totum, sed partem eius superiorem, quem admodum & vomitio, sicut suo loco dictū est. Non est autem aliud nausea quam inanis quidem conatus vomendi: ubi enim ventriculus vel copia grauatur, vel qualitate mordacis cuiusdam rei offenditur, & eorum excretionem natura molitur, si partes imæ valent, superiores autem imbecilliores fuerint, primum ea vel eorum partem à fundo ventriculi ad stomachum usque attollit, & vacuare per os nititur, quod si faciat, vomitio succedit: sin autem per imbecillitatem aut materiæ lentorem, crassitiem & contumaciam vomitio nulla fieri potest, manet quidem voluntas conatusque euomendi, sed plane irritus atque inanis. Hic nausea proprie dicitur, præceditque fere semper vomitum, sicut & tussim ἀναιμίας, sed non ita ut vomitus post nauseam perpetuo sequatur, maxime si causa parua est quæ nauseam excitauit. Ac quamquam nausea proprie ventriculi sit, attamen per metaphoram etiam de venis sanguinem fundentibus Hippocr. lib. 2. ἀναιμίας, ναυσίαν καὶ ναυσίαν dixit, cum illæ veluti nauseabundæ sanguinem expuunt & quodammodo vomunt, quod vitium idem pau-

lo ante in venis ἀναιμίας appellauerat, ut annotauit Galenus comment. 2. οἱ δὲ ἀναιμίας.

**Nāpā**. naphtha. Est bituminis colamen & flos, coloris candidi. Itaque bitumine tenuior est, & ignem ad se, vel è longinquo celerius trahit. Plus enim in se igneæ substantiæ habet, quam reliqua bituminis genera. Eo uti ad lucernarum lumina olei vice, verus est & multis in locis vsitatum, sicut in Sicilia in Agrigentino agro, vnde oleum Siculū dictum est. Est autem νάπα Babylonicum nomen. Vis naphthæ eadem est quæ & omni bitumini, sed propter substantiæ tenuitatem efficacior.

**Nauisibens**. iuuenis. Is dicitur qui in florenti ætate est, quæ ἀκμή dicitur. Eadem enim est ἡ ἀκμή τοῦ καὶ ἡ νῆς ναισικον ἡλικία, hoc est florens & iuuenilis ætas. Terminatur, ut scribit Galenus in aphor. 30. libr. 3. quinta septimana, id est, anno tricesimo quinto: incipit autem, ut idem annotauit in aphor. 9. libr. 5. ab anno vigesimo quinto, desinente scilicet adolescentia, quæ ἡ πύλιν ναισικον dicitur. Ea ætate quia corporis robur maximum est, ideo ναισικον dixit Hippocrates in Proxhet. αἰὲν τὴν γυναικὸς ἡ σφοδρὸς ἡ ἰσχυρὸς, ut Gal. comment. 1. annotauit. Vide ἡλικία.

**Naiσικον φάρμακον**. caput stimmeos, cadmiz, chalcitidis, misyos, xenicis, singulorum pares portiones. minutim cōtunduntur, & melle respersa torrefiunt. Læuigata vsui sunt, vitur eo Paulus πρὸς μαλφάσις. τὸ βλεφάρων.

**Naiσικον**. ἡ πύλιν καὶ ἡ γὰρ καὶ καὶ καὶ hoc est, venter inferior & postremus. quanquam Homerus Iliad. 1 non dicit simpliciter ναισικον, sed ναισικον γαστήρ, eo versu:

**Naiσικον** δὲ ἡ γαστήρ καὶ ἡ δόληρος καὶ ἡ γαστήρ. hoc est, postremo seu imo.

**Naiσικον**. nomen est malagmatis, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 18.

**Naiσικον**. ἡ νῆς. hoc est, nouū vel nuper, apud Hippocrat. ut explicat Gal. in τὴν γαστήρ.

**Naiσικον**. dicitur vini multū genus ex musto confectū, hoc modo: Mustum quousq; ad dimidias fere resideat, excoquitur, & in decem eius sextarios vnus mellis Attici miscetur, post in cadum transfunditur, gypatoque vasis spiraculo in vmbra reconditur. Verum inflationibus obnoxium esse perhibetur & stomacho aduersum, daturque alui ciendæ causa. Author Const. Cæsar lib. 8. de agricult. Ex eo medicamenta multa nectarea dicta sunt, inter quæ habetur ναισικον ἀναιμίας descripta à Galeno lib. 8. τὸ καὶ ναισικον, ita dicta vel à nectare, vel ab helenio quod recipit, quod nectarium à quibusdam vocatū fuit, ex quo ναισικον οἶνος apud Dioscoridem, quod ex nectario, id est, helenio, fieret. Est & ναισικον ἡλικία colicis, pleuriticis & dyspnoicis periculū, descriptum libro 9. τὸ καὶ ναισικον, vino dulci affuso coctum, & alia præterea quamplurima à veteribus medicis eo donata nomine propter suauitatem.



*Nekmuv.* τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον. hoc est, natans & adueniens, apud Hippocratem lib. 1. τὸ παραπλεῖον, quorum alterum de chorio, alterum de foetu dictum est; vt annotat Gal. ὁ τὸ γινώσκων.

*Nvegis.* frutex est pusillus in petris, similis pēplo sed breuior, quāquam folio maiore. alio nomine παραπύριον vocatur: *νεγεις* verò dicitur, quod radice consistet neruulēta & torosa. Sunt & qui *νεγεις* τὸ πνέον appellent, vt author est Dioscor.

*Nvwp.* neruus. Est pars simplex spermatica, exanguis, sensu tantum aut sensu & motu prædita. Vt enim arteria & vena, sic neruus inter prima ac simplicissima humani corporis elementa censetur lib. 1. de elementis, & inter partes similes numeratur. Fieri autem ex semine, non ex sanguine, Galenus lib. 1. de semine prodidit, & albus ipse color neruorum arguit, quodque frigidus sit & exanguis. Erasistratus, vt habetur apud Galenum lib. de atra bile, scripsit, lētum & tractitium nec facilem excretu cibum esse à quo nerui aluntur, eiusque sententiam sequutus Galenus comment. in aphor. 26. lib. 2. ait neruos nutriri ex frigidis & glutinosis humoribus. Ex quo apparet neruos simili substantia constare, humore scilicet mucoso. Et enim si elixentur, si putrescant, in eius generis humorem dissoluuntur. Verum Galenus lib. de vsu partium scribit neruos duplici constare substantia, vt & cerebrum, alios quidem molliore, alios vero duriore. Inde neruorum duplex oritur differentia. Alii enim molles, alii duri sunt. Quorum vt substantia, sic opus diuersum est: molles enim ad sensum, duri ad motum sunt comparati. Vt autem magis minusque molles esse possunt aut duri, sic magis minusque ad sensum aut motum valent. Quod tamen non ita accipi debet, quasi duri non sentiant. Omnis enim neruus sensu præditus est, & vbi neruus est, illic etiam sensum inesse oportet, licet magis obtusum & heberem à duro quā molliore neruo: Non tamen contra necesse est omnem neruum mouendi vi præditum esse. Itaque qui nerui mouēt, iidem prorsus sentiunt, non autem e contrario qui sentiunt, iidem etiam mouent. Mollium principium est cerebrum, durorum spinalis medulla. Ab hoc principio singuli in suas sedes à natura mittuntur, molles quidem in organa sensuum, duri vero in musculos. Nullus eorum simplex est & ἀπλῆς, sed omnes coniugati feruntur, idēque ab anatomicis neruorum paria appellantur. Ac septem quidem ex cerebro, triginta verò ex spinali medulla proficiuntur. Eorum qui sunt à cerebro, primum par seu prima coniugatio est neruorum opticoꝝ, qui sunt maximi, mollissimi & cavi meatu sensibili. Secunda eorum est qui mouent oculos. Sunt autem graciles, duri, multiplices: nam ramis septem in totidem oculi musculos absumuntur. Tertia autē multiplex est, cuius portio prior multis

propagibus inferitur in crotaphitas, masseteras, cutem faciei, dentes, ginginas, musculos labiorum & linguæ tunicam ad saporem discretionem (ob id hæc tota Galeno gustatoria dicitur) Posterior autem portio, gracilior, durior aliis propagibus fertur in crotaphitas, cutem frontis & faciei, musculos labii inferni, pterygia & narium membranas. Quarta dura & gracilis in palati tunicam absumitur. Quinta duplex est, parte maiore inferitur in meatum auditorium, in musculum latum, in crotaphitas & masseteras omnes, minore vero in eisdem masseteras absumitur. Sexta omnium ramulissima distribuitur ramulis quibusdam in colli & laryngis musculos, sed fere tota in thoracē, vbi ramulos dat musculus tribus à sternō & vicina clauī ascendētibz, & rama per costarum radices demittit ad partes ventris inferni quem costalem vocamus, alterum ad musculos laryngis recurrentem, tertium insigniorem in stomachum & ventriculum qui stomachicus dicitur. Septima vero dura est & absumitur in musculos linguæ, ossis hyoidis & laryngis. Hæc autem septem neruorum paria cranio excidunt per foramina, primum rotunda, secundum scissa, tertium & quartum oblonga, quintum mediocria in osse auditorio, sextum maxima, septimū parua, occipitis maximo foramini iuncta. Quæ verò ex spinali medulla excidunt neruorum paria, inter spondylos excidunt, ita tamen vt supposito spondylo tribuantur. Primum enim thoracis par id dicitur quod inter septimum cervicis & primum thoracis spondylum excidit, & primum similiter lumborum par quod inter primum lumborum & vltimum thoracis spondylum est, & primum ossis sacri par quod est inter quintum lumborum spondylum & primum ossis sacri. Sic primum par dicitur, quod per foramen posticum, primo spondylo & occipiti commune egreditur. Hunc in modum prodeuntes nerui inferuntur fere in vicinas partes, ne in longiore via periclitentur: quam si ingrediuntur, mire reguntur & mununtur ad securitatem. Hæc quidem de neruis proprie appellatis sufficiant. Cæterum non omittendum est quod scribitur à Galeno initio lib. 15. de vsu partium differente de pudendi substantia, neruum tribus modis dici, vno quidem proprie genus illud totū quod à cerebro & spinali medulla est: altero id quod à musculis oritur & νῆμα, hoc est, tendo, ab Hippocrate dicitur: tertio autē quod Hippocrates αὐτὸς καλεῖται, id est, ligamentum, medicis vero post eum νῆμα καλεῖται, id est, neruum colligarem, nuncupantur. Dictum est Græcis νῆμα καὶ τὸ πνέον quod nutare & flectere significat, vt scribit Gal. initio lib. de motu muscularum.

*Nveg παραπλεῖον.* nerui recurrentes. Sunt rami duo neruorum sextæ coniugationis, quorum dexter circum arteriam quæ axillam adit, sinister vero circum magnum arterias

teriz descendens truncum obuolutus sursum reuertitur in laryngem. Oportuit enim laryngis quosdam maulculos, quo vox ederet, deorsum moueri, & ob id spiritum animalē ab inferioribus partibus sursum quodammodo ipsis deduci: neque fieri id aliter potuit quam demissis ad inferna neruis, posteaque recurrentibus. Quo autem summi recurrent, eos inniti corpori cuiusdam firmo & rotundo commodum fuit. Itaque circum arteriam quidem axillarem dextram nervus ille dexter ad superiora reuertitur, reflectitur: sinister vero quoniam circum sinistram ipsam arteriam axillarem comode inflecti non potuit (neque enim illa transuersim, vt dextra, sed oblique sursum in alā contendit) ideo in cavitatem thoracis cogitur descendere, & arteriz magnæ truncum apprehendere, qui deorsum ad spinam proficiscitur. Sic uterque secundum latera asperæ arteriz sursum redit, & inseritur in musculos laryngis ad edendam vocem. quā ex causa Galenus libr. 4. de locis affectis *φωνητικῶν* maluit appellare: tam sunt enim ad vocem necessarii, vt secti vocē prorsus aboleat: refrigerati vero tantisper vocem impediāt, donec calefacti naturalem temperiem recuperauerint.

*Νευροσπονδυλίου συνδέσμος.* est ligamenti genus durum, cartilaginofum, parum latum, parum rotundum. Medium quoddam corpus est inter cartilaginē & ligamentum, hoc quidē durius, illa vero mollius. Itaque quod ad cartilaginis duritiem aliquomodo accedat, non sine causa cartilaginofum ligamentum dicitur, vt & neruofum, quod nervi rotundam figuram quadantenus imitetur. Neque enim latum est vt cartilago, neque plane rotundum vt nervus, sed mediæ cuiusdam figuræ. Eiusmodi habentur in articulo pternæ cum astragalo & vicinis partibus. Tale etiam in intimo sinu coxendicis visitur, valde quidem durum, quod principio tam latum est, vt pubis foramen etiam attingat, deinde paulatim contrahitur, rotundiusque factum inseritur in mediū cruris caput.

*Νευροδύς.* neruofum. Est corpus spermaticum & exāgue, ad nervi naturā similitudinemue accedens. Tria eius genera Galenus esse dicit initio libr. 1. §. de vsu part. & comment. 1. in libr. 6. *τῶν δυνάμεων*. Vnum eorum quæ proprie nervi appellantur, & prodeunt ex cerebro aut spinali medulla. Secundum eorum quæ a musculis oriuntur & *νῆρνες* ab Hippocrate appellantur, ab aliis autem *συννευροδύς*: siquidem neruofas partes musculorum tendines vocantur. Tertium vero eorum quæ *συνδέσμοι* Hippocrates vocauit, recentiores autem medici *νῆρνες συνδράμας*, id est neruos colligantes. At vero præter hæc genera etiam sedes, vterus vesicæ & pudendum neruosa dicuntur, cum tamen nullo trium prædictorum generum contineantur, neque ex vilo istarum trium generum com-

ponantur, sed quod neruoforum corporum similitudinem gerant: siquidem laxissime distenduntur, contraque in breuissimū spatium contrahuntur, quod nulli carnoso membro aut pingui accidit. Itaque partes illas neruofas ex quadam similitudine dicimus, vt & reliqua omnia alba & exanguī materia prædita, quoniam plurimum extendi, rursumque in seipso retrahi & subsidere videantur, vt eo comment. Galenus annotauit.

*Νεφέλη.* nubes. nubecula. Id dicitur apud Hippocratem quod in vrinis pēdet, eodem modo quo nubes in æte. Galenus *νεφελή* appellat comment. 2. *εἰς τὸ ἀεθρῶσαν*, scribens *νεφελὴ καὶ νεφελή* idem esse, aut *νεφελὴ* speciem esse *τῆς νεφελῆς*: legitur enim apud Hippocrat. duplex *νεφελή*, *ζωοειδὴς καὶ νεφελὴ* siue *ἀνθρωπῆς*: hoc est genituræ nubiq; simile: quorum illud crassius, candidius, compactius & rotundius est: hoc vero minus candidum, rarius magisque diffusum. Vt enim aer nubilofus dicitur non qui atris nubibus condensatus est & caliginofus, sed qui serenius putusque nubes aliquot per eum sparsas habet: sic *ζωοειδὴς νεφελή*, siue *νεφελή* appellare Hippocrates videtur, quod nec colore est album, nec etiā plane nigrum, sed horū medium, vt docet Gal. comment. 1. *εἰς τὸ γὰρ ἀνθρωπῆς*. Ceterum id omne crudum esse & à flatuoso spiritu in altum afferri Galenus docuit. Quod perfecte concoctum, secretum, æquale, simileque est, id certe quoniam nihil flatus habet, in fundum vasis vrinarii descendit.

*Νεφέλη.* nubecula. Est in nigro oculi exulceratio superficialia ab humoris distillatione facta, caliginē (*ἄλβαν* dicunt) profundior, minor & candidior.

*Νεφελὴς ζώου.* nubilofa vrina, hoc est, vrina quæ albam nubeculam continet, vt annotat Gal. comment. *εἰς τὸ νεφελὴς διαγνῆς, ὁζῶν*. vide *νεφελή*.

*Νεφέλης.* sic proprio nomine dicitur è lumborū vertebra prima, sicut postrema *σπονδυλῆς*.

*Νεφελῆς.* dici quidem potest omnis affectus quo *οἱ νεφροί*, id est, renes, laborant, siue is similis sit, siue organicus, siue communis: proprie tamen *νιθίας*, id est, calculi morbus, *νεφελῆς* dicitur. Nomen habet à leſa particula.

*Νεφελὴς φάρμακον.* dicuntur antidoti & cōpositiones quæ renibus affectis cōueniunt. Est autem earū duplex differētia generalissima: quædam enim calculofos renes ituant, quædam vero inflāmatos & viceratos, quæ etiā ad vesicā similiter affectā conueniunt. Habent autem contrarias inter se facultates: quæ enim inflammationibus & vlceribus conteniūt, mitigatoria esse oportet, coniūcta tamē diureticis: quæ vero calculofis medentur, vnicā facultatem sortiuntur, quæ secare & extergere potest cum manifesta caliditate. Sunt autem talia fere omnia amara.

*Νεφροί.* renes, sunt partes carnolæ, duræ, densæ, concavæ, fibratum expertes, yrinam à san-

guine secermenter hoc enim eorum munus est, humore seroso sanguinem repurgare. Quae ex re voluptatem potius quam alimentum capiunt, sanguinem enim ad sui nutritionem habent. Ceterum quo serum attrahant, duò vasa in singulos renes inferuntur, à vena caua vnum, & à subdita illi arteria alterum, maiora multo quam renum magnitudini còueniàt: vulgo emulgentia vasa appellantur. Ipsum autem iudem secerunt vase duro, crasso, ex iisdem vasis confiato, in ipsam carnem vtriq; diuiso, ramis primum binis deinde sextenis saepius & qualibus, dimidio sui exteriori carni renum connatis, interiore liberis, tandem ad gibbæ renum partis medium coalescentibus. his vbi serum seceruerint, ipsum denique expellant in vesicam per vterque numerose etiam in carnem renum diffusos, quos, vti & vasa, parte sua summa excipit. In omnibus prope ren dexter sinistro sublimior est, vterq; membrana à peritoneo nascente inuoluitur, neruumque gracilem recipit à ramis sextæ coniugationis qui costarum radicibus exporriguntur. Sunt autem renes prauis succi, & concoctu difficiles: & resipiunt nescio quid vrinæ, vt testatur Galenus lib. 3. de alimentis.

*Nesporus*, dicitur in *nesporus* id est in *nesporus*. apud Hippocratem, hoc est, qui non à multo ante tempore comedit.

*Nidivis*, dicitur in *nesporus*, apud Hippocratem, id est, intestina.

*Nidus*, venter. quo nomine intelligitur omne concavum in modum ventris conceptaculum: quo humor alendis partibus idoneus continetur. vt patet ex Hippocrate lib. de aere, loc. & aq.

*Nidus*, dicitur in *nesporus*. hoc est, impotens est, apud Hippocratem, vt annotat Gal.

*Nidus*, herba quæ vino infusa tristitiam diffundit, & malorum omnium obliuionem inducit. Eam buglossum esse quidam existimant, alii helenium, quorum opinio probabilior videtur. Nec enim aliud esse putatur, quod Helena apud Homerum Odys. 9 in vinum coniecit quam helenium, ipsius nomine donatum.

*Nidus*, infans, sic dicitur fœtus ab eo tempore quo in utero brachia cruraque fœtus distincta absolutaque cernuntur, vsque ad pubertatem. Itaque non tantum quum editum est in lucem, *nidus* vocatur, sed in ipso etiã utero post corporis absolutionem, cum iam videlicet palpitare & moveri cœperit, dicitur etiam ab Hippocrate.

*Nidus*, nerium. Est frutex vulgaris notius, quæ Dioscorides *πάσις δένδρον* & *πάσις δένδρον* scribit vocari. vide *πάσις δένδρον*. Sic etiã à quibusdam dictum esse *πάσις δένδρον* Dioscorides auctor est.

*Nidus*, ieiunum intestinum. Est intestinum ordine à ventriculo secundum, illic incipiens vbi primum, quod *χυλός* appellatur, in anfractus gyrolque conuolui cœperit. Sic dictum est quod semper inane sit, nec minimū

quidem cibi in se contineat. Id primum quidem omnium (quidam enim *χυλός* inter intestina non enumerant) chylum à ventriculo prodeūtem excipit, ex eoque primum hepar adhuc vacuum sursum alimentum attrahit, vasorum multorum officijs in summa eius partem infertis. Itaque tum propter eorum multitudinem, tam propter hepatis viciniam, plurima & subita sit ex ieiuno distributio, nec diu chylus in eo morari potest, maxime chylo adhuc liquido facile effluente, & ieiuno etiam vehementius quam reliqua intestina eum propellente, quod adipsum bilis syncerior & actior ab ecphylis confluat: his enim de causis fit vt ieiunum chyli vacuum semper reperitur. verum nō vt eius principium certum est (incipit enim vbi *χυλός* definit) sic & finis circumscribi designarique potest. Est enim cum eo quod illi succedit (*χυλός* & *χυλός* appellantur) tam simile substantia & gyris, vt ab eo distingui nō possit, à quo videtur tantum differre quod ieiunum vas pluribus scatet, & inane sit. Vbi enim & rariora iam vasa cernuntur, & chylus minus diffuens factusque crassior, consistere incipit, illic tertii intestini initium statui debet.

*Nidus*, est genus collyrii nardini ex lacte preparati ad multa oculorū vitia perutilis. Eius descriptio habetur apud Aetium lib. 7. cap. ultimo.

*Nidus*, dicitur in *nesporus*. nomen est compositi medicamenti glutinatorij quo Paulus vtitur lib. 4. cap. 37. ad conglutinanda vlcera.

*Nidus*, dicitur in *nesporus*. est collyrium diatradon quod ad Nilum auctorem refertur, omnium quæ vnquam composita sunt optimum & celeberrimum. Ceterum variis modis ab auctoribus describitur: id enim aliter Celsus, aliter Galenus, apud quem geminum est, aliter Aetius, aliter Paulus describunt: sed in materia fere omnes consentiunt, præter vnum Paulum qui nardum non habet, quam tamē omisam esse puto non Pauli iudicio sed librorum negligentia.

*Nidus*, vel (vt quidam codices habent) *nidus*, dicitur à quibusdam montana nardus, vt auctor est Dioscorides, quam & alio nomine *Νάρδος* scribit appellari vide *Νάρδος*.

*Nidus*, nitrum. Est luteus concretus sali finitimus. Perinde atque sal aut nascitur, aut conficitur. Nitrum quod nascitur, vel repetitur in terra vel extra terram. Quod in terra repetitur, aut ceditur aliorum fossiliū modo, estque durum & spissum & lapidi similius: aut in speluncis colligitur, ex quorum camentis vel pendens stiracum instar concreuit, vel excidens liquidum adhuc in terram defertur. Id vero est molle, laxum, candidius & similis spumæ. Vtrūque, hoc est, tam id quod effoditur quam quod in speluncis colligitur, vocatur à Grecis *ασπίον*, cum tamē molle modo ac spumæ similis sub hac voce subici recte possit, durum ac spissum non possit: sed ipsi vnum ab altero non nominibus,

*Nomen* nomen etiam à Plinio dicitur. Est vlcus putredinosum, quod vicinas partes serpendo depascitur. Putredinem autem acquirit vel diuturnitate repositis, quo omnia, quam initio *videtur* sint, tandem *revertitur* redduntur, vel statim à principio, vt quod à venenatis animalibus factum est. Progressu quidem temporis & aphthæ & dysenterix in nomas transeunt, vt scripsit Galenus *de morbis* *etymologia*. Sunt autem omnia eiusmodi vlceræ agre sanabilia, & vehementissimis profus medicamentis opus habent, adeo vt citra visionem curari non possint. Dicitur affectus hic *non* *etymologia*, quod pascere significat, propterea quod pergere pascendo id vitii ab ægris particulis ad eas quæ integræ sunt, solcat, arque harum semper aliquid ægri

**N**ovus morbus. Est affectus præter naturam, actionem per se ledens. Sed quid sit affectus, ante dictum est in dictione *de diuina*. Præter naturam vel contra naturam dicere, nihil profusus refert: utriusque vno verbo *de quibus* Græci dicunt. Nam & scædus ictericorum color, & lentigo, & alius quiuvis etiam leuissimus affectus contra naturam est, nec tamen morbus dicitur, si propter sui exiguitatem non lædat actionem. Siquidem in omni morbo necesse est actionem lædi corporis aut alicuius partis, eamque læsionem tum sensibilem esse, tum per se, primo & proxime à morbo fieri, ut eo discrimine morbus à causa sua, suisque symptomatis distingatur. Ac quoniam morbus omnis ei parti insidet cuius actionem primo & per se lædit, consentaneum est primas morborum differentias ex partium differentiis constitui. Itaque cum duplices sint, similes atque organice, duo pariter erunt summa morborum genera, intemperies & incommodatio, quorum illud partis similis, hoc autem organice proprium est. Nam intemperies naturale partis similis temperamentum (per quod omnis actio inculpata editur) dissoluit: incommodatio vero instrumenti symmetriam peruerit, sine qua actio fieri non potest, vel per quam melius fit aut conservatur. His duobus tertium etiam genus additur unitatis solutio, utrique parti commune, quod ambas ad actionem vel usum inter se coniungi & coherere oporteat. Habent autem singula proprias differentias, non iam ex partium diuersitate, sed ex ipsa morborum substantia de promptas. Siquidem intemperies, quæ partis similis morbum esse diximus, alia simplex, alia composita est: & utriusque earum alia æqualis, alia inæqualis. Simplex sola primarum quatuor qualitarum est, eaque quadruplex, calida, ut febris, ambustio ab igne vel sole, calor immodicus à motu nimio, vel alia causa calfaciente: frigida, ut congelatio totius vel partis à frigore vehementi, tanta sæpe ut pars demortua cadat, vel si in toto corpore est



homo moriatur, & qualis in apoplexia, epilepsia, tremore & spasmus esse consuevit: humida, ut in quibus partibus laxitas & mollieties visu & tactu perceptibilis est, nulla foris affluente substantia: sicca, perinde ac si pars salsa esset, ut marasmus totius vel partis, ut ossium vel ut in sabulum resolutorum. Composita vero duplex est: aut enim sola primarum quatuor qualitarum est, aut adiunctum habet materiam affluxum. Illa calida humida, calida sicca, frigida humida, vel frigida sicca est, & difficulter admodum, ut & quatuor simplices, nisi magna sit, à medicis noscitur. Hæc vero, quæ similiter quadruplex est, neminem potest latere, quia minorem præter naturam adiunctum habet, quadruplicis materiam influxum differentem. Sunt autem eius differentiarum, phlegmone, erysipelas, œdema, scirrhus, aliquando simplices, aliquando vero inuicem inæqualiter misti, sed nomen à vincenti humore sumeres, ad quas etiam reducuntur strumæ, phymata, phygethæ, lepra, psora, vitiligo, elephanta, & alia eiusmodi morborum genera: quæ quatuor similiarium partium sunt propria, per accidens tamen ad organicas referuntur, non ex modo, sed alii etiam similiarium partium simplices morbi, si vnam instrumenti particulam infestant. Ut ophthalmia tunicæ cohererentis phlegmone, eiusdem morbus proprie est: totius autem oculi, per accidens: & erosio ceratoidis tanta ut per eam excidat rhagoides, & ob id distorqueatur pupilla. Hinc namque tres affectus oculi sunt pathemata, licet erosio ceratoidi, prolapsus rhagoidi, contortio pupillæ sit propria. Tales quidem sunt intemperiei differentiarum, à propria eius substantia sumptæ. Quæ & rursus suas peculiare fortiter sunt differentias partium à causis suis, partim à symptomatis, partim à aliis morborum adiunctis petitas. Siquidem variarum causarum varias gignunt morborum ex intemperie species, certoque constat plurimorumque morbos sola causarum varietate differre, sicut & multos solis symptomatis esse diversos. Ab adiunctis similiter discrimen est. Sic autem voco breuitatem, longitudo, celeritatem, tarditatem, periculum, securitatem, adhuc morborum mores & partium in quibus consistant, differentias. Hinc morborum aliarumque, ad id quod in dictione & in tabula ante oculos proposuimus & explicauimus. Habet etiam suas differentias incommodatio, quam organice partis morbum esse diximus, easque quadruplices. Vna conformationis, altera magnitudinis, tertia numeri, quarta situs vitium est, quarum etiam singulæ in alias diniduntur. Nam conformationis vitium in figura, in cavitare & meatu, in asperitate atque leuitate potest esse. In figura quidem, ut in sinu à natura, ictu, casu, in varis, vaciis, planiciis in fractura male curata, in luxatione, in callo eminentiore innato articulis, &

in reliquarum partium vitiosa figura. In cavitare vero & meatu, si debita multitudo aut magnitudo non seruetur: id quod contingit si meatus vel initium patent, vel coalescunt, vel constipantur ab iis quæ intus condita sunt, vel obstruuntur ab humoribus multis, crassis, lentis, vel comprimuntur à vicina parte humore vel flatu tumida, vel resident & contrahuntur, essentia ipsorum quibus in sunt, siccata atque indurata. In asperitate autem & leuitate, quum ea quæ suapte natura aspera esse debent, leuitatem, contra quæ leuita asperitatem alicunde contraxerunt. Magnitudo autem organi vitiosa est, vel quod nimis aucta sit, ut in lingua magna, illa linguæ essentia, in carne vlcibus supercrecere, & corpore toto: vel quibusdam partibus, ut in ammis, testibus, abdomine, pedibus adeo auctis ut actionem lædant (aliter enim morbus non esset, sed vel symptoma vel pathema tantum, ut dolor) verum nimia hæc magnitudo raro accidit post natiuitatem, particula suam figuram seruante. Vel vitatur magnitudo, quod minor sit quæ conueniat, ut in atrophia partis alicuius vel totius, id quod sæpe accidit post natiuitatem. Numeri vero morbus tum in exuperantia, tum in defectu consistit. Exuperantia vel est rei naturalis, ut sexti digiti, & tertii testiculi: vel est rei toto genere præter naturam, vel abscessuum & eorum quæ in abscessibus continentur, lumbricorum, calculi, grandinis & suffusionis in oculo, calli, verrucæ & aliorum eiusmodi, ex quibus quæ actionem primo impediunt, ut suffusio, sunt morbi: quæ vero non primo, sunt morbi causæ. Defectus autem solius rei naturalis est, siue ea ex toto, siue ex parte petierit: ex parte quidem, ut in partibus ex dimidio sectis, mutilatis, non formatis: ex toto autem, ut in iis quæ radicitus perierunt ossibus digitis, membris, glandulis, gurgulione & cæteris partibus truncatis, exectis, putrefactis, aut non formatis. Ex quibus quæ actionem primo lædunt, sunt morbi: quæ vero partem actionis opificem refrigerant, vel ei non satis alimenti transmittunt, aut aliter afficiunt, sunt morbi causæ. Quædam autem & morbus sunt, & morbi causæ, ut gurgulio exectus. Nam vocem lædit & thoracem refrigerat, in quibus morbum ad partem relictam, non ad deficientem referre oportet. Est etiam situs siue compositionis morbus duplex, quorum vnus in situ partium præter naturam consistit, sicut apparet, in omnibus herniarum speciebus & in articularum luxatione: alter vero in connexu partium præter naturam, quando vicinæ partes inter se non bene consentiunt, ut in vinculo linguæ & pudendi cōtingit, & in articularum ligamenti laxi, intentis, ruptis, brevioribus, longioribus, & præter hæc in coalescentia labiorum, digitorum, palpebrarum, sedis vel pudendi muliebris, siue ab ortu, siue ab vlcere. Hæc quidem sunt differentiarum summarum morbi



morbi partis organicæ, &que simplices. Coeunt autem aliquando atque complicantur morbi simplices, vel secum, vt suffusio cum pretygio in oculo, magnitudo nimia & asperitas in lingua: vel cum aliis similariū partium morbis, vt luxatio cum phlegmone, quarum illa primo instrumenti, hæc similariū instrumenti partium morbus est primo: instrumenti autem non primo nec proprie, sed per accidens, quemadmodum supra dictum est. Cæterum in his propriis organicarum partium differentiis id perpetuo tenendum est, prima instrumenta, vt musculum, venam, arteriam, ex partibus similaribus secunda vero, vt digitum, ex primis, tertia autem, vt manum, thoracem, pedem, ex secundis, rectam vel viuatam compositionem sortiri, & ex his quod sana sint vel ægra, obtinere. Restat iam tertium morbi genus, vtrique parti commune, id est unitatis partium, quæ inter se coherere debent ad actionem vel vsum, solutio: quæ duplex etiam ponitur, vna simplex, altera composita. Simplex in carne quidem *ῥαῖμα*, *ἐλκος*, *φθίμα*; *θλάσμα* siue *θλάσις*, *ἐκθλάσις*: in osse vero *ρῆξις*, *ρῆξις*, *ἐκροπή*, *διχαστή*, *ἑλκῶς*: & in molli osse capitis *θλάσμα*, *καταγμα*, *πρηδὼν*: in neruo autem *σπασμός*. Cōposita vero, cum duo morbi ad solutam continuitatem pertinentes secum coniunguntur, vt fracturā cum vlcere; vlcus tū spāsmo: vel cum morbo solutæ continuitatis cum alio morbo partium similariū vel organicarum complicatur, vt vlcus cum aliqua intemperie aut cum phlegmone aut erysipelate, aut aliquid cuius partis sphacelo, aut amputatione, aut peruerfione.

**Νοσῶδες**. morbosum. Pluribus modis dicitur apud Galenum initio artis paræ. Dicitur enim vt corpus, vt causa, vt signū. Nā corpora quæ morbos continent, causæ quæ hos tū efficiunt tum fouēt, & signa quæ ipsos indicant, *νοσῶδες* Græcis, nobis morbosa dicuntur. Ac corpus quidem morbosum dicitur multis modis. simpliciter quidem, quod ex ortu partibus simplicibus intemperatum, vel instrumentis male compactum, vel vtrūque est. vbi enim tanta est exuperantia ab ipso ortu contracta, vt actiones omnino imperfecte edantur, corpus simpliciter morbosum dicitur. In præsentia vero, siue nunc, corpus morbosum dicitur, quod eo tempore quo tale dicitur, ægrotat. Certum est autem, id, quō tempore morbosum dicitur, aut partibus simplicibus intemperatum, aut instrumentis male compositum, aut vtrūque esse. Morbosum vero semper est, quod ab ipso ortu, aut simplicibus primisq; partibus, vel omnibus vel quibusdam vel principibus intemperatissimum est, aut instrumentis pessime cōpositum, iisque similiter vel omnibus, vel quibusdam, vel præcipuis. Magna autem ex parte morbosum corpus est, quod ab huius quidem vitio recedit, nōdum tamen medio constitutum est. Signa vero

morbosa sunt quæ morbum præsentem significant, præteritum in memoriam reuocant, & futurum prædicunt. Causæ vero dicuntur, quæcunque has affectiones adaugent, aer, cibis & potus, motus & quies, somnus, vigilia, excæta, retenta, affectus animi.

**Νόσος**. dicitur à quibusdam *νόσος ἀγρῶς* siue cucumis anguinus, vt habetur apud Dioscoridem.

**Νόσος πυρετός**. humida febris. Est differentia febris apud Hippocrat. libr. 6. epidemion, sumpta à subiecto in quo calor febrilis accenditur. Id autem est humor, cuius quoniā variz habentur in corpore differentiz, ideo earum alias *ἐξ ὁσπρίων*, alias *ἐξ ὀφθαλμῶν*, alias *πλευρῶν* appellant. Has febres practici humorales vocant.

**Νόσος**. auster. ventus est meridie flans. Hic febre semper calidus est, nisi forte, quod rarum est, ineunte vere frigidus sit, vt scribit Galenus comment. 1. *ἡς τὸ ἀπὸ ὁπιδνημῶν*, sed nunquam valde frigidus est. Magna etiam ex parte humidus est, & pluuias, vt scribit Hippocrat. continentes leuesque inducit. Talis autem si flarit diutius, caliginem in nobis inducit, dissoluit corpora, fundit humores, putredinem excitat & multorum morborum author est: veruntamen non semper humidus est: videtur enim, vt scribit Galenus comment. 3. *ἡς τὸ γὰρ ὁπιδνημῶν*, aliquando siccus esse, quem *λευκόνον* vulgus Latini Caurum appellant. Homerus *ἀργεῖον νότον* eam ob causam vocauit, quasi purum & candidum austrum, quod imbris careat. Id quod etiam indicauit Hippocrates libro 1. *τὸν ὁπιδνημῶν*, describens itarum qui totus austrinus & squalidus fuit. Est autem is auster nonnunquam vehemens, nec latere potest dum spirat. Alius vero lenis est, cuius motum, vt ait Galenus, in aere & nubibus non sentias. Calidus autem semper est, cum Caurus interim frigidus sentiat.

**Νύκμα**. punctio. Est solutio cōtinuitatis in carne, incidente aliquo acuto & tenui facta. dicitur & *νύξμα*.

**Νύκμα πῶδός ὀδυνη**. punctōrius dolor. vide *ὀδυνή*.

**Νυκτερός**. lusciosus. Dicitur is qui interdum quidem videt, at sole occidere obscurius, noctu omnino nihil. Accidit propter capitis imbecillitatem & maxime spiritus visui crassitudinem, itemque reliquorum oculi humorum ac tunicarum. Quibusdam vero contingit, vt noctu melius videant, interdum deterior, & si Luna luceat nihil cernant. Sed hoc rarum est, illud plurimum contingit. Cæterum *νυκτερός* dicitur non ille modo qui ita laborat, sed ipsius etiam affectionis nomen est. Sic autem dicitur quasi *ὁ νυκτερός*, hoc est noctu cæcus: *λατὴν* enim videre significat. vide *μύωψ*.

**Νυκτερός πυρετός**. nocturna febris. Est febris quotidiana noctu accedens. Cum enim, inquit Galenus, duæ sint quotidianæ febris

differentia, vna nocturna, altera diurna, illam *nocturna* Hippocrates vocatur lib. 3. Epid. sect. 3.

*Nympha*. *in aëre*, vt habetur apud Dioscor. Eam Aetius ad caligines oculorum commendauit, videturque raulis *auri* & *nasae* accepisse.

*Nympha*. herba est in paludibus & stagnantibus aquis nascens, folius fabae Aegyptiae minoribus & longioribus, aliis in summa aqua, aliis demersis, pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente: cum defloruerit, vt rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat, nigro semine, denso, lato, lentigustus. Caulis est leuis, niger, minime crassus, ciborio cognatus: radix nigra, scabra, clauis similis, quae autumnio secatur. *Nymphae* nomen habuit, quoniam aquas amet. Est & altera *nympha*, cuius flos *blague* dicitur, foliis antedictae, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosae simili. *Nympha* vim habet sinerofione siccandi, ventrem reprimi, & genituram absuimit. Quae radicem albam habet, valentior est: quae vero nigram, deteriora quoque vi & exteunte pollet.

*Nympha*. *nympha*. Est epiphyllis cutacea, lata intra pudendum muliebre, supra alarum communis ad vrinarium meatum sita. Gemina autem est, vtriusque scilicet vna. Data est a natura, tum ornamenti causa (nam quod peni virili praepunium est, id *nympha* vtero est) tum etiam vt vterum a puluere, frigore & aliis externis iniuriis tueatur. Vt enim vna pharyngi propugnaculum est, sic *nympha* vtero. Siquidem illa operit colli vteri orificiū, cui pro munimento data est. Verum aliquando naturae modum excedit, & ad tantā magnitudinem excreuit, vt deformitatem atque pudorem inducat, extra vterum propedens. Tūc ferro resecari debet, quemadmodum Aetius lib. ultimo prodidit.

*Nymphodoti* *epoxyen*. pastilli species auctore Nymphodoto, adstringendi vi praediti: cuius duae habentur compositiones, vna apud Paulum lib. 7. cap. 12. altera apud Aetium lib. 9. cap. 49. de iis quae inferne dysentericis infunduntur.

*Nympha*. punctio. Est solutio continuitatis in carne, incidente aliquo acuto & tenui facta. dicitur & *nympha*.

*Nympha*. *in aëre* *nocturna* *auri* *nasae*: hoc est, longo tempore & tenuiter: apud Hippocr. aphor. 7. lib. 2. sicut Gal. interpretatur. Alias *nympha*, vt *nympha*, est Tardus, Imbecillus.

*Nympha*.

*Nympha*. dorsum. Pars est posterior corporis. Late patet Aristoteli lib. 1. de histor. animal. Eius enim partes facit scapulas, spinam & lumbos. Itaque eo auctore, quem postea permulti sequuti sunt, dicitur pars tota posterior ab occipite vsque ad extremum coccygem, triginta quatuor vertebriis compacta. Cui sententiae etiam fauet Latinum dorsum nomen, quod secundum Probum significat totam posteriorem corporis partem, eo quod deorsum sit deorsum, vt inquit Festus: tota namque ea pars declinans inflexaque est, & ab anatomicis carinae navis comparata: est enim veluti statumen quoddam in quo costae, velut in carina trabes, connectuntur, totumque corpus stabilitur. Sic dorsum si quinque partes erūt, collum, thorax, lumbi, os sacrum & coccyx. Alii vero multo arctius dorsum definiunt, dicentes esse partem cervicis subiectam, & duodecim vt plurimum comprehensam vertebriis. Hi *nympha* appellat, quod illi thoracem. Sed reuera thorax non posteriorem modo partem, verum anteriorem etiam designat, sic vt *nympha* ea secunda significatione pars sit thoracis posterior. Itaque his auctoribus, vbi cervicis vertebrae delinunt, dorsum illic incipit. Collum autem a dorso non hominum sola institutio, verum ipsa etiam natura discreuit. Ea namque cum spinas vertebrae cervicis veluti bicornes produxerit, postea in dorso simplices effecit. Non est autem in omnibus certus vertebrae numerus, quod aliquando vna vel deficit vel numero excedat. Superest vero rarius quam deficit. Earum prima *nympha* dicta fuit a veteribus, quo nomine quicquid prominet, intelligitur: secunda *nympha*, quasi axillaris, vocatur. Reliquae nouem consequentes *nympha*, duodecima vero *nympha*, quod ea parte cingamur. Haec igitur postica vertebrae structura *nympha* appellatur. Definitur autem ea, sicut dictum est, ab octaua vertebra vsque ad decimam nonam, & a lateribus, dextro & sinistro, quantum videlicet a postica parte patet oculis. Nam & costarum pars posterior, & musculi similiter sub ea parte comprehenduntur. Ea quoniam petiori opposita est, etiam *nympha* a plenisque dicta fuit. Est enim *nympha* thoracis pars anterior, sicut *nympha* posterior. Rufus libello de partium hominis nomenclatura, *nympha*, inquit, dicitur pars corporis posterior a ceruice vsque ad *nympha*. Est autem *nympha* pars media inter dorsum & lumbos quae renes adiacent.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

## TO II.



*Λάππα*, nomen est compo-  
siti medicamēti acris  
& exedētis, quo Pau-  
lus l. 4. c. 43. vtitur ad  
vlcera in quibus caro  
supercrefcit, & eiuf-  
dem lib. c. 53. ad in-  
ducendam cruſta &

ſiſtendum ſanguinem ex quauis parte pro-  
fluentem.

*Ξάνθη*, lappa. planta eſt pinguibuſ lociſ naſcēs  
& vbi lacuſ exaruerunt, caule cubitali, angu-  
loſo, pingui, alaſ plureſ fundente, folio attri-  
pliciaſ incifuraſ habentē, odore naſturtii, ſe-  
mine rotundo ceu grandiore oliua, ſpiñoſo,  
platani pilula, veſtium cum tangitur tenaci,  
philanthropoſ ob id à quibuſdā dicta. No-  
men habet quod ruſet capillum. ab herbari-  
iſ lappa minor & lappa inuerſa nominatur.

*Λέντις*, lenticulae ſpecies, ſed rarior, cum tamē  
vari lenticulae ſpecieſ cetera vulgo nota ſint.  
Eſt autem rubicundior & inaequalior, vt  
ſcribit Celfuſ lib. 6. cap. 5.

*Ξεῖον*, ſextarius. Eſt meſura liquidiaſ atque ari-  
diſ communiaſ duaſ heminaſ capienſ apud  
Romanoſ. Hanc Galen. lib. 1. τὸν ἕξ ἡμῖν ſcri-  
bit viginti vnciaſ continere. (nec dubitan-  
dum quin meſuraſ intelligat: pondera-  
leſ enim variaſ ſunt & numero incertaſ, ſed  
pro modo & pondere rerum quaſ meti-  
mur) & ſimiliter Oribiaſiuſ, eoſque falli qui  
putarunt ſextarium Romanum decem &  
octo vnciaſ meſuraſ capere. Erat autem  
& *ἑξῆς* Atticuſ, ſextario Romano minor.  
liquorum & ipſe meſura, capienſ duaſ  
νύκταſ, ſive libram & ſemiſſem, hoc eſt vnciaſ  
decem & octo. Eſt autem *ἑξῆς* vocabu-  
lum è Latino ſextarii nomine deprauatum,  
vt aſſerit Galen. lib. τὸν ἕξ τόπου. Nam neque  
nomen neque meſura haec apud vetuſtio-  
reſ Atticoſ ſcriptoreſ inuenitur, ſed vna  
cum imperio Romano & vox & meſura  
in Graeciam venit. Vnde uſuſ eiuaſ apud An-  
dromachuſ, Heram, Aſclepiadem, Crito-  
nem, Dioſcoridem ac nonnulloſ alioſ, qui  
dum reſ Romanae floreſcent, de medicamē-  
tiſ libroſ ſcripſerunt, admodum frequenſ  
eſt: duaſ recipit νύκταſ, ſicut Fanniuſ decla-  
rar iſtiſ verſibuſ:

*Ac corylas (quaſ, ſi placeat, dixiſſe licebit  
Heminaſ) recipit geminaſ ſextarius unus.*

Ac quia ſextariuſ duodecim cyathos cō-  
tinebat, quemadmodum aſ & libra duode-  
cim vnciaſ, antiqui, praefertim poetae, ſexta-  
riuſ tanquam libram, in vnciaſ partiebantur,  
iſiſdemque nominibuſ appellabant. Ita-  
que ſicut in ponderibuſ ſextanſ duaſ vnciaſ

aſ ſignificabat, ita cum de poculiſ ſermo e-  
rat, ſextanſ duaſ cyathoſ, quadranſ treſ cya-  
thoſ, trienſ quatuor cyathoſ, & quincunſ  
quinque cyathoſ, vt in multis lociſ apud  
Martialeſ legitur.

Sed & *ἑξῆς* aridorum meſura fuit apud  
Atticoſ, continenſ ſimiliter νύκταſ duaſ ſive  
decem & octo vnciaſ meſuraſ. Eiuaſ no-  
ta apud Graecoſ fuit & cum ad verticē ap-  
poliro.

*Ξεχοιφόν*, ſignificat ſicca vt frictione. verbū  
eſt oppoſitum τὴν χυττοδαμῶν. Galen. lib. 2. de  
ſimpl. medic.

*Ξηρότης*, vitium capillorum, vt ſcribit Def. med.  
author, cum ij ſimileſ lanugini apparent,  
perinde ac ſi puluere conſperſi eſſent. Spe-  
cieſ alopeciae cenſeri poteſt, quae ita dicta ſit  
propter alimentuſ pilorum defectum & ari-  
ditatem cutiſ.

*Ξερόφιον*, idem quod *Ξεῖον*, de quo mox.

*Ξεῖον*, eſt medicamentum aridum quod in  
pulueriſ modum inſpergitur, ideoque & *κα-  
ταρροία* alio nomine appellatur. Conſtare  
poteſt varia materia ad uſum multiplicem:  
aliud cuti, aliud vlceribuſ inſpergitur. Eo-  
rum quae cuti admoventur, alia abſtergunt,  
alia extenuant, alia diſcutiunt, alia, vt quae  
capiti adhibentur, fluxioneſ reprimunt aut  
deſiccant. Quae vlceribuſ conueniunt, alia  
carnem inducunt, alia excreſcentia reprimunt,  
alia cicatricem generant, alia vrunt  
exeduntque, alia ſanguinem ſiſtunt. Exem-  
pla eorum multa habentur apud Paulum &  
Aetium.

*Ξηροκαλλύειον*, eſt collyriuſ ex aridiſ medica-  
mentiſ praefertim metalliciſ conſtanſ, excep-  
tiſ vniſque vel ſucco vel melle vel humo-  
re aliquo. Quauis enim liquore aliquo col-  
liguntur, nō deſiunt arida collyria eſſe, pro-  
pterea quod ipſoruſ denominatio nō eſt ab  
eo quod ea colligit atque coadūnat, ſed ab  
ipſa materia qua maxima ex parte conſtant.  
Siquidem ab eo quod magis in ipſorum cō-  
poſitione pollet, vel *ξηροκαλλύειον* vel *ὕψευκα-  
λύειον* appellatur. Sunt autem varia τὸν *ξηρο-  
καλλύειον* compoſitioneſ apud veterēſ me-  
dicoſ, quorum magis celebres deſcribuntur  
ab Aetio lib. 7. vide καλλύειον.

*Ξηρόμυρον*, vnguentum ſiccum. Eſt compoſitio  
odorifera, ſiccis aromatibuſ conſtanſ. Ad va-  
rioſ uſuſ antiquiſ apparabatur: ad ſuſtineſ o-  
doriſ gratia, ad amuleta, praefertim peſtilen-  
tia, ad exiccationē fluxionis alicuiuſ, aduer-  
ſuſ hircolum odorem axillarum & reliqui  
corporiſ: itaque pro vario uſu diuerſo modo  
efformabatur. Aetiuſ lib. 6. deſcribenſ pul-  
uereſ inſperſileſ caput denſanteſ deſcribit

*Ξηρόμυρος* siccis omnibus constans tritis & in puluerem tenuem redactis, quem capiti prius oblito vino austero inspergendum consuevit. Idem lib. i. 6. selecta quædam aromata trita cribrataque excipit aliquo liquore, docetque pilulas rotundas ad ciceris magnitudinem effingere, quas ac perforatas & exiccatas traiecto filo è collo suspendit. Nec verò dubium est, quin massam in vnam componi possint in mali modum, quod pomum odoriferum vocari poterit, quale hodie à plerisque gestatur, tum ad venustatem, tum ad arcendum pestilentie periculum.

*Ξηρότης*, siccitas, est vna ex primis quatuor qualitatibus; materialis tamen potius quam actiua, non quod ab omni actione immunis sit (alterare enim totam admotam substantiam potest: tametsi non pari celeritate cum calore & frigore) sed quod minimum id agat, neque pari celeritate. Eius enim actio totius est per tota, quemadmodum & calidi & frigidi: ut est à Galeno demonstratum lib. de elementis. Siccitatem autem quadruplicem in nobis accidere idem annotauit lib. 7. meth. med. quarum prima est quæ in exilibus venis & arteriis cuiusque particulæ propriis consistit, quæ provenit ex sanguinis penuria. Secunda est, cum propria humiditas unde partes nutriuntur, omnino est absorpta. Cōtinetur ea in omnibus animalis partibus, seu ros quidam per eas sparsus. Est præterea siccitas utique quum ea quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro & adeps, sunt liquata. Quarta est prorsus insanabilis, si consummata fuerit, est autem prorsus consummata, vbi solida similium partium substantia reddita est siccior, quippe quod senium est in morbis, id sicca intemperies est in ægris. Porro eiusmodi siccitates proueniunt ex diuturnis euacuationibus, quæ vel ex ventris profluio, vel intestinorum leuitate, vel dysenteria, aut diuturnis vomitibus, aut vigiliis aut tali alia de causa proueniunt, aut longi temporis fame, & febribus ardentibus longis, atque ut in vniuersum dicatur, quæcunque ipsas animalis solidas partes vehementer exsiccant, sicuti & hec tice febres.

*Ξηρὴ πυρετός*, sicca febris, in qua sitis vehemens per initia, lingua arida, cutis dura in modum corii, & squalor plurim⁹ toto corpore. Huic opposita est humida febris, in qua egri à primo statim die sudant, verum sudore vel parum vel nullo modo leuantur. Author Gal. libello aduersus Lycum.

*Ξηρόθυμία* est arida lippitudo, in qua oculi subaridi neque tument neque fluunt, sed rubet tantum, & cum dolore quodam leui & pruriginè grauescunt, & palpebræ citrà duritiem vllam prægravi pituita inhaerescunt. Author Celsus & Aetius.

*Ξηρίδιον*, sic dicitur ab aliquibus à *απὸ ξηρότητος*, ut author est Dioscorides.

*Ξηρίον*, gladiolus, herba est sic dicta quod foliis gladii speciem præbeat. Ea autem iridi simi-

lia sunt, sed minora & angustiora, & gladii modo mucronata nerviōlaque. In caulem exit cubitalem vel etiam bicubitalem, ut ait Plinius, in quo purpurei flores in ordinem digesti inter se distat, semine rotundo, radicibus geminis, quarum vna insidet alteri ceu pusillis bulbis inferiore gracili, superna vero vberiore & habitiore. In ariis maxime nascitur, vocatur aliis nominibus *ψαλμαριον* & *μαχαριον*. Radix eius, præsertim superior, dicitur vim habere attrahendi, discutiendi & exiccandi.

*Ξηρότης στήθους*, est cartilago triagula parti infimæ sterni adnata gladii effigie. In hanc enim sternon exacurrit & desinit. Non est autem semper simplex & acuminata hæc cartilago, sed non raro in fine lata, sæpe bifida, unde & vulgo furcella dicitur. Sæpe tota est latissima & plane ossæa (unde Galeno os aliquando dicitur, quod ætatis aut temperamenti siccioris occasione in os degenerat) præsertim partē anteriore: nam posteriore diutius cartilaginosa est, & intima semper. Quidam mucronatam cartilaginem vocat, vulgo malum granatum. Sunt verò qui non eam cartilaginem, sed totum ipsum sternon cum ea *Ξηρότης* nuncupent, ut ait Galenus. Nam sternon manubrio, cartilago vero gladio plerumque similis videtur.

*Ξυλαρόν*, lignum aloës, quod proprio nomine *αλαρόν* appellatur.

*Ξυλόβαλσαμον*, est frutex, siue farnetum, siue furculus balsami. Ampurabatur ab incolis & vānibat, propterea quod eo decocto in vnguētis vicē opobalsami multis esset, etiam si ex toto balsamo minima illi inesset odoris gratia. Dioscorides probari dicit recens, farnetum tenui, fuluum, odoratum & quadamtenus opobalsamum spirans.

*Ξυλοπέπτα*, siliquæ, sic vocantur à recentioribus Græcis quæ veteres *κεράνα* vocarunt. Sunt qui peculiariter arboris ceratoniz siliquas hoc nomine nuncupari tradant, quæ vulgo corrupta voce xylocara dicta dicunt.

*Ξυλοκινάμωμον*, est lignum cinamomi, cortice suo multo ignobilius: siquidem in fastidio est, propter origani, quod redolet, actimoniam.

*Ξυλοκίνα*, idem quod *κίνα*, ut scribit Dioscorides.

*Ξύλον*, sic appellauit Hippocrates organum suum ad restituendā omnia luxata idoneum, recentiores *βαλβρον* dixerunt, de quo vide suo loco.

*Ξυμπίστις*, vacuatio, siue extenuatio corporis, apud Hippoc. aphor. 3, lib. 1. *ἀπὸ τοῦ Ξυμπίστιον, πῶς αὐτὸ ἐκτενέται*, quæ enim vacuantur corpora, concidere ac confidere solent, atque etiam extenuari. vsus est & eo verbo Hippocrates in hac significatione lib. 6. *πῶς ἐκτενέται*.

*Ξυρίον*, herba est folio iridis, latiore & in turbinem mucronato, caule crasso, cubitali, ex quo siliquæ triangulares dependens, in quibus purpureus flos in medio puniceus, semen

in folliculis simile fabis, rotundum, rubrum, acre. radix longa, geniculata, rufa. Natura tenuis est, discoloria & extrahentis atque desiccatoria, præcipue semen quod & urinam mouet, & lieni indurato medetur. Romani gladiolum dicunt, quidam irin agrestem.

*Εὐομα*. strigmenta. Proprie dicebantur antiquis ea quæ oleo illitis corporibus post sudorem vna cum sudore, reliquisque humani corporis sordibus destingebantur. Est autem destingere, lacinia, strigilive alio, aut tota manu quæ corpori hærent abradere & exterere. Ea ex oleo, sudore & sordibus humani corporis concreta, & in balneorum pavimentis relictæ, in multos usus seruebantur. Ex ijs ad morbos etiam trās lata vox est. Nam in dysenterijs summæ intestinorum partes humoris acrimonia derafa destriteque, *Εὐομα* appellantur. Sic etiam aliquando dicuntur linamenta linteolis derafis concinnata, quæ proprie *κοτὺς Εὐομῆς* chirurgi nuncupant.

*Εὐομας κνηστὺς*: pruritus, apud Hippocratem. *Εὐομα*. est scalprum chirurgicum radendo ido-

neum, quo se ad rimas usum Galenus prodidit: sed quæ fuerit eius figura non satis explicat, credo fuisse varias. Galenus libro 8. de anatomic. administr. fabricat ipsum vtrinque similiter secantem, ut lineas vtriusque secantes vtrinque curuas habeat, sed altera sit concava, huic vero opposita gibba. Materia ex qua parabatur, similiter diuersa fuit, sed melior ex buxo aut myrto. libro 6. meth. medendi scribit, scalpellos quibus acies vtrinque habetur, aut quibus cuspis acuta est, omnino fugiendos esse in vulneribus peritonæi & intestinorum: ergo habentur alii quibus non est vtrinque acies, & quibus cuspis acuta non est. Varium autem fuisse hoc instrumentum palam est. Dicitur & *Εὐομα*, hoc est strigilis.


*Εὐομα*. est collyrium *τετραχρῆμα*, cuius variaz habentur compositiones: vnam recenset Paulus, Aetius duas. dicitur *ἄπο τοῦ Εὐομῆς*, quod palpebræ asperitates abradat.

*Εὐομας*. linamentorum genus est apud Galenum in Isagoge: quasi rasile dicas, à materia linteolorum derafa. vide *Εὐομα*.

## IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

T O

O.



A. sic appellabantur ab Atheniensibus forba, quæ omnes alij per diphthongum *οβα* vocant, ut scribit Galen. lib. 2. de alim. facult.

*Οβελία* *ραφή*. est sutura cranij recta, quæ à me-

dia sincipitis futura ad mediam futuram occipitis secundum capitis longitudinem extenditur, in crano secundum naturam se habente, inter anteriorem posterioremque suturam concluditur, neque ultra fertur: aliquando tamen ad nasum usque per os frontis medium descendit. Dicitur alio nomine *σαβδόγης*, utrumque nomen inditum est quod veru, aut sagitte, aut virgæ instar recta incedit, verticemque in duas partes dextram & sinistram secat. Latini rectam vocare possunt.

*Οβολός*. obolus, pēdus est dimidij scripuli. drachma enim sex obolos pendit, siue tria scripula. diuiditur autem obolus *εἰς τρεῖς μέρη*, hoc est in filiquas tres.

*Οὐρανός*. apud Atticos significat *τὸ μέγα καὶ ἐπὶ ἡμέραν φρονέειν*: hoc est magnum & sublimē sapere. Verum ab Hippocrate usurpatur pro attolli subito in tumorem, ut annotauit Erotianus.

*Οὐχεν σίρειν*. apud Hippocratem. hoc est ferre. Erotianus.

*Οδοντῆς*. Est gingivarum pruritus ante den-

tionem. Nam antequam erumpant dentes, dolor quidam seu pruritus est, seu morfus, illis intra gingiuas conceptis & erumpere festinantibus sentitur, quod vulgo dicunt nutrices dentes geminare, quo motu infantes gingiuas inuicem collidunt. ex quo pater *ὁδοντῆς* aliud esse quam *ὁδοντῆσις*. hæc enim est dentis iam concreti eruptio extra gingiuam, ille vero dentis ipsius concretio & conformatio intra gingiuam, siue dolor ex eiusmodi concretionem exoritur. Hermolaus Barbarus apud Dioscoridem gingiuarum commotionem vertit. Reperitur & *ὁδοντῆσις*, ab *ὁδοντῆς*.

*Οδόντες*. dentes. Sunt ossa sentientia & tota vita auctilia, genæ infernæ supernæque alueolis infixæ, ad comminuendos cibos comparata. In ossium quidem numero habendos esse dentes Galenus contendit, etiam si plerique sophistæ, inquit, secus arbitrentur. A reliquis tamen ossibus differunt primum quidem quod sentiant, quum reliqua ossa sensu careant: dentium enim radicibus mollis quidam neruus à tertia coniugatione vtriusque genæ inseritur. superiore quidem perforamen eius quod sub oculo est, inferiore vero ad musculum in ore latentem. hic autem neruus secū venam ad dentium nutritionem, & arteriam ad caloris natui custodiā, cum meninge tenui in dentes adducit. Inde fit ut dolor in dentibus pulsatorius



per inflammationes sentiatur: veruntamen foris & in superficie integros dentes non sentire verum est, quod in eam dentis partem densissimam nervi fibræ non permeant, eamque ob rem cum ea parte limantur, secantur, vřuntur, punguntur, non dolent. Tota vřo parte interiore quam sint dolori obnoxij dentes, aperte docent qui eos cautos asperius tractant, aut frigidi calidius contactu irritant. Deinde vero differunt ab aliis ossibus quod toto vitæ tempore dentes augeantur. Id enim nisi fieret, prorsus deficerent, cibis comminuentis attriti. Differunt & ab aliis ossibus quod nudi sint, sine membrana, sine carne, quodque sint reliquis ossibus, ut ait Celsus, duriores, videlicet ne occurrũ mutuo, mandendo frangendoque attenuarentur magis quam reliqua ossa, propterea quod nec cartilagine, nec adipi, ut reliqui articuli, superlinuntur, quibus atteri verentur. Sunt autem dentes in perfectis hominibus utraque gena sedecim. In aliis enim plures sunt vel pauciores, atque tam multos fieri potius quam vnum expediebat, ne vño aut dolente, aut vi vel vitio pereunte, affectio aliis communis existeret. Primi utrinque quatuor acie sunt pretenui, quo fit ut gladiis similes cibos mordendo abscindant, ut melius in ore moli, & in ventriculo concoqui possint, ob id *μυελαι*, vel (ut ait Celsus) *μυελαι*, id est incisores, appellantur. Sed aliqui pro his quatuor, siue supernis, siue infernis, duos tantum habent, sed fere tam latos, ut vsũ spatiumque quatuor dentium comprehendant: aliis vřo pro quatuor incisores, sex, octo, atque etiam plures, nullo sæpe ordine collocati, sed partim recti, partim foras exerti, partim intro in oris capacitatem erumpentes, & manducationem & pronunciationem persæpe vitiant, ut frequenter eos vel euellere, vel vřere, vel lima tenui minuere oporteat. habent hi quatuor incisores vñam modo radicem. Post eos canini utrinque hærent, *κυνόδοντες* Græce dicti, singulares etiam radices sortiti. hi à basi rotunda in acutissimum mucronem fastigiati descendunt ad ossa & alia dura frangenda, quæ dentes subterfugerũt: siquidem ut incisores cibos molles, ita hi duros validissime confringunt. Post hos sequuntur *γόμεναι* siue *μόλαι*, hoc est, clavales seu molares, quini ab utroque latere ut plurimum, aliquando autem pauciores aut plures, omnes asperi, inæquales, ampli & lati. Sic enim à dentibus incisoriis incisos cibos & effractos à caninis in leuorem terere & quodammodo molere possunt. Sunt enim molis quibus farinae fiunt, nõ formæ modo, sed etiam vsu persimiles. formam quidẽ similem reddit asperitas, quæ plurimum valet ad continendam materiam ne effluat & dilabatur, quæ si molis deest attritu nimio iam læuigatis, denuo ferreis malleis efficienda est. Hi pluribus radicibus genis infixi sunt, ternis quidem genæ superiori, binis vřo inferiori,

nonnullis tamen exceptis, qui supra sæpe cum quaternis, infra vero cum ternis radicibus deprehenduntur. Sunt enim dentium genæ inferioris quam superiores radices & pauciores & minores, quoniam genæ inferioris substantia durior densiorque dentes sua etiam gravitate incumbentes firmitus continere potest quam gena superior rara mollisq; pendulos, & velut in casum ob suam gravitatem procliuēs. Cæterum præter hos triginta duos dentes, alii aliis interdum prodeunt quos genuinos Plinius appellat, ab anno decimo octavo ad vigesimum sextum, vel, ut ille ait, etiam octogesimum, aliquando indolenter, sæpe cum magno cruciatu. Eos Hippocrates & Rufus *συνφρονισμους* vocari dicunt, quia dum nascuntur, homo *συνφρονισμους*, id est sapere, incipit. Habent autem dentes omnes in pueris epiphysem, quæ ipsis sæpe excidit spõte, sed relicta dentis radice, alia prompte in eius locũ succrescit. Omnes præterea dentes insignuntur, ut ait Galenus, *ἐν τοῖς τῷ πατρὶον βόσπροις*. Sunt autem *κύνια*, ossa ipsos continentia: *βόσπρια* vero, alveoli & cavitates quas subeunt.

*Ὀδόντες* vero etiam appellant anatomici apophysim secundi spondyli cervicis, altam, duram, solidam, & superiori interna mediaq; eius sede erumpentem sursumque spectantem, propterea quod denti hominis canino assimiletur. Est autem ea apophysis secundo spondylo propria, perque eam cum primo spondylo & cum occipitis cavitate inter suas apophyses *κορυμνίδεις* per diarthrosim iungitur, & valido quodam rotundoque ligamento occipiti alligatur, eique locum cui apte & tuto affirmeretur & stabiliatur præbet spondylus primus, ipse quoque ligamentum quoddam transuersum producens quod illi apophysii intus injicitur. Sæbit enim dens in cavitatem primi spondyli. Ab hac apophysii totam etiam ipsam secundam vertebram Hippocrates, ut Galenus ait, *Ὀδόντα* appellavit, non autem ut scribit se putare Rufus *ἐν τῇ τῷ μοχλῶν ὀνομασίᾳ*, primam. Alii vřo ipsam apophysim *πυλωειδὴν* vocarunt, à similitudine nuclei, alii à nucẽ pinea *κωνοειδὴν*, alii vero etiam *ὀδονοειδὴν*, à dentis similitudine.

*Ὀδονόζωον*, instrumentum chirurgicum ad euellendos dentes.

*Ὀδονόσις*, dentitio: Est dentis iam concreti eruptio extra gingiuam. dicitur alio nomine *ὀδονόφισα*. Primum quidem dentes intra suos alveolos concipiuntur & concreſcunt, deinde erumpunt, quorum utramque magnò cum dolore fit. Illud *ὀδονόφισα*, hoc *ὀδονόσις* Græci vocant.

*Ὀδονότις*, est fœnum fruticosum, triangulis flagellis, geniculatis, nigro articulorum nodo, foliis polygono longioribus, hordei semine. Decoctum in vino austero gargarizatu dolores dentium mulcet: inde ductum nomen. Vide & Plin.

*Ὀδονοειδὴς ἀπόφυσις*, ea est quam Hippocr. *ὀδόντα*,



non in qualitarum modo primarum, sed secundarum etiam contemperatione, & conuenienti præterea figura siturque consistere, & propterea omnē inæqualem intemperiem ἀσπύς factam dolorificam esse, sicuti Galenus censuit. Neque id quidem vnquam Galenus negauit, etiam si dicat aliquot locis omnem proximam doloris causam ad vnitatis solutionem referri quodammodo posse, præsertim in libris de simplicium medic. facult. Et comment. 3. aphor. 34. in librum de fracturis, quo scripsit Hippocrat. omnes morbos vlcera esse probabiliter dici posse, de quo tamē nihil pronunciat lib. 1. 2. meth. med. agens de affectibus à quibus dolores proueniunt, sed in dubio relinquit, quod longiore, vt ait, disputatione egeat. Sunt autem variz dolorum differentiz, quarum aliz ex ipsa partium dolentium natura, aliz ab ipsis rebus dolorem cientibus, aliz vero à causarum magnitudine aut paruitate desumuntur, quarum hæ præcipuæ sunt auctore Galenō:

*βαρύς*. grauis. sic dictus ab Hippocrate, qui veluti cuiusdam ponderis loco incumbētis sensum inuehit, qualis sit calculo maiore in partē renum carnosā impacto, aut ea phlegmonen patientē: similiter & iecinoris parte carnosā inflammata. Accidit & capiti, humorumque copiam simpliciter significat.

*ἐμπαρυμνός*. infixus. Is est in quo ceu pālus videtur infixus: hoc dolore affectum corpus crassum esse significatur. Proprie ad colon intestinum pertinet. Accidit tamen etiam auri cum quodam pulsu, & dentibus molaribus & oculis, neruis autem minime, vt vult Galenus: siquidem plurimum vtrinque tum supra tum infra extenditur. Eius causa est vel humorum copia confertim ingruentium, vel spiritus flatuosus.

*ὀμαλὸς διήκων*. id est mordax. fit à mordaci humore partes sensibiles erodente. Accidit præsertim intestinis per dysenterias. Accidit & capiti propter humorum & vaporum acrimoniam.

*λατὴρ*. id est latus siue mollis apud Hippocratē lib. 6. τὸν ὀπίθην. Is intelligitur, vt ait Galenus, qui sine phlegmone & tensione est.

*πυκνός*. punctorius. Circa membranas potissimum consistit, & ad eas proprie pertinet, ipsius affectus veluti radice eo loco fixa, vbi membrana pungitur, dolore vero circa locum punctum ad magnū spatium circulum se fundente. Hic in pleuritide manifestus est, & in hepate etiam & renibus, si eorum tunica inflammationes patientur.

*ἀσπύς*. acutus & pungen. finissimus punctio est, cum ceu acu aut terebro perforante aut palo impacto pars diuelli videtur, vt crassum intestinum in colico dolore Galeni à pituita vitrea facto, & in quibuscūq; cepha-

lzis, & à calculo præcipue inæquali, acuto, vel obstructione capacitatem renum, vterum ortum, vasa & tunicam renum, hepatis aut lienis stimulantē. Hic autem dolor nec continuus est, nec per omnes partes æqualiter porrectus. Species videtur esse doloris punctorii, sicut & vicerofus & pruriginosus, quorum ille tum cutem, tum partes imas ad ossa vsque affligit, hic vero ad cutem tantum fixus est. Vterque fit ab humore acro.

*ὀστέος*. id est ossium dolor. Consistit in membranis quæ ossibus adjacent. Idcirco profundus est & in intimo corpore sensum mouet, ossiumque ipsorum veluti dolentium imaginem præbet. Nascitur magna ex parte ab immodicis exercitationibus, interdum vero & à frigore & à plenitudine.

*σπυρμαδής* ἢ *σπυρματικός*. pulsatorius. Hic per se proprieque pertinet ad arterias, quod solæ pulsent, in homine quidem benevalēte citra dolorem: vbi autē oborta est vehemens inflammatio, aut affectus aliquis phlegmonodes, vt erysipelas aut abscessus, cum dolore. Nec vero ad ipsas modo arterias pertinet, sed ad partes etiam in quibus eæ continentur. Cuius doloris duæ sunt præcipuæ causa, videlicet cum ipsæ mouētur, aut cum à re quapiam comprimuntur, sicut inflammato omnino musculo accidit. Est autem inflammationi proprius, nec omni quidem sed maiori. Neque enim in scirrhis, neque in œdematis proprie dictis, neque in alia intemperie quæ tumorem non habet cōiunctum, neque in paruis etiam inflammationibus arteriæ cum dolore pulsan. Ergo neque in peripneumonia, neque in pleuritide, neque in vllis alijs partibus, in quibus & arteria & sensus deest, dolor pulsatorius sentiri potest, neque similiter in hepate aut renibus, quoniam nullus per corpus ipsorum nervus dispersus sit. Verum omnis eiusmodi dolor in corporibus sensibilibus per inflammatorios affectus excitatur, idque proprio & primario affectu in arteriis, in reliquis vero omnibus partibus sensibilibus per consensum, eo quod à contactu vicinorum comprimantur.

*πυκνός*. tensius. Membranæ quibus nulla sunt arteriæ, & cutis & adenes cum inflammationē laborant, hoc vno duntaxat doloris modo vexantur. Is in capite sæpe sentitur, ac si quidem citra grauitatē & pulsū fiat, spiritus tenuis & flatuosi copiam significat; cum pulsu vero membranæ inflammationē, cum grauitate vero humorum multitudinem intra membranas contentam. Gignitur interdum tensius dolor ab immodicis exercitationibus, vt & lassitudines quæ tensuē appellantur, pertinetque hic ad totos musculos, vt ne carnes quidem eorum ab hoc sint immunes. fit & à siccitate. Estque hic dolor partium inanitarum à causa aliqua, siue externa, per se vel per accidens vacuante. Inde nervi ut repletionē, sic inanitiō-

inanitione valenter versus principium & finem tenduntur, interdum vsque ad caput, tuncque fit totius corporis conuulsio & distensio, non ante futura quam nervi tensio cerebrum attingat. fieri potest in omni parte sentiente. Maxime vero tensius dolor à repletionem nascitur, siue humoris, siue flatus, siue vaporis, estque commune symptoma phlegmonarum, erysipelatū & aliorum tumorum, præcipue calidorum. Nam per eos venæ, arteriæ, nervi sic sæpe tenduntur, vt per totos artus ab inflammato loco vsque ad alas vel inguina tensio, rubor, calor, dolor percipiatur, præcipue si superficiales sint phlegmonæ, & eæ partes tangantur. Nam in magna tensione pars etiam non mota dolet: in leniore, mota tantum & tacta. In pulmonis quoque & hepatis & lienis & renum tumoribus membrana ambiens tensa dolet, & cutis extrema, omnes membranae, glandulae etiam valde inflammatae, tensione dolent à multo humore intra se contento, vt vesica vrina plena per ischuriam, vterus foetu grandiore, ventriculus cibo largiore distensus.

Sunt vero & quædam aliæ per prædictas differentias distributæ, vt profundus, sic dictus ab accidente, quod partium sit in profundo sitarum. Hic autem & tensius & punctorius & pulsatorius esse potest. Contrarius illi sublimis est & superficiarius, qualis est pericranii & cutis & partium ei propinquarum dolor, Aphor. 1. & 7. lib. 6. Alia est doloris lati seu sparsi differentia, æqualis item & inæqualis, adhæc angusti & longi. Sunt vero tensiui doloris differentia, Est & turgidus dolor qui à patre primario affecta velut ab radice celeriter in vicinas excurrit. Est & torpidus seu stupidus nullius quidem partis proprius, nec doloris species, sed dispositio partium nervosarū. Dolor enim stupidus res duæ sunt, dolor & stupor, vt vlcus inflammatum morbi sunt duò, vlcus & inflammatio, non autem vna vlceris species. Dicitur & dolor alius vehemens, mitis, magnus, paruus, continuus, intermittens, calidus, frigidus. Alius vero à partibus etiam affectis arthriticus, stomachicus, cardiacus, ostocopus. Præter has vero sunt & aliæ plures dolorum species, quorum proprietates scripto explicari non possunt, sed ne sentiri quidem exacte, nisi qui eos patitur medicus fuerit, qui & perite & prudenter & fortiter eos explorare & diiudicare possit. Eiusmodi forte sunt illi quos Archigenes designauit, *ἐλκμυς*, *αὐστηρὸς*, *γλυκὺς*, *ἰσθρὸς*, *ὀξύς*, *ἀγκύλος*, vel (vt quidam legunt) *ἀλκίλος*, *γλίχρος*, *ἐπειρὸς*, *εὐφρων*: quorum tamen appellationes Galenus vehementer reprehendit lib. 1. de locis affectis.

*Ὀζαία*. est narium vlcus putridum ab humorum acrimia defluxu. Ex vlcerum genere esse Gal. lib. 5. *Ὀζις* *τὸ πύον* ostendit, eoque inter alia à polypo differt, qui in tumorum tantum genere est, nō vicerum. Nascitur influ-

xu humorum acrimia & putrescibilem à cerebro in nares facto, vnde vel earum alæ, vel interstitium, vel aliæ partes exulcerantur. Et humoris quidem acrimonia difficilem admodum eius curationem reddit, putrilago vero graueolentiam & foetorem inducit, vnde morbo nomen veteres indidère. Quando, inquit Celsus, vlcera circa nares sunt, pluresque crassas & odorem foetum habent, id genus Græci *Ὀζαία* appellant. Id malignus nobis multo frequentius est quam antiquis fuerit, vt quod luem Veneream sapissime consequatur.

*Ὀζαίτης* *ναρῶδός*. nardi species, sic dicta à virulento odore. vide *ναρῶδός*.

*Ὀζις*. inde *Ὀζαία* dicta. Sic autem vocatur, inquit Celsus lib. 3. cap. 11. foetor quidam oris qualis ante febres cum frigore sentitur.

*Ὀζοίς*. ramificatur. Id verbum Hippoc. usurpauit de brachiis & cruribus, eam quam ad ramos habent proportionē, volēs significare.

*Ὀθοννα*. othonna. quidā maioris chelidonii succum esse aiunt, alii glaucii, alii succum floribus corniculati papaueris expressum, alii permistos cœruleæ anagallidis, hyōscyami & papaueris succos esse contendunt, alii Troglodyticæ cuiusdam herbæ (quam eodem nomine othonnam vocant) succum, nascique eam in eo Arabiæ tractu qui ad Ægyptum spectat. Proditur autem herba ipsa foliis erucæ, perforatis cribri modo, & veluti à tineâ derosis, squalore oblitis, paucis, flore croci, latifolio: quare quidā anemones speciem esse putauerunt. Sunt tamen qui affirmant lapidem esse Ægyptium in Thebaide nascentem exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci. Vim habet othonna detergendi atque erodendi, omnia quæ claritati oculorum officiant exterens.

*Ὀιδίμα*. apud Hippocrat. aliosque omnes veteres idem plane significabat quod *ὄγκος*, id est, tumor, cuiuscunque generis ille esset. Verum iuniores medici nominis eius significationem postea contraxerunt ad eum tumorem designandum quem pituita committit: sicut enim quæ ex sanguine fit, phlegmonie, ex biliosa fluxione, erysipelas, ex melancholico succo scirrhus nascitur: ita tumori illi quem pituita creat, cedematis nomen proprium esse voluerunt. Non est autem vnius generis. Vnum verum exquisitumque est, multa non vera atque illegitima. Verum est quod naturalis pituita, in partem aliquam abscedens, committit, molle, laxum, digito prementi cedens, indolens, album, minimum calens, & aliis breuiter notis præditum quæ pituita solent consequi. Non verum autem est quod fit à pituita non naturali, siue per alterationem talis euascent, siue per alterius humoris mixtionem. Itaque cum flatus & aqua longè recesserint à naturali pituitæ remberie, nec tumores flatulenti qui spiritu vaporoso constant, & in cadaueribus etiam plerumque excitantur, nec qui aquam tenuem

duntaxat continent, inter vera œdemata habentur, vt nec ii qui sanguinis aut bilis alterius participes sunt. hæc enim non simpliciter *οἰδήματα*, sed pro misti humoris specie vel *φλεγμονώδη*, vel *ἰσχυροειδῆ*, vel *σπυρρῶδη* nuncupantur: illa vero alias appellationes sortita sunt, quanquam reuera omnia in œdematū genere continentur, quod & mollia sint & doloris expertia. His enim duabus notis omnem œdematis naturam substantiamque medici comprehenderunt. quibus tamen Hippoc. tertiā videtur addidisse & *πῶς γεγασκῶ*, quod scilicet digito cōpressum œdema cedat, siue id symptoma mollitiem consequatur, siue (quod verisimilius est. neque enim Hippocratis breuitas permittit tot verba in vna & eadem re consumere) designet appresso digito œdema ita cedere, vt cavitatis vestigia impressa maneant. Præterea vero omne œdema, quod proprie & simpliciter œdema dicitur, certo loco definitum circumscriptumque est: ab eius tamen similitudine œdema etiam dicitur tumor ille pituitosus qui nōnunquam in pedibus & eruribus eorum oritur qui aqua intercute & phthisi & cachexia laborant, quique etiam in leucophlegmatia occupat corpus vniuersum. Verumtamen eiusmodi œdema eorum morborum symptoma est, nulla propria præcipuaque curatione indigens: quod autem alterius generis œdema est, in morborum genere censetur simularium, compositorum ex intemperie & materiæ affluxu, peculiaremque habet curationem. Cæterum cum œdema omnibus partibus corporis, quæ distendi possunt, eueniat, oculis etiam aliquando contingit, qui œdemate dicuntur laborare cum palpebræ intumescunt, suntque decolores & grauiore, mouenturque difficilius, & pallidiores apparent, atque ipsum etiam palpebræ album aliquantulum excedit nigrum. Non est autem aliud oculi œdema, quam tumor externus palpebræ, latus, indolens, & naturali habitui concolor, qui digito compressus cito cedit, & cito rursus repletur. Fit vt plurimum ab aquosâ fluxione, & flatulento humore.

*Οἰνάζα*. frutex qui & *οἰνοθήκη* appellatur, de quo postea. Dicitur & *οἰνάζα*. Dioscor.

*Οἰνωτάριον μύρον*. vnguenti conditura est, non sic dicta quod *οἶνος* & *οἰνάζης*, hoc est è labrusca, fiat, sed quod *πῶς οἶνος καὶ τῶ ἀπὸ κρίνου*, hoc est, vino & flore liliorum, constet. Siquidem pleraque eius generis vnguenta ne cenanthen quidem recipiunt. Vfus eiusmodi vnguentorum apud quosdam odoris gratia duntaxat & deliciarum adhibetur, tum à lanoacro totius corporis perfusione, tum à cœna mensarum per spongiam illitione. Confert vero & ad medicinam, tum resolutis, tum syncope laborantibus, si roborantibus stomachi cataplasmaris admisceatur: nam & stomachum & spiritum animale vitalemque confirmat: proindeque ad vitandam pestilentiam conducit. Dux cenanthariorum

formulæ habentur apud Paulum lib. 7. cap. 21. itemque apud Aetium lib. 16. dicitur & *οἰνωτάριον μύρον*.

*Οἰνάζη*. est vna vitis labrusca. Ea duorum generum est. Vnum, quod nunquam maturescit: alterum, quod ad frugem peruenit. paruis acinis, nigrum & adstringens. Colligitur cum flore quando optime olet, siccaturque in vmbra, atque in cados conditur. Refrigerandi atque adstringendi vim habet. Ex ea fit vinum quod *οἰνάζηνον* cognominatur, duabus libris florum in musti cado maceratis, qui post triginta dies mutantur.

Est & *οἰνάζη* herba candido pastinacæ flore, caule crasso, palmi altitudine, semine triplicis, radice magna, in multa rotunda capitula extuberante. Nascitur in petris.

*Οἰνάζηνον*. vide *οἰνάζη* & *οἰνάζη*.

*Οἰνάζη*. ἀμπέλαιον, id est, viti, apud Hippocr. vt annotat Gal. ἐν τῇ ἐξηγήσει τῆς γλώσσης.

*Οἰνάζη*. καλήμαλα & ἀμπέλαιον. hoc est, palmities vitis, apud Hippocr. Galenō authore.

*Οἰνάζη*. mistura veno & oleo constans, cuius mentionem Galenus facit, tum lib. 1. *τῆς ψυχῆς*, in descriptione emplastri quod ex argenti spuma & œnelæo præparatur, tum in lib. *περὶ εὐπορίων*, quo loco veratipsum dari phthificis, sed eo calfacto stomachum fouendum præcipit.

*Οἰνωγάλα*. potionis genus ex vino & lacte mistis. Cuius mentionem fecit Hippocr. Cedrim Creticam scribens foeminarum incommodis auxiliari & *οἰνωγάλακτι*. Id quod tamē nonnulli repidum aut egelidum interpretantur in modum lactis. Id enim *γαλακτώδες* videtur significare, de quo supra.

*Οἰνωγάρον*. garum vinosum, hoc est, garum vino mistum. vide *γάρον*. Aetius lib. 3. cap. 85. refert compositionem *οἰνωγάρον καθαρινόν*, ex qua tamen quodnam proprie fuerit gari & vini temperamentum, certo constare non potest.

*Οἰνωθήκη*. frutex est arboris instar prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili, flore rosaceo, magno, radice candida, longa, cum siccata est, vinum oleste. Hilaritatem dicitur afferre data in vino, & non hominum modo, verum omnium etiam animalium feritatem mitigare: id quod de radice Theophrastus intellexit. Dicitur eadem ratione & *οἰνάζα*: Dioscoridi vero & onothera & onagra.

*Οἰνώμενος*, vinum mulsum. dicitur & simpliciter mulsum. Non aliud est quam vinum melle conditum. Sed condiendi ratio diuersa traditur. Alii, inquit Dioscorides, faciunt duabus vini metretis, admista vna mellis: alii, qui, quo celerius præberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt: alii parcentes impendio ad sextarios sex musti feruentis vnum mellis adiciunt, & vbi ferbuerit, vase recondunt: ita paratum dulcedinem retinet. Omnes autem è ventre vino austeroque & bono melle faciunt. Minus



enim inflat, ac celeriter id genus in usum venit. vetus corpus alit, media ætate alio prodest, vrinam pellit, à summo cibo sumptum nocet, & inter initia posum implet, dein appetendi aviditatem retocat. Alii vero, ut scribit Constant. Cæsar lib. 8. ad sextarium unum mellis calentis vini sextarios quatuor adiiciunt, & postea recondunt, inque eo nonnulli costi scriptula duodecim suspendunt, quidam vero etiam folii malabathri scriptula duodecim ammiscunt. Sunt qui mustum, quod ex musto fit, à Græcis *μέθυ* vocari scribant. Attamen Constant. Cæsar eo nomine conditi musti genus quoddam appellari scribit ex variis aromatis, & sub Caniculæ ortum per dies quadraginta insolari. Alii vero, ut idem scripsit, mustum quousque ad dimidias ferè resideat, excoquant, & in decem eius sextarios unum mellis Attici miscunt sextarium, & in cadum transfundunt, gypsa quoque vasis spiraculo in umbra recondunt. Sed hoc genus inflationibus obnoxium est, aduersum stomacho. Sunt & aliæ multæ musti condituræ, quas hic referre superuacuum fuerit.

*Οἶνος.* vinum. Est vix succus feruendo coctus. Cum vnam dico, vitiginè intelligo, cui proprie hoc nomen competit. Is succus si non calcaris aliterue expressis vis spon te defluat, *μέθυ* vocatur *ἀπὸ τοῦ μεθύειν τὸ ἐκπίεμα*. Sin autem prælo aut pedibus exprimatur, *γλεύκος*. Vtrumque autem, cum primum ex vis prodiit, crudum est, flatuosum & concoctu difficile, taleque tam diu manet, dum feruorè mitificatum fuerit atq; concoctum. Est autem feruor ille veluti quædam putrefactio illius succi à calore externo in humorem excrementitium agentè. Cum enim in eo succo multa simul varii generis excrementa redundent, neque ab insito ipsi calore, qui per initia perexiguus est, regi gubernari que possint, putredo inducatur necesse est; quam calor & ebullitio & perturbatio maxima propter flatuosi spiritus admistionem consequuntur. Eo autem in opere homogenea ab heterogeneis segregantur, facit humor superfluous, flatus dissipantur, totusque succus ita excoquitur, ut deposito omni præter naturam calore atque excremento, suavis atque benignus euadat. Is donec ad eum modum coctus fuerit, à Græcis *γλεύκος*, à Latinis mustum appellatur, crudum autem est & flatibus refertum & concoctu difficile: ubi vero in vinum transit, depositis iis vitiis nouam naturam hominumque vitiis commodissimam induit, virtutes musti vitiis aduersas habens, cum nec inflet præcordia, imo si inflata sint subdere faciat, nec inibi moram trahat propter caloris mediocritatem: adde quod cum digestionis vias aperiat & pariter impellat, ac nutrimentum sursum agar, ad celeritatem deductionis in corpus conducit. Est præterea boni succi, & ad contemperanda concoquendaque ea quæ in ventriculo & venis sunt

idoneum: nam bilis amaræ etiam acrimoniâ frangit ac mirigar. Præterea nutrit & solidas corporis partes humectat. Iam vires quoque organorum adauget, & expellendis excrementis viam facit. eoque fit ut sudores & præter cætera vrinæ moueat, quando & totum corpus celeriter transit, & impetu cursus sui excrementa secum expellit. Ut autem nullam inuenire est substantiam plane *ὁμοιομερῆ*, omnibusque sui partibus sibi similem; ita neque vinum, quod in eo quadruplicis nature partes spectentur, à Galeno explicatæ lib. 4. de simpl. medic. facult. Earum una *μέθυ* à Græcis, *sax* à Latinis dicta, vini ipsius excrementum est, quod temporis spatium fecernitur, & deorsum descendit. Alia *ἀπὸ τοῦ*, hoc est, flos, dicitur, quæ, dum vinum feruet, supernat, tandemque cum face in imo dolio subidet. Tertia aquea est, toti vino permixta, quæ primario potissimumque feruet; & quarta præter eas, ipsum reuera vinum. Harum partium varietate & inæquali mistura non est dubium vinorum differentias atque facultates quam plurimas existere. quanquam non ex iis modo partibus tam variè inter se mistis, verum ab aliis etiam prope infinitis eorum differentiarum petantur, ut à nativo solo, à gustu, à colore, ab ætate, à consistentia & reliquis eiusmodi. Quas omnes ut enumerare impossibile est, sic præcipuas annotare non erit inutile, quarum veteres meminerunt, atque in primis Galenus, qui pluribus in locis de iis studiose tractauit, ut lib. 12. meth. med. & lib. 5. sanit. tuendæ. Eas autem ordine literario subiicere visum est.

*ἀδριακὸς οἶνος.* Adrianum vinum, quod in Adria nascebatur, vel quod ab Adriatico sinu Romam aduehebatur. Erat subastringens, tenue, album & aquosæ consistentiæ, in nobilium vinorum censu à Galeno habitum, posteaquam ad vetustatè peruenisset: Dioscorides lib. 5. scribit in Sicilia provenire: ut & Mamertinum, modice adstringere, ocysime inueterati, minusque ob suam tenuitatem nervos tentare.

*ἀδυναμὸς.* vinum adynamon. hoc est, impotens & imbecillum. Vini genus fuit factitium, cuius multiplex traditur compositio. Alii, inquit Dioscorides, pares aquæ & musti menses coquant molli igne, donec absumatur aqua: quod ubi refluxerit elutriatum, vase picato recondunt. Alii marinæ & celestis aquæ, mellis & musti, pares miscunt portiones, decapulant, & diebus quadraginta insolant. Aliis vero albi musti sextarii viginti, aquæ dimidiū feruet, donec excoquatur aquæ mensura. Aliis autem marinæ sextarii decem, tantundem pluviæ in sole quadraginta diebus torrentur. Non amplius anno durat, & agris datur quibus vini noxa metuitur, loræ vires habens.

*ἀερῶνυμὸς.* vini dulcis genus, quasi semper mustum. factitium est, quoniam feruere prohibeatur. Sic enim prohibetur mustum

in vinum transire. Ergo merguntur protinus in aqua cadi donec bruma transcat, & consuetudo fiat algendi.

*αἰγαῖος*. vinum Ægeates, quod apud Ægas prope Mytinam nascebatur, crassum, austerum & nigrum vini genus, vt scribit Gal. comment. 3. *αἰς τὸ κατὰ διαίτην ὄξυνον*, sect. 7. Id adstringebat, longo tempore in ventre manebat, & fluctuationes in eo excitabat. Hoc autem loco non erit inutile admonere, quod iudicio meo, male apud Galenum lib. 5. sanit. tuenda de vinis differentem, Ægæum legitur, cum Ægeatē scribere oporteat, quod vini genus tam est affine Perperino, vt ea duo semper Galenus coniungat: vt lib. 12. Method.

*αἰθαῖος*. vinum Albanum, ad Albam natum. Aquosum fuit consistentia & austerum. Dioscorides scripsit Albana vina crassioribus constare partibus, & dulcia esse, stomachum inflare, ventrem emollire, sed concoctionem minus adiuuare & nervosa minus infestare: vetustate autem eadem austerum saporem concipere.

*αἰθαῖος*. Vinum Albates Austerum simul & dulce vini genus, qualitatibus præditum contrariis. Quo fit vt prauum sit, quod neq. distribuatur, neq. descendat, sed plus æquo in ventre permaneat inferiore; & ipsum inflet. Id Gal. in vinorum crassorum censu enumerat lib. 12. meth. med. Idem in Cilicia nasci prædidit com. 3. *αἰς τὸ κατὰ διαίτην ὄξυνον*. Sed video id nomen variis locis deprauatum esse, aliis *αἰθαῖος*, aliis *αἰθαῖος*, aliis *αἰθαῖος* scribentibus. Gal. sic ex loco dictum esse prodidit.

*ἀμυνῶς*. vinum Aminæum. Triplex proditur à Gal. lib. 1. de Antidotis. vnū quod in collibus Neapoli vicinis nascitur, aquosum, tenue, firmū & austerū. alterū, quod in Sicilia: tertiū, quod in Bithynia provenit vtrūq. pariter aquosum quidē & tenue, non tamen vile, vt quod facile cū Sabino de præstantia cōtēderet; p̄sertim vbi ad senium peruenisset.

*ἀνδρῶς*. vinum fortē & generosum, apud Hippoc. nisi forte scribendum sit *ἀνδρῶς*. hoc est, vinum natum in Andro insula, vt *ἀνδρῶς*, quod est à Lesbos, vt scribit Erotianus.

*ἀνταρχύτος*. vinum aparachyton. Vinum cui aqua marina admista non est. Sic dictum ad eius laudem à mercatoribus, quasi purū & syncerum, nec adulteratum aquæ marinæ mistura, tanquā per se satis firmū & generosum. Neq. enim nobilib. vinis misceri solebat aqua marina, sed imbecilliorib. quæ *ἀνταρχύτος* ob id dicebatur. Diosc. 5. tēminit vinorum *ἀνταρχύτων*, quæ admistam sapā recipiant: quæ quidem reuera *ἀνταρχύτος* sunt, hoc est, aquæ marinæ expertia, sed tamen alio liquore adulterata, sapā scilicet immista.

*ἀνταρχύτος*. vinum Ariusum. Vinum Græcū, quod locis quibusdam in Chio provenit, aptissimum prorsus ad digestionem succorū in corpus. Est enim flavū & odorum, & cōsistentia inter aquosa crassaq. medium, antidotis optimum.

*ἀρῖονος*. Vinum Arsyennum. fuit Asiaticū aquosū cōsistētia. Gall. 7. meth. Scribitur & *ἀρῖονος* apud Stephanū, ab Arsyia, Pfyro-rū & Chii loco. Strabo *ἀρῖονος* vocat lib. 14.

*αἰσινῶς*. vinum austerum. Est vinum modice crassarum partium, parumque adstringens. Tale autem est præsertim novum. Vetustate namq. austeritas cōcoquitur vinumque tenuius & dulcius euadit. Itaque quod principio frigidius erat, calidi' fit, & præstantissimum redditur. Quāto. n. quodq. austrius est, tāto etiā est frigidius & crassius, proindeq. stomachum & intestina corroborat, fluxiones sistit, caput minime tētat, sed non facile digeritur, atq. ad succorū deductionē inutile est. Verum vbi ad vetustatem peruenit, si merum & syncerū bibatur, exalfacit, facile distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam inuitat: vires alit, robur addit, somnum conciliat & commendat colorem.

*βίαιος*. vinum à festinatione & violentia sic dictum, quod ante maturitatem & quasi per vim ab vuis exprimitur. Idem omnino videtur esse cum omphacite.

*βίαιος*. vinum Breiū: vile, crassum, infusum, & austerū, præsertim quod in maioribus lagenis olim asseruabatur, vt literis Gal. mā-davit. In parvis enim, inquit, seruatum, melius paulo fiebat, & medium quodammodo inter bona malaque vina euadebat.

*γαυδαῖος*. vinum Gaurianum. Inter Italica vina numeratur à Galeno. fuit autem album, aquosum & oligophoron.

*γλυκύς*. vinum dulce. Quod dulci qualitate præditum est. Vini differentia est sumpta à gustu. Tale autē modice crassum est & nigrum, multisq. numeris, vt scribit Gal. ab aqua tū colore tū substantia recedit. Neq. enim, inquit, tenue exquisitū, neq. album est vinum dulce, sed omne quod dulcius est, eo & colore nigrius & substantia crassius apparet. Quamobrem mediocriter calefacit, sitimq. propter caliditatem & crassitatem inducit. Eiusmodi fuit Theriū & Scybelites, vtrumque crassum & nigrū: præterea quæ in Mæonia nascebantur, Therinū & Caryinū, tāto minus prædictis nigra crassaque, quanto etiam minus dulcia fuerē. Itaque cum nulum vinum dulce sit exquisite tenue, sed magis minusve crassum, certum est à dulci vino iecur & lienem obstrui, eisque noxam inferri, maxime si inflammatione aut scirr-ho laborent. Verum pulmōni non perinde noxium est, quod sedata iam inflammatione profit ad spurum educendum, pulmōnis meatus & humores in iis inhærentes commodissime diuulsioneque humectando. Est autem magna in vinis dulcibus varietas, non tantum quia magis minusve talia sunt, sed quod alias aliquando adsci-sunt qualitates.

At *γλυκύς* vinum passum. quod fit passis & in vite diutius adustis vuis. Vide suo loco.

*γυψῶδης*. vinū gypsatū sine gypso cōditum. Id contra venena ceteris aptius est, vt scribit Dioscori-

Dioscorides. sed netius officit, caput aggrauat & incendit, ac vesicæ aduersatur.

*συντεταγμένον*. vinum secundarium. Cato & Latini loram vocant. Hoc quanquam non possit reuera vinum dici, tamen inter vina operaria numeratur, maceratis aqua vinaceis, rursusque prælo subiectis. Id autem ita faciendum Dioscor. præcipit: in vinaceos, è quibus triginta musti cados expresseris, cados treis aquæ addi, tum calcari, expressumque ad tertias decoqui, deinde in singulos congios modi huius qui remansit, sextarios salis binos cõiici, acta hyeme decapulari in fistilia, post annũ vii. Id vinum celeriter exolescet, nec anno amplius durat. Conuenit agris quibus timemus noxam vini, item à longa valetudine se recolligentibus.

*σκληρὸν*. vinum quod sit vuis in sole siccatis, clauso loco per dies septem, in cratibus rotidem pedibus à terra alte, noctibus à rore defensus, octauo die calcatis. Ita fit optimi odoris saporisque.

*ἀκριδὲς*. vinum acre. Vini differetia sumpta à gustu. Succedit dulci per vetustatem, quæ admodum & aceto & melli & adipum omni generi accidit: quæ quanto sunt vetustiora, tanto etiam actiora redduntur. Est autem eiusmodi vinum vehementer calidum. Siquidem fieri ita solet, vt omnia vina vetustate euadant calidiora: atque austera quidẽ temporis spacio dulcedinem quandam atque acrimoniam deposita adstrictione acquirant, deinde vero incrementum acrimonie, sensim dulcedinem deponant, & postea progressu temporis admodum acra euadant, assidueque amarescant, ac denique vbi crassescere cœperint, penitus fiant amara: sicut Galenus lib. 4. simpl. med. demonstrauit.

*ἐρυθρὸν*. vinum rubrum. Est vinum colore medium inter fuluum & nigrum. Vt autem colore ita & facultatibus medium est, tanto minus calidum & tenue reliquisque vini fului dotibus præditum, quanto etiam nigrius existit.

*ἐξήμα*. sapa. Appellatur alio nomine *σιρῆμα*, vini factitii dulcisque genus est musto ad tertiam vsque mensuræ partem decocto. vide suo loco.

*θαλάσσιον ἢ θαλασσοποιόν*. vinum marinum. hoc est, cui aqua marina admista est. Id quod fieri solebat vinis aquosis & debilibus: vt eo quasi fuco adulterata, calidiora & actiora viderentur, tum vt facilius à mercatoribus conficerentur, & longæ viæ incommoda perferrent, atque etiam diutius feruari possent. Sed temperandi ratio varia fuit, vt docet Dioscorides. Alii, inquit, statim cum decerptæ sunt vites, aquam maris admiscunt. Alii in area vvas sole siccant, quibus calcatis marinam adiiciunt. Alii passas prius vvas in doliis marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: quod tamen magis passî generibus adscribitur. Omnia eiusmodi vina siccant, sitimque inducunt, pro modo aquæ marinæ admistæ stomacho ad-

uersantur, neos infestant. alio tamen apte esse Dioscorides prodidit. Fuerunt huius generis, vt idem ait, vina Coa & Clazomenia, quæ propter plurimam aquæ marinæ mistionem facile corrumpuntur, flatus mouent, aluum turbant & neruis officiunt. Splemics quidam veteres exhibuerunt.

*σπαστός*. Theracum vinum. Id fuit crassum, nigrum, dulce, sed citra adstrictionem. In Cræta proueniebat. In ventre, inquit Galenus, diutius immoratur, nec vinas mouet, sed deorsum properat, ideoque ante cibum sumitur.

*ἄσιον*. vinum Therinum. dulce, modice crassum & nigrum. Est autem Asianum, nascens in Mætonia.

*Θύσκιον*. vinum Thuscum, hoc est, in Thuscia natum, aquosum & oligophoron.

*ἵπποδαμναιον*. Vinum hippodamantium. manifestam habet adstrictionem: ideoque stomacho saluberrimum: potissimum autem si inueterarit. Est ex ea specie cuius est dulce Falernum, & Tmolites: nisi quod manifestius quam hæc adstringat. Galenus lib. 12. meth. med.

*καρυβόσιον*. vinum Cæcubum. Galenus lib. 12. meth. med. scribit eo nomine nullum designari certum vini genus, vt plerique existimant: sed omne vinum à Romanis sic vocari quod per vetustatem eo peruenit, vt igneum colorem contrahat atque inde ipsum quoque nomen fuisse sortitum. Neque enim, inquit, eo omnia perueniunt, cum prius crassentur quam in pellucido flauorem accipiant. Sed quem huius sententiæ auctorem Gal habuerit, non video, neque intelligo quomodo Cæcubi nomen inditum esse possit à vetustate, vel ab igneo colore. Perfacile fuit, vt arbitror, hominem peregrinum & linguæ Latinæ ignarum decipi à quouis, & vulgò aut etiam ignaro credere. Magis probabile est Cæcubum vinum dici à Cæcubo oppido Campaniæ in Italia, quod vincta (vt est apud Strabonem libro quinto) vini feracissima præcipuis enutrit arboribus. Dioscoridi quidem videtur fuisse certum aliquod vini genus, qui de Cæcubo deferens, scribit ipsum dulce esse & Albano crassius, corpus & colorem alere, ægre tamen concoqui.

*καλαινόν*. Vinum Calænum, quod apud Calenos in Campania nascitur præstantissimum, succo (vt ait Plinius) per omnes terras indycto. Verum hoc natura, non ingenii opus est. Nam & Calænum vinum aliud est, eiusdem cum sapa generis, vino ita decocto, vt tertia perdita duæ partes remanserint.

*καρυβόσιον*. vinum Caryinum. Id Asianum fuit ex Mætonia prodiens, nigrum, dulce, sine morfu.

*κίρρον*. vinum fuluũ. Vini differentia à colore sumpta. Id post flauum calidissimũ censetur & tenuiũ partium, velocissime in corpus digeritur, & crudos succos concoquit,

sed caput tenet & mentem. Eius tanta cum flauo cognatio similitudoque est, vt quod Hippocr. *κρόνον*, hoc est, fuluim, appellare solet, potuerit etiā *κρόνον*, id est, flauum, appellare, sicut Gal. lib. 5. sanis. tuenda prodidit. Talia autē vel per se nascuntur, vel vetustate euadunt. Nam & vina alba quo magis inueterauerint, eo redduntur fuluora. Duorum autem generum fuluim vinum est, alterum dulce, alterum austerius pauloq; crassius. Dioscor. lib. 5. vinum *κρόνον* colore medium esse dicitur inter album & nigrum, & medias inter vtrunque vires habere. Quo quidem in loco *κρόνον* varie ab interpretibus vertitur. Barbarus rubrum, non distinguens *κρόνον* & *έρωσπον*, sicut debuerat. Ruellius giluum, Marcellus vermiculum conuertit, cuius scripta hac de re neminem legisse poeniteat.

*κρόνον*. vinum conditum. Factiui vini genus, piperis eloti, & vbi fuerit reficcatum, triti scrupulis octo, mellis Attici sextario vno, vini veteris albi sextariis quinque simul permistis. Sic quidem parabat Constant. Cæsar. Variæ tamen fuerunt eius compositiones, de quibus vide suo loco.

*κρόνον*. vinum Creticum. Vini dulcis genus auctore Dioscoride, quod vis sole liccat in area aut in sarmento torrefactis exprimitur.

*κρόνον*. vinum Lesbium, in Lesbo insula natum, habitum semper inter vina præstantissima, vt quod flauum & odorū esset, & consistentia inter aquosa crassaq; medium, ideoque ad concoctionē humorum & eorundē deductionem in corpus aptissimum. Sed vt omnia vina generosa & tenuia, caput facile & mentem tentat, atque ideo infirmo capiti est noxiū: vt & Gal. lib. 12. Methodi *οἶνον κρόνον* vocat. Cum vero tria, inquit Gal. sint in Lesbo oppida, minus certe tū odorū tū dulce in Mitylene gignitur, magis & odoratū & dulce in Ereffe, deinde in Methymna.

*λευκός*. vinum album. Id minus quam alia omnia calefacit, eoque minus quo albidius fuerit. Imo vero vt scribit Gal. lib. 12. meth. med. non inuenias ex albo vinorum genere calidum vllum: quādo etiam austera & mediocriter alba, cum inueterauerint, primum quidem pallidula, deinde plane pallida, tandem vero ex pallido flauentia & fuluora quodammodo reddantur. Est enim, vt scribit Galen. lib. 5. sanis. tuen. vinum album, si colorem spectes, oppositum flauo, cum hoc vt calidissimū est, sic album misime omnium calidum sit. Sed nec vllum vinum album plane dulce est, sed quoddam austerum & crassum, aliud aquosum & tenue, aliud fuluum flauumque, aliud mediocriter dulce, vt Hippodamantium & Faustianum Falernum, sicut habetur apud Gal. lib. 12. *εὐχρη*. & *καποχρη*.

*λευκός*. species est vini salis, ex passis prius visis compositi, sed mox calcatis, & aqua marina maceratis, deinde in album mustum coniectis. Species est vini albi.

*μαμερτινός*. vinum Mamertinum. Id in Sicilia, vt & Adrianum, gigni Dioscorides auctor est, crassarum partium, modice adstringens, ocysissime inueterascens, minusque ob suam tenuitatem nervos tentans.

*μαρτός*. vinum Marsum, natum in Marfia, regiuncula Italiæ, vltra Picenum Samnites versus. Censetur autem valde austerum & asperum.

*μαλακός*. Passi genus, vt scribit Plinius lib. 14. cap. 9. suum saporem, non vini referens. Dioscorides scribit id nigrum crassumque esse, & corpora multum alere. priuatimque conferre ad ventris rheumatismos. Non est dubium à Psithia vite sic dictum, quam Columella lib. 3. inter Græculas vires commemorat.

*μύρας*. vinum nigrum. Omne crassum est, plurimi alimenti & sanguinis, sed crassioris atque melancholici. Duæ sunt eius differentię. Aliud dulce, aliud austerum, aut etiam acerbum habetur. Pauca autem admodum sunt, quæ simul austera & dulcia sint, & si quæ eiusmodi reperiantur, praua sunt, qualitatibus prædita contrariis, quale Albates in Sicilia commemoratur à Galeno. Quæ nigra dulciaque sunt, qualia censentur à Galeno Scybelites & Theræum, calidiora sunt austeris, minus in ventre morantur, crassum sanguinem gignunt: vrinas tamen nec ipsa mouent, sed deorsum properant & aluum mouent: ideoque etiam ante cibum sumi solent. Quæ vero nigra austeraque sunt, ea frigidiora sunt, adstringunt, repellunt, fluxiones sistunt, longo tempore in ventre manent, & fluctuationes in eo excitant, præsertim nouella & mediæ ætatis. Verustate namque vt colorem mutant, reddira primum nigra, postea fulua, & tandem flaua, ita etiam vires.

*μελίτης*. vinum melitites, mustum è musto, quod & *νέκτερ* quidam vocant. Vini dulcis genus est, quod, vt scribit Dioscorides, distat à musto, quoniam illud à vino vetere austero, addito mellis exiguo, temperatur: hoc è musto, in quinque congios austera musti congio mellis & salis cyatho inditis. Vel, vt aliis magis placet, mustum, quousque ad dimidias fere resideat, excoquitur, & in decem eius sextarios vnus mellis Attici miscetur sextarius, & in cadum transfunditur, gyplatoque vasis spiraculo in vmbra reconditur. Est autem inflationibus obnoxium, & aduersum stomacho, aliisq; facultatibus præditum quas Dioscor. lib. 5. recensuit.

*μεσσηνικός*. vinum Mesogites. Asianū fuit, è Tmolio monte, vt ait Dioscor. infestum capiti & neruis. Idem forte cum Tmolite, cuius frequens mentio apud Galenum.

*μυρτίνος*. fuit vinum *μύρρα* περιποιημένον, hoc est, vinum vnguento mustum, sine, vt Pollux scribit, *λευκός* εἶνος, vinum dulce. Ar Hefychius *μυρτίνος* οἶνον per duplex & scribit, deductum certe *μύρρα* πᾶσι *μύρρα*, hoc est, à myrrha, vt sit vinum

vinum myrrha conditum. habetque adstipulatorem Plinium lib. 14. cap. 13.

*μυρρινόν*. vinum Mysium; quod in Hellesponto Myfia prouenit, Surrentino non ab simile. Est enim flauum, odoratum, & consistentia inter aquosa crassaque medium.

*νικιτινόν*. Idem quod melicites, ut plerisque placet.

*ζανθόν οίνον*. vinum flauum. quod vini generis summe calidum est & tenue, optimi succi: velocissime per corpus digeritur, crudos succos concoquit, caput & mentem tentat. Eiusmodi autem color inest vinis vel media etate, vel in senio. Nullum enim vinum novum fulvum aut flauum est, uti nec calidum. Verustate autem color ille maxime contrahitur, quoque omnia verustiora, eo etiam primum fuluora, mox flauiora euadunt, & calidiora. Est autem duorum generum. Vinum parum dulce, alterum modice austerum. Neque enim flauum vini natura fert ut multum sit vel dulce vel austerum. Oppositum est hoc vini genus, si colorem spectemus, albo, ut quod calidissimum sit, sicut minime calidum, album.

*οιναιθίνον*. vinum crenathinum. fit ex labrusca, hoc est vite syluestri, duabus libris florum in musti cado maceratis, qui post triginta dies mutantur.

*οινόμελι*. mulsum vinum. fit ex annoso austeroque vino & melle quamoptimo, non autem ex musto, ut melicites. Temperatur autem duobus cadis vini vno mellis adiuncto. Quidam vero, ut compendium operæ faciant, cum vino mel decoquunt, deinde ita in lagenas fictiles diffundunt. Alii parcentes impendio, in sex sextarios musti feruentis sextarium mellis adiiciunt: cum defebuerit, elutriant ita conditum, dulcedinem retinet.

*οινώδης*. vinum vinosum. Sic appellauit Hippocrates non molle & quod specie tantum vini haberet, sed potius austerum & forte, sicut habet Erotianus.

*οινοφόρος*. vinum quod paucam aquæ missionem admittit. Idem cum *πυλποφόρος*. cui contrarium est quod polyphorum vocatur.

*ομφακίτης*. vinum omphacites. Id nomen quamuis omnis vini crudi & ante maturitatem excerpti videri potest commune, & idem cum *πυλποφόρος*, priuatim tamen in Lesbo exprimi Dioscorides author est. vix paulo ante maturitatem colliguntur, etiam semiacerbe, per triduum aut quattriduum sole torrentur, donec acini passi fiant, rugasque plane contraxerint, tum premuntur, deinde sole in fictilibus inueterantur. Constringit, stomacho vtile est cibos non coquenti dissolutoque granidarum malacis & defectionibus medetur. Est autem diu crudum, nec nisi post annos multos bibi potest.

*πυλποφόρος*. vinum vernus. Est vinum quod factum est verustate scilicet primum quidem

acrius, deinde vero etiam acrius. Id quod annorum quidem spatio omnino euenit, sed vario & inequali. Aquosa enim vina celerissime omnium inueterantur, crassa vero & austera tardius. E quorum numero Surrentina non ante vigesimum annum vigere solent, atque ab eo tempore ad potum idonea bonaque diutissime perseverant, nec facile amarescunt, sicut Galenus testatus est. Sunt autem notæ duæ vetustatis, acrimonia primum, quæ plane magis calida euadunt verustata vina; deinde vero amari tudo, quæ acrimoniæ succedit: quam ubi adepta sunt, immodice resiccant. Est autem vinum vetus nervis noxium & reliquis sensibus; gustu tamen suauissimum: ideoque cauendum iis qui intestinæ alicuius partis imbecillitatem sentiunt. at tamen in secunda valetudine paucum, dilutum aqua, innoxie sumitur.

*παρτυπιανόν*. vinum Paratypianum. quod, ut scribit Dioscorides, ex Adriatico sinu deferretur, odoratum ac tenuius, ideoque liberaliter potum fallens, diuque seruans ebrietatem & soporem adferens.

*παχύς*. vinum crassum. sic à consistentia dictum, aquoso contrarium: eiusmodi est sirizon siue hepsēma, item Therazum & Scybelites. Valde nutrit, sed facile obstruit.

*περπερινόν*. vinum Perperinum. quod apud Perperinen, iuxta Pergamum, in Asia gignitur, crassum, austerum & nigrum vinigenus, ut & Egeates. Adstringit, longo tempore in vêtre manet, & fluctuationes in eo excitat.

*πικρόδης*. vinum picatum, hoc est pice conditum. Excalfacit, concoquit, sanguinem excreantibus inimicum, ut & quod resinam recipit.

*πυλποφόρος*. vinum oppositum *πυλποφόρος*. Id autem est quod ut bene temperetur, multam aquam requirit, siue quod aquæ multum sustinere potest ad temperatam missionem. Ergo ut vina aquosa & alba paucifera sunt, ita vinosas & flauas *πυλποφόρα* erunt. Hippocrates τὸ πυλποφόρον appellauit αἰσθητὸν καὶ οἰνώδες.

*πότμος οἶνος*. idem quod *δυνάμιος*, de quo ante.

*πυλποφόρος οἶνος*. Pucinum vinum, ab oppido Pucino in quo nascitur. de quo Plinius lib. 14. capite 6. de vinis generosis sic scribit: Liuiam, inquit, augusta LXXXI annos vitæ Pucino reulit acceptos, non aquoso. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Timauro fonte, saxeo colle, maritimo afflatu paucas coquente amphoras. Nec aliud aptius medicamenti iudicatur. Hoc esse crediderim quod Græci celebrantes miris laudibus *πυλποφόρον* appellauerunt, ex Adriatico sinu. Hæc Plinius. de quo vino miror nihil scriptum à Galeno.

*πυλποφόρος*. legitur hoc nomen vini apud Dioscoridem lib. 7. cum tamen interpretes *πυλποφόρος* videantur legere.



*αἰγυνίος*. vinum Pramniū. fuit vini genus dulcis; auctore Dioscoride; quod vnis sole siccatis in arēa aut in sarmento torrefactis exprimebatur, ab Hippocrate & Homero celebratum. Dictum autem fuit vel à Pramniavite, vel quasi *αἰγυνίος*, id est perennans, vel perennans, ut grammatici docent. Premebat hoc Smyrna regio.

*αἰθρῶνος*. vinum ptoptū seu lixivium, hoc est defluens antequam calcetur vitæ. Dulcis vini genus, auctore Dioscoride; quod vnis sole siccatis in arēa, aut in sarmento torrefactis exprimebatur, quæadmodum & Creticum & Pramniū.

*αἰθρῶνος*. vinum Sabinum, aquosum, tenue album & modice adstringens. Quod ut novellum, hoc est ante sextum annum, aquosius est & imbecillius, ægriusque concoquitur, atque rāgis excrementosum est, diutissimeque in stomacho ac ventriculo innatat, fluctuationesque parit: ita posteaquam annum sextum excessit, inter nobilia vina censetur, maxime quod austerum fuerit. Itaque cum Galen. multis in locis vinum Sabinum inter imbecilla vina annumeret, & dicat in Italia febricitantibus dari solitum, de nouo, quod annum sextum nondum attingit, non autem de vetere, intelligendum est.

*αἰθρῶνος*. vinum Signinum, adstringens quidem, sed paulo austerius. Celsus libr. 4. cap. 5. quā asperrimum fuisse testatur. Sic dictum est à Signinis Italiæ populis.

*αἰθρῶνος*. Sapa. vini factitii genus, vino, ut plerique volunt, ad tertiam vsque mensuræ partem decocto. dicitur alio nomine *εἰρηνα*. Dioscorides autem libro 5. scribit esse vini dulcis genus; quod fieret musto igni decocto. vide suo loco.

*αἰθρῶνος*. vinum Scybelites. Id inter vina crassa & nigra numeratur, sed citra adstrictionem. Minus autem in ventre moratur, urinas non mouet, sed deorsum properat, ideoque ante cibum sumi solet.

*αἰθρῶνος*. vinum Surrentinum in Surrento Campaniæ oppido natum. Habitu fuit inter optima vina, mediocriter adstringens, & cæteris tum calidius tum iucundius, magisque odoratum. Crudum adhuc est, inquit Galenus libr. 1. de Antidotis, ante annum fere vigesimum: sed vigesimo tādē anno viget, potuique aptum diu perseuerat, nec facile amarescit, præstantiaque cum Falerno contendit. Dioscorides libr. 5. valde austerum esse scribit, ideoque intestinorum & stomachi fluxiones cohibere, & cum tenue sit, caput minime tentare: inueteratum autem suauius reddi & stomacho utile.

*αἰθρῶνος*. vinum acerbum. quod vehementer adstringit. frigidum est atque crassarum partium, proindeque difficulter concoquitur, obstruit, omnem vacuationem suppressit, fluxiones sistit.

*αἰθρῶνος*. vinum adstringens. sic autem dici-

tur non quod acerbum sit & valde adstringat, sed quod moderatæ adstrictionis participes est, & tantum austerum. Est enim austeritas modicaque adstrictio vini maturi, fortis & generosi nota, ut magna adstrictio crudiarque asperi.

*αἰθρῶνος*. vinum Sybates. nigrum, & crassum, longo tempore in ventre manens & fluctuationes in eo excitans, ut scribit Galenus libr. 5. de sanis. tuenda. quo tamen loco mendose scriptum esse comicio, & pro *αἰθρῶνος* legendum esse *αἰθρῶνος* puto.

*αἰθρῶνος*. vinum Tibecinum, Asiaticum: sic dictū à regione Tiba in qua provenit. Id fuit aquosæ & tenuis consistentiæ, non tamē inter vilia vina habitum, ut quod eū Sabino certaret, præsertim ubi ad senium peruenisset.

*αἰθρῶνος*. vinum Tiburtinum. vinum generosum, modice adstringens: regione Tiburti natum. quanquā alicubi Galenus ipsum inter imbecilla annumerat.

*αἰθρῶνος*. vinum Titacazenum. Asiaticum, aquosæ quidem consistentiæ & tenuis, non tamen prorsus ignobile; ut quod cum Sabino contenderet.

*αἰθρῶνος*. vinū Tmolites, in Tmolo montenascens. Asiam est, alio nomine, ut arbitror, *μεσσηνίος* dictum, habitu inter vina præstantissima & simile Falerno. Est enim tenuissimum, perlucidum, fuluum colore, dulce mediocriter, nimis quam odoratum. Fuit & aliud eiusdem nominis huic simile tum colore, tum substantia, verum neque dulce neque odoratum, præditum vi quadam adstringendi, sed dulcedine multo inferius. Galen. libr. 12. Methodi vinum Tmolites inter austera annumerat. Infirmis capiti est noxium.

*αἰθρῶνος*. vinum aquosum. Quod colore & consistentia aquæ simile est. Nam & pelucidum & splendens & purum est, & consistentia tenuē videtur, & gustanti nullam adfert qualitatem insignem, atque si ipsum aqua diluas, non multum aquæ feret: eamque ob rem etiam *αἰθρῶνος* veteres appellarunt. Est autem ut colore, ita facultate aquæ persimile, nec perspicue calefaciēs, nec caput tentans, nec nervos debilitans: Id inter vina solum medium est inter aquæ & vini maleficia, multis etiam ornatum dotibus vires corroborandi, succos humectandi, mediocriter incidendi, contemperandi omnem qualitatis excessum, mouendi urinas & sudores & persæpe alui, præcordiorum aestu ficiorem.

*αἰθρῶνος*. vinū Falernum. vinum omnium præstantissimum quæ in Italia olim nascebantur, quod tū melioris succi, tū etiam calidius reliquis esset: utpote quod & velocius illis per corpus digereretur, & crudos succos melius concoqueret, & stomachum maxime roboraret, pulsus reuocaret, alui adstringeret. Verum, auctore Dioscoride, vesicæ inimicum fuit, & visus hebetudini, &

radini, & ad potus crebros minime idoneū habebatur. capiti etiam infirmo noxium fuit, teste Galeno lib. 12. Method. Fuit autē duplex Falernorū differētia aliud enim dulce admodum fuit, quod Fanstianum dicebatur: aliud, si cum hoc conferas, austerum, si vero cum Sigaino & Marfo, dulce.

*φαιρινος*. vinum Faustianum. Falerni species, admodum dulcis.

*φυγελιτης*. vinum Phygelites. ab oppido Ephesi sic dictum, eandem quas & Chiam, vires habens.

*χιος*. vinum Chium. Molle est, vt scribit Dioscorides, & aptū potui. bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis vtile.

*αχρος*, vinum pallidum. vtique quod medio colore est inter flauum & album. quippe si flauū albo miscere liceat, quod ex ambobus confit, pallidum euadet. Aquā etiam admistum flauum eiusmodi colorem reddit. Verum pro maiore minoreue aquā modo, alias pallidum, alias *αχρὸλευκον*, id est ex pallido albicans, alias *αχρὸκαρπον*, id est, ex pallido flauum apparet. Itaque cum calidissimum, si colorem spectes, flauum sit; minime calidum, album: pallidum medias inter vtrumque vini genus vires habebit, & prout alterutri magis accedet, ita vim eius exhibebit.

Hæ quidē differentię sunt vinorum quorum apud veteres medicos, Dioscoridē maxime & Galenum, mentio facta est. Sunt autē omnia fere Græca aut Italica. Præter quas non est dubiū haberi quamplurimas à natali solo sumptas. Nam vt taceam Rhenana atque Hispana vina, Gallia nostra vinetorum feracissima, permulta educat, quæ non facile cessura sint peregrinis. Inter quæ alba omnis generis habentur, aquosa quidem Vastiniana & Parisina, fortiora autē Andegauensia, Vasconiana, Herbæsiana. Nigra autē sunt cum adstrictione quidem Burgūdiana, præsertim ad Altiſſiodorū nata, citra adstrictionē verō Vasconiana ad Burdigalā. Nam & alia habētur in Vasconia omnium nobilissima, saluo colore: vt & apud Aluernos pallidos in agro autē Aurelianensi atque Belnensi, sanguineo. Calida autem illa sunt & tenuia, iisdemque quibus olim Falernum & Cæcubū dotibus prædita. Media autē tum colore, tum consistentia, tum viribus habētur Iſanciana atque Aysiana, lautionibus cænis potissimum expenta, cum propter facile ciborum concoctionem & eorundem digestionem in corpus, tū vero maxime propter suauitatem, quodq; largiore etiam potu caput & mentem minime rentent, nec sitim inducant. Omnia autem ante annum matura sunt, nec plus biennio perdurant, exceptis albis Andegauensibus, quæ ad plures annos integris viribus conferantur.

*Οιζυρις*. sic à quibusdam dicitur *αἰζυριανη*, vt habetur apud Dioscor.

*Οιζοφάγος*. gula. Est meatus à faucibus in ventri-

culum, duabustunicis constans, per quem cibus & potus in ventriculū descendūt. Sic dictus est, quod ea ferat quæ eduntur: est enim via cibi. Habet duas proprias tunicas, quarum interna oris tunicæ continua est, & ibi crassior atque durior, vbique autem nervosa: externa vero carnosa. vtraque fibris contexta est: interna rectis, externa trasuersis, sed vtrisque quidem deglutitionē accelerantibus, & vomitum, dum illi trahunt, hi expellunt. Incumbit septem spondylis colli, & quatuor metaphreni, nonnihil in dextrum latus, à quorū interim spondylorū ligamētis ortam habet tertiam tunicam, qua ille obligatus fertur in ventriculū nonnihil in dextrum latus abscedens, vt cedat aortæ descendenti. Ad nonū deniq; spondylum ligamentis valentibus ab eo natis in altū leuatus arteriamque præteruectus, iā sinister, pruso diaphragmate cū duobus nervis insignib⁹ à sexto pati demissis vetriculo vnitur.

*Οιζοφάγος* etiam ab Hippocrate dici os vetriculi, Galenus in linguarum interpretatione explicauit.

*Οιζύρις*, *αἰζύρις*. dicitur ab Hippocrate sordes inter pilos capræ nascēs, eoquē maxime qui sunt circa sedem, vt explicat Gal. *ἐν τῇ ἐκνήσει τῷ γλωσσῷ*. Dicitur & *οἰζυρις* per syncopen.

*Οἰζυρις*. idem quod *οἰζυρις*, apud Hippocratem, vt annotauit Gal.

*Οἰζυρις*. proprie dicitur ouium sordes earum lanis adhærescens: deinde verō pro ipsa etiam lana adhuc fordida & illota dici cœpit. Sordes autē ea pecudū ex sudore feminum & alarum colligitur, adhæretq; lanis, quæ propterea quod *οἰζυρις* habent, *οἰζυρις* *ἐξ* *οἰζυρις*, & ab Hippocrate *πρόβειος* & *πρόβειος* appellantur. Est enim *πρόβειος* idem quod *πρόβειος*. Latini fordidas & succidas vocāt, quod tales sint, quales vbi primum succisē detonſæq; sunt. De cæſypo sic scripsit Ouidius:

*O Esſa quid redolet, quāvis mittatur Athenis,*

*Demptus ab immunda vellere succus omis*

Dioscorides cæſypum appellauit succidarum lanarum pinguitudinem, eiusque extrahēdi parandique rationem lib. 2. explicauit. Ex eo conficitur pharmacū à Paulo descriptum lib. 7. & ab Aetio lib. 15. quod Græci alias

*οἰζυρις* *φαρμακον*, alias *οἰζυρις* *καρποῦ*, alias *οἰζυρις* *καρποῦ* *αἰζυρις*, alias *οἰζυρις* *αἰζυρις* nuncupant; e-

iūſdem proſus cum ipſo cæſypo facultatis, adeo vt promiscuus sit amborum vsus, sicut tradidit Galenus libro. 14. meth. mēdendi.

Habet autem vim, vt scripsit Galenus non simplicem, sed mixtam ex contrariis qualitibus ac virib⁹, adstringēdi scilicet & modice calfaciendi. Ex quo constat vim illi in-

esse leniendū, digerendū & repellendū. Particulatim autem ad multa vtilis est, quæ Dioscorides lib. 2. commemorat. Dicitur non

tantum *οἰζυρις* genere masculino, sed etiam *οἰζυρις* & *οἰζυρις*.

*Οἰζυρις*. *ἡ μύλη*. *τὸ ὄν* *γόν*. *ἡ ὄν* *γόν*. vt scribit Homeri interpret. vnde *μεταφάση*, *ἐκ μύλης* *τὸ ὄν* *γόν*.

*ἡ μύλη*. hoc est, inſectere genua.

**Οἰχέσας**. est flexis genibus super furas taloque sedere, apud Hippocr. vt annotauit Erotianus.

**Οἰκίειν μὴ δύνασθαι**. hoc est nō posse, apud Hippocr. vt annotauit Erot.

**Οἰκίς**. ἐξοχὴ περὶ μήκους. hoc est, eminentia oblonga, apud Hippocr. vt explicauit Galen.

**Οἰκράσις**. cubitus siue os ipsam cubitis. Sic ab Atticis dicitur quem Hippocr. ἀγκύρα appellauit. vide ἀγκύρα. scribitur & οἰκ. τὸ οἰ, vt pater ex Hesychio duobus in locis eam vocem interpretante.

**Οἰκρὸν**. δυσὸδὸς ἢ μέλας. hoc est, male olens vel nigrum, apud Hippocr. sic dictū à sepiarum attramentō quod οἰκρὸν vocant: vt annotauit Galen, ἐν τῇ ἐξηγήσει τῆς γλωσσῆς. Dicitur idem & οἰκρὸν à οἰκός.

**Οἰκρόσμος**. altera species est iunci leuis, crassior & laxior. somnum adfert, ventris fluxus desiccatur.

**Οἰκταρεῖν**. excidere, luxari, ἐξαρθεῖν. quanquam sunt qui ea duo verba distinguunt, existimantes ἐξαρθεῖν vsurpari ad ea ossa significanda quę toto loco mota sunt: οἰκταρεῖν vero ad ea quę paululum, non autem ex toto naturali sede excefferunt. hanc tamen differentiam non obseruat Hippocrates, vt initio libri περὶ ἀρθρῶν, vbi scribit se vidisse vno modo latum scapularum os οἰκταρεῖν, id est excidere, nempe in alam. Siquidem in eo affectu totum humeri caput eo sinu mouetur in quo recipitur, cum non possit paululum excidere, sicut facile ex ipso Hippocrate intelligere est, vt annotat Gal. comment. 2. eis τὸ περὶ ἀγκύρας.

**Οἰκνήματα**. dicuntur ab Hippocrate eum ossa toto loco mouentur, οἰκνήματα vero cum paulum excidunt, vt annotat Gal. comment. 3. eis τὸ περὶ ἀγκύρας.

**Οἰκράζοντα**. οἰκταρῶντα, id est labentem, apud Hippocr. vt explicat Galen. ἐν ταῖς γλώσσαις. Sicut qui malint scribere οἰκταρῶντα sine ρ.

**Οἰκρὸν**. idem quod ἡ δραχμή. Sic enim Galenus πρὸ οὐκλῆ interpretatur quādam referēs Asclepiadis, qui Therapionis antidotū sacrā cum retulisset, sic scribit: ἡ χηρὴς περὶ μὲ τὰς βρεθύνωντας οὐκρὸν μία μετὰ ψυχρὸν ὕδατος κινῶν δ'. hoc est, vltus ad tardas concoctiones drachma vnā cum frigida aqua cyathis quatuor. Postea Galenus ait, κελεύει δὲ δοῦναι μίαν ἀλλεῖν μὲ ὕδατος ψυχρὸν κινῶν δ'. ἡ γούμαι τὴ λήγειν αὐτὴν δραχμὴν ἀργυρεῖν. καὶ τὸ οὗτω ἔχον ἀπασι τὰς νεανίας τοὺς ἰατροὺς ἔδος ὑπομαίνει. hoc est, iuber dare drachmam vnā cum frigida aqua cyathis quatuor. arbitror autem ipsum dicere drachmam argenteam. Etenim sic prope omnibus iunioribus medicis mos est nominare. Significat autem proprie οὐκρὸν idē quod πῶρον, id est pondus, vt apud Dioscoridem capite de iride: κατὰ μίρον τὴ χολὰς ποτίζμεναι μὲ ὕδατος οὐκρὸν δραχμὴν ζ'. hoc est, bilem ex hydromelite, pondere drachmarum septem epota, purgant.

**Οἰκρὸν**. glutinosum, lētum atque molle, quod, dum extēditur, trahi, non etiā rumpi possit.

**Οἰκός**. herba siccis nascens locis, aristas habens in cacumine tennes, culmo quale hordeum resibile. Multi zeam esse contendunt, alii syluestrem auenam. Vide Plinium. Dioscorides author est etiam sic vocari araneū, & ab aliis quibusdam λίκον, hoc est lupum dici.

**Οἰκός**. sic vocatur ab aliquibus ὁ γόναξ, hoc est, ea tota pars corporis quā à collo ad crura vsque pertendit.

**Οἰκρόρον**. dicitur à quibusdam ἡ χαμαίπτερος, vt habetur apud Diosc.

**Οἰκρὸν**. herba quādam agrestis oleracea apud Hippocratem, vt explicat Galen. ἐν ταῖς γλώσσαις.

**Οἰκρὸν**. sepiarum attramentum dicit Hippocr. vt explicat Galenus ἐν ταῖς γλώσσαις. Idem & οἰκός vocatur.

**Οἰκρὸν**. herba est pusilla, digitis tribus aut quatuor supereminens extra terram, foliis ramisque coronopodis aut graminis, astringēs gustu, radice admodum tenui, vsque ad capillamenti speciem, candida, longitudine semipedis. nascitur in collibus. Sine duritie est, ideoque putatur per antistrophe dicta. nam nihil habet in se nō mollissimum. Desiccatur cum adstrictione.

**Οἰκρόσμος**. tertium genus est iūci palustris, vtroque asperius & callosius. semine simili.

**Οἰκρὸν**. πύλας. φλύκταινα. hoc est pustula, apud Hippocr. vt explicauit Galenus ἐν ταῖς γλώσσαις. quo tamen nomine alii περικνίδα, alii δισκίνας, alii ἐξαιθήματα τῶν φόνος ὁμοία, bestiolis paruis similia, intellexerunt, vt annotat Erot.

**Οἰκρὸν**. dicitur à nonnullis τὸ ἀείζων, siue sedum maius, ab aureo seminis colore.

**Οἰκρὸν**. siue

**Οἰκρὸν**. est collyrium magna simplicium medicamentorum turba constans, vt describit Paulus lib. 7. cap. 16. cui egregiam vim tribuit in procidentis oculorum & omnibus viceribus, lib. 3. cap. 22. agens περὶ τῶν πύλων.

**Οἰκρὸν**. collyrium Olympionici, diuersum omnino à præcedēte, suffusiones & maximos dolores leuans, cuius compositio habetur apud Aetium libr. 7. à quo recensetur inter τὰ πύλα collyria.

**Οἰκρὸν**. Latine grossi vel glosuli dicuntur. sunt autem fici quę non māturescunt, priuatim tamen in biferā fico eas intelligunt, quę per messes māturantur. dicuntur autem etiam alio nomine ἐξαιθίς.

**Οἰκρὸν**. Latinis, Plinio auctore, siligo dicitur. eumque sequuti sunt Hermolaus, Manardus & Ruellius. quorum tamen opinionem probare nō potest Matthiolus, tradēs speciatim de siligine & olyra tanquam de rebus inuicem discrepantibus Plinium multis locis scripsisse. Authore autem Hesychio species est seminis mediæ inter frumentum & hordeum naturæ. Addit, quosdam eandem esse velle cum τὴ ζῆα siue ζῆα. cum quibus Galenus facit, ζῆα apud Hippocr. expōnens

nens *ὀλίγη*. Similiter & Dioscorides. Plinius vero diuersam à zea facit, & arincā Latine appellari dicit.

*ὀλιδης*. turbidus vel niger apud Hippocratē. vt annotauit Galēnus ὅτι quod sepius arramētum significat. Pro eodem *τολιδης* dicitur, itemque *τολιδόν* pro *ὀλιδόν*.

*ὀμαλὸς σφυγμός*. æqualis pulsus. Est qui perpetuo sibi constat, siue in quō omnes vel aliqua pulsuum differentia pares manent. Si omnes pares manent, simpliciter & absolute æqualis dicitur: si in aliqua tantum, secundum quid æqualis est, scilicet secundum eam differentiam quam parem & perpetuo eandem retinet: itaque non simpliciter æqualis est, sed potius æqualiter inæqualis: suntque eius differentia ad inæqualitatem potius quam ad æqualitatem referendæ. Dum enim æqualem pulsuum apud medicos legimus, eum qui absolute & simpliciter talis est, intelligere oportet. Huic contrarius est *ἀνὸμος*, hoc est inæqualis: inter quæ medius pulsus nullus est, sicut in aliis pulsuum differentiis.

*ὀμαλὸς ὀμάλως*, apud Hippocratē, vt interpretatur Erot.

*ὀμιλία*. est osium inter se coherencia, quomodo cumque ea fiat. dicitur aliis nominibus *συνῆσις καὶ συνάφης*, de quibus vidē suo loco. Annotauit autem Erotianus *ὀμιλίαν* apud Hippocratē tria significare. aliquādo quidem *πῶς ἴσθ' αἰσθάνων αἰσθησώμεν*, ὡς πὲρ ὁμοῦ εἰλέει: hoc est conuersationem hominum, quia simul versantur: aliquando vero *ὡς ἔστι καὶ γεινῆσιον*, vt libro de articulis, his verbis: *ὀμιλεῖ ἵβραχίον τῇ κοτύλῃ & ὁμοπλάτης*: hoc est, vicinum vero brachium est humeri cavitati. alias vero *περίω*, vt libro de aere, locis, & aquis: *πῶς τέλει τὸ πέντε οὐ μόνον λόγῳ αἰσθάνῃ, ἀλλὰ καὶ ὀμιλίᾳ*. hoc est, artem autem istam, non tantum ratione, sed experientia etiam exercere oportet.

*ὀμορῆς πυρετός*. dicitur à Galeno febris quæ alio nomine *συνεχής*. appellatur. dicuntur etiam *ὁμορῆς* partes quas *ὁμοιομερῆς* vocant.

*ὀμοιομερῆς*. partes similes. sic dicuntur partes quæ in similes diuiduntur particulas, id est, omnes earum partes tum sibi mutuo, tum toti similes habentur. quæ & simplices etiam & primæ & incompressæ nonnumquam appellantur. quod ex illis constitutæ sint particula quæ organica, id est, instrumentales siue officiales, vocantur. Sunt autem hæc, os, caro, vena, arteria, neruus, ligamentum, tendo, membrana, caro, adeps, vnguis, cutis. his adduntur humores, vt sanguis: & qui in oculo sunt, crystallinus & vitreus humor. Appellantur ab aliis *ὁμορῆς*, itemque *συνῆσις* & *αἰσθάνῃ συνῆσις*, atque *συνῆσις* & *συνῆσις* *μορῆς* *περικύτῃ*: velut primo de facultatibus naturalibus Galenus declarat.

*ὀμοιογενῆ φάρμακα*. dicuntur ab Hippocrate lib. 2. *ὅτι διείκῃς ὁξέων*, medicamenta iisdem facultatibus viribusque secum conuenientia, nullaque in re ab inuicem discrepan-

tia: vt Galenus annotauit comment. 2.

*ὀμόνοια*. sic dicitur à quibusdam *ὁμοχρῆμα*, vt habetur apud Dioscor.

*ὀμόπνος πυρετός*. febris est sibi æqualis ac similis à principio ad finem vsque perseverans. Nam quasi semper in eodem vigore consistit, neque crescens neque decrescens. unde & *ἀμαστικὸν πυρετός* alio nomine medici appellantur. Galenus cap. 2. lib. 2. de differentiis febrium facit eam speciem *πὲρ συνόχου*, sed putris quidem & eius quæ ex sanguine putrente euadit biliosa, & cuius humor in vena caua putrescit. Idem vero lib. 9. methodi medendi *πὲρ ὁμόπνου*, vt & *ἐπαμαστικὸν & ὡσχεμαστικὸν*; speciem statuit *τοῦ συνόχου* non putris, quam inter diarias febres recenset. vt eodem autore *ὁμόπνος* dici possit quæ cumque febris eundem tenorem perpetuo seruauerit.

*ὀμότυλα*. quæ cognationem & similitudinem substantiæ inter se habet, apud Hippocratē lib. de nat. hum.

*ὀμοχρῆμα*. corporis vel coloris æqualitas & similitudo. vsurpatur ab Hippocrate initio libri de vulneribus capitū, vbi videtur potius læuitatem & æqualitatem corporis significare quam similitudinem coloris. Legitur & apud eundem in libr. de fracturis eadem significatione, vbi eos reprehendit qui brachium primum alligabant, quod brachio ita figuratō partes æqualitatem seruaret, quam ibi *ὁμοχρῆμα* nominat, *ἀπὸ τῆ χροῦς* quod reliquis calibus *χροῦς* *χροῖ* *χροῖα* declinatur. Significauit autem *χρῶμα* non modo colorem, sed etiam corporis colorati superficiem apud veteres, in qua color tanquam in subiecto est.

*ὀμφάκων ἑλαιόν*. acerbum oleum, hoc est ex oliuis acerbis expressum. Tales autem omnino crudæ sunt, ideoque *ὀμοτελεῖς*, hoc est crudum, etiam vocatur. Dicuntur autem *ὀμφάκων* non vix modo, sed feliqui etiam fructus qui nondum ad maturitatem peruenere.

*ὀμφάκων*. succus vix acerbæ, quæ *ὀμφάκων* Graeci vocant. Is parentis suæ naturam retinet, quæ cum sit acida, & acerbæ, succum quoque acidum atque acerbum signat: necesse est, sed qui tamen ab aceto plurimum differat. Siquidem nec calorem habet, nec proinde acrimoniam. crassarum partium est, nihilque omnino in se habet alienæ caliditatis, eamque ob causam imbecillius multo quam acetum, cui omnia insunt prædictis contraria, refrigerat: acerbum autem præterea est, quod maturitatem & dulcedinem vix ipsa non assequatur. Sunt tamen inter eas quæ plus minusue tum acerbæ tum acidæ existant. Itaque cum ad eorum qualitatem utramque refrigeratio consequatur (non enim acida modo, verum etiam acerbæ frigida sunt) necesse est omphacio refrigerandi facultatem inesse. Siccat vero præterea & adstringit. Sed notandum est duplicem esse omphacii differentiam. Vnum li-

quidum est, obsonium magis quam medicamentum, paulo ante vindemiarum tempus ex vva agresti quidē, sed suā tamen maturitatē adepta paratum, quod sale exiguo conditum in vinaria cella reponitur, annoque durat. Id vires alias non habet quam quā supra proposita sunt. Alterum vero est densum, siccum, concretum; ad medicamenta magis quam ad ciborum condituram præparatum, ex succo, ut Dioscoridi placet, vva acerbæ immaturæ & nondum nigrescentis. exprimebatur huius melligo ante Canis ortum, & insolabatur Cyprio in ære, quod linteolo adopertum esset, donec penitus concreveret, decutiendo assidue in subiectum liquorem, quicquid in ambitu lateribus cohasisset. Verum alii coquendo eum succum densabant, & in ære Cyprio sernabant. Tale autem omphacium optimum habebatur colore fuluo, friabile, spissans abunde mordensque linguam. Id præter supradictas facultates, ab ære alias consequitur, & insigniter comburit: proptereaque frangere eius vehementiam plurima aqua oportet, & in usu præberi exiguum. Quod quantum à nostrate omphacio differat, nemo est qui non videt.

*Ομφαλῖς.* est cauum ex quo glās quercina enascitur qua vruntur coriarii, ut scribit Paulus lib. 3. cap. 42.

*Ομφαλίτης.* species est gallæ, parvæ, tuberosæ, solidæ, nullo foramine peruiæ. Refrigerat, adstringit, siccatur.

*Ομφαλίμεν.* potionis conditæ genus ex vva acerbæ succo & melle. Parandi ratio antiquis hæc fuit: Vva acerbæ per quatuor aut quinque dies in aere primum resiccatæ exprimuntur, & in tres succi sextarios vnus mellis adiicitur ante despumati. Sic mista diebus qua draginta insolatur, vel donec humor superfluus absumptus sit atque concoctus. Is est syrupus de agresta pharmacopolis dictus. Commendatur plurimum ab Oribasio Collect. lib. 5. cap. 21. ex Philagrion.

*Ομφαλόκαρπος.* dicitur ἡ ἀπειρία, auctore Dioscoride, quod semen eius umbilico simile videatur.

*Ομφαλὸς.* umbilicus. Est pars organica duabus venis totidemque arteriis concurrentibus efformata, in medio οὐτέχον habens. Venæ enim & arteriæ ex spermaticis derivatæ & in vteri fundum lateraque insertæ, suisque orificiis in cavitare vteri adpertsæ & in eam menstruum sanguinem effundentes, postquam semen in vtero conceptum est, extimam foetus tunicam, χορίον dictam, qua parte attingunt, excavant, & perflando, fistulæ in modum efformant, tandemque vasorum ora tot sunt in chorio quot fuerunt in vtero, itaque sibi inuicem respondent, ut venæ venis, arteriæ arteriis copulentur. Porro vasa hæc ab his velut radicibus in alia maiora, atque ab his in alia etiam his maiora contrahuntur, donec omnia in duos velut truncos, in venas venæ, in arterias arteriæ

terminentur, ex vtraque parte tam dextra quam sinistra circa umbilicum foetum ingredientibus. Neque enim aliud est umbilicus nisi hæc quatuor vasa, in medio οὐτέχον habentia. Cæterum venæ umbilici truncus in sinistram partem hepatis, prope portæ initium inferitur & distribuitur ad foetus nutritionem: sanguinem enim defert quo foetus alatur. Arteriæ autem duæ per foetus umbilicum receptæ & secundum vesicæ fundum inuectæ in ilium arterias inferuntur, in id viles in quod alia arteriæ. Verum quem vsum umbilicus foetui in vtero præbet, eundem nato infante amittit, & siccatus ligamenti naturam & vsum acquirit. Eum Aristot. libro secundo de generat. animal. κέλυφος δερματικόν, hoc est putamen cuticulare, appellauit. Dicitur & περὶ τριμῆς, ὅτι τὸ περὶ τὴν περιώδην ἐν τῇ βρέφεισι: primum enim secari in infantibus solet. Cæterum summa & media eius pars ἀκρομήριον & μεσομήριον nominantur: χαῖα autem siue χαῖν, pellis umbilicum ambiens, quod ea corrugata senectutis indicium sit; γαγγαμὼν vero, locus dicitur ad umbilicum circumiectus. sagenā vocant, quod illic in modum sagenæ aut retis nerui implentur.

*Ὀνάρχα ἢ Ὀνιχαρον.* frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice rotunda, longa, cum siccata est, vinum olente. Nascitur in montibus: aqua in qua radix maduerit, in potu data feras mitigat, & cicures facit: illitu quoque tetra vlcera mulcet. A quibusdam οἰνοθήκη ὄνιχα dicitur. huius radix arefacta vinosum quiddam redolet, sed & vini maxime facultatis est.

*Ὀνέουσα.* significat apud Hippocratem per axem extendere, quem ille ζυγὸν καὶ ὀνίσκον solet appellare. Sunt qui κατ' ὀνέουσαν scribant.

*Ὀνίτις.* species origani, candidiore tantum folio, hyssopoque consimiliore, fructu confertis corymbis cōpacto. sic dicta creditur quod ab asinis imperatur. Nam & Nicander in Theriacis ὀνοπέταλον origanum cognominauit, id est asini folium, quod ipsis grato cibo cederet.

*Ὀνέλων.* species bliti, linguæ similis, quæ Hippocrati contra foeminarum profluvia in vellere apponitur.

*Ὀνέρυγες.* planta lentis folio, longiore paulo, caule semipedem alto, flore rubenti, radicibus exiguis. Nascitur in cultis & aquosis locis. Rarefaciendi & digerendi vim habet.

*Ὀνέριον.* sic dicitur à quibusdam ὁ δὲ ἵακος, ut habetur apud Dioscoridem.

*Ὀνίσκος ἢ*

*Ὀνυ.* aselli millepedæ. Animalia sunt quæ sub hydriis & aquariis vasis, omnibusque locis humidioribus, velut cellariis & lignis humidioribus humoreque obsitis atque etiam sterquiliniis proueniunt, & ad contactum sese coglomerant. Multos pedes habent, quare πολύποδες etiam à Græcis dicta sunt.

Dioscorides



Dioscorides etiam *καλαϊδα* appellat. Galenus *καλαϊς*, hoc est, fabas, ab Asianis vocari prodidit. Hæc ex vino pota difficili vrinæ & regio morbo auxiliantr, cum melle anginis utiliter illinuntur, trita & in cortice mali punici calfacta, doloribus aurium adiecto rosaceo conuenienter instillantur.

*Ούνη*, sic dicitur à quibusdam *ὀύνη*, vt habetur apud Dioscor.

*Ούς*, axis apud Hippoc. cuius diminutivum *ούσος*, paruum axem significat.

*Ούχια*, herba quæ folia gerit anchusæ oblonga, mollia, fere quatuor digitos procera, duos lata in terramq; iacentia, anchusæ proxima, sine caule, sine flore, sine semine. Subiecta est radix pusilla, quadamtenus longa, infirma, tenuis, modice rubescens. Nascitur in asperis locis.

*Ούρις*, planta fruticosa quæ Theophrasto *οὐρίης* dicitur, de qua ante dictum est.

*Ούχια*, *ή*

*Ούχια*, est secunda species anchusæ, quæ alio nomine *αὐχισιάδης* dicitur, vide *αὐχισίον*.

*Ούγξ*, vnguis, proprie dicitur pars digitorum extrema, lata, duraque quæ ipsi firmantr. Sunt autem qui vngues partis nomīne non dignentur, vt nec pilos, quod nulla sit eorum propria actio, vt qui facultate omni carere dicantur, à qua omnis actio primario proficiscitur. Nullam enim, inquit Galenus, gubernationem habent, sed ortum tantummodo. Vsum tamen aliquem atque vtilitatem afferunt, quod iis extremi digiti firmiores sint, & melius apprehendant. Est autem eorum generatio eiusmodi. Digitorum nervi, ligamenta, tendines, arteriæ, venæ, & si quid in illis præterea solidi inest, ex suo nutrimento excrementum etiam crassius, & magis terrenum relinquunt: id quia in ærem digerere non potest, vi expultrice propellitur in vnguini sedes, vbi magis resiccatur, magnam duritiem & soliditatem comparat. Quod autem vnguini materia excrementum sit, nec, vt aliqui crediderunt, tendines vel etiam nervi per totos digitos dispersi, tandem in vnum coeuntes, vnguini substantiam constituat, patet ex eo maxime, quod vngues non sentiant, quos tamen necessario sentire oporteret, si ex ipsa tendinum neuorumque substantia constarent. Sic autem excrementis orti vngues ad eundem modum quo & pili crescunt, alio atque alio subinde excremento ad vnguini radices expulso, & imæ eorum parti adherente, eamque, vt clavius clauum trudit, pellente. Sunt autem duri, quod ex solidis corporibus solida quoque duraque excrementa prodeant.

*Ούγξ*, per metaphoram & similitudinem dicitur certus oculi morbus, quem author definit med. definit esse Collectionem puris in nigro oculi cum phlegmone, secundum iridem, vngui affinem: scribitque alio nomine *ουόνιον* nuncupari. Paulus lib. 3. cap. 2. 2. scripto professus est aliquando cor-

neam tunicam purulentam fieri nunc alius nunc in superficie, pure resecti vnguis figuram imitante, eaque de causa hoc quoque malum vnguē nominari. Aetius libr. 7. paulo accuratius definiuit, scribens *ὀύνη* siue *ὀύνης* dici cum ab vlcere profundiore pus defluens, & inter tunicas illapsum, & in circulo iridis figuratum, vnguis resecti imaginem refert: statuenque discrimen inter *ὀύνη* & *καύνη*, quod Paulus non annotauit. Ille namque auctore *καύνης* dicitur cum pure ampliore collecto & dimidium nigri occupante, aut per totam corneam tunicam relucēte, suppūratio oculi apparet. Sed quicquid ab Aetio scriptum sit, in sola vnguis similitudine differentia posita est, quæ ex *ὀύνη* perspicua est, sed ex *καύνη* nulla. Fiunt hæc aliquando, vt ipse ait, etiam citra exulcerationem, dolore capitis aut lipitudine prægressa. Contingunt etiam inflammatione præcedente disruptis humorum copia vas, & sanguine qui profusus sit suppūrato.

*Ούγξ*, etiam à quibusdam dicitur *ὀύγξ*, frutex paruus auctore Dioscoride.

*Ούγξ*, vnguis odoratus. Est testa, vt scribit Paulus, conchylii Indici, hardum redolens, quod eius fruticem in India pascatur. Legitur e lacunis exhausto solibus humore. Pro purpura quidam vsurpant.

*Ούγξ*, lapis qui & *ὀύγξ* dicitur, quod illi candor sit vnguis humani.

*Εἰς ὀύνη καὶ ὀύνη*, fracturæ ossis differentia est, vide *καὶ ὀύνη*.

*Ούγξ*, species est *καὶ ὀύνης*, quæ in fornacibus sit, sic dicta à similitudine venarum onychis lapidis, quam ob diuersos colores refert. Nā fracta intus cinereas & candidas venas similiter habet, cum in superficie plerumque sit coerulea.

*Ούγξ*, herba quæ & *αὐγξ* dicitur Dioscoridi ab herbariis resta bouis.

*Ούγξ*, rumex acetosus, folia habet syluestriæ æ exigui rumici similia, caulem nō magnū, semen subactum, rubens & acris, in caule & agnatis appendicibus emicans. Alii *αὐγξ* vocant, alii *αὐγξ* vocant, vt scribit Dioscor.

*Ούγξ*, acida muria, non quidem quæ vitio aliquo acorem contraxit, sed cui mistum est acetum. Eam Plinius aliquando videtur acetum salsum dixisse.

*Ούγξ*, conditura genus aceto & oleo simul temperatis.

*Ούγξ*, eadem quæ & *αὐγξ*.

*Ούγξ*, acetum. Est vinum putredine frigidius, acrius tenuiusque effectum. Quæ enim vina imbecilliora sunt & frigidiora, ea prompre refrigerantur, & natiuo vini calore destituta, putrescunt, atque in pristinam naturam resoluuntur, hoc est, in eum acidum humorem redeunt, ex quo primum prouenerant. Itaque vinum quia corruptum est, natiuum quoque calorem amittit, & frigidum euadit. Atque hac ratione moti plerique, acetum simpliciter frigidum esse pro-

nunciarunt, nec caloris vilius particeps esse, siquidem vt à frigiditate omnia acescunt, sic omnia acida frigida esse constar: verum alii, quia vinum quod in acetum degenerat, putrescit, vt suo quidem calore destituitur, sic alium ex putredine calorem accedere opinantur, quo acetum calidum dici potest. Quorum etiam opinioni subscribit Aristoteles, dicens acetum proprio quidem vini calorem esse frigidum, adscitio autem calidum: videtur enim acetum & caloris & frigoris esse particeps, huius quidem interni, illius vero aduentitii & ex putredine geniti, ita tamen vt frigiditas in eo tanto exuperet caliditatem, quanto hæc illam in melle antecellit. In qua etiam sententia post longas disputationes stetit Gal. lib. 4. de simpl. medic. facult. primum tamen dubitans & perplexus si quam machinam aut rationem inuenire posset, qua sicut in lacte, ita in aceto contrarias partes separaret. Id enim tantum obstare scripsit lib. 1. quo minus eorum sententiam laudet qui acetum vinum esse mortuum dixerunt, & pro eorum opinione pericula omnia subeat, qui in aceti generatione propriam vini caliditatem perisse, atque aliam ex putredine natam esse asseuerant. Verum eam postea ipse sibi sustulit dubitationem, dicens & vinum & acetum non simplicia esse corpora, sed partibus contrariæ facultatis constare: habet enim vinum in se recrementum crassarum partium, ex quo fæx consistit. habet & aliud quod florem nuncupant, quod dum vinum feruet, supernatat, sed postea ad fæces subsidit: tertium aqueum, quod toti vino permixtum est, ex quo primario potissimumque feruet: & quartum præter hæc ipsum reuera vinum. Cæterum dum vinum transit in acetum, vinosa vini partes refrigerantur: aqueum autem illud recrementum putrescens, adscitium calorem conquirat, velut cætera omnia quæ putrescunt, fitque acetum quiddam ex contrariæ facultatis partibus compositum partim refrigerantibus, partim calidis velut etiam omnes vstorum lignorum cineres. Quamuis quatuor illæ quas in vino esse diximus partes, non tam manifeste in aceto appareant: esse tamen in eo quod illis proportionem respondeat, verisimile est, quod acetum vini partium alteratione potius quàm corruptione generetur. Sed & à putrido illo calore igneam quandam acrimoniam acetum acquirit quæ sensum mordet, rodit & exasperat, & intro subiens dolorem parit. Ab ea autem quiddam acetum calidum esse, non quidem per se, sed per accidens pronunciantur. Quod enim dolorem moueat, fluxionem concitare dicunt, non crassi quidem & frigidi cuiusdam humoris (siquidem acetum adstringendi vi præditum huiusmodi humorem repellit, eique viam præcludit) sed biliosi & tenuis, qui in partem aceti acrimonia demorsam perueniens, caloris in ea sensum inuehat. Est & ab eodem calore val-

de tenuium partium, in intimas corporis partes penetrabile, incidens attenuansque quæcunque viscosa & crassa in alto corpore constiterint. Ac quamuis specie humidum videatur, strenue tamen ordine tertio desiccatur: habet vero & vim adstringendi repellendi; maximam, vt non modo sanguinis profusio, sed aluum etiam sistat & phlegmonas incipientes reprimat, non aliam quidem ob causam quam quod valde refrigeret.

*Oξος καὶ ἀσπιλον* acetum purgatorium: varie fieri potest pro ratione humoris qui vacuari debet. In aceri sextarios quinque iniicitur scammonia uncia vna trita, & finitur ad dies quinque. Quod si lathyridum unciam vnā pro scammonia maceraueris, pituitam expurgabit: si vero parem epithymi portionē, atram bilem. Dandum est autem cuiusque cochlearium vnum vel duo ad intinctus vna cum cibo.

*Oξύ* acidum. Id dicitur quod absque caliditate linguam mordet, vt diffinit Aetius. vide in dictione *ἰξίμης*.

*Oξύλα* dicitur alterum fagi genus. Scissimam Latini vocant, quod in tenuissimas secetur laminas. Est arbor abietis aspectu, erecta, lævis, enodis, proceritate crassitudineque illi fere æqualis: folio crasso, bifido aculeato: fructus in ea pender glâde in calyce echinata, placida tamen nec hispida, vt castanea, nihilominus illi similis dulcedine atque succo. Eius folia adstringendi vim habent.

*Oξύρακτις* acuta spina. Arbor est pyrastro similis, spinosa valde & minor, baccas profert myrti plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, alte descendentem. Viribus quoque pyrosylvestri æqualis est, habet & subtile quiddam coniunctum: fructus ipsius myrti baccis responder. Officina Berberis, ruta Spiniuinetum appellant: quibus tamen aduersatur Marthiolus.

*Oξύρακτις* dicitur à quibusdam *ἰκνωτοῖς*, vt habetur apud Dioscor.

*Oξύλας*, siue

*Oξύλας* acetabulum. Est tum liquoris tum aridi mensura quæ apud Romanos sesquicyathum continebat. Græci atque ad eorum imitationem Romanis ex aceto nominatur vas primo dictum in quod acetum infunderetur, deinde ad mensuram translaturum est. Hermolaus Barbarus in castigationibus Plinianis ab accipiendi dictum putat: quem qui sequuntur acceptabulum scribunt. Eadem autem mensura etiam apud Atticos fuit tam liquidorum quam aridorum sesquicyathum & ipsa capiens, siue uncias duas & drachmas duas mensurales, quæ ad drachmas quindecim ponderales reducuntur. ideoque *ποτὶς πῶρον* à medicis aliquando dicitur. Eius nota apud Græcos fuit ξ.

*Oξύλας* lac acidum. Fit certa quadam lactis præparatione, per quam sola caseosa substantia relinquatur, eaq; ipsa non eiusdem o-

minino naturæ cuius ab initio fuit, verum multo frigidior, vt ægerrime, nec nisi à ventriculo valde calido concoquatur. Neque enim calidam & acrem feri qualitatem retinet, neque pinguem & calidam butyri, sed sola crassiore substantia constat, quæ in cascum abít *ὄζυρα* πικρὸν appellatum. Id genus hodie Galli videntur iunceam appellare. Est autem vehementer frigidum, crassum & concoctum difficile.

*ὄζυρον*, garum acetosum, hoc est garum acetomistum. vide γάρον. *ὄζυρον κατάρπικον* describitur ab Aetio lib. 3. cap. 86.

*ὄζυρον*, nomen hoc non vere Græcum est, sed ex Latino corruptum: significat autem axungiam, hoc est, adipem suillum, nec eum quidem omnem, sed proprie qui vngendis rotarum axibus inseruiert. Illi enim tum ex rotarum circumactis, tum ex earundem ferrugine noua quædam qualitas accessit, ob quæ & phlegmonis imponitur & sedis vitii opitulatur plus quam recens & syncerus adeps.

*ὄζυρλικές* η̄

*ὄζυρλική*, est potus qui paratur dulcissimis fauis maceratis atque decoctis. Fauis à quibus mel omne expressum fuerit, in ollam conii-ciuntur in qua pura aqua sit, tum inferunt; donec faui omnem prorsus humorem in aqua posuisse videantur. Is humor reponitur seruaturq; & æstiuo tempore bibitur ad sitim tollendam, frigida aqua dilutis. Anthor Galenus comment. 2. εἰς τὸ πρὸς ἀγμῶν. Idem autem commen. 3. scribit *ὄζυρλικές* non aliud esse quam *ἀγμῶν*, fierique ab aliis ex melle & aceto, ab aliis autem ex fauis & aceto. Est igitur *ἀγμῶν* acidum. Incidendi & refrigerandi vim habet. vide *ἀγμῶν*.

*ὄζυρλική* η̄

*ὄζυρλικὰ φάρμακα*, vocantur medicameta quæ oculos, nullo quidem sensibili affectu laborantes, malè tamen munere suo fungentes corrigunt, & in integrum restitunt. Eiusmodi aliquot collyria referuntur à Galeno lib. 4. τῶν κατὰ τὸν οὐρανόν.

*ὄζυρλικός*, iracundus, ira impotens, qui leuissimà de causâ irascitur, vel qui natura ad iram proclius est. Opponitur, inquit Galenus, comment. 2. lib. 1. Epid. τῶν θυμώδεων, hoc est, animoso, qui non nisi magnâ & iustâ de causâ irascitur. Sic ira & iracundia apud Latinos differre dicuntur. Ira enim, inquit Donatus, de causâ est: iracundia de vitio multum irascentis, siue de moribus. *θυμώδης*, inquit Galenus, magnanimus est & rerum humilium contemptor: *ὄζυρλικός* autem, pusillanimis nec generoso virilique animo præditus, vt qui sit frigidior temperamento & *δυσήγητος*. Eam namque ob causam si vel leuissime offendarur, iram ferre & coquere non potest, sed statim excandescit, nec potens est iræ & animo suo moderari, sed mulierum more minimis etiam perturbationibus succumbit & protinus ardet iracundia.

*ὄζυρλικός*, species cedri, magis acuto folio, duro, spinoso.

*ὄζυρα* πικρὰ, posca, vel posca est acetum aqua mistum. Miscendi autem ratio nunquam certa fuit. Variè namque temperari potest. Sed, vt Aetius est author, si simplici ratione construat, refrigerat & humectat: sin condia-tur, & calorem & siccitatem adsciscit. Inter veteres, vt idem inquit, omnes fere conueniunt, noxium parere succum, nervis officere, flatuosos spiritus creare, capitis dolores concitare, contra sacrum morbum prodesse, vini crapulam mitigare, sanguinis acrimoniam lenire. Consuluntque ea potione abstinentium, quod facile putrilagine concipiat qui ex eo contrahitur humor, item propter noxam quam nervis infert. Græcorum iuniores imitatione Latinorum etiam *πρὸς σιν* id genus potione appellant.

*ὄζυρα* πικρὰ, genus rumicis quod in acutum tendit, prædura habens labra, in palustribus nascens. Caulis ei ramosus; prægrandis, folia betæ, vliginosa; & in acutum tendentia, ex quibus nomen sortitum est. vulgus pærellâ, officinæ grandem oxillam vocant. Vtramque naturam, tum discutiendi, tum repellendi habet. Herba ipsa aluum subducit, semen vero ita adstringit, vt dysentericæ & alui profusio medeatur.

*ὄζυρλικός* ἀγμῶν, acidus panis, cui scilicet exiguum aceti affusum est. Ventrem sistit, idque magis quo plus habet aceti. Hunc Galenus lib. 8. meth. med. & post eum Aetius lib. 5. exhibet febre diaria laborantibus quibus aluus profuit.

*ὄζυρλική*, acetum mulsam, vel mulsam acetosum, vt alii loquuntur. Potio est ex aceto & melle condita vetustissima certe, vt quæ etiam ante Hippocratis seculum in sanitatis usum venerit. Huius duæ sunt summæ differentię: alia simplex est, alia composita. Nec vero etiam simplicis ratio vna est: quidam enim ita præparant: Melli optimo super carbones despumato additur aceti tantum vnde gustanti nec acidum nimis, nec dulce videatur: ac denuo super prunas coquitur, quoad planè vnita amborum qualitates sint; nec appareat gustanti acetum adhuc crudum: hinc ab igni deponitur, cumq; eo vtendum est, aqua mista ita temperatur vt vinum, nimirum exsumentis gustu. Id enim vt iucundissimum est, ita etiam vtile: & contra vt iniucundum, ita aduersissimum. Alii vero tum mellis, tum aceti modum definiunt, vini aceti parti mellis, à quo detracta spuma sit, duplum miscentes, deinde ambo leni igni coquētes, donec eorum qualitates in vnum coierint. Alii autem cum aqua statim ipsum faciunt, melli quadruplum optimæ aquæ miscentes, deinde coquētes modico igni, quoad spumare definat: post vero dimidio aceti adiecto rursus coquētes, donec qualitarum omnino sit vnitas, nec acetum crudum etiam appareat. Conficitur etiam tribus statim ab initio mistis, ad hunc modum: Aceti vni parti additur mellis duplum & aquæ quadruplum, atque hæc ad tertiam vel

quartam partem coquantur, spuma interim detracta: aut si valentius id facere studes, tantundem iniicies aceti quantum mellis. Hæ quidem sunt rationes parandi simplicis oxymelitis, à Galeno prodita lib. 4. sanitar. tuend. Quibus tamen Galenus alias addit in consilio pueri epileptici, scribens id oxymeli acidissimum censeri, quod ad mellis proportionem quartam aceti habet partem, dulcissimum quod octauam aliaque multas esse intermedias differentias pro mistionis modo. Præterea vero in plurisque Græciæ locis oxymeli etiam ex fanis confici solere. Cæterum oxymeli omne extergit viscosos humores, & crassos attenuat. quapropter viscerum omnium obstructions dissoluit siue in febribus, siue citra febre detur. Verum aquæ multæ mitione vires eius exoluntur. Tussim autem mouere quæ non est, & intestina raderè oxymeli, Hippocrates & Galenus scribere, non in corporibus quidem crassis & glutinoso humore redundantibus, sed puris ab incrementis, aut iis quæ tenui & acuti fluxione vexantur, quæque nervosas partes valde sensu exquisitissimo præditas habent. Hæc quidem fuit oxymelitis simplex mistura, aceto, melle & aqua constans. quibus si quid præterea accedat, id iam compositum dici debet, quale est quod à Plinio lib. 14. cap. 17. & 23. cap. 2. describitur è mellis decem minis, aceti veteris hëminis quinque, salis marini pondo, thymbræ quadrante, aquæ pluuiæ sextariis quinque pariter coctis, sufferuë factis decies atq; ita diffusis & inueteratis. Alii vero alia miscuerunt ad varios vsus, inter quæ nobile habetur τὸ Ἰουιανόν, memoratum à Galeno lib. 2. τὸ Ἰουιανόν, & à Paulo Aegineta descriptum lib. 7. capite 5. item οὐκιστὸν & αὐκιστὸν ab eodem Paulo descriptum lib. 7. capite 11. & præterea κατὰ πλὺνόν, cuius varii modi habentur apud Aetium lib. 3. capite 76. 77. 78. 79.

Οὐκιστὸν. syluestris myrtus. Romanis ruscum dicitur. foliis myrti latoribus, cuspidis specie mucronato cacumine. Baccæ per maturitatem rubescunt à mediis foliis dependentes, nucleo durities ossæ, radix graminis gustus adstricti, subfalsi, à qua ramuli viticis, frequentes, lenti. Officinæ bruscum vocant. folia & baccæ si coquantur & bibantur, urinam mouent, menses pronocant, vesicæ calculos frangunt, & urinæ stillicidio medentur.

Οὐκιστὸν. nomen est emplastri ruptorii, cuius descriptio habetur apud Aet. lib. 15. cap. 17.

Οὐκιστὸν. medicamenti genus est tenuium partium, & facile venas subiens & permeans, vt nomen ipsum indicat, à citra penetratione inditum. Est autem facultate concoctorium, iis constans quæ cum tenuitate partium calore prædita sunt. Eiusmodi est τὸ δῖον, τὸ δῖον περὶ τὸ δῖον, τὸ δῖον κατὰ μὲν τὸ δῖον, κατὰ δὲ τὸ δῖον, quæ habentur apud Galenum in lib. sanit. tuend. & alia permulta ab Aetio descripta lib. 3. cap. 90. 91. & lib. 5. cap. 68. & lib.

6. cap. 10. Nec vero vnus est exhibendi modus. Nam vel in potu ante cibum tum manet vesperti præberi potest, vel datur à Rufo in cura melancholiæ, ad tollendas inflationes, vel in condimento ad ciborum concoctionem digestionemque procurandam. Materia autem hæc fere deligitur, fœniculum, apium, ligusticum, ammi, piper, zingiber, ruta, cuminum, fœfeli, thymus, calamintha, cinamomum, & reliqua eiusdem generis, de quibus apud Aetium lib. 9. cap. 24. vbi de cruditate ex Galeno differit. Quibus etiam aliquid quandoque adlici potest quod purgandi vim habet, ex quo οὐκιστὸν κατὰ πλὺνόν fiet, quemadmodum apud Aetium lib. 3. continetur.

Οὐκιστὸν. acidus ructus. Est qui flatum sapore acidum à ventriculo ad os refert. Prouenit potissimum ob ventriculi frigiditatem, non eam quidem immodicam, sed cum imbecillo calore coniunctam. Neq; enim vbi nulla prorsus facta est ciborum alteratio, acidi ructus excitantur, quemadmodum nec vbi optime concocti fuerint, sed tantum vbi modicam à ventriculi calore alterationem perpessi fuerint, nec perfectam adipisci potuerint. Fiunt etiam propter frigidam pituitam in ventriculo acruatam, & frigidam fluxionem in ipsum decumbentem, adhæc ciborum tum frigiditatem tum copiam: his enim omnibus causis commune est calorem ventriculi ingentem vinci à cibis, non eos vincere. vide ἐρυν.

Οὐκιστὸν. oleum rosaceum aceto temperatum. Sed cum varius possit esse vtriusque modus, qui temperatissimus est, recipi olei rosacei partes quatuor, aceti vnam, vt ait Gal. initio lib. 12. οὐκιστὸν: sic enim medicocriter refrigerat. Quod vero plus aceti habet vehemētius refrigerat, vt contra minus, quod minus habet aceti. Habet etiam vim repellendi. Itaque in morborum principiis magna vtilitate illinitur, præsertim si calidus morbus est. Sed & in oedematis atque ipsis etiam lethergicis Galenus in lib. meth. med. admouet, quo humor, quisquis fuerit, à parte affecta repellatur. Tanta adeo vis est oxyrhodini in frigidis etiam morbis, siue per se, siue cum sale, aut thymo, aut alio exhibiri, ne frigiditate nocere possit.

Οὐκιστὸν. acutus. dicitur à Græcis homo ἀκμὸς καὶ τὸν ἀκμὸς, id est, acer, siue, quod idem est, celer, vt annotauit Galenus commentar. in lib. 6. τὸν ἀκμὸν. quo etiam in loco scribit Hippocratem ea loquendi consuetudine inductum εἰς τὸν πυρετὸς, id est, acutas febres, appellasse eas quæ caliditatem exhibent manui celeriter occurrentem, eoque nomine velocem caloris motum ostendisse: verum minus proprie eiusmodi febres acutas dici palam est, quod febris tertiana ad hunc modum calida, acuta non fit. Ab eodem vero loquendi more, οὐκιστὸν πυρετὸς, siue οὐκιστὸν πυρετὸς dictum esse à medicis, non est dubium. Nam, vt ait Gal. extremo lib. 3. de diebus criticis, ex motus specie

et acutus morbus nominatur. Nec tamen in solo celeri motu essentia acuti morbi posita est, sed in eius etiam magnitudine & periculo. Itaque acutum morbum dicere eum esse qui celeriter sua tempora absoluit, non est eum quidem definire, sed ex ipso nomine vim eius & proprietatem explicare. Qui enim sic definit, non ille quidem *ὀξείας νόσον*, sed potius *βραχυρόνησον* definit, qui morbus ut non semper acutus est, sic acutus omnis *βραχυρόνης* semper existit. Multæ siquidem febres diariæ externam aliquam ob causam contractæ intra diem vnum desinunt, quas tamen nemo vel medicus vel idiota acutus vocare consuevit. Quamobrem Archigenes multum à Galeno hac in re collaudatus lib. 2. de diebus criticis, acutum morbum non repositibus quidem solis nudisque, sed motu potius & naturâ appellandum censebat. Nam cum morbus segni lentoque motu & cum interuallis à febre vacuis ad quadragesimum vsque diem procedit, nemo, inquit, sanæ mentis eum acutum dixerit, sed *παραχρόνησον*, hoc est, diuturnum: similiter & paruas illas febres periculoque carentes diarias, nemo acutas, sed *ὀξυρόνησους*, id est, breues, vocauerit. Est enim acutus morbus, ut ipse definit, cui motus velox & subito pericula adueniunt. Ac velociter quidem moueri dicitur, quod ad suum finem iudiciumque properet, ipsumque ad decimum quartum diem consequatur. Qui enim ante soluitur, *κἀνθεύς*, id est, peracutus, dicitur. Qui vero longius procedit, simpliciter acutus. Sunt tamen & in illis differentiæ. Siquidem ut exacte peracutus est qui quarto die desinit, non exacte qui ad septimum vsque peruenit, ita & inter acutos alius vere acutus est qui quattodecimo die iudicatur, alius non vere qui ad vigesimum vsque perdurat: quamquam & ipse acutus sit. Præter has autem differentias etiam tertia acutorum est quæ *ὁ μετακίνησις*, id est, ex decidentia siue lapsu, dicitur, quoties acuto quodam morbo imperfecte intra diem vigesimum iudicato & fracta ex eo die eius vehementia, reliquum eius nec eiusdem celeritatis neque periculi prorsus expers intra quadragesimum diem desinit. Talis quidem est acutorum morborum motus. Sunt autem & hi omnes magni periculosique siue proprietatione, ut apoplexia, epilepsia, conuulsio, tetanus, cholera: siue propter symptomata ut coniunctam vehementem febrem, in qua Hippocrates videtur acutorum morborum essentiam collocasse, scribit enim lib. 1. *ὅτι διακρίναι ὀξείας* in hunc modum: Sunt igitur acuti morbi quos præci nominatim perstrinxerunt, pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, caussus & quicumque alii hos consequuntur morbi: quorum febres prorsus continuæ interficiunt. Quibus tamen verbis non videtur Hippocrates alios ab acutorum numero excludere qui febre carent, geminam eorum differentiam manifesto agnoscens, quo lo-

co ait: spirandi facilitatem magnam vim habere ad salutem in omnibus acutis morbis quibus coniuncta febris est. Tales autem acuti morbi quorum febris comes est à bile flaua accenduntur, ob quâ & celeriter mouentur & tertio quoque die fere semper accessiones habent, & repentinis mutationibus atque periculis obnoxii sunt. Dicitur vero & alia significatione *ὀξὺς πυρετός* ab Hippocrate lib. 6. *τῶν ὀξυδηµόνων*. Est enim febris differentia à motu caloris sumpta, hoc est, à caliditate celeriter manui occurrente, & suâ motionem celerem indicante, cui ipse Hippocr. *ἐπικαθιδόντα πυρετός* opponit. Dicitur autem ea cuius calor initio & mox ubi manus est admotâ corpori, ardens & acris percipitur, sed manu diutius immorante languidior & mitior sentitur. Huiusmodi sunt biliosæ febres. Tertianario enim, ut ait Paulus lib. 2. capit. 18. si manum iniicis, primo quidem contractu calor copiosus & acer occurrit, sed paulo post à manu remanente vincitur, ea scilicet parte cui manus admouetur. Nec tamen ista febrium differentia à motu caloris ita sumitur, quin & febris essentia, id est, calori intensiori & materiæ in qua calor accenditur, aliquid suæ generationis debeat.

*Ὀξύς*. herba, quæ, ut Plinius author est, folia terna habet. Putatur esse *ὀξύριφνον*, officinæ trifolium acetosum & alleluia vocant. Eam edunt quos enterocoele male habet.

*Ὀξύς*. iunci palustris genus, acuto cacumine. Cuius duæ species produntur: vna sterilis, cuius in medicina nullus est usus: altera semen nigrum & orbiculatum ferens, cuius calami crassiores carnosioresque sunt. Eius semen somnum conciliat. vtrumque si frictum cum vino bibatur, ventris fluxus desiccatur. Composita eorum temperies est, ex terrena essentia leniter frigida, & aquea leniter calida: ut prodidit Galenus.

*Ὀξύς*. aciditas. qualitas est gustabilis in corpore humido & tenuium partium à frigiditate proueniens. Siquidem acida omnia frigida sunt, tam ea quæ ex crudis matura fiunt, quam quæ ex maturis perfectisque in aliam naturam degenerant. Quæ enim initio propter summam crassitiem & frigiditatem acerbâ, & postea austerâ enadunt, ea calore paululum attenuatâ, factoque humore eorum magis æreo & subtili acida redduntur, ita tamen vt multis numeris frigiditas caliditatem in illis exuperet. Sed & acetum quod vini vitio prouenit, & à frigido acescit, & acidum factum ex calido frigidum efficitur. Eius exemplo acida omnia tenuium partium existunt, & adstringunt & exasperant & acrimonia non carent, euenitque illis, ut inquit Galenus, simile quid quod borealibus constitutionibus accidit, ut frigida videlicet sint, simulque tenuis essentia. Quod autem in corpore humido aciditatem prouenire dictum est, sic accipi debet, non ut intelliga-



mus acida, vt specie quidem, sic etiam viribus humida esse, siquidem facultate magis sicca sunt, verum quod ea quæ ex acerbis & ansteris acidâ euadunt, cuiusmodi sunt fructus omnes qui maturitatem adipiscuntur, affluentis humoris copia id perpetiuntur. Est enim sapor acerbus magis terrenus, acidus autem magis humidus.

Ο *τριφυλλον*. trifolium. nam hoc nomine à quibusdam vocari *τὸ τριφυλλον*, Dioscorides author est.

Ο *εὐφορίαν*. palma sylvestris, arbor est fronde saligna virens, pom. pruni, ossis duro, nucleo intrus exili, carne foris copiosa, colore è nigro in luteum languescente. officinæ thamarindum vocat, quasi palmulam Indicam. Abscessu secundo refrigerat & humectat, flauæque bilis ardorem vehementer restinguit.

Ο *εὐφύμων*. sic dicitur à quibusdam *τὸ γερνιον*, vt habetur apud Dioscor.

Ο *πιον*. succus papaueris: alii lac, alii lacrymam appellant. Eius parandi rationem hanc Dioscorid. prodidit. Cum ros in papauere exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam curam incidere oportet, lacrymam exeuntem digito in concham abstergere, nec multo post redire, vt concreta inueniatur. Et enim quæ tum aut postero die etiam offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Id opium dici testatur. Scribonius Largus in descriptione collyrii quod diagaucion vocat, Opium, inquit, quod ex lacte ipso syluatici papaueris capitum fit, non ex succo foliorum eius, vt pigmentarii institores eius rei compendii causa faciunt. Illud enim cum magno labore exiguum conficitur, hoc sine molestia & abundanter teritur. Dioscorides ab aliquibus capita ipsa & folia rudi & prælo exprimi, teriq; in mortario, & digeri in pastillos scribit: vocari autem *μυκόνιον*, multum opio ignauius. Quod ipsum etiam Plinius libr. 20. capite 18. dixit his verbis, Quum capita ipsa & folia decoquantur, succus meconium vocatur, multum opio ignauior. Galenus opium interdum Hispanicum, interdum Libycum & album commendat, Aetius aliquando Asianum, aliquoties Achaicum. Officinæ nostræ vno ore Thebaicum prædicant, emuntque à mercatoribus alicunde comparatum, sed vbi & quomodo paratum sit, prorsus ignorant. Optimum habetur, inquit Dioscorides, graue & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum nõ vt cera coeat, & in sole diffundatur, dein ad mortu lucernis non atra luceat flamma, extinctum denique odoris vim conseruet. Adulteratur autem multis modis, vt glancio gummi aut sylvestris lactuæ succo.

Ο *πιδεσπας*. est collyrium *πυρογμυλιν* ad palpebrarum asperitates emicax, cuius descri-

ptio habetur apud Aetium lib. 7. ex Orisatio. Quod aliis etiam nominibus *εὐμαπιν καὶ εὐπιν* tradit appellari.

Ο *πιδεσπας*. spinæ in posteriorem partem contorsio. dicitur & simpliciter *κρίσας*, de qua suo loco diximus.

Ο *πιδεσπας*. Est perpetua totius corporis conuulsio in partem posteriorem. Species est *τὸ ἀπασπας*. Is autem perpetuus est & non distinctus accessionibus quæ per temporum redeunt intervalla, totumque corpus exercet, ita vt nulla eius pars in posteriora non contorqueatur. Ex quo patet affectum ad principium neruorum pertinere ex quo nerui oriuntur, qui corpus in partem posteriorem retro adducunt: quanquam fieri etiam aliquando possit, vt non affectis iis neruis, sed aliis potius resolutis, quorum munus est corpus in anteriora flectere, *ἐπιδότῃ* contingat, perinde atque *ἀπασπας* *ἐκκλινῆς*, in quo non ea pars quæ videtur contrahi, sed opposita laborat. Cum enim natura tam dextra parte quam sinistra aduersos inter se neruos numero, magnitudine & robore pares constituerit, æquabili quodam nixu corpus veluti in æquilibrio continentes, cum primum aliquos resoluti contigerit, illis aduersos perpetuo solos agere necesse est, atque ad principium suum recurrentes, musculos etiam eo secum adducere. Galenus tamen & qui eum sequuti sunt medici, *ἐπιδότῃ* conuulsionis speciem esse prodiderunt, fierique eum censuerunt contrahitis iis neruis qui corpus in posteriora inflectunt. Qui simpliciter quidem dicitur *ἐπιδότῃ*, totius corporis est, & male affecto neruorum principio contingit: potest vero quibusdam etiam partibus accidere, vt ceruici maxillis, lumbis, conuulsis videlicet eorum duntaxat musculis qui eas partes in posteriora agunt. Verum is non simpliciter *ἐπιδότῃ* dicitur, sed addito eius partis nomine quæ distenditur. Eadem est eius affectionis causa quæ & conuulsionis in vniuersum.

Ο *πασ*. dicuntur apud Hippocratem funes ex stipula, lino vel cannabe, vt exponit Galen. *τῆς γλῶσσης*.

Ο *ποδισσάμον*. opobalsamum. est succus qui ex balsamo manat. Cortex eius vitro lapide, aut offeis cultellis vulnerabatur (ferro namque caudex eius concisus protinus moritur) inde manabat gutta primum tenuis, deinde oleo similis, quæ postea rubescebat simulq; durescebat. Per Capiculam excipi solitam Dioscorides author est: eamq; probari maxime quæ sit validi odoris, sincera, dilui facilis, gustu adstringens & modice mordens. vis illi est siccare & calfacere. Est & maxime tenuium partium.

Ο *ποκρίπασον*. succus quidam est venenatus, soporem & strangulationem adducens. Est autem frigidus, & collyriis accommodus. Adhibuit eam aliquando Archigenes capiti, quo pilos flauos & crispes efficeret, vt recitat Galen. lib. 1. *τὸ π* Idem lib. de anti-

antidotis priore tradit opocarpasum circa optimam myrrham reperiri, longe tamen diuersa à myrrha natura. Quid autem sit Carpasum non constat. Hoc vnum certum est, non esse quod dicitur Carpesum, sed maxime diuersum.

**O'πραιός.** succus panacis Heraclii. Excipitur lacryma caule vel radice incisa cum recens eruperit caulis. Ea redditur candida vbi adaruerit. Croci exterius præfert colorem. Probatur amarissimus; interne candidus & subrufus, extra nocens, lenis, pinguis, friabilis, tener, facile tabescens, odore graui. Damnatur niger ac mollis. Excalfacit ordine tertio, tenuat, emollit: siccit secundo.

**O'πός.** succus, humor qui ab aliquo expresso, inciso, vel etiam sponte manat. Alii quod exprimitur, *χυλόν*: quod ab incisione vel sponte defluit, *δελουον* vocant. **O'πός** autem cum sit vox omnium quæ ita stillant communis, significat tamen κατ' *Ερυν* Cyrenaicum succum simpliciter prolata. Is enim omnium succorum præstantissimus est. Nec vero *οπός* silphii modo succus dicitur, sed ipsum etiam silphium Hippocrati, *οπός καρπός* dicenti pro silphii semine, quod *δελουον* & *μαγνιδεύς* à quibusdam vocatur, vt scribit Galen. *α' τῆς γλώττης*.

**O'πσις.** assatio. Est concoctio ab alieno & sicco calore perfecta. Sic quidem Aristoteles lib. 4. meteorolog. definiuit, explicans non modo quo differat à maturatione quam *πύσις* vocat, quod illa ab externo, hæc ab interno & nativo calore perficitur, sed quo etiam differat ab elixatione quæ *ἐλασις* dicitur: hæc enim ab humido calore, illa ab arido est. In assis enim coquitur & definitur ab igne humiditas. Siquidem absumpto humore ab igni, assa euadunt. Quoniã autem hoc opus artis est non naturæ, non possunt partes omnes æquabiliter assari. Nam quæ igni proximæ sunt, citius magisque resiccantur quam internæ. Siquidem externis meatibus præ siccitate addensatis & conuiuentibus, non potest qui intus continetur humor excerni, sed intus conclusus manet: suntque eam ob rem assa sicciora externis partibus quam internis. Species seu modi assationis plures sunt. Nam vel igni admouentur ea quæ assari debent, vel in aliquo vase, in quo nihil humoris insit, subiecto igne assantur, aut in vase pariter, in quo quidem aliquid humiditatis sit, sed non tantum, vt assati corporis humiditatem euincat, verum potius simul cum illa ab igne superetur & concoquantur: hoc modo assari dicuntur ea quæ friguntur. Sunt enim frixa, auctore Aristotele, assorum species.

**O'πώγ.** altera pars æstatis. Quidam enim ex antiquis æstatem in duas partes diuiserunt, primamque proprie æstatem appellauerunt, eodem cum toto nomine, à Virgiliarum exortu, vsque ad ortum Canicula; alteram vero *ὀπώρα*, à Canicula scilicet vsque ad finem

æstatis: alii vero totam æstatem tripartito diuiserunt, & primam quidem partem totius nomine, *ἔρος*, mediam vero *ἀργύ*, tertiam *ὀπώρα*, quali *πῶς ὅτι τῇ ἀργύ* nūcuparunt, quod post *ἀργύ* lequatur. Quo tempore quoniam fructus maturefcere solent, factum est vt omnes fere fructus æstiu *ὀπώγ* dicantur. Quidam tamen discrimen posuere, *ὀπώγ* vocantes quicquid herbaceo fructu viret, lignosi nihil exterius habens, vt duracina, pyra, mala, damascena, pruna: reliquos vero omnes *ἀπρόδωρα*, qui putamen exterius lignosumque fructum contineant, vt malum Punicum, castaneæ, pistacia, nuces. Vtrumque genus salgami nomine Latini complectuntur.

**O'πρωκόν.** medicamenti nomen est ex fructibus compositi. sic ad dysentericos, stomachique vitia in congio musti albi, lento vapore decoctis malis cotoneis quinque cum suis seminibus, Punicis rotidem, sorborum sextario & pari mensura eius quod rhun Syriacon vocant, croci semuncia. Coquitur vsque ad crassitudinem mellis, hæc Plinius. Eadem fere habet Galenus lib. 8. *πρὸς τὴν πύσιν* ex Asclepiade, ipsumque medicamentum *δ' ὀπρωκόν* appellat.

**O'πρῶν.** turgere, furere. Verbum est quod proprie ad animalia pertinet quæ ad coitum incitantur. Translata vox est ad homines aut succos qui in corporibus continentur. Nam sicut illa stare loco non possunt, quadam titillatione impulsæ, eoque affectu concitata: sic & humores plarumque in motu vehementiore atque transfluxu à partibus ad partes, in morbi principio hominem infestant, mouentes, titillantes, & quiescere non permittentes, cum & ipsi pariter moueantur & transfluant, & titillatione ægrum infestent. Tales igitur humores protinus euacuare conuenit, hoc est qui sunt in motu & latione & fluxu, priusquam in aliquam partem decumbant, in qua tumoris aliquod genus creent, aut aliud malignum immedicabile concitent. Sed notandum quod scripsit Hippocrates, Plurima vero non turgent, discereque oportet hoc ab experientia, raro contingere vt humores ab vna parte ad aliam transfluant, sed frequentius accidere, vt in vna aliqua parte quiescant atque consistant, in qua etiam concoquantur toto morbi tempore vsque ad eius solutionem.

**O'πρωον.** instrumentum. Est pars corporis quæ perfectam edere actionem potest. Refertur enim instrumenti nomen ad actionem, vt instrumentū dicatur quatenus edit actionem. Sic venæ, nervi, arteriæ & plæræque, aliæ similes partes inter instrumenta censentur, quatenus ab iis actio aliqua editur. Et tamē similis pars ab instrumēto propria ratione differt. Dicitur enim similis pars quia simplex, instrumentum vero quia actionem edat. Id autem quamuis aliquando, vt diximus, simile statui possit, minus ta-

men proprie quod simile est instrumenti nomen sortitur, quum quæ proprie instrumenta sint, eadem ex similaribus componantur, adeo ut compositas vel instrumentarias partes dicere nihil apud medicos inter sit. Reuera enim omnis composita pars organica est, quamuis non omnis organica composita esse videatur. Siquidem plures instrumentorum differentiarum statuuntur, ut alia prima, alia secunda, alia etiam tertia quartaque dicantur. Ac prima quidem vocantur quæ ex similaribus partibus coalescentibus vnius functionis gratia sunt constituta, velut musculus, vena & arteria. Ea namque ex simplicibus corporibus compositionem suam immediate sortiuntur. Ex his ipsis primis coagmentantur secunda. Quæcunque enim ex primis instrumentis componuntur, etsi vni totius instrumenti functioni quam maxime obseruiunt, inter secunda numerantur. Eiusmodi sunt digiti. Tertia vero instrumenta appellantur quæ ex ipsis secundis constituuntur, veluti manus aut pes. Ex digitis enim vterque constat. Sic quarta quæ ex tertiis, ut brachium & crus. Illud namque inter alias partes manu, hoc vero pede constat. Hæc quanto magis composita sunt, tanto etiam magis instrumenta dici merentur, & actionem quoque edunt perfectiorem. Ex quo apparet definitionem eam instrumenti à Galeno assignatam, ut id dicatur quod perfectam edere actionem potest, perfectis tantum instrumentis conuenire, cuiusmodi sunt cerebrum, cor, iecur, testes, item oculus, auris, pulmo, thorax, venter, manus, pedesque, non etiam singulis eorum particulis, quas constat perfectam actionem per se edere non posse. Oportet autem instrumentum omne si recte opus suum perficere debeat, non ex qualibuscunque simplicibus particulis, neque ex numero aut magnitudine qualibet non satis opportuna, neque ex quouis modo compositionis constare, sed habere formam, magnitudinem, numerum partium similarium ex quibus componitur, & constructionem præterea decentem. Carterum id vnum sciendum est partem quamlibet corporis instrumentariam quamuis ex pluribus particulis composita sit, vnam tamen habere quæ suæ ipsius actionis sit causa, reliquas vero quæ instrumentum quoduis efficiunt, illius gratia constitutas esse, ut Galenus in libris de vſu partium demonstrauit.

Οἷον αἷμα, αἰσθητικόν, συντακτικόν, hoc est commiscere & contemperare, apud Hippocratem. ut explicat Galenus in τῶν γράμματα.

Οἷον ἰρα. Est feruor caloris in corde. Commune quidem est plerisque motibus caloris augmentum in corde excitare. Nam & balneis & insolatione, & cum igni fouemur, & cum calidis medicamentis perfricamur, & cum exercitamus, & cum pudore afficimur, naturalis etiam calor augetur: verum in ira handquaquam auctio, sed veluti feruor est caloris in corde, sicut videtur sensisse Galen

lib. 2. san. tuendæ. In corde autem feruorem eum excitari primum Hippocrates & Plato, deinde Galenus docuerunt, quod irascibilis facultatis sedes sit: feruor aurem ille cordis tantum est, non etiam totius corporis. Nam si in totum extensus fuerit corpus, tunc huiusmodi affectus *πυρετός*, hoc est febris, nuncupatur, quæ est quædam totius corporis immoderata caliditas. Per iram vero feruor ille caloris in corde consistit, à quo si forte per totum corpus diffundatur, ut nonnunquam accidit, febrem accendit, primum diariam, deinde vero & sæpe quidem, si vehementior ira est, ardentem, si bilis per eam commota non vacuetur, sed intus manens putrescat: sin autem non putrescat, ieterum plærumque gignit. Feruet autem tantopere calor iratis propter immoderatum & impotentem motum facultatis irascibilis, cuius proprium est affectare honorem & gloriam, iniuriæque acceptæ vindictam. in quo quidem animi affectu arque perturbatione non modo cordis partes tumultuantur & motibus maximis arque in compositis agitantur, indeque incalescunt, sed etiam bilis feruet quæ in venis, arteriis, hepate, suoque folliculo continetur. Itaque etiam essentiam eius vel probatissimi philosophorum in caloris feruore statuerunt, iræque accessorium esse, non eius essentiam, vltionis appetentiam. Quippe hæc causæ potius videtur habere rationem. Iræ præterea permulta etiam alia comitantur, inter quæ forte caloris auctio, quod in tanta irascibilis facultatis agitatione fieri aliter non possit, quin & spiritus & vapor calidus largior excitetur, à quo calorem plenius renutritum ampliolem auctioremque fieri necesse est. Adhæc pulsus & respiratio altior, maior, vehementior, crebrior, velocior, auctio nimirum calore natiua. Tandem vero si modum ira excedat, & diutius perseueret, vires non aliter quam frequentes vigilæ resoluit.

ὀργή quoque generis appellatione significant apud Hippocratem τὸς ἡρότιμος, hoc est mores. unde εὐοργητικὸς ab eo dicitur τὸ εὐοργητικὸς καὶ εὐοργητικὸς, hoc est minime mala.

ὀργιστὴν δὲ αἰσθητικὸν, irascibilis facultas, vide Dioscoridum.

ὀργιστὴν, dicitur à quibusdam ἡ χαμαίτιος, ut habetur apud Dioscoridem.

ὀργιστὴν, an ynquam aliquod fuerit fossile & natium, certo scire non possumus. non enim extare nouimus aliud quam illud factitium, quod ex ære constat tincto cadmiæ fossilis colore. AEs namque cadmia tingitur & abit in aureum colorem, appellaturque à Græcis ὀργιστὴν.

ὀρεῖς, appetitus, siue appetentia. Est concupiscentia cibi & potus. Ea autem à iecinore principium habet. Est enim totum hoc opus naturalis facultatis quam non *φυσικὸν* modo, sed & *ἐκ τῶν μετεωρικῶν* & *ἐκ τῶν οὐρανίων* veteres appellauerunt. Sed aduertendum est appeten-

petentia nomen ambiguum esse. V. n. a. n. significatione dicitur naturalis quædam inclinatio, qua singulæ corporis partes alimentum desiderant quod in vacuata substantiæ locum succedat: hæc quidem naturalis appetentia est. Nam quoniam cute tenus vni quodque animal in ambientem aerem digeritur, accidit ut membra quæ sub ea sunt, prima vacuentur, quorum ingenita vis ex proximis sibi alimentum trahit, id scilicet quod vacuatur reficiens, deinde rursus illa, ex iis quæ sibi sunt proxima: sicut quæ tertio loco sunt posita, ab iis quæ sibi, atque ita semper per continuum, veluti in choro quopiam translatione celerissime facta, ad venas quæ ad ventriculum pertinent, vacuatio peruenit. Hæc vero & solent pariter & nati sunt ex ventriculo nutrimentum trahere, perinde ut stirpium radices quæ in terram sunt demissa, ab ea. Est enim hoc opus vniuersum naturale, non animale, ut quod stirpibus & animalibus commune sit eodemque modo in vtrisque perficiatur. Fit enim talis appetentia propter solam vacationem & alimenti penuriam, ob quam & stirpes & quæcunque intra terram nutriuntur, alimentum appetunt, atque si nullum trahere datur, marcescunt. Est igitur ea appetentia singulis corporis partibus insita, atque etiam ventriculo, quod non aliter quam reliquæ partes alimento destituitur, atque in omnibus iis ob solam alimenti penuriam vacationemque contingit. Altera vero significatione appetentia dicitur desiderium cibi & potus, quo ventriculus exungi se sentiens tenetur. Et hæc quidem animalis appetentia est: siquidem natura animalibus non item stirpibus vacationis & penuriæ sensum dedit, quo scilicet ad cibum potionemque prorata, sese impleri appetant. Fit autem is penuriæ sensus, cum venæ ex ipso ventriculo veluti emulgentes sugentesque, aliud trahunt: non ferens enim eum suctum ventriculus, sed veluti diuulsus, offensæ eius medelam cibum desiderat. Quippe venæ hoc pacto nulla cum ventriculi molestia ad obiectos cibos conuertuntur, atque ex iis, relicto ventriculo, nutrimentum trahunt. Fitque post cibi sumptionem, ut & venæ simul ad cibos se conuertant, & ventriculus ex iis, quantum prius per venas est exhaustus, in seipsum trahat. Ad hanc autem appetentiam quinque symptomata concurrunt, ordine quodam sese sequentia, ac primum quidem vacuatio est, siue alimenti penuria: secundum exinanitatum partium appetentia illa naturalis, de qua modo diximus: tertium ventriculi suctus à venis factus: quartum eius sensus: quintum vero & vltimum appetentia eius animalis. Itaque cum sensus eam pariat, merito animalis nuncupatur, soli namque animalis sensus datus est: atque etiam perspicuum est, eam ventriculi esse non etiam aliarum partium, quæ sine molestiæ sensu dissipari adimique sibi alimentum suum pari-

untur, ac præsertim oris eius, quod reliquis partibus, propter neruorum quibus prædictum est magnitudinem, eximia vi sentiendi longe antecellit.

*O'pētēs κυνώδης.* appetentia canina. Est vehemens & insatiabilis edendi cupiditas, à cibis ad vomitum & à vomitu ad cibos subinde rediens. Affectio est τῇ ἀνορεξίᾳ prorsus contraria. Prouenit magna ex parte ab humore aliquo vitioso & acido, siue is pituitosus sit siue melancholicus, qui in os ventris impactus ipsum mordet & irritat. Talis namque mordacitatem suctioni similem inducit, & ventriculi tunicis coactis adstrictisque inanitionem perinde ac naturalis fames inuehit, atque inexplebilem cibi cupiditatem. Itaque eorum copia grauari, coguntur cibos euomere, deinde cibis denuo se ingurgitare, postea redire ad vomitum, inde ad cibum, atque ab eo identidem ad vomitum, canum modo in eandem noxam relabentes à qua per vomitum fuerant liberati. Quo fit ut tantam ventriculus imbecillitatem contrahat, ut nihil continere possit, sed perpetua fere laboret vomitione. Nec vero vomitu tantum reddunt ingestos plus æquo cibos, sed alui etiam profusio aliquando deiciunt. Quo fit ut his succedant & cæliacæ & dysentericæ affectiones & ipsa aqua intercutem, propterea quod ante prioris cibi concoctionem, ingesto alio, cruditas vitari non potest. Huiusmodi appetentiam Hippocrates *κυνώδης*, hoc est famem, appellauit, eo aphorismo quo scripsit famem meri potione solui, ut in comment. Galenus annotauit. Differt *ὄρεξις ἢ κυνώδης* ἀπὸ τοῦ βούλησις multis rationibus. primum quidem quod illa communior sit & generalior, ut ex eodem Galeni commentario potest intelligi: deinde quod *ὄρεξις κυνώδης* causam habeat non modo frigoris internum, sed & humorem acidum in ipso ventriculi ore impactum, *βούλησις* autem ab externo frigore excitetur: tertio quod *βούλησις* frequentes animi defectus comites habeat, imo vero, ut ait Galenus libro primo ad Glauconem, nihil aliud sit quam animi defectus, illa autem sine animi defectione sit, nisi si nimis diu vitium traxerit & oris ventriculi robur dissoluerit. Caterum Aetius aliam appetentiam caninam speciem exposuit, cum videlicet corpus vniuersum rarius existens & per occultam transpirationem exhaustum præter modum exinanitur. his alui deiectiones pauciores & sicciore prodeunt quam pro cibi ingesti modo & qualitate. Nec his quidem plura symptomata Aetius tribuit. Ex quo perspicuum est eam affectionem quæ vomitione careat, non esse oris ventriculi, sed habitus totius corporis, nec proprie appetentiam caninam appellari posse. vide *βούλησις*.

*O'ρεοσέλινον.* oreoselinum. est apium montanum. caule vno prouenit palmum alto, radice præ-

tenui. per ambirum ramulos spargit capitulis cicuta, multo tamen tenuioribus; in iis semen longum & acrimoniam gustu præferens, odoratum, tenue, cumino proximū nasci in petrosi & montanis amat.

Ὁ ῥοδίαρον. mēsurā est apud Græcos quarerum intervalla metiuntur. Est autem totum id spatium quod inter primam palmæ partem, καρπὸν Græci vocant, & extremum medium digitorum interiaceret: sic enim & Pollux & Hesychius interpretantur. Continet autem digitos circiter vndecim. Latine rectus palmus dici potest.

Ὁ ῥοδιαλον. vitium articuli est, quando ob durum aliquem tumorem chorda musculos partem aliquam inflectentes non sequitur, sed perpetuo articulus tenditur nec inflecti potest, ut annotavit Galenus comment. 3. εἰς τὸ ῥοδίαρον.

Ὁ ῥοδίαρον. Genere quidem non aliud est quam δὲ πνοια σφοδρά; hoc est magna spirandi difficultas, cui tamen adiunctum symptoma est, ut ea etiam non aliter fieri possit quam recta ceruice. Definiri et potest, frequens sine febre respiratio recto thorace facta. Eiusmodi fere solet esse iis qui velocius cucurrerunt. Sic dicta est, quod qui ea laborant (ὁ ῥοδίαρον) iij vocantur à medicis non nisi recta ceruice spirare possint, proindeque erigere sese è stratis coguntur & recto thorace spiritum ducere. Nam cum aspera arteria, ut scribit Galenus εἰς τὸ ῥοδίαρον, principium à gutture habens in pulmonem dividatur, quoties quidem thoracem cum collo recte extendimus, arteriam ipsam dilatari contingit, atque etiam quæ ex ea in pulmones distribuuntur propagines omnes; atque interim regionem augeri eis internam: hæc quidem causa est cur recti spirare affectent. Idem malum ἄσθμα etiam ab alio symptomate vocatur. in causa est pulmonis & eius vasorum angustia ab humore aliquo in iis præter naturam contento, estque symptoma commune peripneumonia; empyematis, tuberculi aut abscessus in pulmone geniti. Crassus autem & viscosus humor qui eam affectionem parit, non in leuibus sed asperis arteriis sit oportet, quod ex sint respirationis instrumenta. Est autem per orthopneam respiratio parua densa & velox; sicut Galen. libr. de difficultate spirandi primo demonstravit.

Ὁ ῥοδίαρον, id est τὸ χροῖον, apud Hippocr. ut explicat Galen. εἰ τὸ χροῖον.

Ὁ ῥοδίαρον. significat apud Hippocr. libr. 1. Epid. facile ferre morbum, adeo ut qui laborat, munia obeat consueta, nec cogatur in lecto decumbere. Sic comment. 1. Galenus explicavit.

Ὁ ῥοδίαρον. marum. ut habetur apud Dioscor.

Ὁ ῥοδίαρον. quod Heracleoticum & cunilam vocant, herba est folio hyssopi non dissimili, umbellæque non in rotæ speciem orbiculata sed veluti multifida, semine in summis virgis handquam denso: apud Gallos ma-

iorana Anglica appellantur. Quæ veteres dicuntur, candidior est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei origani Heracleotici, sed multo inferior. Sylvestre autem origanum quod aliqui panaces Heracleion; alii cunilam etiam vocant, foliis est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi, radix tenuis, superna-cua. Habent autem omnia origani genera vires incidendi, extenuandi, siccandi & calfaciendi in tertio abscessu.

Ὁ ῥοδίαρον. etiam à quibusdam dicitur ῥοδίαρον Dioscor. author est.

Ὁ ῥοδίαρον. scribitur sæpe pro ῥοδίαρον. quod vide.

Ὁ ῥοδίαρον. herba est foliis marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in sylvestri rotundum fuscumque inuenitur, in altero nigrum & oblongum qui in usu habetur. Calidum est mediocriter, siccum & abstergens, præcipue sylvestre. officinis gallicis, herbariis centrum gallinæ dicitur. ῥοδίαρον à Theophrasto & Plinio recensetur etiam in frugum generibus: Hesychius esse leguminis genus dicit.

Ὁ ῥοδίαρον. apud Atticos dictus est ῥοδίαρον, forte δὲ ῥοδίαρον, quod ruere significat, quoniam ubi adoleuit, facile decideratque corruat: qua de causa etiam corruam à Latinis dici nonnulli voluerunt.

Ὁ ῥοδίαρον. dicta fuit à quibusdam ῥοδίαρον, ut habetur apud Dioscor.

Ὁ ῥοδίαρον. Arbor est vlmī specie. foliis amygdalæ, prælongis filiquis in furculorum cacumine prodeuntibus oleagina magnitudine, in quibus medulla inest, linguæ auis similis, vnde nomen. exterius rubra; intus ex candore in luteum vergens. sapore acri vellicante linguam cum nonnulla amaritudine. Ea, ut tradunt, secundo abscessu calfacit, laterum dolores sedat. vrinam ciet, & remoratam herentemque pellit. Venereim stimulat, & genituram auget. Linguam auis officinæ nominant.

Ὁ ῥοδίαρον. cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipèdalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei visuntur; inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Ruellius in Gallia ῥοδίαρον copiosum nasci scribit, pueris non incognitum, qui propter adstantes cum ab agricolis terra proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur, ornithogali radices vomere erutas colligunt, & cum sint castaneis suauiores, iis & crassis, & in cineribus incoctis vescuntur, odore iucundissimo, os mirum in modum commendante. Radices in orbem fere collectæ sunt, cortice pullo, candidissima intus carne, perquam odorata, vere vel æstate cum frōde virent, hyeme



vel autumnno eum exarantur agri, radicibus velluntur. Diu seruari possunt, & ubi anno-  
na premit inopia, plebis rustica famem, &  
ieiunia castanearum more sariant. Mire sui-  
bus expetuntur, qui rostro scrobiculos ex-  
cavant, & horum capti dulcedine, gregatim  
ad has eliciendas radicibusque vellendas ad-  
nolant.

**ὀρεβάριον**, cauliculus est sesquipedalis & inter-  
dū maior, subruber, hirsutus, tener, sine fo-  
lio, pinguis, flore subalbido autem luteū ver-  
gente, radice digiti crassitudine, & cum ari-  
ditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter  
quædam legumina nasci constat, & ea stran-  
gulari: vnde **ὀρεβάριον** sibi cognomen usur-  
pauit. Estur, vt holus, cruda, & in patinis,  
aspatagi modo, decocta. Legumitis ad-  
dita concoctione accelerare creditur. Sunt,  
vt scribit Plinius, qui **καυοιόρεον** eam appellat,  
à similitudine canini genitalis. **ὀρεβάριον** au-  
tem est sicca frigidaq; temperaturæ in pri-  
mo ordine.

**ὀρεβήριον**, dicitur à quibusdam **ὀρεβήριον**, vt ha-  
beretur apud Dioscor.

**ὀρεβίς** ἢ **ὀρεβιάτις**, genus ciceris, sic dictū ab erui  
similitudine. vide **ἐρεβνός**.

**ὀρεβίς**, dicitur primum genus chrysocollæ fa-  
ctitiz, quam Plinius à Latinis herbaceam  
scripsit nominari. vide **χρυσικόλλα**.

**ὀρεός**, eruium, frutex parvus, angusto folio, te-  
nuis, semina in valvulis habens, è quibus fa-  
rina fit multis vñibus inseruiens. Ordine pri-  
mo calefacit, siccatur secūdo cū amaritudine,  
per quam incidit, deterget, obstructa aperit.

**ὀρός**, dicit à quibusdā **ὀρεός**, hoc est pars rota  
pedis superior, quā alii etiam **πλωστόν** appel-  
lant. Reperitur **ὀρός** etiam pro **ὄρος**, teste Eu-  
stathio. Alias Montem significat. At **ὄρος** fi-  
nis, terminus. **ὄρος** vero, quod & **ὄρρος**, serum  
lactis.

**ὄρρομα**, est picis liquidæ serosum recremen-  
tum. Id aliqui eum **παστέλιον** idem esse pu-  
tant. Dicitur & diuisis nominibus **πίσος ὄρρος**.  
Vide **παστέλιον**. Erotianus annotauit **ὄρρον πί-  
σος** ab Hippocrate dici **πύρεον** **πύρεος**:  
hoc est, quod in pice humidissimum est, pi-  
cis veluti serum.

**ὄρρονύγιον**, vltima pars spinæ, quæ vertebræ de-  
finiunt. Ea manifestior in auiibus quam in  
homine est, de quæ iis propriè dicitur autho-  
re Aristot. lib. de gressu animalium. Sic di-  
cta quasi **ὄρρονύγιον**.

**ὄρρος**, à quibusdā dicitur **ὄρεός**, q̄ alio etiam  
nomine **δάμας** vocatur. Galen. **ὁ τῶν γλώσσων**  
scribit sic vocari **τὴν ἱεροῦ ὀρίου πύρεος**, hoc est  
sacri ossis extremū, quod etiam **ὄρρονύγιον** ap-  
pellatur. Ex hac significatione **ὄρρος** apud  
Hippocr. dicitur **ὁ ἀχρὶ τὸ ὄρρον ὀκνηόμενος**, hoc  
est ad caudam vsque protensus. **ὄρρος** vero  
quod & **ὄρος oxyronos**, significat serum lactis  
de quo vide in dictione **γάλας**.

**ὄρυζα**, oryza, de genere frugum est. mediocri-  
ter alit. Vim autem quandam adstringendi  
possidet, quæ ventrem modice sistit: à Gallis  
Rys vocatur.

**ὀρεβήριον**, **μύλας**. hoc est tenebricosum  
& nigrum: apud Hippocr. in Progn. sect. 3.  
Accidit melancholicis. Euenit vero & iis qui  
vomitione spontanea laborant, quod vñque  
significat atrum ex flauæ bilis syncere exha-  
latione confectum. Hæc enim plenius cale-  
facta & quodāmodo superassata atram ex-  
halationem ceu fuliginem ad caput emittit.  
Quod vero ex eo humore ad oculos perme-  
at, turbulentiorem reddit in eis humorem  
splendidum & purum ex natura, ita vt fiat  
conditio quædam similis ei quæ circa pu-  
rissimum ac lucidissimum aerem euenit, re-  
cipiente in se aut fuliginosum quendam aut  
humidum nigrorem.

**ὄρχας**, testes, apud Hippocr. hoc est scrotum. Ga-  
len. **ὁ τῶν γλώσσων**, vbi tamen quidam cōdi-  
ces habent **ὄρχος**.

**ὄρχις**, testes, testiculi. Sunt corpora duo glan-  
diosa, alba, mollia, torūda, seminis & gene-  
rationis principiū. Hi quia gemini sunt, etiā  
**δίδυμοι** appellantur. A Gal. lib. 3. alimentorū  
glandibus accensentur. Substantia enim con-  
stant alba & molli, & quod venulis frequē-  
tibus intus varie pertexuntur, rara, laxa, at-  
que cauernosa. Nullam namque aliam ex se  
cauitatem habent. Tales enim semen meli-  
tis percoquunt, & copiosius continent. Est  
autem naturale & proprium eorum munus  
seminis generatio. Itaque eius materiam  
per vasa spermatica attractam, & per epidid-  
ymidem propriam ipsorum tunicam, at-  
que inde per parastatam testi impositum  
corpus testis alterius quadam effigie, per-  
meantem propria facultate alterant, deal-  
bant, concoquunt, verūque semen efficiunt,  
quemadmodum mammæ lac, & ossa me-  
dullam ex sanguine generant. Pluribus tu-  
nicis seu inuolutris integuntur, ac primum  
quidem sua propria & interna & vñque cō-  
tigua, quæ **ἐνδοδιδυμική** dicitur: deinde alia  
quam **ἐκδοδιδυμική** vocant, propterea quod à  
suis vasis & à musculo testium gracili rube-  
scat, testem ipsum testisque epididymidem  
totam inuoluentem: præterea vero duabus  
aliis communibus, quarum vna **ὄρχος** seu  
scrotum dicitur, altera vero **ἐπιδιδυμική** sub-  
iecta. Habent autem & singuli testes su-  
um **ἀρχιδιδυμική** sibi que impositum testis al-  
terius quadam effigie, in quo & vis generan-  
di seminis inest. Cæterum maribus testes  
extrā membranam abdominis sunt & propen-  
dent musculis, quos ex eo **κρεμάνητες** vo-  
cant: mulieribus vero intus latent à lateri-  
bus vteri, frigidiores, minores & imperfe-  
ctiores quam marium. Sic quidem con-  
diti testes in principiū partium numero ha-  
bentur, non quod ad præsentem vitam ne-  
cessarii sint, sed quod ad vitam natorum se-  
rie propagandam, & ad speciem quandam  
immortalitatis eorum actio sit necessaria.  
Sunt enim generationis principium, quod  
à nulla alia parte, sed à se ipsis habent. Nec  
tamen est in præsentī vita vis eorū tam exi-  
gua & nullius momenti: imo vero corpus

uniuersum valde afficiunt & immutant. Ab his enim in totum corpus vis quædam per venas effertur, quæ quidem in maribus robusti & masculi habitus, in fœminis vero fœminæ ipsius naturæ causa est. Ea autem vis est *αἰματική*, hoc est seminis generatrix, qua partes solidæ præditæ semen generant, quo optime aluntur & robustissimæ euadunt. Ex eo namque fit, ut quibus testes frigidiores sunt & humidiores, iis corpus uniuersum frigidum, humidum, infirmumque sit & morbis obnoxium. Nam cum aquosam & tenuem habeant genituram, male solidæ eorum partes aluntur: quare robustæ esse non possunt, quoniam basis hæ sunt totius corporis & fundamentum, quo infirmo necesse est reliquas corporis partes infirmas esse.

*ὄρυς*, alii *κωνίς ὄρυς* vocant: foliis circa caulem & ima eius parte in terra stratis, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, læuibus. caule semipedali, floribus in vertice purpureis, radice bulbosa, oblonga, in modum oliuæ gemina, superiore quæ durior & callosior est, inferiore quæ mollior & rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Nascitur in petrosis & sabuletis. Alter quoque *ὄρυς* habetur, qui serapias dicitur. sic enim Andreas medicus à multis vtilitatibus radicis nominauit, foliis porri, oblongis, latioribus, pinguioribus, ex alarum sinu emicantibus & inflexis, caule palmeo, flore quasi purpureo, radice testiculis simili. Quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur, abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit.

*ὄρχει*, sic à quibusdam dicuntur *οἱ πορτοί*, hoc est, extremi palpebrarum ambitus vnde excrescunt cilia. At *ὄρχει*, Plantæ ordine positæ, seu Plantarum ordo.

*ὄσπρις*, vide *ὄσπρις*.

*ὄσμη*, odor. vide *ὄσπρις*.

*ὄσμη*, odorata.

*ὄσπρις*, legumina. Dicuntur ea cerealium semina, ex quibus panis non fit, ut fabæ, pisa, cicera, lentes, lupini, oryza, erium, cicercula, araci, eruilia, phaseli, fœnū græcum, lens, & si quæ sunt similia. Omnia sunt crassi succi, ventrem implent & concoctu sunt difficilima, ut scripsit Hippocrates *ἐν τῇ αἰσθητικῇ διαίτη*.

*ὄσσε*, ossa. Sunt partes animantis durissimæ, siccissimæ, maximeque terrestres. Sic quidem Galenus definiuit: quāquam satis erat dicere maxime terrestres. nam mox necessario sequebatur siccissimas esse & durissimas: adde vero etiam frigiditas. Sunt autem ossium communes vsus, quod & se mutuo & partes alias omnes tanquam fundamēta sustinent, & eas sibi adnatas adfixaque firmant: præterea vero particulares vsus infiniti, qui à Gal. explicantur in libris anat. Eorum differentia sunt præsertim ab apophysibus, epiphysibus, cartilaginibus, ceruicibus, capitibus, soliditate, cauitatibus, harum quorundam

superciliis, medulla, & aliis quibusdam ipsorum particulis, & à consistentia, magnitudine, numero, figura, situ, & aliis substantiam necessario consequentibus, in sceletis visu tactuque obseruandæ.

*ὄσσεον*, instrumentum chirurgicum quo ossa vel attolluntur, vel deprimuntur, vel omnino loco mouentur.

*ὄσσεον ἱερὸν*, os sacrum. Duobus modis à Galeno vsurpatur, vno quidem latius, ut coccygem etiam comprehendat. ut lib. 12. de vsu partium, cum scribit os sacrum constare ossibus quatuor, tribus scilicet propriis & coccyge. Siquidem per symphysem ossa illa vnita sunt, ut mirū esse non debeat totum os ita sibi vnitum, parte superna vocari sacrum, inferna coccygē, sicut idem ipse humerus qua parte à nobis spectatur *ἐπὶ μῆκος*, parte spinæ suæ summa *ἐκφύλλον*, parte lata *ὡς μὲν ἀπὸ τοῦ* vocatur, atque similiter os sacri ipsius ossis lateribus annexum, os ilium, ad corylen ischion, antica vero parte os pubis. Altera autem significatione specialius vsurpatur, eamque tantum partem significat, quæ reuera sacra est, id est, magna & lata, quantum videlicet huius cum osse ilium per synarthrosim iungitur: hac enim sola parte reuera *ἱερὸν* est, id est, magnum atque latum, tuncque eius reliquū gracilescens semper ac tenuatum, donec in tres cartilagine acutissimas desinat, coccygem appellat. Sed de hoc suo loco dictū est. Constat os sacrum tribus ossibus simul coagmentatis, in prima quidem ætate per cartilaginem, in edita vero per symphysem, quæ coctione multa aut vetustate, in iunioribus præsertim separantur. Sed cur os illud *ἱερὸν* dictum fuerit, variæ fuerunt sententiæ. Alii sic dictum voluerunt, quod in eo aliquid sacri arcanique insit, quoniam partus tempore diuinitus aperiatur, eductoque sætu solidescat miro quodam naturæ opificio. Alii vero quod partes quæ huic ossi adiacent diu offerri in sacrificiis solerent, id quod Menandri testimonio confirmant, *οἱ δὲ τῶν ἱερῶν ἀπὸ τοῦ σίσταρις*. Plutarchus vero in libello Terrestribusne an aquatilibus maior insit prudentia, scribit apud vereres *ἱερὸν* grande significasse, ideoque Homerum *ἱερὸν ἰχθυὸν*, *ἱερὸν θάλασσαν*, *ἱερὸν Ἴλιον*, *ἱερὸν μένος Ἀχαιῶν* dixisse. Sic & Hippocr. *ἱερὸν νόσον* comitalem morbum appellauit. sic antiqui scriptores quicquid ingens ac præclarum habere volebant, *ἱερὸν* dixerunt.

*ὄσσεον ὀσσεον*, ossium dolor. Est species lassitudinis inflammatoriae, cum non modo musculi, sed tendones etiam & nervi per exercitationem nimium excalfacti attraxere quippiam ex circumfusis sibi excrementis. sic autem nominatur is affectus, quod propter penitionem sensum intimarum quoque partium nomen ei tribuatur. Siquidem tendones ipsis ossibus adherent. Itaque cum hi patiuntur, videntur in imo ac circa ipsa ossa affectio hære. Qui sic laborant, ne minimum quidem motum sustinent, sed omnem formidant.

Sentiunt

Sentiunt autem manifestum calorem vna cum demorsu & tensione, vitioso humore in totam corporis molem large effuso.

*O' spauris.* species est & *radix*, quæ in fornaculis locis humilioribus ex crassa materia fit. Reperitur sæpius in his fornacibus in quibus pyrites ærosus non coquitur. Crassarum est partium inter omnia Cadmiæ genera: & quia terrea duræ est, *spauris*, à testa quam superficie repræsentat, nominatur. vide *radix*.

*O' oves.* frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos fractuque contumaces, & in his folia quaternâ, quinâ, senave, ceu lini, nigra in initio, deinde colorem mutato rubescentia. Decoctum eius potum iuuat arquatos. Amara enim inest qualitas, & obstructions expediendi facultas. quare & in iecinore consistentes obstructions adiuvat. Dicitur & *O' oves*. Per v apud Dioscoridem scriptum est in secunda syllaba, apud alios *O' oves* & *O' oves* per i.

*O' opphoris.* odoratus. Est sensus odoris, quanquā non sensus ipse solum, sed etiam vis ipsa odorandi eo nomine dicatur: sicut *visus* non modo saporis sensum sed ipsam etiam facultatem significat per quam gustamus. Huius autem tum sensus tum facultatis instrumentum intra caluariam conditum est, siue id sint ventriculi cerebri anteriores, seu potius continuæ cum ijs propagines similiter cauz, prope ossium ethmoideum initium desinentes. De eo namque dubitare Galenus videtur, modo hoc, modo illud asserens. Nam quod ad meatūs & membranas internas narium & ossium ethmoideum pertinet, non sunt illa quidem primæ & præcipua odorandi instrumenta, sed odoratui tantum deferuiunt. Cæterum duo illi processus à partibus cerebri prioribus erumpentes, quāquam nervis similes videri possunt, inter nervos tamen non habentur, quod tū nervis molliores sint, tum extra durā membranam haudquaquam proferantur. Mamillares & papillares à quibusdam vocantur per similitudinem. Hæ molliissimæ sunt, quò odorēs facillimè admittant & diiudicent, vel, si opus sit, in anteriores cerebri ventriculos transmittant, vbi odoris sensum moueri Galenus existimat, argumentis quibusdam persuasus quæ in libello de instrumento odoratus recenset. Nec vero ad odoris perfectiorem sensum instrumenti tantum mollior, & expeditus eius meatus necessarius est (obstructis namque iis propaginibus vel ab excrementis, vt per grauedines & distillationes, vel ab aliquo præter naturam tumore, veluti polypo, callo, tuberculo, aut aboletur, aut deprauatur, aut imbecillior redditur odoris sensus) sed eorum etiā quæ odorantur aptitudo. Nam quæ frigida sunt & crassarum partium, nullum odorem mouent, quod quæcunque odorata sunt, tenuia & calida esse oporteat, nec tamen prorsus sicca. Nisi namque eius-

modi fuerint, nihil vaporis ex se remittent: quem tamen ab ijs efferti, & aeri ambiēti remisceri, & per nares in cerebrum attrahi ad odorem ciendum necesse est. Est enim odoris materia vapor ex rebus odoratis prodians. Sunt autem odorum sicut & saporum plures differentiæ. Sed saporum quidem notæ, & non vocabulis modo, sed proprijs etiam substantiis, à quibus nomina acceperunt, distinctæ: odorum vero & incognitæ & innominatæ. Siquidem vt saporis sensus homini valde exquisitus est, ita odoris infirmissimus: & tamen tot esse odorum differentiæ quot sunt etiam saporum, & odorabiles cum gustabilibus habere proportionem à Galeno perhibetur. Omnes autē in duo summa genera reducuntur. Alii enim beneolentes, alii graueolentes dicuntur: illos *euodous*, hos Græci *dunodous* nominat. Beneolentes quidem suaves sunt & grati, vt qui spiritui in cerebri ventriculis contento familiares sunt, vnusque tantum generis existunt: similes namque sunt saporis dulci qui linguæ familiarissimus est. Graueolentes vero insuaves ingrati que sunt, & multorum generum, quemadmodum & saporis non dulces. Non sunt tamen illis, vt dixi, imposita nomina, quibus propriè significentur, sed quædam à saporibus, quibuscum magnam cognationem habent, appellationem sortiuntur, vt acidus & acris. Quædam enim acri, quædam acido odore esse dicimus, quod scilicet nos eodem modo afficiunt quo & saporis. Nam & acetum & acida omnia similiter odoratum gustumque mouent, & acritia quoque, vt allia, cepe, non minus gustum quā odoratum mordicant. Quinetiam per sæpe odore solo iudice quamplurima gustare recusamus. Adeo in omnibus fere mutuo consentiunt odoratus & gustus, vt ex odore liceat de sapore iudicare. Veruntamen id perpetuum non est, cum pleraque sint odore suauissimo, vt rosa, quæ gustu sint perquam insauia.

*O' opphoris dūaphis.* odoratrix facultas. Dicitur & *O' opphoris dūaphis*, & vno vocabulo *opphoris*.

*O' opis.* dicitur dorsi ea pars qua cingimur, de qua sic scribit Aristoteles: *ἡ μὲν ὀπίσθεν ὀσφύς, ἡ δὲ καὶ πύμα ἔχει.* hoc est, pars ea qua cingimur, retro quidem lumbus: vnde & nomen habet. Apollodoro, vt scribit Suidas, *ὀσφύς* dicitur quasi *ὀσφύς*, quasi ossis naturam redolens. Est enim ea pars ossæ & excarnis. *ἔχει*, alio nomine à quibusdam dicitur. Galenus tamen apud Hippocratem interpretatur *ἔχει*, ὅτι μὲν καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ὀπίσθεν. Latini huius nominis penuria laborant, & lumborum nomen usurpant in ea parte designanda. Est autem propriè *ὀσφύς* pars rotius spinæ quinque vertebis omnium crassissimis maximisque compacta, inter dorsum & os sacrum mediis. Veruntamen vt sunt crassissimæ, ita angusto foramine singulæ canatæ sunt, pro cuius modo gracilem quo-

que medullam continent. Præter id autem habent etiam singulæ alia multa foramina interiore sui parte, qua venam cauam attingunt, nullo ordine collocata nec numero certo, quibus venas admittunt ad sui nutritionem, cum tamen in reliquis vel nulla vel admodum exigua appareant. Ceterum earum vertebrarum prima, *νεφρίτις* dicitur, quod ex aduerso renum sita sit: vltima vero, *ασφαλής*, id est *ασφαλής*, hoc est à securitate, vt verisimile est, quod ossi firmissimo incumbat. Reliquæ peculiari nomine carēt. Qui ijs adiacent muscoli, *σπεί* vocantur, de quibus suo loco.

*ὄρεον ἢ ὄρεος*. scrotum. Est extrema & communis testiculorum tunica, multis rugis & media futura distincta. vulgus bursam vocat.

*ὄρεον*. τῇ αἰετὶ τὸ σπῆμα τῆς μητρὸς ἐνταπεινὸν ἐπιμαρτυροῦν: hoc est, circa os vuluæ flexuosa extuberantia: apud Hippocr. *ὄρεος* enim & *μόρεος* significant palmities & claviculas. Idem vero etiam *ἀμφιδόν* & *κίχρα* appellauit, vt annotat Galenus ἐν ταῖς γυναικείαις.

*ὄρεον*. nomen anis apud Hippocr. quam Aristot. *ὠπιδά* per *ὠ* scribit. Eam vero Xenophon, vt & Hippocr. *ὠπιδά* per *ο* appellat.

*ὄρεον*. sorba. fructus sunt sorbi arboris. valde adstringunt & deficcant. Rarius *ὄρεα* dicuntur.

*ὄρεον*. vox quidem Romana, Romanum pondus significans, sed quæ tamen apud Græcos literis paululum, vt scribit Galenus, immutatis recepta est etiam pro eodem pondere. Dioscorides in libello de ponderibus & mensuris drachmarum octo esse ait, his verbis: *ὅτι δὲ ὄρεον δραχμῆς ἢ χεῖμαται καὶ*. Id est, vncia drachmas habet octo, scrupula 24.

Similiter & Galenus *ὅτι κατὰ ἥλην* lib. 6. *ἡ δὲ τῶν σελμῶν ὄρεον ἢ ὄρεον δραχμῆς ἔλκεν*. hoc est, quod pōderalis mensura octo drachmas habeat. Idem libro quinto eiusdem operis, *ἐλασις δὲ αἰ δὲ ὄρεον ἰταλικά αἰ δὲ τῶν κατὰ πτρυμνῶν κέρεον*, *ἐπὶ δὲ ἡμίσειας ὄρεον σελμῶν*. αἰ δὲ τῶν δραχμῶν ἰόνται, αἰ μίαν ὄρεον ἢ δραχμῆς *δραχμῶν*. Id est, pendunt enim nouem vnciæ Italicæ quæ in cornibus intersectis sunt, septem vnciæ ponderales & dimidiam: quæ quidem sexaginta drachmæ fiunt: cum vnaquæque vncia capiat octo drachmas.

Helychius quoque scribit, *δραχμῆς τὸ ὄρεον δὲ ὄρεον*, hoc est, drachma, pars octaua vnciæ. Præterea Aetius sectionis tertiz sermone 4. cap. 26. post descriptam compositionem pastilli ex acaciis & veratris scribit hunc in modum: *ὅλας τὰ προχόσκου σελμῶν ὄρεον δραχμῶν ἢ πνιπὸν ὄρεον καὶ*. Id est, totum pastilli pondus drachmarum centum sexaginta octo est, id est vnciarum XXI.

Hanc quidem vnciæ diuisionem Romani in octo octauas appellauerunt, quibus aliqui nomen aliud non dederunt, vt ille cuius quædam de notis ponderum ex vetusto codice sunt. Largo adscripta. Multi eas drachmarum nomine appellant, vt Balbus ad Celsum de agri memoria, Galen. & plerique alii præsertim Græci. Verum nō omnes eodem modo yn-

ciam in octo partes diuiserunt, sed nonnulli dixerunt eam drachmarum septem esse, alii vero septem & dimidie, vt scribit Galen. lib. 5. *τὸν χῆ' ἥλην* his verbis: *ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ὄρεων καὶ πνιπῶν μὲν ἐπὶ αὐτῇ ἡμίσειας δραχμῶν ἐν αἰ φασιν, ἀλλοὶ δὲ ζ' μόνον, ἑτέροι δὲ ἢ*. hoc est, quoniam plerique vnciam quidem drachmarum septem & dimidie esse dicunt, alii vero septem tantum, alii vero octo. Sed qui septē drachmarum vnciam constituunt, proculdubio drachmæ vocabulo intelligunt denarium. Atque hī nomine mutato parum cautos fallūt, cum ipsi rem ignorasse videri non debeant. Id quod testatur Gal. lib. 8. *τὸν χῆ' τόποις*, scribens: *περὶ δὲ αὐτῶν δὲ ὅτι δραχμῶν λέγονται νῦν αἰ τοῖς ὀνόμασι ἀπὸ τῶν ὄρεων ὅτι ὁ ὄρεον ὀνομάζουσι*. hoc est, manifestum autem est quod drachmam dicimus nunc in his omnibus, quod Romani denarium nominant. Qui vero dixerunt septem drachmarum & dimidie vnciam esse, videtur quidem aduertisse drachmam leuiorem esse denario, non tamen plane, quantum interesset, examinasse. attamen eorum sententiam tanquam veram, artis veterinariae medici receperunt.

Est etiam vncia apud Latinos mētura quæ rerū interualla metiuntur. Est autem pedis pars duodecima. Id quod clare explicat Frōtinus his verbis: Pes, inquit, habet palmos quatuor, vncias duodecim, digitos sedecim.

*ὄρεον*. cicatrix. est naturale carnis tegumentum, calli modo duratum & cutis vice vlceribus superinductum. Ea cuti quidem est quam simillima, cutis tamen non est, quando & deficiore a vīluta tūque sentitur & ratione non modo densior, sed & sicciōr, ex eo quod pilos non edir, intelligitur. Siquidem cutis talis omnino qualis erat quæ perierit prorsus restitui non potest, sed simile quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, potest, non tamen plane cutis. Est enim spermatica, eamque ob causam talis prorsus regigni non potest. Quod autem in eius locum substituitur, cicatrix, non cutis dicitur, id ex subiecta creatur carne valde reficcat. Quod quamuis naturæ opus sit, perficitur tamen etiam medicamentis, quæ carnem ipsam vehementer ficiēt & adstringant. Nam quoniam cutis carne ipsa tum ficiōr est, tum etiam densior, si carnem ficiabimus & adstringemus, cuti etiam perfimilem reddemus. Tanta autem ficiandi vis & adstringēdi esse debet, vt non modo quod in carnem affluit, verum etiam humor qui secundum naturam continetur in ipsa carne, consumatur.

Hæc ἐπιπλαστική ἀ medicis, ipsumque medicamentum ἐπιπλαστικόν appellatur. vide ἐπιπλαστικὸν φάρμακον.

*ὄρεον*. gingiuz. dicuntur *πὸ τοῦ ὀδόντος*, id est *ὀδόντος* vt ait Rufus, hoc est caruncula dentibus circumposita, quarū quidē connectio *χελυδὶς*, eodem auctore, nuncupatur. In ijs nuper natoꝝ dentes latent, & veluti in præsepulis conditi sunt, & vt sicciōribus adstrictisque continentur, ita redundante humi-

humiditate laxioribus decidūt. Nervos habent à tertio pari, vt & dentes, per quos sentiunt & dolent, sæpeque in ijs dolor est qui in dente putatur esse.

*Οὐλομελίη*, integra & absoluta natura cuiusque rei, vsurpat ab Hippocrate de adenibus *ἐν τῇ αἰεὶ ἀρδρῶν*, de quarum *ὀλομελίη* scripturum se librum professus est.

*Οὐλόφονον*, dicitur ὁ *χαμαρῶν*, non omnis tamen, vt quibusdam placet, sed tantum is qui viscū profundit, vnde Nicander in Alexipharmacis *οὐλόφονον ἔχον* dixit, quasi viscosum. & Dioscor. lib. 6. *ἔχας* inquit qui *οὐλόφονον* appellatur.

*Οὐραχός*, finē

*Οὐραχός*, est meatus vrinarius in medio umbilico situs, à fundo vesicæ exorians & in allantoidis cavitatem insertus. Continetur medius inter duas venas duasque arterias umbilicum constituentes. Est autem allantoidis tunicæ initium, perforaturque satis lento & evidenti meatu ad fundum vesicæ ipsius foetus, sic vt allantoides cum vesicæ *τῷ οὐραχῷ*, qui medius inter utraque est, coniungatur. Per eum vrina foetus defertur in allantoidis cavitatem longam, angustam, rotundam, quæ in ipsius fines magis effunditur, ne amnion, chorion, vterum, ipsamque foetum premat. Neque enim vrinam retineri intra vesicam expediebat, neq; per vesicæ cervicem reddi, ne foetui circumfusa eius cutem exulceraret.

*Οὐράιον*, τὸ πέρας τῆς ὀφθῆς, hoc est extrema pars ossis, apud Hippocr. *ἐν τῇ αἰεὶ διαίτης ὄξιν*, quo loco *πίνοντας οὐράιδας* vocat, qui vsque ad *οὐράιον*, hoc est ossis extremum, protenduntur, vt Galen. comment. 4. annotavit.

*Οὐράιναι*, sic à quibusdam dicuntur *οὐρητῆρες*, hoc est vasa vrinaria.

*Οὐραία*, cognomētum fuit ἡ *ἑλιδος*, sicut annotarum est apud Dioscoridem.

*Οὐραϊνον*, est collyrium *ἀδελφῶν* descriptum & ab Aetio & à Paulo, sed parum differenter.

*Οὐρανίσιος*, sic quidam τὸν *ὠφθαλμὸν*, hoc est palatū, appellant, quod in cœli modum cameratum sit, dicitur etiam *οὐρενός*.

*Οὐρανός*, cœlum, sic dictus est ab Hippocr. more vulgi aer qui supra nos est vsque ad nubium regionem, vt annotat Galenus comment. 2. in lib. 3. *τὸν ὀφθαλμῶν*. Sic etiam à quibusdam dicitur ἡ *ὠφθαλμὸς*, hoc est palatum, vt Aristot. lib. 2. cap. 17. de part. anim. *ὠπὸ δὲ τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ σῶματι ἡ γλῶσσα τοῦ ζώου ἐστίν*, id est, lingua animalibus in ore cœlo (hoc est palato) subiacet. Plinius tamen cœlum capitis supremam partem dicere videtur, his verbis: Cerebrum viscerum excellentissimum est, proximumque cœlo capitis.

*Οὐραχός*, vide *οὐραχός* paulo ante.

*Οὐρητρα*, est meatus vrinarius à ceruice vesicæ ad extremam vsque glandem porrectus. Hic in viris longus, angustus & s Romanæ literæ modo obliquus est. In mulieribus vero brevis, latus & rectus. - Ex nervosa tunica contexitur instar coriaceæ fistulæ.

*Οὔρημα*, hoc nomen habetur apud Hippoc. extremo libro de natura humana. Sed Galen. negat vocem hanc vnquam ab Hippocrate aut Polybo vsurpatam fuisse. Significat autem idem quod *οὔρον*, vel *σπέρμα*.

*Οὐρητῆρες*, sunt meatus duo per quos vrina à renibus in vesicam stillat. Habetur vtrinque vnus, qui constans tunica tenui, sed densa & fibris tantum obliquis texta, à renis sinu per eius simam partem super lumbos fertur, vbi alteram à peritonæo tunicam venulis & arteriis intertextam mutuatur: tandem vero inter vesicæ tunicas spatio breui interlapsus, paulo supra vesicæ os in ipsius capacitatem erumpit. Ad ipsum autem foramen inembranula geminæ ex vesicæ corpore pro-pendens, veluti processus, quidam, quæ vrina in vesicam ab vrētere delabente cedunt & aperiuntur, eademque, vbi vesica plena est, vrinam in vrētera regei & remeare prohibent.

*Οὐρητικοί πόρος*, iidem qui & *οὐρητῆρες*.

*Οὐρίας*, fistula vrinaria, quæ in ceruicē vesicæ fieri solet.

*ὠς*, ὠπός, auris. Est pars corporis organica ad audiendum comparata. Eam natura ex diuersis corporibus, vt nervis, membranis, ossibus, cartilagine artificiosissime composuit. foramen primum amplum atque anfractuosum in osse temporum lapidoso, vtrinque vnum machinata est. In id auditorius nervus à quinta cerebri coniugatione vnā cum dura cerebri membrana incidit, cumque ea in latitudinem sese explicans foramen sublinat. Qua in re parē similemque omnino cum ipso foramine cavitatem adipiscitur. Itaque id foramen hoc modo explicante se nervo vndique conuestitum, *πόρος ἀκουστικός*, id est meatus auditorius, appellatur, quo nomine nō modo cavitās ipsa nudā, sed & nervus ipse auditorius à medicis appellatur, aliis definiētibz *πόρον ἀκουστικὸν* cavitatem esse, aliis nervum. In quo nihil erratur, siquidem nervus ipse excavatur, secundum foraminis ductum. Vocatur autem etiam à quibusdam *πόρος πύλῆς*, id est foramen cœcum, non quod verus peruiusque meatus non sit, sed quod propter varios flexus & quia paulatim arctissimus euadit, vix vsque ad auditus organi amplitudinem setam aut aliud quid admittat. Est autem nervus hic qui ad aurem est, reliquis per quos alii sensus exercentur durior effectus minusque sensibilis, in quo naturæ providentiam licet admirari. Nam cum nervus hic excipere debeat sensibile extrinsecus occurrens, ne ab eo offenderetur, natura os durum & densum auribus oppositum, flexibus obliquis instar labyrinthi pertudit, quo frigidi quidem aeris vires integras, quas ipse ex recta irruptione erat habiturus, flexuum varietate sensum exolueret, & aliorum exiguum corporum imperum mæandris illis frangeret. Nec vero eo solum anfractu pariendi difficultatē nervo auditorio com-



parauit, verum etiam propria ipsius constructione. siquidem cum durum, quoad licuit, effecit. Durissimus enim ad audiendum ineptus est, mollis autem iniuriis valde obnoxius. Ob eam causam durior quam ut actioni conueniat, nervus auditorius factus est, & propter duritiem, quanquam ita positus est in vicino, tamen vehementissima medicamenta tolerat, ut docet Galenus libro 6. methodi medendi. Præter foramen & nervum corpus quoddam extra prominet ex cartilagine carneque constitutum, Latini auriculam, Græci *πτερυγία* vel *αὐτίδα*, si voles, appellant. Est autem ea meatui auditorio circumposita, sinuosa & intus cava, forisque conuexa, tum ut interno meatui propugnaculum esset aduersus externas iniurias, tum ut & ipsa sonum aliquem funderet, aere circum gyros eius commorante, nec citius æquo præterlabente. Ea vanni modo auricularium meatum cingit. Ac huius quidem superior pars nomine caret, ut ait Aristoteles, quo tamen loco Gaza pinnam vocat, non proprio nomine: inferior autem *κοίτη*, id est fibra, appellatur: qua in parte quod prominet, *μεσολέων* est. Rursum vero superioris auriculæ partes expansæ, *πτερυγία*, quasi dicas alas: refractæ vero inflexæque, *κοίτη* appellatur, ut scribit author Introductorii, qui præterea in eadē superiore auricula quod concavum est, *καρχίον*, id est conchulam, vocat, & particulam illam *κοίτη* seu fibræ superpositam, *αὐτοκοίτην*. quanquam sunt qui eo nomine quod asperum in superioris auriculæ circumferentia est significari putent. Sunt vero & *τὰ ὦτα*, id est aures, in corde, ad earum quas nunc descripsimus similitudinem dictæ, quas Galenus libro sexto de usu partium definit esse epiphysses quasdam tenues, nervosas & canas ante cordis orificia constitutas: ut enim aures capiti vtrinque annexæ sunt, ita & hæc appendices ipso cordis corpore nervosiores & magis cuticulares vtrinque cordi appendæ sunt. Laxæ quidem illæ per se sunt & iccirco concavæ, cum vero cor dilatatur, quo modo membranæ tenduntur ac contrahuntur, ob idque ipsum materias ex se ipsis expressas cordi præmittunt. Quæ autem proxima ipsis sunt vasorum orificia, propterea quod à corde intro vehementer tenduntur, materias ab auribus impulsas deducunt. Ipsum vero cor omnibus quæ in mentem cuius venire possunt attrahendi facultatibus præditum, arripiens ac veluti exorbens, influentes materias citissime suorum ventriculorum sinibus excipit. Duæ autem aures illæ sunt, singulæ scilicet in utroque vasorum materiâ cordi inuehenti, in dextra quidem parte, quæ vena in cordis sinum inibi inseritur: in sinistro vero, quæ arteria venosa. Ac illis quidem natura remittentem tribuit, quo facilius una cum corde contraheretur, & eius motum sequeretur: easdem vero robustas effecit, ne corde vehem-

enter materias attrahente rumperentur: fortissimum enim est quod nervosum est. Causæ autem eam ob causam sunt, ut in ijs materiæ contineantur & præsto sint quæ implendo cordi sufficiant. Materiæ autem illæ quæ cordi subministrantur, sunt sanguis & aer: quorum ille quidem à ramo venæ canæ in dextram aurem inserto, cordi infertur, hic vero in cor per sinistram aurem ab arteria venosa proficiscitur.

*Ὀφθαλμία*, emplastri nomen est desiccantis & anodynæ & ad permulta utilis, ut habetur apud Actium lib. 15. cap. 14. atque item ultimo, ubi paulo aliter describitur. Emollic maxime & tumores dissolvit.

*Ὀφθαλμία*, est inflammatio adnatæ oculorum membranæ. Sed cum dupliciter omnis inflammatio dicatur, ut scribit Galen. lib. 2. ad Glauconem: una humida, altera sicca: proprie dicta *Ὀφθαλμία* inflammatio humida est. Quæ enim sicca est, non simpliciter *Ὀφθαλμία*, sed *Ξηροφθαλμία* nuncupatur. Inflammatione quidem tumor, tensio, dolor, calor, ruborque eius tunice testantur: humiditatem vero tum venarum plenitudo, tum lacrymæ ex oculis manantes. Gignitur sanguine copiosiore in adnatam tunicam, quam Græci *ἐπιπεφυκτά* vocant, affluente. Ea autem cum & ex pericranio originem ducat, & totum oculum cum musculis suis committat & sede sua contineat, plerumque accidit ut gravio ophthalmia tentata, non modo dolor sentiat, sed eum etiam & capiti & genis & reliquis circumpositis partibus communicet. Celsus *ὀφθαλμίας* Latine lippitudinem nominat. Paulus lib. 3. eam speciem esse *καυμά* prodidit, quo nomine calidæ & humidæ oculorum cum rubore affectiones significantur. Sed hoc interesse dicit, quod *καυμά* ab externa quadam causa fit, ut fumo, sole, pulvere, oleo: *ὀφθαλμία* vero non à manifesta modo causa, verum etiam interna, hoc est sanguinis fluxione, excitatur.

*Ὀφθαλμός*, oculus. Sic dicitur totum instrumentum visionis. Instrumentumne an partem organicam voces, nihil interest, modo intelligas partem esse à natura comparatam ut per eam visio fieret. Quod ut natura melius assequeretur, geminam esse voluit, & utrumque sublimi in loco collocavit, ut inde tanquam è specula plurima eminens intuerentur, & quæcumque nocere aut prodesse possunt præviderent. Quam unam ob causam factum est, ut necesse habuerit natura caput in summo totius corporis loco constituturæ, sicut Gal. literis prodidit. Poterat enim omnia quidem alia munia, alia quavis in parte positum exercere, solam visionem non poterat, quod tam & ab edito loco fieri oportere, & brevissimos, ideoque cerebro proximis, opticorum nervorum ductus esse. Oculorum permagnus est usus & præcipua dignitas, eosque propterea non modo natura summo artificio fabrefecit, sed loco etiam tutissimo recondidit, ne facile externis iniurijs

minimis paterent. Loco enim concavo & duro veluti in antro quodam conditi sunt, & hinc fronte atque superciliis, inde malis leniter extuberantibus, naso, temporumque ossibus quasi vallō quodam muniti. Data sunt & palpebræ valde molles, quibus ad omnia aduersa celerrime & momentō conninerent, neque pilis, quos *βλεφαρίδες* vocant, præditæ ad leniora, quæ oculis incidere possent, declinanda. Est autem oculi figura sphaerica, multiplici partium structura, quarum alia etiā sphaerica sunt, alia semicircularēs tantum, alia verō secundum diametrum protēnsæ. Vt autem omnis cūculus centrum habet, sic oculi cētrum est humor crystallinus, *κρυσταλλοειδής* à Græcis vocatus; non ille quidem fluidus, sed ceu cera mollior, consistens. Is totus sphaericus est. Eum autem ambit tunica tenuis & valde pellucida *αεχροειδής* dicta, non totum quidem, sed partē tantum anteriore: semicircularis enim est. humoris crystallini adnascitur nō aliter quam cōpis tenuissima quædam pellicula. A posteriore humoris crystallini partē situs est humor alius *υαλοειδής*, hoc est vitreus, nuncupatus, copiosior longe quam humor ipse crystallinus. semicircularis autem est, vt qui partem modo posteriorem humoris crystallini amplectatur, nec eius diametrum excedat qui à dextra eius partē in sinistram ducitur. Sicut autem vitreus ille humor posteriore partē humorem ambit crystallinum, ita anteriore post tunicam *αεχροειδής* diffusus est alius humor, *υδαρπιδής*, hoc est aqueus, & à quibusdam *υδαρπιδής*, hoc est albugineus, dictus. ipse etiam semicircularis, vt qui medium crystallinum anteriore tantum partē complectatur. Ita fit vt aqueus cum vitreo sphaeram vnā constituat, cuius centrum crystallinus humor sit. Eos autem veluti diametēr quidam distinguit, & quasi paries quidam medius dirimit tunica quædam ab vna initium ducens. Huicigitur tunicæ & humoris crystallini partē vna vitreus humor contigit posteriori sui partē alia tunica molli & plane mucosa continetur & clauditur, quæ non est aliud quam nervi ipsius optici substantia, vbi à suo principio ad vitreum humorem peruenerit, resoluta & dilatata, & bifariam veluti in duos truncos discissa, multoque mollior ipso cerebro effecta, adeo vt eam multi tunicæ nomine nō sint dignati. Ea posticam tantum vitrei humoris partem complectitur, ideoque semicircularis est, perinde atque humor ipse vitreus, simulque multas graciles & obscuras venas atque arterias intertextas habet, ex quibus omnibus factum est vt *ἀμφιβληστροειδής*, hoc est reticularis, vocaretur. Vt autem nervus ipse opticus in eam tunicam resoluitur, sic & tenuis membrana quæ nervum illum opticum inuoluit, à tenuibus cerebri membranis profecta, degenerat in aliam

tunicam, & eam quidem ptope sphaericam, quæ non posteriore tantum parte, vt *ἀμφιβληστροειδής*, sed anteriore etiam omnes iam dictas oculi partes ambit & complectitur: contigua parte quidem postica tunicæ *ἀμφιβληστροειδής*, antica verō humori quem *υδαρπιδής* diximus nuncupari. Ea *παρρειδής*, hoc est vnea, vocatur, quod vuz folliculo, à quo pedunculus auulsus est, quā simillimā sit: vt enim illē, ita hæc tunica partē sui anteriore leniter compressa est, & media partē, qua pupilla est, medio foramine concava. Eam vero etiam totam circundat & complectitur alia tunica *κωκκοειδής*, hoc est cornea, nuncupata, nata ex duriori membrana nervi illius optici, à crassiss cerebri membranis prodeunte, & in eam, non aliter quam tenuis, vtrinque resoluta. Quæ cum reliquis fere partibus paulo obscurior sit, parte tamen anteriore, qua pupillam contegit admodum pellucida est: tota orbicularis est, nec, vt *παρρειδής*, depressa anteriore parte. quō fit vt quā pupilla est, plurimum, à rhagoide distet, spatiumque medium inter eas sit, non inane quidem, sed humore etiam illo aqueo, qui per pupillæ foramen eo manauit, & spiritu visorio vndique plenum & vehementer tēsum. Insuper verō alia tunica est quæ *ἐπιπεφυκιδής* dicitur, omnium extrema, ex pericranio ducens originem, quæ oculo adnata ipsum continet, vicinifque partibus alligat. Ea vero non conuenit oculum vniversum, vt quæ nullo modo tunicam *ἀμφιβληστροειδής* attingat, sed à lateribus tantum & oculorum hæmisphaerio corneæ tunicæ connascitur, eamque complectens ad iridem vsque progreditur, quō cum peruenerit, summa tenuitate euanesceat, neque pupillæ vel corneæ, qua pupillam contegit, prætenditur, ne visui officiat. Nequid vero ad oculi perfectionem deesset, natura ei septem mūsculos attribuit, quibus non modo sua sedē contineretur, quasi vinculis, sed in omnem etiam partem expedire moueretur. Eorum vnus superne situs oculum sursum mouet: vnus inferne positis, deorsum demittit: vnus qui ad magnum canthum est, versus nasum impellit: vnus qui ad paruum canthum situs est, versus *ὕψος* inflectit: duo quorum vnus à magno cantho ad paruum superne porrigitur, alter inferne à paruo cantho ad magnum extenditur, circumagunt: vnus verō in duos vel tres diuiduus, neruum opticum ambiens & in corneam tunicam prope dimidiam insertus, intro impellit. His partibus instructus oculus visionem exercet, quarum tamen in ea actione sicut vsus, ita dignitas etiam impar est. Earum enim quædam sunt per quas visio fit, quædam sine quibus fieri nō potest, alia quibus melius fit, alia verō quibus ipsa conseruatur, quemadmodum Galenus lib. 10. de vsu part. demonstrauit.

*ὁφθαλμῶς*. genus est deligationis apud

Hippocr. ἐν τῇ κετ' ἐν τῇ κετ'. Oculo adhiberi consuevit, vel cum procidentia peticitur, vel vt quæ imposita ipsi sunt contineantur. Sunt autem variz huius generis differentiz in lib. de fasciis explicata.

Οφίαισι, est affectus capitis, quo capilli primum extenuati postea decidunt certis spatiis in serpentis similitudinem. Species est areæ Celso. Sic dicta quod serpentis speciem præ se ferat. Incipit enim ab occipitio capillus defluere duorum digitorum spatio, vitiumque ad aures duobus capitibus serpit, quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Infantibus fere accidit, & per se sæpe sine curatione finitur. Idem reuera cum alopecia malum est, solaque figura ab eo differt. Nec vero soli modo capiti, sed mento etiam affectio hæc aliquando contingit. Nascitur ab humorum vitio ex quibus pili nutriantur. Eiusmodi namque vitioso alimento corumpuntur & decidunt.

Οφίοκορδον, dicitur à quibusdam ἡ κείπαισι, sicut habetur apud Dioscor.

Οφίοκορδον, allium anguinum. dicitur allium sylvestre, quod ad omnia longe est efficacius satiuo.

Οφιοσκόφωλη, dicitur ἡ ἀμπελαεική, id est vitis alba, anthore Dioscoride, quasi anguina vna. Ratio forte nominis est quod in sepibus nascatur, in quibus & angues plerumque latent, vel quod anguinem modo serpat, clauiculis suis vicinos frutices comprehendens, quam ob causam etiam vulgo Colubrina dicitur.

Οφίτης λίθος, est marmor maculosum in modum serpentis. Eius tria genera dicuntur esse candidum, nigricans, cinereum, quod πεφεία vocant. Omnes, vt scripsit Dioscorides, alligati contra capitis dolores & serpentium ictus profunt.

Οφρύς, supercilium. sic dicitur pars ea frontis quæ pilos habet. Est autem supercilium vtrinque vnum. Inter ea quod medium est, μεσίοφρυς dicitur & μετώπιον, vtrumque à situ

nomen inditum. Mart. Capella lepidoglabellam vocauit, quod ea pars glabra sit & depilis. Pars autem ea quæ naribus proxima est, ὀφρύων κεφάλι: quæ ad tempora accedit, ὀφρύων οὐρὴ dicitur. pilos autem ipsos πλάρι- que πύλοις appellant. Quod vero in superciliis prominet velut imbricamentum quoddam aliofuit humores deriuans, γείων & γείστομα dicitur: Gaza grundam apud Aristot. interpretatus est.

Οφρύς, herbæ nomen denticulato oleri similis, & quæ duobus tantum foliis representatur. vsus eius ad nigrandos capillos, Plinius.

Οχέπιαλα, sic vocantur à quibusdam ipsa narium foramina, quæ etiam θαλάμους aliqui appellant.

Οχέρι, dicuntur apud Hippocr. ἐν τῇ κετ' ἀρτηρίας, atque arteriæ, quod per eas sanguis vehatur. inde ὀχέριον per riuos ducere, & παροχέριον deriuare significat.


Οχέρις, vocatur à quibusdam scrotum, quod magis vsitato nomine ὀχέον appellant.

Οχέρι, tumores verrucosi tuberosique, quales in elephantis apparent. inde labra vlcera prætumida, callola & dura, ὀχέριον, quasi dicas verrucosa, appellantur.

Οχέρι, pyrus agrestis: Theophr. lib. 2. de histor. plantarum, cap. 7. Frequentius ὀχέριον: vnde ὀχέριον, Hesychio ἀπία, pyra, sylvestria scilicet.


Οχέριον ὀδόντις, genuini dentes. Sic dicuntur nouissimi maxillares, & qui iam adultis tum viris tum mulieribus gignuntur. Iam vero, inquit Plinius, quibusdam mulieribus anno etiam octogesimo maxillares illi nouissimi non sine dolore exierunt. Viris quodque idem euenisse accepimus, quod certe ijs accidit quibus in iuuentute ipsi genuini nati non fuerint. Sed quibus in iuuentute non fuere nati, decidere in senecta & mox renasci, certum est. Iidem etiam dicuntur κραινέες, & à quibusdam σπρόν- σπρες.

Οψίς, ἡ κόρη, pupilla. vide in dictione κόρη.



# IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

## TO II.



**Μαχαρία.** placentæ genus est in modum rote papyro inuolutum quo diutius durer. Apud Alexandrinos celebre illud fuit.

**Μαχαρίον.** dicitur à quibusdam chamæleo albus, ut habetur apud Dioscor.

**Μαχαρίον.** vides. vide **Μαχαρίον**, & **Μαχαρίον**.

**Μαχαρίον.** dicta fuit à quibusdam eo nomine inscripta, sicut legitur apud Dioscor.

**Μαχαρίον.** auctore Plinio, plāta est radice bulbi magni, colore rufo vel purpurecente, gustu amaro qui os accendat, foliis lilii sed longioribus. Sunt qui pusillam scillam malint appellare. Galenus radicem eius tum gustu tum viribus scillæ similem fecit, ita ut nonnulli, cum eius non datur occasio, pancreation in vicem sufficiant. Sed & Paulus & specie & viribus scillæ comparauit. Hydropicis & splenicis cum melle datur. Potest ad eadem ad quæ scilla. Idem Plinius cichorium quoque propter singularem salubritatem **Μαχαρίον** & **Μαχαρίον** ab aliquib. appellari scribit.

**Μαχαρίον.** est glandulosum corpus in medio mesenterio situm, vasorum diuisiones confirmans. Nam cum infiniti properami venæ portæ per mesenterium dispersi sint, chylū ab intestinis præsertim tenuibus exuentes & in eum deferentes, sciens natura eos propter exiguitatem infirmos esse & iniuriis obnoxios, ventre præsertim sæpe laborante salu, ictu, compressu, vociferatione, spiritus contentione & rerum grauium impulsu, glandibus singulas vasorum scissuras munivit securasque reddidit, qui vsus est non huius modo glandulosi corporis, sed aliarum quoque glandularum, **αδύνα** vocant, quæ pluribus aliis corporis partibus indita sunt à natura.

**Μαχαρίον.** nomen medicamenti, non vnius quidem sed multiplicis. sic dictum est collyrii genus quoddam **αδύνα** vocatū, quod describitur à Galeno lib. 4. **Μαχαρίον**. Item aliud Erasistrati **αδύνα** eodem libro descriptū, & apud Paulum lib. 2. cap. 22. quo tamen loco quidam **αδύνα** legunt. Idem confectiois genus ad tussim, empyema, tabem, orthopneam & alia permulsa, quod habetur apud Galenum eiusdem operis lib. 7.

**Μαχαρίον.** nomen est liquidi collyrii, quod quidam **αδύνα** malunt appellare, de quo supra.

**Μαχαρίον.**

**Πάθος.** passio: multa significat. Generaliter quidem dicitur omnis motus qui ab altero fit in alterum. Quippe agentis motus, actio est: eius vero quod ab eo est affectum, passio. Prisci enim motus omnes, etiam qui naturaliter se habent, nisi actiui sint, **πάθος** nominant, sicuti etiam ipsos actiuos motus, actiones. Eo pacto & Plāto sensuum alterationes **πάθος** & **αδύνα** appellauit, in visu quidem eas quæ ab albo, nigro, flauo, & cæteris coloribus fiunt: in tactu quæ à calido, frigido, humido, secco, molli, duro, cæterisque id genus: atque ad eundem modum in singulis reliquorum sensuum: sed & voluntatem passionem vocat. Ac à veteribus quidem **πάθος** priuatim de omni extrinsecus motu dicebatur siue in loco, siue in qualitate fiat. Ergo si **πάθος** motus est, motus autem ex eorum numero non est: quæ esse absolute dicuntur (siquidem nullo temporis, nec sermonis, nec etiam motus vllius) perspicuum est **πάθος** in ipso ut sic dicam, fieri esse suum obtinere. Suam namque habet in ipso verti, mutari, alterari aut modo quouis alio moueri generationem. Quandiu enim aliquid mouetur, patitur: cum desit moueri, non amplius pari, sed affectum esse dicitur. Differt enim **πάθος** & **αδύνα**, hoc est passio ab affectione siue dispositione, solo motu. Quippe cessante eo quod alterabar, alteratio quæ in passio iam remanet, **αδύνα**, hoc est affectio, eius est. Iam ergo non in ipso fieri, ut **πάθος**, sed in eo quod manet & in subiecto corpore post motum reuertatur, **αδύνα** constat. Hæc cum à veteribus ita distincta fuerint, nunc tamen per abusum etiam ipsæ **αδύνα** quæ ex passione iam prouenere, nec amplius in motu sunt, **πάθος** appellantur. Cum autem omnem, etiam qui naturaliter se habet, motū **πάθος** veteres dixerint, postea tamen quidam id nomen ad eos tantum motus contraxerunt qui præter naturam accidunt. Alii vero ne de iis quidem omnibus dici vouerunt. Eas enim præter naturam affectiones quæ morbum præcedunt causæque rationem obtinent, causas tantū dicimus, non **πάθος**. Quæ vero illum sequuntur, si actionum offensa sunt, & **αδύνα** & **πάθος** vocamus, sicut & immodicas vel inanitiones vel retentiones: si vero affectiones sunt, hoc est, si in corporū affectu consistat, veluti vitiosus color, supra passionis & symptomatis appellationem etiam **αδύνα**, hoc est, affectus siue affectiones, vocamus, ita nimirum ut sunt. Itaque proprie **πάθος** & morbi & eorum symptomata à medicis appellantur,

hoc est, omnis *ἀφ' ὧν* contraria naturali corporis nostri constitutioni, non tantum ubi aliquid alicui parti præter naturam accidit, sed ubi etiam deest quod secundum naturam influere consuevit. Sed læso exortu nerui iuxta spinalem medullam, ideoque vi sentiendi ad digitos non amplius influentem, digiti pati dicuntur: sic etiam cibi portionisque penuria passio est. Quod enim alicui ad naturalem eius gubernationem quouis modo deficit, id non immerito passio eius appellari potest.

*Ἀσθηματὶς* & *ψυχῆς*. affectus animi. vide *ὑπερθεσίου* *διώμας*.

*Παθολογικὸν*. Id dicitur quod proprie affectionis speciem significat. Proprie quidem de signo dicitur, improprie de symptomate, & quatenus tantum morbi naturam indicare potest. Nam & symptoma proprium aliquando signum est morbi cuiusdam interioris atque occulti à quo prodiit. Quod autem eiusmodi est ut morbi speciem ostendat, necessario morbum consequi oportet, & omni solique eiusmodi morbo semperque proprium esse. Nam quæ non necessario consequuntur, quæque nec omni nec soli nec semper insunt, *συμπεριγενή*, hoc est, assidentia, appellantur, eaque non morbi speciem, sed eius aut differentiam, aut morem, aut aliquando magnitudinem indicare solent. Si quidem *παθολογικὰ* separari non possunt, & affectionis, ut ita dicam, constituunt essentiam, ideoque ut inseparabilia sunt, ita pariter cum morbo inuadunt, pariterque desinunt: *συμπεριγενή* vero ex iis sunt, quæ sæperantur accidunt, & proinde alias cum morbo inuadunt, alias superueniunt, alias neque omnino adsunt. Itaque perpetua sitis, calorque perpetuo adurens, signa sunt ardentis febris pathognomonica, ut & perpetuum delirium cum febre phrenitidis: atque lateris dolor punctorius, difficilis respiratio, tussis & acuta febris, pleuritidis. Veruntamen non est facile in quouis morbi genere vnum aliquod pathognomonicum signum reperire, quod ei omni, soli, semperque insit: id quod tamen pathognomonici signi ratio postulat. ideoque in plerisque morbis, signi vnius pathognomonici loco, ipsam *συνδρομὴν παθολογικὴν* à medicis & Galeno ita vocatam per sæpe obseruamus: veluti in pleuritide, cuius commemorata signa si per se singula spectentur, propria pleuritidis non sunt: composita vero simulque perpensa, non aliam morbi speciem quam pleuritidem indicare possunt.

*Παιδερὶς*. à quibusdam dicitur *ἡ ἀκανθα* siue *ἀκανθὸς*, ut Dioscorides & Plinius testantur. Pausanias tamen scribit genus herbe Sicyonæ, in vno tantum Veneris septo nasci, quod *παιδερὶς* vocent, folium fundens fagino minus, omnino quernis simile, altera parte cadidum, altera subatrum velut albæ populi, eamque ibi tantum spectari. Genus etiam vnguenti *παιδερὶς* veteres nominarunt, quo

mulieres nimium cutis candorem occultabant, & vernaculum faciei colorem mentiebantur. Alexis poeta feminas albore nimio decolores uti præderote solitas in comædia significauit, quod & Ægyptium vnguentum dicitur.

*Παιδερὶς φάρμακον*. cataplasmatism nomen apud Gal. libr. 4. *πῶς* & *πῶς*, quod & *παῖς* à quibusdam inscribitur, ad omnem oculorum fluxum & lippitudinem.

*Παυσία*. herba est cui caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera. mas folia iuglandis habet, in femina Smyrni more diuiditur. summo caule siliquas emittit, veluti Græcas nuces, in quibus cum dehiscunt, multa granula rubra, acinis Puniceorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, albæ feminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhzrent, ut in hastula regia. Radici vis est acris & leuiter subamara, & sicca cum nonnulla adstrictione: menses prouocat, renes & iecur purgat instar amygdalæ pota cum vino: adalligata vero puero morbum comitalem abigit.

*Παυσία*. antidoti nomen apud veteres celeberrimi ad distillationes, tussis, & omnes thoracis pulmonisque affectiones, cuius descriptio habetur apud Aetium libr. 13, capite. 102.

Est & catapotium Andree *παύσιον* dictum, ad splenem coparatum, quod myrices fructu tuso cribratoque constat, galbano misto & in catapotia redacto, ut refert Gal. libr. 9.

*πῶς* & *πῶς*.

*Παπύλη*, *σπόδος* καὶ *λεπτότατον* ἢ *ἀλευρή*. pars farinæ tenuissima, flos ipse polentæ, pollen.

*Πακκιστὸν κοινὸν* *εἶναι*. species *κακκίς* *εἰς* *αὐτὸν*. cuius descriptio habetur apud Aer. lib. 7.

*Παλαστή*, siue *πάλαιστος* genere masculino, mensura est apud Græcos qua rerum intervalla dimeriuntur. Constat autem ex quatuor digitis, de qua sic Hesychius: *πάλαιστος*, τὸ πάλαιον *δαικίλινον* μέτρον. hoc est, palæste dicitur quatuor digitorum mensura. Sic dicitur, ut author est Iulius Pollux, *ὅτι πάλαιστος οὐκ ἔστιν ὅσα, πῦνις πλῆσιον πῦνις δαικίλινος*. hoc est quoniam prope coniungit ossa, siue prope vnit ipsos digitos. Ab ea sit *πάλαιστος*, quo Dioscorides virtut de veratro albo: & *δαικίλινος*, quo in herba phalaride: & *πάλαιστος* & *πάλαιστος*. Dicitur autem *πάλαιστος* alio nomine *δουμή*. vide suo loco.

*Παλιγρόν πῆγμα*. dicitur apud Hippocr. malus affectus qui recruduit & quasi iterum excidit. *αἰὲς* enim iram significat.

*Παλμπία*. sic à quibusdam dicitur, ut ait Dioscorides, *πῆμα* *ξηρὸν*, hoc est, pix arida, ad differentiam *πῆς* *υγρᾶς* liquida enim pix secundo decocta in spissam siccamque transit. Neque enim sicca pix aliud est quam cocta bis resina. Nam prima decoctione pix fit,



secunda bis pax, hoc est, *παλμπία*. Eius genera etiam duo sunt, viscosum & aridum: priori nomen *βρομαί*, visci modo lento. vide *πίστα*.

*Παλμπόρουμ*. recurrere, reuerti. Verbum ab Hippocrate usurpatum cum aliis in locis, tum sect. 2. Prognost. cum humores à quibus tumores præter naturam excirabantur, remeant in easdem sedes unde prius venerat, ut eo loco Galenus interpretatur.

*Παλμπόρουμ σφυγμύς*. recurrens pulsus. Est pulsus inæqualis in vna pulsatione & vna parte arteriæ, tactū secundo feriens post absolutam diastolen, antequā systole absoluta sit. Hic *δύσκολος* proprio nomine appellatur, de quo vide suo loco.

*Παλμπία*. *πᾶσι δ' ἡλίου ἀπαραμμένα*, hoc est à sole auersa, ut explicat Gal. *αἱ τῆς γλώττης*.

*Παλιούρος*. paliurus. frutex est aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum innescit. Non obscuram habet adstringendi facultatem, ut folia eius & radix vëtrementem cohibeant, digerit. fructus etiam incidit vehementer, ut & calculos vesicæ comminuat, & pectoris excreationibus medeatur.

*Παλμύς*. palpitatio. est diastole præter naturam in aliqua parte facta. fit in omnibus corporis partibus quæ distendi dilatarique possunt, hoc est, naturaliter mollibus, ut & extendi & rursus in se fidere possint, ut cute & subiectis musculis, sed præsertim ventriculo, vesicâ, vtero, intestinis, iecinore, liene, & septo transuerso: adhuc in arteriis etiam & corde, in quibus palpitatio diuersus multum à pulsu motus esse manifesto apparet. Palpitatio namque non in iis modo partibus, sed aliis etiam omnibus quibus incidere potest, solius morbi opus est, neque ad eius generationem quicquam natura confert: sed neque passio est volutaria virtutis propria, aut instrumentorum ad eam spectantium, sed ceu modo dictum est, omnibus corporibus quæ dilatari possunt, incidit, eas exaltâs inflansque ad eum modum quo arteriæ dilatantur. Incidit autem etiam vna cum palpitatione patris quodammodo huc atque illuc concussio, eodem quidem modo quo etiam in tremore, sed maioribus interuallis. Palpitans namque musculus si magnus est, dum dilatur, totum mēbrum se penumero secum attollit: dum vero contrahitur, deorsum ferri, ceu rei cuidam inanimatæ permittit, ita ut totus motus præter naturam sit, nō autē, sicut in tremore, mistus quodammodo & compositus. Eius causa est substantia quædam crassarum partiū halituosa, & pro ratione loci, in quo consistit, copiosa: talis namque dilatat atque attollit partē, quoad trusa & cōpulta ad sui generis perspirer substantiam. Cæterum refrigeratis partibus palpitatio ut plurimum incidit: frigore enim quod concoctum erat, redditur halituosius & crassiorum partium, nec facile sicut prius perspirans.

*Παμπάδης*. nomen emplastri compositi ex cin-

nabari, ad tophos aliosque tumores scirrhosos. Dicitur hoc modo quasi ad omnes eiusmodi affectus cōueniat. Eius descriptio habetur apud Paulum libr. 7. cap. 17. Item apud Aetium libr. 15. à quo etiam dicitur *πρῶτον* appellari.

*Παμπάς*. *παμπάδης*, omnino, prorsus, in totum, ut interpretatur Galenus. tum initio commet. in libr. Hippocr. de nat. humana, tum commentario in aphor. 19. libr. 2. quo scribitur, Acutorum morborum prædictiones οὐ *πᾶν ἀσφάδεις*, hoc est, non omnino certæ sunt.

*Παμπάδης*. legitur male apud Hermolaum Barbarum pro *παμπάδης*, de quo supra.

*Παμφίλον*. nomē emplastri albi, cuius descriptio habetur apud Gal. libr. 1. *ἢ καὶ ἡμῶν*, cap. 7. Item libr. 2. cap. 14. inter epulotica emplastra Asclepiadis.

*Πανάκεια*. sic à quibusdam leuisticum, à quibusdam etiam centaurium maius dictum fuit, quoniā succurrit omnibus vitiiis, plurimisque polleat remediis.

*Πανάκεια*. nomen medicamenti non vnius quidem, sed multiplicis. Sic enim antidorus quædam dicta fuit ad Aphrodam relata, cuius descriptio habetur apud Galenum libro 2. de antidotis, atque item alia ad Musam multum à superiore diuersa, quæ habetur libro 7. *ἢ καὶ τῶν*. Est & nomen emplastri gemini, quorum vnum sub nomine Andromachi describitur à Galeno inter epulotica libro 2. *ἢ καὶ ἡμῶν*: alterum vero Heræ est, inter polychresta numeratum, atque descriptum libro 5. *τῶν καὶ ἡμῶν*, quod aliter *ὑγίαιον* vocatum scribit. Sed scribitur interdū *παναχία*.

Est etiam Panacea nomen arteriaci medicamenti quod Mithridatis dicitur libr. 7. *ἢ καὶ τῶν*.

*Πάναξ*. herba est trium generum. *ἡ ἐχέλκη* dicitur ex quo opopanax colligi solet. foliis est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedētib⁹, in ambitu quinquepartito diuisis. caule ut ferula altissimo, qui lanugine quadam incanescit, foliis etiam minutoribus obsitus, muscarii, cœu anethi, in cacumine, flore luteo & semine odorato feruēteque. Radices habet multas ab origine vna, candidas, graueolentes, crassi corticis & subamari gustus. Excalfacit, mollit, extenuat. Secunda species, *παναξ ἀσκληπιδιον* dicitur. caule à solo emittit tenuē, cubitalem, geniculatū, circa quem folia fūduntur fœniculo similia, maiora tamen & hirsutiora, odorata. in cacumine umbella, vbi flores emicāt aurei acris gustus, & odorati. radix parua & tenuis. Sunt qui ipsum cunilam & sylvestre organū vocant. Tertia est *πάναξ χειρόνιον*. folium eius amaraco simile, flos aureus, radix parua, quæ non alte demittitur, gustu acris.

*Πάναξ* & *πανάκεια* dicitur à nonnullis *αἰγυσιον*, de quo supra.

*Παρὰδης*. nomen emplastri nigri quod ab Ae-

tio inter cephalica numeratur, & describitur lib. 15.

*Παθήμους νόσος.* communis morbus, dicitur certus morbus & singularis qui alicubi vagatur, & multos æque simul corripit. Hic autē ut omnibus communis est, sic etiam causam habet communem, ut aerem vitiosum quem omnes pariter inspirant; vel aquæ potum vel cibum etiam aliquando à cœli intemperie aut aliâ occasione vitiatum, aut famem, aut grauem tetramque exhalationem, aut loci naturam, aut simile quid, quod vitari nullo modo potest. Dicitur & *κατὰ δὲ πάγους*. Diuiditur ex aduerso cum dispersis morbis quos *σποράδες* vocant. Habetque duas differentias. nam alius *ἐνδημός*, alius *ἐπιδημός* est. vide *ἐνδημός*.

*Παράλημος.* nomen trochisci qui carnem supercresecerem reprimat citra rosionem. Eo Paulus vitatur lib. 4. cap. 43. Describitur ab eodem libr. 7. cap. 12.

*Πάρυχον.* legitur quibusdam locis apud Galenū pro emplastri aliquo genere, sed puto legendum *πάρυχον*, de quo postea.

*Πάπυρος.* papyrus, qua chartæ sunt. præcipuè in medicata vitilitata laxandas fistulas. habet nescio quid alimenti radix. ideoque Ægyptii eam mandunt, succum tantum detiorantes, & mansam expuunt, ut scribit Dioscorides.

*Παρακέντησις.* compunctio. Est incisionis ratio qua hydropicis aqua eximitur. Paulus non omnibus aquæ intercūtis generibus, sed afficit tantum conuenire scripsit: eiusque tres in vniuersum differentias statuit, vnam sectione facta directe sub vmbilico, tribus digitis interpositis, si sitis ab intestinis orta fuerit: aliam eadem facta à sinistro vmbilici parte, si primario iecoris affectui malum feratur acceptum: tertiā autem à dextra eiusdem parte, si à lienē vitium traxerit originem. Scalpello eiusmodi sectio fieri debet, aut aculeo intra peritonæum adacto, deinde in foramen immissa ænea fistula, per eam humor sensim effundendus pro cuiusque virium ratione, cauēdo vbique subitam cumulatamque vacuationem.

*Παρακμαστική ηλικία.* ætasia m̄ vergens & inclinata. ætās declinans. Media est inter iuuentutem & senectutem. Incipit secundum Galenū à tricesimo quinto anno, duratque ad annum quadragesimum nonum, quo scilicet senectus incipit, vide *ηλικία*.

*Παρεχμαστική πυρετός.* febris decrescens. Species vna est febris continentis quam *σύνολον* vocant, quæ à primo die ad postremum vsque semper de sua magnitudine remittit aliquid donec prorsus desinat. Ei opposita est febris *ἵππακμαστική*, hoc est increscens, dicta. exemplum eius habetur apud Galen. lib. 9. meth. meden.

*Παρέκρηξις.* declinatio. Est tempus quo morbus mitescere & cessare incipit. Postremum est quatuor temporum quæ in morbis salubribus considerantur, in quod necessario à vi-

gore transit omnis qui soluitur. Vt autem ipsa tempora vniuersalia & particularia dicuntur, sic & declinatio vel totius morbi est, vel singularum morbi accessionum. Totius quidem morbi declinatio simplex est, transacto vigore incipiens vsque ad perfectam morbi solutionem. Interim autem omnia symptomata mitescunt, donec totus morbus aboleatur, & perfecte solutus sit. De eo intellexit Hippocrates in Aphor. scribens circa fines omnia imbecilliora esse: *τέλος* enim *τὸ ἀσθενὲς* appellauit. Quia autem symptomata singularum morborum multum inter se diuersa sunt, iccirco declinationis cuiusque morbi non possunt communia signa describi, sed sua habent singuli. In febribus cum humores concocti excerni cœperint & symptomata imminui, declinationis signum est: in phlegmonis, quando pus effluit aut sanguine digesto resolutoque tumor subsidere incipit: atque ita in reliquis morborum generibus. Particularis vero declinatio singularum totius morbi accessionū esse intelligitur, quæ non aliter quam totus ipse morbus eadem tempora habent. Definitur autem esse omne id tempus quod est à febris vigore vsque ad sequentis accessionis principium. Hæc enim similiter post accessionis vigorem incipit, atque in ea accessionis symptomata malaque omnia remittuntur. Quamquam autem multorum morborum communis sit, ut epilepsie, hemicranie, tussis, distillationis & omnis fere doloris, proprie tamē ad febres pertinet, quod in iis accessiones ipsæ atque earum tempora multo manifestius distincta sint. In his declinatio contrarios habet accessionis principio motus. Fit enim principium calore omni ex toto corpore ad cor & thoracem concurrente: declinatio vero perspirante caliditate atque medium corporis relincente. Inde maior sudorque, quibus omnes fere accessiones soluiuntur. Cæterum in quibus morbis non prius soluitur accessio quam succedat altera, declinationis tempus simplex est & vniuersum. In quibus vero *διελευσμός* est, declinationis geminum tempus statuitur. Tunc enim & declinationem & *διελευσμός* continet, quam in febribus proprie *ἀπυρεξίαν* appellant. Id namque tempus vniuersum vsque ad alteram accessionem declinationis nomine censetur.

*Παρεχούσις.*

*Παρεχούσις.* obauditio. est deprauatio auditus talis, qualis in visu *παρόρεσις*. Dici potest & *παρεχούσις*.

*Παρεκρίβησις.* delirare. dementem esse. verbum est apud medicos ambiguum. Nam Galenus initio comment. 3. in libr. 3. *τὸ ἐπιδημιῶν* scribit Hippocratem eo verbo vti solitum, cum vult indicare *τὸ ἀσθενὲς* magnitudinem, quemadmodum & verbis *ἐκστῆναι*, *μανῆναι* & *ἐκμανῆναι*. Idem autem libr. 3. de loc. affect. scribit eos qui in febribus delirant, ab omnibus non solum medicis sed et-



succedit apoplexiæ, & aliquando epilepsiæ, comment. 4. *αἰς τὸ πρὸς διαίτης ὄψιν.*

*Παρερρημα*. parua luxatio, per quam scilicet articulus paululum à suo loco naturali excessit: in quo differt *πρὸς τὴν ἐκερρημασίαν*, quod magna perfecta que luxatio est. contingit ut plurimum vel ex mutuo partium inter se affricu, vel ex equitatione, vel etiam cinctu aut calceatu. quidam intertriginem Latine appellant. Dicitur & alio nomine *δισκίνημα*. vide *ἀνδρῶν*.

*Παρέρματα*. dicuntur, inquit Galenus, segmenta quæ indumentis detrahuntur & rescantur ab iis qui ea consueunt. mollia sunt & luxationibus ob id conueniunt: fimbrias quidam Latine interpretantur.

*Παρέρρυθμος σφυγμός*. est pulsus arhythmus, vicinæ ætatis, naturæ, partus ætatis, loci & reliquorum omnium proprium rhythmum seruans. Qui enim eum rhythmum seruat, is *εὐρυθμος* dicitur: qui vero non seruat, *ἀρρυθμος*. Itaque *ἀρρυθμος* species est *ἑ ἀρρυθμῶν*, nec tamen multum ab eurythmia recedit, sicut *ἐπερρρυθμος*, multoque magis *εὐρυθμος*. vide supra *ἀρρυθμῶν*.

*Παρερρημασία*. vinculi simplicis genus quo vniuersum caput obuoluitur. describitur à Galeno in lib. de fasciis.

*Παρερρημασία*. dicitur *πρὸς τὴν παρερρημασίαν*, quod significat adstare. Id enim quadrat utrique corpori quod veteres *ἄρρημα* appellarunt. duo enim eodem nomine appellantur, vnum *ἄρρημας κισσῶν*, alterum *ἄρρημας ἀδενῶν*. Dicitur autem *ἄρρημας κισσῶν*, hoc est varicosus, corpus id quod utrique testis antestat in modum pyramidis efformatum, incipiens paulo supra testem, qua venæ & arteriæ spermaticæ coeunt & commiscantur, deinde post multos gyros & circumuolutiones varicum in modum paulum latefcēs, & in superiorem testis partem insertum. Itaque vas spermaticis coalescentibus gignitur, primumque feminis materiam, seu semen rude & imperfectum excipit, quod postea testiculus absoluit. Ergo ut facultate cum testiculo conspirat, sic quadamtenus etiam figura conuenit: habet enim parui cuiusdam testis effigiem. Paulus Aegineta lib. 6. cap. 6. nescio cuius auctoritate fretus, definit hos *ἄρρημας* esse propágines membranzæ spinalis medullæ cum venis arteriosis ad testiculos pertinentes per quas semen in naturalia permeat, eademque alio nomine *κισσῶν* dici. quod quam falsum sit, nemo non videt. Galenus. *αἰς τὴν γλῶσσαν*. annotauit *ἄρρημας* ab Hippocrate *αἰς τὴν πρὸς βλεφαρῶν* vocari *ταῖς ἐνδιδυμῶν*. Verum *ἄρρημας ἀδενῶν*, id est glandulosus, dicitur corpus seu glandula meatui vrinario supraposita, vasorum semen deferentium insertionem excipiens. In eam enim deferentia semen vasa postquam coiere, inseruntur ad securitatem. Est autem ad humillimam vesicæ partem sita, media quodammodo inter vesicæ corpus & eius cecum. verum hanc aliqui non

*ἄρρημα*, sed *ἄρρημα* appellant, quo vitent ambiguitatem.

Sunt etiam qui *ἄρρημα* vocant os *ισσῶν*, quod situm est ad radicem linguz.

*Παρερρημασία*. vide *κισσῶν*.

*Παρερρημασία*, apud Hippocratem significat errorem non quemlibet, sed eum qui vero proximus est, & ea de causa probabilis, ut annotat Galenus comment. 3. *αἰς τὴν πρὸς ἄρρημα*.

*Παρερρημασία*. pars colli iugulo proxima, ad clauem sita inter collum & pectus.

*Παρερρημασία*. aberrante manu contingere, & manu falli: ut & *ισσῶν*, iniecta manu attingere. Hinc etiam oculos muliebris pudendi locos *ἄρρημας* vocant, ut scribit Galenus *αἰς τὴν γλῶσσαν*. Deducitur *πρὸς τὴν ἀφῆν*.

*Παρερρημασία*. *ἄρρημα*, hoc est desipere. Non dicitur *πρὸς τὴν ἀφῆν*, ut *παρερρημασία*, de quo ante dictum est, sed perinde dicitur atque *ἀρρημασία*, ut scribit Galenus *αἰς τὴν γλῶσσαν*.

*Παρερρημασία*. vitium est *τῆς σφίσεως* contrarium cum videlicet ea quæ naturales meatus concludunt, ita diducta sunt, ut reduci nequeat. Proprie tamen dicitur de præputio ita retrorsum adducto, ut glandem tegere nequeat. Quod malum ex nervi contractione maxime contingit: fit & ex immodica præputii siccitate. Ei contrarium vitium *σφίσεως καὶ σφίσεως* appellatur, de quibus vide suo loco.

*Παρερρημασία*. *μικρὰ παρερρημασία*: hoc est paruū delirium. Siquidem Hippocrates *τὸ παρερρημασία* usurpat in iis qui modice delirant, ut & *παρερρημασία*. Inde *παρερρημασία* dicti sunt ab Hippocrate *οἱ παρερρημασῆντες καὶ παρερρημασῆντες*: ut Galenus explicauit comment. 2. in Proxhet.

*Παρερρημασία*. delirium. desipientia. mentis abalienatio. Duobus modis dicitur: vno generaliter, altero particularius. Generaliter quidem dicitur, motus deprauatus & errans facultatis imaginatricis aut ratiocinatricis, in eo differens *πρὸς τὴν αἰσῶν καὶ μνήσῶν*, quarum illa ratiocinatricis virtutis veluti *παρερρημασία* καὶ *ἀπὸ τῆς αἰσῶν* sit, hæc vero veluti deficiens functio. Plurimumque autem in vtrisque simul *παρερρημασία* consistit, tum parum probe imaginando, tum parum apte ratiocinando. Aliquando vero in altero duntaxat, sicut Galenus narrat Theophilo medico contigisse, cui sola imaginatio deprauata fuit, similiter & phrenitico cuidam, qui omnia vasa discernens & suis nominibus appellans perfrigit: huic enim sola vis ratiocinandi deprauata fuit. Huius autem *παρερρημασίας* generaliter dictæ, species siue differentię sunt plures, quæ sumuntur ab eius magnitudine, causis, adiunctis, actionibus. A magnitudine quidem quod alia sit magna, alia parua, quas verbis propriis ab inuicem distinguēs Hippocrates, in magna quidem significanda vitur verbis *παρερρημασία*, *ὀκνησία*, *μανία*, *ὀμμανία*: in parua vero usurpat *ληρησία*, *παρερρημασία*, *παρερρημασία*, *παρερρημασία*: Galenus autem etiam





ab eo spinalis medulla initium accipit. Plenum & ipsum est animali spiritui, quem nervus durus à spinali medulla pròdeutibus impertit.

**Παρίχυμα.** Sic dicta fuit ab Erasistrato propria cuiusque visceris substantia. Eius enim opinio fuit, carnem appellari solum eam quæ mulculos constituit: quæ vero in reliquis partibus est, ut hepate, renibus, splene, pulmone, non caro sed *παρίχυμα* ab eo vocabatur: in intestinis autem, ventre, stomacho atque utero, carnem innominatam relinquebat. *παρίχυμα* autem dictum est ab eo, quod existimaret viscerum eorum molem ex sanguine è venis effuso condescere, ut scribit Galenus initio libr. 11. simpl. medic. qui tamen neglecta Erasistrati opinione, eorum viscerum propriam substantiam, non *παρίχυμα*, sed carnem sæpe appellat.

**Παρεν.** pars faciei quæ ab oculis ad mentum usque protenditur. Galli vocant *la igne*. Polluci tamen *μυτα*, *πρόν*, *παρνα* synonyma sunt. genæ aut malæ dici possunt Latine.

**Παρεν.** vinculum quod malas continet vel fractas vel luxatas vel alio quovis modo affectas. sic dicitur à malis per quas ducitur.

**Παρεν.** est pulsus inæqualis systematicus, in quo expectata quies in medio tanquam superuacua aliquis pulsus sentitur. Contrarius est pulsui *πρὸς διακρίσιν*, hoc est, deficienti, in quo sæpe aboleretur aut minor apparet pulsus, cum in illo contra inter binos ictus qui suo ordine pulsant, medius quidam ictus præter legitimum numerum incidat. A Latinis interpretibus intercідens & coincідens vertitur.

**Παρεν.** idem apud Hippoc. quod *ῥαγισμός* & *ῥαγισμός*, hoc est, leuiter delirare. Vide *ῥαγισμός*.

**Παρεν.** dicitur apud Hippocrat. cum æger se ipsum præbet medico curandum, quo tempore medicus primum cognoscit affectum ipsum infestantem, deinde ad curationem eius accingitur. Eo sæpe vitur *ἡ κατὰ ἡγήσιν*. possis Latine dicere exhibitionem.

**Παρεν.** idem quod *ῥαγισμός*, hoc est, resolutio: ut & *παρεν*, ut *ῥαγισμός*.

**Παρεν.** idem prorsus quod *ῥαγισμός*, hoc est dolorem sedans. dicitur & *ῥαγισμός*, hoc est mitigatorium.

**Παρεν.** sic quondam dicta fuit *ἡ ἀρραμυρία*.

**Παρεν.** aliqui *ἀμαρύνω* vocant. foliis est coriandri, tenuibus. flore per ambitum albo, intus inclino, odore subuiroso, sapore amaro. Galli maticariam vocant. Sed hoc plurius herbarum nomen fuit apud veteres. primum quidem sic dicta fuit à quibusdam *ἡ ἰσχυρία*, quod, ut ferunt, à Minerua Pericli monstrata sit. Sic etiam dictam fuisse Mercurialem herbam, quæ *ἰσχυρία* vocatur, Dioscorides author est. Alii, ut scribit Gal. *ἀρραμυρία* & *ἀμαρύνω* sic nuncuparunt.

**Παρεν.** tonsilla. quo nomine & pars faucium & eiusdem etiam inflammatio significatur:

*ἡ ἀρραμυρία* alio nomine vocantur, quæ cum velut isthmus quidam inter gulam & asperam arteriam extremum condita sint, merito *ῥαγισμός* sua fuere dicta. vide *ἡ ἀρραμυρία*.

**Παρεν.** Sunt iuxta dentes in gingivis tubercula quædam dolentia, ut scribit Celsus libr. 6. cap. 13. quo tamen loco quidam *παρεν* legendum censent, non autem *παρεν*, quod nomen hoc à nullo Græcorum usurpatum obseruetur.

**Παρεν.** accessio. Est motus particularis morbi à remissione ad deterius, sicut Aetius definiuit. Cum enim remissa iam priori accessione corpus quietem agit, si eam oborta perturbatio interrumpit, morbus *παρεν*, id est, exacerbari & in deteriore statum facta esse commutatio merito dicitur. Verum ea particularis dicitur, quæ excludatur & quæ totius morbi est, quando ille augeri incipit. Galenus comment. in Aphor. 12. libro 1. non multum differenter diffinit, dicens *παρεν* esse deterius tempus totius circuitus. Habet autem & ille sua quatuor tempora, principium (quod & *ῥαγισμός* & *ἡ ἀρραμυρία* medici appellant) incrementum, summum vigorem, & declinationem, tum caloris motu, tum symptomatum vehementia distincta, quemadmodum & totus ipse morbus caloris quidem motu, quod accessionis principium fiat calore omni toto ex corpore ad cor thoracemque concurrente: incrementum, cum ille ad extremas corporis partes sese expandit: status, quando ex æquo totum corpus occupat: declinatio vero, perspirante caliditate atque medium corporis relincente: symptomatum vero vehementia, quod quæ mala principio inuadunt, incremento augentur, in vigore vehementer excruciant, in declinatione autem paulatim mitiora redduntur & evanescent.

**Παρεν.** Celsus accessionem dicit, alii exacerbationem vertunt.

**Παρεν.** est inflammatio partis alicuius gingivarum. Ea autem omnium inflammationum modo, nisi discussa fuerit, suppuratur & vertitur in abscessum: proindeque Paulus libr. 6. *παρεν* abscessum esse dixit. Ex ea plerumque gingivæ putrescunt & decidunt, gigniturque *ἡ ἰσχυρία*, hoc est, carnis excrecentia, maxime ad intimos molares dentes. Vidi autem parulidem ab imperito chirurgo male curatam, in qua caro non modo supercrepuit, sed cum aduerso etiam buccarum musculo prorsus coaluit.

**Παρεν.** derivatio. Est vacuatio humoris per vicinam partem. Est autem curationis genus, ut scribit Galenus initio comment. 2. in lib. 6. epidem. ad humores pertinens, cum videlicet humor qui vacuari debet, non per eam fertur partem per quam eum ferri oportet, nec tamen valde procul à conuenienti, neque ad remotissimam, sed per propinquam. Sunt vero huius exempla hæc, cum id quod per palatum vacuatur, per nares trahitur, nobis irritantibus aut per actia medicamen-  
ta prouo-

ta prouocantibus: cum quod fluit ad oculos aut aures, tum in nares, tum in ostrahitur, collutionibus & gargarismatis acerbis atque aliis eiusdem generis remediis: cum, quod defluit per asperam arteriam in pulmonem, ad stomachum conuertimus: id enim potius optandum: cum sanguinem per sedem profuerem in muliere, per vuluam deriuamus: similiter cum mulieri sanguinem vomenti, ex Hippocratis consilio, menses ducimus: sed hoc exemplum reuulsionis potius fuerit quam deriuationis. Reuulsio enim fit per loca plurimum distantia, eoque solo à deriuatione differt. Deriuatio ite est cum quod per renes & vesicam fertur, ad aliud deducimus, aut contra ab alio ad vrinâs. Fit deriuatio à dextris ad sinistra, ab anterioribus ad posteriora, & contra, sed breuissima via: alioqui ad reuulsionis naturam magis accedit. estque humoris tum fluentis, tum iam impacti & in egra parte consistentis: in quo etiâ videtur à reuulsione differre, quæ fluenti tantum humori adhibetur.

**Παρυσσι.** emplastrum est ab Hera primum descriptum hunc in modum: (sic Galenus prodidit libro 7. τῶν κτ' ἑξῆς) Adipis suilli recentis & curati vnc. xlii. cera vnc. xxi. cerussa vnc. vi. argenti spumæ vnc. vi. liquida cum aridis permiscetur, ac manebit quidem aliquamdiu liquidius, postea vero consistet per se & compagem acquirat. Alii vero postea aliter pro suo quisque arbitrio composuere. Emollit primo ordine, præsertim recens: inueteratum enim magis digerit: inflammationem quidē coarctat & lenit, sed vlcerâ sordida reddit: vide apud Paulum & Actium.

**Παρονυχία.** est abscessus ad vnguis radicem natus, alii malum inflammationem vocare: Nō leue prorsus malum est, vt quod dolores & febres aliquando moueat. Et tamen Latini reduuiam curare, pro occipari in rem minima, prouerbii loco vsurpant. Ex quo arbitror reduuiæ nomine non tantum παρονυχίαν designari, sed eum etiam affectum in quo ad vnguuium latera caruncula, aut cutis portio resoluitur nullo fere dolore. Inde Latini reduuiam vel reduiam malum hoc nuncuparunt: reduiire enim soluere est, vt scribit Festus. Quanquam Heilmol. Barbarus relunium etiam vocat à reliendo; hoc est soluendo. Barbari parinaritium vocant.

**Παρονυχία.** frutex est exiguus, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus foliis. Sic dictus videtur, quod paronychis atque fanis remedio fit. Vis eius est tenuium partium, exsiccat sine morfu, & valde digerit. Excalfacit & desiccatur tertio ordine.

**Παρονυχία.** sic dicuntur oculorum minores anguli qui ad tempora spectant: vt & oppositi, qui scilicet ad nares sunt, παρτίτες vocantur.

**Παρονυχία.** tumor est glandularum sub auribus. Galenus lib. 3. τῶν κτ' ἑξῆς. parotidem de ge-

nere inflammationum esse dixit. Paulus nō inflammationem, sed affectionem tantum dixit, vt tumor omnis, sine scirrhus, sine etiâ œdematosis, non sola inflammatio, parotis nominetur. Sed cuiuscunque generis tumor sit parotis, glandulas sub auribus sitas occupat, materia in eas vel à capite decumbente, & ibi postea impacta, vel à toto corpore, id quod aliquando per crises contingit, confluenta.

**Παρονυχία.** is recipit squamæ æris drach. x i. æris vsti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, eruginis rase, thuris, singulorū drach. vi. r. r. Ærugo cum ære, squamæ & alumine sub sole conteruntur, & probe tritis thus additur: inde formantur pastilli valent ad rhymos, condylomata, myrmecias. Paulus eos ἡ ἀσπὴς imponit libr. 4.

**Παρονυχία.** genus emplastri siccis, crustam inducentis. Cōstat, vt scribit Aetius, paribus portionibus atramenti sutorii, sandarachæ, mifyos, chalcitidis.

**Παρονυχία.** medicamenta inspersilia in farinæ aut pulueris modum. Eadem composito nomine etiam ἡσπέρια vocantur, & apud Latinos recepto. Vide ἡσπέρια.

**Παρονυχία.** dicitur ab Hippocrate ὁ κτ' ἑξῆς, id est, milium, vnde etiam apud eundem παρονυχία ἄριος vocatur panis, vel farina militi subtilis, vt habetur apud Gal. ὁ κτ' ἑξῆς ἡσπέρια.

**Παρονυχία.** sic vocantur iridis partes nigre, quæ oculi pupillæ proximæ sunt.

**Παρονυχία.** ὁ κτ' ἑξῆς παρονυχία, hoc est, parvus pilus, parillus, apud Hippocratem, vt scribit Gal. ὁ κτ' ἑξῆς ἡσπέρια.

**Παρονυχία.** ὁ κτ' ἑξῆς παρονυχία, hoc est in vite à sole diutius adusta. Quæ autem à sua vite detracta soli exponitur succanda, παρονυχία vocatur. de qua vide suo loco.

**Παρονυχία.** genus est palmæ tertium, vt scribit Plinius, sed nimirò liquore redudans, cuius pomum etiam in sua matrē dehiscit & rumpitur, calcatoque simile apparet: inde nomen inditum. Sunt autem qui in eo nomine palmas passas, & à sole in ipsa arbore vstas & corrugatas intelligendas censeant: quo etiam modo παρονυχία ἡσπέρια interpretantur, ex quibus Aetius lib. 9. cap. 24. vinum scybelites stillare scripsit: quanquam eo loco reliqua caleatas intelligere possumus, ex quibus vinum sponte fluere dicitur, si rationem habeamus eius quod prælo expressis vuis manat. Carterum palmarum prædictum genus nō de iis modo dicitur quæ iam diutius in arbore solem passæ fuerint & prope exiccatæ, sed de iis etiam quæ ante maturitatem succo grauidæ & turgentes rumpi solent.

**Παρονυχία.** sunt qui eo nomine significari dicant puluerem, qui luctaturis post olei illitionē inspergebatur & affricabatur, παρονυχία ab Atticis vocatum, densandi atque roborandi corporis gratia. Sunt vero qui nō eum modo puluerem, sed sudorem ipsum pulueri

mistū *μίχμα* vocent, vt Aesius lib. 2. cap. 107. scriptum reliquit.

*Παράλυσος*. fictum nomen est ab Hippocrate, qui eo nomine designare voluit *παραλύσις* *παράλυσις* hoc est: qui in differendo voce labuntur, & sepius eadem repetunt, vt explicat Galenus *παράλυσος*. Homerus *παράλυσος* appellat, vt videre licet vbi Therisitem depingit.

*Πύλαγρος*. species est myrrhæ, præpinguis, quæ expressa statim emittitur auctore Dioscorido.

*Πύλαγρος*. planta ima planta pedis. Pars est pedis quinque ossibus constans, inter tarsum & digitos sita. Hæc per synarthrosion quinque pedis digitis inarticulatur. Proportionem respondet metacarpo quod in manu est, nisi quod in manu primum pollicis, os cum carpo diarthrosi copulatur.

*Πύλαγρος*. vsurpatur hoc nomen ab Hippocrate lib. 2. de morbis mulierum, vbi scriptum est, *πύλαγρος* *πύλαγρος*. Ac Zenodotus quidem libro quem edidit *πύλαγρος* *πύλαγρος* Arcades & Diores *πύλαγρος* pedem vocare. Verum Hippocrates sic videtur appellasse vel imam plantam, vel malleolos pedum. Author Galenus *πύλαγρος*.

*Πένες*.

*Πένες*. famies. Est suctionis in ventriculo sensus. Cum enim propter vacuationem & alimentum penuriam partes exinaniri cibum naturaliter appetant, primumque ex exinaniri soleant quæ sunt æri ambiendi proximæ, illæ à proximis sibi alimentum trahunt, deinde rursus illæ ex his quæ sibi sunt proximæ, donec ita continuata serie ad venas quæ ad ventriculum pertinent vacuatio suctioneque perueniat. Tunc autem ventriculus exungi se sentiens, famescit, & eam excitat appetentiam quæ animalis nuncupatur. Hic suctionis sensus *πένες* à Galeno proprie dicitur (Latini non aliter quam famem appellant, quod tamen nomine etiam *πένες* significant) animalem ciborum appetentiam pariens, factus autem à vacuatione & vacuatorum appetentia naturali, ventriculi suctionem excitante. Nam cum hæc quinque symptomata, vt scribit Galenus, ordine quodam sese deinceps consequantur, vacuatio, vacuorum appetentia naturalis, ventriculi suctionis sensus, & appetentia ventriculi naturalis, famies quæ suctionis sensus est, ordine quarta est. Sic facile intelligitur quo differat famies ab appetentia. Nam cum appetentia gemina sit, vna naturalis, altera animalis, famies vna est, eaque semper animalis. Adhæc plantæ etiam naturaliter appetunt: animantium & eorum modo quæ sensu prædita sunt, famies est. Sensus enim qui ad sola animalia pertinet, eam parit. Non est igitur famies appetentia, aut cibi portionisque animalis, sed naturalis quidem appetentia famem parit, & hæc rursus animalem appetentiam. Vis enim illa animæ interior, tristi quodam

suctionis sensu affecta, cibum potumque protinus concipit, & in eorum desiderium fertur. Horum tamen symptomatum proximitas facit vt famies interdum appetentia vocetur. Cæterum quomodo differant *πένες* *πένες*, quorum vtrumque vnico nomine Latini famem vocant, vide in dictione *πένες*.

*Πείρα*. experimentum, siue experientia vocabulum est empiricorum proprium. Significat autem eius quod frequenter & eodem modo visum est, comprehensionem atque memoriam, vel definire potes, experientia esse eius quod eodem modo visum est, observationem atque memoriā. Idem vero est observatio atque experientia Gal. de optima secta. Est & experientia quam *πειρα* *πειρα*, quasi iam tritam experientiam, appellabant, ab experimē tali disciplina ductam. Experimentalem vero disciplinam vocabant, eorum habitū quæ ita frequenter apparuerūt, vt iam inde theorematata sint comparata, perceptumque nunquid illa semper aut plerumque, aut vitronis modo, aut raro euenire soleant. Scribit Gal. libello de subfigurata empirica. vide *πειρα*.

*Πύλαγρος*. sic appellatur à quibusdam *πύλαγρος* *πύλαγρος* teste Plinio.

*Πύλαγρος*. securidaca. herba aut frutex potius, viscerum obturationes expurgat, ob vim amarā & subacerbam, atque hæc vis & in semine & in ramulis eius continetur, Galeno teste. Sed & hoc nomine ab vnguentariis appellatum fuisse *πύλαγρος* Dioscorid. prodidit.

*Πύλαγρος*. liuidum. sic dicitur color inter plane nigrum & rubrum, aut aliquem alium ex floridis colorem medius: sit autem vel exipsis floridis in nigrum abeuntibus, vel ex nigro in album cedente, vt apparet in suppurationibus, in quibus quod nigrum erat, liuescere incipit, & ex liuido ad colorem ignis tendere, & paulatim candidius fieri: proxime accedit ad fuscum. Contrahitur in corporibus à sanguinis & caloris naturæ defectu: frigus enim liuidum & nigrum colorem inducit. Designat & humorem, veluti viridis, praua qualitate prædictum, sicut rubidus sanguinis copiam.

*Πύλαγρος*. liuida, subfusca, apud Hippoc. quæ idem etiam *πύλαγρος* nuncupat. Zenodotus scripsit apud Sicyōios *πύλαγρος* dicitur *πύλαγρος* refert Gal. *πύλαγρος*. Etotius vnico habet *πύλαγρος*, exponens *πύλαγρος*, subfuscum, eosque comprehendens qui *πύλαγρος* pro eo scripserint, quum apud Sophoclem quoque in Amphiarao legatur *πύλαγρος* *πύλαγρος* eadem significatione. Eadē scriptura apud Etymologum est: apud Suidā vero *πύλαγρος*, apud Hesych. *πύλαγρος* oxytonus, expositum iidem *πύλαγρος*, niger.

*Πύλαγρος*. planta pedis, hoc est ima pedis pars quæ solum teritur: Latinis solum dicta. Alexander Aphrodisiensis *πύλαγρος* tribuit digitis, imā eorum partē sic appellans, quæ vngui subiaceret.

*Πύλαγρος*. dicitur senex, vt ait Galenus, quia ad tertiā senectutis ætatem penitens, decrepitū videlicet, & propter vitium infirmitatem

iam rebus omnibus inutilem. Sic autem vocatur, ut aiunt qui vocabulorum etymologiis gaudent, ab eo quod est *πνευματώδης* id est, quod mox ad manes ablegandus sit.

*Πνευμάτωδης πυρετός*. flatulenta seu inflata febris.

Est differentia febris apud Hippocr. libr. 6.

*πνιγνύουσα*, sed quam plerique vario modo interpretati sunt, ut scribit Galenus. Alii

diariam febrem intelligunt, natam spiritibus incensis, quæ & *πνευματώδης*, hoc est, spirituosæ, à quibusdam propterea dicitur, vel

*πνευμάτωδης πυρετός* dicitur, ut ait Galenus, *απὸ τῶν*

*πνευματώδων*, hoc est, *πνευματώδης*, hoc est, fe-

bris madēs & humida, ab effluuiio quodam

aerolo & vaporoso per cutem sapius erumpente. Vel ea febris sic vocatur, quæ veluti

exilientium & manui occurrentium scintillatum opinionem præbet: vel ita appellatur pestilens *πνιγνύουσα*, hoc est, quæ

cum pustulis efflorescit. Verum Galenus in eam sententiam inclinât, ut diaria intelligatur, quæ in spiritibus incensis & interdum

putrentibus consistit. Quanquam & per

*πνευμάτωδης* possit intelligi *απὸ τῶν* non putris,

quam ob id inflatiuam vulgus practicoꝝ vocat, quod sanguinis calore febrili feruentis copia venæ omnes plurimum sunt inflatæ, & sanguine flatuoso & bullante plenæ.

*Πενταήμερος πυρετός*. quintana febris. Species est

febris intermitteñtis quinto quoque die accessiones habentis. De ea quidem Hippocrates scripsit libr. 1. de morbis vulgaribus: negat tamen Galenus visam à se, nisi obscurâ valde & difficilem. Hippocratis verba de ea

habentur, Quintana pessima est omnium: etenim & ante tabem & iam tabidis superueniens, perimit. Ego memini Parisiis me

eam vidisse semel, eamque duplicem, cuius fuerunt plurimæ accessiones. Impares illæ erant, multumque ab inuicem distinctæ: alias tertiana fuisset. Excesserunt autem numerum quinquedecim accessionum distinctarum ab inuicē tempore inuasionis, horrore,

magnitudine & longitudine accessionum & sudoribus, ut nemo sit vel mediocriter versatus in arte medica, qui febrem eam constare complexu duplicis quintanæ nō intelligat.

*παραδελός*. emplastri nomen, ad collisâ, vibices

flagellorum & cutem excoꝝiatam accom-

modi. Habetur apud Aetium libr. 1. capite

35.

*Πενταμύρον*. vnguenti nomen: sic dicti quod

quinque rebus constet: styracis uncia, mastiches sextante, ceræ albæ quadrante, opobalsami triente, vnguenti nardii quincun-

ce, ut habetur apud Aetium lib. 12. cap. 44.

Similis omnino descriptio est apud Paulum

lib. 7. cap. 18. nisi quod non opobalsamum,

sed opopanaxem habet.

*Πενταφύλλον*. quinque folium, herba est ramulos

habēs festucarum modo grâciles, palmium

nō excedentes, & in iis semina: folia men-

ta *συνία*, in singulis pediculis quina; nec

plura, nisi perquam raro, & per ambitu crenata serræ modo; florem in candido pallidū vel auri æmulum. Radix subrubra, oblonga, paulo crassior quam veratri nigri. Ab ea non longe abest quam officinæ tormētillam vocant, nisi quod septem non quinque habet folia. Archigenes apud Galenum libr. 5. *πενταφύλλον* cap. 9. scribit *πενταφύλλον* à quibusdā *εὐπυρίων* dici. Desiccatur tertio ordine, minimum habens euidentis caliditatis, & minimum acris est.

*Πενταπόδον*. sic à quibusdam dicitur *πενταπόδιον*, ut

Dioscorides & Plinius scripto prodiderunt.

*Πενταπόδιον* maturatio. Dicitur proprie, anthorē

Aristoteli, alimenti in fructibus concoctio.

Ac quoniam concoctio perfectio quædam

est, tunc maturatio perfecta est cum semina

quæ fructu continentur tale aliquid efficere possunt qualia ipsa sunt. Quamuis autem

ad fructus proprie *πενταπόδιον* pertinet, tamen

multa alia præter fructus *πενταπόδιον* dicuntur per

metaphoram, quoniam non sunt primum

indita nomina singulis quæ à naturali calore & frigore perfectionem consequuta sunt.

Nam & *γύμναστα* & *πυρίται* & reliqui tum hu-

mores, tum morbi *πενταπόδιον* dicuntur.

*Πενταμοῖος*. maturatio, concoctio. Dicitur, inquit

Galenus comment. 2. in libro 1. *τῶν ἐνδονο-*

*μῶν*, morbi & eorum quæ præter naturam

sunt, veluti coctio quædam & maturatio,

in qua quod assimilatur paucum est, quod

autem semicoctum superfluumque relin-

quitur, multum. Idem vero comment. 3. in libro 6. *τῶν ἐνδονομῶν*, & *πενταμοῖος* signifi-

caturum latius extendit, omnem deductionem

ad mediocrem temperiem sic appellans. In

morbis fere semper dicitur, sicut *πενταμοῖος* in

fructibus, quam tamen etiam in morbis &

humoribus præter naturam *αὐτὸν* & *πενταμοῖον*

Aristoteles usurpauit libr. 4. *τῶν μετεωρῶν*. vide *ἡψ.*

*Πενταπύλον*. sic appellat Hippocrates *αὐτὸν* *διὰ τὴν ἑξῆς*, morbum qui concoctionem adeptus est.

*Πενταπύλον*. piper. Exotica arbor in India nascens,

disimiliter à variis authoribus descripta, qui

forstân eam nō vidissent, sed potius alio-

rum fidem sequuti repræsentarunt. Sed nul-

lud ea certius prodidere, quam qui Lusitani regis studio in nouum orbem contulerunt, ubi piperis vtriusque longi ac rotundi,

innumeras plantas gigni & virescere nar-

rant: fruticem, non arborem piper edere

affirmant, albæ viti sepibus proreptanti simillimam, vicinas scandentem arbores, quæ

racemosum fructum ostendat, primum vi-

ridem, nec aliter quam in ligustro coaceruat-

tum. Hunc, antequam legitima maturitate

nigrescat, lectum, sub sole palmeis regetibus

expandunt. sic baceas solis æstu corrugari,

vel passas nigrescere commemorant. In eodem frutice longum piper & album offēdi

negant, sed alias arbores longum piper fer-

re, & esse velut nucamentum quoddam ex-

libus granulis squamatis compactū, Pon-



**Πικρὴ νύκτις** inlo simile, piperato gustu, quod tamen nunquam in album aut nigrum transcat. Galenus tamen, Dioscoridem opinor sequentis, eandem plantam tam rotundum quam longum piper gignere prodidit libro 8. simpl. medic. his verbis: Piperis radix vires costo similes obtinet. Porro fructus nuper germinantis arboris oblongum est piper, humidum natura & calidum: humiditatis autem signum est quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet: fructus vero adhuc acerbus immaturusque album piper est, nigro actius, ut quod multo magis assatum sit: utrumque autem vehementer tum exalfacit, tum desiccatur. Ex iis medicamentum paratur *πικρὴν ἰνκόν*, multis à Galeno laudibus commendatum libris de sanitate tuenda: atque aliud præterea, sed multum diuersæ facultatis, quod *δύο πικρὴν* dicitur, descriptum à Paulo libr. 7. cap. 11.

**Πικρὴν**. siliquastrum. herba est caule, ut Plinius scribit, rubro, longo, densis geniculis, foliis lauri, semine albo, tenui, gustu piperis: unde & nomen, teste Plinio. Græci recēiores *κρόνον* nominarūt. quædam officinæ herbam diu Mariz.

**Πικρὸν**. frutex est opacus, candidi succi plenus, foliis satius portulacæ (unde quibusdam *αἰσπράχην ἀγρία*, hoc est, sylvestris portulaca, dicitur) rotundis, inferne rubentibus: semine sub foliis rotundo, uti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Eadem cum peplo vires habet.

**Πικρὸν** dicitur à quibusdam *πικρὸν ἰνκόν*, ut habetur apud Dioscor.

**Πικρὸν**. frutex est lactei succi plenus, foliis paruis, ut rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, fere dodrantali, humi respersa: semine sub foliis rotundo, minore quam candidi papaueris. Radicem habet vnicam, superuacua, ex qua fruticat. nascitur inter vites & in hortis. A quibusdam papauer spumeum vocatur & meconium, ut Galenus annotauit. Liquorem remittit, qui tichymallorum modo purgat.

**Πικρὸν διυαγόν**. concoctrix facultas. Est vis naturalis, attractum alimentum in propriam corporis quod nutritur qualitate alteras. Eadem etiam *ἀλλοτριώτις*, id est, alteratrix, dicitur, de qua vide suo loco, & in dictione *πικρὸς*.

**Πικρὰ φάρμακα**. concoquentia medicamenta. Ea duobus modis, ut & cōcoctio, dicuntur ut enim una sanorū est, circa alimenta versatur, altera vero morborū & vitiosi humoris maturatio, sic medicamenta concoquentia dicuntur, tum quæ ad stomachi ventriculiq; imbecillitatem vel inflationem adhibentur, quo cibi melius concoquantur, tum quæ ad pus mouendū conducunt. Id enim naturæ quadā concoctione generatur. Hæc autem eadem facultate polleat quæ & suppūratia medicamenta, Græcis *ἐκτριπτικά* appellata.

**Πικρὸς**. sinegma est ad faciei nigritiem conferens, cuius meminit Paulus libr. 3. cap. 25. Descriptio eius habetur apud eundem libr. 7. cap. 13.

**Πικρὸν pepo**. species est cucumeris. nam qui naturam magnitudinem exceperit, pepo Plinio vocatur, unde non tantum *πικρὸν*, sed etiam *σικυς πικρὸν* cōiunctis nominibus aliquando à medicis dicitur: *σικυς* enim nomē Græci commune fecerūt pluribus fructibus, qui aut cartilagine aut cute foris obducta in oleraceis extra terram crescunt. Ceterum *πικρὸν* dictus est *κρόν* & *πικρὸν*, quod maturescere significat, velut etiam *πικρὸν*, hoc est, maturum: nec peponibus proprie dictis tantum, sed aliis etiam omnibus quæ maturescunt, conuenit. Nam & racemus cum exacte maturus est, dici potest *πικρὸν*, & similiter fructus omnes autumnales & pira & cucurbitæ *πικρὸν*, id est, matura, vocari cōsueuerunt: quemadmodum & melopepon, qui in seipso *πικρὸν*, id est, maturum, continet: unde medici quidam non simpliciter nominare voluerunt *πικρὸν*, sed composito nomine *σικυοπικρὸν*, id est, cucumerem maturum, aut peponem cucumeralem, nominari oportere contenderunt. Ceterum in pepone specialiter dicto, superat humida frigidaque intemperies in secundo ordine: si quis tamen semen aut radicem arefaciat, deliccandi vim acquirit primo ordine, aut etiam secundo incipiente.

**Πικρὸν**. sic dicta fuit à pluribus *πικρὸν*, quoniam perdicēs ex præcipue vellantur. Ex ea dentitricia Galenus composuit libro 3. de compositione medicam. secundum locos. Actius quartæ tetrabili ferm. 3. ceratum describit ad sinus, cui ob nimiam vim repellendi, vicinos locos inflammandi potetiam attribuit & materiam eo colligendi.

**Πικρὸν**. terebrium rectum & acutum, apud Hippocr. ut habetur apud Gal. *πικρὸν γλαυκόν*, diuersum ab eo quod *χρῆμα* dicitur.

**Πικρὸν**. amuleta. sic dicuntur quæ corporis parti cuiunque alligata noxam ab ea depellunt. Eius generis plurima Galenus libr. 2. *πικρὸν* recenset ex Archigene, quæ capiti coronæ modo imposita, dolorē eius leuēt. Per multa etiam quotidie experimur, quæ brachiali admota febres reprimunt.

**Πικρὸν**. sic dicitur à quibusdam *πικρὸν*, hoc est extremus capillorum ambitus.

**Πικρὸν**. *πικρὸν* *πικρὸν* *πικρὸν* hoc est, indumentis se contegebat, apud Hippocrat. ut scribit Gal. *πικρὸν γλαυκόν*.

**Πικρὸν**. sic dicitur Hippocrati multis in locis morbus non lethalis, interprete Galeno.

**Πικρὸν**. idem quod *πικρὸν*. Theodorus cinctum vertit.

**Πικρὸν**. ardens febris. Est differentia febris apud Hippocrat. libr. 6. *πικρὸν*, sumpta à caloris febrilis essentia, ut ait Galenus libr. 1. de differ. febr. Sic autem dicitur quæ protinus atque admota manus est, & quamdiu



& quamdiu admonetur, copiam caloris & ardoris tactui exhibet. In ea enim immodicus est & non deficiens calor, & copia ingens materię incēdi paratę. Eiusmodi sunt febres æstiuę ardentes & *ἐμύρται*. Cum enim quod per cutim expirat ei quod intus accēditur par est & æquale, & incendi pręterea habilis est materia multa, fit vt confestim ardentes manu sentiantur. Et quia continenter plurimum fit per cutim vltę bilis effluuium, fit vt semper quamdiu durāt, similiter ardeant, nec à manu medici vincantur, accedente ad id multitudine materię adijcendum paratę, quę eo semper continuo calorem à manu medici vinci non patitur. Huic febri contrarium facit Hippoc. alterum genus febrium quas *βλαχεύς* *ἐν πύρετι* vocat, hoc est ad manum quidem mites, sed quę intus æstuosę sint & siccę. Non est autem idem *θελακίς* cum *καύσος*, sed ratio eorum plane diuersa est.

*Πελεκάρδιον*. est tunica crassa, dura, à cordis basi nata & ipsum vndique ambiens. Ita autem ambit, vt cordis figuram imitetur: fibrarum expers est. Eam vero etiam altera tunica inuoluit, prodiens à membrana costas succingente, qua thoracem diuidit. Quibus thorax breuior est, attingit septum transuersum: non attingit vero, quibus septem ossa sortitum est. In eo serosius humor continetur, parciior quidem quibus cor est calidius, copiosior quibus frigidius, vaporibus multis in aquam resolutis. Neros habet à sexta cerebri coniugatione seu à recurrenente sinistro, venas & arterias à septo transuerso & membranis medium thoracem diuidentibus.

*Πελεκάρτιον*. bulbi genus, cuius duę species Plinio, vnum cortice rubro, alterum nigro, papaueri simile. vtrumque excafcit.

*Πελεκάρτιον*. *θελακισμύρινος*, *χρυταί* & *ὀπτικαμπής*, hoc est inflexi, adunci, curuati, apud Hippocratem, vt scribit Galenus *ἐν τῆς γλῶττις*.

*Πελεκάρτιον*. frutex est ex interuallis parna folia habens ipsum amplectentia, subcandida, hordeacea: inter folia surculi exeunt, in quibus baccę hedere similes: flos fabę candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum & quod difficile enellatur: radice rotunda, crassa. Incidendi & calfaciendi vires habet. Officinis marrisyluā dicitur.

*Πελεκάρτιον*. est membrana è crassa mēinge orta, totum cranium ambiens: oritur autem hunc in modum: Tenues quędā membranę pluraque vincula è dura mēinge foras prodeunt per caluarie suturas: quo autem loco singula prodeunt, eodem expanduntur & larescunt, progressaque longius sibi mutuo occurrunt atque inter se coalescunt, vt tandem ex omnibus vna membrana fiat. Dura est sensuque poller, vt & membrana interior ex qua nascitur. Diffunditur autem per vniuersam caluariam, cam-

que totam ambit, pręterquam qua caput collo committitur. Ac cum eiusdem sit cum periosteo naturę, ac reuera periosteos sit, sola tamen inter alias eiusdę generis tunicas propter partis quam inuoluit pręstantiam, peculiare nomen sortita est, & *πελεκάρτιος* dicta. Ea vbi ad oculos descēderit, duplo crassior cutique subnexa, cilium vtrumque producit, tum omnia faciēi ossa, genamque infernam totā obducit, nisi quā musculos aut recipit aut emittit, diciturque iam non pericranios, sed periosteos. Illa extimam etiam oculi tunicam *ἐπιπερικάρτιον* dictam producit. Sunt & qui *πελεκάρτιον* atque *πελεκάρτιον* ab ea nasci prodant, vt scribit Galenus comment. in lib. 6. *πρὸς ὁμοιότητάς*.

*Πελεκάρτιον*. scribitur & *πελεῖον* sine diphthongo.

Pars est ea corporis apud Hippocrat. quę à principio genitalis ad anum vsque pertinet, qua ceruix vesicę sita est. Siquidem media pars est *τῆς πλάγος*, vt annotat Galenus comment. 4. *ἐν τῇ περὶ ἀρθρῶν*. Vocat autem Hippocrates *πλάγος* totum id quod inter inguina vtriusque cruris est. Itaque *πελεῖον* idem appellat mediam eius partem, quę ab exortu pudendi vsque ad anum pertinet, vbi etiam vesicę collum situm est, qua etiam in parte mulieris pudendum habetur. Aristot. lib. 1. c. 14. hist. anim. scribit *πελεῖον* partem esse interiorem femoris & natis communem. Idem tamen libris de gener. anim. *πελεῖον* maribus tantum tribuere videtur, dicens: *ἀνδρῶν οὐκ ἔστι τῆς γυναικὸς τῆς ἀφ' ἧς εἶναι ὄργανα. τῆς μὲν ὅστις, τῆς δὲ πελεῖος ὅστις*. hoc est, necesse quidem est tum foeminae tum mari esse instrumenta: sed huic quidem vterus, illi vero perineum est. Gaza modo penē, modo colem vertit. Ab aliis fēmen, seu potius interfemineum dicitur. Est enim proprie fēmen pars femorum interior. Rufus in libello quem edidit de partium hominis nomenclatura, scribit genitalium viri partium τὸ μὲν ὀκρεμῆς, τῆμα τὸ δὲ μὲν ὀκρεμῆς, ἱστίον τῆμα ἢ *πελεῖον*: hoc est, partem eam quę propendet, penem: quę vero non propendit, hypostema vel perinæon appellari. Sunt vero qui futuram penis quę per scrotum ad podicem vsque porrigitur eo nomine designari putent, ea tamen *θάμνος* & *ὄρρος* dicitur, non *πελεῖος*. Hippocrates etiam *πέλεον* ἀπὸ τῆς *πελεῖος* dixit, vt refert Galenus *ἐν τῆς γλῶττις*. Hesychius etiam *πρίνα* affert, sed exponens *αἰδοῖον*. Idem & per scriptum in prima syllaba reperitur.

Est & *πελεῖος* laquei nomen quem & simplicem nodum veteres dixerunt, de quo apud Oribasium lib. de laqueis.

*Πελεῖον* *σπυρμός*. circumnūens pulsus, dicitur & *ὀπτικαμπής*: vtroque enim nomine Archigenes eum appellauit. Species est τῶ *μυόν*, de quo vide *ὀπτικαμπής* & *μύρον*.

*Πελεῖον*. *θελακίς*. *θελακίς*, hoc est circuminundat & circuminatat, apud Hippocr. vt scribit Galenus *ἐν τῆς γλῶττις*.

*Πελεῖον*. *ἐν κύκλῳ* *θελακίς*, hoc est circulari-

ter scarificans, apud Hippocrat. vt explicat Gal. *α τὴν ἐξήγησιν.*

**Περίστροφος.** circuitus. Est morbi ab iisdem in eadē per circulum eodemque ordine reuersio. Hunc in modum Galenus in lib. de morborum temp. definiuit. Sic enim singulis accessionibus recurrit morbus, vt redintegrari innouarique videatur. Is in febribus intermitentibus manifestissimus est, atq; aliis morbis qui similiter post aliquod intervallum repetunt. Continentes perpetuique morbi circuitus nullos habent. Est autē alius breuior, qui cito recurrit, alius plurium horarū vel dierum, alius analogiam seruat, alius non seruat. Est autē analogia temporis ad tempus, moris ad morē collatio, vt si fiat eadē hora, vel tardet, vel anticipet, æqualiter aut inæqualiter, ordinate vel inordinate, mitius vel seuius. Omnis autem per circulum videtur fieri, vt qui ab vno statu redeat in eundem, atque id perpetuo ad finē vsque morbi obseruetur. Itaque ab horrore qui febrē tertianam inchoat vsque ad alterius accessionis horrorem circuitus vnus est: similiter à rigore febris quartanæ, vsque ad initium alterius rigoris vnus circuitus est. Ergo in circuitu remissio continetur siue perfecta sit, siue imperfecta. Diuiditur enim circuitus in duas partes, *παροξυσμὸς* & *ἀναστροφή*, hoc est accessionem & remissionē, quemadmodum Hippocratēs distinxit, & Galenus multis in locis explicauit.

**Περίστροφος ὀστέων.** dicitur tenuis membrana ossibus circumducta, per quam ossa sentiunt, si quid modo sentiunt. Generale quidem nomen est, habetque pro varietate partium specialia quædam nomina: in cranio enim *σκληράνιον*, in costis *παρασπλην* dicitur.

**Περίστροφος.** dicuntur apud Hippocrat. tenuium humiditatum deiectiones per aluum, quæ vt *ἐξερροει* dicuntur, si quis diluto aqua cruento ventre aquam excerneret, sic *χολιδος* dicuntur, cum quod excernitur, tale apparet qualis aqua est pauca bile mista. Author Galenus comment. 1. in lib. 1. prorrhēt.

**Περίπνευμονία.** est pulmonis inflammatio. Ea autem vel primum & per se oritur, nullo precedente affectu: vel aliis morbis succedit, vt distillationibus, angina, asthma, pleuritidi. Symptomata eius sunt febris acuta & ardens, spirandi difficultas, grauitas distentioque pectoris, tumor ruborq; faciei, sputum sanguinis floridi. hæc autem sine dolore accidunt, nisi membranae pariter, quæ cū thorace secundum eius longitudinem connexæ sunt, inflammatae fuerint, sicut Aretæus lib. 2. cap. 1. *τὴν ἐξήγησιν* explicat, de omnibus peripneumonix symptomatis doctissime edisserēs. Ab eo quæ de peripneumonia dixit Aetius omnia mutuatur. Sunt autem quæ ratione nominis adducti negent peripneumoniam pulmonis esse morbum, sed potius adiacentium & vicinarum pulmonum partium. A quibusdam etiam *πνευμον*

via sine præpositione dicitur. Constat vero omnium veterum testimonio pulmonis esse inflammationem.

**Περίπνευμονια φωνή.** vox quæ editur in peripneumonia, hoc est aspera vel elangosa, vt explicat Galenus *α τὴν γλώσσην.*

**Περίπνευμονια.** *τὴν ἐν κνήμῃ καὶ ποδὶ οὖσαν καὶ χεῖρ.* hoc est, quæ circulo sub pedibus est, & infra: apud Hippocrat. vt scribit Galenus *α τὴν γλώσσην.*

**Περίπνευμονια.** vocabulum est Empiricorum proprium. Eo autem significabant occasionem quandam fortuitam, ex qua in aliquos morbos & remedia improuiso incidissent. Inde enim species experimenti fiebat per fortuitam occasionem, quam ipsi *πείρα* *ἀπὸ τῆς πείρας* appellabant: vide *ἐμπειρία*.

**Περίπνευμονια.** est vitiosa deligatura, apud Hippocrat. videlicet cum in dextram vel sinistram partem tota deligatio deurgit & declinat: id quod immodica fasciarum copia sæpe accidit.

**Περίπνευμονια.** vtrinq; perforatum, apud Hippocrat. vt scribit Galen. *α τὴν γλώσσην.*

**Περίπνευμονια.** sectionis genus est in sincipite ad caluariam vsque, vna tribusve lineis, quemadmodum apud Paulum lib. 6. cap. 7. & apud Aetium lib. 7. cap. 93. scriptum est. Adhibetur autem cum multa & in alto posita vasa tenuem & copiosam fluxionem in oculos transmittunt, quæ nullis remediis sustineri possent. Quæ tamen curandi ratio nunc prorsus exoleuit.

**Περίπνευμονια.** comprehensua facultas. Est quæ alimentum attractum arte complectitur, quo melius concoquatur. Ministra est virtutis retentricis, atque inde concoctricis. Si namque vacuum inter alimērum & ventriculum spatium relinquatur, fluctuationes strepitusque excitabuntur, effluetque necessario alimentum antequam perfecte concoctum fuerit. Porro facultas ea non modo ad ciborum qui in ventriculo continentur concoctionem, sed in omnibus etiam partibus requiritur, in quibus certo quodam tempore aliquid retineri oportet. Aliter enim gestari fœtus ad legitimum vsque parienti tempus non posset, nisi vterus ipsum arctissime comprehenderet, & vndique complecteretur.

**Περίπνευμονια.** crista gallinacea, verbenaca, trixalis, exupera dicitur à Romanis auctore Dioscoride. Cuius ille duo facit genera, rectum & supinum: Plinius marem & fœminam. Quidam non distinguunt. Dioscorides secundum genus, quod supinum censeret, *ισοβοτάνη* appellat. Primum genus sic dictum est, quod columbæ in ea manserint, vnde columbaris quoque vocatur. Latinis verbenæ & verbenaca: à Gallis veruena dicitur. vide *ισοβοτάνη*.

**Περίπνευμονια.** appellatur à *ισοβοτάνη* à Dioscoride.

**Περίπνευμονια.** dicitur ab Hippocrate modus reponendi articuli, sola digitorum coniectione

contractationeque siue ipsius atri, siue medici. Is facillimus est, & in ea articuli luxatione usurpatur ubi commissura laxa est, & canum exiguis labris continetur. Sic enim atri per se ipsos articulum facile restitunt, ipsique digiti vicem rectis præstant. Talis reponendi ratio conuenit articulo humeri cum laxo scapularum osse, quippe qui nullum oblongum processum habeat, neque in capite humeri (ex toto enim rotundum est) neque in labris illius cavitatis in quam recipitur, sicut annotat Galen. comment. 1. de re med. 2. ubi circumuagationem interpres conuertit.

**Peritonæum** peritonæum. Est membrana, seu tunica (vtramque enim sortitur appellationem, sed membrana quidem ab essentia, tunica vero ab usu nuncupatur) totum ventrem infernum continens. Huic enim toti *σπέρνιμ*, hoc est circumtenditur, vnde & nomen habet. Oritur præcipue à ligamentis spondylorum qui sunt ad lumbos, ibique crassissima est, & superne viris, inferne mulieribus crassior & robustior. Omnibus autem ventris inferni partibus tunicam largitur, & eam quidem qua crassior est crassiorem, tanquam apophysim quandam, phrenibus, hepatis, folliculo felleis, qua parte non tegitur hepate, lieni, ventriculo, intestinis, vesicæ, vtero, renibus, vræteribus, venæ cauæ & arteriæ magnæ descendentes & vasis ab utraque spermaticis. Eadem quoque duplicata, epiploon & mesarion, ramos portæ venæ utrinque colligans, facit illud diffusa, hoc vnita, ambo ex ipsius peritonæi basi orta. Quinetiam parti costarum notharum & musculorum epigastrii præcipue transversorum, tum carni tum aponeurosi subrenditur. Recipit autem peritonæum à lumborum & partium in processu vicinarum nervis quidem sensum, venis autem alimentum.

**Περίσπυμα** excrementum. Dicitur quicquid in corpore superfluum est, siue spiritus, siue humor, siue corpus aliud solidum. Cæterum omne redundat ex corporis nutritione. Nam si quid in alendo corpore nec confectum nec prorsus assimilatum est, id corpori nec adnascitur accrescitve, sed per ipsius laxiora intus spatia errat tanquam superuacaneum, vnde nomen quoque recte à maioribus *περίσπυμα* est inditum. Sed cum genere triplicia, ut diximus, excrementa habeantur, primum de humoribus dicendum, quorum etiam duæ sunt differentie. Nā quod humor copiosius exuperet, vel quod aliena qualitate præditus sit, excrementitius appellatur: vtrumque enim natura seponit & excernit. Primi generis sunt sanguis menstruus, aut saltem portio eius tenuior & purior, lac, semen, medulla ossium, humor tum spumens qui in pulmonis carne continetur, tum glutinosus qui in arti-

culis est, & si quæ alia sunt in corpore prorsus benigna, sed quibus in præsens carere corpus possit, vel sint ad generationem aut fortis alimoniam comparata. Nam partes omnes, ut demonstravit Galenus in lib. de facultat. natur. quicquid possunt alimenti sibi assimilant & apponunt quo nutriantur: & ex eo opere duplex recrementum relinquitur, alterum inutile, alterum utile & benignum, similis cum parte ipsa naturæ, quod quidem à multitudine & copia habet originem, cæterum tanquam familiare seruatur. Quod vero alendo corpori inutile est nec benignum, aliud naturale, aliud præter naturam est. Naturale rursum aliud utile, aliud inutile prorsus est. Utile dicitur cuius aliquis in corpore usus est, ut bilis flaua in sua vesicula, & atra in liene, & eius excrementi ex quo pili & ungues oriuntur: inutile contra quod corpori nullo modo inseruit, ut stercus, vrina, sudor. Quod vero præter naturam est, id præter naturæ leges nascitur, nullumque corpori usum præstat, sed vehementer officit, morbosque creat. Huius generis sunt permultæ bilis species de quibus suo loco dicetur, & quicunque humor in corpore computruit, vel naturæ modum excessit. Cuius quidem excessus quoniam varia & multiplex ratio est, ideo plurimæ sunt huiusmodi excrementorum differentie, quarum alie à colore, alie à consistentia, alie à qualitatibus temperie, alie à gustu, alie ab effectibus nomen habent. Inde flaua, nigra, alba, aquosa, tenuia, crassa, calida, frigida, humida, vitrea, nitrosa, falsa, acida, nidorosa, acrida, exedentia, putrefaciencia appellantur. Hi quidem excrementitii humores sunt. Datur vero & excrementi nomen spiritui vaporoso & fuliginoso qui conspectum præ tenuitate effugit, & perflatu sensum latentem transpirat. Id enim tertie concoctionis excrementum à Galeno dicitur. Sed & solida quedam corpora inter excrementa reputantur, ut calculi, arenulæ, lumbrici, & si quæ præterea eius generis in corpore continentur.

**Περίσπυρον** vitium est *τὸ πύρον* contrarium, cum videlicet ea quæ meatibus naturales concludunt ita diducta sunt, ut reduci nequeant. Proprie tamen dicitur de præputio ita retrorsum adducto, ut glandem rursus tegere nequeat. vide *σπύρον*.

**Περίσπυρον** usurpatur dictio hæc in Prothet. duorumque alterum significat, ut ait Galen. vel excrementum bile aspersum & circumfusum, quod proprie *περίσπυρον*, hoc est in ambitu & superficie coloratum, dicitur, vel abunde biliosum. Neque enim *περίσπυρον* aliter intelligi potest.

**Περίσπυρον** nigricans & lineescens, apud Hippocratem, ut scribit Galenus *ὁ τῆς γλαυκῆς*. Supra *πύρον* siue (ut quidam codices habent) *πύρον*, eodem significatu.

**Περὶ ψύξης.** refrigeratio. Dicitur in febribus frigus id quod horrorem præcedit.

**Περὶ τῆς σφύρας.** fibula à quibusdam. Est alterum os tibie exterius & tenuius. Alterum enim quod crassissimum est & interiori in parte situm, ὡς καὶ Græcis, eodem cum tota parte nomine, Latinis tibia appellatur. Est autem à πέρων supra breuior paulo, ut quæ genu ipsum non contingat, infra vero longior multo quam tibia: habet autem & supra & infra epiphysim, quarum superiore iungitur cum osse tibie membranoso ligamento inferiori vero prominente & gibba malleolū extetnum constituit, sicut tibia epiphysi simili internum, vide *anatom.* Scribit autem Galen. *de τῆς γνάθου* apud Hippocr. *τὸν περὶ τῆς* diuersa significare: aliquādo quidem os totum membri, aliquādo vero ipsius ossis epiphysim, interdum autem eius protuberantiam, quæ non aliud est quam malleolus.

**Περὶ τῆς σφύρας.** sic dictum à quibusdam fuisse à *σφύρα*, Dioscor. author est.

**Περὶ τῆς μήλας.** pomorum species est: quod maturum tam stomacho quam ventri utile habetur. acerbum aluum cohibet, sed siccum vehementius. Decoctum è siccis, alui stomachique fluxiones sistit. Idem *ποδάρκην* alio nomine appellatur.

**Περὶ τῆς σφύρας.** *σφύρα* vinum annotinum, siue superioris anni vinum, sic tāquam *σφύρα* dictum apud Hippocr. quemadmodum & *αὐτῆς* appellat *τὸν αὐτῆς*, hoc est eiusdem anni, ut scribit Galenus *de τῆς γνάθου*.

**Πῦρ.** pessus, pessarium. Est, ut ait Paulus lib. 3. lana concēpta, & ad digiti figuram rotunda facta, in qua pharḡaca excipiuntur & continentur. Verumtamen non ex lana sola, sed ex panno etiam aut bombace aut linamentis, primum demersis in medicamentum curationi conducens, deinde inuolutis serico filoque appensis parantur. Fiunt & ex gummi, & resinis, & cera, aliisque liquoribus ad talem formam redactis. Conuenit id genus medicamenti præsertim vtero, estque ad multa vtile. Verum de vsu & differentiis pessorum idem Paulus lib. 7. cap. 24. abunde tradit. Ut autem ex Antyllo refert Oribasius, tres sunt pessorum differentie: Alii namque molliunt, alii adstringunt, alii aperiunt. Mollientibus ad veteri inflammationes, exulcerationes, petfrictiones, strangulas, auersiones & inflationes, utimur. fiunt autem ex cera Tyrrhenica, cyprino, susino, pinguedine anseris & gallinæ, buryro infusso, resina deusta, medulla certuina, fœnogræco & similibus. Aperientes viles sunt cum purgationem suppressam prouocare volumus, aut coniuentem compressamque vuluam emendare: hique ex melle, artemisia, dictamnino, brassica, dulcis radices succo, ruta & scamonea. Adstringentium vltus contrariis est apertientibus. nam fluxorem muliebrem cohibent, & vterum suspensum contrahunt, & prolapsum reprimant.

**Πῦρ.** nigricantia in oculo Iulius Pollux interpretatur.

**Περὶ τῆς σφύρας.** foliosa vrina dicitur ea in qua foliis similia siue squamis aut laminis subsident dicuntur autem *σφύρα*, inquit Actuarius, quæ & longitudinem & latitudinem habent, non etiam evidentem profunditatem. Eodem etiam, ait ille, dotata sunt nomine instrumenta quædam ad sanificia comparata. Quinetiam lapis quidam *σφύρα* dicitur quasi *σφύρα*, hoc est in laminas, solutus. Ex quibus omnibus *σφύρα* siue quæ subsident in vrinis foliis similia, & considerare oportet. Fir autem eiusmodi, vesica resoluta & erosa, ut author est Galen. continent. aphor. 76. lib. 2. vide *σφύρα*.

**Περὶ τῆς πέταλις.** herba est cuius pediculus cubito maior est, crassitudine pollicis, à quo prægrandè folium, galeri modo amplum, seu fungus dependet. tertio ordine desiccat.

**Περὶ τῆς πέτρας.** petra Asia, in qua lapis Asius prouenit, cui tamen illa vim habeat similem, actionis tamen vehementia inferior est. vide *σφύρα*.

**Περὶ τῶν ῥαχίδων.** saxatiles pisces. Hi dicuntur qui non in leuibus aut arenosis aut terreis littoribus, sed in petrosis promontoriis, & vbi saxa sunt, delitescunt & pariunt. Alimentum autem quod ex ijs sumitur, non modo ad coquendum est facile, sed hominū etiam corporibus saluberrimum, ut quod sanguinem medium consistentia generet: hoc est neque admodum tenuem, neque aquosum, neque vehementer crassum. Sunt præterea ad detergendum optimi, bonique succi, neque glutinosi, quos etiam febricitantibus offerendos esse Galenus consulit. Numerantur autem hi à Galeno lib. de alimentorum facult. 3. scarus, merula, turdus, iulia, fuca, perca.

**Περὶ τῆς πετρελαίας.** petroleum. dicitur à quibusdam bitumen liquidū, quod effluat è saxis, vel quod eo ad lucernarum luminā olei vice antiqui vtentur. Scribit Platearius fieri cum pinguedo terræ & aque actione caloris in igne, partes conuertitur, & inueniri super lapides, quia per eos refudet, & ex eis, & supra muros inueniri, sed nigri coloris, postea vero per excoctionem fieri album: dicitur igneam habere vim dissoluendi, attrahendi, & consumendi. vide *σφύρα*.

**Περὶ τῆς πετρελαίας.** species apii præruptis in locis nascentis semine ammeos, sed olente magis, gustu acri & odorato. Horrens longe maius est. Macedonicum cognominatur, quoniam in Macedonia frequens optimumque nascitur. Eius semen calidum siccumque est tertio excessu, incidit, vrinas mouet & menses, flarus valenter discutit.

**Περὶ τῆς πετρελαίας.** sic dicitur *σφύρα*, siue sedum maius, quod in petris nascatur.

**Περὶ τῆς πετρελαίας.** planta est caulem emittens tenuem, gracilem, fœniculo similem. comam habet statim ab terra foliosam spissamque, florem lute-

Inteum, radicem nigram, crassam, plenam, grani odore, succosam, ex qua tenera cultrillo concisa profluat succus admodum exalfaciens, digerens, attenuans, maximi in medicina usus, si verus haberetur.

*Concoctio* etiam dicitur à quibusdam *hinc* *hinc*, hoc est cucumis anguinus, sicut habetur apud Dioscoridem.

*Concoctio*. *Concoctio*. Est alteratio nutritis in propriam qualitatem eius quod nutritur. Alterationem esse multis in locis Galenus docuit, sed non eam quidem quæ fiat per qualitatis depositionem & mutationem in contrariam qualitatem, eodem manente subiecto, sed specificam, quæ proprie & primum ab eo dicitur alteratio. Ea fit cum ex specie alia species inducitur, ut cum ex pane, carnibus, vino, sanguis, pituita, bilis tum flava, tum atra, atque ex his postea adeps, os, nervus, caro, arteria, vena generantur, nutriuntur & augentur. Siquidem dum in ventre venisque nutrimentum concoquitur, easque mutationes perpetitur, tota sua substantia alteratur, veteremque naturam exiit, in aliam transiens speciem. Concoctio igitur alteratio est, non in omnem, sed in propriam corporis nutriendi qualitatem, quæ quidem cibo induci non potest, nisi in aliam speciem versio, quæ proxime ad nutriti substantiam accedat. Non est enim ea quæ cibo inducitur qualitas elementaris, calor scilicet aut frigiditas, sed essentialis potius & substantifica. Itaque si concoctio nutritionis gratia fit, eaque perficitur appositione similis substantiæ, necesse est cibum qui concoquitur, aliam substantiæ speciem induere, & in aliud mutari. Quare quot sunt coctiones, totidem substantiæ mutationes fieri necesse est, antequam in propriam cuiusque, à quo mutatur, qualitatem alterari possit. Ac in ventriculo quidem chylus, quem succum, vel, si placet, cremorem interpretare, in iecinore & venis sanguis, in solidis ipsis partibus ceteros efficitur. Tot enim concoctiones à medicis in animalium corpore statuuntur. Sed primum dicendum de prima, quæ fit in ventriculo. Quæ si communem concoctionis rationem habet, necesse est in ventriculo cibum cōuersum in chylum propriam ventriculi qualitatem induere. Quo in opere duo concurrunt, chylus & propria qualitas, quorum hæc veram concoctionis ventriculi rationem substantiamque perficit, ille vero non perficit quidem, ex ijs tamen est quæ necessario concoctionis substantiam consequuntur. Neque enim cibi in chylum cōuersio proprius est concoctionis ventriculi terminus, quod oporteret statim post eius generationem *aperiri* aperiri, statimque ipsum à ventriculo in venas transire, cum tamen ijs qui imbecilli sunt, diutissime hic innatet, & fluctuationes cum sonitu, dum moratur, exciret, neque exeat, nisi vi facta ventriculo, præsertim cum foris etiam speci-

em eiusmodi cremoris efficere liceat. Sed verus huius concoctionis terminus est propria ventriculi qualitas in eiusmodi cremorem impressa. Ac donec quidem chylus eam qualitatis similitudinem adeptus fuerit, concoqui dicitur: ubi vero parti nutriendæ apponi coepit, iam non coqui, sed alere ipsaque actio nutritio appellatur. sine enim à se inuicem concoctio nutritioque differunt, quod hæc mutatio sit cibi in nutriti substantiam, illa vero in solam qualitatem. Est autem ea quæ in ventriculo fit concoctio, actio ipsius ventriculi propria, non oris ipsius, quod appetit quidem cibos, sed non concoquit. Eius causa, ut & omnium operum naturalium, est proprius & innatus calor ventriculi, quem magis indicibili quadam proprietate, quam ardore & vehementia definire conuenit. Hic cum calidus sit & humidus iccirco veteres concoctionem elixationem propter similitudinem dixerunt. Talis quidem fuit Hippocratis & Aristotelis sententia, hoc inter cetera argumento firmata, quod concoctio per somnum quam quietem efficacius fiat. Ut enim scribit Hippocr. lib. 6. *de indurion*, euidenter vigilans calidior exterius, interius autem frigidior, dormiens e contrario. At vero Erasistratus conitione & molitura, & amplexu ventriculi & ascitij spiritus proprietate: Empedocles autem putrefactione (cuius opinionem plerique veterum sequuti, *ampla* vocauerunt, quæ postea *ampla* dicta sunt) quod alimenta in ventriculo saporis odorisque gratiam amittant, ciborum concoctiones fieri crediderunt. Cum autem calor ipse naturæ concoquendi principium sit, cause tamen aliæ plæræque ad concoctionem concurrunt, vel per quas melius ipsa concoctio perficitur, vel sine quibus absolui non potest. Nam & cibos in ore mandi oportet, in quo principium huius concoctionis quidam posuerunt, & in ventriculo retineri necesse est, & ventrem eos prorsus complecti ac vndique constringere, ut nullum vacuum relinquat locum. Alioquin vel exit cibus priusquam possit concoqui, vel fluctuantis humoris sonitus velut ex vacuo eduntur atque exaudiuntur, ipseque ventriculus premitur pariter & grauatur. Est autem hic complexus tanti momenti, ut nec in utero, nec ventre, nec vesica vitæ, nec ea quæ bilem excipit, nec altera, vacuum locum sit inuenire, sed siue parum sit, quod in his continetur, siue multum, pleni eorum sinus apparent, tunicis ipsis semper ea quæ continent arcte complectentibus, modo scilicet naturaliter animal se habeat. Eadē & in secunda coctione ratio est, quæ in venis mesenterij & in iecinore perficitur. Id enim attractu chylum arcte similiter comprehendit, nec nisi concoctum dimittit. Huius quidem concoctionis materia chylus est, finis vero & terminus impressa chylo propria iecinoris qualitas, quo in opere chyli specie mutari, & in san-



guinem transire necessarium est, ipsum autem concoquendi instrumentum iecur. Sic & in tertia concoctione sanguis pro materia habetur, qui deinde sanguinis forma exutus speciem roris accipit, & in propriam solidarum partium, quibus alimento est, qualitatem mutatur. Sunt enim solidæ partes huius tertiæ concoctionis instrumenta. Vt autem illæ multæ sunt, sic etiam multiplices huius concoctionis differentiæ existunt. Pars enim vnaquæque sibi sanguinem concoquit suo modo: aliter quidem nervus, aliter os, aliter arteria. Hunc quidem in modum se habet triplex ea ciborum concoctio, quæ in corporibus animalium fieri veteres prodiderunt: in quarum posterioribus eadem ferè omnia, quæ de priore dicta sunt, usurpare continet. His omnibus scopus vnus, propositus est, ita alterare alimentum, vt postea in corporis substantiam facile verti possit. Quia in re, si quid inest alimento quod assimilari non potest, id calor natiuus tanquam inutile & alienum separat atque expellit. Sic fit, vt singularum coctionum propria sint extrema, quemadmodum Gal. lib. 1. sanitiuendæ demonstrauit. Sic quidè in sano homine & secundum naturam se habentē coctio peragitur. Cæterum ab ea non longe diuersa est vitiosi humoris, quæ per morbos suscipitur à natura, coctio. Habent enim inter se permixta communia. Vtramque calor natiuus molitur solidis partibus insitus, in vtraque eadem illæ partes materiam quæ coquitur, contendunt in propriam qualitatem commutare alterareque. Sed eum quidem finem in alimento concoquendo natura assequitur, in morbifico autem humore consequi non potest. Quod enim putridus atque à natura prorsus alienus humor est, fieri non potest vt propriam corporis nostri qualitatem recipiat. Itaque quamuis natura circa eius coctionem alterationemque versetur, idem ex eo quod ex optimo alimento consequi cupiens (nemo enim naturales facultates ratione gubernari administrarique, vt opinor, contenderit) eo tamen sine frustratur propter materiæ peruersitatem, quæ nunquam ita mitigari potest, vt propriam corporis nostri qualitatem admittat, deindeque nutriet. At tamen si modo morbus salubris futurus est, eam quadamtenus à solidis partibus, quarum proprium munus est coctio, alterari necesse est & mitiorem reddi. Id quod concoqui vocauit Hippocrates, id est, à natura quocunque modo euinci. Tunc enim concoctionis nomen in suo vniuersaliore significato accipimus. Est autem id vniuersalius, inquit Galenus, cum natura causis fortior fuerit, permutaueritque eas suo robore. Sunt autem huius euictionis permutationisque variorum differentiæ. Nam & crassa dum extenuantur, aut tenuia in crassantur, aut lenta inciduntur, aut putria in pus vertuntur, à natura vinci & concoqui dicuntur, concoctione

scilicet, vt ait Galenus, omnem ad mediocriter temperamentum adductionem significantem. Sic enim vitiosi humores quandam tum substantiæ, tum qualitatis moderationem adipiscuntur. Hanc autem consequuti facile postea extra corpus pelluntur à facultate expultrice, quæ nunquam nisi perfecta concoctione, salubriter munere suo fungi potest. Alias enim omnis excretio symptomatice censi debet, non aliter quam cruda lientericorum deiectio. Hunc quidem in modum de coctione se res habet. Quod autem ad nominis rationem attinet, Aristoteles πύμας nomen commune facit πύμας, πύμας & εἶμας. Tres enim has species πύμας constituit. πύμας siue πύμας appellat coctionem eam quæ fit à calore interno, de qua superiora omnia dicta sunt, & cui πύμας potius quam πύμας nomen dedimus, Hippocratem & medicos omnes sequuti: εἶμας vero & εἶμας, eam quæ fit ab externo. At vero alii πύμας vocant, vt scribit Galenus comment. 2. in lib. 1. πύμας deductionem quandam eius quod coquitur in coquendis substantiam, quæ in sanis fiat, & ex qua paucissimum super sit semicoctum: πύμας autem veluti coctionem quandam & maturationem humoris morbifici, in qua quod assimilatur paucum est, quod autem semicoctum & superfluum relinquitur, multum. Galenus tamen passim concoctionem quæ in morbis fit πύμας indifferenter appellat. vide εἶμας.

Πύμας, dicuntur à quibusdam oculorum anguli maiores, qui sunt ad nares, quos etiam alio nomine πύμας appellant.

Πύμας, emplastrum rutaceum, quod triplex reperio: vnum apud Paulum lib. 7. alterum apud Aetium lib. 1. 5. contractos manuum articulos magnopere emolliens: tertium similiter apud Aetium, ad scabras fistulas conueniens.

Πύμας, concretile. Est passua qualitas secundi generis, de numero earum quæ secundum naturalem potentiam vel impotentiam dicuntur: significat autem id quod condensari atque indurari potest. Quibus autem id contingit modis, calore & frigore: illo quidem desiccante humorem, hoc vero calorem expellente. Itaque alia humoris absentia, alia vero caloris con crescent: aquea quidem caloris, vt glacies, cera, seuum: terrea vero humoris, vt sal, nitrum, lutum. vide πύμας.

Πύμας siue

Πύμας γάλα, est lac coactum per coagulum admixto melle. de quo vide in dictione γάλα.

Πύμας, est species collyriorum πύμας, sic dictum, vt arbitror, πύμας, quasi cœnosum siue lutosum, & idem quod πύμας. Ex ipsa compositionis forma nomen inditum. Nam cum pleræque πύμας differētiæ Aetius describat, omnes se habent in fecis modum propter acaciæ succum, quo quæ constant collyria πύμας, ea Galenus

πρὸς τὸν nuncupari scribit, lib. 4. *πρὸς τὸν*, *πρὸς τὸν*.

Πηλοποιήτων *πρὸς τὸν*.

Πηλοποιήτων *πρὸς τὸν*. ab omnibus fere interpretibus male veritur: alius lixiniā figuli aquā, alius cum luto suo lixiniā, alius aquam lutarīam reddidit, alius se plane nescire quid esset professus est. Nec immerito quidem, quod non animaduertent per *πηλοποιήτων* scribendum esse: quod quid significet, vide suo loco.

Πηλ. coagulatio, concretio. Est diffluentis humidii determinatio, sit exiccatione, quod propriū sit sicci terminari atque definiri. Inducitur autem siccitas vel sicco corpore superinducto, vel summo quæ inerat, humiditatis redundantia. Cuius summouendæ ratio etiam duplex est, scilicet per compressionem humiditatis à terrestribus partibus siccioribus factam, sed adhuc tamen in corpore latentis & contentæ, vel per resolutionem. Causæ vero coagulationis seu concretionis sunt tum calidum, tum frigidum. Calidum quidem tam per se quam per accidens, frigidum vero non nisi per accidens, sicut Aristor. lib. 4. meteor. demonstrauit.

Πηλ. *πρὸς τὸν*, apud Hippocr. interdum etiam *πρὸς τὸν*, apud eundem lib. *πρὸς τὸν* *αἰμορροϊδῶν καὶ συελύων*, vt scribit Gal. *πρὸς τὸν* *γλῶσσας*. Apud Erymol. & Suidam oxytōnōs est *πηλ*: quorum ille dicit esse *πρην*, hic *αἰδοῖν*.

Πηλ. *πρὸς τὸν*, dicitur à Galenō nardus montana eadem prorsus ratione, qua etiam *δουάνας* appellatur, ob id videlicet quod è Syria atque Cilicia *δουάνας καὶ πηλ*, hoc est sacculis & peris, in Græciam deportaretur. vide *πρὸς τὸν*.

Πηλ. cubitus. duo significat apud Hippocratem. Hic enim aliquando vocauit eam partem totam, quæ inter manum & cubiti articulum est, interdum cubitum id os quod è duobus ossibus longius est & grandius. *πρην* enim gemino osse constat, quorum alterum *κρην*, id est radius, alterum *πρην* eodē cum tota parte nomine appellatur. sicut *κρην* & totam partem, & partis totius portionem significat, vt annotat Galenus comment. 4. *πρην* *πρὸς τὸν* *πρην*. Subest autem cubitus radio, habetque duas apophyses acutas, *κρην* ob id dictas, quarum anterior est minor, altera maior. Inter has autem cavitates est, *πρην* siue *πρην* dicta, similis Græcorum literæ, vt asperæ arteriæ bronchia, in quam orbita trochleæ similis, inter duos condylos sita, brachio inseritur. Huius autem ossis, quod cubitū speciatim nominant, finis vterque validis ligamenti radio colligatur. Media autem amborum inter se omnino dehiscunt. Vtrinque autem os iuxta carpum epiphysem foris gibbā, intus cauam habet, cubitus quidem minimo digito, radius autem maximo respondentem, in quam cavitatem carpus immittitur & diarthrosi inarticulatur. Inest præterea cubito ex abundantia quadam apophysis dicta su-

*πρην*, siue *πρην*, à styli vel columnæ figura, ipsa etiam carpo per diarthrosim inarticulata, motus carpi obliquos dirigēs ac firmans, tum ligamenti, tum etiam occursum ossis carpi ipsam parua cavitare excipientis. vide *πρην*.

Est & *πρην* mensuræ nomen, qua rerum intervalla dimetimur. Est autem extensio à cubitu vsq; ad summum medium digitum, pedis vnus & dimidiū, vt scribunt Suidas, Hesychius & Pollux. Est igitur mensura digitorum quatuor & viginti. Latini cubitum etiam vocant. Ab eo deriuantur *πρην*, *πρην*, *πρην*, quæ sæpe apud authores occurrunt.

Πηλ. *πρην*, sic à quibusdam dictum est elleborum album, vt habetur apud Dioscor.

Πηλ. *πρην*, retrementum cuiuscunque rei post expressionem relictum. dicitur & *πρην* & *πρην*. Plurique tamen non retrementa tantum à succo expresso reliqua, sed ipsum etiam succum aliquando significari contendunt. Dicitur *πρην* *πρην*, quod premere significat.

Πηλ. *πρην*, instrumentum chirurgicum, apud Hippocratem, quod & *πρην* à fori rumpendo appellatur. refert Galen. *πρην* *πρην*.

Πηλ. *πρην*, dicitur genus papaueris sylvestre, quod aliqui etiam rhœada appellant. vide in dictione Papauer.

Πηλ. *πρην*, *πρην*, apud Hippocr. vt scribit Galen. *πρην* *πρην*.

Πηλ. *πρην*, medicamenti nomen est ex aloë compositum, quod quamuis duobus nominibus *πρην* dicatur, absolute tamen tempore Galeni *πρην*, propter insignem amaritudinem, dictum est. vide *πρην*.

Πηλ. *πρην*, dicitur à quibusdam *πρην*, vt habetur apud Dioscoridem. vel eodem etiam authore, sylvestris feris, quæ & cichorium appellatur.

Πηλ. *πρην*, amarum. Id dicitur quod vehementer extergit, simulque linguam moleste exasperat. Quicquid autem tale est, terrestre prorsus est & siccum, sed subtile & calor excessui extenuarum atque elaboratum, & consistentia omnino cineri simile, eaque in re falso admodum propinquum & affine. Sunt enim ambo terrena & calida, in eo tamen non obscure dissidentia, quod salsum, veluti & adstringens, multo crassioris substantiæ sit, amarum vero tenuioris. Quod autem amara terrena sint & sicca, hinc licet colligere, quod ex dulcibus excalfactis supra modum amara fiant, appareantque protinus consistentia sicciorē quam dulcia. Cum enim à dulcibus humor semper defluat & absumatur in vaporem à calore resolutus, necesse est reliquum terrenius sicciusque effici. Siquidem dulcedo calido atque humido constat, habetque temperiem nostræ simillimam. Itaque quod è dulci superaffato prouenit, petendū vt calx cinisque calidum & siccum necessario efficitur. Neque

enim aerea, neque tenuis, neque aqua potest esse eius consistentia, sed terrena prorsus & superata. Ideo amara omnium minime putrescunt, nec vermes aut alia eiusmodi animalia procreant, qualia in reliquis putrescentibus proueniunt. Siccitatem autem eam inducit calor mediocriter excedens, non tantus quidem ut urat & acre efficiat, sed superans dulcedinem & eius humiditatem reficcans. Fiant igitur amara vi caloris, partim proprii & insiti, quomodo mel vetustate amarescit, partim externi & adueritii, ut cum igni vel soli diutius exponitur. Sed cum ampla sit caloris latitudo, immodice acris, moderatus dulcia, medius amara efficit. Verum is quoque in singulis suos habet terminos: siquidem tantus calor ut abstergere possit, nec quicquam ultra moliri, amara reddit: qui vero intensior est, adeo ut exurat, acris: at moderatus, qui nihil horum agit, sed nutrire modo potest, dulcia generat. Itaque veluti amara tenuiora & calidiora sunt non modo adstringentibus sed & dulcibus, ita acris crassiora sunt minusque calida. Verum tamen quicquid amarum est, idem etiam acre dici potest, siquidem amara mordicant, sed minus quam absolute acris. Ergo cum amara eiusmodi temperie sint, patet ea vim habere incidendi, extenuandi, abstergerendi, expurgandi, siccandi & calefaciendi, hactenus tamen ut non urant, & proinde menses mouendi, atque educendi pus ex pectore & pulmone, & comitiali quoque morbo conferre. Verum praecipue obstructions iecinoris & lienis expediunt, sed per se omnifariam stomacho infesta sunt, & omnibus prope animantibus nedum hominibus ad edendum nutriendumque inepta. Haec quidem de simpliciter & exacte amaris dicta sunt, hoc est, de iis quae nulla alia sensu notabili qualitate participat. Nam pleraque dissimilibus vel contrariis etiam partibus constant, ut absinthium partium amararum, partim adstringentibus, & lactuca vetus partim amararum, partim etiam frigidis atque humidis.

**Πικρότης.** amaritudo. Est sapor moleste linguam exasperans, in substantia sicca, terrestri, subtili & exsergente, a caloris excessu proueniens. Succedit dulcedini, extenuata vi caloris humiditatem & resoluta, quo fit ut amara calidiora simul & tenuiora temperie sint quam dulcia, sicut paulo ante dictum est.

**Πικρόχολοι.** dicuntur ab Hippocrate qui amaro humore, qualis est flaua bilis, redundant, quasi amararum bilis homines. Colligitur autem humor ille aliquando toto corpore, aliquando superiore corporis parte, ut Paulo rhetori, sicut Galenus narrat: quandoque vero inferiore, ut Eudemo philosopho. Itaque pro locorum in quibus ille regurgitat varietate, **πικρόχολοι τῷ ὅλῳ ὄντι, ἢ τῇ ἀνω, ἢ τῇ κατω,** hoc est picrocholi toto habitu, aut superioribus partibus aut inferioribus; ab Hippocrate appellantur.

**Πικρόχολος χυμός.** est pallida & amara bilis, ut exponit Galen. comment. 3. **ἢ τῇ ἀνω, ἢ τῇ κατω,** de his loquens qui ex stomacho caput dolent. nam qui vere **πικρόχολος** humor est, eum **χολῶ** simpliciter dictum fuisse ab antiquis, idem annotauit comment. in aphor. 3 2. lib. 7. Itaque **πικρόχολος χυμός** non aliud est quam **ἡ χολή**, id est bilis, a qua homines **πικρόχολοι** appellantur.

**Πιλοποτηκία κοῖνα.** est lixiuium quo **οἱ πιλοποιοὶ** utuntur cogendis parandisque lanis. Est enim **πῖλος**, **τὸ ἐξ ἐλέως πικρὴν ὑδύμα**, hoc est indumentum de lana compactum, siue in subuculae modum induatur, siue pro calceo pedibus aptetur caloris causa, siue eo ut pileo caput contegatur, siue aliis vsum inseruiat. Est enim **πῖλιν** siue **πῖλιν** lanas cogere & compingere. unde **πῖλιν** deductum est, quod significat lanam coactam, cuiusmodi apud Gallos feltrum est, & omnis generis indumenta ex lana confecta. Inde etiam **πῖλιν κτήματα**, id est lanae coactae, quas iurisperiti coactilia appellant, a quibus **οἱ πιλοποιοὶ**, Latini coactilarii dici possunt. Ceterum eo in opere lanas aqua abluere oportet. quae cum **οἶον πικρὸν**, id est succidat, sint, non est dubium quin aliquam vim medicamentosam in aqua relinquant. Nam ut aqua quae per cinerem aut calcem colata est, vim aliquam inde accipit, ita ea quae succidat abluuntur: ex quo perinde atque illae inter **κοῖνα**, id est lixiuiorum, genera censentur. Est autem praedita facultate digerendi atque incidendi, praesertim si additum est acetum, quod cogendis lanis quondam misceri solitum Plinius scripsit lib. 8. cap. 48. ubi de lanarum generibus disserit. Proinde strenuum est lactis coagulati remedium, ut habetur lib. 6, apud Dioscoridem: nec temere Galenus lib. 6. methodi medendi, ab ea perit remedium ad neruum punctum in penuria alterius medicamenti, cum agro forte vicinum **πιλοποῖν** vidisset. Sic enim legendum est per **π**, non ut Linacer **πιλοποῖν**, quem figulum male videtur interpretari. Nam quamuis **πῖλος** lutum significet, nemo tamen Graecorum eum qui ex luto aliquid fingit, **πῖλοποιον**, sed vel **κεραμῖς** vel **καροπλάστης**, appellauit. Neque enim lutum ipsum fingitur, sed ex eo alia fiunt ab artifice. Quod tamen mirum est a nullo Graecorum medicorum interprete animaduersum fuisse, quod ubique apud Dioscoridem, Galenum & reliquos per **π** scriptum legeretur. Ac quamuis magna pars medicorum eam in lixiuiorum genere annumerent, **κοῖνα πιλοποτηκία** vel **πιλοποτηκία** appellant, a multis tamen **ὁδὸν πιλοποτηκίαν**, vel **πιλοποῖν**, vel **τὴν πιλοποῖν** vocari reperies: ab Actio vero **κεκτὴν τὴν πιλοποῖν**, nulla prorsus ipsius rei differentia.

**Ἰμμελ.** adeps pinguedo. est pars corporis similis, & quoad sensum simplicissima, humida & exanguis, a frigiditate partium neruo-

serum ex aerea & pinguiore sanguinis substantia per vasorum tunicas exudante, concretescens, & cuti ad internam eius membranam subnascens. Hic quamvis ex sanguine factus sit, exanguis tamen est & frigidus, ut qui ex habitus frigiditate gignatur. Eum humidiores esse cerebro Galen. demonstravit in lib. de temperamentis, eiusque generationis modum declaravit, scribens adipem calfactum liquari, ceterorum humidorum à frigore coagularum ritu. Cerebrum autem calfactum minime liquari, eoque adipe minus esse humidum, etiamsi adeps specie aridior esse videatur. Adipi namque concretio contingit, propterea quod membranis adiacet. Crasso namque oleo est similis, eoque coagulatur ubi cum frigidis & exanguibus particulis coniungitur. At neque circa iecur, neque circa arterias venasve aut cor, sed neque circa aliam præcalidam particulam coire potest, proindeque frigidioris naturæ & vitæ magis desidiose nota est. Affusus est autem membranosis & reliquis siccis particulis, ut eas ipsas pingui natio humectet, quæ celeriter in diurnis inediis ac vehementibus exercitationibus & calori- bus immodicis exiccatur atque indurescunt, ut docet Gal. lib. 16. de usu partium. Differt autem sæuum (quod sæuum sine sæbum Latini interpretantur) quod, ut ait Galen. sæuum crassius ac durius sit, ac propterea in animalibus totam naturam sicciores magisque terrestrem habentibus proveniat, velut adeps humidioribus: quodque sæuum nec facile funditur liquefcitve, & fusum celeriter iterum coit & congelatur, adeps contra ab igne liquefcit celeriter, nec facile ubi reliquata fuerit, rursus cogitur: vel, ut ait Aristoteles lib. 3. de natura animalium, quod sæuum fragile usquequaque sit, & cum refrixit concrefcet, adeps liquidus sit, minimeque aptus durari, quodque locis etiam discerpit: adeps enim inter carnem cutemque solet consistere, sæuum in sine carnis semper est. Verum sæpe hæc duo vocabula apud antiquos confunduntur, qui indifferenter vnum pro altero vsurpant:

**Πινον.** vinum hordeaceum, ut scribit Arist. quod qui inebriantur, non in omnem partem, ut ceteri, corrumpunt, sed proni tantum aut supini. Paulus autem vinum quod ex sordibus vel lerum elutis conficitur, **πινον** vocari putat. **πινος** enim sordem significat.

**Πιπίων.** Hippocr. dicere solet quod ceteri **πινίον**, bibendum dare, seu in potu præbere. ut **πινίον** initio, **πινίον** καὶ **πινίον**. At **πινίον**, pipire est: ut **πινίον**, pipiones, aurum pulli.

**Πικρα.** pix. Nihil aliud est quam fluxus combustæ in tecta sua resinæ. Quod enim ex viventibus plantis destillat, resinæ nomine donatur. Idem vero incensa in furnis eadem materia, picis appellatione fluit, & canaliculis quibusdam circa pyram compositis excipitur. De pinu fere omnis est, ut Theophras-

tus inquit, quanquam in Syria terebinthi quoque picem ferant: è picea quoque, cedro, palma, abiete, strobilo colligitur. Quæ prima diffluit, simplex & liquida tantum est. quæ postrema venit, siccior paulo est, sed quæ tamen liquida nomen adhuc retineat. Sicca enim pix sit, alterutra earum iterum decocta, ideoque à quibusdam **πικρα** nuncupatur. Ut autem liquida & sicca compage differunt, sic etiam facultatibus. Sicca in secundo ordine desiccatur, minusque quam liquida calefacit. & habent quidem ambæ quod purget, maturet, discutiat, & accre sit, ad omnia tamè liquida efficacior est, sicca autem glutinandis vulneribus aptior. Sed cum plures fuerint apud antiquos picis differentia, **βρυτία**, hoc est Brutiam, supra ceteras in medicina commendavit Galen. liquidam præsertim, ut quæ pinguisima resinosisissimaque esset: quanquam etiam **βρυτία** **ἐν** vsus sit Andromachus ad splenicis, ut refert Galen. lib. 9. **τὸν καὶ τὸν**. Eam à Brutijs dictam fuisse constat, qui olim eum Italia tractum incolebant, qui nunc Calabria dicitur.

**πικρα**, dicitur à quibusdam **πικρα**, ut habetur apud Dioscoridem. Ratio est à glutinoso eius lentore, quod, ut ait Plinius, trita mellis odorem habeat, digitis tactu eius coherentibus.

**Πικρὰς.** picis flos. Id dicitur, inquit Galenus lib. 2. de simplic. medic. faculr. quod oleosum in pice liquida superne fluitat. id autem est, ut idem ait, multo tenuiorum quam pix ipsa partium, siue eius copagem, siue etiam facultatem spectemus. Paulus lib. 3. cap. 74. idem videtur **πικρὰς** nomine intelligere. Scribonius cap. 40. ait, Picis florem, quod **πικρὰς** appellant: quamvis Galenus eo loco **πικρὰς** & **πικρὰς** plurimum inter se differre scribat.

**Πικρὰς.** bituminis genus est quod Epiri ad Apolloniam gignitur: ubi Cerauniis montibus devolutum, impetu fluminis rapitur, æstuque in litus expiuit, & cogitur in glebas. Sic autem dictum est, vel quod naturaliter pix mista sit bitumini, ut scribit Plinius, vel quod utrumque oleat, ut Dioscor. tradit. Quidam vero ipsi miscent.

**Πικρὰς.** oleum picinum. Fir, inquit Dioscorides, è pice separato liquore aquoso qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa, quamdiu pix coquitur, supra eam vellera pura, halitu eius madescunt, qui postea exprimitur in vas. Ob id putò idem esse cum **πικρὰς**, siue **πικρὰς** **πικρὰς**, cuius sæpe medicum meminere. At non sic Galenus, qui omnium solus, quod sciam, scribit lib. 1. **πικρὰς** **πικρὰς** dici picem liquidam oleo permistam, **πικρὰς** autem esse id quod liquida pici superstat, quod tamen Dioscoridi **πικρὰς** est. Forte iam coeperat Galeni seculo vera & antiqua **πικρὰς** significatio attribui medicamento ex oleo & pice liquida composito.

**Πισσάκη** *κέρων*. est ceratum rosa, oleo, & arida pice constans, vt annotat Galen. comment. *ἰς τὸ πικρὸν ἀγρὸν*.

**Πισσάκος**, sic dicitur, inquit Aristoteles, alucorum tectorum crustaue, proxima τῇ μύτῃ, sed ea leuior, minusq; medicamentosa. Plinius scribit prima operis apum fundamenta *μίτῃ* vocari, secunda *πισσάκων*, tertia *τὸν πάλιν*. crusta prima est, saporis amari: *πισσάκος* super eam venit picatium modo, seu dilutor, ceræ initium, plerumque è mitiori gummi: propolis crassioris iam materię additis floribus, nondum tamen cera, sed fauorum stabilimentum.

**Πισάκια**, fructus pineis nucibus similes è surculis arboris dependentes quæ in Syria nascitur omnino nuda præterquam ramorū cacuminibus, quæ densiore folio, angusto & subrufo vestiuntur. Sicut autem cum pineis nucibus forma conueniunt, ita & effectu. Officinæ fistica & fisticorum grana vocant.

**Πιστοχία** siue *πιστοχία*. est quartum genus aristolochiæ, tenuior quam clematidis, densis radicum capillamentis (vnde & *πυλὴρις* appellatur) iunci plenioris crassitudine. Dicitur & eo nomine à quibusdam *ἡ ἀλγία*, vt habetur apud Dioscor.

**Πίσσις**, picatio. Est picis ad cutem illitio: vel, est dropax simplicissimus, pice arida cum exiguo oleo liquata, cutique dum caler illita. Species est dropacis, qui cum multiplex esse possit, variaque materia ad varios vsus constare, qui simplicissimus est, atque ita, vt dictum est, apparatus, *πίσσις* appellatur. Adhibetur id remedii genus vel corpori vniuerso, vel certis interdum partibus: Raduntur primum pili vel psilothro auelluntur, deinde pix modico soluta oleo calensque cuti superlinitur, & priusquam plane refrigeret, auellitur: deinde rursum, vt ante, admouetur & auellitur, atque hoc identidem repetitur, quantum medendi ratio postulat, vel vno eodemque die, vel pluribus. Vis ei calfaciendi, humectandi, ex alto ad cutem attrahendi, poros opplendi atque obstruendi, ne quod attractum fuerit, in ambientem digeratur. Propterea conuenit crudis, apesia laborantibus, vomentibus, coeliacis, & partibus alimentum non sentientibus. Mouet enim atque adauget calorem natium, vnaque sanguinis copiam allicit, quam, quia poros opplet, diffari vetat, proindeque *ὡς σαρμῶσιν*, hoc est ad reparandam carnē, optimum medicamentum à Galenō perhibetur, præsertim si diutius parti adhæreat, nec sæpe vno die mutetur.

**Πισσάκη**, sic à quibusdam vocatā fuisse *ἐξυμῶν*, Dioscor. prodidit.

**Πισσίδες**, fructus pini aut piceæ quos in conis suis gerunt, siue nucleis pinearum nucum, sicut videtur Dioscoridi lib. 1. siue nuces è pinastro, vt Plinius nominat. Galen. fructum picearum ita proprie dicit scribit, & eos abuti nomine qui pini fructum *πισσίδες* nuncupat. Hippocrates eo nomine piceam resinam in-

terpretatur, sicut Galen. explicat *ὡς τῆς γλῶσσης*.

**Πιπλίζεν**, significat obire genus quoddam exercitationis quod manu vtraque in pugnum contracta (id enim designat *πιπλός*) fiebat, in ea exercitatione, sicut scribit Galenus lib. secundo de sanit. tuenda, summis pedibus ingrediebantur, tenasque in sublime manus, hanc antrosum, illam retrorsum cellerrime mouebant. Hoc autem exercitamento maxime vti solebant ante parietem stantes, quo, si quando aberrassent, facile pariete apprehenso erigerentur. Significat & *πιπλίζεν* simpliciter gesticulari & crebro motu ciere manus, à quo *πιπλίσμα* fit, ipsam manuum gesticulationem significans.

**Πίπλος**, significat apud Hippocratem remigium vel remum, vt Galenus explicat *ὡς τῆς γλῶσσης*.

**Πιπόριον**, sic dicitur à quibusdam *ἡ χαμαίπτις*, vt habetur apud Dioscor.

**Πιπύσσα**, frutex est sola specie à tithymallo cyparissia differens, ob idque in tithymalli generib⁹ enumeratus, cui caulis cubito maior, geniculatus, folia piceæ, acuta, exilia: flos paruus quasi purpureus, semen instar lenticulæ, latū, radix crassa, candida, succo referta. officinis & herbariis esula nominatur, Barbari turbet appellant. Liqueorem vt tithymallus habet, eique similiter purgat. Sunt qui *πιπύσσα* scribendum putent, contractum ex *πιπύσσα*. nam sic dicta est quod (Dioscor. teste) folia eius similia sint *πίσσι* & *πίπας*, piceæ foliis, vt interpretatur Plinius.

**Πιπρά**, furfures, dicuntur & *ἀφαιρημα*. Latini etiam canicas & apludas vocant: vnde caniceus panis furfureus est Pacuio.

**Πιπείας** ἢ

**Πιπείας ἄρτος**, furfuraceus panis vel furfureus.

Dicitur qui post excussam tenuissimam farinam ex reliquo conficitur. Furfuris habet plurimum, & minus purioris farinæ. Quare parum alit, ventrem verò multis excrementis replet, & facile etiam subfidet, & quia furfur nonnihil facultatis habet deterforiæ, ideo intestinis irritatis cito deijcitur. Proinde & pauco fermēto & leni subactione opus habet. Ei contrarius est panis purissimus, vt qui & plurimum alāt, & parum excrementi relinquit, & omnium tardissime deijciatur. Inter ytrumque medius est *αὐτόπιπρος* siue *συνμημῆς*, vt qui ex toto tritico nulla vel farinæ vel furfuris adempta parte fiat.

**Πιπείας**, furfures, porrigo. Est vbi inter pilos quædam quasi squamulæ tenues & furfuraceæ surgunt, exque à cute resoluntur. Interdum madent, multo sæpius siccæ sunt: idque euenit modo sine vlcere, modo exulcerato loco, huic quoque modo malo odore, modo nullo accedente. Id malum fere in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio, vel reliquo etiam corpore. Prouenit à vitioso corporis humore, saluave



saluae pituita, aut bilioso & melancholico sanguine caput subeunte, vt ait Paulus, vel à viciosis serolis humoribus, vt Galenus & Aetius scripserunt. Nomen morbo inditum à similitudine,

*Cum caput immensa pexum porrigine ningit,  
Copia farris uti frendentibus edita saxis:*  
quemadmodum Quintus Serenus poeta cecinit.

*Πυρεσίδες*, *ἐλαιοί*, fufuraceæ oliuæ, sic dicuntur oliuæ tritæ, vt habetur apud Athenæum lib. 2. Stringebantur autem, quò melius seruantur, antequam omnino maturifcerent.

*Πυρεσίδες*, *καυσταίς*, fufuracea hypostafis siue fufuribus similis, fit à vehemènti calore febrili, supra modum colliquante, vtente & resiccante solidas partes. vide *καυσταίς*.

*Πίνος*, picea. Arbor pinò similis, à qua tantum differt quò pinguior ac tenuior folio est, quodque minus alta minusque recta quam pinus affurgit: præterea & conum minorè, nucleosque resinâ perfusos habet.

*Παντίπας*, *ἀδονίπας*, plenius, vberius, apud Hippocratem.

*Πλαδερών*, affectus est, vt scribit *ἡ ἰατρικὴ αὐθιγὴ* author, internæ palpebrarum partis, obortis in ea mollibus quibusdam corporibus & laxiuis, vnde & nomen inditum fuit morbo.

*Πλάσος*, dicitur apud Hippocr. humiditas in aliqua parte redundans & superflua, siue tenuis ea sit, siue in modum puris crassa, vt scripsit Galen. comment. 3. *ἐἰς τὸ πᾶν ἀπὸ τοῦ ὕδατος*. Nam & *πλάσος* *ἕλκας* ea ratione ab Hippoc. dicuntur, & *πλάσος* simpliciter, quæ humida sunt. Quoniam vero quæcunque superfluo humore madent, infirma vt plurimum sunt, & laxa, factum est vt *πλάσος* etiam *πῶς ἀνίπας* significet, vt annotauit Galen. comment. 2. *ἐἰς τὸ πᾶν ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὁρίζων*.

*Πλάστηξ*, sic dicta est ab Hippocr. ferula, quod feriendo apta sit.

*Πλαυῖς*, species vnâ est *ἡ καδμία*, quæ in fornacibus perficitur, & crustarum modo concreuit: de qua vide in dictione *καδμία*. Est & species quædam aluminis, crassarum partiû, hoc modo dicta quasi crustacea.

*Πλαῖς πυρετός*, erratica febris. Est febris, cuius accessiones nullam inter se proportionem seruant. Habet enim suarum accessiõnum inordinata principia, nullam certâ alicuius febris vel simplicis vel compositæ speciem referentia. Itaque erratica febris nullius certæ speciei est, nec eam possis dicere quoridianam, nec tertianam, nec quartanâ, multoque minus continuam. Nam cum erratica febris ab incertis accessiõnum principiis dicatur, patet continuam esse non posse, licet continuè implexa esse possit eque atque aliæ intermittentes febres. Est autem febris erratica non ex certa humoris specie, quemadmodum aliæ intermittentes, sed vel ex confusis secum humoribus, & inæqualiter permixtis, & in corporis habitu putrentib⁹, vel ex vno quidem humore, sed transmuta-

to, & in alteram naturam transeunte. Quantum enim in ægrotantium corpore humores mutantur, tantum etiam accessiõnum circuitus. Ac maxime quidem transmutatur sanguis cum putrescit, parte vna in flauam bilem, altera in nigram abeunte. Deinde vero flaua bilis quæ nondum totâ vsta sit: hæc enim tanquam flauæ atræque bilis media multiplices mistosque motus habet, quod inæqualibus portionibus alteratio illa perficiatur & putredo oriatur. Id autem naturaliter contingit à media fere ætate ad principium autumnû, quòd tempus *ὀπίσθας* Græci nominant, eoquæ potissimum erraticæ febres proueniunt. Verum superueniente autumnû, & flaua bile totâ vsta & in atrâ versa, tunc ex febre erraticâ constans & legitima quartana nascitur. Aliâ quoque est non parua erraticæ inordinatæque febris causa, cum qui putrescere incipit humor, in aliquo membrò consistit: alter vero ex aliis defluit partibus, qui vel in ipsis solis continebatur, vel in vniuerso corpore redundabat. Aliâ præterea causa est error in ratione victus ab ægris commissus, qui si in sanis accessiones nouas parit & morbos, multo magis in ægrotis vel circuitus facit anticipare, vel alios diuersæ naturæ à prioribus excitat, à quibus accessiõnum ordo peruertitur. Videntur vero etiam aliquâdo absque ordine fieri accessiones propter circuitu complicationem quæ à medicis ignoratur, cum verius complexa febris sit quam erratica, quæ tunc vteralis est quando qui febre faciant humores in alteram naturam transierint, aut in victu errare contigerit, sicut docet Galenus extremo libro secundo de differentiis febrium.

*Πλάται*, dicuntur, auctore Polluce, costæ latiores, sicut *κωτία* quæ sunt angustiores. Hippocrates lib. de locis in homine videtur *πλάτας* scapulas appellare, scribens: *ἀπὸ δὲ πλάτας ἀπὸ τῆς γὰρ ἡρδωνίας, ὁππότερον ὁππότερον τὸ ἐκ τῆς γὰρ*. *Πλατμόν*, apud Hippocr. significat petram in mari prominentem, leuē & humilem, circa quam dilatantur fluctus, vt scribit Galenus *ἐν τῇς γλῶσσαις*.

*Πλατμιστὸν μῆλον*, mali genus, inquit Galenus, vile & quod edinequeat, sed suisbus edendum obijcitur, sic dictum quod tēdera platurorum folia gustu quodammodo representet.

*Πλάτανος*, platanus. arbor est aduenâ quidem & peregrina, sed magno in honore habita postquam à Romanis recepta est, & vmbra gratia expetita. Est autē cortice crasso, fronde virginea, lara, longo rubroque pediculo, flosculo paruo ac pallido, baccis rotundis, scabris & lanuginosis. Est humidioris & frigidioris essentia, sed symmetra. Cortex & pilulæ magis siccantem vim habent.

*Πλατυσμός*, vitium oris, cum eo nimium diducto sermo male promitur.

*Πλάτυσμα*, dicitur quicquid in latum extenditur: ideoque variis rebus accommodatur, vt

emplastris aliquando, in quorum genere *πλαστρον* vocatur emplastrum latum, seu potius latius linteum cui emplastrum superlimum est. Sic sæpe apud Galenum reperias in lib. πῶς καὶ ὅπως, ut extremo L. 4. ubi Herz emplastrum refert, scribitque primum vlcus per spogiam probe purgandum, ut maioris expers sit, deinde super id platysma imponendum cui emplastrum illitum sit, postea duplex linamentum exterius superdandum. Sic Aetius lib. 9. cap. 48. *πλαστρον εἰδὲν οὐ μόνον* vocat laminam ex ferro stomomate latiore.

*Πλάτος μῦς.*

*Πλάστρον μῦς δὲ.* latus musculus, de quo vide *μῦς δὲ πλαστρον*.

*Πλαστρον* idem quod *μυδριαν*, de qua vide suo loco.

*Πλαστόν* cognomen *εἰμῆως*, sed fæminæ quæ proprio nomine *εἰς* dicitur. Nomen inditum quod à mulieribus ad comparandam oculis gratiam vsurpetur.

*Πλακίαι* citri. Sic Eudemus nominavit vteri cornua. Incertum tamē est vtrum vasa, quæ illic reuoluta implicantur, an illos mammillares vteri processus *ταῖς πλακίαις*, id est cirris polyporum comparavit. Eos Praxagoras & Philotimus *κάλπας*, Diocles *κεραίαι* nūcupavit. Galenus *αἱ τῆς γλώττης* interpretatur *πλακίαις* apud Hippocratem, ἢ *πλεγματῶν, ἀπὸ τῆς ματῶν φερεται*.

*Πλῆμα* ἢ *μύξα*, hoc est mucus, apud Hippocratem, unde & *πλενται, μύξας δὲ*, hoc est mucosæ, ut scribit Galenus *αἱ τῆς γλώττης*. Dicitur & *βλεμα*.

*Πλεόρις*, φθόν. ἢ *πλεωμῶδες πάθος*, apud Hippocratem, auctore Galeno *αἱ τῆς γλώττης*, hoc est tabes vel pulmonis affectio. unde & apud eundem *πλεωμῶς* vsurpatur *ἀπὸ τῆς πλεωμῶδης γένεσιν* ἢ *φθίνε*, hoc est, pulmone laborat, aut tabe conficitur.

*Πλευραὶ*, costæ. Sunt ossa thoracis, à lateribus sita, sternon spondylis committentia. Ea sunt utrinque ut plurimum duodecim, quot & dorfi spondyli. Ex his superiores septem simpliciter *πλευραὶ* dicuntur, totidem scilicet numero quot ossa habentur in sterno, cum quibus, sicut cum dorfi spondylis, iunguntur per diarthrosim: quamquam ea qua sterni ossibus copulantur diarthrosis obscurior sit, propter ligamenta membranosa quibus vndique tegitur. Tam exiguus autem est earum motus, ut synarthrosis appellari queat. His autem costis nec vna est simplexque figura, nec situs. Sunt enim principio angustiores & subrotundæ, deinde paulatim lateſcunt, & ubi latiores evaſere, paulatim contrahuntur. Situs præterea quodammodo obliquus est. Nam post suam cum spondylis diarthrosim in anteriora simul & inferiora feruntur, multumque ita progressæ, rursusque sursum verſæ, protinus ad sternon recurvantur. Unde iam quicquid earum cum sterno committitur, non os sed cartilago est: quanquam non ea tan-

tum parte cartilaginosa sunt, sed præter id bonæ sui parte, & iam inde propemodum ubi recurvari cœperunt quæ sunt molliores, ut ad radicem duriores. Earum duæ primæ *ἀνίστροφι*, quasi rectoræ, dictæ sunt, auctore Polluce, duæ aliæ sequentes *τυπαι* propter firmitatem, tres vero postremæ *συννιδες*. Quinque vero reliquæ costæ inferiores, *νιδες* dicuntur, hoc est spuræ & illegitimæ, quia imperfectæ sunt. Neque enim in sterno, ut septem veræ articulantur, sed intus diaphragmati suis cartilaginibus iunguntur, & iisdem acuminatis inferiores superioribus applicatæ, ligamenti affirmantur. Dicuntur *αἱ περιστροφι* & *μαλδανγαι*, ut scribit Pollux. Celsus *ρώας* à Græcis dici testatur. Cæterum inter ipsas costas inserti sunt muscoli genere duplices, quos *μυοπλευρῆς*, hoc est intercostales, nominant. Alii enim externi sunt, qui ex costæ superioris inferno latere in subditæ costæ latus supernum oblique antrosum feruntur, & vna cum pluribus aliis musculis dilatando thoraci inferuiunt. Alii vero interni sunt, qui ex inferioris costæ superno latere in supraposite latus infernum oblique antrosum inferuntur, & externos ubique ad *χ* literæ formam intersecant. Hi autem vna cum quibusdam aliis thoracem expirando contrahunt.

*Πλευρις*, est inflammatio membranae costas succingentis. Omnis in genere inflammationum est, totque propterea recipit differentias, quot habet ipsa phlegmone, sumptas à materia, unde gignitur, varietate. Alia enim vere simpliciterque phlegmone est, quæ scilicet nascitur ex fluxione sanguinis calidi & copiosi: alia vero non simpliciter, sed vel œdematodes, vel erysipelatodes, vel scirrholes, prout sanguini pituita aut bilis flava aut atra mista fuerit. Non tamen ut phlegmone, sic etiam pleuritis ab humoris specie, vera aut non vera dicitur, sed, quod ipsum præ se fert nomen, ab ipsa parte affecta. Vera enim pleuritis debet *αἱ τῆς πλευρᾶς* consistere, aut saltem musculis illi continuis. sic autem vocatur *αἱ τῆς πλευρᾶς* *πλευρῆς ὕμνω*, hoc est membrana costas succingens interna. Itaque phlegmone quæ externos costarum musculos tam *μυοπλευρῆς* dictos quàm qui ab humeris ad partes thoracis superiores derivantur, occupat, vel ipsa etiam diaphragma, pleuritis non est, etiam si signa plurima cum pleuritide habeat communia. Sunt autem veræ pleuritidis signa hæc, & inseparabilia symptomata: febris acuta, dolor internus perinde ac si locus vel intendatur vel pungatur, spiratio difficilis, frequens & exigua, pulsus parvus, arteriam & duram & quodammodo tensam indicans, tussis maxima ex parte cum spuris coloratis, nonnunquam vero sicca. Sed eam quæ sine sputo est, *ἀπὸ τῆς πνεύμονος*, hoc est incoctam, appellat, quæ vel celeriter hominem iugulat, vel non nisi longo tempore finitur. Verum

rum alia pleuritides ab hac vera discernuntur, vel quod earum dolor externus sit, & contactu moueatur, vel quod sine febre sit, vel sine spuro, vel sine tussi, vel sine spirandi difficultate, vel quod neque tensionem neque duritiem ullam pulsus referat.

**Πληξίς.** Dicitur in pulsu motus arteriæ tactui occurrens. Quidam tamen, ut scribit Galenus, non omnem arteriæ occursum sic vocandum censent, sed eum proprie qui violentus sit. Verum nihil, ut idem ait, interest *πληξίς* aut *ἀσπασίς* aut *ἀνών* appellare, vel etiam *αἵμα*.

**Πλῆθος.** copia, multitudo. Dicitur de quolibet humore superabundante, sanguine, pituita, aut vtriusque bile; coque differt *πλῆθος* & *ὑπερπλῆθος*. Itaque si bilis flaua in corpore excedit, iure bilis *πλῆθος* dicitur, non etiam *ὑπερπλῆθος*, proprie quidem loquentibus. Improprie tamen aliquando *πλῆθος* *πλῆθος* *πλῆθος* usurpatur.

**Πληρότης.** plenitudo: est omnium humorum æquabilis redundantia. Aliqui vero contenti sunt dicere esse sanguinis redundantiam, non eius quidem synceri, & ab aliis humoribus secreti, sed cum naturæ modo confusi. Venarum enim sanguis cum nequaquam simplex sit & vnius naturæ, sed pituita, bile vtraque, & puro sanguine secum certa quadam proportionem, & ut cuique corpori expedit ad valetudinem, mistis consistit, eam quatuor humorum commixtionem temperationemque sanguinis nomine omnes appellant. Eiusmodi sanguis interdum in corporibus hominum exuperat, & legitimum naturæ modum excedit, atque is excessus *πληρότης* vocatur. Ea autem duplex est, vna quam *πλῆθος* *ἀγνία*, hoc est, ad vasa, altera quam *πλῆθος* *διὰ τὰς αἰσθήσεις*, hoc est, ad vires, medici solent nuncupare. Illa quidem simpliciter & absolute plenitudo censetur, quod venæ tam copioso sanguine redundant, ut non modo intumescant, sed etiam distendantur penèque rumpantur. Ea plenitudine præditi sunt athletæ, quorum habitus, ut scribit Hippocrates, quoniam ad summum bonæ valetudinis gradum peruenit, in quo diu manere & consistere non possint, nec quicquam ei præterea addere, periculo non caret. Nam tametsi non nisi bonis scateant humoribus, siue omnes vna increuerint, siue purus tantum sanguis modum excesserit, sintque viribus admodum robustis, verendum tamen est ne quid sinistri illis contingat, nisi prope bonus ille habitus tantæque plenitudo tollatur. Hæc *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα* dicitur, siue, ut Galenus explicat, *πλῆθος* *τῶν ἐν τῇ αἵμα* *τῶν αἰσθητικῶν* *πλῆθος* *αἰσθητικῶν*, hoc est, ad vasorum capacitem qui humores ipsos continent: quod tanta sit sanguinis copia, ut eam prope capere venæ nequeant. Vocata est & à quibusdam *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*, quoniam, ut idem scripsit, *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα* *πλῆθος* *αἰσθητικῶν* *πλῆθος* *αἰσθητικῶν*, id est, infusus per vasa humoribus consistit atque intelligitur. Altera

plenitudo non simpliciter dicitur, sed *πλῆθος* *διὰ τὰς αἰσθήσεις*. Refertur enim ad vires. Nam quamvis vasa non sint plena sanguine, nec eo tumeant aut distendantur, plus tamen habent quam natura possit cōficere. Infirmitior enim natura grauat per sepe mediocri sanguine etiam optimo, qui eadem à calore natino imbecillo destituitur, putrescit morbosque excitat. Itaque cum non sint pares omnium vires, patet plenitudinem hanc non absolute dici; quam enim hic ferre non potest, alius facile perferet. Quæ vero ad vasa dicitur, nulli ætati, sexui, naturæ contingit, quin simpliciter & absolute plenitudo vocari debeat.

**Πληξίς.** calcar. vide *βλῆθος*.

**Πλημυξίς.** significat apud Hippocrat. lib. *πλῆθος* *διὰ τὰς αἰσθήσεις*, hoc est, humiditatis cuiusdam redundantiam, ut comment. 3. Galenus explicauit.

**Πλῆθος.** *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*. modiolus rotæ apud Ionas, quo etiam vocabulo idem significatur apud Hippocrat. lib. *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*, ut comment. 2. Gal. annotauit, atque etiam *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*, vbi tamen legitur, *πλῆθος*.

**Πληρότης.** plenus pulsus, qui arteriam in sua diastole pleniorē representat, & occursum eius humiditate plenum. Huic oppositus est *καὶ*, hoc est, vacuus: amboque simplicem vnam pulsum differentiam constituunt, sumptam à quantitate infusionis humorum arteriæ, seu à contentis in eius capacitate.

**Πληρότης.** repletio. Est cuiuslibet rei & quacunque in parte. Itaque & cibi & potionis & humorum atque etiam excrementorum est, diciturque de ventriculo, venis cæterisque corporis partibus.

**Πληρότης.** repletio cibi & potus vel, ut ait Galenus in Aphor. 17. lib. 2. *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*, hoc est, alimentum copiosius quam corporis naturæ conueniat.

**Πληρότης.** *πλῆθος*. hoc est, ferulæ, apud Hippocrat. *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*, ut scribit Galen. *πλῆθος*.


**Πλῆθος.** dicitur apud Hippocrat. rotum id quod inter inguina vtriusque cruris est, ut explicat Gal. comment. 4. *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*. Idem etiam scribit comment. 2. *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα*, scilicet eo nomine apud Hippocrat. designari quod inter vtriusque cruris spatium est. Nam & *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα* & *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα* diuaticari significat, dicunturque ea verba de cruribus gressum facientibus atque inter se distantibus: ipsaque crurum diductio digressioque *πλῆθος*, sicut & ipse gressus *πλῆθος* à Grecis nuncupatur. Sunt autem, ut scribit Galenus, qui *πλῆθος* *ἐν τῇ αἵμα* per se scribant. Quidam etiam *πλῆθος*.

**Πλῆθος.** machinamenti genus est quod ad Nileum auctorem refertur, factum ad eorum similitudinem quæ vocantur tractoria quadrata oblonga. Duo enim habet latera, longa palmos quatuor, digiti crassitudine, quæ extremis partibus transversariis inter se

compacta sunt. Est autem transuersariorum crassitudo & latitudo quāta laterū, sed longitudo palmum implet. Merito igitur cum talis compositio sit, vt latera quatuor palmos longa sint, transuersaria vnū, rotius organi quadrati structura oblonga euadit. Licet autem, si quis voluerit, latera breuiora efficere. Media itaq; latera pertusa sunt ro-

tundis & petuiis foraminibus, per quos axis traiecitur, qui media parte clauū infixum habet: capitib<sup>9</sup> vero, quibus latera excedit, vetes & neos, vel ferreos, decem digitorū magnitudine. Sunt item in organo quatuor annuli lateribus affixi, bini ab inferiori parte, totidem à superiori. Antiqua quidem huius organi structura auctore Nilco talis est.

- A. Duo latera  
B. Transuersaria  
C. Transuersariorum partes priores excavatae ad fixuram  
D. Rotunda ac prima foramina  
E. Axis qui media parte clauum infixum habet  
F. Vetus axis  
G. Annuli



**Placens.** species vna est aluminis, teste Aetio. quae dicitur alio nomine *maxims*.

**Thymus.** herba quae & *phlegmus* dicitur Latinis verbascum.

**Præpar.** spiritus. Est substantia ætherea, calida, leuissima tenuissimaque, omnes in corpore motus ciens. Substantiam quidem esse liquet, quod tertia sit substantiæ nostræ portio, quam medici constare scripserunt solidis, humoribus & spiritibus: verum supra corporeæ naturæ sortem ex elementorum temperamento conflata. Siquidem hæc nihil habet elementare, sed eiusdem plane est cum calore nativo originis, cuius etiam perpetuo comes est, & in rebus omnibus gerendis instrumentum. Nam cum ad vitæ conseruationem oporteat calidum illud innatum per omnia diffundi, ei natura spiritû socium asciuit, qui ipsum quo necesse erat deduceret. Proindeque spiritus ille cum calido nativo mistus ita confususque est, vt nunquam ab inuicem separentur, sed vbi-cunque calor est, illic etiam spiritum esse sit necesse. Non insidet alterum alteri, vt subiecto, sed totis substantiis perfectissime secū commiscuntur, adeo vt vnum tantum corpus, vnaque res videri possint. Ex eo factum est, vt à medicis vnius opera alterius esse plerumque dicantur & iisdem cognominibus titulisq; ornentur. vtrumque interdum naturam, opificem, animam etiam aut eius instrumentum, auctoremque omnium functionum, adhuc vitæ vinculum indifferenter dici inuenies à medicis aliud agentibus & non ex professo ea de re disserentibus. Cum ergo tanta sit spiritui cum calore nativo communicatio operisque societas, par est eum eiusdem etiam naturæ esse, hoc est, æthereum, cœlestem & diuinum, cuiusmodi calidum innatum esse, quod *Supra* dicitur, suo loco annotauimus. Idem vero etiam calidus est tum ab origine, tum quod

cum calore innato commercium habeat, per eum, sicut dictum est, diffusus. Hac autem naturâ præditum, quis neget leuissimum tenuissimumque esse? Et talem quidem esse conueniens fuit, vt quoquouersum calidum innatum deduceret, & in solidissima quæque penetraret, rueret, impetum faceret. Qua de causa Hippocrates corporis nostri spiritus *na* *inopugnata*, nomine profecto accuratissimo & ad eorum naturam explicandam aptissimo appellauit, sicut eam vocem ante enarrantes ostendimus. Est enim spiritus præcipuum naturæ instrumentum quo omnes functiones muniaque exequitur. Is tum sit genere vnus & simplex, sicut & calor nativus, attamen pro locorum in quibus habitat & functionum quas obit varietate magnas habet differentias. Vt enim suo calido innato pars v-quæque prædita est, sic & proprium spiritum possidet tam instrum à primis natalibus, quam ex principibus partibus eum gignentibus influentem, ex quo primum nobis ingenitus nutritur atque instauratur. Quo fit vt totidem sint innati nobis spiritus, quot sunt & naturarum & calorū varietates. Qui quoniam promptissime exoluerentur & euanescerent, nisi subinde alio adueniente spiritu rescicerentur, ideo natura triplicem spiritum procreandorum officinam instituit, ex quibus tres in vniuersum spirituum differentię oriūtur: naturalis quidem ex iecinore, vitalis autem à corde, animalis autem à cerebro, tribus certe nobilissimis partibus, quæ sicut dignitate potentiaque cæteris præcellunt, ita reliquarum curâ, vt ita dicam, gerentes nouos iugiter spiritus creant, quibus non modo munia sua obeant, verum etiam alios singulis partibus ingenitos instaurant. Quorū tamen spirituum tanta est varietas, quantum tres ille partes earumque functiones ab inuicem distant. Itaque cum

iecur

iecur circa alimentorum concoctionē ver-  
setur, coque in opere plurimum fit sordidū  
& inquinamenti, fieri non potest quin spi-  
ritus etiā, cuius beneficio naturales omnes  
actiones absoluantur, veluti labe quadam  
inde contracta minus purus tenuisque sit, si  
cum vitali animalique comparetur. Is ali-  
tur augeturque à tenuiore, puriore, magis-  
que aerea portione totius alimenti, quā in  
vaporis speciem quandam ex eo sublata, à  
solido ipsius iecinoris corpore ( quod in ea  
actione primas partes sustinet, spiritu & ca-  
lore, tanquam instrumentis, vtens ) conco-  
quitur, & spiritus fit naturalis. De quo ta-  
men apud veteres medicos dubitarum fuisse,  
sitne aliquis, liquet ex Galeno; qui libro  
12. meth. med. differens de affectibus qui  
in spiritu consistunt, visus est de eo quoque  
dubitasse, nō ausus aliquem esse plane pro-  
fiteri, sed si aliquis est, vtiq; eum in iecino-  
re & venis contineri. Nunc tamen doctis o-  
mnibus placere video aliquem reuera esse,  
cuius opera ventriculus, iecur, cæteræque  
partes familiare alimentum attrahunt, reti-  
nent, concoquunt, cuius etiā vi atque im-  
petu partes omnes excrementa à se depel-  
lunt. Quod enim ventriculus aliquādo ob-  
murmuret, nauseet, singuliat, ructet, euo-  
mat, intestina similiter quā lōgissime ster-  
cora propellant, vesica vrinam eiacularur;  
spiritibus impetu concitatis acceptum re-  
ferri debet. Continentur autem ii in venis,  
perque eas feruntur in vniuersum corpus,  
quatuor facultatum naturalium muneribus  
inseruientes, seseque pabulum præbentes  
ei spiritui quem à primis naturæ nostræ pri-  
mordiis singulæ partes congenitum acce-  
perunt. Huius autem spiritus quantum per  
venam cauam vna cum sanguine sursum  
fertur, in dextrum cordis sinum subit, vbi  
perfectius excoctum attenuatumque per  
arctissimos meatus sinistram ingreditur, &  
ex naturali vitalis euadit, à solidò cordis cor-  
pore alteratus. Ibi maximos motus ciet, cor-  
dis atque arteriarum diastolis, systolisque  
insignes, præter gloriæ, honorum, vindictæ,  
aliorumque eiusmodi cupiditatem, animi-  
que perurbationes ab ipso quidem corpore  
cordis, siue ab insita ipsi facultate profe-  
ctas, sed spirituum ministerio absolutas &  
continuas. Hinc pulsus vehementes, ma-  
gni, celeres, crebri à magno spirituum vita-  
lium impetu, vt ab exiguo cōtrarii, sicut Ga-  
lenus in libris pulsum demonstrauit. Dif-  
funditur autem spiritus ille per arterias in o-  
mne corpus cum vitali calore, suamque vi-  
ram singulis partibus conseruat. Vt autem  
ipse ex naturali spiritu alitur & sese susten-  
tar, ita per internum maioremque arteriæ  
quam *καρδιὰν* vocant, ramum in plexum il-  
lum *δυσσπαστικόν* receptus, propterque multos  
eius viæ anfractus & ambages illic diu retē-  
tus, factusque adhuc purior tenuiorque, in  
animalem spiritum vertitur, demumque in  
cerebri ventriculos intromissus, propria so-

lidæ cerebri substantiæ virtute summam te-  
nuitatem perfectionemque assequutus, per  
neruorum spiracula sensum fugientia per-  
means, in corpus vniuersum impetu conci-  
tatissimo discurrit, & motus ciet admirabi-  
les. Eo instrumento facultas animalis ap-  
prehendit, ratiocinatur, reminiscitur, mo-  
uet, sentit, nihilque non agit, si modo eius  
impetus nihil remoretur. Aer enim frigi-  
dus, nebulosus atque caliginosus, cruditas  
ex immodico vini potu, cibisque frigidis,  
crassis multisque contracta, vita deses & o-  
ciosa, somnus largior, excrementorum co-  
pia, corporis summa extenuatio, siue à mōr-  
bo, siue à nimia exercitatione, siue ab inedia  
fuerit, adhuc frigidior intemperies, mem-  
brorum densitas, vasorum per quos spiritus  
feruntur obstructions, vt eos reddūt cras-  
siores, grauiore, minusq; calidos, ita eorum  
etiā impetus retardant, minuunt, atque  
interdum abolent, sicut iis oppositæ causæ  
spiritus gignunt copiosiores, calidiores, te-  
nuiores, leuiore, à quibus ad motus omnes  
alacriore reddimur. Ista quidem de spiritu  
illò æthereo, & perpetuo caloris natui co-  
mite, & de quo videtur Galenus incertus  
fuisse animane sit, an præcipuum animæ in-  
strumentum, dicta sint. Præter eum alius  
etiā est in nobis spiritus naturæ multum  
ab eo diuersæ, spiritus quidem propter quā-  
dam similitudinem dictus, sed qui potius  
flatus nomē, quem *φύμα* vocant, mereatur.  
Est enim veluti vapor quidam crassior, im-  
purior atque turbidior, tanto aqueo vaporī  
similior, quanto ille naturam aeris exuperat  
& antecellit. Oritur à nobis ipsis, & in omni  
corporis parte colligitur in qua calor imbe-  
cillus est, humorque crudus. fertur autem  
huc atque illuc motu errabundo, non citra  
partis in quam ruit dolorem & molestiam,  
eum spiritus ille, de quo ante diximus, sem-  
per mitis sit & beneficis, nisi si quando ni-  
mium exuberans aut exolutus minus belle  
officio suo defungi potest.

Est & alia *πνεύματος* significatio, qua  
dicitur aer inspiratu attractus, qui respira-  
tionis vocisq; materia est, à qua *πνεύμα-  
τος* etiam nomen longius progressum est,  
vt *πνεύματι* multis in locis apud  
Hippocratem designet, quemadmodum  
Galenus comment. 1. *εἰς τὸ πνεύματι διακρίνεται*,  
atque etiam in Prognost. annotauit. Idem  
vero libr. 3. *πνεύματι* author est, *πνεύμα-  
τος* nomen in morbis simpliciter ab Hippo-  
crate enunciarum, *πνεύματι* significare,  
atque inde *πνεύματι* dici eum qui difficul-  
tate spirandi laboret: etsi interdum simpli-  
citer *αὐτὸ ἐμπνευσμένον*, hoc est, pro eo qui  
flatu distentus sit, vsurpetur, vt ipse *ὁ πνεύματι*  
explicauit. Ab ea significatione flu-  
xerunt ista nomina, *πνεύματι*, *πνεύματι*, *πνεύματι*,  
passim ab Hippocrate vsurpata,  
quibus ea spirandi difficultas designatur  
per quam pectus in sublime ita attollitur, vt  
sub ipsis etiam vestimentis difficilem illum



motum thoracis & scapularum facile liceat intueri. ut scriptum habetur à Galeno comment. 1. in Protrhet. Est & quādo πνεύματος nomine Hippocrates respirationis differentias intelligit, ut Galenus annotat. comment. 3. lib. 1. Epid.

Πνεύμα δασύ. spiritus asper. sic à quibusdam appellatur spiritus qui cum sono ducitur, siue ob angustiam loci quo ille redditur, siue ab humoris copia, ut Gal. annotat comment. 3. eis τὸ πᾶσι ἀσπρῶν.

Πνευματικὸν. iidem qui & πνευματόμενοι, hoc est, spiritu inflati atque distenti, & quibus venter flatu distenditur.

Πνευματικοί. dicti sunt medici quidā hoc cognomine, qui à flatu seu spiritu in corpora subeunte, omnia vel secundum naturam se habere, vel in morbos incidere censebāt. Forre Hippocrates, aut quisquis author fuit libelli de flatibus, huic sectæ occasionē præbuit, cui se inter medicos Athenæus & Archigenes in primis addixerunt.

Πνευματικός. ramex ventosus. Is genere, ut Paulus ait, αἰνύσσημα est, ut qui dilatatione fiat à flatulento spiritu. Verum duobus modis accidit, vel ex quatuor vasis testiculum alentibus, qui durior est, nec cōpressu digitorum euanescit, sed recipere curationem potest: vel ab arteriis dactylon membranā intercurrentibus, qui appresso digito intro recurrit & euanescit: curationem verò non recipit, propter periculum quod ab incessabili sanguinis profusio impendet.

Πνευματικός. cui vmbilicus à flatu protuberat. Species est τῆς ἐμφύτου.

Πνευματόμενοι. dicuntur ab Hippocrate, seu quis alius est author Protrhet. quibus magna est & frequens respiratio, quos ἐν τῇ πᾶσι διαίτης ὀξείῃ Hippocrates πνευματόμενους appellat. Possunt tamen & ii intelligi quibus venter flatu distenditur. Vocantur & ab Hippocrate πνευματικαί, ut scribit Galen. libro 3. πᾶσι δυσποίας.

Πνευματώδεις, ἢ

Πνευμαθίνες. iidem qui & πνευματόμενοι, de quibus supra.

Πνευματικός γαστρός. flatus ventriculi. Generatur ab humoribus vel cibis exigua caliditate in vapores dissolutis. nam frigiditas hoc nomine quod dissolvere & extenuare non sit idonea, nullos flatūs procreat; vehemens autem calor, cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit. minor verò caliditas diffundit quidem & transmutat alimentum, verū minus quam opus sit: unde flatus excitantur.

Πνεύμων. pulmo. Est caro mollissima & laxissima, respirationis & vocis instrumentum. Nulla enim in toto corpore caro rarior, laxior, molliorque est, & quæ spōgiæ similior sit, spumamque sanguinis magis referat. Tali quidem substantia pulmonem constare oportuit, quo follis instar aëre impleri distendique citra noxam posset. Est enim à natura conditus, ut respirationis vocisque effect

instrumentum. Cuius quidem actionis etiam propria eius substantia primaria causa est, multa tamen præterea ad pulmonis constructionem cōcurrunt, tum per quæ actio ipsa melius fit, tum sine quibus fieri nullo modo potest. Situs est intra thoracem, ipsumque totum replet & occupat, & eius motum sequitur. Cum enim pulmo per se immobilis sit, ab alio moueri debet. Itaque distentus thorax, pulmonem vna distendit: subsidens autem atque contractus, ipsum quoque subidere facit, & aerem quem dilatatus attraxerat exufflare, atque ita aeris inspirationem expirationemque perficit. Ut autem thorax ipse in duo diuisus est, & media membrana (mediastinum vocant) distinguitur, ita pulmo in duas partes diuisus est, dextram & sinistram. Rursum vero pars eius utraque duobus lobis constat, vnò superiore, altero inferiore, sæpe palam discretis, interdum obscure. Præter hos nonnunquam tertius est dexter lobus exiguus, vasis peripneusticæ textus, media cavitare venam cauā in cor subeuntem ceu puluino molli excipiens ac firmans, in hominibus sternon ossibus septem compositum sortitis. Nam quibus cum sterno thorax anticus est breuior, iis pericardios tunica in phrenas magna suæ cavitatis parte incidit, & in hanc cavitatem vena caua, lobo hoc quinto propter viæ breuitatem non indigens. Tria autem vasa per eius substantiam dispersa sunt, ante quidem arteria venosa, post vero vena arteriosa, & media harum aspera arteria: & hæc quidē iam inde à quarto thoracis spondylo, vena à dextra cordis ventriculo, arteria à sinistro proficiscitur. Distribuantur autem singula in totos pulmones numerosa ramorum serie. Ceterum pulmonem ipsum vna cum suis vasis tunica obducit orra ab ea quæ costas succingit, & neruulos à sexta cerebri coniugatione sortita, quorum beneficio tunica quidē ipsa mediocrem sensum possidet, cum tamē pulmo ipse nullam vim sentiendi sortitus sit.

Πνιγμός. morbus incubus Latinis dictus. Venit ἀπὸ τῆς πνίγεως, quod eo laborantes prope suffocari videantur: ἐμφύτου alio nomine vocatur, de quo ante dictum est. Reperitur & πνιγμῶν pro eodem.

Πνίξ ὑστερική. vide in dictione ὑστερική πνίξ.

Πόδα. nihil aliud est quam arthritis pedum. Cum enim pedum tantum articulos noxius humor infestat, articularis quidem morbus fit, sed quī nomen ab affecta parte accipiat. Sic si manuum articulos idem morbus occupet, χεειράρα vocatur.

Πόδος. herba duorum generum apud Theophrastum, alterum hyacinthi flore, alterum sine colore candidum, quo sepulcra coronabantur, à quo & nomen, quasi desideratis esset dicatum. Nascitur autem fere in tumulis.

Ποίν. dicitur apud Hippocr. quæ habet folium simile viti natura, ut cissampeli vocatæ species. author Gal. ἐν τῇ γλώσσῃ. Alias πῶν significat



*similis, subhirsuta. Radix illi pilosa, in qua continentur cirri ceu polyporum, crassitudine minimi digiti, coloris intus herbacei, austera aliquantum & gustu subacris. Eiusmodi polypodium est quod Dioscorides depinxit. Verum aliud præterea est folio aspleni, viridior, longior, magisque per ambitum laciniato, radice priori simili, paulo tamen graciliore, quod plurimum in montium sylvis nascitur. vtrumque moderate purgat, atque vt ait Galenus, citra morsum desiccatur.*

*Πολυπόδιος οἶνος.* vinum ex polypodio factitium, cuius cōpositio habetur apud Aetium libro 3. cap. 60. & 61.

*Πολύποδες.* multipedæ, siue millepedæ, animalia sunt exigua locis humectis nascētia, quæ ad contactum sese in globum contrahunt. Dicuntur etiam *ὄνοι* & *ὀνίσκας*, de quibus ante diximus.

*Πόλυπος.* polypus. Est tumor præter naturam in naribus genitus, polypi carni similis secundum substantiæ proprietatem. Sic quidem Galenus definiuit libro 3. τὸ καὶ πῶς. Proprietatem autem substantiæ intelligo, non colorem modo & cōsistentiam, sed reliqua etiam quæ sunt polypis propria, quibus tumorem hunc similem esse veteres prodiderunt: nempe quod multas radices, vt & ille pedes, habeat, quodque vt ille venantes vlciscitur, acetabulis suis manus illorum apprehendens, ita & vitium hoc laborantium nares obstruat, vt & difficulter spirent, & egre loqui possint. Hæc enim substantiæ polypi proprietatem cōsequuntur, non minus quam color atque consistentia. Ac color quidem varius est, aliis albidus, aliis subflauus, aliis subruber. Substantia pariter aliis mollis & quodammodo fluida, aliis durior magisque cōtracta. Celsus lib. 6. cap. 8. graphice polypum depinxit his verbis: Polypus in naribus est carūcula modo alba, modo subrubra, quæ nariū ossi inhæret, & modo ad labra pendens narem implet, modo retro per id foramen quo spiritus à naribus ad faucēs descendit, adeo increfcit, vt post vnam conspici possit, strangulatq; hominē, maxime Austro aut Euro flante, fereque mollis est, raro dura, eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat, quæ fere κακιστὸς est. Itaque attingi non debet. His quidem verbis Celsus omnes polyporum differentias complexus est, quas Hippocr. in lib. περὶ πύων quinque constituit.

*Πολύριζον.* sic à quibusdam dictum fuisse helleborum nigrū Dioscorides author est, similiter & quartum genus τὸ ἀειπαλόν, quæ peculiari nomine *πυλωρία* dicitur.

*Πολύπτερον.* machinamentum est articulis repōnendis cōueniens. Sic dictum est, quoniam multis orbiculorum circuitionibus facilitatem præstet. Est autem iter facientibus maxime idoneum. Refertur ad Archimedem authorem. In quo describendo minime curiosi fuere veteres, quod ad eum vsum Hip-

pocratis scamnum per se abunde esset.

*Πολύτριχον.* herba quam & ἀδάμαν & capillum Veneris vocant. sic dicta ab effectu. Explet enim capillorum defluvia, & ad hoc decoquitur in vino cū semine apii adiecto oleo copiosiore, vt capiti inunctum crispum desumque capillum faciat.

*Πολύτριχον φάρμακον.* Medicamentum ad multos vsus cōparatum, quodque multis simul affectibus conuenit. Sunt autem eius generis nonnulla non modo specie, sed etiam genere diuersa. Omnia certe ex contrariis constant medicaminibus, nō tantum secundum primas qualitates, verum etiam secundas. Aliter enim vni tantum simpliciue affectioni, non etiam multis atque inter se etiam sæpe contrariis prodesse. Coegit autem medicos necessitas contraria aliquando medicamenta miscere, non modo vt vnum alterius vires frangeret, atque minueret, sed quod conducibilis esse iudicarent, habere vnum aliquod medicamentum per multis affectionibus cōueniens, quam tam multa singulis affectibus destinata, etiam si ea πολύτριχος in medicina longe præstent. Sic enim vno eodemque medicamento repelluntur & digeruntur, detergentur & lauiuntur, incrassantur & attenuantur humores, quod diuersas in se facultates contineat. Eius generis est Panacea, Isis, Icesium, aliaque plurima emplastra, de quibus agit Gal. libr. 5. τὸν καὶ ῥήγν. Et si in simplicibus quidem medicamentis, vt aloe, rheo barbarico, mastiche & aliis sexcentis ea vis inesse cernitur, vt contrarios simul effectus in hominū corporibus producant, nemo mirari debet in compositis contrariorum pariter inesse facultatem.

*Πολυχρόνιος νόσος.* diuturnus morbus. Sic dicitur qui non nisi longo temporis spatio soluitur. Contrarius est τῇ βραχυχρονίᾳ, non etiam τῇ ὀξείᾳ vide ὀξύς.

*Πόμα.* potus. Dicitur & τὸ πρὸν. vide πῶς.

*Πομφόλι.* apud Hippocratem dicuntur eminētia cutis tumida simulque humore redundantes & rubicundæ, vt interpretatur Galen. ὁ καὶ γλώσσας. Generaliter πομφός bullam significat vt & πομφόλυξ.

*Πομφολυγρόν.* nomen emplastri, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 17.

*Πομφόλυξ.* bulla. Est eleuatio in humore facta à spiritu flatuoso. Siquidem spiritu flatulento intra humorem concluso bulla excitari solet, præsertim si humor tenax viscosusque est. Tunc enim bulla permanet nec facile soluitur. huiusmodi bullæ sæpe in vrinis insident, morbum renalem & longum significantes, vt habetur apud Hippocr.

*Πομφόλυξ.* medicamentū metallicū quod in coctura æris sursum fertur, & in cameris parietibusque fornacum, bullarum modo tumens, colligitur. Nihil enim aliud est quā æris fauilla. Effertur autem vel ex ære solo, vel ex cadmia sola, vel ex ære & cadmia, & eam aliquando friatam metallici inpergat æri.

**ari.** Primum autem in bullas, ut aqua, tumet, atque ex eo nomen accepit: mox maiore accedente incremento, lanarum assimilatur peniculis. Atque ita quidem sua sponte gignitur in fornacibus. Eius autem duo genera Dioscorides statuit, unum colore aris & modice pingue, alterum candidissimum & extremæ lenitatis. fit quod candidum est, cum in coctura aris, liquecente eo, metallici multam friatam cadmiam inspergunt, meliorem pompholygem facere volentes. Nec solum ex ære fit, verum ex cadmia etiam consulto ad confectionem eius foliis ventilata. Conficiendi autem rationem & Dioscorides & Georg. Agricola aperte exponunt. Eiusdem omnino generis cum spodio est. specie tantum differt. Quod enim in eo opere tenuius est & lenius, sursum fertur, pompholyxque dicitur: quod vero deorsum fertur, spodium est, sic dictum à cineris similitudine. Rara nunc est pompholyx, & pene ignota, ut & pleraque alia recrementa metallorum. Sunt tamen qui in officinis eam nil album appellat, ut & spodium nil nigrum aut gryseum. Inter *adversæ* phar-maca numeratur pompholyx. adstringit & siccit lenissime, præsertim lota, habetque ténacitatem partium citrà calorem.

**Πόνος.** labor. Est motus omnis vehementior, idem omnino cum exercitatione generaliter dicta. In qua significatione vocem eam Hippocrates usurpauit lib. 3. Epid. sect. 2. sicut Galenus eo loco explicauit. Quoniam autem ex immodico labore plerumque lassitudo dolorque oritur, factum est ut *πόνος* non modo vehementem motum, sed dolorem etiam significet, & quicquid hominem offendit. sic enim intelligendum est laboris nomen Aphor. 7. lib. 1. *ἵκαν μὲ οὐ καὶ πόνον τὴν νόσημα, αὐτὰ πόνος ἐστίν* *πόνος* *ἐστίν*. hoc est, quò peracutus morbus est, statim extremos dolores habet. Sed cum in omni dolore duo esse oporteat, affectum à naturali constitutione alienum, & eius affectionis sensum, Hippocrates utrumque *πόνος* appellat. Siquidem Aphor. 6. lib. 2. *ἀσθενὲς πάντοτε καὶ ὁ σπύμνος, καὶ πολλὰ ἢ πόνον οὐκ ἀνέχονται, πόνον αὖτε ἢ πόνον*. hoc est, quicumque dolentes partem aliquam corporis, dolorem non sentiunt, is mens egrotat: ipsa sola affectio dolorifica ab Hippocrate *πόνος* appellatur: hic enim *πόνος* intelligit eos qui aliqua in parte tam vehementer offensi sunt, ut omnino, nisi delirent, dolituri sint. Cum vero scribit dolorem fieri propter calidum, propter frigidum, propter plus, propter minus, ipsum alterationis sensum sine dubio intelligit. Ut autem *ὁ πόνος* apud Græcos, sic apud Latinos labor accipitur, sicut ex Cicerone videre licet, qui laborem definiuit esse functionem quandam vel animi vel corporis grauioris operis & muneris: & ex Virgilio, qui parienti dolorem Lucinæ labores appellat.

**Πονηρὰ ρίζα.** sic à quibusdam dicitur ἡ γλυκύριος, ut habetur apud Dioscoridem: plurima e-

nim in Ponto nascitur.

**Προπονία.** vocabulum est Methodicorum proprium, quo ipsum exiguorum meatuum statum designabant, in quo sanitatis morbi que causas constituebant. Hinc *μετὰ προπονίαν* apud eos eiusmodi meatuum status immutationem significabat, ut & *μετὰ σιγήμην*, de quibus vide suis locis.

**Πόρος ακουστικός,** siue (quod idem est)

**Πόρος πφρῶς.** meatus auditorius, siue foramen cæcum. vide *cis*.

**Πόρος.** meatus. Id dicitur per quod aliquid infuit vel effluit, siue id spiritus sit, siue aer siue humor, siue excrementum. Proinde oculorum nerui *πόροι* vocati sunt ab Herophilo. Similiter & in auribus *ἀκουστικοὶ πόροι*: ad hæc meatus tum per quos cibus vel in ventriculum subit vel ab eo exiit, tum quibus chylus in iecur effunditur, aut bilis in suam vesiculam ingreditur vel ex ea effunditur, *πόροι* appellantur: præterea & exigua illa foramina per totam dispersa cutem, quæ corporis vniversi perspirationem molitur. Sunt autem in vniuersum duo pororum genera: alii sensibiles, alii insensibiles habentur. Illi magni & patentes sunt, quales in ventre, iecinore, liene, intestinis, venis, arteriis, & reliquis eiusmodi instrumentis visuntur: hi vero parui & visum fugientes non solum quidem partium superficiem occupantes, sed per totam etiam carnis, ossium, cartilaginum, neruorum, ligamentorum, membranarum, & cutis substantiam disseminati. Neque enim externi modo sunt & superficiales, sed etiam intimi. Siquidem is plenum est totum corpus & tota cutis. Aliter putredo vitari nullo modo posset. His enim foraminibus totius corporis perspiratio fit, quæ constat & frigidi aeris intromissione, & fuliginosorum quæ in singulis partibus colliguntur extremorum vacatione. Ex quibus perspicuum est meatus omnes in optima corporis constitutione patentes semper esse oportere. Quod ut plurimum valet ad tuendam sanitatem, sic eorum obstructio maximorum morborum occasionem præber.

**Πορφύρα.** purpura. nomen est emplastri cruenta vulnera glutinantis. Descriptio habetur apud Aetium lib. 15. cap. 12.

**Πρόζω.** præputium. Est glandis tegumentum. Id autem non aliud est quam carnea membrana cute obducta, quo tenuius esset, & facilius tum extenderetur tum vndiq; glandem comprehenderet. Natura in hunc usum ipsum glandi videtur induxisse, ut glandem seruaret lauem, mollem & lubricam. Callosa enim & arida stupida est, nec sensum retinet qui muneri suo conueniat. Summa præputii pars quæ prominēt, *ἀπορροια καὶ ἀπορροια* dicitur.

**Παθία.** tuberculum oculi, quod alio nomine *κρηνη* vocatur, de qua vide suo loco.

**Πόρις.** porio. Non est aliud quam ὁ ἵψου *καταπόρις*, hoc est humoris deglutitio, siue (quod idem est) humoris ab ore in ventriculum at-

tractio. Est enim ea actio facultatis attractricis, quæ humores æctis fibris, quas interna ventriculi tunica plurimas habet, attrahit: Cæterum attractionem eam sitis excitat, ut quæ non aliud sit quam potionis desiderium. Et appetuntur quidem proprie frigida humidaque: vocaturque is appetitus *διψα*, hoc est sitis. Quod autem bibitur, *πότης* siue *πόμα* dicitur, pars *δὲ διαίτης* non infima. Quippe quantum ad sanitatem conducit ratio potus recte instituta, tantum valetudini officit, si quis eo abutatur. Ac valet quidem imprimis ad cibi concoctionem & distributionem, quod cibus nisi humore aliquo perfusus sit, non nisi ægerime concoquatur & ventriculum offendat: quodque propter siccitatem in venas & iecur subire non possit, nec sanguinem consistentia mediocrem gignere. Nec tamen propter eam tantum causas appetitur, sed etiam per se, propria ratione: cum enim hominum corpora ex quatuor elementis certa quadam proportionem mistis constituta sint, si ea diu valere debent, elementorum substantias seu qualitates in eadem temperie perpetuo seruare oportet. Quare cum eorum dissipatio assidue quodam, quod vitari nō potest, substantiæ nostræ effluat quotidie fiat, sicut cibo quod calidum siccumque in nobis est refarcitur, ita potu frigidum humidumque instaurari necesse fuit. Ex quo sequitur potum omnem, aquæ etiam purissimæ, vna videlicet cum cibo acceptum ei quæ permixtum nos alere. Ex iisdem enim omnino nutrimur ex quibus constamus, nihiloque absurdus est ex aliquo quid nutrirī, quam componi. Proindeque eadem sitis ratio est, quæ & famis, eademque causarum series in excitanda siti spectatur, quam & in fame Galenus exposuit, suntque eius pariter duæ differentiz, animalis & naturalis, totidemque in potionis appetentia, quorū & in cibo symptomata esse Galenus libr. 1. de symp. causis ostendit. Aliquando enim quædam priuatio appetitiz potionis est, nulloque modo potus experitur, cum corpus vel propter excessum humoris & frigoris omnino potionem non eger, vel venter offensam ex desiderio in se non sentit. Aliquando vero diminuta potionis appetentia est, cum eadem ipsa remissiora sunt. Interdum autem etiam vitiosa est, habetque se ad portionem cum ea quæ circa alimentum est praua, alias quidem immodice potum affectans, si in ipsis ventriculi tunicis malus aliquis succus saluus aut biliosus continetur, aut naturale humidum in eo veluti feruet, alias vero prauum & à natura abhorrerentem, pro ratione vitiosissimi in ventriculo & corpore redundantis.

*Πότης*. apud Hippocr. significat *διψα*, id est modico, ut Gal. interpretatur *ἡ τῆς γλώττης*.

*Ποτήριον*. apud Hippocratem dicuntur *πὶ ποσὶ ὁμα* hoc est, recentia, ut scribit Gal. *ἡ τῆς γλώττης*. Dorica lingua, vel (ut habetur commet. 2. *ἡ δὲ διαίτης ἔξω*) Ionica.

*Παρμερίαν*. herba folio betæ, hirsuto, paululū supereminente extra aquam. Refrigerat, adstringit, inspissat.

*Πόνειον*. frutex est cortice obductus tenui, spinis horridus, lanugine spissa, ramulis lōgis, mollibus lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis, foliis paruis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris, semine gustu acuro & odorato, radicibus binos ternosue cubitos longis, neruosis, firmis, quib⁹ rectis manat succus gummi similis, qui præcisis neruis & vulneribus glutinandis illinitur.

*Πόνι*. maxime, præcipue apud Hippocratem, ut exponit Gal. Significat & *πὴν*, hoc est, Aliquando, ut idem interpretatur *ἡ τῆς γλώττης*. Dorica dialectus pro *πες* vsurpat.

*Πόνις*. (*ἡ ὄρε*) flora. Sic a quibusdam votari *δωρεῖται*, Dioscor. author est, lib. 5. cap. 13.

*Πὴν*. pes, pars ea cruris dicitur, inquit Aristoteles, quæ multiplici osse constat: malleolis, talo, & digitis definitur. De quo ita ille lib. 1. de histor. animal. *ἡ δὲ πάλυξ ἢ ὀρέξος, πὴν, πόνι ἢ τὸ μὲν ὀπίσθεν μέρος, ἡ ὄρε: πὴ δὲ ἔμπροσθεν ἢ πῶδες, ἢ μὲν ἐμπροσθεν, δὲ πάλυξ ἢ πόνι, ἢ δὲ ὑποπῶδες ἢ πῶδες, τὸ δὲ αὐτὸν ἢ τῶν ποδῶν σκελετῶδες καὶ αὐτὸν μόνον*. hoc est, ut Gaza conuertit, Pes autem, quod multiplici osse constat cuius pars posterior calx, prior discretæ in digitos quinque est: media plantæ nomine explicatur. cuius quod carnosum inferius solum attingit, vestigium est: quod superius pronam conficit partem, neruosum & nominis adhuc indigum est. Alii vero aliter pedem distinguunt & singulis partibus sua nomina accommodant. Etenim, ut quibusdam placet, prior pedis pars à malleolis ad digitos, *πῶδες* vocatur: interior à malleolis ad magnum vsq; digitum, pedibus sese quasi aspicientibus, *πῶδες*: quod sub hoc statim in imi pedis medio habetur, *καὶ πὴν πῶδες*: infimum autē quò terram contingimus & calcamus, *πάλυξ* est. Pars verò ea quæ post cauum pedis iuxta digitos attollitur, *σῆδε* *πῶδες* ἢ *πῶδες* dicitur. Ab his digiti sequuntur: Alii vero superiorem pedis partē totam quæ ante digitos est & neruis ossibusq; constat, *πῶδες* vocant ἢ *πάλυξ*, eiusq; priorē partē quæ digitis proxima est, *πῶδες*, posteriorem vero *πῶδες*, id est, calcem: inferiorem vero partē totam, *πάλυξ*, id est, vestigium, quod scilicet carnosum est, & inferius solum attingit. Vtrum Galenus *πῶδες* vocat eam partē quæ malleolis proxima ex septe ossibus constat, & manus carpo responderet: *πῶδες* vero; proximam illi partē quæque ossibus cōpositam, & quæ metacarpio in manu responderet.

*Πῶς*. pes. Mensura est qua rerum interualla dimetitur. Constat vnciis duodecim, siue sedecim digitis, siue palmis quatuor, ut ex Euterpe Herodoti perspicuum est, ubi sic scribit: *αὶ δὲ ἐκατὸν ὄργια διχαί, εἰς τεσσαρὰ ἑκατῶν ἑκατῶν μὲν ὄργια μετρωμένα καὶ περὶ πῶδες: τῶν πῶδων μὲν περὶ πάλυξ ἑκατῶν, δὲ τῶν καὶ ἑκατῶν*. id est, Centum autem iusti



institi passus sunt stadium vnum quod sex sit plethrorum. ut passum sex pedibus metiamur & quatuor cubitis: pedes vero sunt quatuor palmorum, cubitum autem sex palmorum. Suidas quoque scribit: ὁ πῦς ἐστὶν ἡ δακτύλος ἴσ'. hoc est, pes habet digitos sedecim. Ex eo formantur πεδῖαιος, ἡμιπόδιος, διπόδιος, τριπόδιος. Sed quamuis tā Romani quam Græci pedem in totidem partes diuiserint, attamen pedem Græcū Romano semuncia, siue (ut Gallico more loquamur) semipollice maiorem fuisse Georgius Agricola ostendit, qui mēsuras omnes doctissime explicauit.

**Πεδῖνος ὄνιος**, sic dicitur ab Hippocrate vini genus quoddam nigrum atque austerum, ut scribit Gal. ἐν τῇ γλώσσῃ.

**Πεδῖον**, marubium, frutex est ab radice ramosis, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro. semen in caulibus & ex intervallis. flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Gustu amarū est, interanea expurgat. Secundo ordine completo exalfacit, siccat vero tertio fere medio aut etiam completo.

**Πεδῖον**, sic dictum à quibusdam fuisse τὸ περὶ ἀρχαίων, Dioscorides author est, secundam videlicet eius speciem.

**Πεδῖον κεράσιον**, porrum capitatum. olus est quod estur vulgo, simplici capite ex albæ cernicis angustis extuberante, fronde super terram carinata & in angulum oblonga, colore adeo viridi ut pro herbaceo porraceus color vsurpetur.

**Πρέμων**, extremitas albi oculorū, authore Polluce. Alias significat Stipes, Strips.

**Πρῶσις**, apud Hippocrat. τὸ πρὸς τὴν νύκτα, hoc est, quod in tertiam inclinat, ut interpretatur Gal. ἐν τῇ γλώσσῃ.

**Πρήσις**, apud Hippocrat. inflatio. similiter & πρήσις. videt & πρηστύχτων, maxime inflationum, ut exponit Gal. ἐν τῇ γλώσσῃ.

**Πρήσις**, pars colli exterior, quæ per iram incensa & tumens inflatur, ut author est Pollux. Dicitur ἐπὶ τῇ πρήσει siue πρήσει, quod & inflare & incendere atque vire significat.

**Πρήσις πυρετός**, mitis febris. Est differentia febris apud Hippocrat. lib. 6. τὰν ἐπὶ δριμύτην, opposita τῇ δριμύτῃ πυρετός, sumpta à caloris febrilis essentia, & dicitur quæ medicum manum non mordicat neque exurit, sed vapore minime mordacem exhalat. Huiusmodi est diaria febris. Mitis autem dicitur non simpliciter quidem, sed per comparisonem, hoc est, minus mordax, siquidē febrilis omnis calor, cum igne sit, acer est & mordax, sed hic magis, ille minus. Hippocr. sæpe ὡχρὴν appellat.

**Πρῆσις τοῦ ποδός**, tentigo. Est auctio pudendi stabilis in longitudinem ac orbem tumefacti, citra rei Venereæ appetentiam, sic quidem Galenus lib. 9. τῇ 15. τῷ ποδὶ definiuit. Addit autē Aetius dolores inde moueri, quales esse in terano solent, quod inflatum distentumque

pudendum conuulsionis modo afficiatur. Scribit etiam eos qui sic laborant, cito perire ventre inflatos & frigidum sudantes, nisi illico auxilium eis adhibeatur. Accedit etiam iis quandoque inflammatio. Fit hic morbus à flatu vaporoso, ab humoribus viscosis crassisque sublato, & caruiernosum penis neruū distendente. Aliquando vero ipsi etiam arteriis eo flatu repletis oritur, nullo præcipuo proprioque affectu colem infestante. Hæc causa est propter quā Gal. lib. 6. loc. affect. scribit fieri ut oris arteriarum nimium patetibus priapismus excutetur. Nā cum nimium patet, quacūque de causa arteriæ incaluerint, non exigua tunc spiritus essentiam admittunt atque intra se recipiunt, quæ postea in fistulosum neruum effundunt, qui paulatim impletus colēm extendit, ita ut tota ipsius essentia in fistuloso neruo consistere videatur. Ac causam quidem eā priapismi frequentiore esse asseuerat, quam flatuosum spiritum in neruo fistuloso genitum. Quod an verum sit, valde dubito. Nam quamuis in naturali pudendi artectione id verum videri possit, attamen cum priapismus præter naturam sit, humorem in ipso genitali præter naturam contineri maxima ex parte verum est, qui in vaporem solutus distentione pariat. Dicitur à Priapo, cui talē pudendum fuisse veteres sinxerunt. Dictus est & à quibusdam satyriasis, quod Satyri attingere semper crediti sunt. Nec reuera Galenus ea nomina distinxit. Paulus lib. 3. cap. 56. 57. manifesto discreuit, incertum quem authorem sequutus, eum priapismum cui aliquando coniunctam esse inflammationem conuulsionemque Aetius scripsit, & mortem breui succedere cum ventris inflatione & frigidis sudoribus, πρηστύχτων appellans.

**Πριπίπτος**, vocatur ab Hippocrate lignum paruum in medio suo scamno insertum. Est autem lignum octo fere digitorum, magna ex parte rotundum. Idem πυλίσκος & σάκκος nūcupatur, vide βάλανος.

**Πῆλιος**, ilex, arbor est quæ quercus generi assignatur, & consimile munus obit, ut scripto prodidit Dioscor.

**Πρᾶυσις τῶν ὀστέων**, dicuntur ab Hippocr. οἱ ὅτι πλεον ἐν ὀστέων, hoc est, qui plurimum aucti sunt, & quorum iam ossa, perinde ac tenellorum, formari fingique non possunt. Inde etiam morbi quidam πρᾶυσις ab eodem dicuntur, qui accidunt etate iam progressis, ut Galenus exponit ἐν τῇ γλώσσῃ.

**Πρῆσις**, quāquam proprie oves significet, Hippocrates tamen ἐν τῇ πρὸς ἀνδρῶν eo nomine designauit βοσκήματα, hoc est, pecora, omnia, ut & Homerus & alii plerique veteres: ut annotauit Gal. comment. 1.

**Προβάσιον**, sic dicitur τὸ ἀνθρώπινον, authore Dioscoride, quasi ouilla herba. Sunt enim plantaginis folia linguæ pecorum similia.

**Προγλωττις**, dicitur ab anatomicis pars linguæ prior quæ acuta est.

**Πρηγνῶσις**, præcognitio, prægnatio, siue præsensio.

Est cognitio futuri exitus morbi & eorum, quæ illi superueniunt. Sed intelligere oportet nihil ab ægro aut affidentibus admissum quod morbi naturam dissoluat & cogat naturam in aliud tempus differre morbi solutionem. verbi gratia prædicit medicus septimo die, si omnia ut oportet agantur, solum iri morbum. ubi vero quicquam admissum est, si parvus quidem error hic sit, relabi solutionem ex septimo in nonum posse: si maior, in undecimum: si multo maior, in quartumdecimum: si perquam magnus, periculum pro certa salute sequitur. Hæc quidem ad morbum attinet. Nec vero de symptomatibus aliter sentiendum est, sed necessarii & magna ex parte morbum comitantibus. Tumultus enim ex vicinis per nocte, & canes latrantes, & iniucudi quidam nuntii, insomnes ægrotos reddunt. quorum nullum neque generationem habet necessariam, neque firmam destinationem. Quare non est omnium quæ circa ægrotos eueniunt, *προβλεψίς*, sed eorum tantum quæ generationem habent necessariam, ut assis & doloris lateris in pleuritide, capitis doloris in febre, tumoris & ruboris in phlegmone.

*Πρόδρομοι*. dicuntur venti qui Etiefas præcedunt, quasi eorum præcursores. Dirimit eos, ut scribit Galenus, Canis ortus. Sexto Idus Iul. flare incipiunt, ut Columella prodidit.

*Πρόδρομος*. vini genus quod Athenæus in Lesbos nasci dulce scribit. Quibusdam videtur id esse quod & *πρόδρομος*, eandemque nominis rationem sortitum.

*Προσηρμένη αιτία*. causa interna, quam & antecedentem solent appellare. Celsus abditam & in occulto positam causam vocat & morbos continentem causam. vide *αιτία*.

*Πρόσιον*. sic à quibusdam dictum fuisse elleborum nigrum Dioscorides author est, quod Melampus Proetidas eo seruauerit.

*Πρόκλα*. significat apud Hippocratem idem quod *εξαίφνης*, hoc est, repente, ut scripsit Galenus *ὅτι ἡ γλώττις*.

*Προκείμενα*. Abroroni cognomē est teste Dioscoride, propterea quod in terram se flectat, & cacumine suo se propaget. *προκείμενα* enim in plantis Græci dicunt, quæ cum se erexerint, in terram rursus se incuruant.

*Προκείμενη*.

*Προκείμενη αιτία*. dicitur causa externa & euidentis, quæ extra corpus posita ipsam bene malene afficit, atque internam causam quasi irritat & protocat. Ab eā enim fere fit initium motus id quod significat *προκαίρη*, itemque *καίρη*. Hanc vulgo primitiuam causam appellant, sicut *πρώτη προσηρμένη* antecedentem & antegressam, veluti Galenus manifesto distinxit initio libr. 4. de sanitate tuenda: quam tamen differentiam quidam aliquando negligentius obseruauerunt.

*Προκύνδου*. dicantur, ut scribit Rufus, primi digitorum articuli, metacarpio preximi. Nā medios digitorum articulos *μεσύνδου* dicit vo-

cari. Itaque quod his illi priores sint, *προκύνδου* appellantur, ut & extremi *μεσύνδου*.

*Προκύνιον*. triticum tostum. verum Galenus in explicatione vocum Hippocratis dicit *ἀρβύλον προκύνιον* ab Hippocrate appellari, farinam ex hordeo recenti & tenero confectam, antequam videlicet ex eo conus erigatur. Solent enim in areis etiam nunc conici construi, & maxime in humidis regionibus ex ligno recto circa quod in metæ vel coni figuram fructus circumponuntur.

*Προληψίς τύπος*. anticipatio accessionis. Est motus accessionis, ante horam qua præcedens accessio inuaserat, recurrens. Id autem contingit vel per totum morbi curriculum, vel particulariter in quibusdam accessionibus. Quæ per totum morbum fit, morbi proprietatem & mores potius consequitur, quam eius incrementum ostendat, cum & quartani & tertiani & quotidiani quidam circuitus usque ad integram solutionem ita anticipare visi fuerint, ac maxime quidem si *προληψίς*, hoc est anticipatio, proportionem per singulas accessiones seruauerit. Ab ea proprie dicitur *προληψίς τύπος*, in qua videlicet ab ipso morbi exordio usque ad finem accessiones perpetuo anticipant. Quæ vero particulariter in quibusdam accessionibus contingit, incrementum totius morbi ostendit, ut & ea quæ per singulas accessiones præcedentes *ἀνδρογῆς* facta, ubi fieri cœperit plus quam proportio exigit. Sic enim anticipatio morbi incrementum ostendit, sicut & accessionum retardatio, quæ *ὀστρεὺς τύπος* dicitur, declinationem. Siquidem simpliciter vel anticipare vel tardiorē esse accessionem, neutrum significat.

*Προμαλακτικόν*. dicitur prima pars balnei, siue prima domus, quod in ea præmolliiri corpora soleat, ut annotauit Gal. libr. 9. simpl. medic. *ὅτι χαλκόνδε*.

*Προμετωπίδιον*. sic dicitur curis quæ fronti prætenditur, in qua rugæ *πρόμετωπίς* dictæ consistunt. dicitur & *προμετωπίς*.

*Προμήνη*. dicuntur ab Hippocrate instrumenta chirurgica quæ suo extremo acuta sunt. vide *φθακρόν*.

*Προμυλαίη*. procidit, prominet in anteriorem partem apud Hippocratem, ut annotat Gal. *ὅτι ἡ γλώττις*. unde & *προμυλαίη* ab eodem dicitur, ὅτι *προεστὴς ἐξω πρὸ χεῖλε*, hoc est, cui labra prominent.

*Πρόνοια*. vocabulū est ab Hippocrate usurpatum initio libelli *προνοίας*. quo non vltim Hippocratem pro vulgari more Græcorum, Galenus annotat. Solent enim designare eo nomine *πρὸς φρονίαν καὶ πρὸς ὑγιεινὴν*, hoc est curam sollicitudinemque quam circa aliquam rem obimus. Siquidem ait Euripidem dixisse, — *ὃ δὲ καὶ ὁπλοκράτης*, ὅπως Πάριον προνοίαν ἔχον εὐχόμενος ποιεῖ. Quinetiam verbum hoc *προνοία* secundū omnes modos, infinitas habet significationes. Significat enim & curam habere, & quod vtile sit, ante præparare. Sed & vulgatum illud problema, Mundū providentia

providentia gubernari, eadem significacionem habet. Sed Hippocrates non ita appellavit: verum *αἰτὴ δὲ προγνώσις* usurpavit & *προγνώσις* nomen. nec id quidem simpliciter, sed ex significato quodā, quod communiter utriq; appellationi inest. Si quidem verbum *προγνώσις* atque item & *προγνώσις*, hoc est providentiæ, nomen, ab Homero inuenta sunt, *αἰτὴ δὲ νόσος τὰ προγνώσις* *αἰτὴν ἔσται*, hoc est, quæ res antequam fiant videamus. Eandem vero originem habent *τὸ προγνώσις* καὶ ἡ *προγνώσις*, hoc est, præcognoscere & præcognitio. Quæcumque igitur sub sensum cadūt, prius autem quam ipsa oculis intueamur, ratione inquirimus, hæc merito *προγνώσις*, hoc est, prævidere, dicimus, verbo ipso indicantes *τὸ προγνώσις* *ἔσται νόσος*: id est, quod ea antequā fiat, videamus. Quocirca & res eas quæ derepente fiūt, *αἰσούσα καὶ ἀπρογνώσις*, id est, inuire & improviso: quæ autē consulto, *ἐκ προγνώσις* factas esse dicunt. Eiusque rei etiam apud iurisperitos permulta sunt documenta. Est igitur & *προγνώσις* nomen apud Græcos cōmune rebus bene maleque gestis: nec ut aliqui putant, in bonis tātum solet usurpari. vide multo plura apud Galenum initio comment. in lib. 1. Prognostici Hippocratis.

*Πρόπλις*, est crassior apum materia, flava, odorata, styracem referens, & in mastiches modum ductilis, ceræ quidē finitima, nondum tamen cera, qua omnes frigoris aut iniuriæ aditus ab alueis arcentur. Tertium est ex operis apum fundamentis, quæ cum tria sint, inquit Plinius, prima *μίττω* vocant periti, secunda *πρόπλιον*, tertia *πρόπλιον* inter coria cerasque. Est igitur propolis fauorum stabilitamentum, quod nondum ad ceræ speciem peruenit, & è quo, ut inquit Varro li. 3. apes faciunt ad foramen introitus profectum in alueū, maxime æstate. Itaq; quoniam apes id ante alueum faciūt, dicitur *πρόπλις*, quasi suburbanum. Inuenitur enim in alueariorū foribus. Secundo ordine completo calfacit, & euocat aculeos & omnia infixā corpori extrahit. Ut autem scribit idem Varro, propter multiplicem vsum quem in emplastris exhibet, multo carius in sacra via quam mel venditur: ideo autem factum puto ut propolis olim à quibusdam cera sacra diceretur, ut scripsit Scribonius Largus in strumarū curatione.

*Πρόπομα*, potio ex vino & melle cōcinnara. Vini sextariis quatuor mellis despumati vnus miscebatur, citra quidem cocturam, ut scribit Paulus libr. 7. sed lōga satis insolatione. Hæc quidem simplex fuit propomatis compositio, quæ nomen hoc iccirco sortita est, quod ante cibos biberetur. Cæterum ad vsum varios comparari potest, ut ventriculi robur, cōcoctionem crudorum, alui subductionē. ideoq; varii etiam fuerunt *πρόπομα* apparatus, ut licet videre apud Aet. libro 3. cap. 57. & sequentibus, vbi vinorum purgantium, quæ *πρόπομα* vocat, cōpositiones recenset, & lib. eiusdem capit. 72. rosatum

flauæ bilis purgatorium *πρόπλις* appellans. *Πρόπλις*, procidetia, prolapsus. Generale nomen est, omnem partem loco suo motam alioque prolabentem designans. Itaque si vel vterus, vel podex, vel oculus, procidat, is morbus *πρόπλις*, dicitur, sed addito eius partis quæ prociderit, nomine, ut *πρόπλις* *αἰσχρῶς* ἢ *ἰδρας*, *πρόπλις* *ὕστερος*, *πρόπλις* *ὀφθαλμοῦ*. Ac omnis quidem procidetia causa est musculorum atq; ligamentorum, quibus vnaquæque pars continetur firmaturque, laxitas, imbecillitas & resolutio siue ab interna siue ab externa causa proveniens. Nonnunquā enim, ut Celsus scripsit, ingens inflammatio tāto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: *πρόπλις* (inquit) id, quoniam oculi procident, Græci appellant. At Paulus hoc oculi malum *ἐκπεσµὴν* appellavit, cum totus scilicet oculus ita prolabitur, ut extra ossis sui canitatem exertus emineat: *πρόπλις* aut minime, non quod *πρόπλις*, recte dici non posset (sic enim & Græci & Latini vocarūt) sed ut totius oculi prolapsus, ab vtriusque tunice prolapsu distingueret. quanquam non erat opus Paulo in ea nominum distinctione valde laborare, quod addito partis procidetis ut oculi aut vtriusque nomine, ambiguitas omnis protinus tolleretur, non aliter quam *ὅτι δὲ πρόπλις* *ὕστερος*, aut *ἰδρας*. Neque enim per *πρόπλις* absolute dictam potius licet oculi prolapsus quam vteri aut ani intelligere. Itaq; *πρόπλις* tum oculi totius, tum partis eius vitii est: totius quidem, cum sua sede excidit, à paralyti, ab inflammatione vehementi, aut alio magno præter naturā tumore & fluxione, quæ ut interdum magnū robustumque articulum, ita oculum possunt loco depellere. præterea ab ictu, casu, dolore & vehementi aliquo conatu, cum spiritus ingenti compressione, qualis accidit parturientibus. Pars autem oculi quæ procidit, tunica vuea sola est, *παροχθὴς* Græcis dicta, quā quia cornea tunica cōplectitur & continet, si eam vel erodi, vel rumpi contigerit, protinus vuea excidat necesse est. Itaq; morbus quidem tunicæ corneæ est, nempe solutio continuitatis eius: symptoma autem, vuea, soluta diuisaq; cornea excidentis. Cæterum pro rosationis ruptionisue magnitudine, plus minusue vueam tunicam procidere necesse est. ex quo fit ut hic affectus pro variis eius differētiis, varia quoque nomina sortiatur. Cum enim prolapsus parvus est, *μυοπέδησις* dicitur: cum amplius & eo vsque creuit ut acinum vuea repræsentet, *σφιλομα* nuncupatur: sin autē plurimum creuerit, ut etiam palpebras excedat, *μύλον*. Quod si portio ea tunicæ vueæ præterquam quod procidit, etiam duritiem callumque contraxit, composita iam quodammodo affectio est, & ἡλος, hoc est clauus, vocatur.

*ἐκ Προπληγῆς*. καὶ βραχὺ, hoc est sensim apud Hippocratem, *ἐκ τῆς διείτης ὀξείας*, καὶ *ἐκ τῆς ἀλγῆς*.

*Προπληγῆς*. Hippocrati idē est quod ἡ *σφίλομα*

hoc est, ossium aperte motorum commissura naturalis. vide *ἡρόδοτος*.

*Προσάρτησις*. est longiorum membranarum ad vicina loca applicatio, ut scribit author definitionum medicarum.

*Προσέχειν νοῦτος*. apud Hippocr. *αἰνέει* & *ὑμνείναι*, hoc est permanet: ut explicat Galen. *ἐν ταῖς γλώτταις*.

*Προσέχειν αἷνα*. continens & proxima causa, quæ & *συνέχεις* & *συνεκτικὴ* à Galeno appellatur. vide *αἷνα*.

*Προσέχειν*, (inquit Galen. comment. 3. in 1. Epidem.) si cum *βαλάνος* scriptum occurrit, evidentem habet significationem: ut siue ista adiectione, subaudire oportet *βαλάνος* aut *πυλόν*. Priore modo Hippocr. in eo opere dicit, *προσέχειν τὴν βαλάνος*, quod dicitur *συνεχὲς* *διηλθ*. S. Posteriore, non multo post, *προσέχειν δὲ, ταῦτα μὲν διουφίσθη*: id est, quum verò appo- fuisset, glandem vel pessum, ut mox de ea dicitur *βαλάνος* *προσέχειν πάλιν διηλθ*.

*Πρόσθεσις*. appositio. Est adiectio eorū quæ corpori ad sanitatem desunt, pars scilicet medicinæ altera, quam nonnulli celebres quidem medici definiuerunt esse *προσέστιν* & *ἀφαιρέσθαι*, id est, adiectionem & detractionem.

Est & *προσέστιν* naturæ opus ad nutritionem necessarium, quò alimentum parti nutriendæ opponitur. Postquam enim succus is, qui omnem animalis particulam nutriturus est, à vasis excidit, in totā eam primum dispergitur, mox in halitus speciem adiungitur, hoc est, apponitur parti nutriendæ, deinde agglutinatur, demum assimilatur. Ac adiunctionis quidem atque agglutinationis differentiam euidenter prodit genus illud hydropis quod *αἰματόρρα* dicitur, in quo humor ad partem affluens apponitur quidem, nec tamen, quod aquosior sit, adhærescere potest.

*Πρόσθετα φάρμακα*. dici quidem possunt in vniuersum topica omnia medicamenta & quæcunque partibus dolentibus admoueri possunt, proprie tamen ea dicuntur quæ in velere naturalibus mulierum admouentur, intraque eorum sinum reconduntur, siue, ad mouendos menses, siue ad sistendos, siue aliam ob causam, quæ tamen magis vilitato nomine *πλάσι* vocari solent.

*Πρόσκλησμοί*. asperisiones. Remedii genus est quo facies egri aqua perfunditur. Quod quia commode fit per spongiam, iccirco species est *τῆς ἀσπογγιστικῆς*. Viurpatur autem non tantum ad sordes facie eluendas, sed etiam ad spirituum exolutorum renouationem atque reuocationem, ætate quidem & in ardentibus febribus frigidam, hyeme vero egelidam affundendo. Quod ne immoderatus fiat enadèdum est, præsertim in iis qui sunt capite imbecillo, quod inde comapro- pissime inducatur. Eo remedii genere in ipso ardentis febris vigore vtendum præcipit Archigenes, non solum faciei verum etiam pectori spongiam aqua madentem adhibens.

*Προσκατῆμα* *καταδεδειγν*. agglutinamenta squamosa, siue in squamæ modum facta. sic dicitur commissuræ ossium temporalium cum ossibusincipiis siue bregmatis, quas sic veteres potius quam suturas nominare maluerunt, quod non mutuo quidem in sese infertis ossibus, sed inter se coherentibus in squamarum similitudinem fiant. vide *καταδεδειγν*.

*Πρόσδος*. apud Hippocratem significat cōgressum siue coitum cū muliere, ut anotar Gal. comment. 3. in 6. *τὸν ἐν τῇ μητρὶ*.

*Πρόσθημα*. apud Hippocratem de locis est *πρόσθιον*, quod offertur, adhibetur vel assumitur. & *προσέστιος*, afferendus vel offerendus vel assumendus.

*Πρόστασις*. extensio. vox obscura apud Hippocr. inquit Gal. comment. 5. lib. 6. *τῆς ἐν τῇ μητρὶ*, quo loco Hippocr. scribit *τὸν ἄνθρωπον* *τῆς* *προσέστιος*. *διότι* *τὸν* *τῆς* *προσέστιος* *τῆς* *προσέστιος*. hoc est, linguam eiusdem coloris cum faccis, quo fit ut iis humores dignoscamus. Aliqui enim de humoribus intelligunt è ventriculo erumpentibus, alii humores in lingua concretos, alii eos quibus ipsa perfusa est. Galenus verò hæc omnia eo nomine comprehendit, ut eo nomine omnes succi quoquomodo linguam attingentes intelligantur.

*Πρόσθιος*. dicitur tam in manibus quàm in pedibus pars ea carnosa quæ inter earū partium cauum & digitos attollitur: in manu *πρόσθιος*, in pede *πρόσθιος* vocatur.

*Πρόσρρησις*. agglutinatio, siue adhærentia. Opus est facultatis nutritoriæ alimentum nutriendæ parti sic adaptantis ut illi adhæreat. Priusquam enim nutrimentum assimilatur, agglutinari siue adhærescere necesse est, sicut etiam ut agglutinetur appositum esse prius oportuit. Nam postquam succus is qui omnem animalis particulam nutriturus est è vasis excidit, in totam eam primum dispergitur, mox adiungitur, deinde agglutinatur, demum assimilatur. Differre autem inter se *ἐξαρτία* *συν* & *προσρρησις*, id est, assimilationem atque agglutinationem, docet vitiligo illa quæ *λευκή* dicitur, in qua adhærentia quidam nutrimenti facta cernitur, non tamen assimilatio, sicuti etiam adiunctionis atque agglutinationis differentiam prodit genus illud hydropis quod *αἰματόρρα* vocant. Siquidem in eo apertissime affluentis nutrimenti appositio quædam fit, quod tamen, propterea quod aquosius adhuc est, nec ad succum sufficienter reductum, nec lentitiam glutinisque consistentiam, quæ naturalis caloris ope prouenit, adeptum, adhærentiam consequi non valet. Et enim ut agglutinatio fiat, oportet ea quæ agglutinari debent, nec plus æquo dura esse, nec nimis humida & fluentia, sed mediocriter lenta & tenacia, & in eo loco consistere vbi assimilanda sunt.

*Προσθέςτερος*. si sine iota subscripto legatur, significat *πρόσθεςτερος*, hoc est graueolentius: si vero cum iota *προσθέςτερος* scribatur, significat

cat humidius, ἀπὸ τοῦ οἴδηματός, vt scripsit Gal.  
ἐν ταῖς γλώσσαις.

Προσώπιον ἢ

Προσώπις, sic dicitur à quibusdam τὸ ἄρκεον, quoniam eo veteres in tragœdiis personas sibi conficerent, quam ob rem etiam à Latinis personatæ nomen inditum est.

Πρόσωπον, facies, vultus. Dicitur id totum quod fronti subest, vt ait Iulius Pollux, vel vt Aristoteles, pars quæ caluæ subiecta est anteriore parte: sic enim præter oculos, nasum, genas, os, mentum, & auriculas, frontem quoque comprehendit. De homine tantum dicitur, quod cum vnus animantium erectus sit, solus antrofum prospectat, vocemque ante versus emittit. ὅθεν τὸ πρὸς ὅσον ὀρθὸν εἶναι καὶ ζῶον, μόνον πρὸς ὅσον ὀρθῶς, καὶ τὴν φωνὴν εἰς τὸ πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ σώματος: hoc est quod enim solus inter animalia erectus sit, solus ante se aspiciat, & vocem antèius emittit: vt ait Aristoteles libr. 3. de partibus animalium. Quod autem in homine πρόσωπον est, id in brutis προσημὴ appellatur; in auiibus autem πρόμας ἢ πρόμας.

Προσημῆ, apud Hippocr. ἀντὶ τῆς προσημῆς, hoc est protendentes, vt scribit Gal. ἐν ταῖς γλώσσαις.

Πρότμησις: à quibusdam dictus est umbilicus, quod primum in infante refecetur.

Προτρεπιδεύ, apud Hippocratem, ἀντὶ τοῦ μεταβάλλειν, hoc est transmurari, vt explicat Galenus ἐν ταῖς γλώσσαις. Quidam cod. habent προτρεπιδεύ.

Πρότροπον, est mustum, inquit Plinius, sponte defluens, antequam calcetur vva. Potest & vinum appellari ratione generis, vt apud Dioscor. libr. 5. vbi agit de vinorum differentis ex gustu, ὁ δὲ ὅτι τῶν ἡλοποιδεισῶν σαφηνέως, ἢ ὅτι τῶν κλημῶν ὀπιδεισῶν καὶ πελομένης ἡμύματος γλυκὺς, καλούμενος κρηπιδεύ, ἢ προτρεπιδεύ, hoc est, passum, quod vuis sole siccatis in area, aut in sarracento torrefactis exprimitur, ceticum cognomine, aut pramnium aut protropium. Item apud Aetium libr. 9. cap. 24. αὐτοῦ τῆς ὁ οἶνός ἐστιν, ὁ αὐτοῦ μάλιστα ἀποδείξω ὅτι τῶν πεποιδεισῶν σαφηνέως, καὶ τὸν οἶνον ἀποδείξωσαν. hoc est, scybelites autem vinum est, quod sponte defluit ab vuis sole siccatis in area, vinumque emittentibus. Porro appellatio protropi, siue musti, siue passi, seu vini dicere mauis, Græcis ab eo deducta videtur, quod calcaturam & prælum sponte effluendo præuertat, hoc est, ἀπὸ τοῦ προτρεπιδεύ, vel quod sponte fluens, reliquum mustum præueniat. Quam etiam ob causam quidam ab aliis προδρομὸν appellatū fuisse existimant. Columella hoc ipsum, Mustum lixiuium vocauit, apra nominis translatione ab ea quæ primo priuatimque lixiuia dicitur. Vt enim in ea per colum madere cinere paulatim distillat aqua, ita & hoc musti genus, per se antequam prælo subiiciatur vva, paulatim diffluit, & reliquum mustum præuenit.

Πρόμας, prunus syluestris in Asia sic appellata est, vt scribit Gal.

Πρόφασις, sapè sic dicitur ab Hippocrate causa quæ euidentis manifesta que est, vt pluribus in locis Galenus explicauit. Interdum vero eo nomine omnes simpliciter causas vocat, & aliquando etiam eas, vulgi more, quæ falso causæ esse existimantur, vt idem annotauit comment. 1. in lib. 1. καὶ τὸν ὀρθὸν.

Προφυλακτική, pars est ὁ ὑγιεινός. tuetur enim sanitatē. Tota consistit in causarum, quæ morbum alioqui facturæ erant, ablatione, hoc est tota circa humores præcipue negotiatur. Si quidem maximæ præcipuæque impendentis morbi causæ humores sunt lēti, crassi, multi, valde calidi, frigidi, mordaces, putres, pestilentes, aut alia quadā vitiosa qualitate præditi. Quæ ergo ijs adhibetur prouisio, lentos incidēdo, crassos tenuando, multos vacuando, calidos refrigerando, frigidos calfaciēdo, mordaces contemperando, putres & pestilentes immutando, ne morbum gignant, προφυλακτική appellatur. Ex quo apparet, ὅτι ὑγιεινός partem esse. Cum enim ratio tuendæ sanitatis versetur, vel in tutela hominis optima valetudine fruētis, vel eius qui iam iam in morbum cadere paratus est, prophylacticè secundum hoc munus sibi asciuit. Iam enim in corpore subest latetque morbi causa, eumque mox excitatura est, nisi citissime tollatur, cum nulla adhuc sit eiusmodi causa in eius corpore qui optima præditus est valetudine. Talis quidē proprie ἡ προφυλακτική est. Verum tamen etiam cura quæ sanis & congenitam sanitatem retinentibus, siue ea perfecta absoluta que sit, siue ab optima parum declinat, adhibetur, ὁ προφυλακτικός nomine appellatur, quod sanitatem in suo statu conseruando, futuros morbos declinet. Quinetiam si quis iam ægrotare cœpit, morbusque in ipso, vt dicitur, fieri adhuc est, nec longe progressus, tamen si eiusmodi prouisio ad therapeuticè proprie pertinet, pars tamen quodammodo ὁ προφυλακτικός dici potest. Cum enim morbus iam factus est, nulla que causa superest quæ morbum faciat, tūc sola iam facti morbi curatio relinquitur: vbi vero quæ subest in corpore causa nondum morbum peperit, eius sublatio ad prophylacticè attinet: cum vero iam aliquid egit, aliudque insuper factura est, mustum iam quodammodo hoc opus est ex præseruatione & curatione. Quod enim morbi iam factum est, curatione tolli debet: quod vero faciendum restat, per prophylacticen arcendum est. At nullum huic operi proprie inditum nomen est, quo coniunctam cum præseruatione curationem designemus, sed pro vincēte opere, vel curationem, si morbus iam lōge processit, vel præcautionem, si intra initia sua consistit, appellamus. Sic quidem Galenum interpretari oportet extremo libro artis parua, vbi scribit τὴν προφυλακτικὴν triplicem esse in genere differētiā: primam quidem hominis qui integra fruitur sanitate, secundam eius qui non integre valet, tertiam vero eius qui iam ægrotat.



**Πρόφισις, βλάστημα.** hoc est germinatio, apud Hippocratem, ut explicat Galen. ἐν ταῖς γνάσταις.

**Πρόχρον πνεύμα.** Hippocrates dixit in Protrhet. quod alibi lib. 2. epidem. *μπαρον* appellauerat. significat autem eam spirandi difficultatem, in qua humeri etiam ipsi attolluntur. quod si quando contingit, id facile & manifestum, hoc est *προχέρας*, apparet.

**Προστικὴ δύναμις.** propulsoria facultas. Eadem omnino cum expultrice quæ proprie *ἐκκριτική* dicitur. videtur tamen *τὴν προωστικὴν* Galenus magis usurpare in ea facultate qua vterus vitur in propellendo foetu lib. 3. facult. nat.

**Πρωκός.** pars ea per quam ventris excrementa exonerantur. nomen habet *ὡς τὸ προωστικὸν ἐκτὸς τῆς γαστρὸς*. dicitur & *κρῖος*, & *δακτύλιος*, & *σεφαίη*, & *τέρας*, & *κύσπαρος*, & *ἀρχός*, & *ἔδρα*.

**Πρωπύς.** est collyrium principio suffusionum & ad omnem visus hebetudinem, & ad cicatrices, & ad callos efficax. Triplex habetur eius descriptio. neque enim consentiunt Galeni. Aetii & Pauli compositiones.

**Πρωτόγαλα.** dicitur lac quod statim à partu multum est, quod cinere calido modice reperfactum citra coagulum statim concrevit. Id veteres comici, ut scribit Galenus, *πρωιδίω*, in Asia *πρωεφθον* appellabant: hoc autem purum lac est, nihil alienæ qualitatæ admixtū habens: attamen addendum cum melle cōsulit Aetius, alias concoctu difficilius est & crassioris succi, tardiusque in venas subit.

**Πρωτόζωνον.** sic dicitur à nonnullis *τὸ αἰεζων*, siue sedum maius, auctore Dioscor.

**Πρωτόρρυτος ῥήτιν.** resinae genus sic vocari apud Lacedæmonios auctor est Galenus lib. 3. *ῥήτιν*, eandemque ab aliis *αὐτόρρυτον* dici, quod tum primum sponte fluat. In Cilicia, ut idem ait, *καπρίλαον* appellatur. Ea liquidis omnibus resinis tum liquidior, tum calidior est, & partium tenuitate præstat.

**Πρωτόστικτος κοιλία.** hoc nomine designatur lixiuum proprie in quod parandum calx ad cinerem quemcumque additur. Id autem adiicit, & clysterum potissimum autem medicinis miscetur, ut Paulus lib. 7. prodidit.

**Πρωτόσπυραι.** dicuntur caules brassicæ teneriores, quos & asparagos dici Galenus lib. 2. de alimentis auctor est.

**Πυρμυκή.** frutex est furculos habens paruos, multos, rotundos, abrotano non dissimiles, & circa eos folia oleæ longa, multa, & in cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum, quod suo acti odore sternutamentum excitat, quod & flores efficacissime præstant. Officinis & herbariis pyrethrum sylvestre dicitur. Calfacit & siccatur, viridis quidem secundo excessu, arida vero tertio.

**Πυρμυκὸν φάρμακον.** sternutatorium medicamentum. Est acre medicamentum, quod naribus inditum sternutationem mouet. Acre & mordax omnino sit oportet quod facultatem cerebri expultricem irriter. Ea nam-

que offensa medicamēti acrimonia, nitenque à se quod molestum est depellere, sternutamentum edit. Est autem medicamentum id genere *ἔρπον*, in hoc ab aliis differēs, quæ naribus adhibita citra sternutationem pituitam à capite detrahunt. Eiusmodi facultatem habent cūminum Æthiopicum, piper, struthion, castorium, zinziber, veratrum, euphorbium, cyclaminum succus. Debent autem exigente vīu contundi & cribrari, & intra nares penna, frictione aut aliter prius irritatas & concalescitas, vel digito vel arundine immitti.

**Πυρμός.** sternutatio. Est motus cerebri quo per nares confertim actō spiritu nititur sibi molesta expellere. Recensetur à Galeno inter deprauatos motus voluntarios actionis animalis motricis, ut & conuulsio & tremor & rigor & tussis & pandiculatio; atque in illo symptomatum genere ponitur, in quibus causa aliqua præter naturam sit, quæ eam ad tale opus extimulet. Ea autem est excrementum mordax, nares aliosque respirationis meatus aut ventriculos anteriores cerebri & continua ijs olfactus instrumenta & ossa ethmoidea obstruens, vel flatuosus aliquis spiritus in cerebro contentus. Quæ cerebrum ut à se depellat, geminam adhibet expirationem, vnam quam per se facit, per ossa ethmoidea, alteram vero per nares, neruis, ut Galenus ait, ceu manibus prælongis in thoracem demissis vtens, & spiritum vnicō impetū ex pulmone & capite vehementer & confertim emittens. Exit autem, ut scribit Hippocrates, angusta via, ideoque sonus ille fit qui inter sternutandum exauditur. Quanquam non solus flatus è cerebro erumpens eum excitet, verum ille etiam qui sursum è pulmonibus fertur. Quamobrem capiti vaporibus pleno sternutamentū conducit plurimum, nisi à distillatione factum sit, atque interdum ex accidenti remedio est singultui, ut habetur Aphor. 1. 3. l. 6. propter valentiorē motum musculorum epigastrii, causam singultus simul expellentium. Cum enim ad sternutamentum ciendum expultrix vis ad vehementiores motus se comparat, atque in eo conatu abdominis musculi intenti appressique ventrem vna comprimant, plarumque fit ut vna quoque expellant ea quæ in ventre & gula singultus causa sunt. Nec vero dissimilis ratio est in ijs depellendis quæ pulmones male habēt. Est enim sternutamētum interdum eorum remedium, facta scilicet magno cum impetu expiratione, quæ secum rapiat quicquid pulmonibus inhærescit. Id plarumque mouit, ait Galenus, ut in pulmonis morbis sternutationes cierent. In quo tamē diligenter attendenda est Hippoc. sententiā ab eo scripta in Prognost. in omni pulmonis morbo sternutationem vel præcedere vel subsequi malum esse. Ea namque pulmones mouet atque exagitat, quos in quiete, ut & omnes quæ laborant particulas continere expediat.

Ex quo patet sternutamentū per se pulmo-  
nibus esse inimicum, temerariamque esse  
pulmonis per sternutamenta curandi ratio-  
nem, quā per accidens tantum, & fortuito  
prodesse valeat. Causa eadem est cur Hip-  
pocr. Aphor. 36. libr. 5, mulieri ex utero la-  
boranti aut difficulter patienti sternutatio-  
nem cōferre scripserit, atque alibi consulue-  
rit, ut secundæ ex utero procidant, mouēdas  
esse sternutationes. Compressis enim ma-  
gna vi musculis epigastrii & spiritu à superis  
ad inferna violentius depulso, accidit inter-  
dum ut & fœtus & secundæ loco moueātur.  
At vero sternutamenta per se caput leuant,  
& grauedini, caro, lethargo, apoplexiæ me-  
dentur, quod causam morificam è cerebro  
abigant. Ea autem, sicut initio proposui, spi-  
ritus est flatusosus, vel solus, vel cum alio hu-  
more acri & mordaci interdum sensibili &  
conspicuo, alias tenuiore & visum fugiente  
mistus. Quem quidem Hippocrates sternu-  
tamenti causam agnoscens, scripsit Aphor.  
51. libr. 7. eam fieri ex capite concalescente  
cerebro vel humectato inani quod in capite  
est, breui sentētia flatus omnis orrum expli-  
cans. Nam cum flatus generatio fiat ab im-  
becillo calore in subiectum humidum, pa-  
tet cum duabus summis de causis excitari.  
In frigidioribus enim naturis ubi non est  
magna satis caloris vis ad mouendum flatū,  
cerebri concalescentia eum mouet: in cali-  
dioribus autē, in quibus propter caloris ex-  
uperantiā rota flatum materia discutitur,  
si cerebro superfluius aliquis humor acce-  
dat, cui cōcoquendo impar sit calor cerebri,  
facile inde ventriculi cerebri, & si quæ sunt  
in eo inania spatia, flatu replentur. Itaq; duæ  
causæ flatum, calor & humor ab Hippo-  
crate eo Aphorismo statuuntur, quæ solæ in-  
tra cranium positæ sternutationem mouēt.  
Sunt vero & aliæ quædam externæ, ut me-  
dicamenta *σπασμωγικά* vocata, & aer aliquando  
ex pulmone sursum elatus compressio con-  
fertim thorace.

*Πιπλίς*, vlmus. Arbor est notior quā ut describi  
debeat. Glutinar, adstringit pariter & ab-  
terget, præsertim eius cortex. Sed & radices  
eandem vim habent.

*Πιπύς* .

*Πιπύς*, filix, frutex est foliis sine caule, sine fru-  
ctu, sine flore, quæ ex vno pediculo, cubitali  
longitudine exeunt, multifida & lateribus  
pinnata, subgrau odore. radice per summa  
cespitum nigra, oblonga, filices multas fun-  
dente, subastringente gustu. Adstringit &  
valenter desiccatur.

*Πιπύς*, calx. Est os pedis omniū maximū, parte  
quæ ingredimur leniter rotundum & latia-  
sculum, posteriore tibiæ rectitudinem lōge  
excedens, inferiore astragalo, anteriore ossi  
scaphoidi inarticulatū. Ex partibus eius an-  
terioribus quæ quidem è regione magni di-  
giti sira est, astragali capiti subiacer, neque  
cū altero osse copulatur. Ad eius extremas  
quæ minimo digito respondet, cū osse quod

*αὐλοειδὲς* dicitur, per synarthrosim coniungi-  
tur. Os aut calcis qua parte rotūdū est, aspe-  
rum etiā & inæquale cernitur, eamq; in par-  
tem tibiæ ossis & tali ligamenta inseruntur.

*Πτερυγίων*, ala, vel potius parua ala. videtur enim  
diminutiue dictum ἀπὸ τοῦ πτερυγός. Sunt au-  
tem *πτερυγία* proprie volucriū alæ, duræ qui-  
dem & fibrosæ, sed pauci excrementi & sa-  
lubres. Inde ducta vox est ad alia, ut ad ho-  
minem, in quo *πτερυγία* appellantur exte-  
riores & infimæ nasi partes motu præditæ. Sunt  
autem cartilaginea tenuiaq; corpuscula, ab  
utroque latere adnata, in quæ exigui duo  
musculi à malis prodeuntes, vtrinq; singu-  
li inferuntur: hi nasi alas adaperiunt: qui au-  
tem eas cōtrahant, nulli sunt, quod eas pro-  
pter respirationem non expediat concludi:  
verum cum eas aperientes musculi ab actio-  
ne cessarint, redeunt illæ in naturalē statum  
& conuenienti modo patent. Similiter & in  
mulieribus *πτερυγία* appellari eminentias illas  
duas vteri sinum amabientes scriptū reliquit,  
quisquis ille est Introductionis seu Medici  
author. Ab eiusdem etiam alæ similitudine  
*πτερυγίων* duplex & in diuersa humani corpo-  
ris parte factum malum indicat. Ut enim alæ  
in volatibus ab humeris extensa aperiantur,  
sic in his quæ mox exponemus mala ab  
angulo clausurave aliqua progredientes in-  
utiles membranæ & carunculæ oculis & di-  
gitis nocent. Ac primum quidem de oculo-  
rum *πτερυγίοις* dicamus. Est autem id neruosa  
adnatæ oculi membranæ excrecentia, ex-  
oriens ab angulo & ad pupillam inde per-  
ueniens eamque obtenebrans. Sæpius à na-  
rium, interdum etiā à temporum parte na-  
scitur, rarissime à superna aut inferna palpe-  
bra. Aetius autem lib. 7. definit *πτερυγίων* esse  
cum album in oculo supra modum augefcit,  
aut caro supercrefcit, ex scabra quadam lip-  
itudine aut assiduus fluxionibus. Latini id  
mali genus vnguem vocant, ut ait Cels. libr.  
7. cap. 7. quod humano vngui, ut credimus,  
progrediens neruosa ea membrana similis  
sit. Quod vero in hominis pedibus mani-  
busque *πτερυγίων* sit, est incrementum carnis,  
quæ partem vnguis integit. Nasctur potissi-  
mum in pollicibus, pedum quidem ex of-  
fensione plarumque, manuum autem ex  
neglecta reduuia & post inflammationem  
in pus mutata. Siquidem hoc temporis spa-  
tio vnguis radicem exedit, ipsumq; vnguem  
corrumpit, aliquando totum, interdum di-  
midium. Est cum & os corrumpit, graui cum  
odore, digitusque per summa dilatur & li-  
uet.

*Πτερυγίδης*, alatus. Is dicitur cui scapulæ sine car-  
ne nudæq; sunt, & alarum instar prominēt,  
retrosumque producantur.

*Πτερυγίδης* siue *πτερυγοειδής*, dicuntur duæ apo-  
physes ossis *σπλουειδοδής*, quas ad cranii basim  
extra ipsum emittit. Sic dictæ sunt quod ala-  
rum modo promineant.

*Πτερυξ*, sic dicitur à quibusdam *πτερυγίων*, ut ha-  
betur apud Dioscor.

**Πίλαι.** dicuntur, inquit Galenus lib. 14. meth. med. quibus perire ex ciliis pili. Alii vero nō omnes simpliciter quibus ij pili deciderant, *πίλοις* vocādos censent, sed quibus præterea adiuncta est crassities, callositas ac rubedo palpebrarum, quod aliter inter eos qui *πυλιδόσι* & eos qui *μυλιδόσι* laborant, nō liceat distinguere. Est enim utriusque cōmune pilorum defluuium, ut suis locis videre potes.

**Πίλοις.** est defluuium pilorum ē palpebris crassis, callosis & rubentibus. Aetiū scribit compositam esse affectionem *ἐκ τῆς μυλιδόσεως καὶ τῆς πυλιδόσεως*, hoc est, ex pilorum defluuiō & sicca lippitudine. nō enim simplex pilorum defluuiū est, sicut *τῆς μυλιδόσεως*, sed præterea palpebris & oris præsertim earum accedit crassities, callositas & rubor, quæ sunt *τῆς πυλιδόσεως* symptōmata. Nec vero refert hic scrupulosius inquirere quis in proposito affectu morbus sit, quæ vero symptōmata. Galenus in pilosi ut & in ophia si & alopecia, defluuium pilorum videtur morbum constituere, in eorū morborū organicorū genere positum: quæ in numero partium deficientē cōsistunt. Paulus cōtra symptōma videtur facere, & morbum ipsam crassitiem & callositatem palpebrarū, positam sub eo genere morborū organicæ partis qui in formæ corruptione cōsistunt.

**Πίσινα.** písana. Propria est hordei decorticari appellatio, *ἐκ τῆς πίσεως*, quod pinsere & decorticare significat, quoniam hordeum tundendo degluberetur, ac suo cortice castratum ita conderetur. Mundatum hordeū officinæ vocant. Tunditur enim hoc, non molitur. Ac veteres quidem primo in corbibus perfunctum aqua hordeum dum tumeret, in solē siccabant, mox in pila ligneo pistillo tantisper tundeant, dum corticem glutinamque exuisset, & ita ut diu perennaret, reponēbāt. Aliqui vero hordeum prius aqua madefactum, dein solē resiccatum in pila tundeant, & suis glutinis explicitum molebant, farinam in sacculo coactam diutissime discoquebant, ita abigi vim flatūs exstimates, atque resiccatam & in offas conuolutam ad vsum sorbitionis seruabāt. Alii vero, ut refert Const. Cæsar lib. 12. de agricult. hordeum maceratum, purgatum, decorticatum & in solē siccatum, rursusque pistatum, secundo etiam ad solem exiccabant, cumque reponere volebant, id quod ex ipso tenuē inter pistandū decussum erat, ei aspergebant, quod ita ipsum defendi cōseruarique animaduertissent. At quamvis propriē ex hordeo písana pararetur, attamen ex aliis etiam frugibus eam confici solitam annotatum est, ut tritico, alica, zea, oryza, lente, sed quam non simplici písanæ nomēclatura, sed addito frugis ex qua constaret nomine, *πίσινα πνεύλου, χορδοπίσινα, πλω, πλω ἐκ ζείαις ἢ ὀρίζης πίσινα, φακτοπίσινα*, & alias aliter appellabant. Sic ergo parata

písana recodebatur, optimo quidem & saluberrimo instituto, quod utinam à nobis neglectum non esset: cumque vñs exigebat, in aqua coquebatur. Coquendi autem ratio aliis atque aliis diuersa fuit, sed Græcis maxime vulgata hæc est, quam Galenus lib. 1. de alimentis annotauit: Coquitur písana portio in aquæ decem, vel, ut ait Paulus, quindecim partibus, dādaque inter coquendum opera est, ut quam amplissime intumescat. Quæ enim multum citroque intumescit, optima censetur, ut contra quæ longo tempore parū tumer, pessima. Cum autem in tumorem sublatæ est, atque mōmentum infunditur: deinde olei exiguum, quod tamen etiam per initia iniici potest. Cum ad exactam coctionem peruentum erit, frictus sal inspargi debet. neque aliud præterea miscendum est, nisi forte anethi aut porri pauillum. Et talis quidem est, optima písanæ confectio. Ab ea multum aberat quam plerique aliis multis superfluis imperite condiebant. alii namque amyllum, alii sapam indebant, alii mel & cuminum, cinnum potius quam písanam parantes. Nec defuit illis forte ratio, quod sic hordei crassitiem tenuari, lentorem incidi, flatum discurti arbitrarentur. Nos multo antiquis delicatiores, & ipso Apicio qui lib. 4. de opsoniis superfluum eiusmodi písanæ conditiram recēser, in gulæ studio superiores, sprete ijs omnibus, amygdalis intritis & saccharo, saleque modico contenti sumus, quibus vis quidē aliqua inest aduersus hordei crassitiem, lentorem & flatum, sed porro & anetho longe impar faciunt enim hæc non modo ad palatum & gratiam, sed non parum etiam ad salubritatem cōducunt. Cæterum sic cōcta písana, iam nō písana, sed *πίσινα χυλός*, *ἢ ῥόφημα*, hoc est písanæ cremor, aut sorbitio, appellatur, seu (quod idem est) písanæ ius vel succus. Quinetiam ius decocti integri hordei in aqua tantisper dum coctione dissiliat, hordei cremorem Celsus vocare solet, qui biliosis & incandescētibz propinatur febribz. Písanæ laudes Hippocrates vñ volumine prosequutus est, eam omnibus sorbitionibus præferens, quoniam lenis & lubrica ex facili hauriretur, quoniam sitim arceret, quoniam in aluo non intumesceret, quoniam facile redderetur, & affueris is solus cibus in febribz bis die dari possit, multum remotus ab ijs tum qui medicinam fame exercent, tum qui zgrs ciborum copia obruunt. Est enim písanæ succus: alimentum mediū generis, tenue à Galenio dictū, quod vires nec onerat ut plenus victus, nec ut tenuissimus dissoluit.

**Πύσινα.** apud Hippocr. in Protrhet. non aliud significat quam frequenter spueri, vel os assidue sputo plenum habere: ut scribit Gal. sect. 1. comment. 1.

**Πύσιμα** ἢ

**Πύσιμα.** spurum. Est excrementum ruffiando vacuatum. Cum enim superfluum aliquis humor

humor thoraci, pulmonibus, asperæ arterie, gutturi, aut alicui instrumento respirationis molestus est, eum natura tussis propellere nititur, sputumque mouet, signum proprium affectionum quæ partes eas infestât, & concoctionis quam victrix natura vel oppressa molitur. Sputum enim album, læue, æquale, facile, quodque morbum lenat, concoctionem & naturæ victoriam significat: quod autem eiusmodi non est, tanto peius censetur, quâto magis ab optimo abest. Has duas sputorum differentias, ut sunt natura distinctæ, ita nominibus medici distinxerunt, sicut Galenus libr. 1. de Crisib. annotauit. Quod enim optime concocti spuri, notas gerit, *πύλον*: quod vero sanguine aut altera bile respersum mistumve fuerit, aut spumofum aut aliter vitiosum, *πύσμα* potius dixerunt.

*Πύρις*, vitium est oculi quod alio nomine magisque medicis vitato *φθάγγωσι* appellatur, ut scribit Aetius lib. 7. cap. 68.

*Πυγμα*, mensura est sex digitis breuior quam cubitum, quod à Græcis *πυγίς* appellatur. Est autem spatium quod est à cubito ad digitos clausos, sicut exponit Pollux. Nam quæ ab eo ad digitos inflexos est, *πυγίς* appellatur. *Πυγμαί* Pygmaei dicti sunt, ut author est Eustathius Homeri interpres.

*Πυγίς*, mensura est quatuor digitis breuior quâ cubitum, quod à Græcis *πυγίς* nuncupatur. Est autem spatium quod est à cubito usque ad extremam manus partem cum digiti inflexi fuerint, sicut exponit Hesychius. vide supra *πυγίς*.

*Πυγίς*, nates, quæ & *γλουτὶ* dicuntur.

*Πύλος*, à quibusdam dicitur *πύλας*.

*Πυρμαίνω*, apud Hippocr. sect. 2. *τὸ πᾶσι διαίτης ὀξέων, ἀντὶ τῶν οὐδ' ὄλων*, nullo modo. sumptum nomen à fundo valorum, sonatque perinde ac *ὀλοκαύρωσις*, *πύλεις*, *πυρμαίνωσις*, *ἐλαργίς*, *πυρμαίνωσις*, hoc est prorsus, perfecte, omnino, ut scribit Gal. *ἐν τῇς γλώσσῃς*.

*Πυρρακίον*, herba est nobis incognita, quæ constat cruce foliis, acrioribus, scabris & crassius, caule quadrangulo, flore ocimi, semine marrubii, radice nigra aut pallida, rotunda exigui mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxosis locis.

*Πυρρὸν*, densum. duobus modis dicitur, vno proprio, quod meatus per totum paruos obinet, ut silix & marmor, sicut è diuerso *ἀραιὸν*, hoc est raram, quod eosdem magnos habet, altero autem per metaphoram siue abusum de coacto dicitur, siue cōpacto, ut & raram de laxo: hæc enim ratione aquam & terram densas, aerem & ignem raros dicimus, scilicet ad elementa ipsa translatis appellationibus, quæ tamen & vnita sunt, & ex similibus natura partibus constant, nec villos eiusmodi meatus sortita sunt. Ac quoniam quod densius quidque est, eo etiam durius esse animaduertitur, factum est ut *πυρρὸν* aliquando pro duro dicatur. Inde *πυρρὸν δέσμιον φλέβας* apud Hippocratem lib. *πᾶσι γυναικὶς διαίτης* vo-

catur duræ & quæ minime distendi possunt, ex omnium interpretum sententia. Sed & Galenus annotauit comment. 3. *ἐν τῇ πᾶσι διαίτης ὀξέων*, indifferentem fuisse apud veteres vsum nominum *πυρρὸν καὶ τὸ γῆρας*: ut quod *πυρρὸν* sit, *γῆρας* fieri ab ijs dicatur.

*Πυρρὸς σφυγμός*, creber seu frequens pulsus. Dicitur quando breue tempus est inter diastolen & systolen, siue, ut definit Paulus, cuius media quies paruo durat tempore. Sumitur hæc differentia à tempore quietis, seu à quantitate temporis quietis. Huic oppositus est *ἀραιός*, hoc est rarus pulsus. Hic neque validæ neque imbecillæ facultatis est proprius, vtrique enim accidit. Nam si facultas valida est, calorque multum increuerit, adeo, ut maximus pulsus fiat: si arteriæ distensio tantâ fuerit, quanta maxima esse potest, sed quæ tamen tanto calori refrigerando non sufficiat, tunc necessario cum magnitudine celeritatem atque etiam frequentiam inducet, ut id quod vna diastole non potest, pluribus consequatur, sicut ante de magnò pulsu dicentes annotauimus. Id quod etiam ex ira & balneis calidis pulsus ostendunt, qui cum magnitudine & vehementia habent etiam frequentiam. Sæpissime tamen fit creber pulsus ab imbecillâ facultate, cui crebritas peculiaris est non aliter, quam celeritas validæ. Ut enim motus omnis, ira & pulsus creber ex defectu & facultatis impotentia euadit, cum scilicet vsui impar est neque eum assequitur. Quod enim vno motu non adipiscitur, id pluribus cogitur supplere, quemadmodum ipsa respiratio interdum manifesto docet.

*Πυρρὸσις*, densitas, condensatio. Est obstructio meatuum corporis, facta à refrigerantibus, adstringentibus & siccantibus. Sed & calidior aqua, ut ait Galen. 7. meth. med. cutim densat, eam vrēns & contrahens. Id quæ efficiunt, *πυρρὸσις* appellatur, sed largius paulo sumpto nomine quo *στυγνότης* etiam continentur.

*Πυρρὸν φάρμακον*, densantia siue condensantia medicamenta. Dicuntur ea quæ poros contrahunt, frigida sunt & aquea, sed non terrea neque aerea, ut quæ *στυγνότης* proprie appellantur, quibus vis inest vasorum oscula claudendi. Vt enim sine differunt inter se (hæc enim vasorum officina cōhibent & sensibiles excretionēs supprimunt: illa vero corporis poros densant & insensibilem transpirationem retinet) sic & facultatibus. Est enim *τὸ στυγνὸν* magis terreum & adstringens, *πυρρὸν* autem magis aqueum. Itaque debilius & contrahit & constringit propter molliem. Quippe quicquid valenter constipat cōstringitque, robur quoddam renitens & durum habeat oportet, quo cum careant medicamenta naturæ magis aqueæ, tenuēs quidem poros in vnoquoque corpore contrahunt atque condensant, cæterum instrumentum vndiquaque totum con-

stringere nequeunt. Huius generis est aqua frigida, semperuium, portulaca, tribulus viridis, psyllium, myosota, lenticula palustris, & omnia breuiter quæcunque refrigerant, sed non adstringunt. Opponitur τὸ πικρὸν τῇ ἀραιωτικῇ, sicut τὸ στυγερόν τῇ ἀναισθητικῇ.

**Πικτή.** dicitur lac coagulo concretum, cui dempto sero mel additum est. Ventrem subducit, maxime si serum adiectum fuerit.

**Πύλας, ἡ**

**Πύλας ἥπατος.** dicuntur portæ hepatis, seu pars summa hepatis. Ex hoc vena illa magna, quæ à summa parte hepatis exoritur, ἡ ὅτι τῇ πύλῃ, vel μετὰ τὴν ὅτι πύλῃ, appellatur. quam etiam rationem sequuti anatomici Latine venam portam appellant, rectius, opinor, si venam portæ dixissent. Est enim hac parte ingressus chyli in iecur, sicut in gibba sanguinis ex eo egressus.

**Πυλὸς.** est meatus inferior ventriculi per quem excrementa è ventriculo in intestinum emittuntur. Cum enim ima ventriculi pars paulum in dexteriores partes conuersa in summum intestinum coartatur, iuncturam hanc *πυλὸν* Græci vocant, quoniam portæ modo in inferiores partes ea quæ excreturi sumus remittit. Sunt autem ea primæ concoctionis in ventriculo peractæ excrementa, liquida quidem & facile dilabentia, nisi intus clauso pyloro retinerentur. Quia in re parem habet cum ore vteri functione: ambo, enim pariter clausa continent, quod appetitæ remittunt. Eam ob causam pyloros angustior multo factus est quam os ventriculi superius quod *στόμαχος* dicitur. Ad eum è bilis vesica, vt scribit Gal. lib. 6. de anat. administ. meatus dirigitur, bilem in fundum ventriculi emittens.

**Πυλάκιστος.** à quibusdam dicitur ὁ σκόλυμος, vt habetur apud Dioscor. item arbor, quam *λυκίον* proprie vocant.

**Πύζος.** nomen collyrii apud Celsum lib. 6. capite 6.

**Πύξις.** nomen est vnguenti acopi cui præcipua vis est emolliendi. Valer autem ad omnes inflammationes. Sic dictum est quod in vase buxæ optime seruietur. Describitur à Paulo libr. 7. cap. 19. & ab Aetio libr. 13. sed diuersis paulo ponderibus.

**Πύξος.** buxus arbor est nota, ligni pallore atque duritia, mali proceritate, folio myrti, exiguo, concavo, subrotundo, fronde perpetua, rotundario vsui accommodatissima ac consili, flore herbaceo, semine rufo, ac rotundo, omnibus animantibus inuiso. Nullus eius in medicina vsus.

**Πύος.** pus. Est humor putris, partium spermaticarum substantiæ magna ex parte assimilatus. Humorem esse sensus ipse ostendit, quod in modum humoris diffuat. Nec vero humor tantum est, verum etiã ex humore habet originem, qui in partem inflammatione laborantem decumbens & per inania eius spacia diffusus, occlusis vndique meatibus

perspiratione intercepta cōputrescit, perinde atque alia omnia, quæ perspirati carentia & alieno in loco vehementius incalescunt. At non semper par est putredinis modus. Si namque natuius partis calor valde imbecillus est, humor permultum putret, omniaque à natura plurimum aliena nascitur, foetorem, nigredinem & substantiæ inæqualitatem. Sin autem robusta sit facultas concoctrix, eiusque calor vegetus, parua admodum putredo fit, & minimus qui putredinē sequi solet, foetor. Vitari tamen in totum putredo non potest, etiam si valida partis eius facultas concoctrix eum humorem qui in parte inflammata computrescit, conetur omnibus modis in substantiam partis spermaticæ conuertere. Id enim ne assequatur, calor præter naturam in humore putrēte iam conceptus impedit. Quia in re causæ duæ vna secundum naturam, altera præter naturā, inter se certant, quarum quæ superior euaserit, notas suas in pure imprimit, suamque virtutem odore, colore & consistentia testatur. Si namque pus album, læue, æquale, & minime foetens euasit, concoctricem eius partis facultatem, caloremque natium validū esse significat, qui humorem iam putrētem in partis spermaticæ substantiam prope conuerterit. Spermaticæ autem partes dicuntur, quales sunt vasorum tunicæ, membranae, ossa, ligamenta & similia: quæ quoniam alba sunt, eum quoque humorem album efficiunt, atque etiam crassiores reddunt, tanquam futurum sibi alimentum coquendo in crassarent. Quod si idem humor in pus conuersus, multis diebus sibi similis perseveret, constantem facultatem declarat, sicut læuis & politus, nullaque aliena & dissimili materia variegatus sed vnitus, ostendit concoctricis facultatis robur. Pus quoque quanto minus foetet, vt & vrina, & sterqus, & sudor, tanto præstātius est, sicut supra ostendimus, & apud Galenum habetur primo cōment. in prognost. vbi scribit Hippocrates, Pus optimum censerī albū, æquale, læue, & quam minimum foetens, pessimum vero huic contrarium. Qualis autem est in parte inflammata sanguinis in pus mutatio, talis est humorum in visis atque etiam extra vasa coctio. Id quod animaduertēs Galenus semen puri simile esse dixit, nisi quod à sola secundum naturam causa oriatur. Et Erasistratus id quod in febricitantium vrinis subsidet, non puri comparauit, sed merum pus esse credidit. Quod enim in partibus inflammatis pus est, idem in visis videtur in vrina subsidere per febres. Cum enim febrilis accessio nō aliud sit quam humoris putredo, neque ante desinere soleat, quam quicquid cōputruit, vacuati sit, iecirco natura per vigorem accessionum expiratione & contractionibus arteriarum vacationem fuliginosi excrementi molitur. Ac quod tenue quidem est, hac ratione facile expellit: quod vero veluti cineritium est, non perinde propter crassi-



crassitiem vacuare potest, sed per maiores quosdam meatus educit. Ex quo sequitur vrinæ hypostasim maxime per febres, pus esse vel puri admodum similem, quod portio sit humoris qui per febrem computruit, eamque natura conata sit partium spermaticarum substantiæ assimilare, nec tamen præstare potuerit. In hac enim non aliter quam in phlegmonarum pure, decertant inter se duæ causæ, vna secundum naturam, altera naturæ contraria, quarum vtraque notas sui certas exhibet. Vt enim nullo adhuc in phlegmonis facto pure causa præter naturam superior est multis numeris, sic nulla in vrinis hypostasis summam cruditatem significat: rursus vt in pure optimo calor natiuus præualeat, ita hypostasis alba, lauis & æqualis, calorem natiuum vincere ostendit, eoque magis quo candidior, leuior & equalior fuerit. De sanorum vrinis aliud forte iudicium est. pueris enim & mulieribus, & ijs qui in ocio vitam agunt, & qui plus æquò edunt, subsidere solet plurimum excrementi, quod quia nullius adhuc putredinis particeps fuit, nemo puris nomine donandum censuerit. Id enim crudus succus, non pus iure dicitur. In sanguinis enim generatione refugit quidem naturæ concoctionem, atque ideo crudus succus dici potest, non tamen causæ præter naturam particeps fuit, sicut pus, & ea quæ in vrinis febricitantium subsident. Ac quāquam hic puri admodum similis videatur, multis tamen noris à pure distinguitur, vt Galenus docuit lib. 1. de aliment. facult. agens de tritico.

**Πουλιόν.** instrumentum chirurgicum quo pus trahitur. Adhibetur præsertim sinibus & aliis cauis vlceribus à quibus pus non facile excidit. Quale id fuerit non est mihi notum. Constat tamen foramen habuisse ex lib. 2. Galeni ad Glauconem de sinuum curatione, & ex lib. 2. πῶν κ' ἔχον. forte idem fuit cum chirurgorum organo quod nunc syringam vocant, per quam vt aliquid infunditur, ita facile attrahitur.

**Πῦρ ignis, febris.** Dicitur ab Hippocr. more suo febris vehementissima, vt scripsit Gal. comment. 3. lib. 1. Epidem. quasi non aliam habeat naturam quam ignis, & eiusdem sit cum igne substantiæ. Est enim duabus ignis qualitatibus prædita, caliditate scilicet & siccitate.

**Πῦρ ἀγέλον.** πῶ ἐρεπτείας, apud Hippocr. vt explicat Galenus ἐν ταῖς γλώσσαις.

**Πύρεθρον.** herba foliis cauleque vt daucum sylvestre & fœniculum, umbella anethi, circinata rotundifolia, radice longa, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Herbarii pedem Alæxandri vocant. Radix eius vrit dentiumque dolores leuat.

**Πυρετός.** febris. Variis modis diffinitur à Galeno: Calor præter naturam totum corpus occupans: calor præter naturam in corde existens: calor immodice auctus, vt & hominē offendar & actionem lædat: calida intempe-

ries in totum corpus diffusa: & calor natiuus versus in ignem: à quo quidem calore igneo πυρετός Græcis dicitur, vt Latinis à feruore febris. Genere quidē intemperies est, habetque substantiam in calore præter naturam positam, non modo intensiōe sed genere etiam diuerso à calore natiuo. Sola quidem intensiōe in hæcticis & diariis videtur differre, sed in putridis toto genere. Hic in corde primum concepitur, tanquam in primo febrium subiecto, indeque per arterias in corpus vniuersum facile spargitur. Neque enim solum cor febris subiectum est, sed reliqui pariter corporis spiritus, vel humores vel solidæ partes. Sunt autem febrium multiplices differentiæ, quas omnes Hippocr. vt ait Gal. breuiter complexus est lib. 6. πῶς ἐκδημῶν his verbis, Febrium hæc quidem manū sunt mordaces, hæc vero mites: hæc autem nō mordaces quidem, sed post insurgentes: aliæ vero acutæ, sed quæ manui succumbunt: aliæ sunt statim exardentes, quædam semper pusillæ siccæ, quædam saluginosæ, quædam flatibus plenæ, aspectui graues, nonnullæ ad tactum humectæ, nonnullæ vehementer rubidæ, aliquæ vehementer pallidæ, aliæ liuidæ, & alia eiusmodi. His enim verbis præcipuas febrium differentias comprehendit. A caloris quidē substantia, vel eo quod calori maxime proprium est, alia δεινόςδης mordax, alia τερνόςδης mitis dicitur: illa quidē quod manum medici thoraci maxime impositam perpetuo mordet, hæc quod minus mordax sit. Siquidem omni & prope soli calori semper conuenit mordacem esse aut mitem. Ab eiusdē caloris motu, alia ἐπασσίδους, alia ὀξύς πυρετός increescens & acuta febris, illa quidem, cum calor initio minus mordax, postea manu diutius immorante, acrior & mordacior sentitur: hæc vero, cum initio acrior & mordacior, longiore manus mora mitefcit, minusquē mordet. A materia siue à subiecto caloris in quo ipse accenditur, alia ἐφήμερος, hoc est diaria, quam Hippocr. πμφυγέδης, hoc est flatuosam, appellat, quæ in spiritibus inflammatis consistit, alia ἐξλεκτὴ, quam & δεινὸν ἰδὺν πυρετὸν Hippocr. videtur appellare, quæ in solidis partibus accensis est, alia νοτιάδης siue humida, quæ est in subiecto humore, vel sanguine, vel pituita, vel bile vtraque. A propinquo febris seu potius materiæ febrilis accidente, scilicet colore, alia ἐξερυθρός, hoc est rubens, cuiusmodi sanguinea est, vt synochi: alia ἐξωχρός siue pallida, vt quæ à multa bile flaua: alia πάλως, id est liuida, vt quæ est à pituita, aut humore vsto. Quibus quidem differentiis etiam aliæ permultæ addi possunt. vt ab accidentibus quæ febris habet magis propria, ἀγέλον καὶ συνεχές, intermittens & continua, & ex intermittentibus ἀμφημερὲς, τεταπτός, πεπραπτός, quotidiana, tertiana, quartana siue vera, siue notha, siue simplex, siue complexa: ex continuis vero ἡμτεταπτός, καυστός, κρυμνόςδης, τυφνόςδης, λαμψόςδης, ἐλεώδης, ἡπίαιος, στυγ-

χρῆσι: à parte affecta ἡπατικός, σπληνικός, πνευμονικός, σινοεργικός, ἰκτερός: à symptomate ερεπτικός, κοματικός, χαρπαστικός, λιθαργικός. Diuidit quoque febres quandoque Galen. per alias differentias, vt in tam quæ per se consistit & in symptomaticam: aliter in eam cuius causa adhuc est febre facta, vt putridam, & in eam cuius causa iam desit febre excitata, vt diariam & hecticam: aliter in eam quæ est ἐν χρεσὶ, seu ἐρεπῶ, quæ facili soluitur, vt diariam & putridas biliosas, & hecticam incipientem, & in eam quæ ἐν ἐξῇ siue ἐκπῇ dicitur, quæ difficillime soluitur, vt putridam pituitosam & hac magis melancholicam, & omnium maxime hecticam iam absolutam & μαρμαρώδη. In qua quidem diuisione hecticæ nomen latius parer, quam vbi contra diariam & putridam diuiditur. Sed de hac & reliquis pariter febrium differentiarum seorsum agitur suis locis. Verum ex omnibus medici eas maxime persequuntur quæ sumuntur ab ipso caloris subiecto, vt dictum est, triplici, quod tribus his nominibus designauit Hippocrates, vocans continentia, contenta & imperum facientia: febris enim omnis in aliquo horum trium accenso consistit, & alias ex alio incipit, & ab vno profecta sæpe alia duo intrat: sæpe vero tria hæc febrium genera, vt in hecticis, sapissime duo, vt in putridis simul miscentur. Nulla enim fere hectica est, in qua & humores & spiritus simul accensi non sint: nullaq; omnino putrida, quin & spirituum inducat inflammationem. Verum nomen accipit febris fere ab eo quod primum incensum est, vt accensis primum humoribus putrida dicitur, & accensis principio solidis partibus, hectica. Trasse habet: & de diaria. Interdum tamen vbi transitus fit de miri in magnam, insignioris nomen alterius appellationem inducit: vt dum diaria transit in putridam, etiam si in hac spiritus maneat incensum, tamē solum putrida nominatur. Quod si putrida transit in hecticam, hectica dicitur, nisi etiam putredo adhuc perseueret. Tunc enim quia ambæ sunt insignes & periculosæ, vtriusque nomen retinetur. Ob id Galenus lib. 10. methodi scribit se hecticam cum putrida complicatam deprehendisse. Cum autem admodum variæ causæ sint, externæ præsertim, à quibus febres accenduntur, omnes tamē summis quinque generibus comprehenduntur. Primum est vehemens motus tū corporis, vt labor & exercitatio: tum animi, vt cura, ira, moeror, & eorum similiter quies immodica. Secundum putrefactio, seu à calore externo & alieno in humore nō diffuso corruptela. Tertium suppressio calidi effluuii, seu fuliginosi excrementi. Quartum contactus externi caloris, vt ignis, solis, aut corporis febrientis. Quintum vero permixtio calidæ substantiæ, vt alimentorum acrimium, salforum vel malignorum. Siquidem à causa earum aliqua tum febres omnes, tum maxime diariæ excitantur.

Πυρετώδης. θερμὸς, apud Hippoc. vt καὶ λίαν πυρετώδης, ἢ θερμώτατος, hoc est, venter febriculosus, is qui calidissimus est.

Πυρεῶν, sic dicitur specilli pars altera minor, in nuclei modum rotunda, quam chirurgi ad vsus diuerfos adhibent. vide μύλην. Significat etiam apud Hippocratem τὸν χόνδρον, hoc est granum, diciturq; de thure, vt annotat Galenus ἐν ταῖς γλώσσαις.

Πυρλωειδὴς ἀπόφυσις. est processus secundi spondyli ceruicis, altus, durus, solidus, è superiori interna mediaque eius sede erumpens, sursumque spectans. Est autem secundo spondylo proprius. Per eum cum primo spondylo & cum occipitis cavitare inter suas apophyses χάρωνιδες per diarthrosim iungitur, & valido quodam rotundoque ligamento occipiti alligatur, eique locum cui apte & tuto affirmetur & stabilietur præbet spondylus primus, ipse quoq; ligamentum quoddam transuersum producens, quod illi apophysi intrusini jicitur. Subit enim hic processus in cavitatem primi spondyli. Ad eo caput inflecti & extendi, quod ἀπενεύειν καὶ ἀνανεύειν Græci dicunt, Galenus existimauit. Sic dictus est à nuclei similitudine: alii à nucæ pinea χονοειδὴ vocarunt. Hippocr. ἐόντα appellauit: alii vero ἰδονταειδὴ.

Πυρεῖα ἢ

Πυρεῖα μία. fœtus. fomentum. Id dicitur quod corpori admotum, ipsum quouis modo excalfacit. Generalis hæc quidem significatio est, secundum quam & ipsa cucurbitula affixa, & vapor per arundinem exceptus in fomentum generis continentur, vt patet ex Apollonii verbis, quæ lib. 3. τῶν χυμῶντος Galenus recitat ad aurium dolorem. Dicitur enim πυρεῖα ἀπὸ τοῦ πυρός. Sunt autem fomentum multiplices differentia: alia humida, alia sicca sunt, vel ex vtriusque mista. Humida vel actu vel potestate dicuntur: conueniunt phlegmonis quæ à biliosiore succo factæ sunt. Sicca similiter vel actu eiusmodi sunt, vel facultate: phlegmonis opitulatur quas tenuis & aquosus sanguis excitauit. Omnia calida sunt, nulla frigida. Proinde fomentum omne cutem rarefacit & facile transpirabilem reddit, sanguinemque in inflammationibus attenuat atque discutit. Alia præterea mordentia sunt, alia morsu carentia, vel ex ijs mista. Illa extenuant, profuntque crassis & viscosis humoribus, hæc vero acribus & mordacibus. Quoniam vero fomenta calore suo foras humores attrahunt, iccirco non ante totius corporis vacuationem illis vtendum est. Nam quæ redundant in corpore superflua, eorum vsu trahentur potius in partem affectam quam discutiantur. Cæterum fomentum materia varia est, & modis variis adhiberi potest, per spongiam, per lineum, per pannos, per vitem, per vesicam, per vas æneum vel testaceum, per cucurbitam, per ollam, per arundinem: quorum exempla passim apud Galenum occurrunt.

Πυρεῖα.

**Πυρίλας.** significat apud Hippocratem *πυρὶ δαπύροις καὶ χαλκίαις*, ἢ *ἐρύμματι δάκνη ἀπὸ πυρίλας σιδήρου*: hoc est, inguitos filices, aut frustra ardētia quæ ex ferri scōria decussa sint: vt scribit Gal. c. πύρι γλώσσας.

**Πυρίαν** ἢ

**Πυρίανθρον γάλα.** dicebatur à veteribus, vt scribit Aetius, lac quod postea *πυρίανθρον* appellatū est, quod scilicet calido cinere calfactum, citra coagulum statim concreuit. additur autem mel, quod alias ægre concoquatur & tardius transeat, succumque gignat crassiorē. Apud Gal. lib. 3. de alim. facult. *πυρίανθρον* legitur pro eodem.

**Πυρίαν.** suffusus, apud Hippocrat.

**Πυρίανθρον.** emplastri nomē ad inducendam cicatricem cōparati, apud Gal. lib. 2. *πύριον ἔλκυσμα*.

**Πυρίανθρον.** ambustus. Is dicitur, inquit Gal. lib. 1. *πύριον ἔλκυσμα*, qui in aqua feruenti vltus fuerit. prodeunt primum bullæ, deinde phlegmone & vltus nisi lenibus emplastris & sine morfu exiccantibus nec calidis nec frigidis, sed temperatis protinus succurratur.

**Πυρίαν.** nomen emplastri ad duritias & scirrhos, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 17. *πυρίαν* à quibusdam dici. *πύριον ἔλκυσμα*, author est Dioscor. lib. 1.

**Πυρίαν.** significat quidem lapidem omnē à quo ignis chalybe excuti potest. sic tamen dicitur *κατ' ἐξοχὴν* certum quoddam genus lapidis quod in omnium fere metallorum fodinis genere & colore diuersum reperitur. Nam eius metalli magna ex parte colorem præ se fert, quod plurimum intra se continet. Præfertur quidem à Dioscoride qui æri similis est & à quo æs conflatur, plarumque; tamen autēis argenteisque venulis resperisus est, quod non modo æs, sed aurum etiam & argentum intra se habeat. Continet aliquādo & plumbum & ferrum & alia quædam metalla, modo plura, modo pauciora, in quæ facile per coctionem resoluitur. Reperitur tamē interdum sterilis, & nihil aliud quam lapis. Inuenitur & pyrites in medio soryos & melanteriæ veluti nucleus quidam, ab ijs vndique comprehensus. Hic pyrites ærosus atque etiam chalcites dicitur. Commendatur pyrites in medicina, tum crudus, tum coctus. Cremandi rationem Dioscorides explicauit, scribens sic crematum à quibusdam *διφρυγίς* appellari. Vocatur pyrites quasi ignarius lapis, quod ad chalybē allisus scintillas statim edit. Officinæ cum Arabibus Marchesitam vocant.

**Πυρίανθρον.** dicitur homo qui valde calet, vel qui febre ignea & ardente flagrat, vsurpatur hoc nomē ab Hippo. c. *πύριον ἔλκυσμα*, sect. 4.

**Πυρίαν.** triticum. quid sit notum est. Calscit primo ordine, inter siccantia & humectantia medium est: habet etiam quiddam glutinosum & obstructorium. Elixum coctū difficile est & inflat, concoctum autem alimentum præbet valentissimum, ceditque in panificia maleficiorum supra dictorū experts, si fermenti salisque modicum habuerit.

**Πυρίανθρον.** dicitur à quibusdā *ἡ χαμαία*, vt habetur apud Dioscoridem. quanquā non recte *ἡ χαμαία*, sed potius *ἡ θυμολαία* sic appelleretur, vt doctis placet. nec enim dubium est ab vrēdi facultate sic dici, quasi ignis stipulam. siquidem *ἡ θυμολαία* egregie vrit.

**Πυρίαν.** rufum. sic dicitur quod ad flauum proxime accedit, sed tamen eo albidius est: flauum enim magis ad splendidum vergit. Itaque bilis quæ albidior turbidiorque est, rufa: quæ vero splēdens puraquē est, flaua dicitur. Quod enim in bile veluti igneum splēdet, eam reddit flauiorē. Quanto vero flauo rufum est albidius, tanto pallidum illo. Quāto rufus minus album est flauum quam rufum, tantō rubicundum flauo. Est igitur rufum colore medium inter flauum & pallidum, sicut pallidum medium est inter flauum & album, quemadmodum postea dicemus in dictione *ἀργύριον*.

**Πύριον.** coagulum. Est lac caseosum in ventriculo animalium lactentium concretum. Coagulum enim, vt inquit Aristoteles, lactis substantia est, quippe quod in eorum ventriculo quæ adhuc lactent, contineatur. Est ergo coagulum lac, ignem habēs intra sese, quod cum animalis calore cōcoqueretur, caseum traxerit. Proinde omne acre est & digerentis potentia, atq; etiam exiccat. Aristoteles hinnuli coagulum, Galenus leporis omnium esse præstantissimum asserit. Creditur omne coagulum sistere sanguinis profluuium, & quo vetustius coagulum fuerit, eo præstantius tali profluuiō mederi: ad reiectiones tamen sanguinis è thorace coagulum adhibere Galen. semper reformidauit, propter eius acrimoniam. Aristoteles lib. 3. de hist. animalium, *πύριον* appellat.

**Πύριον.** idē quod *ὄνομα*, vt scribit author diffinitionum medicarū. est autem puris collectio in nigro oculi, cū phlegmōne, iuxta irident. Verum Aetius paulo aliter. Nam cum *πύριον* oculi affectum esse statuat, in quo pus collectum sit, distinguit tamen in duas species *ὄνομα* & *ὀφθαλμία*: lib. 7. cap. 30.

**Πύριον.** barba. pars est viri, eo iā perfectō in mēto proueniēs. Vnā enim est ex ijs partib⁹ quæ *ὀφθαλμία*, hoc est postgenitæ partes, appellantur, quales sūt dētes & reliqui in corpore pili. Oritur autē non primis quidē annis, sed tardius, quū videlicet humores paulo calidiores & sicciores esse incipiunt. Est enim barba & pilorū reliquorū cōmunis quidē generatio, nisi quod ad ortum barbæ humorem oportet esse calidiorē & sicciorē, ideoquē omnium pilorum postrema prouenit, & in solis viris, quoniam mulieribus nō tantum caloris & siccitatis inesse potest quantum ad generationem barbæ expedit. Ea quanquā menti proprium temperamentum significet, ad eam tamen excitandā totius corporis temperies plurimū facit: hinc enim fit vt eunuchis nulla omnino sit, quod exactis testibus refrixerit totum corpus & humidius euaserit. Cæterum Græci in bar-

ba designanda variis vñ sunt nominibus. πώ-  
 ρος quidem barba dicitur quæ toto mento  
 succrescit virilitatis ac roboris argumen-  
 tum. προρρίσιος barba anterior quæ proger-  
 minat ante inferiorem, quæ alio nomine  
 ὑπορρίσιος dicitur, quod sub naribus nascatur.  
 ὑπὲρ ὀφθῆος superioris labri barba est. quanquam  
 sunt, ut ait Coelius, qui eo nomine labrum  
 signari putent. ὑπὸ ὀφθῆος, ut idem author est,  
 barba dicitur circa vtrumque labrum emer-  
 gens. πώριος barbitrium dicitur inferiori la-  
 bro adnascens. ῥόδος lanugo, prima barbæ  
 productio, ut scribit Didymus. ἰούλος prima  
 genarum lanugo, quæ per malas serpendo  
 non aliter quam ἰούλος vermis se conuoluit:  
 vocatur etiam ἰούρος.

Παροκάλυς. est ramex callosus siue tophus in te-  
 sticulo aut in membrana erythroide cōcre-  
 scens, multum renitens, durus & inæqualis.  
 His notis ab hydrocele & sarcocele distin-  
 guitur, ut scribit Paulus lib. 6. cap. 63.

Περὶ ὀμφῆος. topi concretio in umbilico.

Πῶρος, callus. Est corpus durum, siccum, albū,  
 ossa fracta coniungens. Nam quoniam ossis  
 fracti partes inter se coalescere nequeunt  
 propter siccitatem, natura eas callo circa o-  
 ras fracturæ cōcrescere, quasi vinculo quo-  
 dam colligat. Est autem huius ortus ex ali-

menti fracti ossis excremento, in labris ipsius  
 ossis concrecente. Dum autem singulæ fra-  
 cti ossis partes suum proferunt, initio qui-  
 dem cum adhuc viscosum molleque est, si-  
 mul miscetur & vnitur, mora que temporis  
 ab ipso osse proximo & contingente immu-  
 tatum simile ossi euadit, hoc est durum, sic-  
 cum atque album. Habet igitur callus hoc  
 cum aliis partibus cōmune quod ex materia  
 fiat, & à natura generetur: non enim cum a-  
 liter ex nutrimento natura quam alias par-  
 tes gignit: sed illi peculiare est quod ossi si-  
 milis sit, os tamen non sit.

Πῶρος etiam dicitur substantia quædam  
 crassa, lenta, dura, quæ aliqua in parte præ-  
 ter naturam concreuit in modum calli, ut  
 sæpe fit in articulis, & aliquando in pulmo-  
 ne: qui ab ossium callo differt, quod hic na-  
 turæ opus sit, & quodammodo secundum  
 naturam sit, quod aliter pars restitui nō po-  
 test: ille vero morbus sit (quem aliqui suo  
 nomine πῶρασιν vocarunt) quippe qui præ-  
 ter naturam habeat tum causam tum gene-  
 rationem. Nascuntur huiusmodi calli & in  
 oculis & in fistulis aliisque vlceribus atque  
 etiam in cute, tolliq; medicamentis debent,  
 cum calli ossium non modo gigni debeant,  
 sed studiose etiam conseruari.

## IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

TO P.



quod aliqui ῥήον, Lati-  
 ni Rhaponticum vo-  
 cant, planta quædam  
 est radice insignis, ni-  
 gra, centaurio magno  
 simili, sed minore.  
 magisque rufa, fun-  
 gosa, aliquantum læ-  
 ui, sine odore. Nomen habet ab amne qui  
 Rha dicitur, in cuius ripis radix ea gignitur.  
 Plurique eam cum rhabarbaro eandem ef-  
 fe crediderunt, inter quos est Ruellius: alii  
 vero longe diuersam, ut Matthiolus, cui ego  
 potius assentior.

Ῥαβδονδης ραφή. sutura recta capitis. vide ὀβελία  
 ραφή, cum qua eadem est.

Ῥαβδης, fissura. sunt ani vlcuscula oblonga: di-  
 cuntur & rimæ, quibus ani musculus veluti  
 profissus est, non aliter quam labra quan-  
 doq; & manus ex vehementi frigore. Fiunt  
 plarumq; ab acris humoris affluxu, interdū  
 autem propter cōdylomatium inflammationem  
 & distensionē rumpitur cutis, rimæq;  
 eiusmodi emergunt. dicuntur & à veteri-  
 bus quibusdam ραῖες. Plinius fissā appellat.

Ῥαγίστα. ἄστρος ὀρμήσασα, hoc est, affatim & cum  
 impetu erumpens, apud Hippocr. sicut Gal.  
 ἐν ταῖς γλῶσσαις annotauit: à qua quidam signi-

ficatione ἡ αἰμορραγία dicta est.

Ῥάγες, dicuntur, ut ait Rufus, extremi digitorū  
 fines, qui & καρφαὶ vocantur.

Ῥαγέλαι. vsurpāt Hippocrates ἀπὸ τῆς ἀστρος ὀρ-  
 μήσας, id nomen vacuationibus magnis &  
 confertim factis accommodans, ut eo Aphor.  
 γυναικὶ αἷμα ἐκκινῶσιν, τῷ κατὰ μὲν τὸν ραγέλαιον, λυ-  
 σις, hoc est, mulieri sanguinem euimenti,  
 menstruū erumpentibus solutio.

Ῥαγδης χητὼν. vñea tunica. Est oculi tunica cor-  
 neæ subiecta & anteriore quidē oculi parte  
 humorem ὕδατος, posteriore vero tuni-  
 cam ἀμφιβληστροειδῆ proxime comprehendēs.  
 Ducit originem ex tenui cerebri meninge,  
 quæ vnā cum nervo optico ad oculi cōstru-  
 ctionem concurrat: ex quo quidam etiam  
 χοροειδῆ illam appellatūt. Dilatata enim & so-  
 luta tenuis illa meninx circulo oculum am-  
 bit, totaque sphaerica est nisi vbi ad pupillæ  
 locum accedit. Eo enim loco leniter cōpri-  
 mitur, atque media ea parte qua comprimi-  
 tur, foramine rotundo peruia est quod pti-  
 pilla appellatur. Dicta est ραγδης quod vñ  
 folliculo, à quo pedunculus auulsus est, quā  
 simillima sit. ut enim ille, ita hæc tunica par-  
 te sui anteriore leuiter compressa est, & in  
 medio ad pupillam perforata. Habet vero &  
 coloris cū vñ similitudinē variis interstin-

Et a coloribus cœruleo & viridi, quibus se defatigatus oculus recrearet. Præterea vero acini vix læuitatem externam, & asperitatem internam æmulatur, vt eam medici recte illi comparasse videantur.

*ῥαβοειδὴς κεμπύλος*, recuruus, apud Hippocr. vt explicat Gal. *ἢ τῆς γλώσσας*.

*ῥαβός*, qui cruribus est intortis, recuruus & contractis: cui crura sunt introsum obtorta: dicitur & *ῥαβός*. Ei opponitur *βλαούς*.

*ῥάκωμα*, sic dicitur Plinio τὸ *ῥά ποδῖον*.

*ῥάμμα*, acia. Hippocr. appellat id quod vna cum acu traijcitur, siue linum sit, siue lana, siue quippiam aliud huiusmodi: vt explicat Gal. comment. 2. *εἰς τὸ κατ' ἰσχυρίον*.

*ῥάμος*, spina alba aut cœnalis: frutex est ramos ferens rectos & aculeos in acutæ spinæ modum: folia parua, oblonga, suppinguia, tenera. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusque foliis constat, & quadamtenus rubentibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusque rigentibus aculeis. Fructum edit larum, candidum, tenuem follicularii specie, verticillo similem. Siccat secundo, refrigerat primo excessu. Galli burgam spinam appellant.

*ῥαντῆρες*, sic à quibusdam dicti sunt oculorum anguli naso proximi & maiores, quos aliqui etiam *ῥαντῆρες* vocarunt, quod lacrymæ ab his maxime stillent. ijs oppositos angulos, qui scilicet ad tempora spectant, *παραπίας* nuncupant.

*ῥάον*, *ἐπιμέτερον καὶ ἐν χερσέτερον*, hoc est paratius & facilius, apud Hippocr. nonnulli tamen *ἐνφορέτερον* interpretati sunt, hoc est, quod facilius fertur & toleratur.

*ῥατήιον*, ab aliquibus *λεορπητέλιον* dicitur.

*ῥαπτόνικον*, vide *ῥά*.

*ῥάπης*, napus, qui *βουναίς* dicitur. scribitur & *ῥάπης*.

*ῥαφανίδιον χάρισμα*, fractura raphani modo facta, sic dicitur, vt ait Paulus, quæ fit oblique secundum crassitiem ossis: quam idem & *σιμυλίδιον* & *καυλίδιον χάρισμα* ὅτι *ὀκάρη* à quibusdam scribit, ex similitudine fractorum cucumerum & cauliculorum. Videtur tamē Galen. τὸ *ῥαφανίδιον* ἀπὸ τοῦ *καυλίδιον* distinguere libr. 6. meth. med.

*ῥαφανίς*, sic dictum est alterum genus iridis Illyricæ, inquit Plinius, à similitudine radidis. Quæ cum sit etiam cum astragali radice eadem, ideo *ἀστραγάλις* pariter dicta est.

*ῥάφανος*, radix, siue radícula, quo nomine syluestris maxime intelligitur, quam Romani armoraciā vocant. Eius folia satiuæ similia sunt, sed magis lapsanam imitantur. Radix autē ipsa gracilis, tenera & subactis est. Tam folium quam radix in olera recipitur, sed hæc calefacit excessu tertio, siccat secundo. Ac quanuis sic tota planta appelleretur, Dioscorides tamen author est sic eius radicem à Græcis vocari.

*ῥάφανος ἀγρία*, sic dicta est à quibusdam

herba quæ alio nomine *ἀπὸς* vocatur, vt Plinius author est.

*ῥάφης*, napus, qui *βουναίς* dicitur. scribitur & *ῥάπης*.

*ῥάφη*, futura est species *συναρθρώσεως*. Est autem ossium compositio quædam confusus rebus similis, vt in capitis ossibus habetur. eā nonnulli volentes explicare, definiunt esse *συντάξιν* ferratam, id est similem coniunctioni ferrarum sese mutuo contrario occurso ingredientium, cum scilicet detatæ vnus partes, in crenas alterius inseruntur. Alii vero definiūt esse compagem ossium ad vnguem factam, vt hic similem ossium compositionem intelligamus, quæ & aliarum rerum est, quæ in vnguem committi dicuntur: cum scilicet gibbæ partes ad vnguium figuram structæ, sinus sibi idoneos subeunt. Talis quidem iuncturæ ratio in vnguibus & digitis & pectinum dentibus inuicem implexis apparet. Talem etiam fabri lignarii omnium firmissimam ac tutissimam quotidie nobis repræsentant, & in caudam hirundinis factam lignorum commissuram appellant, & ligni tuberculum paulatim latefcens, hirundinis volantis caudæ modo, in idoneam & æqualem sibi cavitatem etiam paulatim latefcere arctissime & firmissime inseritur. Non est tamen compago hæc ad futuræ rationem semper necessaria, sed per harmoniam facta synthesis *ῥάφη* dicta est à retentionibus anatomicis. Neq; enim craniorum omnium futuras omnes ferratis exacte compagibus similiter constructas deprehendes, sed aliquando in ipsa ossium syntaxi cernere est, alteri quidem cranio futuram inesse, alteri harmoniam. Ac cum ossa eiusmodi nonnulla à Galeno, vt ipse lib. de ossibus protulit, persæpe frangerentur, imo ita sese ingredientia inuenit, vt illorum compositio futuræ potius similis esset quam harmoniæ. Ob id quæ eas omnes futuras appellare nemini verendum est. Sunt autem cranij futuræ numero septem. Quarum quidem tres propriè vereque futuræ appellantur: *ἑφαιναία*, *λαμβοειδής*, *ὀβυαία*, sunt quæ cranio peculiare, nec vlli alteri ossi communes. Duæ vero supra aures sitæ non veræ quidem futuræ, ideoque *παρασπονδήματ᾽ λεπιδειδῆ* appellata solius etiam cranij propriæ. Aliæ vero duæ cum ossibus genæ superioris & osse sphenoidæ communes sunt, quas non legi proprio aliquo nomine à veteribus nuncupatas fuisse. De illis vide suis locis, & in dictione *κρανίου*.

*ῥάφισ*, τῆς *κέντησις*, hoc est subula, apud Hippocratem, qua istarum rerum artifices quippiam perforantes, foramina lini tractioni apta efficiunt: vt explicat Galenus *ἐν τῶς γλώσσας*. vbi tamen quidam codices habent *ῥάφιδι*.

*ῥάχης*, spina. Est spondylorum viginti quatuor à summa ceruice ad imos vsq; lumbos structura, erigendo curuandoque corpori conueniens. Sic dici quibusdam placet, quod



spondyli parte posteriore sunt *παρασχημαῖοι*, id est spinosi & asperi. Nec nomen est apud Latinos quod *παρὰ* proprie significet. Quā-  
nis enim spina dici possit, spinæ tamen no-  
mine aliud quiddam significatur, spondy-  
lorum scilicet apophysis transuersa & obli-  
qua. Continet igitur *ράχις* totum id spacium  
quod à summa ceruice ad sacrum vsque os  
interiacet, atque in treis partes diuiditur,  
ceruicem, dorsum, lumbos. Quorum ceruix  
quidem spondylis septē, dorsum duodecim,  
lumbi vero quinque constant. Sic os sacrum  
non censetur inter partes *τῆς ράχως*, quod  
spondylos nō habeat solutos in modum su-  
periorum, etiamsi coctione multa laxari &  
dissolui possunt, sed potius sit totius *ράχως*  
basis & fundamentum. Nec tamen absurdū  
fuerit id inter eius partes comprehendere.  
Est autem *ράχις* instar carinæ curua, qua par-  
te maxime vētriculus situs est, cui veluti lo-  
co cedit: quanquam non huius modo cau-  
sa, sed vt flecti corpus commodius possit,  
curua facta est, & pluribus vertebris potius  
quam vna aut paucioribus donata. Est etiā  
tota caua & plena medulla (*νύκχις* *νύκχις* me-  
arus appellatur, & ab Herophilo *σπίλων*, hoc  
est canalis) eiusdem cum ipso cerebro na-  
turæ, atque ab ea per vertebrarum forami-  
na permulta neruorum paria profiscun-  
tur, & in vniuersum corpus abeunt. Signifi-  
cat autem etiam *ἡ ράχις*, vt ante diximus, præ-  
ter hanc vniuersam spondylorum *συντάξιν*,  
particulatim apophyses singulas posticas  
quæ unicuique spondylo insunt, *ἀνὰ ἑκάστην* alio  
nomine dictas. Appellatur etiam eodem  
nomine ea quæ in dorso est omoplatæ spi-  
na, iam inde à basi incipiens, sed primum  
humilis & depressa, deinde sensim elatior  
facta & amplior, donec desinat in acromi-  
um. Id quod declarat Galenus scribens ad  
hunc modū lib. 13. de vsu partium, *καὶ ῥάχις*  
*ἰδίαν ἔχει τὴν τῶν ὀμοπλάτων ἀπέφυσιν*, hoc est, &  
spinam propriam vtriq; scapularum attri-  
buit. vbi non simpliciter *ράχιν* vtriq; omo-  
platæ tribuit, sed propriam adiecit. Cui et-  
iam ad stipulatur Rufus libello de partium  
hominis nomenclatura scribens, *ὀμοπλάται,*  
*τὰ ὀπίσκειναι παρὰ τὸν τῶν πλατῶν ὅσα ὄν ἡ ὀπίσκειναι*  
*ὑποφύει ῥάχις*, hoc est, scapulæ dicuntur ossa la-  
ta quæ dorso adiacent: spinæ autem, ea quæ  
per medium supereminet.

*Ράχεται*, musculi dicuntur toti spinæ superiecti.  
Illi enim, vt annotat Gal. cōment. 3. *εἰς τὸ πᾶν*  
*ἄσπον*, vniuersis costarum cōmissuris in toto  
thorace superiniectiones sunt à posteriori parte,  
nihil relinquentes quod nō contegāt, sed om-  
nes costarū radices & vertebrarū proces-  
sus qui à lateribus sunt, adhæc quod inter  
ipsas radices est, complectuntur.

*Ράχτης μυῖος*, vide *μυῖος ράχτης*.

*Ρέχως* ἢ

*Ρέχως*, nomina sunt ficticia quibus Hippocra-  
tes designat eum sonum & strepitum qui  
stertendo fit: vt scripsit Galenus *ἐν τῇ γλώσσῃ*  
*τῇ*.

*Ρέβη. πλάτη*, aberratio, vt explicat Galenus *ἐν*  
*τῇ γλώσσῃ*. Sic *ρέβη* idem ibidem interpre-  
tatur *πλάτη*, errat.

*Ρέμμα*, fluxio, ex quacunque parte prodeat, &  
in quacunque incidat, ea quæ tentantur  
partes, *ρευματισμένα μέμνα* dicuntur. Galenus  
comment. 1. in prognost. *ρέμμα* *χερὸς* dixit  
pro alui profluuiio.

*Ρευματισμός*, idem quod *ρέμμα*, vt videtur. Fit au-  
tem eiusmodi affectio, facultate quæ corpus  
vniuersum alit, imbecillitate laborante, vt  
ait Galenus libr. 2. ad Glauconem, cum col-  
lecta multitudo in omnium partium infir-  
missimas defluit.

*Ρήγσι. ῥήγματα, ῥήγματα*, hoc est scissuris, fracturis,  
vt explicat Galen. *ἐν τῇ γλώσσῃ*.

*Ρήγμα*, ruptum, ruptio. Est carnosæ partis solu-  
tio circa vulnerationem. Accidit musculis,  
perinde atq; spasma neruis: verumque nul-  
lo cum vulnere. Nec tamen in musculis tan-  
tum, sed in venis etiam atque arteriis qui-  
dam *τὸ ῥήγμα* dici contendunt ex Galeno,  
de sanguinis reiectione differente: vnam  
enim eius causam *τὴν ῥήξιν*, hoc est ruptu-  
ram, vasis constituit, quam peculiari nomi-  
ne Celsus lib. 4. cap. 4. *ῥήγμα χερού* quasi di-  
antem rupturam vocauit. Omnis ex vio-  
lento ictu vel graui casu, vel alio quopiam  
valente motu, vel ex distentione excitatur.  
Cum ecchymosi quidem omnino, aliquan-  
do vero & cum contusione circum ipsam  
præruptam carnem consistit.

*Ρήματις*, dicitur ab Hippocrate cui aliquid in-  
tus fractum est, quem idem etiam *ῥαγματίας*  
vocat, vt scribit Galen. *ἐν τῇ γλώσσῃ*.

*Ρήμοχασμός*, legitur apud Celsum lib. 4. cap. 4,  
vbi causas spūti sanguinis recenset. Galenus  
& reliqui medici *ῥήξιν* simpliciter dixerunt.  
ex quo dubitare quis possit num legendum  
sit *ῥήγμα* aut *ῥάσμα*. Siquidem nemo alius vi-  
detur eam dictionem usurpasse.

*Ρήντις ἀρναιδὲς*, hoc est pelles aguinæ, apud Hip-  
pocrat. qui *ῥήντις* similiter *αἰτὶ τῶν ἀρνῶν* usur-  
pauit, vt annotat Galenus *ἐν τῇ γλώσσῃ*.

*Ρήξ*, idem quod *ῥήγμα*. Quidam vero ex vete-  
ribus etiam *τῇ ραχίδος ῥήξιν* appellarunt.

*Ρήον*, vide *ῥά*.

*Ρήση*, resina. Est lacryma seu humor liquidus  
& oleaginosus ex planta sponte diffuens.  
Omnis quidem resina ex sua arbore manat  
liquida, eaque *ῥήση* *ἵγχα* à medicis appella-  
tur, vel *ἵγχα* *ῥήση* *ἵγχα*, vt à Galeno libr. 6.  
meth. med. hoc est laguncularis, siue liquida  
ex doliis aut amphoris resina, nimirū quod  
ex doliis atque amphoris afferretur, vel etiā  
*συγκομῆ*, quod in alucis & doliis olim com-  
portaretur: attamē ea cocta in aqua, vel cre-  
mata sine aqua in prunis, sicca redditur &  
friabilis, vt docuit Dioscorides: eaque est  
quam *φρυκτῶ*, hoc est frictā siue tostam, non  
addito etiam resinæ nomine, vel *πεφρυγμένῃ*,  
hoc est retorridam, vocant. Est autem resinæ  
substantia oleosa, & in eo differens à gum-  
mi, quod aquea magis substantia prædi-  
tum est. Itaque illa oleosis promptissime,  
aqueis

aqueis autem difficilime miscetur, hoc autem contra: præterea resina flammam facile concipit, gummi vero in ignibus crepitat. Ea quamvis sponte sua ex arbore defluat, ἀπὸ τοῦ ὄρους ob id dicta & à quibusdam ἀπὸ τοῦ ὄρους, interdum tamen elici potest arborum partibus, præsertim truncis à germinatu incisis & scarificatis. Omnis resina emollit, calefacit, tenuiumque partium est, digerit atque ideo exiccat. Ac cum ex diuersis arboribus legatur, omnium præstantissima est lentiscina, quæ μαρίχη dicitur, deinde terebintina, ab his pinea, strobilina, picea, abietina, laricea, cyparissina, & picea quæ à nonnullis sola dicitur colophonia, quod ex Colophone Asiæ quondam afferebatur, cui propter odoris suauitatem Dioscorides primas assignat.

ῥίγος. dixit Hippocrates ὅτι πηλυμύειν πᾶσι. hoc est veluti quandam inundationem, ut Galenus scribit ἐν τῇ γλώσσῃ.

ῥίγος. rigor. nec aliud apud Latinos nomen est quo magis id Græcum explicari possit. Nec enim tantum inflexilem duritiem, aut quem Græci πένος appellant, significat, sed etiam vehementem frigiditatem. Galenus duobus modis eo nomine utitur, vno quidem generalius, ut libro 2. de differ. febr. cap. 1. scribens rigorem qui tertianas, quotidianas & quartanas præcedit, nequaquam similem esse, & libr. 1. ad Glauconem ubi quotidianæ & quartanæ rigorem frigidum scribit, & lib. 5. symptomatum, ubi rigorem sine febre qui frigidus est & à pituita cruda & vitrea, veteribus incognitum scribit. His enim locis latius extendit rigoris nomen. Verus autem & proprie dictus rigor, est motus voluntarius deprauatus & coactus ab acri & pungente humore: vel, Rigor est moris multus, velox, frequens, quo inuiti distenduntur & curuantur. Similis est conuulsioni, validiorque est quam in tremore. Hic aliquando cum febre, aliquando sine febre nascitur, & causas habet differentes. Qui cum febre est, causas habet tum calidas, tum frigidas, spiritum scilicet aut humorem. Nam & bilis flaua in tertiana exquisita & ardente febre, & atra bilis natura frigida per putredinem calefacta rigorem gignit, & pariter spiritus sine humore calidissimus aut frigidissimus per corpus transiens rigorem gignit. Nam facultas expultrix ab excremento rodenti & moto vehementer per ipsas partes pungendo vulnerandoque irritata, eas ipsas contrahit & constringit, ut earum quælibet contentam in se illius excrementi portionem cito expellat vel in cutem, vel in ventrem tam inferiorem quam superiorem, si sudore, aut tussi, aut vomitu, aut deiectione accessio, vel ipsa febris vniuersa critice solui debet. Contractis autem musculis necessario etiam articuli ipsi annexi contrahuntur, & fit vehemens totius corporis succussio quassatioque, & cutis cum partibus subiectis & extremis exanguis at-

que frigida enadit animali facultate seu calore renatio cum sanguine & spiritu se in corpus intimum retrahente, ut in verecundia & balneo frigida. Postea vero ibi collecta, & ob vehementes contra causam molestiam incurfiones cum multo calore rediens, febrem à rigore accendit, adiuvante præsertim causa ad concipiendum calorem idonea, nisi ob causæ magnitudinem victa facultate imbecilla homo moriatur. Qui vero sine febre rigor est, varias etiam habet causas: aeris frigidi vel aquæ frigida repentinum vel diurnum occursum: aquæ feruentis balneum repente & confertim occurrens; corpore non præcalfacto: aquæ dulcis & temperatæ balneum frequens post cibum: ignaniam, ocium, repletionem frequentem cibi & potus, præsertim temperatæ frigidi & suapte natura pituitam gignentis: timorem, dolorem interdum & medicamentum mordax vlceri impositum. Veruntamen qui rigor ex prava victus ratione nascitur, ob imbecillitatem horror potius quam rigor est. Nam rigor à succis frigidis & pituitosis non videtur excitari, ut qui ob crassitiem vehementer moueri non possint, nec adeo tenuari ut bilis. Talis autem rigor, ut scribit Gal. veteribus fuit ignotus, ut qui cum febre est, notissimus, ut pote qui in salubri victus ratione minus quam nunc aberrarent, & minus crebro se lauarent. Habet vero & rigor suam latitudinem: alius enim maximus, alius minimus, alius medius est, prout causæ magis vel minus erodunt, abundant, mouentur. Excrementum enim copiosum, vel mordacissimum, vel motum vehementius, maximum rigorem facit, contrarium minimum. Quod si copia vel qualitate vel motu multo adhuc moderatius fuerit, iam non rigorem sed horrorem inducet, vel solam etiam inæqualitatem in qua fere nullus motus sentitur, sed sensus tantum qualis in vlcerosa lassitudine & pruritu est. Verum in rigore humoris huius motus magnus vehemensque est, qui in horrore tardior languidiorque fit. Quod autem non per vasa quidem, sed per sentientes partes cum fieri oporteat, neminem arbitror ignorare.

ῥίζα. radix. commune quidem nomen radicibus omnibus, sic tamen κατ' ἐξοχὴν quædam dictæ sunt, ut γλυκίς, ἰδαία, ῥοδία & apud Hippocratem λευκή, quam Galenus dracunculi radicem esse annotauit. Idem vero ῥίζα ab Hippocrate vocari scribit genus quoddam sati, sine flore, sine semine, tribus duntaxat foliis, sed proceris & in terra stratis duorum digitorum magnitudine, similibus anchusæ, radice tenui, leuem purgandi vim habente.

ῥιζόμοις. sic dictum est alterum genus iridis Illyricæ subrufum, inquit Plinius, quod & melius.

ῥυτίον. rugosum. hoc est, rugosum, apud Hippocratem, ut annotat Galenus ἐν τῇ γλώσσῃ.

ῥινάριον. est collyrium σκεπητικόν, cuius meminit

Paulus libr. 3. cap. 22. *ἡ οὐλὴ καὶ λευκαῖα των*. Compositio autem habetur apud eundem lib. 7. cap. 16.

*ῥιννα*. proprie scobem & limaturam significat, à verbis *ῥινῶν* & *ῥινίσεν*, quæ limare & limadeterere significant. Per metaphoram autem sic etiam dictum est collyriū quoddam, quod habetur lib. 4. *ῥῖν καὶ ῥῖνους*, ab exterendis callis & cicatricibus.

*ῥῖνον*. collyrii nomen apud Galenum libr. 4. *ῥῖν καὶ ῥῖνους*, sic dictum quasi limula. Habetur & aliud eiusdem nominis apud Celsum lib. 6. ad xerophthalmiā & oculos scabros.

*ῥῖν*, ἢ *ῥῖς*. nasus. Est pars genæ superioris in media facie posita, duobus ossibus extuberans, & foraminibus pertusa, respirationis & odoratus instrumentum. Duo hæc ossa tribus futuris distinguuntur, duabus quidem quæ à medio superciliorum descendunt, & cōmunes sunt duobus maioribus genæ ossibus: tertia vero eorum propria quæ inter hæc duo descendit media, à spatio inter supercilia medio ad imas nares osseas & cartilaginofas. His ossibus inferiore in fine epiphyfes corporum cartilagineorum ab utroque latere adnascuntur, & ab his duæ aliæ latæ & molles alarum in modum, ob id *ῥῖννα* dictæ, ad ligamenti naturam prope accedentes. In eas duo exigui musculi à malis prodeuntes vtrinque singuli oblique descendunt, easque adaperiunt. Qui vero eas contrahant claudantq; nulli sunt, vt scribit Galenus, quod claudi propter respirationem non expediat: verum musculus, à quibus aperiuntur, ab actione cessantibus, redeunt illæ in naturalem statū, & conuenienti modo patent. Præter has duas cartilagineas alia etiam est cartilago, siue musculus cartilagineus, parvus mollisque, qui ab ossiculo naris internæ inter duas illas cartilagineas adnascitur: quod Gal. comment. 1. in lib. 6. *τὸν ὀπίσθιον* appellat *ἡ φραγμα* & *ῥῖνός*, hoc est, intersectum nasi, scribitque eo loco id fulciri palato sustinerique, eoque fieri vt aliquo palati osse decedente, nasus ipse subsidat: internū enim id ossiculum nasum sustinet, & secundum eius longitudinem exortrectum in duo foramina (*πόρους* vocāt) totum nasi spatium partitur. Eorum autem vtrumque supra media nasi loca in duas partes diuisum est, quarum alteram pars oris intima excipit, altera vero alta, vt ab initio ferebatur, ad ipsū cerebrum scandit, quod & ipsū foramina duo ad hæc ipsa loca spectantia habet, eaque oblonga & concāua, quæ ex anterioribus cerebri ventriculis ortum habent, & ad eam caluariæ partem, vnde nasus oritur, descendūt, quo loco ossa *ἡ μυσθὶν* posita sunt. Per hæc crassior cerebri pituita & mucus traicitur & in ipsas nares incidit, cōferente ad id membrana quæ ea parte, qua nasi ossibus substernitur, multis pariter foraminibus pertusa est, & inde partim in os influir, partim per nares fertur. Neque ve-

ro expurgandi solius cerebri causa foramina hæc facta sunt, verum etiam ad respirationem deseruiunt, maxime vero ad odores in cerebrum inspiratu admittēdos. Quamuis enim primarium odoratus instrumentū non sint, attamen odorum semitam esse nemo possit negare. Cæterum nasi nomina & partes hæc sunt: *ῥῖνες*, etiam *μυκτῖρες*, & *ῥῖνία* & *ῥῶγες* & *μύραι* appellantur: *μύραι*, quasi emunctores, cartilagine dicūtur pluribus spiraculis peruiæ. *ῥῶγες ῥῖνός*, nasi scapula aut spina, vocantur ossæ vtrinque partes genis proximæ. *ἀκροῖον*, tota nasi summitas, quam poetæ à rotunditate *σφαίριον* vocant: cuius exteriores vtrinque partes *ῥῖννα* & *ὑπὸναι* vocantur. *εὐλῖς*, *κῖον*, *διφραγμα*, interstitium illud cartilagineum narem diuidens. *ἡ μυσθὶν*, nasi pars sub superciliis latens: vnde *ἡ μυσθὶν* ossa, quæ aliqui *σπυγγοειδῆ* etiam nuncupant, sunt autem qui distinguant, appellantur *σπυγγοειδῆ* ossa illa tenera atque tenuia, quæ inter palatum & cerebri basim vsque ad nares vtrinque diuersa posita sunt: *ἡ μυσθὶν* verò, quæ ad summam nasi radicem intus fixa hærent tenuia & lata, & magno, quod è cerebro in nares fertur, foramini obtruduntur.

*ῥοδ. malum Punicum. quod & ῥοδ.*

*ῥοδακινὰ μῆλα*. mala rhodacena. sic dicuntur mala Persica. ipsaque arbor *ῥοδακινῆ* appellatur.

*ῥοδακινῶν*. compositio est ex rosis constans. Descriptio multiplex habetur apud Aet. retrab. 4. sermone 4.

*ῥοδία ῥίζα*. nascitur in Macedonia: costo similis, leuior, inæquabilis. contrita rosas redolet, tenuium partium est, & desiccantis facultatis. Calfacit secundo ordine aut initio tertii.

*ῥοδίακόν*. medicamenti genus secundum Asclepiadem, cuius descriptio recitatur à Galeno lib. 1. cap. 7. de compositione medicamentorum secundum genera.

*ῥοδιδες*. pastilli sunt rosacei: quorum compositionem describit Dioscorides.

*ῥοδον*. nomen est medicamenti aridi, acris & erodentis, quod refertur ad Heram. Diuersis modis describitur à Paulo libr. 7. cap. 13: & ab Aetio libr. 14. cap. 36. Eo Paulus vritur lib. 4. cap. 43. ad vlcera in quibus caro supercrescit, eoque similiter crustas inducit, sanguinemq; quauis ex parte profluētem probe sistit lib. 4. cap. 53.

*ῥοδίνος οἶνος*. vinum rosatum, siue conditum rosaceum. Est vinum è rosis factitium, quod Palladius ætate sua fieri solitum hoc modo docet his verbis: quinque libras rosæ pridie purgatæ in vini veteris viginti sextarios merges, & post triginta dies despumati mellis libras decem adicies & vteris. Plinius vero vinum rosaceum sic condiri tradit, ex rosæ foliis tuis in linetoloque in mistum collatis cum pondusculo vt sidat, quadraginta pondere denariorum in sextarios vicenos musti, nec ante tres dies aperto. Qui condituræ

condituræ non multum abſimilis eſt quam Dioſcorides docet hunc in modum: ſiccæ ruſæque roſæ libræ pondo in linreolo colligatas in muſti ſextarios octo demittito, & poſt tertium menſem per colum traiectum diffundito & repõito vinum. Alia ab iſis habetur compoſitio apud Apiciam, itemque alia apud Conſtantinum Cæſarem lib. 8. capite. 2.

*ῥόδον δάκρυον ἢ ῥόδον δένδρον.* frutex eſt calidus in tertio, ſiccus in primo: venenofus & pernicioſus, ſi intus in corpore ſumatur.

*ῥόδον μελι.* mel roſaceum. Sic paratum fuit à veteribus, quemadmodum ex Philagrii libello de ſuauiſſimis potionibus Oribalius atque Aetius referunt. Tribus partibus ſucci roſarum exunguium excolati pars vna mellis adiicitur. Coquitur ad ſolem calidum diebus pluribus, eodem modo quo *ῥομφακόν μελι*, & poſtea aſſervatur. Quod ſi turbulentus aut frigidior aer fuerit quãdo mel roſaceum paras, admifto optimo melle ad roſarum ſuccum, & per rarum panniculum vel linteum excolato, ſimulque ad lentum ignem coquito donec quarta aut tertia ſucci pars cõſumpta ſit, atque ſic exceptum medicamentum aſſervato, cumque calidiorẽm videris aerem, velut *ῥομφακόν μελι* inſolato. Adſtringit leuiter, proindeque refrigerare poteſt. Habet & vim exteriſſoriam ex melle. Habet & ſubamarum quiddam & leniter acre, unde ori commodum eſt inflammato propter calidi humoris influxum, & quibus acres atque biliõſæ fluxiones in venterem fiunt, præſertim poſt vomitum. Exhibetur etiã aqua dilutum iſis quibus venter exaſtuat, citra humorem, item febricitantibus, vigore iam totius morbi inſtante & particularis acceſſionis. Sæpe etiam per febres largius ſemel e potum conuenienti tempore, morbum ſoluit ſudoribus obortis aut aluo ſubducta. Tale quidem fuit *ῥόδον μελι* ſimplex, à quo aliud habetur purgatorium apud Aetium libr. 3, cap. 74.

*ῥόδον μελλανον.* eſt confectio ex roſis & malis cotoneis parata hunc in modum: Succi malorum cotoneorum ſextarius vnus, roſarum libræ tres, mellis ſextarii tres, aquæ ſextarii quinque ſimul miſcentur & coquantur. Verum quoniam roſæ non eodem tempore quo mala cotonea reperiuntur, conuenit eas cum melle ſuo tempore componere, ac ubi mala prouenerint, totam compoſitionem moliri.

*ῥόδον.* roſa. Notus eſt frutex & eius genera quæ in uſum medicum veniunt. Refrigerat & adſtringit, præſertim ſicca facultas eius, inquit Galenus, ex aquea ſubſtantia calida miſta duabus aliis qualitatibus, adſtringenti videlicet & amara, compoſita eſt. Floſ earum magis ipſis roſis adſtringit, ac proinde etiam exſiccatorius eſt.

*ῥόδον αλγινον.* ſic parari Paulus docet lib. 7. cap. 15. Roſarum, quibus vngues ſunt exempti, ſucci ſextariis duobus mellis ſextarius vnus ad-

icitur. incoquantur affidue deſpumando, donec quarta pars fuerit abſumpta. Non eſt aliud quam *ῥόδον μελι*.

*ῥόδονία.* quibuſdam eſt *ῥόδον δένδρον*, quantumvis aliqui vocent vitem ſtanas vnas ferentem, foliis lauri, nunquam decidentibus, amaris. Apud Athenæum vero libro 9. *ῥόδονία*, ſive *ῥόδονία καλοῦται*, edulii genus eſt ex roſis, cerebro, oui luteo, oleo, garo, pipere, vino, tritis & in parella frixis.

*ῥοιά.* malum Punicum, quod granatum vulgo dicitur. Omne adſtringendi vires magnas poſſidet, ſimulque refrigerat & ſiccatur, ſed dulce minus, auſterum magis refrigerare poteſt, ſiccusque eſt & ſtomacho amicum. Acidum pariter refrigerat, & maiorem vim incidendi habet. Verum acini ſucco magis adſtringunt & ſiccant, multoque magis malicorium quod *ῥόδον* dicitur. Huic virtute reſpondet mali ſlos, quem *κόπων* appellant. Dicitur etiam *ῥοιά* ſine diphthongo.

*ῥοιάς.* Sunt qui ita ſcribant oculorum affectum, quem ego malo *ῥοιάς* ſine diphthongo ſcribere. de quo vide poſtea. Dicitur & *ῥοιάς* papauer erraticum, teſte Dioſcor. quod ſcilicet velociter ſlos eius deſſuat.

*ῥοιά δέλεον.* eſt medicamentum aridum, quod cum varie præparetur, ſic fieri optimum Aetius libr. 2. cap. 58. prodidit: Rhum accipito & aqua macerato, lapidemque cupholithon tertio, rhois cremore affuſo, & ſiccari finito. deinde anchuſæ radix cum oleo coquenda, donec oleum ruſceſcat. Eius olei modicum addiendum, ruſumque terendum & ad dies quindecim ſinẽdum, donec reſicceretur, tunc ruſus ex cremore rhois affundẽdum, & ſiccari ſinẽdum, poſtea in vas teſtaceum mittendum, ignique aſſandum. In penuria cupholithi calce vitæ vtendum.

*ῥοιάς.* qui naturaliter cruribus eſt incuruiſ: *ῥοιάς* alio nomine dicitur. annotauit Gal. *ἐν τῇς ὑλαιοῦς*, ab Hippocrate *ῥοιάς* dici *τὴν καμπύλαι*, hoc eſt curua & reſorta.

*ῥοῖον.* eſt confectio ex mali Punici ſucci ſextariis tribus & vno mellis ſextario ad tertias decoctis, vt ſcribit Paulus libr. 7. cap. 15. At *ῥοῖον οἶνος*, vinum è malis Punicis factum, apud Dioſcor. libr. 5.

*ῥοῖος.* deligationis ſpecies eſt rotunda, in rhoibi modum quam Hippoc. *ἐν τῇ κατ' ἐντρίχον* adhibet capiti, cum vel ſuturas relaxatas vel vlceris oras expanſas conſtringere, vel cutem aliquantulum detractam contrahere atque agglutinare conſilium eſt. Ea quomodo fieret Galenus libr. de ſaſciis explicauit.

*ῥοῖμα.* *ῥοῖμα ἢ ῥοῖμας*, hoc eſt ſorbitio: apud Hippocratem, vt explicat Gal. *ἐν τῇ ὑλαιοῦς*.

*ῥοῖαλωσις.* pilorum affectus. cum illi vehuti in baculos coagmentati ſunt, & ita concreti implicati que vt ſeiungi & amplius credere nequeant.

*ῥοῖα.* *τὴν ῥοῖμας*, ἢ *ῥοῖα* *τὴν ῥοῖα* *ῥοῖμας*.

hoc est, quæ quomodo sorbentur, sicut explicat Gal. *αἱ γὰρ αἰμαίνες.*

*ῥοῦς.* confectio ex iolis, expurgans vitiosum humorem. descriptio habetur apud Aetium lib. 3.

*ῥοῦς.* profluuium foeminarum. id proprie apud medicos significat, estque morbi genus fluente sanguine assidue pene & inordinate per vterum. Itaque fluxio ista longe diuersa est *ἢ τῆς ἐμμηρίας ἢ κατὰ μείωσιν*, in quibus fluit sanguis menstruus periodicis. Additur autem nomini coloris diuersitas, vt intelligatur quis humor fluat, dicendo *ῥοῦς λευκόν, ἢ ῥοῦς ἐρυθρόν*. Morbi nomen est *ῥοῦς γυναικείος*, vel *ῥοῦς ὁ ὑστερος*.

*ῥοῦς* arbutula est in petrosis nascens duorum cubitum altitudine, foliis oblongis modiceque rutilis, serratimque per oras incisis, acino vuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, latiusculo, corticea racemorum tunica. obsoniis aspergitur, & ab aliquibus *ἐρυθρός* vocatur. A Latinis dicitur excoriarium, quoniam qui pelles condeplant, spissandis coriis folio eius vtantur. Duo Græci faciunt genera, *μαγνητικόν*, quod additur in obsonia, idem cum Syriaco: alterum *συροδελτικόν*, hoc est excoriarium, quo medici vtuntur ad compescendas fluxiones. Quod ita accipi debet, vt nō putemus propterea duas esse rhois arbores genere vel specie differentes. Eadem enim arbor duobus iis muniis inseruit, semine quidem obsonia condies, foliis autem & ramusculis corianorum operi dicata. Rhoem Ruellius viburnum esse credidit, cum tamen, vt scribit Plinius, nullum illi à Latinis inditum sit nomē. Officinæ sumach appellant.

*ῥοῦδης.* dicebatur affectus omnes fluxionum. inde *ῥοῦδης ὁ φθαρμὸς* vocantur *οἱ ὕγροι*, hoc est, humidi præ fluxione: apud Hippocratem lib. 1. *τῶν ὁμιδημῶν*, sect. 2.

*ῥοῦς.* est carnis in maiore oculi angulo decrementum. refertur inter morbos qui ad minutam magnitudinem pertinent. Itaque à Galeno opponitur *τῇ ἐγκυσίδι*, quæ non est aliud quam carnis in maiore angulo excrescentia. Inde accidit vt male curata encanthise fere semper succedat, ea scilicet carne quæ supra modum creuerat plus æquo detracta & absorpta seu ferro, seu medicamentis. Quod vitium nō modo male curata encanthise, verum etiam ægilopæ & pterygio succedit, si dum inciditur vnguis, vt ait Celsus, ipse ducatur vehementius, vt caruncula etiam quæ in angulo oculi est, sequatur, eaque simul abscindatur. Hoc vbi semel contigit, patescit foramen, per quod postea semper humor descendit & in genas illabitur. Ab eo symptomate nomen morbo datum est, dictusque *ῥοῦς* *ἂν τῷ ῥοῦν* quod fluere significat.

*ῥιμμάλα.* sunt species *τῶν ἰσχυρίων*, laganis multo salubriores, vt scribit Galenus; crassi tamen sunt succi. Constabant similitudine & mel-

*ῥυθμός.* rhythmus. modulus. Est proportio temporis motus aut quietis ad tempus motus vel quietis in pulsu. Cum enim pulsus constet quatuor partibus, duobus scilicet motibus & gemina quiete, sibi inuicē perpetua quadam serie succedētibz, eorum inter se proportio comparatioque rhythmus est. Eum omnis pulsus habet, sed varium. Suus enim est cuique naturæ, ætati, anni tempori, loco, sexui & reliquis: quem quidem qui seruat, *ἰς εὐρυθμὸν* dicitur: qui non seruat, *ἀρρυθμὸς*. Cum ergo rhythmus in earum partium proportionem consistat, varieg emergant rhythmī differētiæ necesse est. Vel enim tempus diastoles cum tempore systoles comparatur, vel quies cum quiete, vel motus, hoc est, ipsa diastole vel systole, cū alterutra quiete. Sed cum in omni pulsu hic rhythmus sit, ægrē tamen noscitur nisi in vehemētissimo. Sunt autem rhythmorum duæ summæ differētiæ. Omnes enim sunt proportionem vel pari vel impari. Pari quidem vt cum diastoles tempus equat tempus systoles: impari vero, vbi tempus vtriusque impar est, earumque altera alteram excedit. Id quod modo certis, modo incertis fit excessibus. Certis quidem etiam bifariam, aut multiplici proportionem, aut vt numeri ad numerum, qui *ἀριθμητικὸς* appellatur. Proportio quidem multiplex est, dupla vel tripla, vel quadrupla vel alia. Vt numeri ad numerum est, cum quanta sunt duo diastoles tempora, tanta sunt etiam systoles, incertis autem excessibus, tripliciter. Nam aut diastoles tempus incertum est, aut systoles, aut vtrumque. Quorum etiam vnum quodque aliquando parum, aliquando plus, interdum etiam plurimū aucta habet incertis excessibus sua tempora, siue plura, siue vnum quod sensu primum est.

*ῥήματα.* *τὰ βοηθήματα.* hoc est auxilia, præsidia, apud Hippocratem. *ἂν τῷ ῥήματι*, quod seruare significat.

*ῥήματα.* dicuntur medicamenta absterforia, & corpori nitorem conciliantia, cuiusmodi vim inesse cucumeri esculento Galenus prodidit. *ἂν τῷ ῥήματι*, quod est abstergere & purgare.

*ῥυμός.* lodes. Est excrementum tertie concoctionis quod in summo corpore nostro colligitur. Sicut enim concoctio tum quæ in ventriculo, tum quæ in iecinore perficitur, duplex excrementi genus relinquit, vnum humidum, alterum siccum: ita & ex tertia concoctione duo excrementorum genera in singulis animantis nascuntur particulis, ex ipso vnde aluntur succo. Alterum sudor est, hoc est humor, qui ante transmittendi alimentī fuerat vehiculum, humidus, tenuis, serosus, & vrinæ similis: alterum vero ceu semicoctæ quæpiam reliquæ, quæ assimilari nutriendæ parti nequiverunt. Tenue quidem & illud est, vt quod insensili transpiratione per cutis poros vacuetur, sed habet etiā crassioris excrementi nonnihil admistum, ex quo fit vt sepiissime sistatur ad cutem. Ab hoc excremento



cremento tum pilis origo est, tum iis quæ super cutem semper acceruantur, sordibus, à quibus id ipsum etiam ceu sordes quædam dici meruit. Non incognitæ eæ quidem veteribus fuere, vt quas ipsi magna cura ex hominum corporibus ad varios vsus deraderent. Sordes & strigmenta appellabant: à Græcis autem non modo *ῥύπος*, sed *γλοῖς* etiam vocabantur. Vim habent modice calfaciendi, emolliendi, discutiendi: quæ quidem fortitæ sunt non tam ex corporis nostri natura, quam olei atque pulueris mistione. Quæ enim in balneis strigili detrahebatur, olei atque sudoris mistura constabat: quæ vero ex palæstra, habebant præterea pulueris accessionē, tum eius qui athletis inspergebatur post olei illitionem, tum eius etiam qui inter luctandum excitabatur: dicebatur autem id sudoris genus proprio nomine *ῥύπος*. Eas itaque quæ plus olei haberent, constat maiore vi emolliendi præditas fuisse: quæ vero plus pulueris, magis desiccasse, & discutere digerereque potuisse, præsertim si pulvis erat paulo acrior atque asperior: qui namque, paulo tenuior pinguiorque est, quem Galenus *κόινον ἡμέτερον* appellat libr. 5. sanis. tuendæ, magis est emplasticus, nec corpus cui conspersus est, resolui & digeri patitur. Omnium vero strigmentorum maxime discutiunt, siccant modice, atque etiam emolliunt quæ ex æreis statuis ac vasis, in quibus oleum ad palæstre vsus reponebatur, veteres deradebant, vt pote quæ ab ære æruginis quippiam contraxerant, sicut Paulus lib. 7. prodidit.

*ῥυτίων φάρμακον*. detergens siue extergens medicamentum. Dicitur id omne quod *ῥύπος* id est, sordes, in quavis parte eluit & aufert. Sordes autem non cuti tantum extimæ & vlcibus inhaerent, sed etiam internis partibus, linguae, oesophago, tunicis ventriculi, reliquorum viscerum & venarum atque arteriarum. Eas quæ tergent, alia imbecillius,

alia vehementius id agunt. Modice detergent farina fabarum, hordei, ciceris, semen lini torrefactum, sacchar, oxymeli: magis terebyntina, thus, mel, despumatum, amygdalæ amaræ: valentius erui farina, semen homini, radix ireos & panacis, nitrum vstum, nitri spuma, fictiles testæ, pumex, buccinorū & purpurarum & cæterorum ostreorum, testæ, vltæ, tritæ, tenui cribro cretæ, quorum quidem aliqua tam valenter terget, vt etiam pilos tenuent: sed hæc improprie *ῥυτίων* appellantur. Quæ vero proprie & speciatim dicta sunt, tergent tantum non etiam obstructa liberant, quia sunt amaris imbecilliora, falsa scilicet & dulcia: quæ autem valenter detergent, omnino etiam digerūt, & ob id valde siccant.

*ῥυτίων*. emplastri nomen est, cuius descriptio habetur apud Celsum libr. 5. c. 19. sic dictū est à similitudine sordium, quasi strigmentosum. *ῥύπος* enim id significat.

*ῥύπος*. fluxus. Vna est è tribus communitatibus, quibus Methodici artem medicam constituebant. Definiebant autem esse rarefactionem corporis immodicam, & eorum quæ manere debuerant excretionem, vt contra *στένωσιν*, densitatem & necessariorum excrementorum suppressionem. vide *μεθοδικαί*.

*ῥυτίων*. rugæ ac sordes quæ in senili facie ceruntur. Suid.

*ῥυτίων*. *ὁ ἐπὶ τῷ ὤφθαλμῳ ἔχων*. hoc est, qui aliquid intus fractum habet, apud Hippocr. quem idem etiam *ῥυτίων* appellat, vt explicat Gal. *ὁ τῶν γλοῖων*.

*ῥυτίων*: est diuisio caluariæ superficialia, vel profunda quidem, sed eatenus vt fractum os loco non moueatur. differētia est fracturæ capitis, vt habetur apud Paulum libri 6. capite 90.

*ῥυτίων* *ὁ παρὰ τοῖς χεῖρας*, hoc est, tunica rhagoides. sic dicta est tunica vnea, quæ tantam habet cum vna similitudinem, vt vuc etiam nomine donata sit.

## IO. GORRAEI PARISIENSIS DEFINITIONVM MEDICARVM

T O Σ.



*Ζαγαπένιον*. sagapenum. Succus est ferulacei fructus nascentis in Media. Laudatur translucidum foris, colore rufo, & cum frangitur, intus candido, odore medio inter laserpitii

*Αζαδένιον*. nomē opobalsami, à loco in quo plurimum & optimū prouenit. cūctis aliis melius quod in Palæstina prædiis colligitur: vt annotat Gal. libr. 1. de Antidotis.

succum & galbanum, gustu acere. Officina interpolato nomine serapinum appellant. Calidum est & tenuum partium, habetque quiddam absterforium quo oculorum cicatrices expurgat & suffusionibus prodest. Addit & Mesues eo purgari crassos lentosque humores cerebri, leuarique inde hemi-crānicos, comitiales, vertiginosos, paralyticos, pectoris dolores, veteres tussis & asthmaticos. Quod simile est ammoniac lacrymæ, *αζαδένιον* vocari sunt qui putent. Apud Aetiū & Paulum scribitur *αζαδένιον*.

Σακκίον

*Σακκίον*. per saccum excolare. Vox est apud Galenum frequens, quo significat sacco humorem aliquem transmittere & percolare. Id quod ad varios vsus ab antiquis inuentum fuit. Ac primum quidem quo lymphidiora purioraque redderentur quæ per saccum colabantur. Sic enim quæ per coctionem crassiora turbidioraque facta sunt, tenuiora clarioraque euadunt: vti experientia facile probare potest. A quo vsu scriptum est à Martiali poeta,

— *ut liquidum porret Alanda merum,*

*Turbida sollicito transmittere Cacuba sacco.*

Ita enim vinum purius & defecius redderetur. Sed & sacco veteres vsi sunt, ut vires vini castigarentur & frangerentur, quo plus vini inquit Plinius, caperetur. Id vini genus saccatum appellabant, ut habetur apud Scribonium Largum cap. 122. Nec tamen per saccum vinà ea tantum de causa percolabatur, sed etiam ut peregrinis saporibus in saccum additis vinum tum odore, tum sapore suauiora fierent. Quo quidem sensu accipiendum est quod à Plinio scribitur de aniso, ipsum saccis inditum cum amaris nucibus vinum commendare. Cuius etiam conditura meminit Constantinus Cæsar capite vltimo libro 7. de agricultura. Huius generis fuisse quondam veterum *σάκκα*, *σάκκα*, *σάκκα*. nostrumque etiam vulgo dictum Hippocraticum tam vinosum quam aquosum, inditum saccis pipere, cinamomo, zinzibere, cocco, absinthio, melle, saccharo, vinoque postea superfuso & per ea semel aut sæpius excolare.

Σάκχαρον

*Σάκχαρον*. est mel in arundinibus concretum, candidum & salis modo dentibus fragile. Concretum mellis genus esse Dioscorides testatur. Colligitur autem in arundinibus, unde à quibusdam mel calamimum, id est, arundinaceum, appellatur. Candidum euadit multa coctione. Primo excoquitur arundo, deinde flaua pars fecernitur: tum secundo coquitur, atque ita fit candidius & concretius. Quod si tertio coquatur, maximum & candorem & densitatem contrahet. Quartum etiam aut quintum solet excoqui, & donec specie aluminis scissilis transluceat. Quod genus alii candidum, alii candium vulgo cognominant. Dentibus autem subiectum salis modo friatur, atque tam multa habet salis similia, ut à veteribus sal Indicus dictus sit, quod maxime in India proueniret. Saccharum ut recentiores Græci memorie prodiderunt, calidum & humidum est abscessu primo. Deterget, discutit mellis modo, nec tamen perinde sitim inuitat.

Σάμια γῆ

*Σάμια γῆ*. oleum Salcz. fuit olei aromatici conditura preciosa. Habetur apud Aetium libro 1. optima, quam se dixit Alexandriz aliquando præparasse. Habetur & alia diuersa multum ab ea apud eundem lib. vltimo.

*Σάμια γῆ*. Samia terra. quæ in Samo inuenitur, in qua cum plures sint terrarum differentie, sic κατ' ἐξοχὴν ea dicitur quæ est candida, leuis, tangenti linguae glutinis modo adhærescens, mollis, succola, friabilis: cuiusmodi est quam aliqui *καλλιέλαιον* vocabant, quod oculorum medicamentis optime misceretur. Dux enim species terræ Samiæ fuerunt, vna quæ ante dicta est, altera quæ *αἰσῆ* appellatur, crustacea & cotis modo prædensa, prædicta glutinosior, grauior, spissior, sed minus quam Lemnia terra fuit olim forte sic dicta quod stella ei imprimeretur, aut quod in ipsa multe micæ in modum stellarum intermitterent. Inter eas præcipua est differentia, quod Samia terra *αἰσῆ* dicta glutinosior sit collyrio & magis emplastica, ut Gal. & Aetius scripserunt, utraque mediocriter refrigerat, repellit fluxiones, & sudores arceat.

Σάμιος λίθος

*Σάμιος λίθος*. est lapis qui in Samia terra inuenitur inclusus, candidus & subdurus, quo aurifices vtuntur polliendo auro, ut resplendeat. Adstringit & refrigerat.

*Σαμφακκινὴ γάρδος*. est species nardi sic dicta à regione in qua nascitur, ut author est Dioscorides. hanc autem aliqui *ψευδὴν γάρδον* esse suspicantur.

*Σαμφύχον ἔλαιον*. samfuchinum oleum, quod Aetius libr. 4. cap. 42. docet conficere cocto samfuchio in duplici vase cum oleo. Calfacit & valde digerit atque discutit.

*Σαμφύχον μύρον*. samfuchinum vnguentum. Cuius compositio habet adhuc modum: Serpylli, casia, abrotoni, florum sisymbrii, frondium myrti, samfuchi singulae portione quantum pro cuiusque viribus satis fore conieceris. vna tunduntur, atque iis omphacini olei modus adiecitur qui madetium vires non euincat. hæc post quadriduum exprimuntur, deinde noua alia simili mensura & æquali tempore macerata premuntur. ita enim validius reddi solet. vim habet acré, calfactoriam, extenuantem, & lassitudines illitum discutit. sic dicitur quod samfuchus in eo viribus præpolleat. Diuersum autem est ab amaracino, etiam si samfuchus & amaracus idem significant, sicut in sequentibus videre est.

*Σάμψυχον*. samfuchum. Est herba ramosa, perpetuo virens, per terram repens, foliis eius calaminthæ quæ tenui folio constat & *καλὴ φυλλος* appellatur, hirsutis & rotundis & odoris, radice retortida, summo cespite leniter herente, multifida, quam Dioscorides ait à Romanis maioranam dici. An vero idem sit samfuchum cum amaraco plerique dubitant. Dioscorides scripsit *σάμψυχον* à Siculis & Cyzicenis *ἀμαράκινον* appellari. Similiter Plinius ait Dioclem medicum & Siculam gentem vocare amaracum quod Egyptus & Syria samfuchum: atque alio loco samfuchum siue amaracum ait in Cypro laudatissimum & odoratissimum: nec multo post, sit ex eo oleum quod samfuchinum aut

aut amaracinū vocatur. Verum aliter videtur sentire Galenus, Aetius & Paulus, diffidentes viribus plantas testati, cum tanquam diuersarum seorsim locis variis mentionem faciant, sampsuchumque in tertio calfacientium & siccantium censu collocent, amaracum in secundo siccare volūt ordine, & tertio calefacere. Quae discordia facile conciliari potest, si intelligamus amaracum duarum herbarum differentium nomen esse: neque enim tantum hoc nomine *ἡ ἀμαράκη* appellatur, sed etiam *ἡ παρθένος*, ut auctor est Dioscorides, de quo posteriore amaraco parthenium significante Galenus, Aetius, Paulusque scripserunt, praesertim cum nusquam de simplicium facultatibus agentes parthenium meminerint. Sed quæres, cur igitur Dioscorides separatim sampsuchini & amaracini vnguenti compositiones explicat, nisi sampsuchum & amaracum diuersa esse existimauit. Responso facilis est: non herbarum inibi varietatem esse, sed variam tantum vnguenti compositionem describi. Nam sampsuchinum quidem dicebatur quod ubique fere apparabatur, amaracinū vero proprie quod in Cyzico fiebat, vbi *ἡ ἀμαράκη* vernacula lingua *ἀμαράκη* dici Dioscoridem scripsisse supra annotauimus. Itaque quamuis etiam id sampsuchinum recte vocari possit, patriam tamen illi nomenclaturam Dioscorides tribuit.

*Σαρδάριος*, nomen laquei descripti ab Oribasio, quem ipse *ἡ σαρδάριος* laqueo implicat: ut videtur datur libro de laqueis.

*Σαρδάριον*, est aliquid cere duritia proximum quod apes recondunt. Hic est apum dum operantur cibis, qui sæpe inuenitur in fauorum inanitatibus repositus, & ipse amari saporis, ut Plinius docuit, probatur rufa & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris calore, sulphuris virū redolens. Dos eadem & vitiū quæ auripigmento. Quidam *ἡ σαρδάριος* vocant, melle quidem deteriore, ut scribit Aristoteles, at dulcedine propolis. Gignitur fore vernio.

*Σανδύξ*, sandaracha. Est succus concretus terreusque & quodammodo vltus, in metallis fere iisdem in quibus & *ἀπορρυγνός*, hoc est, auripigmentum, proueniens. Plinius in aurariis & argentariis metallis inueniri scribit. Sunt autem quædam eius differentiae: in colore quidem, quod alia valde rufa est & cinnabaris colorem refert, alia minus rufa & quasi sublutea est: in figura vero quod alia glebosa est, qualis plerumque inuenitur, alia puluerulenta, ut auctor est Theophrastus. Ea in locis, ut Vitruuius tradit, quæ sunt inter Magnesie & Ephesi fines, effoditur parata, quam nec molere nec cernere opus est, sed sic est subtilis, quemadmodum si qua est manu contrusa & subcreta. Sandaracha sulphur olet per se, ac magis trita, sed maxime vsta. Luteum autem emittit fumum. Optima autem est quæ pura, quæ ad satietatem flammeo colore rufescit, quæ etiam si non

teratur nec ardeat, olet sulphur, quæ facile frangi terique potest, qualis nascitur in Ponto. Fit etiam ex auripigmento sandaracha ad hunc modum: Auripigmenti mediocres particulae in ollam, cuius os obturatum sit, coniectæ quinque horis coquantur in furno contrahuntque sandarachæ colorem. Arabes cum arsenico sandaracham confundere videntur, æque vno nomine vtrumque censere, solo autem colore distinguere: nam quæ vere sandaracha est, eam appellant arsenicum rubrum: luteum vero, quod proprie auripigmentum est. Sed turpius errant qui sandaracham pro vernice accipiunt, medicamentum scilicet deleterium pro salutari, cum sandaracha metallica sit, vernix autem gummi seu concreta iuniperi lacryma. Sandaracha vtuntur pictores, vtuntur tornatores cum circum vascula lineas ducunt, vtuntur & medici quod vim habeat vrendi, sed liquoribus resinisq; temperata multis morbis medetur, nullo quidem purulentæ excretioni, resina sulphuris & veteri russi, eius vapore per fistulam in os attracto, melle rancitati, sicut Dioscorides prodidit. Vitruuius id quod fit ex cerussa in fictile coniecta ac super carbonibus quoad colorem rubrum duxerit, cremata, sandaracham ob similitudinem coloris nominat: sed id ipsum Dioscorides *σανδύξ* scribit appellari, de quo mox.

*Σανδύξ*, est cerussa vsta donec rufa & similis sandarachæ euaserit. Vritur autem hoc modo: Cerussa trita in patinam nouam & cauam supra prunas imponitur & ferulacea rude mouetur, vsq; dum rufescat, & induerit sandarachæ colorem. Id autem (inquit Vitruuius libr. 7.) incendio facto ex casu didicerunt homines, & ea multo meliorem vsum præstat quam quæ de metallis per se nata foditur. Quo loco Vitruuius sandycem appellat sandaracham, quod sandyx sandarachæ color sit: neque enim cerussa hoc modo vsta vere sandaracha est, ut quæ per se in metallis nascitur, sed sola coloris similitudine hoc modo sandycem fieri primum prodidit Dioscorides, assenserunt Galenus, Aetius & Paulus, qui præterea sandycem *σανδύξ* dici scripto reliquere. Solus Plinius & Syricum à sandyce diuersum facit, & sandycem docet fieri ex cerussa tosta, æqua parte rubrica admixta. Verum quia sandyx res est non naturalis sed factitia, potuit varia arte præparari & adulterari. Nam & hodie, ut nunquam cessat fraus, latere reruntur in farinam, qua sandyx adulteratur. Cæterum Plinius scribit se animaduertere. Virgilium existimasse sandycem herbam esse illo versu qui in Bucolicis habetur.

*Sponse sua sandyx pascentes vestiet agnos.*

In qua sententia fuit etiam Seruius, qui de herba interpretatus est, de qua sandycinum colorem tingi dicit, & varanā à rusticis vocari. Eumque postea sequenti herbam depin-

gunt delicatæ olfacturæ, caule breui & in aliis fœniculo similem. Verum miror unde id in mentem Plinio venerit. Neque enim de herba Virgilius dixit sandycem, sed de coloris genere. Tantam enim sæculi felicitatem eo loco ominatur, ut tincturam lana deinceps desideratura non sit, quoniam tum in pratis oves pascuntur, non ex sandyce quidem, quam nullam in pratis esse reperio, sed quavis herba, earum vellera & muricis, & croci, luti & sandycis similia sua sponte euadent.

Est & *σάνδυξ* collyrium *σάνδυξ* *καὶ* *ἀνδύς*, quod & *σάνδυξ* Aetius scribit appellari lib. 7. quo loco ipsius compositionem exponit. Sic autem vocatur, quod recipiat cerussam vltam quam *σάνδυξ* & *σάνδυξ* appellari supra diximus.

Fit ex sandyce ceratum egregium quod speciali nomine *σάνδυξ* a veteribus appellatum est, cicatricem inducens tibiarum ulceribus antiquis & malignis. Recipit autem sandycis libræ unam, olei dulcis libras duas, tamdiu coquantur dum manus non inquinant.

*Σανίδης*, dicuntur ii quibus thorax tabulæ ritu angustus est, ut scribit Galenus lib. 2. de temperamentis. Deriuatur *σάν* a *σάνιδος*, quod asserem siue tabulam significat.

*Σάρμας*, nomen est à recessuibus Græcis usurpatum. Est autem lignum quod India mittit. Huius tria sunt genera. Candidum, rubrum, luteum. Tertio ordine refrigerant, sed rubrum aliquanto exteris existimatur frigidius. Sicca tamen omnia in secundo recessu sunt.

*Σάρμας*, dicitur hoc nomine tertia species absinthii, regionis, in qua nascitur, cognomento. vide *αἰθέρης*.

*Σαρπη*, dicitur ab Hippocrate non quod corruptum est, ut multi nominant, sed quicquid vetustum diuturnumque est, ut annotat Gal. *ὅτι τὸ πάλαιον*.

*Σάπων*, sapo. Gallorum inuentum est, inquit Plinius, tutilandis capillis. fit ex sæno & cinere, optimus fagino & cærpineo, duobus modis, spissus & liquidus. Talis quidem fuit prima eius compositio. Alii deinde varia adiecerunt pro arbitrio & vtilitatem commodo, ut Constantinus, cuius saponis celebris fuit, adiectis saponi Gallico multis partim adstringentibus, partim odoratis, ut habetur apud Paulum lib. 7. cap. 13. & apud Aetium lib. 6. cap. 4. Hodie qui apud Venetos paratur, primas tener, addito oleo, calcæ, sale, & aliquando etiam odoratis quibusdam.

*Σάπυς*, Atticum nomen est, quo viciam significant, ut author est Galenus lib. de alimentorum facultatibus: vel vicie semē. Sed scribitur ibi etiam *σάπυς*, quod verius est.

*Σάπυς*, vide *σάπυς*.

*Σάπυς*, est ea quæ distractos & distantes habet digitos pedum, ut explicat Gal. in suo lexico Hippocratico.

*Σαρδανὶ βάλανι*, Sardinæ glandes, quas aliqui

castaneas appellat. Arbores sunt haud incongnitæ. Adstringendi vim habent, & solæ inter fructus agrestes alimentum memorabile corpori præbent, ut scribit Gal.

*Σαρδάνια* *ἡ*

*Σαρδάνια*, herba, quæ non est aliud quam alterum ranunculigenus, copiosissimum in Sardinia, gustus acerrimi, cuius esu mentem adimi auctores quæ plurimi sunt, atque ita contorqueri ora, ut risus imaginem referat, qui Sardinus ob id dictus est, & abiit in proverbium. Inter venena recensetur à Dioscor. lib. 6.

*Σαρδάνια*, Galenus apud Hippocri. comment. 1. *αἰς τὸ πάλαιον* scribit varie a quibusdā verbum hoc explicari. Dicitur quidem de brutis pascentibus sed alii significare volunt labra inter se tam vehementer committere, ut auellere & abscindere partem aliquam graminis valeant: alii vero dentibus inferioribus & superiore labro idem efficere: alii dentibus inter se ex utraque parte commissis scindere, quod Galeno videtur verisimilius locum eum Hippocratis explicanti.

*Σαρπη*, hydropis species qui & *σάρπη*, & *αἰσθήκη*, & *λεποπλεγματίας* dicitur. vide *ὁδὸς*.

*Σαρπη*, ramex carnosus. Est caro durior, quæ aliqua scroti parte increvit. Gal. tumore eum in genere scirrhorū statuit. In eo color sui similis ubique est. Propterea quidem de testiculis induratis dicitur: nec tamen ad eos solos pertinet, sed ad netuos et a quibus testes depedit, si eos duriores fieri cōligerit, & ad tunicas, si quādo inter eas caro increuerit. Causa esse potest interdū fluxio, interdū vero ictus, aut imperita post ramis incisione curatio, aliaque omnia a quibus scirrhi inducuntur.

*Σαρπη*, est lacryma arboris in Perside nascētis, thuris pollini similis, colore subrufo, amara gustati. Inter gummi genera numeratur à Plinio. Sed & eodē nomine arbor ipsa cum lacryma sua vocatur. Nomen habet quod vulnera glutinet: sed & fluxiones sistit.

*Σαρπη*, est incrementum carnis in umbilico matris vel malignæ.

*Σαρπη*, lapis qui etiam *σάρπη* appellatur, de quo vide suo loco.

*Σαρπη*, est carnis in naribus præter naturam incrementum. Est autē eiusdē cum polypo natura, ut scribit Paulus: differt autē a polypo, ut habetur in medicis diffinitionibus, magnitudine & forma. Est autē polypus quidem sarcoma, non cōtra. Polypus enim similitudinem piscis polypi gerat oportet, cum *σάρπη* informe sit potius carnis incrementum.

*Σαρπη*, est medicamentum carnis producendæ vim habens. Nam quamvis carnis generatio naturæ opus esse videatur, iuuatur tamen illa quidem plurimum in replendo vlcere medicamentis quæ modice calefaciunt, moderate detergēt & purgant, atque minimum siccant, nulloque modo adstringunt. Talem namque *σάρπη* facultate esse oportet. Carnis enim generatio fit cum & membra ipsa quibus adnasci vel circumnasci caro debet, in calore & frigore temperata fuerint,

fuerint, & sanguis qui illuc affluit, tum qualitate salubris, tum quantitate moderatus. Verum calidiora paulo ipsa carne oportet esse sarcorica, quo sanguinem attrahant, neque vilo modo adstringere oportet; ne quod influit repellant, sordemque vlceribus arctius affingant, minimumque siccare, ne absumant, sed modice prorsus siccare quo in carnem densetur. detergendi autem purgandique vi prædita esse decet, ne mala caro & vitiosa gignatur, si quid sordis & vitii in sanguine relictum sit, sed citra omnem mortuum & acrimoniam.

*Σαρξ*. caro. tribus modis dicitur, ut auctor est Galenus lib. 10. methodi medendi: vno proprie, duobus improprie. Proprie quidem & absolute dicitur pars corporis nostri simplex, mollis, rubicunda, fibras musculorum complectens. Quamquam non eas tantum complectitur, sed etiam contra caloris interni impetum & vehementiam, atque externorum calorem, frigus, duritiem eas munit, fouet, nutrit. Gignitur ex sanguine medicriter siccato, & perditur regignitur. Ob id caro pars multi sanguinis & calida dicitur, unde & carnis abundantia ex sanguinis copia nascitur. Hæc caro partem plurimam animalium sanguine præditorum constituit. Ad hanc quoque reducenda est quæ in gingiuis, in glande penis, intus in digitorum radicibus, finibus mediis & lateribus & cuncti inest. Quin & in plantis ipsis circa lignosas & veluti nertiosas fibras suam quædam carnem Theophrastus tribuit. Tu quoque in ferro rubigine exeso carnem contabuisse, fibras ob duritiem restituisse deprehendes, ac modo eodem in lapidibus carie exesis. Talis quidem est caro proprie dicta. Alterum autem carnis genus est improprie dictum & nomine, ut ait eodem loco Galenus, carens, huic quidem finitimum, sed tamen diuersum, fibras omnes cordis, ventriculi, œsophagi, intestinorum, vesicæ vtriusque, vteri, & si qua sunt alia his fibris cuique propriis prædita ambiens, & his circum hærens & circumnascens & eas muniens contra calorem nativum omnia populantem, atque etiam contra æstum, frigus & cætera foris occurrentia. Quamuis autem membranis aliis fibræ non sint, tamen his quandam carnem propriam negare non possumus, cum sanis & bene nutritis membranis huiusmodi sint habitiores, & magis corpulentæ, attenuatis vero quacunque de causa sint magis tenues. Tertium vero & vltimum carnis genus est propria cuiusque visceris substantia, quam Erasistratus *σάρκωμα*, hoc est affusionem, appellauit. Ea visceris cuiusque actionis causa est. Talis est cerebri, pulmonum, hepatis, lienis, renum caro, sen id totum quod venis, arteriis, nervis, stomachis, præterea folliculo fellis quidem ab hepate, vtereris vero à rene ademptis reliquum manet. Per hanc carnem cerebrum animale spiritum elaborat, pulmo aerem, hepar chylum & sanguinem,

lien crassam & sæculentum sanguinem trahit & sibi concoquit, renes sanguinis portionem ad sentiendum idoneam, & lonium quod vesicæ mox transmittunt. Caro hæc omnis ceu stœbe quædam & factura, ut ait Galenus, tum viscerum vasa firmat, & spatia horum media opplet, tum fibras ipsas tam musculorum quam partium aliarum, quibus fibris vndique circumiecta est, munit, & roborat ne facile contendantur aut rumpantur: adhuc contra frigus, & æstum hæc omnia defendit. Cadenti enim aut cubanti caro fit substerniculum molle: dum vero contunditur, fit operimentum, penicillis simillimum: cum vulneratur, propugnaculum, contra frigus calfacit, contra æstum est umbraculum.

*Σαρπίς*, marcidum, non corruptum simpliciter, sed cum corruptione tabidum: ut explicat Galenus comment. 3. in lib. Hippocratis de fracturis.

*Σαρξίφαρον*.

*Σαρξίφαρον*. Romanis laxifraga. frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis: ut apud Dioscor. legitur.

*Σαρκελαιον*. nomen antidoti cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 2.

*Σαρκελασις*. est pudendi palpiratio, inflammatoriz cuidam vasorum spermatorum affectioni cum tensione superueniens. Sic quidem Paulus definiuit, discernens *σαρκελασις* à *σάρκωματι*, quæ nec Gal. nec Aetius distinxerunt. Sed hic quidem duas priapismi differentias constituit, vnam quæ solam habeat pudendi tentiginem, alteram vero cui præter tentiginem dolor etiam insit, & inflammatio, & conuulsio. Hæc autem est quam saryriasm Paulus appellat, cuique alia omnia symptomata tribuit quæ & tali priapismo Aetius assignat, resolutionem, conuulsionem, ventris inflationem, frigidos sudores, & ab his subitum interitum. Vterque etiam non viris modo, sed & mulieribus saryriasm accidere prodidit, quod recte de priapismo dici non potest, quoniam tentigine mulierem laborare dicere ridiculum sit. Consequitur autem mulierum saryriasm, ut ex Sorano refert Aetius, pudendorum ingens pruritus cum dolore, ut manus subinde locis ad mouere cogantur, & intolerabili Veneris desiderio contabescant. Quippe salis & acris humoris affluxus eas pūgit & stimulat, vicinæque vteroque partes pariter inflammantur. Nec tamen illæ coitu leuantur, sed potius irritantur, quod propter locorum distentionem, meatuumque angustiam, quam inflammatio efficit, semen excernere nequeant, maiorque semper humorum copia ad locum affectum affluat. Dicta est Saryriasis forte propter inextinguibile concundi desiderium, quod Saryri semper arrigere dicatur.

*Σαρκελασις*, etiam dicta à quibusdam est *εὐσπάρκωσις*, ut Aretæus, Galenus & Aetius scripto testati sunt, propter vultus similitudinem summamque libidinem.





nonnulla, Dioscorides ab aliquibus *πύρεν* ita appellari tradit.

*Σερύφιον*. dicitur hoc nomine absinthium marinum, quod est secunda absinthii species. Dicitur etiam *σέρφον* à Dioscoride, Galeno & Paulo. vide *ἀψίνθιον*.

*Σίσαλη*. herba est cuius multæ pro natali solo differentia statuantur. Aliud enim Massiliense dicitur, foliis feniculi, crassioribus, caule vegetiore, umbella anethi, in qua semen oblongum, angulosum, gustu acre, radix longa est, iucundi odoris. Aliud est Æthiopicum quod folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi, semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore & acriore, multum suavi. Aliud ab his habetur Peloponnesiense, cui folia cicutæ, latiora, crassiora, caulibus supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceus & latus. In cacumine umbellam habet, in qua semen latius, odoratum & carnosum pendet. Inuenitur & seseli Cyprium, quod à quibusdam *λίνη*, id est, ricinus, appellatur, ut habetur apud Dioscoridem. Herodorus *σινδύβριον* vocat.

*Σισυρις*. *διαστὴν καὶ ἀπερμένον*, hoc est, distans & apertum. Sic vocatur ab Hippocrate vicus hians, metaphora sumpta ab iis qui ringuntur. Nam *σισυρίαι* proprie significat labra diducere dentibus commissis, ut annotat Gal. comment. 3. *εἰς τὸ πρὸς ἀγμῶν*.

*Σεντομάλαρον*. olus est à recentioribus Græcis nominatum quasi maluacea beta, quod forte figura & denticulato seminis habitu betam, mollitia maluam repræsentet. Id vere videtur quod vulgo spinaceum vocant.

*Σημειωτική*. pars est medicinae, signorum omnium differentias & vires expēdens. Cum autem signa multipliciter dicantur, ut Galenus in arte parua scripsit, certum est ad istam partem omnium contemplationem pertinere; sed eorum maxime quibus per morbos & præterita inuestigamus & præsentia cognoscimus atque futura prævidemus, sicut ab Hippocrate proditum est initio lib. prognosticon.

*Σπείγγωδες*. laxum, rarum, multis foraminibus diuisum. hæc enim foramina *σπείγγες* & *σπείγγες* vocantur. & tale corpus *σπείγγωδες* & *σπείγγωδες*, hoc est, foraminosum: ut refert Galenus in lexico Hippocratis.

*Σπασμὸς* ἢ

*Σπασμὸς*. idem quod *σπασμοειδής*, ut habetur apud Dioscoridem, de quo mox.

*Σπασμοειδής*. plāta est duorum generum: vnum magnum, alterum paruum est. Magnum Anticyrenses elleborum vocauerunt, quoniam albo verato in purgationibus misceretur. Simile est senecioni aut rutæ, longo folio, flore candido, radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Paruo autem cauliculi sunt dodrantes, folia coronopi, minora, hirsutiora, & in cauliculorum

cacumine capitula florum pene purpureorum, medio eorum albo, semen sesamæ, fulvum, amarum, radix tenuis.

*Σπασμοειδής*. sic quondam dictum fuit apud Anticyrenses semen ellebori nigri, ut scribit Dioscorides. Verum Theophrastus ipsum elleborum ab iis sic vocatum fuisse prodidit, quod sesamæ similitudinem haberet.

*Σπασμοειδής ὄσση*. ossa sesamidis similia. Sunt officula oblonga & planā intra manuum pedumque articulos posita: sic dicta sunt à sesamidis similitudine. Ea in singularum manuum articulis numerantur decem & novem intus sita, & ad inflexionem articulorum comparata. Sunt autem hoc ordine digesta. In quatuor digitis manus, intus ad articulos, primos quidem bina, alios autem singulos singula sub tendonibus incumbunt, ligamenti implexa. Ex articulis autem pollicis, primis quidem nullum, secundus bina, ultimus vnum continet. Sunt & in utroque pede interna totidem. Præterea vero in manu alia quatuordecim foris sæpe insternuntur tendonibus implexa, singula quidem singulis iam dictis quatuor digitorum articulis, duo autem secundo pollicis articulo, sub utroque scilicet tendone vnum, sed minora & magis cartilaginosa, præsertim pueris. verum iis pedum articuli carent, neque in iis vlla superne apparent. aut admodum rara vel obscura: sed grandia duo habet, vnum quidem ad articulum astragali cum scaphoide: alterum vero ad articulum præternæ cum cyboide. Sunt igitur in digitorum articulis ossa sesamoidea numero quinquaginta duo, & duo insuper alia grandia, de quibus modo diximus. Atque hæc quidem omnia facile est reperire, ablatis prius tendonibus extendentibus, deinde sectis per transversum articulorum ligamentis. horum autem omnium proprius usus est & verus, ut articulos implentia stringentiaque eos luxari prohibeant. Sic enim mola genu articulum patre antica firmat, ne ambulātibz per decubia, aut genu multum flectentibus luxatio in anteriora fiat. Quoniam autem & in anteriora & in posteriora luxatio fieri potest, quæ quidem articulis manus internis insunt ossa sesamoidea, eos intro luxari prohibent, dum manus vehementer extenditur, eaque sic tensa vis aliqua adhibetur: quæ vero exterius supernis eorum partibus implantata sunt, ne extrema flexione foras luxentur, impediunt. Hæc etiam ratione articulis digitorum pedis omnibus ossa subsunt sesamoidea, ligamentis implexa, ut in digitorum manus internis articulis, non ad inflexionem quidem, ad quam sunt valde inepti; sed ut pes stantibus & ambulātibz etiam per loca inæqualia & aspera sit firmior, & ne digiti lapidibus vel re alia quavis altiore, velut euerfi dum stamus aut ambulamus, prompte luxentur.

*Σήσυμνον*. quidam frumenti, quidam leguminum generi annumerant. culmine ferulaceo, fo-

liis sanguineis, semine candido, infra magnitudinem lini, quod vasculis vt papauer continetur. radice simplici & alba. lam agri plegrique in Gallia hac fruge rubent.

*Σιόνιον, ἀργεῖον.* sic à quibuldā dictum fuisse heliotropium maius Dioscorides auctor est.

Sic quoque à quibuldā vocari *σιόνιον*, id est, ricinum, idem prodidit.

*Σύνπυς, putredo, putrefactio.* Duplicem Galenus facit libro 1. de differentiis febrium: vnā quā sit superante natura, alterā vero superata. Et superare quidem, sicut in inflammationibus, & similibus tumoribus omnibus pus, in humoribus autē qui in venis atque arteriis continentur, quiddam quod puri proportionē respondet, subsidens in vrinis. At talis quidem putredo nō simpliciter putredo existit, sed aliquid in se continet coctionis. Nam adhuc vi coquendi vasorum remanente, qui interim putrescit humor, ad talem pertinet alterationem. Sed & alterū est putredinis genus, cum ea vis cui demandatum est concoquendi officium, adeo imbecillis facta est, vt nullam amplius facere possit in putrescente superfluitate ad optimū transmutationem. Quod quidem vsu contingit nonnunquam cum eadem vis ad vltimū imbecillitatis peruenerit, etiā id quod putrescit, mediocriter sit viciatum: interdū vno fieri potest, vt vis quidē ipsa non omnino sit imbecillis, humor vero putrescēs maxime sit viciatus. Huius autem superfluitatis putredo, neq; consistentiam neque autē colorem aut odorem habet vnū, sed semper permutatur, ac multis modis illud euariat quod putrescit. Altera autem putrefactio, quā & coctionem esse diximus, semper ad vnā puris speciem terminatur, coloremque ac consistentiam suscipit atq; odorem.

*Σταγρον.* maxilla *ῥύς, γνάθος.* sic dicta *ὅτι σείαται ἀεὶ ἀπορρέων*, hoc est, quod circumacta mouetur.

*Σίδηρον, vel σίγγον.* saliuā. Est pituita quā à glandulis ad radicem linguę sitis profecta os totū humectat. Pituitam quidem esse, præter humiditatem & frigiditatem, color etiam ostendit & gustus, non ex earum quidem genere quā vel screando, vel vomendo, vel emungendo quotidie educuntur, vaporoso scilicet spiritu plenā, vt ne sensum quidem latere possit ipsas esse dissimilares, sed ex genere proprie dictę pituitę. Videtur enim esse similis, si modo secundum naturam se habeat, hoc est, si nec fluida valde & aquosa sit, nec nimium lenta & sicca, nec aliena qualitate prædita. Est autem ei naturalis aquę qualitas quę *ἁμιος* est, aliena vero acris, acida & salia, vt quę dissimilis humoris mistura proueniat. Cæterum saliuam gignunt glandulę seu glandulosa corpora ad radicem linguę sita eamque in os euidētibz venulis stillantim effundunt. Id quod magna naturę prouidentia factum est, vt perpetuo humore rotę fauces, lingua & palatum madescant, vsū alioqui respiratio-

nis, vocis, & deglutionis, qualem natura poscit, non præstitura: Ac quanquam quotquot per corpus sparsę sunt glandulę sensū quendam humorem & quasi pituitosum contineant, saliuę perquam similem, eum tamen nemo hominum saliuam appellat, vt nec crassiore illam pituitam quę ex cerebro tum per os, tum per nares defluit. Non enim eum saliuam, sed omnes fere *μύχην*, Hippocrates verō *σάλινον* vocauit. Affluit autem eiusmodi pituita in os aliquando à cerebro humidiorē, aliquando vero à stomacho, quod vitium *σθυσμός* dictum est, de quo vide suo loco. Reperitur etiam masculinogenere *σίδος* & *σίγος* pro eodem. Homero autē *σίδος* est porcus sagmatius. Idem *σίδος* adiectiue etiam vsurpat pro succulento & pingui itemq; Hippocrates, teste Gal.

*Σιμμοειδής, σιμμοειδής,* sic dicitur processus vnus omoplate, quod instar antiquę Græcorum literę Ccauus sit. Idē aliis nominibus *σχιμμοειδής* & *σισμοειδής* appellatur, de quibus vide suis locis.

Dicitur & hoc nomine sinus seu cavitās semicircularis in cubito, inter duas cubiti apophyses comprehēsa, in quam brachii extremum, trochleę simile, inseritur. Refert figuram C Græcorum literę, vnde *σχιμμοειδής* vel *σισμοειδής* appellatur.

Dicuntur & *χόνδροι σιμμοειδής* cartilagines quibus aspera arteria cōtexitur, quod semicirculares sint instar C Græcorum literę.

Dicuntur & *σχιμμοειδής* tres membranulę ad orificium venę arterialis positę, quę intus ortę extrorsum feruntur. Sunt enim semicirculares, & literę C imaginem referunt.

*Σιδόν.* planta est lacustris in Orchomenio lacu frequens, papaueris similis, roseo flore, vasculo mali amplitudine, candidis membranis obducto, semine intus rubro, gustu triticum æmulante. Cibo idonea est, folia ouium pabulo grata, germina suillo pecori, fructus hominibus estur.

*Σιδνεύς.* herba est triam generum apud Dioscoridem. Primum genus proditur ab eo folia habere marrubii, sed longiora, satis ad frondem quercus aut saluie accedētia, minorā tamē & aspera. caules edit quadratos, dodrantem altos, aut etiam maiores, non inuicundi gustus, aliquantulumque substringētis, in quibz per interstitia orbiculatę vertebra, vt in marrubio spectātur, & semen in eis nigrum. nascitur in petrosis. Secundum genus ramulis est binum cubitorū, exilibus, folio filicis, numeroso, vtrinque per oras diuiso: pediculo lōgo, prodeuantibus ē summo alarū sine furculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quā betę rotundius aliquāto & durius. Tertium autē genus à Cræteu positū est, in maceris & vineis nascēs, foliis ab vnā radice multis, coriādro similibus, circa coliculos dodrantes, leues, teneros, subcandidos atq; subrubicundos, flore puniceo

punico, paruo, gustanti amaro & lento. Sidericidis vires memoriz prodidit Galen. scribens eam habere, quiddam abstergens, sed plurimum humidam esse, & modice frigidam: adstrictionis vero pauculum illi inesse. Sic etiam dicta fuit à multis ἡ ἐξήμη, atque etiam ὁ ἀσβεστης, sicut habetur apud Dioscor. Dicitur & apud Euboeos ἡ χαμαίτης, sicut idem author est.

**Σίδης.** ferrum. Quid sit, notum est. Variæ sunt eius differentiæ: quoddam est tenax, quod optimum, quoddam mediocre, quoddam fragile & ærosum, quod deterrimum. Nullum purum nascitur, sed igni excoquitur. Quo in opere tria ex ferro prodeunt, σίμφμα, λείψ, σκουρία. Latini σίμφμα ferri aciem videntur dicere, nec aliud est quam ferrum sapius liquefactum & purgatus redditum. λείψ, quam squamam dicunt, ea est quæ malleorū ictibus excutitur de ferro, aut de eius stomomate, quæ valentius quam æris squama adstringit, & utilior est malignis vlceribus, sed minus acris est. σκουρία vero purgamentum eius est, siccantis admodum facultatis.

**Σίδιον.** malicorium, hoc est, asperum mali Punci putamen. Adstringendi spissandique vim habet, eamque maiorem succo & acinis.

**Σινομορίς.** symptoma est cum saliuā plus æquo in os affluit. Id quod contingit tum vitio capitis humidioris multamque saliuam in glādulas ad radicem linguæ siras effundentis, tum stomachi multa pituita redundantis, quæ ex eo secundum gulam in os prorepat: cuius quidem affectionis Galenus meminit libr. 8. τῶν κτ' νόσων, cap. 4. & Paulus libri 3. cap. 37.

**Σιναιος.** malicia insidiatoria, causa occulta: ut explicat Galen. in lexico Hippocr.

**Σινύα.** cucurbita vel cucurbitula. Instrumentum est concavum, quod ad multos usus cum flamma corporibus adhibetur. Plures eius differentiæ tam à materia quam à forma haberi possunt. A materia tres fuerunt præcipuæ apud antiquos, vitrea, cornea, ænea: nam argenteas, quia vehementius igni rentur, reijciebant. Ænearum frequentior erat usus: nunc vitreis magis utimur, quod per eas melius sanguinis vacuationem contemplemur. Corneæ post eas secundum locum nunc obtinent. Quod ad figuram spectat, differentia præcipue in æneis erat. Elatiores humilioribus magis attrahunt. humiliores capiti magis conueniunt, quia non vehementer trahunt. Quæ plana habet labra, corporibus latitudinem habentibus: quæ resima, curuis & gracilibus commodius affiguntur. Quæ acutū os habet, illis competunt in quibus scarificatione quidem non utimur, sed per lenium cucurbitularum applicationem vehementer attrahere volumus, laborum acuitate ad attractionis violentiam conferente. Quæ obrusa habent labra, tum in aliis membris, tum præcipue in capite utiliter applicantur. Ænearum cucurbitularum tractus quemadmodum etiam vitrearum non

nisi per ignem sit, cornearum vero etiam sine igne, ut Antyllus scripsit. Quippe in extremo eas licet perforare. Itaque cum aptantur, si quis vehementius ore per foramen exugat, illæ attrahent. Statim vero foramen digito cerave claudi debet. Ceterum cucurbitæ multiplices usus medici veteres prodiderunt. capitis materiam vacuat, dolorem soluit, phlegmonem minuit, inflationes discutit, appetentiam reuocat, imbecillam & exolutum stomachum roborat, animi defectiones depellit, quæ in profundo sunt ad superficiem transfert, fluxiones exiccat, sanguinis eruptiones cohibet, menses suis circuitibus mouet, venena mortifera foras attrahit, rigores & circuitus soluit, cataphoras discutit, somnos conciliat. Verum ut docet Galenus libr. 14. methodi med. etiam si cucurbitula (strenuum plane auxilium) inuēta est tum ut foras euocentur quæ in alio sunt, tum ut eximantur atque eruantur quæ iam in scirrhum abeunt, in plethoricis tamē prætermittenda est, quod corporibus tantum utilis sit quæ prius vacuata sunt. Eadem ratione ubi cerebrum eiusque membranæ phlegmone vexantur, aut alia omnino particula, non est per initia utendum cucurbitulis, sed posteaquā totum corpus vacuaueris, ac necessarium sit eorum quæ in inflammata parte continentur, aliquid educas atque cruas, aut etiam foras versus attrahas. Dum vero affectus ipsi generantur, minime ipsis membris quæ laborare incipiunt, sed ijs quæ continuata his sunt, cucurbita imponi debet, auellendi in contrarium causa. Sic namque ad mamillas cucurbitam imponimus, cum sanguis ex utero profluit, defixo maxime in ipsis communib⁹ pectoris & uteri vasis eius ore. Sic si ex naribus sanguis profunditur, præcordiis maximas cucurbitas affigimus. Sic & omne aliud sanguinis profluvium ad contrarium per communes venas auertimus, quemadmodum rursum & sanguinē, si ita est opus, attrahimus. Siquidem cum menses euocare in animo est, in pube & inguine cucurbitam figimus. Præterea cucurbita in occipite defixa efficax est remedium ad oculorum fluxiones. Vacuari tamen prius totum corpus expedit: nam si pleoricum corpus sit, in quacunque parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipsum implebis. Idem vero & de reliquis partibus iudicandum. Reperitur & σινύα apud Galen. & Hippocr.

**Σινύα πικρά.** dicitur à quibusdam ἡ καλοκινύς, ut habetur adud Diosc.

**Σινηδὸν κατέγμα.** differentia est fracturæ ossis, quæ & καυληδὸν & ραφανηδὸν dicitur. vide in dictione κατέγμα.

**Σίνως ἡ**

**Σίνως.** cucumer siue cucumis. Olim fuit nomen multis fructibus commune qui aut cartilagine aut cute foris obducta in oleraceis extra terram crescunt. Estque illis qui priuatim nunc cucumis dicitur, primum & supre-

munus genus, cui deinde subiunguntur pepo-  
nes, & melopepones. sed cucumerem qui-  
dem Græci simpliciter *σίκω* ἢ *σίκω* appel-  
lant, quem nos priuatim cucumerem voca-  
mus, cibus aptum, vesicæ & vrinæ vtilem,  
quemq; Dioscorides scribit bonam aluum  
facere, & stomacho accommodatum esse:  
species vero eius cum adiecto nuncupant,  
vt *σίκω πέπων* appellantes. Cæterum qui *σί-  
κω* proprie & simpliciter dicitur, duas habet  
differentias. alius enim *ἡμερος*, hoc est sati-  
uus, dicitur, alius vero *αἰρετος*, quem Latini  
cucumerem anguinum vel sylvestrem, vul-  
gus nunc asininum appellat. Hic fructu tan-  
tum à satiuo distat, multo minor, & habens  
& glandibus longiusculis similem, ramis &  
foliis paribus, radice alba, grandi. ruderibus  
fabulosisque nascitur, totoque frutice ama-  
ritudinem habet. Ex eo medicamentum fit  
quod *ἐλαττερον* vocatur.

*Σικώων*. quatuor significat apud Hippocratem:  
colocynthidem, pyro similem cucurbitam,  
medicinalem cucurbitam fundo carentem,  
& conii similem cucurbitam. Refert Galen.  
in lexico Hippocratico.

*Σικώωνος σπέρμα*. vocat Hippocr. colocynthidis  
interiorem partem: Refert Galen. in lexico  
Hippocr.

*Σίκω*.

*Σίκω*. idem quod *σίκω*. Hippocrates etiam *σίκω*  
dixit.

*Σιλιγίς*. siligo. Romana quidem vox est, sed ta-  
men à Græcis usurpata, propter penuriam  
Græci nominis in ea re designanda, sicut Ga-  
lenus lib. 1. de aliment. testatur, vbi putissi-  
mum esse siligineum panem, & ab eo simi-  
lagineum tradit, siligineum appellans *σιλι-  
γίτιον*, non Græce quidem, inquit, sed quod  
non habeat aliud nomen quo ipsum desi-  
gnet. Est enim mere Romanum vocabulū  
quo purissima tritici farina nuncupatur, at-  
que ipsum etiā optimum præstantissimum-  
que trititum. Quare non immetito Plinius  
lib. 18. cap. 8. siliginem tritici delicias appel-  
lauit. Quod ex eiusmodi farina depuratissi-  
mum est, flos à Latinis dicitur. Vt autē opti-  
mi tritici farina siligo dicitur, ita communis  
minusque præstantis, similago & à Græcis  
*σιμιλάγος* dicitur, eiusque purissima portio  
pollen, vt ex Plinio patet lib. 18. cap. 10. qui  
in hunc modum scribit: Similago ex tritico  
fit laudatissima, ex Aphrico iustum est è mo-  
diis redire semodios, & pollinis sextarios  
quinque: ita enim appellant in tritico, quod  
florem in siligine. Ex quibus patet quam  
male nunc omnes eam frumenti speciem  
quæ tipha & olyra quondam dicta fuit, sili-  
ginem vocitent.

*Σιλλυμπριον*. sic dicitur ab Herodoto *σιλλυ*, hoc  
est ricinus, alii *σίκω* *κύπριον* vocant, vt Dio-  
scorides testatur.

*Σίφις*. laserpitium. frutex est cui radix crassa  
multaque, canlis annuus, altitudine & cras-  
situdine quasi ferulæ, folium simile apio,  
quod incante vere profilit deciduumque

est, semen latum, foliaceum. Succus duplex,  
vnus è scapo, alter è radice vilior ac putre-  
scens. Pellucidior puriorque à radice ma-  
nat, omnium succorum præstantissimus, vt  
qui meruerit simpliciter *ἐπὶ κατ' ἐξοχὴν* ap-  
pellat. Latini laser vocant: succus Cyre-  
naicus dicitur quod optimus ex oppidō Cy-  
renarum adferretur.

*Σίγνυ*. subtransuersum, vt interpretatur Linacer  
lib. 2. de sanit. tuen. quod parvulum abstrah-  
uerit in vtramque partem declinat.

*Σινάμωρα*. nocua, hoc est *βλαβερὰ*, apud Hippocr.  
vt Galen. annotat comment. 3. in lib. de ra-  
tione victus in morbis acutis.

*Σινάμις*.

*Σινάμι*. planta est trium generum. vñum sylve-  
strius & erraticum est, tenui tum folio tum  
semine: vulgus fanelam vocat. secundū hor-  
tense, rapitia fronde, cæteris maius, cuius v-  
sus in officinis est. tertium deinde & ipsum  
satiuum est, semine albo minusque acris: v-  
trumque communiter rustici senecue vocant.  
Vis ei calfaciendi siccandique quarto etiam  
ordine, igneque vi semen eius nares & ce-  
rebrum apprehendit, lacrymasque excutit,  
nullo tam acris saporis præuio odore.

*Σινάπισμος*. sinapisimus. Est cataplasma ex sinapi,  
vt Archigenes definiuit. Simplicissimus qui-  
dem ille est, qui solo sinapi constat trito &  
apposito. quō tamen non contenti veteres  
sinapisimum ita præpararunt: fici pingues te-  
pida aqua pridie macerabantur, postridie  
manibus diligenter expressæ contundeban-  
tur. deinde sinapim quam acerrimam, qua-  
lis est Syriaca vel Ægyptia, priuatim tere-  
bant, adiecto interim ficuum cremore quo  
facilius teri posset, nec tamen aquosum equa-  
deret, postremo in ossas simul hæc coge-  
bāt. Si sinapisimum vehementiorem facere fu-  
isset in animo, binas sinapis portiones ad v-  
nam ficuum addebant: sin inualidiorem, cō-  
tra, si moderatum, aquas vtriusque partes  
commiscebant. In mollioribus autem cor-  
poribus sensuque præditis exquisito, & in  
quibus circa superficiem affectio est, panem  
pro caricis miscebant, aut ipsum sinapi ace-  
to macerabant antequam detereretur, quo  
magis eius domareretur acrimonia, quod ace-  
to vis sinapis frangatur. Ita pararus sinapi-  
simus, vel illinebatur, vel linteo exceptus ad-  
monebatur, & quantum opus esset sineba-  
tur. Temporis autem spatium certo defini-  
re nō licebat. Quare frequenter leuandum  
erat cataplasma, & considerandum an sub-  
iecta pars ruborem contraxisset, præfertim  
si sensu hebetiore prædita esset. Quod vt ce-  
lerius fieret, partem ipsam spongiis aqua ca-  
lente madentibus fouebant incumbente  
adhuc cataplasmate nec soluto: deinde vbi  
satis calere, rubere, & tumere videbatur, si-  
napisimum eximebant, post in balneum du-  
cebant, deinde rosaceo partem illinebant,  
aut hapso lanæ rosaceo & aqua imburo, vel  
malua cocta tritaque cum pane intgebant,  
donec nihil ex sinapisimo mali superesset.

Sed



Sed cur ætate nostra remedii tam excellentis vsum medici respiciant, nihil possum excusare, nisi vel vtilitatem eius, quoniam minimo ære comparatur, non profuturum alioqui nisi pluris vñierit, vel eiusdem acrimoniam causari, quod scruis morborum lenioribus blandiri placeat, differentibus magis occidionem quam prohibentibus, ut renitenti sapius agrotantium voluptati subscribant: cum quibus subinde melius esset actum, si hoc medicamenti genus in vsum reuocaretur. Est enim efficacissimum remedium longis & deploratis fere valetudinibus, cum iam inueterati morbi cæteris præsidii non cesserunt. Poller enim plurimum aduersus ventuosos capitis dolores, hemicranicos, lethargicos, comitiales, insaniam, vertigines, siue capiti siue cruribus admoveatur. Valer & ad orthopnoas, asthma, longas tussis thoraci impositus. Diuturnis stomachi & intestinorum affectionibus, inapparentie, ischiadi, arthritidi, paralyti, perfrictionibus, quæ calori non cedunt, medetur. Sed modum adhibere oportet, desisterendumque à medicamento cum locus iam multum intumuit, & inflammatione cingitur, caro turgens succrescit & cicatricosa liuet, & post balneum pustulis leniter exasperatur: neque est committendum ut partem sensus deficiat ardore nimio victam & velut obstupentem. Non est autem id remedii genus adhibendum acutis morbis, exulceratione pulmonis aut alterius internæ partis vel externæ, quod vlcera sinapis acrimonia irritetur, ut nec particulis cartilaginosis & carne viduis, quoniam sinapismo facile vrantur & nigrescant. Ista fere sunt quæ de sinapismo Archigenes & Antyllus prodiderunt, ab Orisasio libro 10. collect. & Actio lib. 3. in suos commentarios translata.

**Σιν.** Hippocr. appellat nocumenta & lésiones. nam & *σινεξ* nocumèto affici ac lædi vocat. Gal. de fractur. lib. 2.

**Σιν.** vide paulo ante in *σιν.*

**Σιν.** *ἀγρον*, in *Σιν.* *ἀγρον*. dictum fuit à quibusdam in *ἀγρον*, ut habetur apud Diosc.

**Σιν.** *μυγε*. significat apud Hippocr. ea quæ mali habitus sunt, in *κακόν*: ut explicat Gal. in lexico Hippocr.

**Σιν.** apud Hippocr. in *βλαβή*, noxa. *Σιν.* *πὸ σίνε*, verbo Ionico, quod nocere significat: à quo *σιν.* *μυγε* sapè dicuntur Hippocrati in *βλαβή*, ut prodidit Galen. comment. 3. *εἰς τὴν βλαβήν*.

**Σιν.** Hippocrati dicitur quod aliis *σιν.* est autem herba quaternis costans ramulis, semen habens apio simile, nigrum, longum, feruentis naturæ. Quidam mentham aquaticam appellant, alii balsamitam.

**Σιν.** species est rubricæ siue terræ rubre, densæ, grauis, iecoris colore, non calculosæ, sibi concoloris, & copiose cum diluitur se diffundentis. Non valde dissimilis est à gleba Armenia, vel terra Lemnia quam sigillatam dicunt, tum specie, tum facultatibus (sic-

cat enim & adstringit, optimumque pestilentia remedium perhibetur) imo eadem videri posset, nisi solo natali differret. Inuenta enim primum est in Sinope vrbe Ponti, nomenque inde habuit rubricæ Sinopice, ut terra Lemnia rubricæ Lemniæ.

**Σιν.** sic dictum à quibusdam in *σιν.* *μυγε* *ἐπερ*, Diosc. author est. dicitur etiam à quibusdam in *σιν.* *μυγε*.

**Σιν.** hoc ex pyxidem. significat etiam alias nomen hoc fictile quoddam vas, in quod farina iniicitur, ut annotat Galen. in lexico Hippocr.

**Σιν.** *σάπα*. defrutum. Sed *σάπα* quidè vocatur mustum ad tertiam vsque mensuræ partem decoctum. Defrutum vero ubi ad dimidiam partem decoctum est. Gal. l. 1. 2. merh. med. ab Asiaticis *σάπα* tradit appellari. Alii autem caricarum decoctum appellandum cèsent: ipsis pinguibus caricis in aqua decoctis. Medie autem id est facultatis lenis scilicet & citra acrimoniam extergètem. Omne coctione nigritiem, crassitiem & dulcedinè acquirit, quod si supra modum coquatur etiam amaritudinem: sicut & mel, quod quanquam omnium dulcissimum sit, longa tamen coctione amarum redditur. Obstruit, calefacit, & flatus discutit. Paulus l. 1. c. 4. exhibet ad incrassandum lac. Arabes rob & robub dicunt, sed latius extendunt, accomodantque omnibus succis solis aut ignis calore crassatis: ut rob ribes, rob berberis, &c. Alioqui absolute positum significat idem quod *σάπα* apud Latinos & *σάπα* apud Græcos.

**Σιν.** *σιν*, est inflammatio cerebri & membranarum, quam consequuntur sincipitis & oculorum cauitas, febris ardens, pallor, totius corporis siccitas & inappetentia. Morbus hic infantium proprius esse dicitur, cui inditum nomen est à sincipitis cauitate: *σιν* enim Græci appellant foueâ in qua semina recondunt & asseruant. Scribitur & *σιν*.

**Σιν.** in Eubœa dicitur in *σιν*, teste Plinio: pro quo sisaram habet Varro.

**Σιν.** *σιν*. Est exiguum semen in Syria natum, apio simile, oblongum, nigrum, feruentis naturæ. Id nobis incognitum est. Sic etiam à quibusdam dicitur *σιν*, de quo ante.

**Σιν.** *μυγε*, herba est menthæ hortensi similis, odoratior, latiore folio: quidam serpyllum sylvestre vocant. Alterum eius genus est quod alii cardaminam, alii *σιν* appellant. Riguis gaudet, & iisdem in locis quibus *σιν* provenit. Gustu cardamum, hoc est nasturtium, refert. folia primum rotunda prædeunt, adulta eruca modo finduntur. Galenus vires ei tribuit subtiles, discutiendi, calfaciendi, siccandi tertio excessu.

**Σιν.** Galen. comment. 2. *εἰς τὴν βλαβήν* *ἀρσεν*. scribit certum quoddam triqui genus esse in Co & omni Græcia Asiatica, paucis omnino fursuribus præditum, sed ex quo pasta fit valde lenta & glutinosa. Id seri solitum fuisse verè ineunte dixit, nec tamen quo tempore perficeretur, explicauit. Apparet ta-

men Galenum sensisse id diuersum fuisse ab eo tritici genere quod *σπυλον* & *πασαγερον* *ἡμερον* à vulgo, ab Articis autē *πῆτις* vocabatur, contra eorum opinionem, qui eo loco Hippocratem interpretati sunt. Paulo vero postea idem Galenus dubius videtur esse quos Hippocrates *σπυλον* *πυρον* dixerit. forte enim, inquit, sic genus omne tritici appellat quod densum est, quodque subactum tenax lentumque euadit. Video doctissimis placere, ut sitanum idem sit cum trimestri tritico. Vere seritur, & macrum, triste, hordei similitudine prouenit, nullis aristis vallatum, & omnino ad sementem ineptum. Vulgus Gallicum *scourgeon*, quasi succursum gentium, vocat. Seritur enim in subsidium annonæ, cum propter aquas aliamve causam matura satio fuerit omissa, & impendentis famis sæpe arceret noxas.

*στανον*, etiam à quibusdam dictum fuisse alperum mespili genus *σταννίδα* dictum, Dioscorides author est. Ex quo emendari potest Plinii codex, in quo pro sitania mespilo inuenitur satanea & setanea scriptum.

*Στανον*, vel ex præsentis anni frumentis, vel ex excussis & tenuibus farinis, hoc est purgatis: ut explicat Galenus in lexico Hippocratis.

*Σπῖα*, dicuntur ab Hippocrate panes maxime frumentacei, vel simpliciter omnia edulia quoniam modo apparatu, seu potius fruges omnes ex quibus panis parari & confici potest, ut Gal. comment. 4. *eis τὸ πᾶσι διαίτης ὅξιν* annotauit.

*Σπῖς*, frumentum, id quidem primum eo nomine designatum est. postea sic dici hordeum cœpit & zea. Translata deinde vox est & ad omnia legumina quæ *δημήτεια σπύσματα* vocantur, lentes, fabas, lupinos, panicum, milium, & reliqua eiusmodi. Breuiter sic dicitur quicquid ex se mittit aristas, & in herba per hyemem est. Hippocrati vero libro *πᾶσι διαίτης ὅξιν* sic dicitur ciborum excrementum, quod intra intestina continetur, quod *σπύκαλον* & *κόπραον* appellant, sicut docet Galen. comm. 1. eiusdem libri.

*Σπύκαλον*, sic dicitur à quibusdam *ἡ ἀγρίων* siue festuca.

*Σίφων*, cognomen herbe quæ proprie à Græcis *ἀγρίων*, à Latinis festuca appellatur.

*Σίφωνιον*, herba est *βρωμὸς* à quibusdam dicta. sunt qui aueniam nominent. similis est agilopi, naturamque habet siccandi.

*Σκαμμωνία*, frutex est ramos habens multos ab vna radice, tricubitos, pingues & quadamtenus crassos, folia quoque hirsuta helixinæ aut hederæ, molliora, triangula, florem candidum male olentem, rotundum, & cauum ceu calathum, radicem grauius olentem, liquoris plenam, oblongam, crassitudine brachiali, candidam. Lacrymam è radice sua fundit, quam in cotoneo malo coctam ne stomachum offendar, recentiores Græci *δακρυδιον*, quasi lacrymulam, dixerunt. corrupto

nunc vocabulo medici *diagredion* vocant. Circa Canis ortum excipitur. Vis bima, nec ante nec postea est. Laudatur Dioscoridi nitida, sine pondere, soluta, tauri glutinis colore, prætenuibus fistulis, fungosa, qualis è Myfia, quæ in Asia est, defertur. Lingua etiam tactu debet albescere: cui tamen experimento niti non conuenit, quod idem etiam eueniat adulteratæ tithymalli lacte: sed fidelior probatio à gustu petenda est, ne valde linguam accendat, id quod permisti tithymalli est argumentum. Hæc igitur cum sint optimi scammonii argumenta, certum est verum legitimamque ad nos non deferri, sed Syriacum potius & Iudæicum, compactum, densum, grane & cerui fortasse farina, tithymalli lacte, aliisque imposturis vitiatum. Succus *σκαμμωνιον* dici solet, à Nicandro etiam *δακρυκῆμονος*.

*σκαμμωνία λεπήν*, sic dicta fuit species vna *πῆς καὶ ἡμαπῆδος* apud Plinium, quæ pedales & foliosos, non dissimiles scammonia ramos habet, nisi quod ei nigriora minoraque sunt folia.

*σκαμμωνιον*, dicta fuit à quibusdam eo nomine *ἡ δαμά* sicut habetur apud Dioscoridē, quod ea petinde atque scammonio corpora purgarentur.

*Σκαυδίζ*, inter olera syluestria censetur à Græcis. Galenus similem gingidio facit. Eadem erat Plinio anthriscus, si tenuiora folia & odoratoria haberet. Est autem olus vulgare & sua sponte nascens incultis plerumque locis, plebis cibus & quotidianum pulmentum, foliis gingidii vel anthrisci, sed maioribus & minus odoratis, gustu acri subamaroque. Calfacit ordine secundo, urinam mouet & viscera obstructione liberat.

*Σκαυδισμύωσιν*, apud Hippocr. idem quod *καυδισμύωσιν*, de quo ante.

*Σκαφῖον*, vinculi nomen est quod commodissime adhibetur vel ubi summum caput, & quod inter ipsum & frõtem est, vincire conuenit, vel si quando coniungere diducta necesse est, post incisam cutem, ad sistendam veterem in oculos fluxionem, vel alio vulnere in fronte accepto. Dicitur alio nomine tholus Dioscleus, ut habetur apud Galenum libr. de fasciis: Forte nomen inditum quod Græcis *τὸ κρανίον* dicatur *σκαφῖον*, ut apud Aristophanem *ἴνα μὴ καταγῆς σκαφῖον, πονηρὸς ἔστω*. Siquidem in cranio petinde atque in vase cerebrum continetur.

*Σκαφῖς*, Attici pastoralē mulctram dicunt, ut eo versu, *Γαυλοῖτε σκαφίδες τὴν πηνυμένα πῖσιν ἄμαρ γὰρ* hoc est, situla & mulctralia facta quibus mulgebat: Hippocrates autem marinam concham prolixiorē, quam quidam *μυδα*, hoc est muelum, vocant. Author Galen. in lexico Hippocr.

*Σκαφοειδὲς ὄστυον*, os nauticæ seu nauiforme. Est os profundo sinu excavatum, tali caput anterius & oblongum excipiens. Sic dictum est à scaphæ similitudine. Cavitatem enim habet

habet oblongam scaphæ similem, qua simile caput astragali seu tali intra se admittit. Sua autem parte opposita tres habet superficies, cubicas quibusdam dictas, planis proximas (sunt tamen non nihil gibbæ) quibus trium tarsalium ossium nomine carentium facies similiter laues & minimum canas excipit. Quorum medium tenera cubo, seu corpori cubico, & latera sex plana omnino equalia sortito est propius similis que quam quod *condit* proprie anatomici vocarunt.

*Σταφύλι*. sunt qui eo nomine interiorem auriculæ ambitum appellant.

*Σταφύλι*. apud Hippocr. significat exquisitum, ut *σταφύλιαι*, exquisita & optima victus ratio, cui opponitur *φάσις*, ut annotat Galenus comment. *ἀπὸ ἀγρῶν*.

*Σταφύλις*. cadaver aridum. Definitur à Galeno omnium humani corporis ossium invicem commissorum vniuersa syntaxis. Quare nonnulli, inquit, libros suos in quibus de ossibus disseruerunt, *ἀπὸ σταφύλης* inscripserunt.

*Σταφύλις*. est crurum resolutio, qua totius homo recta ingredi nequit, sed aliquando sinistram latus in dextrum, aliquando dextrum in sinistram circumfert, aliquando crus post se trahit, non aliter quam qui valde accliuos locos conscendit. Nomen hoc, ut & morbus ipse, coepit primum Germanici tempore cum trans Rhenum exercitum duxisset. Vitio enim aquæ milites, ut ait Plinius, duobus malis tentari coeperunt, quæ stomachicæ & sceleris ben vocarunt. Ante hæc tempora nomen hoc à Græcis usurpatum non reperies. dicitur *ἀπὸ τῶν σταφύλης*. Sunt qui scribant *σταφύλις*.

*Σταφύλις*. hoc est contractus & rugosus. ut annotat Galen. in lexico Hippocr.

*Στάσις*. crus. Pars est corporis organica, à coxendice ad inum pedem protensa. Præcipuum est ambulationis instrumentum. Illa enim propria est cruris vniuersa actio. Sed & huic per ossa innititur. Quo autem firmitor esset deambulatio, tribus ex partibus *στάσις* natura constituit, diuisitque *ἐν τῷ μηρῷ*, *πρὸς τὴν γαστήρα*, hoc est in femur, tibiæ & pedem, quemadmodum & totum brachium tribus constat partibus. Quod enim in manu cubitus, id in crure tibia, & quale in manu brachium, tale in crure femur est, quodq; in manu manus extrema, id in crure pes est.

*Σταφύλις*. fascia. Vincti genus est simplicis, apud Hippocr. lib. de offic. medici, de fract. & de artic. Est autem brevis circuitus qui rectus incipiens ad latus attrahitur & inflectitur, sic tamen ut obliquus non sit, definitque in similitudinem *τῆς σταφύλης*, id est fasciæ, qua fabri vtuntur. Namque à recta linea parum recedens curuatur, unde *σταφύλις* appellatur, ut annotat Gal. commen. 3. *ἐν τῷ ἀπὸ ἀγρῶν*. Meminit & Gal. *ἐν τῷ ἀπὸ ἀγρῶν* comment. 2. *ἐν τῷ ἀπὸ ἀγρῶν*.

*Σταφύλις*. sic dicitur fasciæ quoddam genus ad operiendum & deligandum caput, opercu-

lum ad interpretibus Galeni vertitur.

*Σταφύλις*. arefactio, contractio. ut refert Galen. in lexico Hippocr. Sed forsitan pro eo scribendum *σταφύλις*, *ἀπὸ τῶν σταφύλης*, quod est inaruisse seu induruisse.

*Σταφύλις*. in sexto de morbis popularibus, pro *σταφύλις*, ut refert Gal. in lexico Hippocr. Est autem *σταφύλις*, incumbere seu irruere in aliquid. ut sit defluxus.

*Σταφύλις*. excutit. ut author est Galen. in lexico Hippocr.

*Σταφύλις*. duplex est. Vna quidem proprie sic dicta, notior fuit quam ut à Dioscoride pingeretur. Illi radix multipliciter tunicata corticosaque est, ex qua prius caulis per se profluit, tum ex eo flos emergens insidit, qui cum sennerit, folia demum emicant, lata, nullo mixta pediculo, cepitia quadam specie. terni florum prouentus spectantur, singulis singulas species denunciantibus. Altera vero *σταφύλις* ea est, quam *πυρροίτης* vocant, radice bulbi magni, colore rufo purpurascente, gustu amaro qui os accendat, foliis lilii, verum longioribus. Sed hæc posterior *σταφύλις* vocatur, quod vires & præparationem habeat priori consimilem, eodemque pondere in morbis efficaciter assumatur, sed cui mitior quam scillæ facultas insit. Ex ea autem emplastrum fit, cuius descriptionem Asclepiade auctore recenset Aetius tetrah. 4. serm. 3. & plurimis dotibus commendatur. sunt etiam ex ea trochisci ab eodem Aetio descripti tetrah. 4. serm. 1. sunt & scilla acetum itemque vinum, sicut docet Diosc. lib. 3.

*Σταφύλις*. *καταπνέει*. id est concludatur. ut exponit Gal. in lexico Hipp. ubi quidam codices habent *σταφύλις*, significatione eadem.

*Σταφύλις*. duo significat apud Hippocratem, diuisum fuerit, & admodum fuerit, ut refert Galen. in lexico Hippocr. Ibidem *σταφύλις* exponitur *τὸ πᾶν, κατὰ τὴν φύσιν*, dicitur ferire, incidere ut in scarificando, diuidere.

*Στάσις*. est tumor præter naturam durus & doloris expertus. Sic quidem veteres scirrhum simpliciter definiunt, nulla habitatione humoris à quo gigneretur. Sunt enim variz humorum species à quibus huiusmodi tumor excitari potest, ut atra bilis gemina, & crassior sicciorque pituita: quibus omnibus commune est maiorem quam pro ratione nature tumorem excitare, eundemque sine dolore & durum. Ac durities quidem propter humoris siccitatem crassitatemque accedit. Doloris autem sensus abest, propter crassitatem & lentorem. Vbi enim crassus & lentus humor inania partis alicuius spatia subierit, & nervos nervosaque alia corpora repleuerit, facile viam intercludit spiritui animali, à quo vis omnis sentiendi proficiscitur, gummi instar omnia quibus inciderit spiracula oblimens atque obturans. Quia vero non est perpetuo par in humoribus siccitas, crassities & lentor, sed alii aliis sicciores, crassiores magisque lenti sunt,

iccirco nec tumores ab ijs humoribus excitati & que duri sunt aut doloris expertes. Itaque scirrhus alius alio durior magisque dolorificus esse potest. Verum qui plane durus est & sine dolore, is scirrhus verus & exquisitus est: qui talis non est, iam alterius nature est particeps. Vnus modo humor est qui scirrhum eiusmodi parere valeat, melancholicus: quo nomine eum intelligo qui naturalis est, & qui fecis instar sublidet in sanguine, syncerus, nulliusque alterius humoris particeps. Altera enim bilis atræ species, quæ sit per flauæ adustionem, quia non est simplex, sed flauæ bilis naturam aliqua ex parte retinet, ideo scirrhum parit non simplicem, sed dolorificum & cancriformem, ut scribit Galen. lib. 5. simpl. med. quique facile emollientium visu irriteretur. Ad eundem vero modum si humor illi melancholico flauæ bilis portio aliqua remissa est, aut sanguinis, aut pituitæ, iam non absolute scirrhus, sed erysipelarodes aut phlegmonodes, aut œdematodes dicitur. Quo factum est, ut priori definitioni à veteribus tradite, medici recentiores humoris speciem addiderint, definientes scirrhum tumorem esse præter naturam ab humore melancholico durum sine ullo doloris sensu. Cum enim quatuor genera sint tumorum simplicium, a totidem humoribus pariter simplicibus prodeuntia, ut sanguis phlegmonem, pituita œdema, flaua bilis erysipelas parit: ita scirrhus ab humore melancholico originem ducere dicendus est, neque humoris speciem in eius definitione omittenda est, quod non minima pars sit eius substantiæ.

*Σκῆδρ*, id est umbrosus, dicitur ab Hippocrate *ἡ σκῆδρ*, hoc est caliginosus: quasi dicas non clarum, nec purum, nec omnino serenum. Namque solent etiamnum qui Asiam incolunt Græci, *σκῆδρ* & *σκῆδρ*, hoc est umbrosa, omnia quæ ad nigrum declinant, appellare. Atque id vocant etiam *σκῆδρ*, id est caliginosus, & *φαῖν*, hoc est fuscum, quod proprie ad nigrum accedit. Gal. comment. 3. in lib. 3. *ἡ σκῆδρ*.

*Σκληρὸν*, durum. Dicitur, ut ait Plato in Timæo, cui caro nostra cedit, vel ut Aristoteles, quod secundum superficiem in se non cedit. Est autem eadem utriusque sententia, patetque ex ijs durum tactu iudicandum esse, sed maxime carnis siue cutis nostræ, præsertim temperatæ. Cutem enim hominis Plato eodem in libro genere carnem esse ostendit. Dicitur autem durum corpus tribus modis, quæ admodum calidæ & frigidæ: vno quidem absolute seu in summo durum, ut terra dura: altero per excessum, ut vnguis, os, calcar, cornu: tertio vero in collatione ad symmetrum sui generis, vel ad quodvis obuium, vel ad seipsum dum haberet secundum naturam. quo modo non durum simpliciter, sed durius aliquid proprie appellatur. Cæterum corpus durum, hoc est seipso, dum sanum erat, durius, tribus efficitur modis: primo sic-

citæ, quam & validus longusque morus inducit. & solis æstus, & medicamenta siccantia sumpta vel admota, & inedia per accidens desiccans, & febris ardens aut longa, & affectus animi, & vigilie, & cætera caniscentes: quod hoc modo durum est, proprie siccum nominatur: secundo concretione, videlicet à vehementer frigido humore in partem affluente, vel in ea propter frigidam intemperiem nato, vel à frigidis admotis in ea congelato: quod sic durum equalit, proprie durum dicitur: tertio vero repletionem, largo & superfluo humore autapore in partem aliquam affluente: sed quod ita durum est, proprie *ἀσπῆς*, hoc est renitens, appellatur.

*Σκληρὸς σπέρμας*, pulsus durus, quem arteria durior facit, siue in quo arteria siccior & in modum corni rigidior sentitur. Huic oppositus est *μαλακός*. Causa ergo eius est arteriæ durities contracta siue à siccitate, ut in febribus ardentibus & hecticis & marasmo: siue à constrictione, quam frigora & frigidorum ciborum portionumque usus & balnea frigidiora & reliqua ijs similia inducere solent: siue à tensione, ut per convulsorios affectus magnasque nobilium viscerum inflammationes: siue à constrictione & tensione simul, ut in scirrhis præsertim hepatis & lienis.

*Σκληροφθαλμία*, lippitudo dura. Morbus oculi cum non ipse modo oculus durior est & ad motum pigrior, dolensque simul ac rubicundus, sed ipsæ etiam palpebræ duriores sunt & sicciores, adeo ut nihil unquam humoris remittant, sed in earum angulis gramæ concrecant parvæ, contortæ & subaridæ, nec facile post somnum vel aperiri vel inuerti possunt propter duritiem. Affectio hæc genere quidē videtur esse inflammatio, cuius notæ sunt dolor & rubor, proprium tamen quiddam habet & ab inflammatione differens, quod sicca sit. Differt *ἀπὸ τῆς ἐκροφθαλμίας* sola magnitudine, quod cum hæc propter siccitatem dura etiam necessario sit, multo tamen quam illa minus dura sit, & leuiorem dolorem moueat.

*Σκληρώματα* ἢ

*Σκληρωτικά φάρμακα*, indurantia medicamenta.

Sunt medicamenta duritiem corpori inducentia. Cum autem durities tribus modis inducatur, ut supra dictum est, patet tres esse indurantium medicamentorum differentias, sed vnā maxime propriam dici eorum, quæ frigida humidaque sunt, ut sempervivum, portulaca, psyllium, lenticula palustris, solanum. Siquidem congelatione potius quam siccitate aut repletionem siue tensione durum efficitur corpus. Itaque si quid sit quod, proinde quia nativum humorem non retinet, induratum est, id siccum potius quam durum appellabitur, constatque eius sanatio rigatione & humectatione, non emolliatione: similiter quod repletionem durum equalit, non proprie durum, sed renitens dicitur, cui

eiusque curatio non emollitione, sed laxatione perficitur & vacatione.

**Σκλήρωμα.** est scirrhus in collo uteri magna ex parte consistens, prætumidus quidem sed minus renitens, & doloris cuiusdam participes. Est igitur scirrhi species, non exquisiti quidem, sed habentis aliquid humoris bili-osi aut pituitosi, quo dolor mouetur aliquis, nec perinde tactui renititur, atque is qui à solo humore melancholico gignitur. Itaque etiam si dici potest *σκληρὸς οὐδὲ μακρὸς ἢ ἐρισπυλατὸς*, attamen in ea parte excitatum *σκληρῶμα* nomen promeruit, ut Paulus libr. 3. prodidit.

**Σκολιότης ἢ ἀνισομαλία,** hoc est inæqualitas, apud Hippocr. ut sect. 4. lib. *ὅτε διατὸς ὄξυνται, ἔσονται ἐν ἑαυτοῖς σκολιότης*: hoc est, hypochondrium inæquale.

**Σκολιότης,** obliquitas, in latus distortio. Est spinæ vitium cum eius vertebræ loco mouentur & in latus inclinant. Sunt autem alia erusdem vitia, *κνῆσις*, *λόρδωσις* & *σῆσις*, de quibus vide suis locis. has autem omnes distortionis differentias Hippocrates *ὕδαμας* nomine comprehendit, ut annotat Gal. comment. 3. *εἰς τὸ πᾶσι ἀρδραν*. Aliquando vero & per *σκολίωσιν* Hippocrates omnem spinæ deprauationem significat, ut *τὸ πᾶσι ἀρδραν*, cum scribit spinam *σκολιῶσιν*, quod Galen. comment. 1. interpretatur quouis modo peruerit.

**Σκολοπένδριον.** sic dicitur τὸ *ἀσπλωδόν*, propterea quod foliis sit scolopendræ similibus, sit ex eo emplastrum quod discutit abscessus & furunculos. Describitur ab Aetio tetrab. 4. ferm. 3.

**Σκόλυμος.** carduus, frutex est folio chamæleonis & spinæ albæ, sed nigriore & crassiore, caule oblongo, folioso, in cuius vertice spinosum caput subrigit, radice nigra & crassa, quæ decocta in cibos recipitur, eoq; differt à cæteris spinosis. Hic quidem sylvestris carduus est. Satiarius enim & qui in hortis alitur, cinara appellatur à Columella. Est autem scolumus calidus secundo ordine completo, & siccus secundo. Sanat graueolentiam tum alarum tum totius corporis.

**Σκόπιον.** dicitur à quibusdam *σκῆψις*, id est cumis anguinis, sicut habetur apud Diosc.

**Σκορδύσμα ἢ Σκορδύσμιος.** pandiculatio. Est distensio coacta membrorum omnium ad vaporum distillationem. Continetur in genere morus voluntarii illegitimi & deprauati, quique coacta natura fiat: quanquam refertur etiam possit ad motum facultatis expultricis irritatæ à causa præter naturam, ut & singultus & ructus & vomitus, quod ab ea principium sit horum motuum voluntariorum coactorum. Sed pandiculatio quidem mediocris motus est huiusce facultatis, illi vero omnino validi & vehementes. Contingit maxime post somnum, cum in carne halituosum excrementum sentitur, quod & ex concoctione nutrimenti, & per cessationem à corporis motibus est collectum. Na-

tura namque ut eiusmodi excrementum depellat, eique perspiratum molliatur, talem motum machinata est. Fit & per febrium accessiones eandem ob causam. Affectio est omnium corporis musculorum, sicut oscitatio eorum modo qui inferiorem maxillam mouent. Sunt qui non *σκορδύσμα*, sed *κορδύσμα* scribant: sed male, meo quidem iudicio: siquidem Galen. *ἐν ταῖς γλώσσαις σκορδύσσαι* interpretatur *διεπίνεσαι, καὶ μάλα μακρὰ χρόνου*. hoc est, distendi, sed maxime cum oscitatione & hiatu.

**Σκορδόν.** triflago palustris. Herba est in montibus & palustribus nascens, foliis triflaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum alia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus, quadrangulis caulibus, sub rubro flore. Amarum quid obtinet, & acerbum & acre, & maxime *σκορδύς*, hoc est alio, ad similes est eius acrimonia. Vnde sane nomen videtur inditum. Expurgat igitur simulque excalfacit viscera. Alio nomine calaminthæ sylvestris ab aliquibus vocatur, ab aliis chamædrys. Dicitur à quibusdam *σκόρδοις*.

**Σκόροδον.** allium notius est quam ut debeat indicari, fronde capitia, sed minime caua, vereti caule & inani, radice bulbo tenuissimo & plurib. coagmentato nucleis & ijs separatim vestitis, tædioso halitu, aspero sapore. Est in eius magnitudine diuersitas suis nominibus donata. Vpicum cognominatur prægrande, Græci *κύπριον* appellauere, alii *αἰνέσκοροδον*, alii *ἀφροσκοροδον*, quod eo trito in oleo & aceto mirum in modum increfcit spuma. Est & allium sylvestre quod *ἀφροσκοροδον*, quasi anguinum allium, dicitur, in aruis sponte nascens, satiuo longe validius. Est quoque *σκορδύσπασον* quod & gustu & odore porri & allii conditiones possidet, quasi olitorum diligentia in vnum olera duo, veluti monstrum aliquod coaluerint, & communes vtriusque vires sibi asciuit. At vero allium desiccatur & excalfacit quarto excessu, eoque potentius quod sylvestre est.

Ex aliis emplastrum fit attractoria vi præditum, faciens ad omnem duritiem, abscessus, furunculos, strumas, inguinum tumores, fistulas, impetigines, mammas induratas. describitur ab Aetio lib. 15.

**Σκορδύσπερον.** olus est magnitudine porri, qualitarum porri & allii particeps: vnde promiscuas sibi vires ex utroque vendicauit, effectus allii & porri præbens, sed inefficacius.

**Σκορπίου δεισὴ ἢ**

**Σκορπίου ῥίζον.** herbula est breuib. foliis, semine caudæ scorpionis simili. A qua quamuis diuersum sit τὸ *ῥιζοειδές*, attamen sic dictum fuit à quibusdam à scorpionis effigie. excalfacit ordine tertio, desiccatur vero secundo.

**Σκορπίος.** animal notum, de quo legito apud Nicandrum in Theriacis, atque in nostris annotationibus. Sic etiam dictum fuit à quibusdam τὸ *αἰνέοντι σκορδαλιάρη*, quod radix eius scorpæ caudæ similis sit: alterum enim



aconiti genus radicem habet non caudæ scorpil, sed scillæ marinæ cirris similem. Sic etiam dictam fuisse herbam *ῥαῖον*, Diosc. author est.

*Σκορδίνος*. affectio est cerebri ex duobus symptomatis composita, vertigine scilicet & tenebris. Vertigo *ῥίνος* dicitur, cum omnia circumagi & in orbem verti videntur. cui si tenebræ accedant, adeo ut æger visu priuetur, composito nomine *σκορδίνος* vocatur, hoc est tenebrosa vertigo, fit ob inordinatam spiritus statum crudiq; motionem, qui vel in capite primum genitus sit, vel sursum ex infernis partibus conscenderit.

*Σκόρπιον*. vertigo. Est inordinatus motus spirituum in cerebri vetriculis à quo omnia circumagi videntur. Causa est vapor calidus & acris cerebrum impetens, à crudo ventriculo maxime sublatus, ut ex Archigene & Posidonio refert Aetius: vel frigidus glutinosusque humor, ut habetur apud Paulum. Ex eo primum acies oculorum hebescit, aures tinnunt, auditus gravis est, gustus etiam atque olfactus quandoque viriuntur: deinde aucto morbo vehemens capitis dolor, & veternosus sopor, postremo vertigines & scotomæprehendunt. Quibus etiam accedit cardiognos & nausea, si oris ventriculi vitio malum contractum sit. Vaporis quidem crassities tenebras & caliginem menti inducit, eiusdè vero motio inæqualis atque inordinata facit, ut omnia in orbem cœverti videantur, etiam in lecto iacentibus & alioqui quietis, adeo ut facite in terram cœcidant, nisi aliquo fulciantur. Id quod maxime illis accidit si in circulum agantur. Nam quod sanis post multas corporis circuitiones, id ægris vnica in gyrum conuersione accidit. Quinetiam si hominem, si vndas, si trochum, si rotam aut aliud quippiam conuolui viderint, idem perpetuunt, quoniam spiritus vitiosus ijs quæ circumuoluuntur intectus, vna cum ijs rotatur, falsoque putat omnia pariter circumagi. Ex quo patet per scotomata læsam esse vim imaginandi atq; etiam ratiocinandi, & in cerebri vetriculis inordinatos & inæquales spirituum motus cieri. Magna est huic affectioni cum epilepsia cognatio, facilisque in eam transitus: non obscure tamen ab ea differt cum materia, tam symptomatis. Huius materia spiritus est crassus, turbidus, caliginosus: illius autem, humor aut vapor malignus. huic adiuncta cœuissio est, quæ nulla est in scotomate. Cum autem sint huius affectionis duo præcipua symptomata, tenebræ oculis obuersantes, & omnium rerum apparentes quædam circumactio, aduertendum est ab hoc Græcos, ab illo Latinos ei nomen indidisse.

*Σκώβαλα*. excrementa sicciora & quasi in nucleum formata, combusta scilicet à visceris phlegmone, ut annotat Galen. comment. 4. *αἱ τὸ ἐν δὲ δαίτην ὀξείαν.*

*Σκωβίτης ὄνος*. vinum est quod sua sponte ex passis vis distillat, utpote vinum vitro ef-

fundentibus vis, ut habetur apud Aetiam lib. 9. c. 24. Nigrum erat & crassum, nec tamen adstringens, ut scripsit Galen. libr. 12. meth. med. & sanit. tuend.

*Σκωβὴν ῥίνα*. sic dicitur à quibusdam ἡ γλυκύρρινα, ut habetur apud Theophr. & Dioscor.

*Σκωλάκιον*. est collyrium descriptum & à Galeno & ab Aetio, sed diuersis modis, multisque laudibus ab hoc celebratum.

*Σκῆμα*. verberare, secare, diuidere, ut est in Hippocratico Gal. lexico: sed perperâ. nam ex manuscripto codice legendum est *σκήμα*, itemque ex Hesychio.

*Σκῆρος*. callus: *πῶρος*. & *σκυρδῶσιν*, in callum indurati sunt, vel occalluerint, apud Hippocratem, ut annotat Galenus in suo lexico. Hesychius *σκυρδῶσιν* interpretatur *λεῖθωσιν*, in lapidem indurentur: itemque *σκῆρος* exponit *λαπῆλον*, cæmentum, id est frustum è lapide inter cædendum decussum: alii scrupum, salebram.

*Σκῆμα*. quæ in articulo cervicis sunt, ut annotat Gal. in lexico Hippocr.

*Σκωπῖδες*. dicuntur digitorum ossa, quod eo ordine disposita sint, ut velut in acie stare videantur: *σκωπῖν* enim equitum turmam significat, atque eandem ob causam etiâ *φάλαγγες* appellantur, de quibus vide suo loco & in dictione *δελταία*.

*Σκωπῖλον*. à quibusdam dicitur ἡ κοιλία, id est vmbilicus Veneris, sicut habetur apud Dioscoridem.

*Σκωπῖλον σκωπῖλον*. vermiculans pulsus. Est pulsus inæqualis in vna pulsatione & diuersis arteriæ partibus, in quo non tota simul arteria distenditur, sed primum quidem pars eius superior, cordique vicinior, deinde vero alia atque alia in modum vermis progredientis. Nanque ab huiusmodi gressus similitudine huic pulsui inditum nomen est. Eiusdè generis est cum vndoso atq; etiam cum formicante, differtq; ab ijs sola quantitate seu magnitudine: estque amborum medius, tanto minor vndoso, quanto maior est formicante. Habet semper adiunctâ paruitatem, cuius causa est facultatis imbecillitas cum organorum mollitie. Differt præterea ab vndoso, quod in hoc humorum copia subest, in vermiculante deest, ideoque sine febris fere solet magnis vacationibus succedere, atque ijs etiam quibus propter immòdicam humiditatem computruit pulmo, cum scilicet facultas iam incipit laborare. Nec tamen coniunctam esse ijs affectibus inflammationem oportet. Sic enim duri pulsus fierent, non vermiculantes. Proinde nec hæcticas nec marasmos eiusmodi pulsus cōsequuntur, cōsequuntur omnino quod ad affectum in firmamque attinet facultatem, nisi cōiuncta ijs affectibus siccitas arterias redderet duras. Sicut autem vndosus cum in paruitate minuitur, transit in vermiculantem, ita hic minor effectus in formicantem vertitur. Est autem hic pulsus necessario paruus, languidus, frequens, & non obscure paruus.

*Σκωληκίδης* *ἀνθρώπου*. vermicularis seu vermiformis processus. Est corpus ex particulis quā plurimis per membranas tenuēs connexis variē denseque compositum, & secundum meatus longitudinem extensum, qui à medio cerebri ventriculo ad postremum fertur. Speciem gerit vermium vetulas quercus depascentium. Inuehitur autem dorso *τῶν γλουτῶν*, & illis vndique adstringitur & affirmatur per ligamenta quæ *πύοντες*, id est tendines, appellant. Superiacet meatui qui est à medio ventriculo ad postremum, & spiritus animalis per eundem transitui præst.

*Σκωρία*. stercus ferri. eadē facit quæ rubigo, sed inefficacius. appellatur etiam recrementum ferri & spuma.

*Σμαγδῖνον*. nomen est emplastri, cuius descriptio habetur apud Celsum, l. 7. c. 19.

*Σμυγία* *ἡ*

*Σμύλη*. est pulvis siccus qui cuti non vinctæ inspergitur ad eam detergendā. In hunc enim usum primū smegmata adhibita sunt, atque inde dicta. Vnde idē *σμηλίων* est, vel (ut Hippocr. loquitur) *σμηματιδες*, cum *πρὸς ῥοσῆν*, sicut Galen. annotavit comment. 3. *εἰς τὸν ὅδε διαρρῆσθαι*. Eiusmodi facultatem habet nitrum, aphronitrium, sal, mel, salis flos, cimolia, lomentum fabarum, fermentū hordeaceæ farinæ, furfur, pumex. Verum aliis etiam medicamentorum generibus quæ attenuarēt, discuterent, siccarēt, postea accommodatū nomen est. Extenuat quidem & discutiunt veratrū, alcyonium, sulfur, herba pedicularis, sinapi, pyrethrū, semē rosmarini, terra Lemnia, sepiæ testa, quæ propterea commodissima sunt abolerendis pilis, addita præsertim calce & auripigmento. Siccant autē ruentes ex parte aliqua fluxus humorum nitrum, sal, galla, malicorium, alumen, rosa & reliqua eiusmodi. Omnia confusa, cribrata & sicca inspergi debent. Aliquando tamen liquore aliquo dilui possunt & inungi, ut videre licet apud Aetium lib. 6. cap. 54. vbi varios *τῶν σμηματικῶν* usus describit. Monet autem Paulus lib. 6. cap. 13. omnia curi siccae admonenda esse.

*Σμηλίων* *ἡ*

*Σμυγίς*. Terræ quoddam genus cui deterforia vis inest. Galenus & Erotianus apud Hippocratem *σμηλίδας* *γλῆν* exponunt *πρὸς ῥοσῆν*, cui vis inest abstergendi instar smegmatis & saponis. est autem terra alba qua fulones vruntur. Pollux *σμηγείδα* vocat. *ὅδε τὸ σμηγέον*.

*Σμύλη*. vide in *σμηγία*. *σμηλίων* in *σμηλίων*.

*Σμύλας*. taxus. arbor est abietis magnitudine & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Anicula quæ Italicæ taxi baccas deuorant, dicuntur denigrari, & qui ederint eiusdem homines alui profluvio corripiti. Habetur & Narboniæ tam præsentis veneni, ut si qui dormiant sub ea aut in eius vmbra desideant, lædantur & sæpennūmerō moriantur.

Receñsuit eam Nicander in Alexipharmacis inter venena.

Est & *σμύλας* frutex hortensis, cuius semen à nonnullis *ἀέλα* vocatur: folia habet hederæ, molliora tamen, tenuēs caules, & capreolos vicinis fruticibus circumuolucros, qui tantum adoleſcunt, ut topiarias scenas repræsentare videantur. siliquas fœnigræci profert longiores & torosiores, in quibus semina renū similia, sed inæquali colore recluduntur, quæ quadam ex parte fuluescunt. Siliqua cocta cum semine in oleribus asparagi modō estur. Vrinam eiēt & tumultuosa somnia facit.

Est etiam *σμύλας* planta duorum generum, quām ad arboris, de qua antè dictum est, differentiam Galenus & Paulus *μύλας* maluerunt appellare: Vnā aspera est, folio periclymeni, sarmentis tenuibus, multis, rubi modō aut paliuri aculeatis. arbores scandit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumque leuiter mordent, nascitur in palustribus & asperis, radice dura crassaque. Altera verō lauis est, foliis hederæ similibus, mollioribus, lauioribus, tenuioribus. huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuoluitur arboribus, ut prior. fructum parit lupini modō nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Vtraque facultatem acrem & calidam possidet.

*Σμύλη*. scalpellum. instrumentum est chirurgicum. Vtrinque acies illi habebatur, & lineas vtriusque secantes, vtrinque curuas habebat, sed alteram concanā, alteram verō illi oppositam gibbam. cuspis autem acuta erat. Diuersi generis erant. Aliud magnum, aliud paruum, aliud mediocre habebatur.

*Σμύλον*. nomen est medicamenti acris quo Paulus lib. 4. cap. 18. vitur ad rumpenda apostemata: ad rumpendas parotidas, lib. 3. cap. 23. describitur ab eodem l. 7. c. 17. Sed notandum l. 4. c. 18. scribi *σμηλίων*: non male forsitan: *ὅδε τὸ σμηλίων* à detergendo.

*Σμύρη*. myrrha. Lacryma est arboris Arabicæ, Ægypticæ spinæ nō dissimilis, e cuius vulnere defluit lacryma in subiectas tegētes, alia circum caudicem concreſcit. Plures sunt eius species, *πιδάσμιος*, *καβρία*, *βαγλαδιανή*, *καυκάδης*, *εραιστη*, *αμύρια*. Porto myrrha secūdo ordine exalfacit & desiccāt, atq; abstergit, nec arteriam exasperat, ut abstergentium nonnulla.

*Σμύρη*. olusatrū Latine dicitur. herba est caule apii & stolonibus multis, foliis latioribus, subpinguibus, ad terram infractis, robustis: odore medicato, cum quadā acrimonia iuncunda: colore in luteum languescēte: capitibus caulium orbiculatis, ut anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, acri myrrhæ sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus viridis aut subalbidus. Nascitur in sa-

xosis & collibus atque squalidis & limitibus terrenis. Vis radices, herbe & seminis exalfacere.

**Σπινθός.** ad *σπινθός* (hoc est vibices seu linores) sanandos apti, qui ex percussione fiunt, vt annotat Galen. in lexico Hippocr.

**Σβύρος.** herba est duorum generum. syluestrior quædam est & magis spinis horrens, altera teneritate quadam mollescit, cibus expetita; anguloso caule, inani, interdum rubente, foliis in ambitu per interualla dissectis. Adstringit & manifeste refrigerat siue corpori admoueat siue manducetur. Dioscorides cicerbitam à Romanis dici prodidit. Galli lacterones vel lasseronēs appellant.

**Σέμπος.** genus cucurbitæ syluestris digitali crassitudine non nisi in saxosis nascens. Nomen habet, quia sit inanis. nam *σέμπος* est inanis, fungosus, spongiosus.

**Σφιγμένον.** vocantur ab Hippocr. qui sapienter videntur sibi aliquid inuenisse, & tamen errant, ac propterea neque ea obseruant, quæ ab imperitis quibuslibet recte cognoscuntur, Gal. comment. 1. in lib. de fracturis.

**Σπύρος.** herba est à quibusdam *σπύρος* dicta. nascitur in Gallia, vt Plinius auctor est.

**Σπινδα.** conuulsio. *σπινδα*. forminum nomen est, vt refert Gal. in lexico Hippocr.

**Σπινθ.** sic à quibusdam dicta est *σπινθ*, hoc est palma, vt auctor est Dioscorides. Sunt etiam *σπινθ* partes organorum impellendo idoneæ. Vtuntur etiam spatha, vbi extrahendo impellimus, ad femur in posteriorem partem erumpente. Quanquam sunt & alie spathe in quibusdam organis ad alios impellendi modos fabricatæ. Oribasius lib. de machinamentis. *σπινθ* etiam significat machinamentum quo vtuntur ad coquendum, detergendum, subigendum medicamina. fiebat autem ex ferro, aut alia quauis materia, vt ex palma, pinu, rubo, ruta, tæda & alia qualibet materia.

**Σπυρίον.** herba est folio gladioli, sed arctiore & in terram magis procumbente, in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen ab aliquibus *σπύριον* vocatur. Officina spatulam fecidam appellant. vim habet exsiccandi.

**Σπυρίον.** libidine & cupiditate alicuius rei accendit. dicitur præsertim de ijs qui pruriunt libidine Venerea. Vfus est Hippocrates eo verbo in ea significatione, & Galenus exponit *σπύριον*: Erotianus autem *σπύριον* καὶ βλάστητον.

**Σπινθός** n

**Σπινθ.** frutex est longas ferens virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur. semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens. florem vt alba violæ, luteum. Et semen eius & succus magnam habent trahendi facultatem.

**Σπινθ.** est vnitatis solutio in nervosa parte citra vulnerationem. Conuelluntur enim quæ in ipsa sunt fibra cum ex ictu aliquo violento

tiam patiuntur, aut subito & affatim intenduntur. Huius causa est repentinus quidam æqualis vehemensque motus, ac tum præcipue cum neque perfricata neque calefacta, neq; ad æqualitatem ducta aut mollitiæ corpora, motibus exponuntur. Sic enim distrahuntur plurimæ nervosorum corporum partes. Sunt autem causæ alie exteriores, alie intra ipsum corpus. Exteriores quidem quæ collidere apta sunt, interne vero immodicus & inordinatus motus & quædam humorum vitia, quæ corrodendi vim habent.

**Σπινθ.** Celso dicitur distentio nervorum lib.

2. cap. 1. omnes fere medici hodie conuulsionem interpretantur. Est musculi ad suum principium involuntaria contractio. Symptoma est voluntariæ functionis oblatæ, cuius cum primarium instrumentum musculus sit, patet eum in conuulsione affectum esse secundum se totum, maxime tamen secundum partem sui nervosam. Itaque cum motus voluntarius perierit, necesse est per conuulsionem in eum firmum nervos musculosque duci, in quem, si pro lege naturæ se haberent, ab animali virtute ducerentur: id autem est in suum principium suamque originem, ad quam omnia suapte natura feruntur, nisi alio vi aut voluntate retrahantur. Ergo musculis ad sua ipsorum capita & principia retractis, & parte simul in quam intendantur adducta, attractaque, similis quidem naturali motus, sed citra voluntatem fit, atque in eo morbus ipse consistit. Nam quod musculus & tenditur & conuulitur ad suum principium, & vna cum eo pars illa corporis cui inseritur, commune quidem est & sanis & conuulsis: quod autem inuito hoc accidat, præter naturam affectis inest, non sanis. Itaque si ad musculos proprie pertinet conuulsio, manifestum est pro musculorum differentiis, varias esse & differentes conuulsiones non modo vniuersales, sed etiam particulares. Ac particulares quidem sunt ex particularium musculorum differentiis, quarum aliquæ propriis etiam donatæ sunt nominibus: *σπασμὸς* in oculo, *τενὸς* in mandibula, *κυνὸς σπασμὸς* in ore, *σπινθ* in pene. Vniuersales vero, cum vel corpus totum in priora curuatur, *ιμπερόστροφος* Græcis dicta: vel in posteriora, *ἐπιστροφος*: vel in vtranque partem æqualiter, *νίτρος*. quibus & additur *ὁ βλάστητον*. Est enim quædam totius corporis conuulsio, patiente nimirum nervorum principio. Sunt autem plures earum causæ, quas tamen omnes Hippocrates in duas contulit, inanitionem & repletionem. Ad inanitionem quidem reuocatur febris ardens, hellebori potio, immodica sanguinis profusio, vigilia, inedia, & quæcunque corpus vehementer excipiat: ad repletionem vero ebrietas, crapula, suppreffa vacuatio cõsuetæ, exercitatio intermissa, phlegmone, & quæ etiam consequuntur dolor morsusque, præterea & flatus qui in musculis conclusus siue illic

illic genitus, siue aliunde influens, eos distēdit atque contrahit, vt docet Gal. initio libr. 2. de symptomatum causis: quō etiam loco ab vtraque illa causa conuulsione fieri chordarum eleganti similitudine docet: vt enim illarū vel nimio humore imbutarū, vel vehementius resiccatarū tenduntur contrahunturque, vt interdum etiam rumpantur, sic & nerui afficiuntur, atque ita tēsi musculos adducunt. Itaque in neruis quidem ipsis conuulsionis causa aliquando est, non etiam in ipso musculi corpore: musculi tamē nō nerui morbus esse conuulsio dicitur, quod ipse non autē nerui proprium sit morbus, qui in conuulsione latus est, instrumentum. Itaque si nerui ex chordarum cōmparatione conuelli aliquando dicantur, id nō proprie dicitur, sed quod ita affectis necessario quoque musculus contrahatur. Ergo quæcunque neruorum principio, vel copia, vel acrimonia, vel maligna venenarūque qualitate molesta sunt, conuulsionem possunt excitare: siquidem ab ijs grauati nerui irritariq; contrahuntur, & musculos secum adducunt. Ex his patet conuulsionis causam vel in musculo & præsertim eius capite esse, vel secundum nerui ipsius ductum, vel in ipso neruorum principio, quod geminum à medicis statuitur, vnum scilicet in spinali medulla, alterum vero in cerebro.

*Σπασμὸς ἡμῶν*, conuulsus affectus. Dicitur affectus qui in sui principio, aut non multo postquam fieri coeperit, conuulsionem accersit, vt annotauit Gal. comment. 3. in libr. 1. præorthetici. Idem vero libr. 1. de prælag. ex pulsibus, affectum conuulsium appellat qui ante mortem necessario conuulsionis aliquod periculum inducit.

*Σπασμὸς δὲ σπυρμικός*, conuulsus pulsus. Est pulsus inæqualis in vna pulsatione & diuersis arteriarū partibus, in quo vtrinque ab extremis retrahi, tendi conuelli que arteria videtur in modum chordæ tensæ. Videtur enim tunc arteria contracta, & vndeunque contractata, non ceu compressa sit abs quopiam vel constipata, nec etiam veluti rigida vt in febris, præsertim in accessionibus, nec vero vt præ duritie ad intentionē contumax, veluti quod sit diuturnitate tēporis, præsertim cum quid offensum sit vel viscera vitia, sed vt corpus neruosum cauumque, veluti intestinum aut simile ex vtroque finē intentum. Ad eundē modum inæqualis est motus arteriarū in modum chordæ sursum deorsumque, agitatæ. Neque enim species distensionis vel contractionis representatur, verum vibrationi potius similis est, ceu exilientis sursum, iterumque retractæ intro: quod nec constituto quidem tempore habet, sed vñ sæpe tēpore alia eius pars videtur sursum ferri, veluti eiaculara, altera intro ceu à quopiam attracta, atque vna moueri citate, altera tarde. Iam vehemens quoque & magnus hic pulsus videtur esse, non tamen perinde, vt videtur, vehemens est & magnus. Idus e-

nim imponit, dum ob tensionem validus, ob vibrationem exilire apparet. Quamobrem altior interim videtur, ac veluti strepitum quendam ad tactum edit asperum. Sane neminem, qui quidem sit expertus, fugiat hic pulsus. Dictus est conuulsus pulsus tum quod arteria ad vtrumque terminum tendi videatur, tum quod conuulsio statim ab eo pulsu hominem corripit, vt scripsit Gal. lib. de causis pulsuum 2.

*Σπασμὸς ὡς ἡ δισχόρησις*, hoc est humida deiectio, apud Hippocr. ὡς τὴν ἀπὸ διαρρῆς ἐξίαν. vt Gal. interpretatur.

*Σπέρμα*, dispergere & ab inuicē separare. Sic sæpius Græci vtuntur. vnde *σπέρμα δισχόρησις* dicuntur morbi dispersi, scilicet qui non multos, sed seorsum vnumquemque, prehēdunt, ex Galeno, initio comment. in Epidem. 2.

*Σπέρμα*, semen. Est principium nostræ generationis. Duplex est, virile & fœmineū. Differuntque multum ab inuicem, adeo vt alterū materiæ, alterū formæ rationē habeat, sicut Gal. in libris de semine explicauit. Arist. tamen subtilius de eo differens, *σπέρμα* & *σπέρμα* distinxit, vt suo loco videre licet. *σπέρμα*, etiam fructum significat apud Hippocrat.

*τὸ δὲ σπέρμα τὸν*, Trōchisci nomen est apud Paulum 1. 7. c. 12. Similiter nomē est malagmatis, quod ab eodem describitur libr. 7. cap. 18. Est & epithematis nomen, quod apud Actium est, tetrab. 3. serm. 12. ad splenis inflammationem descriptum.

*Σπέρματις ἀρτηρία*, spermaticæ arteriæ. Sunt duæ arteriæ, vna dextra, altera sinistra, à trunco arteriarū magnæ descendētis exortæ, & in testes demissæ. Descendunt autem eo vna cum venis spermaticis, & peritonæo elapsæ ambagiosæque delatæ, in testium tunicas & substantiam absumuntur in viris. In mulierum vero testes tantum abit horum vasorum dimidium, reliquum autem in vteri fundum & latera spargitur.

*Σπέρματις φλέψ*, spermaticæ venæ. Sunt venæ duæ in testes demissæ, sanguinem spermatis materiā ad eos deferentes. Earum vna dextra est, altera sinistra: dextra à trunco venarū cauarū inferioris sub dextra renali seu mulgentē venā nascitur, sinistra vero à medio sinistræ renalis siue emulgentis. Vtraque in viris quidem in testium tunicam & substantiam absumitur, furculis aliquot tenuibus in suā peritonæi apophysim sparsis: in mulieribus autem dimidio in testes, altero dimidio in vteri latera & fundum nutriendum, quo etiam menses fluunt. Cæterum venæ illæ à sua origine deducuntur in testes inuolutæ, intra ventrem quidem peritonæo, extra ventrem vero erythroide tunica.

*Σπέρματις πόρος*, dici quidē possunt vasa omnia per quæ semen deferretur, proprie tamen sic appellatur vasa duo à testibus sursum ascendētia & in *σπέρματις* aduocata inserta, semenque eo deferentia. Hæc enim à testiculis

prodeuntia, & ad posteriorem pubis osis sedem reflexa tecta que peritonæo, sensimque mutuo appropinquantia & latiora crassioraque facta tandem inter se coeunt, vnumque corpus efficiunt, quod se in *σπλην* aduocandi insinuans, inseritur & dehiscit in vtrethram sub initium cervicis vesicæ, semenque in eam excernit.

*Σπλην*, festinans. assidua, apud Hipp. sicut Galen. in suo lexico annotauit.

*Σπλην*, mensura est quæ rerum intervalla metiuntur. Est autem tritum palmorum siue duodecim digitorum, quantum scilicet digitis extensis intervallum est inter minimū digitorum & pollicem, vt interpretantur Pollux & Hesychius. Latini dodrantem vocant, quod dodrans nouem vnciarum sit, quæ item duodecim efficiunt digitos, vel ex similitudine & proportionem quam habet libra cum pede. Est enim dodrans nouem vnciarum, hoc est tres quartas partes libræ continet. Sic & *σπλην*, quæ digitorum est duodecim, dodrans esse videtur pedis, in quo sedecim digiti continentur. Plinius libr. 7. cap. 2. Super hos extrema in parte montium Pygmæi narrantur ternas spithamas longitudine, hoc est ternos dodrantes, non excedentes. Ea mensura non raro vitur Dioscorides, & verbis ab ea deriuatis, quæ sunt *σπλην*, *σπλην*, *σπλην*.

*Σπλην*, non intestina dicuntur, sed præcipua interanea & vitaliora, vt cor, pulmo, iecur, & similia quæ in casis victimis aruspices considerabant si quid portenderent. Sumptum est enim ab aruspiciis id vocabulum, deinde ad omnes animalium partes intrinsecas translatum. Celsus viscera Latine vocat & ab intestinis distinguit, alii exa interpretari malunt.

*Σπλην*, dicitur à quibusdā iunctis odoratus, auctore Dioscoride. Hic arboribus innasci solet, vt cedro, pice, populo albæ & quercui, odoratus. sunt qui *σπλην* *ἀρωματιστὸν* appellent. de eo intelligendum est quod scribit Aetius tetrab. 3. serm. 4. ad podagricos & articulorum dolores, dicens, mulci, quisplanchnon & hyphnon & bryon Græcis appellatur. Video nomen hoc *σπλην* à quibusdā scribi.

*Σπλην*, lien. Est pars corporis rara, spongiosa, nigricans, ventriculo sinistra parte incumbens, & sanguinem humore atro repurgans. Sicut iecur videtur esse putioris sanguinis quædam affusio & concretio, ita & lien nigrioris & sæculenti: ob idque vtriusque visceris carnem Erasistratus *σπλην* appellauit. Quia autem nigro sanguine compositus est, iccirco non modo nigricat, & prominentibus quibusdā tuberibus inæquatis est, sed etiam familiaritate suæ substantiæ quicquid attri humoris & sæcis est in sanguine, ad se attrahit. Hoc enim illi à natura proprietributum est. Trahit autem per eum venæ portæ rami qui superior & minor est. Accius

quidem sæcis parte sibi cognata magis & familiari, per arteriarum præcipue calorem & motum elaborata nutritur: reliquum autem excernit nunc in portam & intestina per eundem portæ rami, nunc in ventriculi latus sinistrum, per insignem venam ex summo aut propinquo in lienis sima ramo prodeuntem: nunc in sedem per hæmorrhoidas, nunc in renes per arterias ab aorta supra renes natas. Id quoniam debuit esse sæculenti sanguinis receptaculum, præuidens naturæ facile obstrueretur, duo præsertim illi remedia comparauit, substantiæ raritatem & arteriarum copiam. Est enim valde laxus & spongiosus, habetque tum plures tum grandiores arterias quam magnitudini suæ conueniat, ab aorta qua per lumbos fertur prodeuntes. Situs est in hypochondrio sinistro qua ventriculo incumbit cauus, qua vero septum contingit leuiter gibbus. Tunicam habet à peritonæo, neruulū autem a ramo sextæ coniugationis, qui sinistrarum costarū radicibus inseritur. Neque enim expediebat maiores eum neruos habere.

*Σπλην*, splenica venia. est ramus superior & minor venæ portæ, qui totus per lienem spargitur. Nam cum vena porta in duos præcipuos ramos distincta sit, hic in lienem abit, alter in mesenterium diffunditur. vide *σπλην*.

*Σπλην*, dici quidem possunt omnes quæ ex liene laborant, proprie tamen à veteribus dicti sunt quibus lien obduruit. Sed cum durities pluribus de causis contrahi cœpit, definitionum medicarum auctor, duritiæ hæc è phlegmonē nec concōcta nec digesta contractam intelligit, duoque eius symptomata recenser, defluxiones, & sædum corporis colorem. Non est autem eubium lienosos euadere à copia melancholici humoris licni infarcti. Ex quo fit, vt eo sub morbi finem crissimque per aluum erumpente, dysenteria prompte exciteretur. quæ si diutius persequeretur, omnino lethalis est: sin breui finiatur, magnā ex parte salutaris est, quemadmodum apud Hippocr. Aphor. 43. & 48. libr. 6. scribitur.

*Σπλην*, linteolum vel emplastrum appellatur, non oblongum tantum, vt Hesychius interpretatur, aut splenis, vt alii, figura, sed quacunque forma ad partium corporis habilitatem aptatum, quo exceptum vel illitum medicamentum adhibetur. Dicitur & *σπλην* à medicis. Galenus Hippocratem id genus linteoli excogitasse ad stabiliendas fracturas libr. 6. methodi med. tradidit his verbis: *ὅτι ἐν τῷ σπληνὶ ὁ πρῶτος, ὁ δεύτερος αὐτῶν ὁ σπλην*. hoc est, vnde ad eorum quidem tutelam remedium ipsis Hippocrates excogitauit, vt splenia adhiberentur. & paulo post ad ossa multifaria contra fracta splenium asciz forma circūdare ex eiusdem Hippocr. præcepto iubet. Nec ossibus modo fractis imponitur, verum etiā aliis partibus, vt fronti in fascio-



lz modum ad leniendos dolores, aut inhibendam distillationem, aut in alium quempiam usum. Non est dubium sic dictum esse à lienis figura longa magis quam lata.

*Σπληνίων*. dicitur à quibusdam πὸ *σπληνός*, vel quod lienis, qui *σπληνός* vocatur, conueniat, vel quod folia habeat longa lataque in modum lienis. Dicitur & à quibusdam eodem nomine ἡ *ῥιμνίτις*, vt habetur apud Dioscoridem.

*Σπυγίον*. epithematis nomē est ex caprillo stercore compositi, quod mirifice tum per latētes meatus tum per aluum humiditatem educit, cuius meminit Paulus libr. 3. cap. 48. Idem vero malzgmatis nomine appellat lib. 7. cap. 18. vbi eius compositionem describit. Sic dictum est quod spongiæ modo humorem hydropicorum combibat.

*Σπυγίαι*. dicuntur glandulæ quædam ad fauces, vt scribit initio lib. 4. Epid. Hippocrates, aut Thessalus eius filius, cui librum hunc, vt secundum & sextum, tribuit Galenus lib. 3. *περὶ δυνάμεως*. Sic forte dictæ sunt quod spongiarum modo humorem combibunt & continent.

*Σποδία*. est species collyriorum *ἀδινύτων καὶ ἀπαλῶν*. Cuius duas differentias describit Aetius lib. 7. quarū priora Paulo Aegineta exponitur iisdem quidem medicamentis, sed pondere inæquali. Hoc collyrium Scribonius à quibusdam cinereum dicit appellari. Igitur errat qui à spodio appellari scribunt, neque enim spodium quicquam prædicta collyria habent, sed à cinericio colore nomen sortita sunt: *σποδός* enim & *σποδία* cinerem significat. Cæterum *σποδία* collyria omnia vim habent dolorem mitigandi & refrigerandi: & moderate *ἀδινύτων*.

*Σποδίου ἄρτος*. panis subcinericus. refert Galenus in lexico Hippocratis.

*Σποδίου ἡ*

*Σποδός*. est recrementum metallorum ystorum, quod cineris in modum partim fornacum parietibus inhærescit, partim in terram decidit, indeque colligitur: nomen habet à cineris similitudine; & quidam ex Latinis cinerulam dixerunt: nec colore modo cinerē refert, verum etiam grauitate; quibus duobus differt à pompholyge candida & leui, cum tamen vtræque sint eadem genere & ex eadem materia prodeat: ea vt plurimum est æs aut cadmia aliquando tamen ex auro & argento & plumbo nigro secernitur. Proinde diuersas habet appellationes; ærariæ, quæ omnium præstabilissima est: plumbariæ, quam post Cypriam ærariam Dioscorides commendat: aurariæ, quæ teste Plinio oculis est vtilissima: Scargentariæ quam Laurion idem vocari dicit à Laurio Atticæ monte, in quo argenti erant fodinæ. Omnis autem spodos lota & à sordibus, id est, carbonibus, terra, pilis purgata, easdem quas pompholyx vires habet, sed crassiorum est partium. Sunt qui existiment nos vero spodio carere, nostrumque non aliud esse quam

ebur vltimum, aut aliud ossis genus. Auscenna autem scripto testatus est spodium cinerem esse radicum cannarum exustarum: verum hæc nō sunt spodium, sed verius *αὐτίαν* dicentur.

*Σπυδύλος*. spondylus. vertebra. Dicitur & *αὐτίαν* ab Articis, sicut & *ἀσπράγγος* *αὐτίαν* & *ἀσπράγγου*. Sunt autem spondyli ossa viginti quatuor quibus *ἡ ῥάχις* tota constructa est. Tot enim sunt in homine secundum naturam se habente: aliquando tamen plura aut pauciora reperiuntur. Omnia caua sunt & forata, omnia *διασπῆς*, hoc est, spinam, habent & apophyses transuersas atque obliquoas ascendentes & descendentes: omnia similiter viaculum membranofum intus (præter duos primos spondylos) duas rhachitidis meningas ambiens, & foris alterum ipsa vndique colligans, præterea articulationes sex, duas suo corpore, duas apophysibus ascendentibus & duas descendentibus. Est autem articulationis hæc fere ratio. Primæ duæ vertebræ per diarthrosim coniunguntur, quod capitis motus validus & manifestus sit. Nusquam enim corpore suo (quam ipsorum partem anteriorem vocat Galenus) committuntur vel sibi vel capiti, quomodo inferiores omnes sibi iunguntur, sed prima duas occipitis apophyses *καρповоедης* duabus cavitatibus excipit & secundam dentem transmittit: secunda vero condylo duplici, sed minus extante, primi cavitates duas *γυλωνοειδης* excipit, & suo dente occipiti inter *καρπα* anterius valido ligamento affirmatur. Inferiores autem omnes vertebre sibi articulantur & corpore suo, & apophysibus obliquis ascendentibus & descendentibus, ita vt harum singularum vertebrarum articulationes sint sex, supra quidem tres, & infra totidem, vndique autem foris parte antica valentique iunguntur, & qua parte dorsalis medulla intus partem hanc anteriorem tangit. Sed quæ se vertebræ facie tangunt, ligamenta sunt cartilaginosa & ab vniuersa cartilagine in alterius cartilaginem immissa, tam crebra, vt his plenum sit totum inter duarum vertebrarum cartilagine, quibus vtrique sublimantur, interuallum. Sunt autem apophyses manifestæ vertebris omnibus communes, parte quidem postica spina vna prælonga & fere acuta, soli primæ vertebræ negata, in lateribus vero binæ semper transuersæ & hæc etiam longæ. Inter has autem aliæ vtrique geminæ sed breues, vna vtrique ascendens, altera vtrique descendens, per quas vertebræ inuicem articulantur dupliciter inferiori & dupliciter superiori, vtræque scilicet parte dextra & sinistra. Hæc vero apophyses articulatoriæ (sic enim eas appellare licet, vt à transuersis & spinis separantur) interdum transuersum, interdum suboblique sitæ sunt. Ab osse enim sacro ascendendo, semper magis propinquant transuersis, donec in decima metaphreni vertebra sint

mediz inter ipsas tranſuerſas, vt vna linea cū tranſuerſis collocata videri poſſint. Ad coſtas aut reliquas in t̃ro magis vergunt quam tranſuerſe, & tandem rurlus foras vergunt, donec in ſumma ceruice iterum ſubtranſuerſe ſiant. Et hæc quidem ſunt omnibus vertebris cōmunia: non ſunt autem omnes ſibi ſimiles. Prima reliquis ſolidior, denſior & maiori foramine cauata eſt. ſola caret ſpina, & habet parte anteriore apophyſim exiguam, & in inferiori parte duas cauitates γλυνειδεις. Secunda peculiarem habet proceſſum durum & ſolidum è ſuperiori mediaque ſui parte exorientem, quem à dentis ſimilitudine ὀδὼν vocant, ex quo totam ipſam etiam vertebram ſecundam Hippocrates ὀδὼν appellauit, non autem primam, vt putat Ruſus in partiū corporis onomaſia: alii vero πρὶννοειδὴ ἀπὸ φωνῆ nuncupant. hic in primæ vertebræ cauitatem ſubit. Ab his vertebræ ſunt tertia, quarta, quinta, ſuperioribus longe minores, quarum tamen quinta maxima eſt. Sexta non modo his tribus maior eſt, ſed etiam ſeptima. A ſexta autem vſque ad infimam rhachim, inferior ſuperiore maior eſt proportionem quadam. Magnum vero ſpondylum Galenus comment. 3. οὐδὲ ἀρσενον interpretatur ſecundū, qui in fauces conuerſus eas angit. nec multo poſt eodem libro magnum ſpondylum appellat infimum lumborum aut ei proximum. Paulo poſt magnum videtur innuere ſextum ceruicis aut ſeptimum. Cæterum vertebræ omnes in tres ordines diſtinguntur: ſunt enim ceruicis ſeptem dorſi duodecim, lumborum quinque. Inter quas facile eſt dorſi vertebras ab aliis diſcernere. ſingula enim dorſi vertebræ vnā vtraque parte coſtam emittunt. Ex his autem decima vertebræ peculiare & proprium quiddam habet: dicitur enim à Galeno ἀρρεπῆς, hoc eſt, ſpinam habens in neutram partem, ſiue nec ſurſum nec deorſum repentem, qualis hominibus huius ſeculi frequenter eſt vndecima, & hac frequentius duodecima, raro autem decima. Cum enim rhachis tota ſit tanquam arcus quidam, eius ipſius ceu clauis, vt vulgo vocatur, eſt decima vertebræ, quæ velut lapis aliquis motu recto delatus, nutantes ſurſum aut deorſum alias vertebras figit & ſirmit.

Σπινεῖς φλέβες. dicuntur à Galeno lib. de anat. venarum, & libro 3. adminiſtr. anat. venæ aliquot per cutem modicis interuallis ſparſæ.

Σπινεῖς ῥιζῆς. diſperſi morbi, qui etiam ἀνογδῶν appellantur. Sic dicuntur qui ſingulos ſeparatim corripiūt. plures ſunt ſimul morbi vagantes & genere diuerſi ſiue pernicioſi ſiue mitiores, quorum alius alium inuadit. Non ab aere, ſed à victus ratione naſcuntur, quam ſinguli habent propriam & peculiarem. Itaque non vnum morborum genus ſic dicitur, ſed differentes ſunt morbi. vide ἰατρικόν,

Σπινῆς. dicta ſic eſt prima pars hyemis à veteribus Græcis. nos ſementem poſſumus appellare. vide χερῶν.

Σπινεῖς διὰ χειρῶν, dicuntur ſect. 2. prorrheth. excrementa πῖς ἀνογδῶν ſimilia. Sunt autem οἱ ἀνογδῶν, caprarum ſtercora ſicca & rotunda.

Σπινῆς. thus maſculum, quod eſt ſua præ natura rotundum & guttæ ſimilimum. vide λιβανός.

Σπινῆς. Dioſcorides interpretatur, ſtadiis meſurans ambulationes. vt refert Gal. in lexico Hippocratis.

Σπινῆς. eſt inchoata ſātum nec abſoluta ὀήσις. Fit cum calor externus agit in humorem eius quod aſſatur, ſed tamen imbecillior eſt quam vt eum perfecte poſſit concoquere. Eſt inconcoctio, vt ſcribit Ariſtoteles, contraria τῇ ὀήσει, quemadmodum & μέλαισις τῇ ἐλάσει oppoſita eſt. Ariſtoteles tamen minus appoſitum ὅτι αὐθιγῆς nomen eſſe ſcripſit ad eam rem ſignificandam, ſed tantum ſimilitudine quadam ſic dici poſſe. Verum Helſychius ita interpretatur. αὐθιγῆς, ἢ τῇ πυρρῇ ἢ χυλῇ αἱ κρῖς καὶ αὐθιγῆς, πρὸς τοῖς ἰσχυρίσμα. hoc eſt, igne medico temperate carnem reſfacere: & αὐθιγῆς, quod modice aſſatum eſt. Scribitur & à quibuſdam αὐθιγῆς, poteſtque permitti, cum αὐθιγῆς αἱ ἢ ἡ αὐθιγῆς & Græci dicant. Ariſtotelis interpretes exalationem ſatis apte reddidit.

Σπινῆς. ſunt magnum aliquod pondus. Ea autem ſunt, quibus vt conſueuimus, libralia pondera ex ære, aut ferro, aut plumbo conſtantia. Gal. in lib. de fracturis commentario. 2.

Σπινῆς. geminam habet ſignificationem. designat enim & pinguedinem ſiue adipem, & fermentum ſiue farinam aqua ſubactam, vt exponit Helſychius. Idē proriſus quod σῆμα, de quo poſtea.

Σπινῆς, ſiue κοῖα σπινῆς. eſt lixiuium liquidum ex quouis cinere colarum, ſic dictum quaſi ſtillatitium. Significat etiam calcem perinde atque ἡ κοῖα. Quæ vocis ambiguitas magnam plerique errorum occaſionem præbuit. Sed teſte Dioſcoride σπινῆς vocatur pinguitudo recentis myrrhæ, cum exigua aqua tuſæ & organo expreſſæ. Ea perquam odorata ac pretioſa eſt, atque vnguentum per ſe facit quod σπινῆς etiam nominatur. Maxime probatur quæ nullam olei miſtionem admittit. Vim caſticatoriam myrrhæ & calidis oleis reſpondentem habet. Officinis ſtyrax liquidus vocatur.

Σπινῆς ἢ

Σπινῆς. collyrii nomen eſt apud Scribonium & Paulū, quod Galenus οὐδὲν appellauit: variat tamen ab inuicem eorum deſcriptiones, præſertim ponderibus.

Σπινῆς. deſtillatio & fluxio à capite, vt exponit Galenus. Sic dicitur & calcanthi genus puriſſimum ſtiracis feu guttæ ſimile. Dioſcorides σπινῆς, Plinius σπινῆς vocat.

**Σταφύλια**. sunt collyria quæ inordinarū fluxionis impetum sistunt. plures sunt eorū differentiarū, Hærmolai, hexacontarchia, hecæontarchia. omnia refrigerant & adstringunt & quadamtenus desiccant, alia magis alia minus. Aetius.

**Σταφύλη**. vna passa est omnis vna insolata, vt seruari possit. Non est dubium qualis vna fuerit secundum naturam, talem etiam esse eius facultatem postquam solem passa fuerit: dulcem scilicet ex dulcibus, austerum ex austeris, mistum ex iis quæ vtriusque qualitatibus sunt particeps. Stomachum & iecur maxime iuuant.

**Σταφύλη ἀγρία**. herba pedicularis. folia habet labruscæ diuisa, & cauliculos rectos, molles nigrosque, fert florem glasti, folliculos virides, similes eiceti, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Vehementer acré obtinet facultatem, abstergitque valenter, & vrendi vim aliquam habet.

**Σταφυλεπάρης**. instrumētum chirurgicum quo vna fluxione laxior attollitur. dicitur & **σταφυλάριον**. Eius meminit Paulus libr. 3. capite. 26.

**Σταφυλή**. sunt qui eo nomine omnem columellæ siue curculionis inflammationem appellari crediderint, inter quos fuit Archigenes, quem propterea Galenus reprehendit libr. 6. **ἡ σταφυλή**. Alii vero, vt idem scribit, foedius aberrarunt, eo nomine partem ipsam secundum naturam se habentem intelligentes. Neutrum enim **σταφυλή** significat, sed eius partis affectionem, cum ea laxior ex fluxione reddita, superna sui parte tenuis est, inferna autem crassior & liuida. Sic enim euadit **ἡ σταφυλή**, hoc est, vna vitigineæ, similis e pedunculo suo dependenti. Vnam autem hic intelligere oportet non totum botrum siue racemum, nō acinum, sed granum quod **ράχα** Græci vocant, à quo tunica oculi **σταφύλη**, vniuersalis Latine dicta, nomen accepit. Ei quidem nihil similis est curculione sic affecto. Pars enim superior tenuis gracilisque apte respondet vnae pedunculo, inferior autem crassa, rotunda, nigra, ipsi grano similis est: sed neque magnitudo dispar. Sic quidem Galeno **ὁδὴ σταφυλῆς** visum est, qui in eo Archigenem taxans, non meminerat opinor, eorum quæ scripto prodiderat Aristoteles libr. 1. de histor. animal. cap. 11. columellam, si immodice humefacta intumescat inflammeturque, vna nomine vocari. Veruntamen si quis rem diligentius expendat, non ipsa inflammatio nomen hoc mereatur, sed potius inflammationis symptoma, quum scilicet columella inflammata figuram eiusmodi sortita fuerit.

**Σταφυλίνη**. pastinaca. herba est foliis gingidii, latioribus, subamaris. caulem habet rectū, scabrum, umbellam anethi similem, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata.

**Σταφύλωμα**. differentia vna est & **σταφύλωσις**, cum scilicet erosa ruptaue cornea tunica, altera ei subdita quæ **σφαγελίς** dicitur, excidit ad eū modum, vt acinum vnae repræsenget. Cum enim infra istum modum excidit, **μυελόφραγμα** cum modum hunc superat, **μύλη** vocatur, vt docet Paulus libr. 3. cap. 22. Interdum vero aliter fit **σταφύλωμα**, sine rupione aut erosione corneæ, quando ipsa cornea intumescit certa quadam parte, atque attollitur, & prominet in modum acini vnae. Id quod plerūque contingit ex defluxione, humoribus intra corneam coaceruatis, quos ea propter imbecillitatem sustinere non valens, laxatur & quasi incuruat, apparetque veluti acinus vnae exertus, qui **staphyloma** appellatur. Differunt inter se hæc duæ species **staphylomatis**, quod vna integra fiat cornea tunica, tumorque ipse candidior appareat, altera vero fiat eadem rupta aut erosa, in qua quod prolabitur, cæruleum aut nigrum cernitur. His addit & tertiam speciem Aetius libr. 7. capite 34. scribens aliquando **σταφύλωμα** fieri ex pustula quadam inter strias corneæ tunice satis profunde excitata, quæ tunicam attollat, non tamen rumpat. Causæ huius affectionis variæ esse possunt, sed quæcūque ea fuerit, certum est visum omni **staphylomate** aboleri.

**Σταχυς**. frutex est marrubio similis sed lōgior, folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædurā, cauā, odoris iucundi, & complures virgas ab vna radice exeuntes, marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem: gustus est amaro. Excalfacit terrio ordine.

**Στέαρ**. sebum siue seuum. Est oleosa & pinguis substantia adipe siccior magisque concrescens. Eiusdem est cū adipe generis, **πικρὸν** Græci vocant. Vtrumque enim oleosum & pingue est, vtrumque sanguis est concretus per bonitatem nutrimenti. Differunt autem, quod **στάρ** fragile vsquequaque sit, nec ad ignem admotum tā facile liquecat, & cum refrigit, denuo concreseat, vt ovis, vt capræ: **πικρὸν** liquidior sit, mimineque apta durari, oleo longa vetustate in crassum similem, vt equi, vt suis. Locis etiam discrepant. **πικρὸν** inter carnem cutemque solet consistere, **στάρ** in fine carnis semper est, quæ parte vtraque detrata sunt animalia, adipe pinguescunt, quæ vna, sebo. Generatur autem ex sanguinis parte pinguiore per tenues venas effusa, circa partes animantis membranosas ac nervosas, cui concretio ideo contingit, quod membranis adiacet. Crasso namque oleo est similis, eoquē congelatur, vbi cum frigidis & exanguibus particulis coniungitur. vide **πικρὸν**.

Nec vero sebum modo aut adipem **στάρ** significat, sed etiam, vt Hesychius exponit, **ἡ μύλη καὶ ἡ ἀλευροίς**, hoc est, fermentum & farinam, aqua videlicet subactam in panis aut offæ formam. Id quod ipse Hesychius adhuc euidentius declarat, vocem **στάρ**

μαρτυρία exponens, ac dicens esse *σιαν* id est *ταῖς χερσὶ ἀπὸ μέρους αὐτῆς δεικνύται, βελόνης δὲ πρὸς τὴν αἰσθητικὴν δὲ δεικνύται*. Intelligit enim quadras ex pane in quibus digitos tergere soliti erant veteres, easque postea canibus obducere. Sic non est aliud *σιαν* quam *σίαν*, hoc est, fermentum & pollen subactus, etiam si id absurdum Marcello videatur apud Dioscoridē cap. de stibio. In hac ergo vocis ambiguitate diligenter videndum an pro adipe, an pro polline *σιαν* accipere conueniat, cum nec ipse Plinius errorem in eo vitare, potuerit, conuertens quæ de scilla & stibio, polline vel fermento illinendis memoriz prodidit.

*Σταν* *ιδιων*. Adeps in aromate & aqua coctus, vt exponit Galenus in lexico Hippocratis.

*Σπέρμα*. affectus est scroti succrescente in eo seuo, vt refert author introductorii.

*Σπέρμα*. est tumor præter naturam, mali coloris, tactu lenis, primum pusillus, temporis progressu amplior, adipem intra se membrana conclusum habens. Differt à strumamollitie, quæ nota etiam à meliceride & atheromate discernitur. Magna ex parte basim habet ampliorem, raroque contingit vt basis angustior, & apex amplior reperiat. In genere apostematum est, eo maxime à reliquis differens quod in eo pingue quiddam ceu adeps subest, tunica conclusum, ideoque sola chirurgia curari potest, quod adeps qui in eo continetur, nec putrefieri possit nec digeri.

*Σπυγία φάρμακα*. stipantia, obstruentia, siue contrahentia, siue occludentia medicamenta. Dicuntur proprie quæ oscula vasorum claudunt, & sensibiles vacuationes supprimunt. Corpus enim quod *σπυγία*, hoc est, claudit ac continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi, ex sese emitit, Græci *σπυγία* appellant. Est autem eorum substantia crassarum partium, frigida & adstringens, & expers acrimoniæ. Talis enim substantia aptissima est contrahere & occludere aperta præter naturam vasorum oscula, vt cui omnia insunt quæcunque requirunt ea quæ contrahi debent. Siquidem consistentiæ crassitudine foris incumbit, nec paruos meatus penetrare potest, tum frigiditate sua intro premit, atque vndiquaque in sese contracta vicinaque corpora cogit & contrahit, & quia desiccatur, humorem depascitur partemque roborat. Quorum quidem omnium concursu efficitur, vt osculum claudatur, à partibus adstringentis substantiæ tanquam foris à manibus contractum. Sunt autem *σπυγία* opposita *πρὸς ἀσθενήματα*. Differunt vero *πρὸς τὴν πυκνότητα*, hoc est, à condensantibus, quod illa vasorum oscula, hæc cutis poros siue meatus occludant: neque enim vt *πυκνότητα* terrenam habent substantiam, sed aqueam magisque imbecillam. Cæterum *σπυγία* aliis nominibus, vt ait Gal. *σπυγία*, & *σπυγία* possunt appellari. Talia quidem sunt quæ proprie *σπυγία*

appellantur. Verum notandum est, vt ait Gal. non sic proprie, sed nomine generis appellari. *σπυγία* enim significat generaliter omnem obstructionem tam osculorum vasorum, quam meatuum corporis. Sed meatuum quidem obstructionem Græci *πύκνωση* vocant, non habentes autem nomen quod eam quæ in vasorum osculis fit designarent, generis nomen ei commodarunt, vt & in multis aliis rerum differentiis factum est. *σπυγία* tamē videtur eam nominare in initio lib. 9. methodi & similiter Paulus lib. 2. capite 23. scribens *σπυγία* dupliciter fieri, *ἢ διὰ τὸ ἐμπεριέχειν, ἢ διὰ τὴν πυκνότητα*. hoc est, vel propter obstructionem, vel propter pororum densitatem. At cum talis quidem sit *σπυγία* natura, non longe abest à recto loquendi vsu Hippocrates, qui sect. 4. *σπυγία* dixit pro alui suppressione, casei incommoda enarrans, sicut Galenus eo loco annotauit.

*Σπύλαι*. superregere, inungere. vt refert Gal. in lexico Hippocratis.

*Σπλεγμα*. dicitur à quibusdam vena illa magna quæ à sima iecinoris parte exoritur & quam portam vulgo vocat. vt apud Galenum lib. 6. administ. anat. & de locis affectis libro 6. cap. 4. Est enim aliarum velut quidam truncus. vide *φλέψ*.

*Σπυγία*. sic ab Atticis appellabatur oliuarum partes solidæ postea quam oleum est expressum, vt scribit Galenus lib. 2. de alimentis.

*Σπυγία* lora, quam alio nomine Attici *σπυγία* appellant.

*Σπυγία*. arctus, angustus, & *σπυγία*, locus angustus, siue angustia. Galenus quoque in lexico suo Hippocr. *σπυγία* constringere & coarctare humorum meatus & siccare, scribit significare.

*Σπυγία*. à quibusdam dicitur *σπυγία*, id est, vmbilicus Veneris, sicut habetur apud Dioscoridem. dicitur etiam & à quibusdam *πρὸς ἀσθενήματα* siue sedum maius, quod amatoris credatur conuenire.

*Σπυγία*. pectus. Hippocrates *σπυγία* vocauit, vt annotauit Galenus. est pars thoracis anterior clauibus subiecta, in quam costæ copulantur. Ea constat ossibus septem, vt ait Galenus, quorū scilicet costæ sunt quæ ipsis inarticulantur. Nunc autem numerus non apparet idem in omnibus sceletis. Nam quibusdam duo tantum sunt manifesta, in plurimis tria manifestam habent circumscriptionem, in aliis quatuor, quinque, aut sex. Septem vero nunc rariora sunt. Sed quot sunt, sibi inuicem tam exacta harmonia coniunguntur, vt eorum sternon os solidum esse appareat. Tenerum admodum est recens natis, vt ossium pars plurima & epiphyses omnes, nil aliud quam cartilago. Deinde vero in medio inter costarum articulationes paulatim siccescit, vtque tamen vnumquodque eius os rotundissimum est. Quod reliquum est omne singula hæc ossicula ambiens, cartilago adhuc est, costarum cartila-

cartilagini tam simile, ut idem videri possit. Caterum parte sterni una cartilago triangulari adnascitur, quam *ὑποστέφυον* appellant, etiam si hoc nomine plerique non illam cartilagine, sed totum sternon vocent, quod vna cum ea cartilagine gladii figuram representet. Nam sternon manubrio, cartilago gladio similis videtur.

*Σφαῖρα*. corona. pars est capitis inter sinciput & occiput media, *ἡ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ σφαίρου ἴση μὲν*, hoc est, circa quam coronas indimus. Sic etiam dicitur extremus capillorum ambitus, qui alio quoque nomine *ἡ ἐξέστροφος* vocatur. Etiam locus est in oculo, quo committuntur inter se tunica vniuersa: vel circulus est in oculo, inter album oculi & pupillam medius. Hic autem circulus ita se habet: Crystallinus humor in vitreum humorem inseritur, & medius in ipso quasi in aqua vehitur, eodē prope modo quo sphaera globusue, cuius dimidium extra aquam promineat. Hæc humorum connexio in crystallini medio hemisphærio, in utroque humore circulum vnum efficit, qui terminus est finisq; omnibus oculorum tunicis. Desinunt enim omnes ad circulum eundem, ubi nigo oculi iungitur album, & propterea *σφαῖρα* vel etiam *σφαῖρον*, id est, coronam, vocauerunt. Alii vero *ἵεον* ab arcus cælestis similitudine. Hic enim locus, ut ait Galen. si omnia probe dissecueris, diligenterque omnia perspexeris, nihil confundens, circulos ostendet plures, nempe septem, sibi mutuo incumbentes & coherentes, crassitudine coloreque varios, ut ne si velis quidem locum hunc aliter quam irim appellare queas. Horum primus quidem maximusque est humoris crystallini: secundus autem vitrei supremus atque extremus est, eorumque vterque ad iridem, communi quadam insertione atque plexu per arachnoideam connectitur: tertius extremus retiformis tunica est: quartus *ἡ ὑποστέφυον*: quintus ipsius duræ membranæ: sextus ex alia quadam membrana insertus est, quæ ex musculorum aponeurosi & tendinibus originem habet: septimus adnatæ membranæ est ex pericranio genitæ, sicut Galenus libro 10. de usu partium explicauit. Rufus etiam *σφαῖρα* appellari dicit ciliorum extrema per somnum sese contingentia, & alio nomine *χαλῶν*, dicitur & *σφαῖρα* à quibusdam *ὁ δακτύλιος καὶ ὁ ὀφθαλμῶν* propter rotunditatem.

*Σφαῖρα*. dicitur à quibusdam *ὁ δῆμος*, ut habetur apud Dioscor. Sic etiam eodem auctore dicta aliquando est *ἡ δάφνη ἀλκιμάδεια*, quod ex ea victores coronarentur. Apuleius habet *σφαῖρα ἀλκιμάδεια*.

*Σφαλαιὰ ραφή*. coronalis sutura. Est sutura anterior cranii ab vno temporum ossis ad alterum transuersim perueniens. sic dicta est, quæ ea capitis parte ubi est, coronæ gestari soleat, vel quod in orbem frontem cingat. vide *κρανιον*.

*Σφαλαιὰ φλέψ*. coronalis vena. Est propago

veniens à magno trunco venæ cavae sursum ascendenti, cingens cordis basim in modum coronæ. Ea quidem magna ex parte simplex est, interdum tamen gemina apparet. Distribuitur autem in partem cordis externā. Est & alia venæ causæ propago, quæ *σφαλαιὰ τριφυλὴ* appellatur. Proficiscitur autem à ramo splenicæ venæ causæ, & ad stomachum effertur, ibique bipartita ramo maiore seu corona stomachum totum cingit, ramulis sursum ad œsophagi finem, & deorsum in ventriculum demissis: minore autem ad pyloron descendit, ramulis obiter ante & post distributis. Quemadmodum autem à vena cava coronalis hæc vena proficiscitur, sic à magna arteria statim ubi à corde orta est, arteriæ duæ *σφαλαιὰ*, hoc est coronariæ, prodeunt, maior sub valvula dextra, minor sub postica, quæ in cordis superficiem & eius partem crassiores perinde ac venæ distribuuntur.

*Σφαλαιὸς*, est vinculi genus quod coronarum modo inter frontem & verticem tendit, ut scribit Gal. lib. de fasciis.

*Στέφανος*. corona. est, herbarum florumque cōtextus ad voluptatem vel sanitatem comparatus. Plinius & Plutarchus in suo conuiuio solam in coronis odoris necessitatem à veteribus quæ sitam esse prodiderunt, ideoque frequentem illis fuisse coronarum usum in cœnis, epulis, comestationibus, sacrificiis, pompis, lætitiæque omni. Veruntamen præter voluptatem valent etiam coronæ ad firmitatem corporis, vegetiores tranquillioresque sensuum nostrorum habitus & motus. Id quod eo opere Plutarchus etiam docuit, rosas & violas adstringere dicens, odoreque suo capitis grauedines pellere. Angulosi vero odorati iunci florem, crocum & baccharim ad placidam somni quietem potos perducere, ob leuem mitemque odoris & halitus sui fluxum, quo in ebriorum corporibus obortæ inequalitates & asperitates sensim extenuentur & dissipentur, concoquanturque crapulæ, illata veluti in pelagus tranquillitate. Id ipsum pariter Plinius docuit, purpureis violis tribuens crapulam & capitis grauedines impositis coronis & olfactu discutere. Hic quondam usus, ratio, & fructus coronarum fuit: & quæ id possent plantæ aut totæ aut earum partes, *σφαλαίωμα καὶ*, id est, coronariæ, dicebantur. Sunt enim, ut ait Theophrastus, in aliis ad coronas utiles tantum flores, propterea quod odorati hi tantum sint, ut in violis: in aliis folia, ut in malabathro: in aliis tota materia, ut in serpyllo, campana inula & sisymbrio.

*Στέφανος*. dicitur tunica ea quæ cornu est specie, paulo supra locum quo committuntur inter se tunica vniuersa. Alii *ἵεον* locum hunc nominant. Gal. ad finem lib. 14. meth. med.

*Στέφανος ἀλκιμάδεια*. sic dicitur à quibusdam *ὁ δακτύλιος*, pro quo apud Apuleium est *σφαῖρα ἀλκιμάδεια*.



Στηθίσκιον. pectusculum. media pars pectoris.

Στηθισκίδης. γαστροσκίδης, hoc est, vëtrofus. apud Hippocratem dicitur *σκήμα χαλκίδης ἢ σμινίς*, hoc est, de eo gladiolo quo chirurgi vtuntur: & specillum siue gladiolum latum significat: siquidem acutum *ἔξυλον* appellat.

Στήθος. pectus. Dicitur ab Hippocrate, vt Galenus annotauit, non omne id quod est à priori parte thoracis, sed medium os in quod se inferunt costæ; quod iuniores medici *σέρπον* appellant. vide *σέρπον*.

Στήθος. etiam dixit Hippocrates in pede imam eius plantam, quam anatomici *πέδιον* nuncupant, vt idem Galenus annotauit: quamquam sunt qui eam pedis partem quæ post eius cauum iuxta digitos attollitur, *σύντος πώδός* appellant, & similiter in manu *σύντος χάρης*, eam partem quæ huic proportionem responder.

Στλοισκίδης, vide *συλοισκίδης*.

Στήμα. penis. virile membrum, quod & *αἰδίδιον* & *καυλός* dicitur. Rufus definit *στήμα* dici τὸ ἐκκρεμές τῆς αἰδοίου, hoc est, partem pudendi pendulam & prominentem: eiq; subiectam quæ non propender, *ὑπόστημα* & *σείνωμον* appellari.

Στήριγμα. dicitur ab Hippocrate *ἐκ τοῦ κατ' ἰνσπρίον* partem agræ adhibiturum firmamentum, quod iniecta quidem fascia fit, sed sine vinculo. Conuenit partibus illis quarum motus necessarius est, à quo cessatio non est in nobis, eoque differt *σπῶν* & *ἐρείσμα*, vt annotauit Galenus comment. 3. *εἰς τὸ κατ' ἰνσπρίον*.

Στῆπώδες. contracte pro *σπατῶδες*, Adiposum, vel Adipe obesum, apud Hippocratem vt annotat Gal. in Lexico.

Σπῆα. calculus, lapillus. vide *σπῶν*.

Σπῆς. stibium. Est species τῆς σίμμεως splendidissimi, emicantis, crustosi, nitidi & friabilis, quam alii *πλευρόφθαλμον* appellarunt. Alii vero *σπῆς καὶ σίμμι* nihil differre putant. Paret tamen ex Dioscoride optimum genus τῆς σίμμεως *σπῆς* nuncupari, & fœminam esse, & mari eo in genere præferri. Nam cum τὸ σίμμι diuidatur in marem & fœminam, vt alia multa, mas, vt ait Plinius, scabrior, minus ponderosus, minus radians & arenosior est.

Σπῆμαλα. dicuntur notæ quæ in facie aut alia quapiam corporis parte infliguntur, quales (inquit Aetius) videmus in manibus eorum qui militiam exercent.

Σπῆμι. stibium. Est lapis metallicus colore nonnihil similis lapidi plumbario, sed magis nitens & candidus. Accedit autem & colore & nitore ad argenti spumam, quam obrem propter similitudinem à Plinio spumæ lapis candentis dicitur. Diuiditur in marem & in fœminam: horridior, inquit Plinius, est mas scabriorque & minus ponderosus; minusque radians & arenosior: fœmina contra nitet, friabilis fissurisque dehiscens, quod genus Dioscorides manifesto scribit *σπῆς* appellari. Est autem *σίμμι* tam simile, plumbo,

vt si paulo magis concremetur, in plumbum vertatur. Vstum autem antiquitus formabatur in pastillos, quibus quia forte Hippocratis tempore erat quadrata tesserarum figura, ipse *σπῆς τετραγώνος* appellat. Vim habet refrigerandi, siccandi & adstringendi, quocirca valet ad oculorum collyria. nigro etiam colore tingit, atque iccirco id mulieres ciliis illinunt, qua de causa Grecis *γυναικίων* dictum: quia vero artificiosa hæc tinctura oculos dilatare videtur, iidem *πλευρόφθαλμον* vocarunt.

Σπῶν. calculus, lapillus. *σπῆς* enim dicuntur iuxta mare calculi: & inde *σπῆς* & *σπῆς* durum significat. vt refert Galenus in lexico Hippocratis.

Σπῶρα. hoc est aridæ & contractæ. Gal. in lexico Hippocratis.

Σπῆς. stœbe. est herba aculeata tum caule tum folio, semine molli, rubido, radice pecoris pabulo gratissima, non alibi quam in aquaticis nascens. Eam à quibusdam vocari phleū Plinius author est. adstringunt folia eius & semen.

Σπῆχας. stœchas. Est herba tenuibus furculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu & aliquantum acris. Hanc hodie officinæ vocant sticados citrinum. nanque frutex ostenditur furculosus, odoratus, ramulis exilibus, folio hyssopi, gustu amaro, semine minuto, capitulis luteosis ex concoloribus flosculis compactis, quare citrinum vocarunt. est autem vere Gallicum. Siquidem nasci iuxta Galliam, in insulis eiusdem nominis, è regione Massiliæ, Dioscorides author est. Obseruarunt autem Arabes alterum stœchados genus caule sesquipedali, pallido, coma renui, oblonga, spica sterili, q; suo gentili cognomento Arabicum vocauerunt, eiusdem cuius & Gallicum effectus: utrunq; enim calefacit & siccatur, decoctum ciet vrinas & menses, pectoris leuat dolores, iecinoris & lienis obstructions reserat, & colicos sedat cruciatus. Attramen Galenus, Dioscorides, Plinius, & Paulus vnus tantum meminerunt, estque verisimile Arabicæ stœchadem inter origani genera comprehendi sub onitide.

Σπῆχέον. elementum. Est corpus simplex ex quo quidque primum constituitur. Simplex quidem significat quod non mole sed diuisione minimum est, & in quod vltima resolutio fit: neque enim partes eius diuersi generis sunt, sed omnes homogeneæ & similes. Refertur autem elementum ad aliquid, sicut & pars. Habent enim res singulæ sua elementa, præter illa quæ sunt omnium rerum communia. Sunt autem omnium communia, ignis, aer, aqua, terra: singulorum vero, partes simplices ex quibus componuntur, quæ & proxima & sensibilia elementa nuncupantur. Hæ sunt in homine os, cartilago, ligamentum, tendo, caro, cutis, membrana, vena, neruus, arteria, & reliqua eiusmodi quorum partes vniuersæ eandem inuicem retinent formam. Quod si quis hæc quoque

quoque ex aliis quibusdam elementis fieri dicat & constare, sanguine, pituita, bile flava & atra, is non intelligit quo differat principium ab elemento. Siquidem elementum totum ipsum componit, inque toto manet, & post totius compositi resolutionem per se subsistit, idemque genus necessario habet cum toto: qualitas enim qualitatis, & corpus corporis elementum est, verum hæc non insunt principio, aut si insunt, non necessario insunt. Itaque humores quatuor quemadmodum & semen sanguisque maternus, generationis quidem simplicium partium principia dici possunt, non autem compositionis, quod nec ea constituent, nec in iis præterea feruntur. Neque enim in ossibus & ligamenti species ipsa humorum remanet, neque in eos ipsa resolui videntur. Sed & ipsi ex cibis & potibus pariter generantur, qui rursus quatuor elementis constant.

**Σελιδες.** rugæ quæ in cute fronti prætensa consistunt, quàm *μετωπιδες* vocant, facta inde metaphora est ad sedem, in qua *σελιδες* vocantur rugæ & plicæ, quas etiam *ρυνιδες* nominant, & quæ plus æquo intumescunt in condylomata transeunt.

**Σελιδώδες.** rugosum apud Hippocratem, ut interpretatur Galenus *ὡς τῆς γλώττης*, inde *ἀκτύλος σελιδώδης, μέτωπον σελιδώδες, & σελιδώδες ἔλας*.

**Στόμα.** os. Duobus modis dicitur. primo quantum diducta labra patent: secundo & proprie totum id spatium quod diductis labris ad imas usque fauces interiaceret, in quo dentes, palatum, lingua, gurgulio, & tonsillæ duæ continentur. Hæ enim oris partes nuncupantur, quantum omnium una tunica continua est, etiam naribus communis. Est autem os homini inter animalia parvum, ad portionem scilicet unguis & dentium. Pars est ad maximas vias comparata, via est nutrimenti maxima, communis & publica ad ventriculūque, primumque alimenti principium. Ut enim elixatio & assatio ori præparant alimentū, sic os ventriculo. Nam & in ore aliqua fieri incipit ciborum cōcoctio, mutans quidem alimentum in alteram speciem manifeste, non tamen ad perfectionem transformans: id quod satis longa oratione Galenus libr. 3. de facult. natural. persequitur. Est & os spiritus & respirationis principium, aerem intra se admittens, qui inde partim ad cerebrum, partim per pulmones in cor proficiscitur. Verum potissimum vocis organum est. deseruit autem vel maxime expurgando cerebro, mucus ab eo suscipiēs, sed non minus ventriculo & thoraci & his annexis partibus, per eandem nimirum viam expellens, per quam etiam attrahit. Vicissim aperitur & clauditur: clauditur quidem à musculis temporalibus: hi enim tensi sursum maxillam inferiorem trahunt, itaque os claudunt: aperitur vero ab aliis duobus musculis, qui ab apophysebus *βύθωνες* profecti in partes maxillæ inferiores inferun-

tur, ut docet Gal. de usu part. corp. hum. lib. 11. cap. 4.

**Συμδρῶν.** dictio hæc scripta est ab Hippocrate lib. 2. de morbis popularibus, authore Dioscoride, qui significare dicit loquentis furiose. Alii vero *συμδρῶν* scribunt, & nomen proprium intelligunt. Author Galenus in lexico Hippocratis.

**Στομαχικὰ φάρμακα.** dicuntur proprie medicamenta quæ ad vias, tonsillas & omnes quæ in ore sunt repente inflammationes conueniunt, ut scribit Galen. libr. 6. *τὸν καὶ τὸν*. Generaliter vero dici possunt quæcunque gargarizata, illita, aut alio quouis modo ad mora medentur oris affectibus. Nam & citra inflammationem vlcera admodum humida stomaticis medicamentis curantur, id quod notum esse potest ex Galeno libro 3. meth. med. ubi scribit ad hunc modum: Vlcerum quæ in ore accidunt, quæcunque admodum sunt humida, ea medicamentis egent quæ vehementer siccet, veluti diphryge, tum ipso per se, tum ex melle & vino & mulso, præterea & quæ iris & quæ anthera, hisque vel siccis, vel ex melle, vel mulso, vel vino, vtile vero ad talia est & Musæ medicamen: præterea rhois succus & omphacium aliaque quæcunque strenue siccant. At quæ simpliciora oris vlcerata sunt, hæc sanare cōmode possunt etiam medicamenta quæ modice siccant, veluti hæc ipsa quæ propterea quod in assiduo sunt usu, stomatica Græcè sunt dicta. Ea sunt quod ex moris conficitur & quod ex rubi fructu, & quod ex succo corticis iuglandium viridis, atque etiam his magis quod ex mûsto & cupressi sphaerulis componitur. Quæ vero in ore admodum humida vlcera sunt proxime ossa, unde carie tentari ossa periclitentur, hæc propter ossium naturam quæ sicca est, vehementissimis medicamentis indigent. Itaque ego iam comprehensos pastillos semper laui, & siccū ipsum medicamentum superimpono. hæc Galenus, vide & Paulum Aeginetam de stomaticis medicamentis eorumque differentis lib. 7. cap. 14.

**Στομαχικοί.** qui stomacho laborant. De huius nominis significatione Galenus scripsit huc in modum lib. 8. *τὸν καὶ τὸν*, disputans contra Andromachum, qui stomaticas confessiones sine discrimine scripserat prodesse stomachicis: Plarique (inquit) vulgo homines eos qui appetentiam perdidērunt, ita vocant, & quibus post acceptū cibum ventris os grauatur atque opprimitur, & quædam egre tolerabilem anxietatem habet: Appellant eodem modo etiam illos quibus nausea contingit, & maxime si ad vomitum impellat, & adhuc magis si cibi corruptantur, quandoque acidi, quandoque nidoro si facti, quandoque etiam aliam vitiatam qualitatem adepti. Et præ his omnibus adhuc magis illos stomachicos nominant, quibus ructus eiusmodi cum molestia quadam & anxietate ac subuersione contin-

gunt, sæpe cum nondum cibum acceperūt. Quinetiam si per plurimum tempus cibi in ore ventris morentur, grauantes & vix descendentes, hos itidem stomachicos appellant. Alios item appetitum caninum appellatum habentes, vt & plurima edant, & maxime grauati paulo post reuomant, similiter vocant. Alios rursus qui fortiter exoluantur, vbi diutius in ediam pertulerint, & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, eodem modo stomachicos vocant. Hæc Galenus. Paulus autem Ægineta scripsit *σμάχικος* proprie dictos fuisse à veteribus qui cibum non contingerent, eosdemque esse cum iis qui *κοιλιακοί* vocantur. Non est dubium stomachicos à stomacho appellatos esse, qui aliquo eo in loco oborto affectu laborent, velut etiam hepaticos ab hepate, & colicos à colo, & nephriticos à renibus, & splenicis à splene affectos.

**Στόμαχος.** stomachus. os ventriculi. Est meatus superior ventriculi, per quem cibi in ipsum intromittuntur. Habet enim vetriculus ora duo, vnum inferius *πυλωρόν* dictum, alterum hoc ipsum superius, inferno longe amplius, quod ita expediat, vt cibos duriores & nondum intritos denotare possit. Est autem maximo sensu præditus & longe acutior quam reliquæ vllæ partes, propter duorum neruorum magnitudinem qui à sexta cerebri coniugatione in ipsum inferuntur: per eos & alimenti penuriam & rōsionem sentit, ventriculique affectus cerebro, & contra ventriculo cerebri communicantur. Ad ipsum proprie pertinet appetentia, quam vt bene habens secundum naturam excitat, sic male affectum inappetentiam & vitiosum appetitum inducit. Est & illi consensus cum corde maximus, adeo vt syncopas inuehat (quas propterea *σμάχικας* appellant) & id veteres communi nomine *καρδία* nuncuparint, & morbum eius *καρδιασμόν καὶ καρδιαγίαν*. Sirum est sub cartilagine *ἐπιοειδές*, quam ob id natura videtur comparasse vt ipsius esset propugnaculum. Cicero lib. 2. de nat. deor. existimauit *σμάχον* eundem esse cum *πύλοισιν*: similiter & Celsus lib. 4. cap. 1. quibus tamen, quanquam grauibz authoribus, hac in re non tam liber assentiri quam vni Galeno, qui cū sexcentis locis aliis, tum lib. 8. *πύλιν* expresse docet veteres os ventriculi duobus nominibus appellasse, *σμάχον καὶ καρδίαν*, etiam si frequenter ipsum *καρδίαν* dixerint.

**Στόμιον.** grauisonum, grauitèr sonans: vt auctor est Galenus in lexico Hippocratis.

**Στοιμή.** aperire. Consuetum magis significatione est scalp pro diuidere, idque proprie in abscessibus dicitur. Verum eo vocabulo generalius vtitur Hippocrates lib. 6. *πῶς ἐπιδιμῶν*, accipiens *στομῶν ἀπὸ τῶ ἀνασφύγγων*, hoc est recludere arque adaptare, quamcumque partem, siue hæmorrhoidas, siue narium aut vteri venas, siue fistulas etiam ve-

teres quidem & longo tempore assuetas, sed aliqua de causa obstructas, siue etiā aurium meatus sordibus repletos & obturatos, adhibito aliquo *ἀνασφύγγῳ*, hoc est, aperiente medicamento. Annotat Gal. comment. 2. in lib. 6. *πῶς ἐπιδιμῶν*.

**Στρυμνα.** est ferrum sæpius igne liquefactum & purgatius redditum. Id chalybs alio nomine dicitur. Galli aciem appellant. Videtur & æris speciem Celsus existimasse lib. 6. in collyrio Cleonis: Squamæ æris (inquit) quod *στρυμνα* appellant. vide *σίδηρος*.

**Στραβισμός.** est conuulsio musculorum oculi qui bulbum mouent, vt annotauit Paulus libr. 3. cap. 22. vt autem Finitionum medicarum auctor, est oculi musculorum nec omnium sed aliquorum resolutio, ob quam causam vel sursum vel deorsum vel in latera ruunt oculi. Idem tamen auctor paulo ante enumerauit *στραβισμόν* inter oculi exulcerationes. quod quomodo intelligendum sit non video.

**Στραγγήδες.** globuli & concretiones lactis in mammis, quales mulieribus potissimum accidunt post partum, si lactis prouentus nulla parte decedat.

**Στραγγουσία.** est vrinx stillicidium: vel, est deprauata vrinx excretio cum stillicidio. Symptoma est excretionis in vesica deprauata. Neque enim pro consuetudine vrina redditur, sed paulatim & guttatim distillat, assidueque est ad meiendum proratio. In causa est vesicæ imbecillitas ex intemperie quadam contracta, aut vlcus: vel lotii acrimonia, aut pus cum vrina mistum, ab abscessu renum aut iecinoris rupto proficiens. Sed cum neque inflammatio, neque calculus, nec aliud quicquam infestat, si vrina acris est, totus habitus aut reliqua signa bilem ostendant, ex hac vel *δυσουρία* vel *στραγγουσία* contrahitur, vt docet Paulus lib. 3. cap. 45.

**Στραπώτης.** herba est in aquis nascens, iisdemque supernatans: semper uiuo similis nisi maiora haberet folia. sine radice uiuit, unde & nomen habet. humectat & refrigerat. Est & alia herba eiusdem nominis, dicta *στραπώτης χλωφύλλος*: exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgens: foliis auium pennas imitantibus, breui admodum dissectoque foliorum exortu. folia syluestre cuminum simulant, præsertim breuitate, atque scabritia, breuiora paulo. densiore umbella, & plenior. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, & candidos. Nascitur in asperis agris præcipue circa semitas. Stratiotes aquaticus quidem humida & frigida facultate est: terrestris vero nonnihil habet adstrictionis.

**Στραπώτης.** dicitur à quibusdam *ἡ ἀχλὺς* herba, vt habetur apud Dioscor.

**Στραπώτης ἡ**

**Στραπώτης καλοῦσιν.** est collyrii nomen vtiles aduerfus duram & aridam lippitudinem. Acre est & lacrymas prouocat, vt habetur apud Paulum

Paulum libr. 3. cap. 22. Eius mentionem fecit Scribonius Largus.

Στρεβλός. vocatur ὁ στρεβλός, hoc est, strabo, cui oculi sunt distorti seu peruersi: vt Gal. explicauit in lexico.

Στρεφει. hoc est dolorem intestinorum præbet, vt exponit Gal.

Στρεφεται. tanquam inhabitat. in lib. de aere, locis & aquis.

Στροβίλος. interdum pinum, interdum nucem pineam, siue nucleum significat. dicitur & à quibusdam ὁ στροβίλος, sicut habetur apud Dioscoridem. nomen est usurpatum à recetioribus medicis. κακαλός enim dictus fuit Hippocrati, & ab antiquis Græcis κώπος, vt refert Gal. ἐς τὸ πλεῖστον διαίτης.

Στρόβος. dicitur à quibusdam ladanum Arabicum apud Nabathæos nascens.

Στροβιλοῦ μύλον. species est cotonei mali, magni quidem, vt ait Dioscorides, sed minus utilis quam reliqua cotoneorum genera.

Στρούθιον. radícula. vulgo herba fullonum, officinis saponaria: cuius radicis præcipuus vsus est. Acris est, calfacit & siccatur quarto ordine, abstergit, irritat mouetque sternutationes.

Στροφίς. sic à quibusdam dicti sunt οἱ στροφύλοι, hoc est colli vertebræ. causa in promptu est ab inuersione sic vocatas esse. Dictæ sunt & στροφίς eadem de causa.

Στρούγος. frugis nomen Hippocrati, leuior tritico & virem magis soluens: vt ipse testatur. verum quid sit, non certo constat.

Στρούλιον. στρούλιον, apud Hippocratem de hamorrhoidib. & fistulis, teste Galeno, vetus liber exponit στρούλιον, quo nomine significari videretur panis aut placenta tortilis.

Στρούργον. Agnoscit hanc scripturam Dioscorides apud Hippocratem. Atque hoc non vt proprium nomen exponit, sed furiose affectum circa rem veneream significari ait. dicta enim esse apud Hippocratem & alia eodem modo epitheta, vt μωχαῖα, σαρκίς, χυπαλάπηξ, & ab Erasistrato similiter στρούργος, idē vero etiam στρούργον apud Hippocratem legi posse defendit. Galen. in lexico Hippocratico.

Στρούργον. acerbum. Est corpus vehementer adstringens facultate frigidum atq; terreum. vt galla immatura, thus, hypocisthis, balaustrum. vehementer adstringens dico, quod cum adstringens, Græci στρούργον vocant, genus sit acerbi & austeri commune, eo tantum inter se differunt, quod acerbum multo vehementius adstringat quam austerum. Quod autem quicquid huiusmodi est, frigidum sit, perspicuum esse potest, quoniam tale gustantibus lingua contrahitur, densatur, siccatur, exasperatur. Hæc enim non nisi frigido effici possunt. terreum vero idem siccumque esse ex eo apparet, quia tarde admodum in corpus permeat: humiditas enim facile intro subit, eaque frigiditati coniuncta non acerbum quidem, sed acidum potius efficit. Acerbi sunt, vt ait Theophrastus,

omnes prope arborum fructus ortus sui principio, qui posteaquam humore impleri ceperint, decedit quidem acerbitas, accedit autem aciditas. Ceterum acerbis tribus modis exolui posse declarat Galenus, incalescentia, humescencia aut vtrumque perpessa. Si incalescunt duntaxat, solam acquirunt dulcedinem, vt robustæ glandes & castanæ: si tantum humoris accesserit, austera fiet minusq; adstringent, si modo humor is fuerit aqueus & crassarum partium. si namque aereus fuerit, acida euadent. Quod si pariter & humor & calor accesserint, ex aquæo quidē humore dulcedo, ex aereo vero pinguedo comparabitur. Quia autem acerbis sicca sunt, & durities siccitate inducitur, factum est vt στρούργον ἀπὸ τῆς σκληροῦ aliquando usurpetur, vt ab Hippocrate lib. de salubritate, quemadmodum in comment. Galenus explicauit.

Στρούργος siue στρούργον. solanum. planta est multorum generum. Hortense quidem solanum est frutex exilis, pusillus, multis concavis alis, folio nigro, maiore quam ocimi & latiore, fructu rotundo, viridi qui maturus nigricat aut fuluescit. Adstringit & refrigerat secundo ordine. vulgus morellam, officinæ solatrum appellant. Aliud est solanum quod halicacabon & physalida, hoc est vesicariam, vocant, foliis antedicto latoribus, cuius caules postquam adoleuerunt proni terram spectant, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, vesiculis simili, rotundo, laxi: officinæ alquequengi, rustici coqueretum vocant. vim habet & vsum hortensis. Aliud ab iis est τὸ μαῖνον, folio eruca, paulo maiore, caules à radice decem aut duodecim emittens, vnam altos. caput in cacumine oliuæ figura fert racemum rotundum, nigrum, denis aut duodenis acinis constantem. Est præterea aliud quod στρούργον dicitur, multis ramis fruticosum, fractu continuacibus, pinguium foliorum cotoneæque mali similitum plenis, flore grandi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubra. Refrigerat ordine tertio.

Στρούργος. vt Plinius scribit, aliqui cacabulum appellant, alii cacam, vt Dioscor. & Apuleius tradunt.

Στρούργος. Vide στρούργος.

Στρούργος. dicitur processus ossis petrosi ab inferiori eius sede exorians, solidus, tenuis & oblongus instar styli, graphii vel acus, vnde Galenus χροῖσις & βροῖσις se appellare scribit lib. de ossibus. Is quia tenuis est & valde prominet, leui de causa abruptitur, ideoque raro in caluariis è terra effossis reperitur.

Dicitur vero & hoc nomine apophysis, hoc est, processus cubiti, qui in eo, vt inquit Galenus, ἐκ τῆς στροφῆς innascitur. Ille carpo per diarthrosim inarticulatur, eiusque opus est motus carpi obliquos dirigere & firmare tum ligamentis, tum etiam occurſu

ossis carpi ipsum parua cavitare excipientis. Alioqui lubrica & errabunda & parum firma fieret hæc motio, si soli radii cavitati, quanquam scaphoidi, committeretur. Dicitur autem interdum *σπαιδής* per *π*, quod columnam repræsentet.

*Σύμμια*. dicebantur veteribus vnguenta solidiora & corpus habentia. Ea autem odorata erant, cuiusmodi sunt costus, nardus, amaracus, amomum, mentha differebant *ἀπὸ τῶν ἰδιουμάτων*, quod liquida essent, nec ut *σύμμια* *π* solida. Ea autem ponebantur in medicamentis odoris gratia, vel ut confecta diutius servarētur, sicut scribit Gal. lib. 2. de comp. med. secundum genera.

*Σπῆλαια*. alumen. Est succus concretus ex aqua & terra aluminiosa, siue à natura talis sit, siue artificio paratus. Est autem omne alumen aut liquidum aut concretum. Liquidi dux sunt differentie. vnum limpidum est, lacteum, æquale & semper succo madens, sine lapidibus atque quendam veluti ignem expirans. Id quia vilis precii est & ubique reperiri potest, ut ait Gal. lib. 6. *τὸ ἁπλῶς φέμεν* appellatur. Alterum impurum, pallidum, scabrum, quod quia sordibus inquinatum est & peruersum, *σθῆλαιος* dicitur. At vero concretum, figuris varium est. Nam aut scissum est, quod ex eo *χρῆν* vocant est autem id cuiusque glebosi & nativi veluti flos. Cuius etiam duos modi sunt. nam vel glebarum aut asserum instar compactum est, vel sigillatim in capillamenta quædam canescencia finditur, quod inde *τρίχης*, quasi capillare, nominatur: vel est rotundum, & *σφαιρόν* appellatur. Id autem triplex est: velenim bullarum modo intumuit, vel foraminum fistulis quandam spongiæ gerit speciem, vel est solidum, aut tali simile est, quod *σφραγιστὸν* vocatur, aut lateris, quod *πλατῆς*, aut ex crustis constat, quod *πλακίς*. At ex glebis nativis qualescunque fuerint, hodie in metæ figuram formant, id quod saccharinum nominatur. Nec vero sola figura aluminum genera distinguit, natura, sed etiam coloribus. Nam vel candidum est, quale est præstantissimum quodque, vel in candido cinereum, siue parum fuscum, quod nigrum vocant, vel in candido rubrum, vel pallidum, ut interdum rotundum atque etiam capillare. Distinguuntur quoque usu & facultate. Siquidem veteres vlos esse scissili, rotundo & liquido Dioscorides prodidit, & scissile longe præstare cæteris. Cæterum *σπῆλαιός* nomen ab adstrictione deductum est, quæ est omni alumini vehementissima: est autem & omne crassarum partium, sed tenuius *χρῆν*, ab hoc *τροχύλον* & *ἀερομαστόν*. Admodum autem crassum est tum liquidum tum *πλακίς* & *πλατῆς* *σπῆλαια* appellatum. Siccat autem tertio ordine, nec tamen adurit. Porro utendi aluminis modum Aetius libro 9. explicavit, alumen in ollulam novam coniectum carbonibus imponens, & ubi diffusum atque liquefa-

ctum fuerit, tolli iubens, atque ubi refrigerit, conterri. Sed quam nos simpliciter *σπῆλαιον* vocamus, dictam fuisse ab Hippocrate *σπῆλαιον χαλκίπιδον*, author est Gal. in lexico Hippocratis.

*Σπῆλαιον*

*Σπῆλαιον*. adstringens. Id dicitur quod terreum est & compagis quidem suæ mole, crassarum partium, frigidum autem qualitate. Est autem adstringens duplex, sicut & calfaciens. Ut enim hoc partim simplex & summum est, velut ignis, partim per exuperantiam caloris, ut vinum, crocus, piper: ita illud vel summum est, ut exempli causa, alumen, melantheria, galla & rhus: vel modicæ cuiusdam adstrictionis particeps, velut pyrum, malum, rosa. Est autem adstringens genus commune austeri & acerbi. Vtrumque enim eorum adstringit, hoc magis, illud minus. Omnia autem adstringentia contrahunt ac densant meatus, siccant, reprimunt: adhæc vincunt ac continent partium sibi inuicem coherentium substantiam, & vehementer refrigerant. Id quod de puris adstringentibus intelligi debet, quoniam pleraque ex dissimilibus particulis composita non adstringunt modo, sed & acrisunt aut pinguis aut dulcia aut amara aut salsa aut acida.

*Σπῆλαιον*. adstrictio. qualitas est gustabilis, quæ à frigido vincente perficitur in crassa & terrena substantia. Itaque propria facultate contrahit & densat meatus, refrigerat & re-percutit: per accidens autem calorem excitat & auget, conducitque ad concoctionem.

*Συγκομις*. inustio. symptoma est ventris, cum propter aciem eorum quæ ingesta sunt caliditatem subeunt acres & inæquales deiectiones, atque etiam febres. Has quidem deiectiones Hippocrates lib. *τὰ δεινὰ ἐξέων* à colliquatione fieri dixit. Galenus tamen comment. 4. in eundem librum, magis ob *συγκομιον* quam *συνέτην* fieri, nec satis proprie Hippocratem loquentem annotavit.

*Συγκομις ἀρτος*. panis est quæ alio nomine Galenus *ἀνὰ πυρον* appellari scribit, quod ex omnibus farinæ sue partibus citra ullam detractionem constet, mediumque esse inter fufuraceum & similaginem. Quod si verum est, male illi sentiunt qui *συγκομιον* fufuraceum panem interpretantur, & alio nomine *πυρον* *εἶναι* dici voluit. Dictus est autem *συγκομις* quasi confusatus, quoniam castratus non sit, sed omnia simul tulerit, fufures, vericulos & similia. Eum Hippocrates libro *τὰ δεινὰ ἐξέων* opponit *τῷ κατάρθῳ*. ex quo intelligi potest eum panem purum non esse, ut Galenus comment. 2. annotavit. Quia autem *τῷ συγκομιῳ ἀρτῳ* omnes simul farinæ colliguntur, & non feceruntur, factum est ut apud Hippocratem *συγκομις* appellentur sordidi homines, ut refert Galenus in lexico Hippocratico.

*Συγκοπή*. syncope. Est præceps vinum omnium lapsus. Sic quidem Galenus ante se à veteribus medicis definitam esse prodidit. Ergo cū essentia



essentia virium quibus regitur corpus, tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistat palam est nihil horum per syncopen manere integrum, sed cuncta collabi & dissipari, cum spiritu quidem calorem nativum, ita cum eo mistum atque confusum, ut nunquam ab invicem separari possint: cum solidorum autem corporum temperamento, tum eum ipsum calorem singulis à natura partibus insitum, tum humidum illud primigenium & radicale, quo vno veluti glutino quodam robur earum continetur. Neque enim servari eorum temperamentum potest nisi eo calore atque humido incolumi. Quæ causa est cur virium hic lapsus, de quo nunc agimus, qui quidem solidorum corporum substantiæ digerendæ succedit, in longissimis morbis subinde incidat, animantem ex frequenti atrophia, id est nutriendi defectu, extenuato, præterea in iis febribus acutis quæ corpus liquant. Itaque lapsus hunc virium protinus atque accidit, duo præcipua symptomata consequuntur, exoluto quidem calore, frigiditas totius corporis: digesta vero solidorum corporum substantia, sudor quem medici *συνκοπτικόν* & *διεσφορητικόν* appellant. Hæc duo sunt *παθογναμντικὰ* & *συνκοπτικὰ* symptomata, quæ alia etiam cuiusque facultatis propria, pulsus defectio, & sensus motusque privatio, consequuntur. Ea cum pluribus de causis excitari possit, sicut à Galeno scriptum est lib. 12. meth. med. & lib. priore ad Glauconem: omnes tamen in duo genera reducuntur, vnum quidem earum quæ spiritus vel alterant, ut vitiosi succi, ambientis aeris malicia, & venenatæ facultates, vel corrumpunt atque dissipant, cuiusmodi sunt tum affectus animi vehementes, timor gaudium, voluptas, tristitia, anxietas, ira, cura, tum ingens dolor, tum plures motus, cuius generis & vigilix sunt, tum immodica eorum tenuitas, & continentium eos corporum raritudo, tum vero ante omnia ipse respiratus prohibitus & nutrimenti defectus. Alterum genus causarum est quæ solidorum ipsorum corporum temperamentum vitiant, aut eorum substantiam digerunt, ad quod reducuntur quæcunque trium principiorum, mox vero reliquarum partium quæ in consortiū affectus, principia secum ex facili trahunt, temperamentum substantiamque labefaciunt. Est enim tantus trium principiorum inter se consensus, ut protinus noxas suas invicem communicent, ipsumque ventriculi os præter reliquas propter exquisitum sensum, si graviter offendatur, syncopas, quas ab eo *συναμαρτναι* appellant, accersit. Sunt quidem hæc syncopes causæ, sed magnæ prorsus & vehementes, adeo ut ab iis ægri non modo *λεπτοσυμψύσι*, hoc est, animo linqui, sed totis viribus resolvi possint, & proximi periculo esse, scilicet alias spiritu ipso deperdito, alias alterato, aliquando maxima ex parte digesto, non raro hæc vitæque perperasso. Cau-

læ namque eedem minores iam non syncopen, sed animi defectum, *λεπτοσύναν* à medicis dictum, inducēt, magnitudine sola à syncope differentem. Neque enim tanta est per lipopsychias animi exolutio, quanta per syncopas, in quibus nulla omnino vis quæ vel in spiritibus vel in solidis partibus posita sit, integra manet, cum per lipopsychias, etiam si aliqua ex parte exoluatur spiritus, solidorum tamen corporum quæ multo minus quæ spiritus, iniuriis sunt opportuna; substantia non digeritur, sed incolumis persistit. Argumento sudor est, in lipopsychia quidem nullus, sed in syncope perpetuus, & pro causarum magnitudine paucus vel multus. Hic enim veluti terminus quidam lipopsychias à syncope diuidit, sic ut quæ virium dissolutiones intra sudorem constiterint, lipopsychiæ, siue lipothymix, siue exolutiones (vnu enim hæc tria significant) dicantur: quæ vero eum prætergressæ fuerint, & ad sudorē usque peruenierint, syncopæ, quarum etiam pro sudoris modo magnum sit discrimen. Siquidem nemini dubium esse potest plus in iis multo esse periculi quibus plurimus sudor accessit, quam quibus exiguus, quod maior virium lapsus ita contingat. Sed quatuuscunque sit, omnem *ὁξείας καὶ ἀσπράας*, hoc est, repente & vniuersim, fieri debere, ratio & *συνκοπτικὴ* exiguit. Cum enim ea nulli morbo acumine & pericula concedat, lapsus illum virium cōfertim & semel & magnum etiam fieri necesse est.

*Συνκρίναι*, miscere. verbum Methodicorum proprium, ex quo *συνκρίματα* appellabant animantium corpora, quasi ex indiuiduorum corpusculorum mistura constarent, & meatuum miscellanea, cui medicandæ, si quando confusa esset, *μελεσυνκρίτικα φάρμακα* ab iis dicta adhibebant, quæ & *μεταποροποιητικὰ* vocabant:

*Σύγκρισις*, sic dicitur à quibusdam *σίνος ἀγχιος*, hoc est cucumis anguinus, sicut habetur apud Dioscor.

*Συγχόνδρωσις*, est ossium siccorum durorumque *σύνφωσις* per cartilaginem. Sic pubis ossa cartilaginis interuentu nectuntur, & ossa mediū pectoris primis annis. ætatis namq; progressu ea per quam vniuntur cartilago ossis in modum indurefcit. Similiter & ossium appendices in pueritia cum suis ossibus conascuntur glutinosarum cartilaginum beneficio.

*Συνκρίματα*, inunctiones. medicamenta sunt *τοῖς ἀκόποις* & facultate & specie similia, nisi quod liquidiorē quodāmodo substantiā fortita sunt, ut habetur apud Paulū lib. 7. c. 19.

*Σύνχυσις*, vitium oculi confusus secum eius humoribus, id quod accidit ut plurimum ex vehementi plaga, interdum vero & ex vneæ tunicæ inflammatione ruptis eius vasis, effusoque humore. Inde pupilla discolor & turbida euadit, & principio quidem maior cernitur, tandem vero cōtabescit minorque seipsa apparet.

**Συγ.** dicuntur apud Hippocratem tumores carnosissimi in partibus palpebrarum facti, vtriusque author est Gal. in lexico Hippocr.

**Συγκέχυμος.** duo significat, morum & sycomorum. Galenus libro 5. 7. 15. 1. cap. 19. agens de gingivarum curatione, adhibet lac mori, his verbis: ἡ συγκαμία, τὴν ἐν μύρτῳ, γὰρ ἐν οὖν ἐγχεῖται, &c. appellans lac succum siue lacrymam quæ ex radice arboris mori circumfossa & incisa colligitur, sicut Dioscorides lib. 1. testatur. Quam tamen Celsus videtur ignorasse, scribens lib. 3. cap. 18. mori nullam lacrymam esse. Dioscorides autem aperte testatur συγκαμίον ab aliquibus συγκεμίον vocari, frequentius tamen morum significat vel mori pomum. Significant autem συγκαμία proprie τὴν μύρτον, quarum arbor συγκαμία cognominatur.

**Συκία.** dicitur à quibusdam ἡ χαμάσκη, vt habetur apud Dioscoridem. Hippocr. vero in 1. de morb. muliebr. συκίς pari significatione quæ συκαμία posuit: quod alibi interpretans μύρτιν dixit. author Gal. in lexico Hippocratis. vbi verba Hippocratis hæc adducit, πνεῦμα συκίς ἀπὸ ρίζης. id est, fomentum à radice mori. vt συκὴ sit hoc loco ἡ συκαμία siue μύρτα morus: quum alibi sic vocetur ficus.

**Συκία.** perperam sæpe occurrit pro συκία, hoc est instrumentum ventresum, quod corporibus affixum vel spiritu. vel leui scarificatu sanguinem elicit. Latine cucurbitulam & cucurbitam vocant.

**Συκίον.** Galenus in lexico Hippocratis exponit τὸ ἐν ἰσχυρῶν ἀφ' ἡμῶν, hoc est, decoctum ficum arefactarum seu caricarum. manuscriptus codex habet συκεον: quod magis probo.

**Συκίον ὄνυξ.** Vinum quod è caricis ficibus fiebat, sicut docet Dioscorides lib. 5.

**Συκαμῶπος.** ficus Ægyptia. Est arbor magna, fico similis, vt ait Dioscorides, vel vt Theophrastus, moro nostri cum folio turis magnitudine, frondosa, multo lacte abundans: potum ter aut quater anno fert non ramis, vt ficus, sed ipso caudice, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus, quod non maturefcit nisi vngue vel ferro scalpatur: sycomoron vocant, eodem cum sua arbore nomine. Appellationis autem ratio diuersa traditur. Dioscorides namque sycomoron vocari prodit, quasi fatuam ficum, propter inefficacem & fatuum gustum. Quod Galeno non placuit, qui ita sentientes deridet, libr. 2. de aliment. scribit autem se plantam ipsam cum suo fructu Alexandriæ vidisse, & fructum quidem cõsimilem visum ficui parum albam, cumque in medio mororum ac ficum locari posse, atque ex vtriusque similitudine nomen illi fuisse inditum. Dicitur & συκαμῶρεα.

**Συκαμία**

**Συκαμία.** marisca, ficus, siue ficatio. Est tumor à fici similitudine sic dictus. Oribasius ad Eustathium, ficos, inquit, appellant germina vicerosa, rotunda, subdura, rubicunda, atque etiam dolorifica. Celsus libro 6. cap. 3. duo

tantum eius genera facit, quorum alterum vlcus esse dicit durum, callosum & rotundum, ex quo exiguum quiddam & glutinosum exit in barba maxime exorients, alterum vero humidum & inæquale, ex quo quod exit, plus est & mali odoris, præcipue in capillo proueniens. In vtroque autem & fici similitudinem esse & carnem excrefcere, & id quidem generale esse. Quod in capite nascitur, tinea, quæ achoris nomine comprehenditur, speciem esse Arabes scripto prodiderunt, & esse rotundam & duram, in cuius superficie rubor sit, intus autem quiddam granis ficuum simile. Quod in mento erumpit, ab humore fit, inquit Galenus, non solum crasso, sed particeps etiam serosæ & tenuis humiditatis, ob quam etiam facile exulceratur. eoque differt ἀπὸ τῆς ἰσχυρῆς. Nascitur vero & in ano, sola magnitudine, inquit Aetius, à thymo differens. Thymus enim eminentia est tuberculosa, aspera, subrubra, oblonga, sed parua, ficus autem illa ipsa est si magnitudine excedit. Latini mariscam appellant, quam aliqui dicunt esse fici præpinguedine hiantem, semenque ostentantem. De hoc morbo intelligendum est quod scribit Martialis:

*Caduntur tumida medico vidente marisca.*

Gignitur vel ex præpostera Venere, vel immodica equitatione, vel eius partis attritione aliam ob causam facta. Est & ὀνυξ οὐλοῦν vitium, quod Paulus dicit esse medium inter βάρωμα & πλάσιν. Esse enim βάρωμα asperitatem palpebræ interna parte: sed maiorem quidem vt veluti incisuras habeat, πλάσιν vocari, verustiore vero & quæ iam occalluerit, πλάσιν. Morbus hic oculi altiores, inquit Aetius, habet eminentias & veluti incisuras, nec alteri rei quam ficui hianti melius comparari potest.

**Συκαμῶν ἱκτάρ.** ficarum iecur. sic dicitur ficuum esu præparatum, vt scribit Oribasius. Sic fit omnium præstatissimum, non modo ad volupratem sed etiam ad alia omnia, si macrandi animalis iecur multarum siccarum ficuum esu præparetur, quam rem in suis maxime faciunt, quod suilla viscera sunt aliorum visceribus, multo suauiora.

**Συνοχία.** congregationes, collectiones. translatio facta est ab iis qui in exercitu congregantur in cohortes, vt exponit Galen. in lexico Hippocratis. σύνχη enim cohors dicitur.

**Συμβεβηκός.** accidēs. Quid sit apud philosophos, notum esse potest ex Ilagoge Porphyrii. Nec vero aliter συμβεβηκός nomen usurpant medici. Distinguunt modo τὸν ἑνὸς συμπεβηκός, vt habetur apud Galenum libro 1. meth. med. Quæ enim, inquit, constitutionem vnde actio nascitur necessario sequuntur, sanis quidem nobis συμβεβηκός, id est, accidentia, ægrotantibus συμπεβηκός nuntupantur. Idem autem sequenti libro tres accidentium differentias constituit. Sunt enim vel vt affectus, vel vt actiones, vel vt passionēs, quorum etiam hæc exēpla ponit, inambulare

ambulare, ut cædive, album aut nigrum esse. Vsurpatur etiam *συμπλεκτικός* ad hunc modum, ut ab eo quod *ἡ φύσις ἐστὶν αἰὲν*, hoc est primum & per se, fit, distinguatur, idemque sit ex accidenti fieri quod secundo loco, sicut declarat Gal. lib. de differentiis sympt. exemplo calculorum motorum.

*Συμπάθεια*. consensus mutuus. societas. Est duorum naturalis quædam coniunctio & concordia. Eam similitudo vel generis vel nature, vel temperamenti, vel morum, vel rerum aliarum conciliat. In plurimis vero causa ignoratur, eamque philosophi & medici etiam sapientissimi ad substantiæ totius familiaritatem atque occultam quandam vim & proprietatē retulerunt, quam si quis sit qui se nosse profiteatur, non careret arrogantia impudentiaque nota. Huiusmodi sympathiæ exempla permulta à philosophis referuntur, ut magnetis cum ferro, purgantium medicamentorum cum humoribus, elephanti cum homine, hominis cum plarisque animalibus, herbis & fructibus quibus salubriter vescitur. Huic sympathiæ contraria est antipathia, quæ non est aliud quam cœca rerum inter se discordia. Paulo aliter *ἡ συμπάθεια* nomen medici usurpant, cum eam distinguunt *ἀπὸ τῆς ἰδιοπάθειας*. Tunc enim significant partis alicuius affectionem non proprie quidem & primario, vel per se laborantis, sed per societatem & consensum alterius. Id autem duobus modis posse fieri Galen. libr. 1. de locis affectis demonstravit. siquidem vel absolute, vel per priuationem eiusmodi sympathia contingit: absolute quidem an positive dicas nihil refert. Fit autem id sympathiæ genus quando à parte primario affecta aliquid in aliam velut umbra per viam transit, quod causam morbo præbeat. Id autem tum vapor, tum humor esse potest. Sic tenuēs humores aut vitiosi vapores à ventriculo, utero, aut alia parte in cerebrum sublatis, dolorem mentis que ab alienationem mouent, in oculos vero ijs similia excitant quæ per suffusiones cernuntur. Itaque quoniam per sympathiam affectiones eiusmodi oriuntur, nec cerebrum, nec oculi tunc proprie & primario laborant, nec debetur etiam ijs proprie curatio, sed ei tantum particula à qua affectionum eiusmodi causa dimanavit. Vide autem ne in distinguenda idiopathia & sympathia hallucineris, nec existimes partem omnem per sympathiam affici quæcumque ab alia afficitur. Distillatio sæpe pleuritidem excitavit, angina versa est in peripneumoniā, dysenteria in lienteriam, febris in abscessum, nec tamen eo casu pleura, nec pulmo, nec ventriculus, nec pars abscessu tentata per sympathiam laborant, sed cum & causa affectus & ipsa affectio in ijs ipsis partibus hæreant & constiterint, primario & *ἡ τῆς ἰδιοπάθειας* laborare dicuntur. Siquidem sanatis etiam ijs partibus, à quibus primum affectio profecta est, ipsa nihilominus perseverat

constansque & stabilis est, atque propriam curationem desiderat, quorum neutrum affectui per consensum factum proprium est. Hic enim ita dependet ab alio ut umbra à corpore. Aliud sympathiæ genus est quod per priuationem fit, tum facultatis in partem aliquam influere solita, tum materiæ ad edendam actionem necessariæ. Quæ enim affecta parte aliqua pars alia eo priuatur quod ei naturaliter adesse consuevit, tum per consensum affecta esse dicitur. Sic digiti per paralytim affecti sunt, quod sentiendi vel mouendi facultas ad eos iam non descendit, nullo tamen vitio in digitis per idiopathiam existente, sed quia eo priuantur quod ipsis sanis aderat ad obeundam actionem. Sic & vox seu larynx per sympathiam læditur, si efflacione, vocis materia priuatus sit thorax, quoniam perfoßus ipse sit, aut quia intercostales muscoli resoluti sint, aut quia spina metaphreni, vel cervicis tota affecta sit, cum tamen per eam aphoniam nullum vitium, nullaque affectio propria sit vocalium instrumentorum, sed tantum quod laryngi materia vocis desit. Quoties enim parti alicui deest id quod secundum naturam ad actionem ei aderat, iure optimo eam affici dicendum est. Quippe ex ipso verbo *συμπάθειν* partem non penitus ab affectu esse liberam, sed ipsam cum alia affici declaratur. Et reuera illius actio, vel omnino perit, vel deprauatur, vel imminuitur: nec tamen ideo pars ea egrotare proprie dicitur, nec talis eius affectio proprie morbus vocabitur. Siquidem ei parti nec morbus ipse, nec morbi causa insidet, nec est necesse partem omnem cuius actio læsa sit, statim etiam morbo teneri.

*Συμπερίσπασις*. est iudicatio apparentiū quæ non ex seipsis verum ex alijs signis comprehenduntur. vocabulū est Empiricorū proprium. *Σύμψυς*. concoctio, quæ & *πύψυς* dicitur. de qua vide suo loco.

*Συμπτώματα*. duobus modis dicitur auctore Galeno. Generatim quidem quicquid animanti præter naturam accidit, id est morbus & causa morbi interna, quæque morbo superueniunt. Speciatim vero quicquid præter naturam accidit, exceptis morbis & eorum causis. Sic sumptum symptoma non aliud est quam affectus præter naturam qui morbum, velut umbra corpus, sequitur. Huius tres à medicis differentiæ assignantur. Aut enim consistit in actionum offensa, aut in corporum ipsorum affectu, aut in retentis vacuatisve immodice. Quorum symptomatum singula varias etiam habent differentiās. Siquidem animalium actionum noxæ triplices sunt. Primæ quidem sensilium, ut visionis, auditionis, gustus, odoratus, tactusque aboliti, debilis aut deprauati: vel sunt motricum actionum, vel principum, ut imaginationis, ratiocinationis & memoriæ similiter abolitæ vel debilis vel deprauatæ. Secundæ vero sunt naturalium, ut attractionis, retentionis, alterationis & expul-

fionis. Tertiæ vero vitalium, ut pulsationis abolitæ, debilis aut depravatæ. Eorum autem symptomatum quæ consistunt in corporum affectionibus, quinque sunt differentiæ, pro sensuum numero. Aut enim consistunt in visu, cuiusmodi sunt colores præter naturam in toto corpore, aut cæcis quibusdam partibus; aut in auditu, cuiusmodi sunt voces clangulosæ, tremulæ, raticæ, & soni, strepitus atque murmura in quavis parte excitata: aut in olfactu, quæ non sunt aliud quam græueolentia respirando aut transpiratu totius corporis præcepta, vel prodians ab auribus, naribus, axillis aut ventriculo per ructus acidos, nidorosos & virosos: aut in gustu, quæ non aliud sunt quam sapor varius excrementorum è singulis partibus prodeuntium: aut in tactu, cuiusmodi sunt calor, frigus, humiditas siccitasque & ex ijs indurata mollities, durities aut alia quædam qualitas in quavis parte. Tertiæ vero sunt eorum quæ præter naturam vel excernuntur vel retinentur in corpore: quorum triplex differentia est. Aut enim tota substantia præter naturam sunt, ut sanguinis profluvium ex morbo aut aliquo symptomate (morbos enim symptomata consequuntur non modo primo, sed plerumque alterius symptomatis interuentu) excitatæ: aut qualitate, aut quantitate, quorum exempla notissima sunt. Idem vero etiam *σύνθεσις* appellatur: atque etiam *σύνθεσις*: nisi existimetur differre inter se, quod *σύνθεσις* dicantur ea, quæ necessario sequuntur corporis constitutionem per quam aliquid agimus, bene valentes & sani: *σύνθεσις* vero, quæ nobis ægrotantibus accidunt.

*Σύνθεσις*, est naturalis ossium vnio. Naturalis quidem, ut ait Galenus, dicta est, quod quæ parum vel omnino laxata sunt, inter se quidem cohereant, fracta quæ inducto callo vniuntur, sed non secundum naturam. Est secunda species coniunctionis ossium. Siquidem omnia inter se coniunguntur vel *κατ' ἄρσιν*, vel *κατὰ φύσιν*. Est autem *σύνθεσις* apud Hippocratem idem quod *σύνθεσις*. Sunt autem *σύνθεσις* duæ primæ differentiæ, aliqua enim ossa sibi inuicem cõnascuntur, alia materiæ alterius interuentu. Quæ enim fungosiora mollioraque sunt, mutuo inter se coalescunt: sicciora vero & duriora aliorum interuentu. Rursus eorum quæ per alia coalescunt, tres sunt differentiæ, *σύνθεσις*, *σύνθεσις*, *σύνθεσις*.

*Σύνθεσις*, duplex est. vnū *κατὰ φύσιν* dictum, quod nascatur in petris, ramis est tenuibus, parvis, organo similibus, capitulis & foliis thymi: lignosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: longa radice, subrufa, digitali crassitudine. Contrarias habet vires: vnam, incidēdi, quæ collectum in thorace pus expurgat: & vim contrahendi, quæ reiectionibus sanguinis auxiliatur. præterea humidum calidumque est, multum digerit, contrahit & constringit. Alterum vero *σύνθεσις*

est, quod aliqui *σύνθεσις* vocant. Id caulem emittit bicubitalem aut maiorem, crassum, leuem, angulosum & sonchi inanem, circa quem breui internuacante spatio folia exiunt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta. Caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, & circa caulem veluti verbasci folia emicant. Tam caulis quam folia aspera lanugine horrent, tactuque pruritum concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidæ, viscosæ, quarum est vsus. Similes alteri vires habet, præter dulcedinem & odoratum. *σύνθεσις* etiam à quibusdam dictam fuisse. *σύνθεσις* Dioscorides author est. forte propter effectus similitudinem. Habet enim symphytum quamplurima glycyrrhizæ affinia, ut recte inter *σύνθεσις* censeri possunt.

*Σύνθεσις*, herba est quam Apuleius interpretatur Apollinarem, sine hyoscyamum.

*Σύνθεσις*, nomen est medicamenti ad tussim optimi, cuius mentio fit apud Galenum libr. 7. *τὸν κατὰ φύσιν*. Descriptio habetur apud Aetium libr. 8.

*Σύνθεσις*, vel humor quidam concretus, vel internus tumor, vel hypostasis, vel callus, ut melius videre est libr. 6. *σύνθεσις* refert Galen. in lexico Hippocr.

*Σύνθεσις* *σύνθεσις* vide *σύνθεσις*.

*Σύνθεσις*, angina. vide *σύνθεσις*.

*Σύνθεσις*, est compositio *κατὰ φύσιν* ossium quæ nec valide nec manifesto, sed obscure & difficulter mouentur. Species eius tres sunt, *σύνθεσις*, *σύνθεσις*, *σύνθεσις*.

*Σύνθεσις*, ligamentum. Est pars corporis simplex, post os & cartilaginem maxime terrestribus, partem parti alligans, muniens, vestiēs. Itaque dura siccaque est, frigida etiam est tum ob id, tum quod exanguis sit. Hæc pars nervo similis est, quoniam alba est & solida: sed nervus non est, quia penitus ex se insensibilis est, nec mouere quicquam potest, & nervo est multo durior, nec à cerebro nec à rhachitide nascitur, sed ab osse vel cartilagine vel osse cartilaginoso vel membrana, & in os aut cartilaginē aut muscolum aut partem aliā inseritur. Est id quidē ligamentum speciatim & proprie dictum. Interdū namque generatim & abusive ligamentum medicis latius patet, ut etiam quicquid in corpore alterum alteri colligat, ligamentum dicatur. Sic cutis reliquarum corporis partium est ligamentum tum per se tum membranarum, nervulorum, venularum & alicubi arteriolarum interuentu, per quæ eadem cutis subiecto adipi, membranae carnosæ, musculis & aliis prope omnibus internis partibus connectitur. Cæteræ etiam corporis partes sibi inuicem colligatæ sustinentur. Peritonæos quoque tunica diaphragmati, hepati, lieni, ventriculo, intestinis, renibus, vesicæ, vtero, vena tum portæ tum cauz inferiori, arteriæ inferiori, epiploo, melaero

mesarzo cum lumbis ligamentum est. Et meninges cerebro cerebrique partibus cum cranio & pericranio vinculum sunt. Sic, ut semel finia, partes corporis omnes sibi continuz colligantur, vel aliarum interuentu, ut sit verum omnia ossibus & periosteis per se aut per aliud coherere. Id autem ligamentorum genus, neruorum quos recipit beneficio, sensus tactorii prope totum est particeps, cum proprie dictum ligamentum, ossolum scilicet aut cartilagosum, quod articulos colligat, & tendones induit, construat, munit, neruis & sensu careat. Ex ligamentis autem proprie speciatimque dictis quamplurima ab osse in os inseruntur, partim articulos, partim ossa ipsa firmiter, ut quæ brachium cum cubito & radio, & femur cum tibia coniungunt, item articulum brachii cum omopla. Alia vero multa his similia vsu, à cartilagine ossis vicaria in cartilagine implantantur. Sunt autem ea tenuia & membranosa, ut quæ sunt in costarum notharum finibus, atque etiam verarum, quando scilicet ossum sterni commissuræ per ætatem teneram sunt cartilagosæ. Talia quoque primis annis sunt in imo sine coccygis. Talia denique bronchia aspera arterie omnia colligant. Nonnulla etiam ligamenta ab osse nata in cartilagine inseruntur, ut cartilaginosa duo & crassa in genu, vnum à condyli interni radice interna in cartilagine genu mobilem externo condylo destinata, & in tibia apophysim subditam: alterum illi subditum multo crassius, etiam obliquum in mediam & cauatam tibia apophysim. Ligamenta etiam proprie dicta ab osse vel cartilagine vel membrana procedunt in musculorum omnium capita cum neruo, ad muscoli vel tendonis villorum neruorum robur, ipsa quoque in villos diuisa. horum pars plurima ab ossibus ipsis musculorum principio propinquis quidam à cartilagine, non pauci à membrana nascuntur. Sunt vero etiam ligamenta quædam mediz quodammodo naturæ inter illa tum generatim tum speciatim dicta, partim ex ossibus aut cartilaginibus, partim aliunde nata, quæ tamen non in os vel cartilagine vel tendonem vel musculum procedunt, ut quæ ab ossibus pubis nascuntur gemina, sed caua & receptis insignibus neruis sentientia, & maximam penis partem constituentia. Cæterum ex ligamentis proprie dictis quæ quidem ab osse vel cartilagine partibus non sentientibus, oriuntur, non sentiunt, nisi horum quædam neruos acceperint, ut quæ penem constituent, linguam & penem firmant. Quæ vero ex periosteis, membranisque aliis sentientibus oriuntur, sentiunt, sicut & illa quæ à tendonibus ad articulos dilaratis prodeunt, cum in modum habentur in calcaneo, epigonatide, digitis, aliisque partibus non paucis. Quæ res imposuit quibusdā putantibus ligamenta vera nunc sentire, cum neruos non recipiant, nec à cerebro aut rachitide oriatur,

nunc non sentire. Ex his perspicui sunt ligamentorum tres vsus præcipui, qui sunt ligandi, muniendi atque vestiendi.

*Συνδρομή*. cōcursus. Est multorum symptomatum sine signorum cumulus, aliquid faciendum præscribens. proprius est Empiricorū. Qui enim experientia sola rem inuestigat, tales concursus respicit, & quæ accidisse viderit, in vnum colligit. Cumque sæpe eadem videris vno in morbo, omnia memorie commendat, atque vbi ex hac obseruatione multos concursus fuerit expertus, tunc quæ in multis concursibus, quæ item in vno tantum euenisse comperit, diligenter obseruat, atque ita demum in communium & propriorum cognitionem venit: quam consequitur signorum in vi & efficacia diuersitatis animaduersio. Quod enim in multis concursibus fuit obseruatum, quam quod in paucis, quod in paucis, quam quod in duobus, quod in duobus, quam quod in vno tantum, maiorem vim habet. Exempli causa Empiricus, ex nonnullis quæ liquido apparent notis circa ægrum, dicit sibi comperit esse sanguinem ægro mitti debere. Si quæras quænam ea sint, respondebit distentionem vasorum, & ruborem & grauitatem corporis vniuersi & pigritiam ad motiones & tensiones membrorum, adhuc vlcerose lassitudinis sensum, & traducta in ocio priorem vitam, ciborum & potus copiam, & solitarum excretionum suppressionem, atque ex hac syndrome siue concursu, venæ secundæ utilitatem à se obseruatam esse. Talis quidem est Empiricorum *συνδρομή* *παρασκευασμένη*, ad cuius similitudinem alios in aliis morbis concursus æstimare potes, ut *εμπειρικὴ συνδρομή*, *συνδρομή*, *συνδρομή* & reliquas. Verum tales *συνδρομαί* Gal. ridet, quod tum rarissimæ, tum longissimæ sint, quodque non protinus appareant, ut interea dum concursus omnium symptomatum expectatur, mora adhibendi remedii periculum afferat. Facilius multo & citius qui ratione signorum vniuscuiusque morbi inuentionem indagat, & communia & propria cognoscit. Vbi enim brachium ex propria sede excidisse, & in alam prolapsum esse animaduertit, reliqua omnia etiam simul intelliget, ut tumorem illic præter naturam esse appariturum, deinde sinuatum in superhumerali locum futurum, capite brachii quod in alam recessit, priuatum, tum dolore vehementi infestados musculos, & euenturum ut brachium doleat, si admonere id ad costas velit. Itaque non expectato eorum omnium concursu, statim iudicabit brachium è propria sede excidisse, & superuenientibus symptomatis remedia comparabit, ut non immerito talem Empiricorum *συνδρομή* Galenus reprehendisse videatur.

*Συνδρομή* *σημείων*. assidentia signa. Sunt signa non necessaria nec propria nec à rebus ipsis inseparabilia, sed quæ ut plurimum accidunt, ut in ardente febre lingua sicca, aspera,



nigra, ventris morfus, deiectiones pallidæ, vehemens sitis, vigilæ & deliria. Ex his autem aliqua simul inuadunt, aliquando superueniunt, sæpe vero nunquam apparent. Neque enim sunt ab ardente febre inseparabilia, neque eius substantiam constituent, sed proprias tantum faciunt eius differentias, ut scripsit Galen. comment. in Aphor. 12. lib. 1. Idem vero & de aliis morbis iudicandum.

*Συνεχὴς αἴτια*, causa continens, quam aliqui contentiuam etiam dicunt. vide *αἴτια*.

*Συνεχόμενα*, coeffundere, hoc est, naturam effundentem & vacationes molientem adiungere & incitare, apud Hippocr. libr. 6. *τὸ συνεχόμενον*. addit vero etiam quiddam Galen. in lexico Hippocr. hoc est, commiscere & contemperare sanis succis eos qui sunt vitiat.

*Συνεχόμενα*, coindicantia dicuntur ea quæ primæ præcipuæque indicationi consentiunt. Nam cum prima indicatio, quæ quid agendum sit ostendit, à morbo petatur, nemo tamen ei obsequi audeat, nisi reliqua aut eorum pars maxima quæ considerata sunt, consenserint. Ea autem sunt virtus, natura, ætas, anni tempus, regio, consuetudo, & si quæ sunt id genus alia. his autem opposita sunt *ἀντιθέμενα*, quæ contrariam indicationem habent.

*Συμπερασμα*, conclusionem. *τὸ συμπερασμα*: ait Galen. in lexico Hippocr.

*Συνεχὴς αἴτια*, causa continens, quæ & *συνεχόμενα* & *συνεχόμενα* appellatur à Galen. vide *αἴτια*.

*Συνεχὴς πυρετός*, continua febris. Est cuius à principio ad finem vnica est accessio in multos dies producta: vel, in qua nunquam febris intermitit. Cuius duæ species assignantur, vna *αἰσθητός*, dicta, altera *αἰσθητός* generis sui nomine, sicut plerisque aliis differentis accidit, quibus nomina indita non sunt. Rursus *αἰσθητός* duplex est, non putris & putris: vtraque adhuc triplex, *ὀξυπύρετος*, *ἀνταναπνέουσα*, *παρὰμαστιγὴς*, inditis nominibus à febrium mutationibus quas habent non per aliquos circuitus, in modum intermittentiæ, sed toto quo durant spatio: *ὀξυπύρετος* enim dicitur cuius vnica accessio à principio ad finem vsque eodem tenore perleuerat, ut *ἀνταναπνέουσα* quæ paulatim increfcit, & *παρὰμαστιγὴς* quæ perpetuo sensimque decrefcit. Febris autem *αἰσθητός*, quam speciem esse statuimus, triplex est, pituitosa, biliosa, & quæ raro accidit, melancholica quarum trium ab initio ad finem vnica est accessio, ut & trium synochorum prædictarum. sed hoc interest quod in synochis nulla aut minima ab initio ad finem mutatio fiat, istis vero mutatio accadat, pituitosis quotidie, biliosis tertio quoque die, melancholicis quarto, ut scribit Galen. libr. 1. Epidem. ex sententia iuniorum medicorum. Porro hæc mutatio non aliud est quam noua quædam exacerbatio, & febris reduplicatio, per quam noua quædam accessioprehendere videtur. Nam ut per initia accessionis intermittentiæ horror aut fri-

gus partium extremarum fit & ad somnum propensio, pigritia insignis, inæqualitas quædam caloris, & pulsus paruus, debilis, tardus, rarus, ita dum istæ exacerbationesprehendunt, augentur aut vigent, sitim, dolorem capitis vehementem, inquietudinem, calorem intolerabilem excitant, ut aliquando videri possit continua febris cum sua & sibi finitima intermittente coniuncta. Verum in continente biliosa per exacerbationes rigor non fit, ut per accessionem tertianæ intermittentiæ, nisi forte cum tempus crisis instat. Corpus enim continuo calore concalfactum minus sentit morsum bilis eam exacerbationem committentis propter eius exiguitatem: cum vero proxima crisis est, perfacile, qui corpus à largissima & copiosissima bile ubique pungitur. Eas in continuis exacerbationes medici *πυρετῶσι* etiam appellant non minus quam in intermittentiis, sed illarum solutionem *συνεχόμενα*, non autem, ut intermittentiæ, *ἀντιθέμενα*. Ista quidem vna est continuarum ab intermittentiis differentia, sumpta ab accessionibus, præterquam alia est à loco in quo materia febrilis continetur. Siquidem per intermittentes febres humor in habitu corporis putret, sicut ante *ἡσυχία* *πυρετός* explicantes annotauimus, per continuas vero in maioribus vasis continetur, quæ sunt magnæ inter alas & inguina arteriæ venæque. Quæ causa est cur in continuis nullus horror, rigor, refrigeratio, non vlla *ἐπιπνομή* sit febris intermittentiæ, quod materia per sentientes partes non feratur. Quorum si quid acciderit, implexum intermittentiæ cum continua esse iudicandum est.

*Συνεχόμενα*, vide *συνεχόμενα* paulo post.

*Συνεπρασμένα*, hoc est *συνεπρασμένα*. coaptata, coadunata, ut in libro de curandis luxatis apud Hippocr.

*Συνεπρεπές*, obrectum & adumbratum. refert Galen. in lexico Hippocr.

*Συνέσις*, est ossium inter se compositio, qualiscunque ea sit: est enim summigenis nomen. eam aliis quoque nominibus (*συνέσις* & *ἐμμια*) vocari tradit Galen. libr. de ossibus. Præterea C. Plinius secundus libro primo de medicina scribit *συνέσις* morbum esse nec periculo, nec facie phthisi dissimilem: inter tam multos auctores solus qui id scripserit.

*Συνεπρεπές*, est siccorum & durorum ossium *συνέσις*, nervorum interuentu. Nervos autem intelligere oportet non veros, quoniam nulla ossa, eorum interuentu, opinor, coalescunt, sed tendones, ligamenta & alia nervosa membranosaque corpora. Nam & tendones qui nervi etiam nomine continentur, sæpe ad articulos dilataci ipsos firmant, ligamenta quoque nervosa tibiæ cruri & crus ischio firmissime alligant, ut interim ligamenta alia externa partium membranosa omnium articularum communia, partim dura, crassa, rotunda quorundam articularum, ut den-

tis, genu, humeri, taceam.

*Σύννομα*: πρὸ συννομα, quæ coierunt & coniuncta sunt. Sic habent editiones quædam in Hippocratico Galeni lexico. aliz vero pro *σύννομα* habent *συνλωμένα*, quod proprie sonat coadunata, *σύννομα* δὲ πρὸ συννομα: & sic etiam in manuscripto codice legitur. *σύννομα* autem proprie dicuntur simul pascencia, iisdem pascuis vrentia, gregalia: *σύννομα* δὲ πρὸ συννομα.

*Συνουληπιὸν φάρμακον*, idem quod *ἐπουληπιὸν*, de quo vide suo loco.

*Συνόχης*, est febris *συνόχης*, nullis distincta accessionibus vel reduplicationibus. In hoc enim differt *ἀπὸ τῆ συνόχης πυρετὸς*, quæ species est *πρὸ συνόχης* generis sui nomine donata, quod *συνόχης* mutationes habeat pro humoris à quo gignitur specie. Si namque eam pituita excitauit, mutationes habet quotidie, si bilis, diebus alternis, si humor melancholicus, quod admodum rarum est; quarto quoque die. Non sunt autem aliud hæ mutationes quam accessiones aut reduplicationes quædam in febrem continuam incidentes. Verum *ὁ συνόχης* nullas eiusmodi mutationes habet, quæ accessiones videri possint, sed vnicam modo accessionem à principio vsque ad finem nullis exacerbationibus distinctam. Cuius tamen tres differentiz statuuntur. At enim perpetua illa accessio sibi æqualis similisque perseverat, totoque febris curriculo similiter viger neque crescens neque decrescens, quæ *συνόχης ὁμοῦ* siue *ἀσπαστὸς* appellatur: aut à mediocribus initiis progreditur ad maiora & increfcit, dicta *ἀσπαστὸς* atque *ἐπικρυστὸς*: aut ab initio ad finem semper decrescit, quam *παρακρυστὸν* appellant. Neque enim fit synochus à pituita aut alterutra bile, quorum proprium est: certis circuibz moueri & nouas accessiones inducere, sed à sanguine qui nullis periodis exacerbari solet. Sanguis autem ille synochi materia, aut incalescit tantum nulla concepta putredine, aut computrescit. Inde geminæ emergunt synochi differentiz, non putris & putris: quarum hanc inter putridas, illam inter ephemerass febres Galenus collocauit. Quæ enim non putris est, duo habet præcipua: cum ephemeris communia, primum quidem id ipsum quod sine putredine sit, deinde vero quod vnica accessione perinde atque ephamera concludatur: vt non immerito diaria plurimum dierum vocari possit. Sed & diariis febribus fere semper succedit, quod vbi euenit, non alia febris species quam diaria producta videtur. Siquidem propter causæ paruitatem febris vnus diei efficitur, sicut propter magnitudinem, multorum interim dierum. Est igitur eiusmodi synochus, quantum ex ipsa est, earum quæ plures dies infestant, & quæ diariæ sunt media & quodammodo communis, quandiu scilicet putredinis nullas notas habet. Vbi vero succedit putredo, non iam diariarum generis est, sed putrida biliosa

ex sanguine putrente dicitur. De ea celebris illa quæstio instituta est crebrisque concertationibz in scholis agitata de sanguinis putredine eiusque in bilem cōuersione, illis Galeni auctoritate, illis Auicennæ calumnia fretis, quæ tamen licebit ex ijs quæ subijciā explicare & diiudicare. Sanguis sincerus à calido innato, cuius subiectū est & pabulum, regitur atque conseruatur, & quia ab eo non deseritur, ideo ægerrime tardissimeque putret. Quia tamen omnia præter ignē putrescere possunt, non est dubium quin sanguis etiam ipse interdum cōputrescat, cum nec spiritus, nec aer à putredine immunia sunt. Inducitur autē in eo putredo à calore externo, siue is sit in aere ambiente calidiorē aut aliter vitiatō, siue in nobis ipsis ab aliqua intēperie aut cacochymia genitus. In causa est obstructio, quæ prohibet tū ne foras excrementa fuliginosa expellantur, tum ne intro subeat attractus aer, qui sanguinem alicubi impactum ventilet. Causa etiam quandoque est in aere calidiorē, qui calore nostro potērior eum foras euocat, dissipat, redditque tam imbecillū vt sanguinem suum, præsertim si magna eius copia fuerit, ampli⁹ regere & continere nō possit. Putredo etiam illa accidit, cum calor natiuus mitis & benignus, alterius caloris commercio & contractu acrior euadit, vt iam non concoquat & conseruet sanguinē, sed eum vrat, corrumpat, putrefaciat. Ceterum ea putrefactio nō inducitur temporis momēto, sed interdum biduo, triduo ve toto aut longiori etiam spatio sanguis tantum incalescit & feruet, non etiam putret, sicut Galen. meth. med. lib. 8. & 9. docuit. Eo quidem tempore synochus dicitur non putris. Verum nisi quis obstructionem summouerit, perseverante malo quicquid in sanguine tenuissimum pinguisimumque est, in bilem flauā transir, quæ ob substantiæ tenuitatem alteratu facilis, vnaque cum sanguine putrens synochum putrem biliosum creat. Nam si cum valemus, labore, inedia, ira interdum adeo inalescimus vt sanguinis portio in bilem vertatur, multo magis dum synochus non putris æstuat in corpore, flauē bilis prouentus fit ex portione sanguinis renuiore & pinguiore. Cum igitur tantum bilis genitum sit quantum biliosam febrem facere potest putrendo, tum pro synochō nō putri synochus putris biliosa appellatur, quamuis nondū multus sanguis putruerit, nec putrendo in bilem flauam transierit, sed procedente tempore transiturus sit, si putredinis causæ perseuerarint. In quo locum non habet Auicennæ calumnia libr. 4. fen. 1. tract. 2. cap. 4. vbi scribit: Error est maxim⁹ in hoc Gal. sermone, quādo sanguis putret, eum in bilē transire. Transir enim in bilem aut quādo putrescit, aut quando putrefactus est, quorum vtrumque est falsum, quod tenue abeat in bilem, crassum in humorem melancholicum. non ergo totus abir in bilem. Quod enim

dicit Anicenna, locum quidem habere potest consummata iam & perfecta putrefactione, non etiam per eius initia cum ex syncho non putri incipit fieri synochus putris, quo tempore parum adhuc bilis com-putruit, nec quarum satis est ad gignendam febrem continuam biliosam quæ tertio quoque die exacerbetur, multoque minus continuam melancholicam, quod humor melancholicus frigidus, crassus, terreus, non statim gigni possit ex syncho non putri, eamque protinus & immediate sequi, sed longo post tempore, multum exusto sanguine & syncho putri iam inueterato. Vt enim ex ephemera synochus non putris, & ab hoc putris nascitur, ita ex putri syncho gigni potest continua febris melancholica mutationes quarto quoque die habens. Verum tantisper dum synochus putris erit, non fiet ea quam putauit Anicenna sanguinis in melancholicum humorem conuersio, neque vlla eius notæ apparebunt. Quare recte videtur dixisse Galenus per synochos putres bilem accendi, & notas quasdam putredinis inchoatæ in ijs videri, eumque male Anicenna reprehendit, existimans vna eum biliosa sanguinis parte etiam crassiorē conuersum in humorem melancholicum accendi. Neque enim ex vno recte concludit alterum, quia bilis repentinam habet generationem, succus autē melancholicus multo tardiorē. Præterea flaua bilis ob caliditatem, siccitatem, tenuitatem, lenitatem igni proxima, æstuante feruenteque sanguine promptissime calorem illum externum concipit: humor autem melancholicus frigidus, terreus, crassus, grauis non facile incendio conflagrat, etiam si in loco putredinis, ut & flaua bilis, maneat, sed id potius calore suo mitiori aut frigore quodammodo temperat, eique diu reluctatur.

*Σύνθεσις*, est ossium inter se compositio qualiscunque ea sit. est enim summi generis nomen. Diuiditur in duas species, *ἀπὸ σπὸν καὶ σὺμ-κλιν*, ut auctor est Galen. lib. de ossibus; ubi etiam *σύνθεσις* aliis nominibus. *σύνθεσις καὶ ἰμμίστα* tradit vocari.

*Σύνθεσις*, distentio. Opposita est τῇ χαλάρῳ, hoc est laxitati. Vtræque non modo in cute, sed in ipsis etiam articulis contingit. in his quidem aut amplius resiccatis, aut perfrigeratis, aut inflāmatīs, aut induratis: in cute vero, non his tantum modis, sed etiam ubi musculi intra ipsam quouis modo augescunt. Quare etiam ex carnis abundantia quibusdam sæpe cutis distenditur, & in inflammationibus hoc ipsum vel maxime perperitur, ut Galenus libris methodi medendi pluribus docet.

*Σύνθεσις*, sunt medicamēta quæ ad siccius paulo vergunt, nec tamen adhuc clare manifesteque contrahentia sunt. Galenus libro 4. meth. med. quo tamen loco quidam pro eo nomine *ἐξαρταῖς* reponunt.

*Σύνθεσις*, colliquatio. Morbus est in quo venter

excernit humorem biliosum à toto corpore confluentem, fuluum, graueolentem, crassitudine strigmentorum aut olei aut adipis. Philagtrius morbum appellauit. Symptoma potius videtur esse febris malignæ & ardentissimæ, quæ tum pinguedinem, tum mollem etiam carnem tabefacit & colliquat, ac si diutius perseueret, ipsam etiam partium solidarum substantiam. Nec tamen pinguis tantum deiectione colliquationis signum est, nisi aliz quoque prius dictæ qualitates simul adsint. Nam ab exiguo etiam calore pinguedo intestinorum fundi potest, quæ in excrementis apparebit: sed eum qui carnes colliquet, feruentissimum esse prorsus necesse est. Itaque ut scribit Galen. comment. 3. in l. 3. *ἢ ἐκ πυρῶν*, colliquationes quæ per ventrem excernuntur, à plagiibus deiectionibus differre medici existimant. Ab hoc symptomate febris ipsa *σύνθεσις* & *σύνθεσις* appellatur, de qua mox dicetur. Cæterum non in deiectionibus modo, sed in vrinis etiam signa colliquationis apparent. Nam, ut scripsit Hippocr. pinguitudines telis araneorum similes vrinæ innatantes colliquationis signa sunt: fit enim, ut ait Galen. *ἀπὸ σπὸν καὶ σὺμ-κλιν*, seu quomodo cunque nominare libet, aliquando totius corporis, aliquando succorum duntaxat qui venis continentur. Quod autem ex ea colliquatione provenit, alias ad ventrem confluit, alias ad vrinas. si tenue quidē est & renes valent, ad vrinas: si crassum est & quate renes trahere non possunt, totum in ventrem necessario fertur. Verum ex vrinis certū colliquationis iudicium sumi non potest, quod sæpe pingues & oleosæ vrinæ nullo ægri detrimento reddantur, imo vero interim plane contrario, in morbi concoctione, ut à se visum Galenus eo commentario testatur est.

*Σύνθεσις*, &

*Σύνθεσις*, febris colliquativa siue colliquans. Est febris ardentissima pinguedinem, carnes, ipsamque solidarum partium substantiam fusam & liquatam calore per ventrem effundens. Ea omnino grauissima periculosissimaque est, animal ipsum aliquando interimens, priusquam solida fibrosa que corpora liquentur. Inducit summam maciem, quemadmodum & febris marasmodes. Sed in eo differunt, quod quæ portio carnis per febres marasmodes colliquatur, ea semper vaporis vice digeritur per insensilem transpiratum, per febres autem colliquantes humoris biliosi, fului, graueolentis crassique specie defluit in ventrem. Harum autem febrium exemplū manifestum ex carnis petitur, dum in craticulis torrentur. Siquidem ab aliquibus plurima liquatio defluit, deciditque in prunas largiter: ab aliquibus nihil omnino, quod utique sentias, defluere videtur, etiam si par sit prunarū subdita copia. Quippe feris suis aut nihil omnino, aut plane minimum est quod defluat: ci-

at: cicuribus vero plurimum, eoque magis quo plus adipe vel carne abundant. Ad eundem modum in calidissimis febribus, si carnes humidæ ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehendas: sin sine adipe & siccæ sunt, in marasmodos febres transeunt. Clarissimo huius rei argumento sunt infirmi, qui per alium quod liquatur excernunt, qui nisi prius moriantur, in marasmodos febres incidunt. Siquidem quoad materiam vberem habent, hanc colliquant: vbi illis tum adeptum caro mollis defecit, duras & ægre liquabiles carnes siccant, à quibus propter siccitatē nihil defluit. Itaque præcedit fere semper colliquans febris, deinde marasmodos exhaustis iam prorsus humoribus consequitur.

**Σωτηρίων**, vehementiam & magnitudinem causæ morbum committētis intellexit Hippocrates sect. 4. *τὸ ἀπὸ διαίτης ἰσχύον*, differens de sanguinis stillicidio.

**Σωτηριον**, ὀσπιδιον, idoneum, apud Hippocratem.

**Σύεον**, à quibusdam *τὸ σίου* dicitur.

**Συελανός λίθος**, lapis qui etiam *ινυδαίμος* appellatur & *πικρὸς λίθος*.

**Συελανός ὀπός**, Galenus lib. 2. *αἵ τινες* ex Archigene existimat esse Comagenum, quādoquidem id ipsum ex Syria apportetur, cuius pars Comagene sit. fiebat autem ex adipe asserino cum cinnamo in vase æreo multa niue obruto, ac rigore gelido macerato: vt Plin. lib. 10. cap. 22. tradit.

**Συεργίης**, genus est *τὸ καλάμιν*, id est arundinis eius quæ fistulis est accommodatissima. vide *κάλαμος*.

**Σιεργή**, fistula. Est sinus angustus, oblongus, callosus, interdum etiam obliquus, os habens cui cicatrix obducitur nequit, per quod humor certis temporibus tenuis excernitur. Nascitur quemadmodum & sinus ex abcessu. Præcipua eius substantia callus est, materia autem humor melancholicus, qui discussus & per halitum digestis tenuioribus humoribus remanet. Itaque in genere tumorum præter naturam continetur, quāvis ob manifestam continui solutionem inter vlcera potius quàm inter tumores numeretur à præstantissimis etiam medicis. Dux eius produntur differentię, cæca, quæ osculum in profundo, sinum ad superficiem habet: occulta, quæ & os & sinum obtinet in profundo. *αὐτὸ δὲ σιεργή* Hippocr. sect. 2. Prognost. verbum *σιεργή* οὐδὲν fecit, sumpta, inquit Galenus, à musicorum fistulis metaphora, quæ longæ & causæ sunt. Qui enim in hominum corporibus affectus iis similes generantur, eodem etiam donantur nomine.

**συεργή** etiam est arundo fistularis atque *ὁ ἐξ ὧν φθαίος κρασίης τῆς συεργίδος*, exterior callosæ fistularis cortex. Galenus lib. 1. de antidosis scribit Andromachi filiū nomini *κρασίης* addidisse nomen *συεργή*, & dixisse *κρασίης συεργή*, atque postea obtinuisse apud phar-

macopæos vt sic appellaretur.

**Συερίον**, idem est quod *σινδύξ*, si credimus Aetio sic scribenti l. 2. *καρόμενον τὸ καρπὸν ψευδαμύου, εἰς τὸ καλούμενον συερίον μεταβάλλεται, ὅπερ οἱ ἰατροὶ σινδύκα ὀνομάζουσιν*. hoc est, vsta pura cerussa trāsīt in Syricum, quod medici sandyca appellant. verum Plinius Syricum ex sandyce & Sinopide fieri scribit partē pondere permistis. Videtur & Paulus Ægineta *σινδύκα καὶ συερίον* idem existimasse, scribens lib. 7. ad hunc modum: *σινδύξ ἢ συερίον, λεπτομαρές μὲν ὄντι καὶ ζῆρατικὴς διωόμενος, οὐ μὲν θερμὸς*. id est, Sandyx siue Syricum tenuium partium est & siccatur, nec tamen calefacit.

**συερίον** est collyriū *ἀδονητικὸν καὶ ἀπαλόν*, quod & *σινδύκα* Aetius scribit appellari lib. 7. quo loco ab eo describitur. non est dubium inditum esse collyrio nomen à metallico medicamento quod in eius compositionē ingreditur, quod *σινδύξ* siue *συερίον* appellatur, quod aliud non est quam cerussa vsta, vt supra annotauimus.

**Συρμαία**, sic dicta est à quibusdam raphanus, quod concitando vomitu esset idonea. Similiter & cibi quoddam genus quod veteres ex adipe & melle concinnabant. Est & portio è sale & aqua mistis apta ventri purgādo.

**Συρμαίσιμος**, dicta est à veteribus modica vacuatio, siue per vomitum, siue per alui deiectionem fieret, sicut annotat Galenus comm. 2. *αἱ τὸ ἀπὸ ἀφύου*. Paulus cap. vlt. lib. 1. interpretatur vomitum qui fit ieiunis ante cibum. Galenus etiam *συρμαίαν* appellat, & interpretatur moderatam eorum quæ in ventre sunt purgationem, in lexico Hippocratis.

**Συναπτικαίσις**, est durorum siccorumque ossium *σύνφυσις* carnis interuentu. Hoc modo caro gingiuarum dura & firma & dentibus firmiter appressa ipsos suos ossibus veluti colligat, adeo vt dentes ob gingiuarum laxitatem mobiles, gingiuis adstrictis stabiles atque immoti reddantur. Similiter & omnes ossium commissuræ, quas muscoli circueundant.

**συναπτικαίσις** etiam dicitur ratio quædam vulnere labra quæ nimis hiāt, nec hamulis auracu adduci possunt, componendi. Id quod adhibitis medicamentis perficitur, quæ gignendæ carnis facultatem habent.

**συναπτικαίσις** etiam dicitur *ὡς τὸ ἀδρηνάκη καὶ περιόκη*, cum scroti tunica, vasa, testes cum carne enata superfluaque concreuerint, vt vnum omnium corpus esse videatur, vt scribit Paulus Ægineta lib. 6. cap. 63.

**Συσμαπτικὸς σπινθίς**, est pulsus inæqualis in pluribus pulsationibus magnitudinem non parem retinens. Hic plurium pulsuum quæ si æceruo constar, atque inde nomen habuit *συσμα* enim æceruum significat & cūmulum. Huius tres habentur differentię, *ὁ ἀγλαίπτος, περιμεινὸν, μείζους* siue *μεινύσας*. Est autem inæqualitas illa *συσμαπτικὴ* cognitu omnium facilima. Dicitur etiam alio nomine *συσμα*.

**Συσταλ.** est motus cordis & arteriæ quo ipsa dilatata per diastolen, comprimuntur. Pars enim pulsus est, quo facultas reprimat pulsum eleuatum & se explicantem, eoquē in opere consequitur ut fuliginosa excrementa expellat & repurget, atque ita refrigerium calori nativo molitur. Paulus libri secundi capite vndecimo, definit motum esse quo arteriæ extrema ad medium sui confidunt coniuuentque, atque ita fuliginosa excrementa expellunt. Submissio Latine dici potest.

**Συσπρεσσαι.** coire, cogi, densari. vsurpatur à medicis in iis quæ liquidiora sunt, & coctione spissantur atque coagmentantur. Inde *συνεσπρεσμένη αμύρμη* amurca dicitur per cocturam inspissata, & *συσπρεσμένα έριου* hapsus lanz, & *συσπρεσά* tubercula & durities ab humoris concretionē, quas *φύματι καὶ σκληρίας* Galenus exponit *αυτῆς γλῶσσης*. ut & *συσπρεσμένην* interpretatur *συνεσπρεσμένην*, hoc est, quod cogendi & coniungendi vim haber. In qua significatione etiam Hippocrates de frigore loquens libro sexto *τῷ ὀπίσθι μὲν* vsurpauit, sicut Galenus eo loco exposuit. Similiter comment. 3. *αἱ τὸ πᾶσι διατῆς ὀξείας*, ubi scribit, cum humores aliqui vitiosi confluxerint in partem aliquam, ibique cumulari fuerint, in ea parte *συσπρεσσαι* dici.

**Συσπρεσν. φύματι καὶ σκληρία.** hoc est tuberculum & durities, ut Galenus exponit in suo lexico Hippocratis, sed multo apertius declarat comment. 4. in lib. de ratione victus in morbis acutis, scribens esse eam quæ à partibus excitatur intumescens. Audire siquidem etiam nunc multos in Asia ita nominare omnes præter naturam tumores.

**Σφαγὴ.** iugulum. proprie cauum illud quo disparantur *αἰσῆς*, pars colli & pectoris communis, ut inquit Aristoteles. Nomen habet quod hic locus ad cædem maxime obnoxius sit.

**Σφαγὴν φλέψ.** iugularis vena. Est ramus venæ causæ clauiculas supergressæ, sursum secundum iugulum conscendens. Est autem is ramus geminus, vnus internus, qui iugularis interna, alter externus, qui iugularis externa dicitur. Illa gracilior secundum latus asperæ arteriæ ascendit ad fauces, & inde in cranium, venulis exilibus obiter missis in asperam arteriam & membranas vicinas & nervos sexti quidem paris in collo, septimi vero in faucibus. Vbi autem cranium attingit, bipertita maiore ramo per cranii basim reflexo, vbi surculum dedit musculo colli interno longo, per foramen paris sexti cum minore carotide arteria sibi coniuge cranium ingressa, coit in vas commune. Minore autem ramo, vbi ramulum auditus organo dimisit per foramen transversum sibi commune, & portio neri quintæ coniugationis crotaphiten petenti, cranium intrat per foramen æpe geminum, sed exiguum, prope latus externum foraminis tertie & quartæ coniugationis in crassam meningem ramosè absumitur. Externa vero iugularis, sæpe simplex, interdum etiam diuisa multipliciter, idque nunc initio sui, nunc in collo medio ascendit sub colli latus sub cute & musculo lato, surculis obiter in vicinos musculos, cutim, membranas dimissis. Vbi fauces attingit, portionem sui in oris partes, glandulas, musculos tum hyoïdis, tum laryngis, tum linguz linguam infernam, tunicam narium internam absumit, nisi quod ramuli aliquot inde etiam in crassam meningem emicant per foramen tum pone mastoide apophylum, tum secundi nervorum paris, tum maximum inter ethmoïdea, surculis obiter in oculos & frontis cutim distributis. Portionem alteram semper subcutaneam dimittit ramo insigni super genam infernam ascendente, in labra utraque, pinnas nasi, nasum, frontem, faciem reliquam, maiorem oculi angulum, & inde in venam frontis vel propriam vel sibi oppositæ communem. dextra scilicet ac sinistra ibi in vnâ coeunte, altero in glandulis ad aures variegatè diuiso, in cutem tum capitis tum faciei & frontis absumitur. Est autem notandum externas iugulares nullas habere adiunctas arterias, etiam si quandoque motu aliquo pulsui cuiusdam non dissimili agitari videantur, ut à se obseruatum esse Galenus prodidit comment. 4. *αἱ τὸ πᾶσι σφαιρῆται*.

**Σφαγὴν.** dicitur à quibusdam *ἰατροῖς*, ut habetur apud Dioscor. Significat etiam pinos arētes, muscoso villo canos, non in cortice modo, verum & in ramis cerri arboris glandiferæ dependentes cubitali magnitudine, odoratos: quos aliter *κατὰ χυρὸν*, *σφαγὴν*, *βρύον*, Latini penem appellant. *σφαγὴν* etiam & *σφαγὴν* à quibusdam dici *τὸ ἐλελίφανον*, hoc est saluam, Dioscorid. auctor est.

**Σφαγὴν θαλάσσια.** est recrementum quoddam maris globosum & spuma maris in littonibus & scopulis concretescens, simile *τῇ ἁλὶ ἀγρῇ*, hoc est spumæ salis. Gaza apud Aristot. histor. animal. lib. 9. cap. 14 pilam marinam interpretatur, quo loco ille scribit alcedones nidum marinæ similem pilæ, & iis quæ à flore maris halosachne dicuntur. Meminit & Galenus *τῆς σφαγὸς θαλάσσιας* lib. 1. *τῷ 15* *πῶς*, capit. 2. describens Critonis pharmaca conservandis augendisque pilis idonea. vbi male Cornarius pro sphæra siue pilâ, spongiam substituit.

**Σφαγεῖον.** collyrii nomen, sed multiplicis. Aliud Tryphonis, quod apud Galenum libro 4. *τῷ 15* *πῶς* habetur. Aliud Euelpidis apud Celsum lib. 6. cap. 6. Est & emplastrum nomen apud Aetium libr. 15. & Paulum libro 7. quo Paulus lib. 4. cap. 11. utitur ad ambusta pustulis, ut inquit, iam excitaris. Non est dubium à globosa figura inditum nomen esse quæ sit efformatum.

Dicitur & simpliciter *σφαγεῖον* orbiculus, globus.





apophyses extra craniū quidem duas, quas ab alarum similitudine *πτερυγίδες* siue *πτερογυίδες* appellāt, intra vero, treis *καρποίδες* vocatas, vnam posticam, quæ superiorem, duas anticas ad neruorum optictorum exortū, quæ inferiorem lecti partem repræsentant. Inter has apophyses qua parte os profundius est & omnium tenuissimum, vel vnum est foramen medium, capiti aciculæ par, vel multa exigua visu tamen & tactu perceptibilia, ceu in coronam sita, per quæ pituita ex cerebri ventribus in choanam recepta, transmittitur in duos sinus seu specus maximos, his foraminibus subiectos, & inde in nares & palatum. Idem os etiam à Galeno *ἀγρίς* appellatur, hoc est coniugatum, quia vnicum est non geminū, cum tamen non reliqua modo ossa, sed & cartilagines & muscoli & partes omnes geminæ existant.

*Σπρίστια φάρμακα*. vide *σπρίστια*.

*Σφρυγίτις*. sphincter. Musculus est ani rotundus vltimam recti intestini oram ambiens. Hic adstringit rectum intestinum, ne intempestiue excrementa effluant. Substantiam habet inter cutem & musculum mediam, cuiusmodi est labiorum pars vltima. vide *ἑδρα*.

*Σφοδρὸς σπρίγμους*. vehemens pulsus. Qui diastole sua medici tactum euertit: seu, qui violentè impellit, & cum renixu quodam pulsatur. Huic oppositus, *ἀμυδρὸς*, hoc est languidus, dicitur. Sumpta autem est hæc tota differentia à diastole, siue à qualitate occursus & ictus arteriæ, siue à tono & vigore arteriæ in feriendo & distendendo. Est autem vehemens pulsus vnus & simplex, non compositus, tamen si vulgo *τὸς σφοδρότης* nomen actioni validæ simul & citatæ tribuatur, vt scribit Galenus: cui si liceret nomina rebus propria instituire, ingenuè profiteretur se pulsum hunc non *σφοδρὸν*, sed *ἐντονον*, aut *ἐνρυστον*, aut *ἰσχυρὸν*, aut *βίαιον*, aut *ἀντιβιατικόν*, siue *αἰσθητικόν* *τὸς ἀφ' ὧς* vocaturum, *σφοδρὸν* autem eum qui ex hac ipsa differentia, & celeritate constaret. Quia tamen maxima pars medicorum vehementiæ nomen vsurpat pro vna hac simplici differentia, non existimauit sibi mirandum esse nomen, sed pariter cum illis vehementem pulsum appellari qui tanta contentione, tantoque cum renixu pulsatur, vt tangentis digitum subuertat, & loco quodammodo moueat. Ac quamuis inter vehementem & languidum medius quidam pulsus & mediocris, vt & in aliis pulsuum differentiis intercedat, ipsumque vehementis nomen excessum quendam significare videatur, vehemens tamen pulsus, si modo non facile ab externis causis muretur, naturalis & moderatus à Galeno perhibetur, sicut præter naturam ab eodem languidus statuitur, qui à tactu euertitur, atque etiam amborum medius, qui nec tactum euertit, nec ab eo etiam euertitur. Neque enim ita se habet in hac pul-

sum differentia, vt & in reliquis, in quibus quod mediocre est, secundum naturam est. Cum enim pulsus vehementis causa sit facultatis pulsificæ robur, eamque expediat homini quam robustissimam esse, daminari non potest pulsus vehementia, maxime si congenita est & naturalis, atque non facile ab externis causis muretur. Quæ enim facile mutatur, congenita non est, sed non aliter quam magnitudo & celeritas vsu virgente inducitur, vt ira, exercitatione, vini potu, eodemq; deficiente elanguescit. Sed de hoc præstat legere Galeni scripta lib. 1. de causis pulsuum.

*Σφοδύλλιον*. folia quadamtenus platani & panicis habet, caules foeniculaceos, cubitali altitudine aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed larius, candidius, & magis paleaceū, grauius odoris. flores eius albi, aut pallentes: radix raphani, candida. Nascitur in palustribus & aquosis. facultatem habet, dissecantē.

*Σφραγίς*. nomen est trochisci auctore Polydo, cuius descriptio est apud Paulum l. 7. c. 12. & apud Aetium lib. 9. cap. 49.

Est & *σφραγίς* apud Cellum nomen pastilli quem Polybus confecit ad glutinanda vulnera, cuius descriptionem habet libr. 5. cap. 10.

Est & *σφραγίς* Neapolitæ & Pacci apud Galen. lib. 4. *τῆς κατὰ τὸν*. Ex quibus apparet commune hoc nomen multorum medicamentorum fuisse.

*Σφραγίς αἰγρὸς ἢ*

*Σφραγίς λιμνία*. idem quod *ἡ λιμνία γῆ*. de qua suo loco.

*Σφριγμὴ*. sic veteres vocarunt *σπρίγμον ἀπειρον*, hoc est pulsum inordinatum & incompositum, vt annotat Galenus in libr. de pulsibus.

*Σφριγμὸς*, pulsus. Primum quidē nomen hoc veteres adhibuerūt designandis motibus dolorificis, quos partes experiūtur inflammatione laborantes, præterea palpitationibus, & concitato vehementique motu arteriarū, quomodo Hippocrates etiam vsurpauit sect. 4. lib. 4. *ὅτι διαίτης ὀξείας*, sicut Galen. eo loco annotauit. Postea vero à medicis accuratius distingui cœpit, vt non modo de motibus illis præter naturam diceretur, sed de eo maxime qui secundum naturam in corde & arteriis fieri animaduertitur, cuius naturam Hippocrates vel non callebat, vel vt fallacem neglexit. Verum eius posterit diligētissime in eius cognitione versati sunt, vt vix aliud sit in arte medica maiore studio explicatum. Est autem motus cordis & arteriarū dilatione contractioneque factus. Hic vitam moderatur, vt qui vel nō aliud sit quam vita, aut causæ certe rationem obtineat per quam vita est, aut sine qua esse non potest. Neque enim aliud vita videtur esse quam actio quædam siue motus actiuus. Cum autem motus plures sint in omnibus vita prædictis, is merito præstantissimus est, & in eo maxime

maxime vitam positam esse censendum qui perpetuus sit, & à quo ceteri omnes dependent. Eiusmodi cordis motus est, cum reliquæ partes interdum ferientur, eo perseuerante, nec vnquam, stante quidem vita, muneri sui vacationem habente. Nec vero cor sibi tantum motum illum ciet, sed corpori etiam vniuerso, quod ita singulis partibus, quantum quæque meretur, calorē natium cuius opifex est, impertiat. Constat autem motus is duobus motibus inter se cōtrariis, quorū vnus cor & eius arteriā à medio quoquo versum distendit, & loco mouet, alter distentum rursus cōtrahit, & in locum priorem reducit. Illū *συστολή*, hunc *διαστολή* Græci veteres dixerunt. Hi quia contrarii sunt, necesse est inter eos media quies intercedat, eaque gemina, vna quæ diastolē, altera quæ systolen excipiat. Ab his differentiæ plurimæ pulsuum oriuntur. Cum enim certis quibusdam numeris ea in edendo pulsu sibi inuicē succedere oporteat, si in aliquo pec-

cerur, pulsus protinus varius fieri necesse est. Numeros appello non rhythmū modo, sed etiam velocitatem, magnitudinem, frequentiam, vehementiam, aliaque eiusmodi ex quibus pulsuum differentiæ sumuntur, quas posteriore tabula descripsimus, quarū aliæ ab ipsa diastole, aliæ vero à systole, nonnullæ à media quiete, quædam ab ipsa arteria, plurimæ ab ipsa facultate aut vlu sumuntur. Cum enim variæ mutandorum pulsuum causæ sint, aliæ externæ, vt hyems, æstas, calor, frigus, animique passionēs: aliæ internæ, vt humorum copia, crassities, acrimonia, & alia id genus: præcipuæ tamen sunt quas continentes appellant, ipsa scilicet facultas vitalis & pulsifica in corde posita, deinde vltus propter quem pulsus fiunt, qui nihil aliud est nisi caloris natui conseruatio, eum per diastolas refrigerando, & per systolas purgando, postremo instrumentum quo pulsus fiunt, quas proxima tabula ante oculos proposuimus.

CAUSÆ  
pulsū  
mutan-  
tes.]

1. **Externæ** vt hyems  
æstas, frigus, calor  
& quæcumque ex-  
tra corpus posita  
ipsam alterant ca-  
lore & frigore, vt  
aer, cibus, potus,  
motus, quies, bal-  
neum, affectus a-  
nimi.

Facultas vi-  
talis, cuius  
essentia est  
in commo-  
do corpo-  
ris cordis  
tempera-  
mento po-  
sita, à qua  
pulsus fit

2. **Internæ** humorum  
copia, crassities, le-  
tor, acrimonia, & si  
qua id gen<sup>o</sup> in cor-  
pore continentur.  
Hæ ambæ etiā cau-  
sæ alterationis pul-  
sū dicuntur, quia  
vt pulsus mutetur  
causæ sunt, mutata  
prius per eas causa  
aliqua continente.  
Non autē sunt cau-  
sæ generationis  
pulsū, seu vt pul-  
sus fiant, id quod  
causæ continentes  
sunt.

3. **Continentes** seu  
coniunctæ & cohæ-  
rentes.

Vfus pro-  
pter quem  
pulsus fiunt,  
primus &  
maxim<sup>9</sup> est  
caloris na-  
turi in toto  
corpore tu-  
rela per di-  
astolas re-  
frigerati,  
per systolas  
purgati à fu-  
liginosis ex-  
crementis.

Instrumentum per  
quod fiunt  
pulsus, vt  
arteria.

**Robustus**, cuius  
causæ sunt tempe-  
riem corporis cor-  
dis propriam ser-  
uantes, aut corri-  
gentes malam.

**Mediocris**, cuius causæ sunt al-  
teraturæ remissæ, vel ambæ, sed  
æquipollentes, vel primæ, qui-  
bus mox succedunt vltimæ.

**Imbecillus**, cuius  
causæ sunt

**Internæ**

**Externæ**

1. **Humoris** semicrudi qui iam coquatur excretio. Paulus  
sen cum Galeno lib. 1. prælagiorum puls.

2. **Naturæ** ad crisim impetus, nisi id sit in eodem genere,  
scilicet humorum coctione. Crisis enim perfecta  
non fit, nisi concoctis humoribus à natura.

3. **Ira**

Vinum.

Cibus.

Exercitatio.

Vel horum contraria, qualitate, quanti-  
tate, tempore postulante exhibitz.

Cætera cordis & arteriarum intemperiem corrigentia,  
vt potus, cibus, medicamenta, balneum.

**Inedia**, quæ per accidens vacuat.

Vacuationes immodicæ per aluum, vrinas, vrerum, hæ-  
morrhoidas, sudorem, vomitū, fluxū sanguinis è na-  
ribus, aut sectam venam aut alia vacuantia remedia.

Tristitia, curæ, dolores maxime syncopici.

Quæcumque cordis & arteriarum intemperiem faciunt,  
siue in corpore sunt, vt in humoribus vel partibus so-  
lidis, siue foris adueniant.

Quæ facultatem vitalem depriment, calfaciendo, refrig-  
gerando, humectando, siccando, digerendo. 1. prælag.

Inedia & alimenti penuria.

Omnis immodica vacuatio.

Affectus animi vehementes.

Dolor vehemens aut diuturnus, aut partis prin-  
cipis.

Morbi maligni, acuti, magni, & vehementes &  
diuturni.

Per se, vt materiæ affluen-  
tia & copia humorū su-  
pra vires & facultatem.

Per aliud, scilicet arteriæ  
affectus, vt obstruen-  
tes eam vel prementes.

Inflammationes.  
Scirrhus.  
Tumores alios.  
Abscessus.  
Corruptiones  
alias.

Temperamento calidiore.

Ætate, vt puerili, florida.

Aeris statu calidiore, vt ætate, sub zona torri-  
da, flante Austro.

Aere nos ambiente.

Balneo.

Cibo, potu, medicamento.

Exercitatione.

Intemperie calida.

Humorum putredine.

Ira & similibus. Paulus.

Motu corporis aut animi.

Putredine.

Suppressione calidi effluuii.

Contactu alterius caloris, vt ignei, solaris.

Mixtione calidæ substantiæ, vt vini, cibi, medicamenti.

Gal. lib. 1. de febr. cap. 4. & lib. de causis morborum.

Naturalibus, vt temperamento frigidiore, &c.

Non naturalibus, vt aere nos ambiente frigidiore.

Præter naturam, vt intemperie frigida, succis frigidis, me-  
tu. Tot enim genere sunt causæ refrigerantes calorem,  
quot calefacientes, sed contrariæ.

Aere externo corpori occurrente vel inspirato, vel frigi-  
diore.

Aqua affusa vel pota immodice.

Cibo pituitoso.

Balneo, medicamento corpori inuncto vel deuorato.

Metu, quiete & otio diuturnis.

Humoribus frigidis in corpore cõrentis prius quietis aut  
cõmotis. Gal. 1. 1. prælag. pulsū, & lib. de caus. morb.

Cibo humido.

Balneis frequentioribus.

Somnis multis.

Vita molli & delicata, & voluptatibus & otii, &c.

Comate, scilicet somnolento.

Lethargo & omni immodica humiditate, qualis est in hy-  
dropse seu leucophlegmasia, seu anasarca & hypofarca. Gal.  
1. 1. prælag. pulsū, & 4. de causis pulsuum hydrop. & 2. præ-  
lag. pulsuum.

Siccitate à febribus ardentibus male productis à torrido marcore, & à cer-  
tis quartanæ & melancholiæ generibus.

Constrictione à frigore, vt ex pomorum esu, aquæ potu, balneis frigidis  
& breuiter omnibus quæ pituitam frigidam aut succū vitreum gignūt.

Affectibus conuellentibus.

Magnis inflammationib. præsertim viscerum, vt hepatis &  
lienis.

Constrictione & tensione simul, vt in scirrhis præsertim hepatis & lienis.  
Gal. 1. prælag. pulsuum, & 2. vbi tractat causas pulsus duri validam con-  
strictionem recenset, vt Paulus. Et lib. de causis morborum.

Tensione

Constrictione

Constrictione

Constrictione

Constrictione

Constrictione

Constrictione

Constrictione

Constrictione

Constrictione


Constrictione

Constrictione

ex Galeni Isagoge &amp; Paulo, ex quibus sumantur.

1. *σφοδρὸς*, velox, qui paruo tempore multum spatii conficit, seu qui arteriam brevi tempore multum distendit.
2. *συνμετρεῖς*, mediocris, qui in motu medio se habet. Is autem naturalis est.
3. *βραδύς*, tardus, qui longo tempore parum spatii meretur, seu arteriam distendit.
4. *μέγας*, magnus, qui longus, latus, & profundus simul est, seu per quem arteria in eas tres dimensiones distenditur.
5. *συνμετρεῖς*, mediocris, amborum medius, qui & naturalis est.
6. *μικρὸς*, parvus, qui brevis, strictus, humilisque simul est.
7. *σφοδρὸς*, vehemens, qui diastole sua medici tactum evertit, seu qui violenter impellit, & valenter ferit. Hic si non facile muratur, naturalis est & moderatus.
8. *συνμετρεῖς*, mediocris, qui ne tactum evertit, nec ab eo etiam evertitur. Non est secundum naturam, ut quidam putant, sed præter naturam, ut languidus auctore Galeno.
9. *ἀσθενὴς*, languidus, qui à tactu evertitur, aut qui tactu languide ferit.
10. *μαλακὸς*, mollis, cum arteria in occursum, siue in diastole sua ceu tenera ac carnosior apparet.
11. *σκληρὸς*, durus, cum veluti siccor & in modum corii rigidior arteria occurrat.
12. *πληρὺς*, plenus, qui arteriam in sua diastole pleniorē repræsentat, & occursum eius humiditate plenum.
13. *συνμετρεῖς*, mediocris, inter plenum & vacuum medius, qui & naturalis est.
14. *κενὸς*, vacuus, qui digitorum impressione confidet, seu qui aeris modo arteriam excitat, ut digitorum impressione loci inanitas occurrat.
15. *θερμὸς*, calidus, quando arteria calidior apparet quam partes vicinæ, ut in febre hectica.
16. *συνμετρεῖς*, mediocris, seu temperatus, qui calidi frigidique medius est.
17. *ψυχρὸς*, frigidus, in quo arteria frigidior sentitur.
18. *συνμετρεῖς*, mediocris, inter frequentem & rarum medius.
19. *σφαιρικός*, rarus, quando quietis tempus inter diastolen & systolen medicū longum est.
20. *ὀρθρὸς*, qui rhythmum servat proprium ætatis, naturæ, sexui, temporis anni, &c. cuius autem in quo sit pulsus.
21. *ἀσθενὴς*, qui rhythmum vicinæ ætatis, naturæ, sexui, temporis anni, &c. proprium servat.
22. *συνμετρεῖς*, qui rhythmum remotionis alicuius ætatis, naturæ, sexui, partis anni, &c. mutatur.
23. *συνμετρεῖς*, qui nullius ætatis, naturæ, sexui, partis anni aut reliquorum rhythmum servat.
24. *ὁμοῦλος*, id est æqualis, Absolutè. Sic dicitur in quo omnes pulsuum differentie pares manent.
25. *ὁμοῦλος*, id est æqualis, Secundum quid: ut velocitatem, magnitudinem vel aliquam aliam differentiam unam, aut plures, non tamen omnes. Sic dicitur pulsus, in quo omnium insequentium pulsuum par est celeritas, magnitudo, frequentia &c. Dicitur etiam *ἰσός*.
26. *ἀσθενὴς*, deficiens, quando non solum vno, sed pluribus etiam magnis vnus minor apparet, atque interdum totus quoque motus aboleatur.
27. *συνμετρεῖς*, coincidens, deficienti contrarius, in quo expectata quiete in medio tanquam superuacuo aliquis pulsus incidit intercidens.
28. *μικρὸς*, qui non cessat decrescere atque minui, donec omnino aboleatur.
29. *μεγας*, qui ex quo cepit decrescere, in priorem statum non redit, sed in qua primū desit paritate, eam perpetuo servat. Caret autē proprio nomine.
30. *συνμετρεῖς*, qui postquam decrevit, rursus inaugeat, & redit in magnitudinē priorī parem, maiorem, vel minorem. *μικρὸς* & *πυλινδρῶς* dicitur.
31. *συνμετρεῖς*, impariter velox. Qui à velocitate in tarditatem transit, & contra.
32. *συνμετρεῖς*, impariter vehemens. Qui à vehementia transit in languiditatem, aut contra.
33. *συνμετρεῖς*, id est, continuus & non intercisus.
34. *ἀσθενὴς*, hoc est intercisus. Qui interciditur quiete, & post eam velocior euadit: hic proprio nomine *διερρηδίζων*, id est caprizans, dicitur. Vnicus pulsus est, non geminus, quod licet bis tactum feriat, id tamen in vna diastole fiat.
35. *συνμετρεῖς*, hoc est repetens. Qui repetit ac recurrit, & secundo tactum ferit post absolutam diastolen, antequam systole absoluta sit. *διερρηδίζων* proprio nomine dicitur. Is non est pulsus vnus, ut putat Archigenes, sed multiplex.
36. *συνμετρεῖς*, Qui continuus manet, æqualis vel inæqualis. Cuius plures sunt differentie pro pulsuum magnitudine longa, breui, media. Nam si motus occurrit digitis duobus, sex erunt necessario differentie: si tribus, viginti quatuor: si quatuor, 78: consergent.
37. *ἀσθενὴς*, hoc est, intercisus aliqua ex parte, seu interruptus. Huius differentie primæ sunt quatuor. Nam si motum sentiat digitis primus & tertius, non 2 & 4, nouem erunt differentie: si vero 1, 3, 4, non etiam 2, aut 1, 2, 4, non etiam 3, differentie 27 erunt: si vero 1 & 4, non etiam 2 & 1, differentie 9 fient.
38. *συνμετρεῖς*, Si magnus apparet in parte arteriæ superioris parvus in inferiori iuxta ægri pollicem.
39. *συνμετρεῖς*, Si magnus circa duos medios digitos sentitur, minor secundum extremos.
40. *συνμετρεῖς*, In quo non tota simul distenditur arteria, sed pars superior & cordi vicinior primū, deinde alia secundo digito tacta, mox alia tertio, postremo quarta, pollicis ægri vicinior, motu manente continuo in modum vndarum sese attollentium. Inæqualis est in magnitudine, vehementia, velocitate, consensu partium arteriæ. Ob id in eo, ut tribus sequentibus, composita in æqualitas à Galeno dicitur.
41. *συνμετρεῖς*, vermiculans, gressui vermis similis: cum scilicet vndulosus totus in paruitatem minuitur: hic parvus, languidus, frequens & non obscure tardus est.
42. *συνμετρεῖς*, formicans, seu formicarum motui similis: cum scilicet vermiculante imminuto, & multis motibus abolitis, pulsus sit minimus omnium: languidissimus, frequentissimus, nec tamen velox, ut putauit Archigenes. Hic rudes fugit, nullum tunc esse arbitrantur. Ceterum tres prædictos pulsus distinguit quantitas & magnitudo, non qualitas.
43. *συνμετρεῖς*, febri hectica, phthisi & empyemati proprius. Hic nullam magnam mutationē sustinet, sed vtriusque ipsa perpetuo similis manet.
44. *συνμετρεῖς*, conuulsorius. In quo vtrinque ab extremis retrahi tendi & conuelli videtur arteria, instar chordæ tensæ, & in quo, ut in vibrato, à suo situ traducta est arteria.
45. *συνμετρεῖς*, vibratus. In quo maior diastole est, & arteriæ quædam partes sursum, aliæ deorsum eodem tempore feruntur, instar iaculorum valida manu emissorum, arteria tamen nec retrahi, nec conuelli videtur.
46. *συνμετρεῖς*, ferratus. Cum alia pars arteriæ elata distentaque, alia minus, ob inæqualem ex phlegmone duciem videtur esse. Vibrari quiddam simile habet. Velox est & frequens, non semper magnus.
47. *συνμετρεῖς*, ordinatus, hic in singulis pulsuum generibus inueniuntur.
48. *συνμετρεῖς*, inordinatus, ex toto seu absolute tantum dicitur, ut qui nullam præter paritatis corruptionem ordinem quoque periodorum similiter inæqualium corrumpat.
49. *συνμετρεῖς*, Absolutè, quando semper est ordo certus circuituum, parium, magnitudinis, velocitatis, frequentia, &c. Ut si duo pulsus magni fiant, deinde duo parui, iterum duo magni, deinde duo parui & sic deinceps, eiusmodi pulsus inæqualis est, ordinatus ex toto seu absolute. Similiter & in aliis generibus.
50. *συνμετρεῖς*, Secundum periodos & circuitus, quia ordinem continuum non seruat, nec habet omnes periodos pares, sed per quendam auterum: ut si duo magni pulsus fiant & duo parui, deinde tres magni & tres parui, postea quatuor magni & totidem parui: deinde ceu rursus incipientes duo magni & duo parui, post tres magni & tres parui, atque similiter deinceps. Sic enim primo circuitui quartus est similis, & secundo quintus, & tertio sextus. Hic pulsus ordine participat in omnibus similiter periodicis, in ordinatione in singulis. Ob id Paulus hunc pulsuum speciem facit inordinatam.
51. *συνμετρεῖς*, inordinatus, ex toto seu absolute tantum dicitur, ut qui nullam præter paritatis corruptionem ordinem quoque periodorum similiter inæqualium corrumpat.
52. *συνμετρεῖς*, Præter has decem differentias adduntur à Galeno duæ, quæ sumantur.
53. *συνμετρεῖς*, A situ arteriæ { sursum, deorsum, prorsum, retrorsum, deorsum, sinistrorsum, dextrorsum. } traductæ.
54. *συνμετρεῖς*, A motu arteriæ, cuius pars vna prius, altera postea in eodem pulsui distenditur, sicut in vndoso & vibrato.





**Σφυγξ.** malleoli. Sunt duæ ossium epiphyses in extrema tibia prominētes & gibbosæ. non sunt autē hæ vnus ossis epiphyses, sed duorum quibus tota tibia conflata est, scilicet *ἡ ὑπὸ τοῦ ὀστέου*, hoc est tibiæ & suræ. Si quidem *ἡ ὑπὸ τοῦ ὀστέου* inferiore in parte interius protuberat, *ἡ ὑπὸ τοῦ ὀστέου* vero exterius. Itaque nō sunt aliud malleoli quam fines *ἡ ὑπὸ τοῦ ὀστέου*, hoc est tibiæ & suræ, inferni, quæ utrinque excarnes sunt & gibbi extraque prominent. Proinde errant, ut ait Galenus, qui eos *ἀσπράγδα*, id est talos, nominant, qui et ex parte Galenitempora exortus, ad nos vsque dimanauit, multis etiam doctis viris *σφυγξ* talos vertentibus, cum malleolos dicere debuerint. Neque enim hæ apophyses astragalum constituunt, sed sub his astragalus latet, tactui & oculis ob ligamenta & tendones nequaquam conspicuus.

**Σφυγξ** *ὀφθαλμοῦ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

res fracti ossis, sed velut ipse rectitudinem funduntur. vide *ἡ ὑπὸ τοῦ ὀστέου*.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

**Σφυγξ** *ἡ* *ἐν τῇ* *ἐκτετακτῇ*. malleoli vena. Hæc ad inguinis glandulas nata, per internum cruris, genu, tibiæ, inter cutim & membranam carnosam descendit ad malleolum externum, & in pedis superni cutim varie absimitur. vulgus saphenam vocat.

aut femur fractum conficitur & cōtinetur. Simile quidem est glossocomo, sed figura differt, vt scribit Galen. comment. 2. *de m. & c.* quo loco Hippocr. de eius vſu multa differt. Exterius rotundus est, interius catus, perinde atque canalis fistilis, per quem aqua confluir in viis lapide stratis, quo fit vt totum membrum cui aptatur, circulo comprehendat. Is autem canalis chirurgicus ab inferiori parte foramina habet, per quæ, si quis humor excesserit, descendat, & à planta moram, quæ simul & sustineat eam & delabi non pariat, & à lateribus cana, per quæ loris datis mora quidem crus femurque vt collocatum est, detineat, sicut Corn. Celsus lib. 8. cap. 10. describit.

Quinetiam ad canalis fistilis similitudinem *σπλιών* ab anatomicis dicitur medium foramen quo omnes ceruicis vertebrae peruiæ sunt, & spinæ medulla à cerebro descendit: id quod alio quoque nomine *ινεξ σπινε* vocatur, quasi lacram fistulam dicas aut magnam.

*Σάπρον*. est medicamentum metallicum odore retro, colore nigro, inisdem metallis, in quibus misy & chalcitis, proueniens. Scripto p̄didit Gal. se in Cypri metallis instratas sibi mutuo foreos, chalcitidis & misyos laminas vidisse, sed infimum quidem sory, summum misy, in medio chalcitidem fuisse. Simul e-

nim hæc tria reperiuntur, quod magna se inter ea substantiarum cognatio, adeo vt certis temporum spatii sory in chalcitidem, chalcitis in misy transeat, à natura perfectius excoctum. Sunt enim hæc tria eiusdem generis, solaque partium tenuitate & crassitie differunt. Crassissimarum enim partium est sory, tenuissimarum misy, medium locum chalcitis obtinet. Sed præterea in odore & colore inter ea annotata differetia est, quod sory fere nigrum sit, misy aureo colore, chalcitis xreo, quodque sory tam tetrum vibret odorem, vt mox olfacienti moueat nausæ. Habetur *δισσώρεας* emplastrum apud Aetiū lib. 14. c. 44. admirandum in curatione malignorum vlcernum. Apud Aetium & Paulum *σπινε* scriptum est.

*Σάουδρον*. dictum fuisse à quibusdam *πὸ δελφίνου* Dioscorides author est.

*Σάπνις*. seruatrix. nomē antidoti, cuius descriptio habetur apud Paulum. l. 7. c. 11.

*Σαφρονισπρις*. genuini dentes qui omnium nouissimi nascuntur, sed vt plurimum quidē ab anno decimo octauo ad vigesimum sextū. Visi aliquando sunt etiā octogesimo nasci. Hi vtrobique singulares penitissima oris parte nasci solēt, ideoque ita nominantur, vt scribit Rufus, quod nascantur cum homo *σαφρονισπρις*, hoc est sapere, incipit. Sunt autem e genere dentium molarium. vide *ισθρις*.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

### T O T.



*Λγρίν*. oleum rancidum, ex vetustis & rancidis nucibus expressum, quæ *καρύνα πυλά* & *ελαινες* dicuntur. Quod quomodo pareatur Cōstantinus Cæsar. docet lib. 9. cap. 22.

*Ταινία*. tæniæ. lumbricorum species quæ etiam *πλατύναι* & *κερίαι* dicuntur. sic dicti sunt quod instar fasciarum sint longi & lati. male apud Plinium tinea pro tæniæ scriptum est, quem errorem non animaduertens Gaza apud Aristot. lib. 5. de histor. animal. cap. 5. *ελμυδαι* tineas reddidit. vide *ελμυδαι*.

*Ταλαντον*. dicitur à quibusdam herba quæ medici polygonion, Macedones *οστράκαλλον*, vulgus symphyton appellant, quod dissectas carnes tradant coalescere si coquatur vna.

*Ταμαρικη*. tamarice. sic dicitur à nonnullis *η μουρίκη*.

*Τάμπος*. coagulum. quod alio nomine dicitur *πύσσα*. vt explicat Gal. in Lexico Hippocr.

*Τάραξ*. oculi perturbatio. Morbus est oculi quem Paulus lib. 3. cap. 22. definit esse hu-

miditatem & caliditatem oculi cum rubore præter naturam, nō à corpore, sed ab aliqua causa externa inductam, vt sole, fumo, pulnere, oleo, ideoque facillime sanari, depulsa scilicet causa. Galenus comment. 5. in librum sextum *ὅτι ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς* scribit *τὴν πύσιν* in oculis phlegmones quoddam initium esse. Paulus vero eo solo *ἀπὸ τῆς ἐφθαρμένης* differre prodidit, quod *ἡ πύσις* à manifesta tantum causa fiat, illa verò non à manifesta modo, verum etiam ab interna, adeo vt ad quintum vsque diem nonnumquam perseueret.

*Ταραξέν*. turbare, vehementius cōmouere vt apud Hippocr. *παραξένον τὴν καὶ τὴν ὁδὸν* *παραξένον*. neque enim eo verbo aliquid moderate, sed supra modum fieri intelligitur, vt Galen. comment. 3. explicauit.

*Ταραχὴ*. *ὁ ἀλόγος παραξένος*. apud Hippocr. in prorrh. vt Galenus comment. 1. annotauit. Significat & *τὴν πύσιν ἐμπίπτει*, vt prorrh. sect. 2. vbi scripsit *παραχὴ διὰ τοῦτο τῆς πύσιν* *διὰ τὴν πύσιν*, hoc est vrinæ cum morſu & dolore exeuntes, vt Galenus eo loco explicat.

**Talax.** falfamentum, proprie quidem dicitur caro piscium fale condita & exiccata, ac præsertim eorum cernices & ventres, ceteræque partes pinguiore, vt scribit Oribasius lib. 2. Reliquæ enim partes minus pingues *μαλακία* vocantur, non autem *ταλαξ*. Vt autem differentes sunt pisces, ita sunt falfamentorum variz differentiz & facultates. Qui enim sunt natura minimum excrementitii, siue molli carne præditi sint, vt omnes faxatiles, siue dura, vt muli, inepti sunt ad falfamenta. Qui vero excrementosi sunt, hoc est, qui succum in se continent pituitosum, si fale adferuntur, *ταλαξ* fient præstantissimum, atque eo quidem magis quo ille fuerit crassior & copiosior. Sardica falfamenta (Sardas hodie vocant) maxime commendat Galenus, deinde coracinos, pelamidas, & quæ sexitana vocabantur. Alii *ωπαία*, quæ & *ωβία* dicuntur, laudarunt. Ea fiebant ex pelamide minore, & ab his *Σύμια* quæ ex pelamide maiore erant. Quanquam vero *ταλαξ* nomen de piscibus fale conditis intelligatur, atramen ad alia etiam accommodatur, quæ alia quauis conditura asseruari possunt. Nam & apud Galenū legitur lib. 5. *Πρὸς τὸν πρῶτον, περὶ τοῦ ἐκ δρυμοῦ τοῦ ἐφ' ἡμέρας μὲν ταλαξιοῦς τοῖς ἑσπέραις.* hoc est, pyrethrum aceto acerrimo quadraginta dieb. infusum, terito. Dicitur & *ταλαξ* cuiuscunque animalis inueterata caro, etiam citra salis condituram, vt apud Dioscoridem videre licet. capite de adipe anserino & gallinaceo *διὰ τὴν αἰσὴν περιχυμένης*. Item apud Plinium libro 28. de adipe suillo, quem inueterari scribit duobus modis, aut cum sale, aut syncerum. Transtulit & ad homines Galenus libr. 9. meth. med. & comment. 2. *οὐκ ἔστι διαίτης ἔξιον*, loquens de medicis diatritariis, qui, vt ait, triduo fame *μετὰ ταλαξιοῦς πρὸς αἰσπρῶς*, quarto die nutrire incipiunt. quo nomine non aliud ibi designat quam immodicam siccitatem inedia inductam.

**Talpis.** est pars pedis quatuor ossium serie constans. Ex his tria carent nomine, quartum *καλκιδίς* dicitur, illa cum osse scaphoide coniunguntur, hoc cum calce articulatur. Differunt inter se figura, magnitudine & situ. Verum omnia intus caua sunt ad ambulationis & apprehensionis firmitatem, foris gibba ad dyspathiam. Videtur in pede *ταλπίς* esse quod est *καρπὸς* in manu, nisi quod *τὸ καρπὸν* ossa sint octo, *τὸ ταλπίον* vero quatuor: ex minoribus namque particulis apprehensionis organum constare debuit, ex grandioribus vero id quod ad ambulandū comparatum est.

**Talpi.** dicitur cartilago in ambitu palpebrarum sita cui sunt inserta cilia, hoc est, palpebrarum sibi semper æquales neque vniquam excrecentes pili, quod propter cartilaginis siccitatem paucum illis suppedietur alimentum. Rufus autem non illam cartilaginem sed pilos ex ea nascentes *ταλπίς* καὶ *βλεφαρίδες* scribit nuncupari.

**Talpis.** etiam dicitur omne quod dilatatum est, ex quo vocabulum hoc manauit apud Hippocratem *πτερυγία*, quod significat dilatata fuerunt. vt scribit Gal. in interpretatione linguarum.

**Talpis.** dicitur à quibusdam *ταλπίς*, hoc est gluten, vt scribit Dioscor.

**Taurus.** taurus. est futura quæ à pene ad vsque sedem producit, vt explicat Introductio nis auctor.

**Taxi.** frequenter vsurpatur *αὐτὸ τὸ ταξι*, eorumque nominum vsus apud veteres sæpe confunditur, vt apud Hippocrat. *ὅτι τὸ ταξι διαίτης ἔξιον*, sicut Gal. comment. 3. annotauit.

**Taxi.** *ταξι* celer pulsus seu velox. Est qui breui tempore multum spatii conficit, seu qui arteriam breui tempore multum distendit. Vna est generalis pulsuum differentia, sumpta ex tempore motus, seu ex qualitate motus, seu ex quantitate temporis, motus, & spatii simul. Huic contrarius, *βραδύς*, hoc est tardus, dicitur. vide *βραδύς*.

**Tigari.** rigari. hoc est, per totam substantiam humectari. *βριγνῆς* vero, extrema tantum superficie madefieri: vt scribit Gal. libr. 9. de simpl. medicamentis. *πῦρον* autem humectare est, vt explicat Galen. in lexico Hippocratis.

**Tigari.** dicuntur ea quæ humore perfusa cum intra se admittunt, indeque humidiora fiunt & molliora, vt lana & terra. Contra vero *ἀπυκνῆς* sunt, æs, sal, nitrum: illud quidem quod ab igne concreuerit, hæc vero quod humore liquecant, nec perfusa maneat & euadant molliora, quod tamen *πυκνῆς* proprium est. Scripsit Aristoteles in vniuersum ea *πυκνῆς* dici, quæ eunque terrea poros habent maiores aquæ mole & duriores: maiores quidem vt aquam admittere possint, duriores vero vt non prompte ab ea resoluantur. Itaque quoniam in lateribus & ære minores sunt, in sale vero nitroque molliores, *ἀπυκνῆς* censentur. Cæterum *πυκνῆς* καὶ *μαλακῆς* de genere eorum sunt quæ concreuerunt, & quæ *πυκνῆς* appellantur: differunt autem quod *μαλακῆς* igne, *πυκνῆς* humore fiant, manente in vtrisque ipsa rerum forma, sed humidior mollioreque, aliter quam *ὅτι τὸς πυκνῆς*, quorum forma colliquatione prius soluitur & perit. Sal enim & nitrum humore diluta speciem suam amittunt.

**Talpis.** *ταλπίς* vinum marinum. vide *δολιχόσπινος*.

**Tenelmus.** tenelmus. Est continua & implacabilis desidendi cupiditas, qua nihil præter cruenta pauca & mucosa egeritur. In causa est vel genita in longanone inflammatio cedematosa, hærentium illic excrementorum opinionem & ea deiiciendi desiderium mouens, vel actis quidam humor in extremo intestino collectus assidue ad excretionem irritans, vel obstructio à stercore in tenui intestino coacta, vel vlcus intestini recti, à quo

excitatum tenesmum quidam proprie tenesmum vocari volunt. Malum hoc sæpe dysenteriam præcedit, interdum tam vehemens est, vt symptomatis omnibus dysenteriz simile videatur, vel eam etiam summo desidendi conatu superare.

*Τεμαρσις*. est quæ per *τεμαρσιον* fit cognitio.

*Τεμαρσιον*. dicitur id quod perpetuo vnum aliquid significat: quod non est aliud quam argumentum ab indicatione sumptum, siue ipsa indicatio. est autem argumentum necessarium à quo desumpta rerum cognitio, *τεμαρσις* appellatur. Eo distinguitur *σημειον*, quod non est perpetuum neque necessarium, vt quod non desumatur à propria cuiusque rei indicatione quam natura suggerit, sed ab obseruatione empirica quâ *τηρησις* appellant. Est enim *σημειον* proprium *τῆς φύσεως ἐμφαντικόν*, sicut *τὸ τεμαρσιον τῆς ἀνθρώπου λογικόν*, quod non aliud est quam indicatio. Author Galenus commentario 3. in progn.

*Τηλαίον*. dicuntur lintea, concepta quæ vulneribus accommodantur, vel fascioli potius quibus oblata membra deligari solent.

*Τηλαίον*. consumere, *ἀρδύσασθαι*: quod vocabulum vsurpatur ab Hippocrate lib. *ἀπὸ τῆς τῆς*, vt annotat Gal. in lexico Hippocratis.

*Τίμα*. dicitur pars ea pedis qua terram contingimus & calcamus.

*Τίσις*. finis & ultimum, vt annotat Gal. in lexico Hippocratis.

*Τίσιον*. tendo. Est *ἀντιρροισις* seu finis musculi quo in partem mouendam inserto fit motus omnis voluntarius. Constat fibris nervorum & ligamentorum in vnum coeuntibus, & interdum carne adhuc eas fibras ambiente. Itaque mixtam habet ex nervis & ligamentis naturam. Hippocrates, sicut annotat Galenus, consuevit appellare *τίσιον*, eas musculorum extremitates quæ ab anatomicis *ἀντιρροισις* nuncupantur, eas præsertim quæ minus carnosæ sunt. Dicitur *τίσιον* *ἀπὸ τῆς τίσεως*, id est à tendendo, quod eius actio præcipua intensio seu contractio est: horum enim vnusquisque fibris suis versus musculi caput retractis partem cui insertus eodem contrahit atque euellit.

*Τρίκλινος*. Arbor est, de qua vide postea in dictione *τρίκλινος*.

*Τρίπιδος*. caries. Est solutio continuitatis in osse ab erosione facta. Causa est humor acutus & acris in osse putrescens ipsumque exulcerans. Sed initio quidem hoc malum reducitur ad aliud ægritudinis genus, & ossis asperitas potius quam caries nominatur. Maiori autem facto foramine & quodam veluti sinu vno vel vario apparente, *τρίπιδος* dicitur. dicitur enim *τρίπιδος* quasi *τρίπιδος*, *ἀπὸ τῆς τριπιδος*, inquit Galenus, quod in eo affectu os pertusum sit: nisi forte denominetur à *τρίπιδος* quod vermem significat qui ligna erodit: namque & os quasi à vermibus corrosus videtur. Sunt autem in osse *τρίπιδος* & *τρίπιδος* idem: quorum vtrumque

eodem nomine cariem Latine dicere possumus.

*Τρίσπον*. proprie quidem sic dicitur summus antennæ: & *τρίσπον* ipsi ruderes inde in summum velum peruenientes. Hippocrates autem in 2. de morbis mulierum, cum inquit, *τρίσπον* fuerit morbi, perinde est atque si diceret summum & supremum, & curationis maxime egens. Galen. in lexico Hippocratis.

*Τρίσπονδος*. species est phymatis, inquit Oribasius, supra quod pustula nigra eminet, quæ rupta inferne similis desquamato apparet, eo autem dissecto pus inuenitur. Dioscorides Alexandreus scriptis prodidit terminthum esse cutis excrescentiam, rotundam, ex nigro viridem, terebinthi fructui simile. Id quod etiam Galeno visum est lib. de linguis Hippocratis. Galenus autem committit. 4. in lib. 6. *τρίσπονδος* literis mandauit, terminthorum nomē nigras quasdam pustulas in cruribus maxime orientes significare, à figura, coloris, magnitudinisque similitudine quæ cum terminthorum, hoc est cicerum, fructu habent, deriuatum. Est autem *τρίσπονδος*, Latine terebinthus, arboris etiam nomē, cuius folia & semen & cortex adstringunt, & ad eadem, ad quæ lentiscus, conueniunt. Excalfacit ordine secundo, & adstrictorium quiddam habet, siccatur etiam ordine secundo.

*Τύπον*. medicamenti compositi nomen, quod describitur ab Aetio lib. 6. cap. 91.

*Τύποιος* *σπυγμός*. ordinatus pulsus. Est qui circuituum ordinē seruat, formamque eadem retinet. Huic contrarius est *ἀντύπος*. Ille per singula pulsuum genera inuenitur, duobusque modis dici potest: vno quidē modo absolute, quādo semper certus est ordo circuituum parium magnitudine, velocitate, frequentia, vehementia, aliisque differentiis: vt, si duo pulsus magni fiant, deinde duo parui, iterum duo magni, deinde duo parui, & sic deinceps, cuiusmodi pulsus inæqualis est, ordinatus ex toto, seu absolute secundum magnitudinem & paruitatem. Similiter autem & de aliis generibus statuendum. Altero vero modo ordinatus dicitur secundum quid, hoc est, secundum periodos & circuitus, quia ordinem continuum non seruat, nec habet omnes periodos pares, sed per quēdam numerum: vt, si duo magni pulsus fiant & duo parui, deinde tres magni & tres parui, postea quatuor magni & totidem parui, deinde vero ceu rursus incipientes duo magni & duo parui, postea tres magni & tres parui, atque ita deinceps. Sic enim primo circuitui quartus est similis, & secundo quintus, & tertio sextus. Itaque pulsus hic ordine participat in omnibus similiter periodis, in ordinatione in singulis, vt iccirco Paulus hūc pulsuum inordinati speciem fecisse videatur. Idem vero ordinatum pulsuum cū inordinato decimam pulsuum differentiam constituit, de quo tamen dubitare quis merito possit, quod omnis quantumlibet ordinatus pulsus inæqualis esse videatur, & proinde tota hæc differentia sub



sub inæqualitate comprehendi. Itaque si omnes pulsus ordinati inæquales sint, patet inæqualis pulsus causam quæ firma fixaque sit, causam etiam esse ordinati, vt non firmam fixamque inordinati. Attamen ex multis Galeni locis constare potest non omnes ordinatos pulsus inæquales esse. Qui enim perpetuo magnus pulsus est aut velox, ille in ea differentia ordinatus æqualisque est, vt in quo omnium insequentium pulsuum par sit magnitudo aut celeritas, aut alix pulsus differentix.

**Tetanus.** rigor. distentio neruorum. Est conuulsio perpetua totius corporis rigidi & in neutram partem inclinati. Species est τὸ ἀσπασμὸς fit enim contractis ad suum principium neruis & musculis. Nec tamen in eo affectu conuulsæ partes manifesto apparent, propterea quod æqualiter ante & retro tendantur. Conuulsio autem ipsa perpetua est, & non distincta accessionibus, veluti comitialis morbus, qui per temporum accidit intervalia, pertinetque vel ad omnes corporis musculos, vt scribit Paulus, vel ad illos qui sunt in ceruice, quibus caput annuit, renuit, & circumagitur, vt scripsit Pelops & Galenus lib. de musculorum dissectione, vel ad musculos & neruos qui habentur in maxillis, vt scripsit rudi adhuc seculo Aretæus. Quia enim per tetanum maxillæ conuelli manifesto videntur, ad eos affectionem ipsam pertinere existimauit. Sed cum tetanus totius corporis conuulsio sit, etiam Galeni sententia, non autem solius ceruicis, patet non modo ceruicis musculos, sed omnes qui corpus maximeque spinam dorsii mouent, conuelli: atque ita & totam spinam & manus pedesque contendit, vt in nullam partem flecti possint, sed rigida & velut congelata maneat: ex quo morbum hunc tum Græci τὸ ἀσπασμὸς τῆς σπονδύλου, tum Corn. Celsus lib. 2. cap. 1. rigorem Latine appellauit. Ex emprosthotono & opisthotono compositus esse dicitur à Galeno, quasi amborum medius, & æquali viriusque contentione factus, & ab eodem numeratur inter peracutos morbos, vt qui teste Hippocrate cito iudicetur & in quatuor diebus hominem perimat. Neque enim tantum dolorem natura diu ferre potest. Rarus hic prorsus affectus est. Sunt autem, vt scribit Aretæus, causæ huius prope infinitæ: omnes tamen ad duas summas, vt & ἀσπασμὸς, referuntur, inanitionem & repletionem. vide Aretæum.

**Tetractis.** ἡ

**Tetractis.** medicamenta erugatoria, siue quæ rugas emendant. Significat enim τὸ τετρακτὶς extendere, complanare, laeuigare, & rugas omnino tollere, vt apud Dioscoridem dera-dice vitis alba, ἡ τὸ τετρακτὶς, inquit, ἡ τὸ τετρακτὶς. Eius generis medicamentum id est quod ex Critone ad varios scripsit Galen. vt eam aut, τὸ τετρακτὶς καὶ καδάρων ἀγροδάρων τὸ τετρακτὶς hoc est, planam & puram conseruat faciem.

**Tempus quartanæ.** quartana febris. Est febris quarto quoque die repetens. Sic quidem in vniuersum febris omnis quartana definiri potest. Cuius duæ habentur differentix. Vna enim vera exquisitaque est, altera notha. Quæ vera quartana est, ea ab humore melancholico gignitur, frigido atque sicco, qui μύχια καὶ χολή proprio nomine appellatur. Ea in liene sedem habet in eoque putrescit. Eius signa sunt lienis tumor, rigor initio parum, qui tamen progressu temporis augetur, lassitudo ὀσφύος, pulsus parui, obscuri, tardi, rari per initia accessionum, & eorum in vna pulsatione inæqualitas, quodque soluta febre æger ad consueta munia facile redeat, cibumque appetat. Inuadit autem hæc febris autumno & ætate iam declinante. Quæ vero notha quartana est, ea non ab eiusmodi humore gignitur iam vltio, frigidoque & sicco reddito, sed ab eo potius qui vritur quidem, & ex flaua bile transit in atram, nondum vero vltus est & ater factus. Ideoque pariceps adhuc est caloris, vt qui bilis flauæ naturam nodum penitus exuerit. Propterea quæ ab eo quartana nascitur, multa aliquando habet cum tertiana febre communia. Oritur fere media ætate, iuuenes & ætate consistentes corripit, cum rigore inuadit, pulsus habet maiores, frequentiores & celeriores quam exquisita quartana, summamque inducit inappetentiam. A iecino-re initium ducit, inque eo sedem habet, quod iecur & inflammatur, & tumet, & dolorem contactu sentit, vt ex Rufo Aetius refert.

**Tempus quadrans.** hoc est, quarta pars cuiusque rei. Quare cum duodecim uncix in libra, totidemque cyathi in sextario habeantur, tres in illa uncix, vt & tres in hoc cyathi, τὸ τετρακτὶς, hoc est quadrans, iure dicentur.

**Tempus quartarius.** Est mensura liquidorum apud Atticos, alio nomine ἡ μιστομένη dicta, continens ἡ ἑξαρά, id est acetabula, duo, siue quatuor uncias & dimidiam. Sic dicitur quod sit quarta pars sextarii.

**Tempus secundum Plinium,** vel

**Tempus secundum Theophrastum,** vocatur ἡ τετρακτὶς, apud Athenienses.

**Tempus acopon** est, quod ex melle conficitur. Sic dicitur quod quatuor vnguentis constet. Recipit autem mellis 3 iij. arini 3 iij. rosacei 3 iij. glucini 3 iij. cereæ 3 iij. terebinthinæ 3 iij. valet ad lassitudinū molestias, neruorum contractiones, beneficit opisthotonicis & canina conuulsione affectis. Describitur à Galeno lib. 7. ἡ τετρακτὶς.

**Tempus emplastrum.** emplastri nomen est quod & βαμνιστὸν appellatur. Constat ex quatuor simplicibus medicamentis, vnde & nomen habet, cera, picc, resina, seu taurini, frid non est, vitulini pari portione inter se mistis. Puri mouendo non est aliud melius vel expeditius.

Est & *παραφάρμακον* antidoti nomen, quā alio nomine *μυστήριον* vocarunt. Constat quatuor medicamentis, gentiana, aristolochia, baccis lauri & myrrha, æquali pondere commistis. Valet ad podagræ præcautionem.

*Τρεμαίνω*. tremit. Gal. in lexico Hippocr.

*Τίρεμος*. tremor cum frigore, vt exponit Gal. in lexico Hippocr.

*Τρεπύλον*. pondus quatuor obolorum, siue *χαμματα δύο*, hoc est duo scripula: *χαμματα* enim in duos obolos diuiditur.

*Τίρεπος*. dicitur ab Orbasio & Rufo pars astragali seu tali superior & sursum vergens. Attamen totus etiā ipse astragalus *τίρεπος* (quidam quattrionem verrūt) dici potest à quatuor ipsius lateribus, dextro, sinistro, anteriore & posteriore. vide in dictione *ἀσπράγος*.

*Τρίκρινος* ἡ

*Τρίκρινος*. herba est virgē referens effigiem, trifoliaginis similitudine, tenui folio, non multū à cicere alieno. facultatem habet incidendi & tenuium partium est. quare lienes sanat. Tertio fere ordine exiccat, & secūdo exalfacit.

*Τρίκρινος*. sic dicitur à quibusdā *τρίκρινος*, Dioscorides author est. Sic etiā dicitur à quibusdā *τρίκρινος*, idem author est: propterea quod quandam habeat cum *τρίκρινος* similitudinem.

*Τρίκρινος*. beta. est olus radice vnica in longum protensa, carnosa, & nonnullis grata cibo vel cruda, caule striato, bicubitali, folio triplicis, semine copioso, vulgo nomen retinet Latinum, tamen & portea à multis nostrorum dicitur. Græci duo eius genera faciunt: vnā nigram, alterā candidā vocant. hanc autem præferunt, appellantque Siculam, quæ nunc extrita litera fere omnibus nostri seculi medicis sicla nūcupatur. Beta nutrit quidem sed parum, multaq; indiget alteratione, stomachum mordicat, multāque bilem continet. Est & nitrosæ facultatis particeps, quā digerit, extergit & per nares purgat, præsertim albā: nam nigra habet quidpiam adstrictionis, ob quam coquitur, inquit Dioscorides, cum lenticula, vt ventrē sistat.

*Τρίκρινος*. est cibi genus constans beta & lente mistis. Componitur ex pugnantis alimentis, itaque & facultatem illi amborum mediā inesse existimandum est. Siquidem in eo beta quidem minus subsidet, lens autem magis subducitur. Sistendi tamen ventris vim habere Dioscorides author est. cap. de beta, scribens betā nigram coqui cum lenticula, vt ventrē sistat, idque magis radice eius præstari. Orbasius lib. 2. collectorū, scribit in eius apparatu multas beras imponēdas esse & paulo plus salis ægari dulcis, quod ita facilius subducatur. Id edulii genus Heraclides Tarerinus non sanis modo, verum etiam ægrotantibus exhibebat, vt scribit Gal. lib. 1. de aliment. facult.

*Τίρεπος*. cinis. Sic appellatur vistorum lignorum reliquæ, nec lignorum modo, sed omnium aliarū rerum. Nam & lapidum etiam vistorum cinis est, vt ait Gal. quem Græci *κίνας*, Latini calcem appellant, tenuioris tamen quæ ex lignis fit substantiæ. habet autem cinis in se contrarias tum qualitates tum substantias. Eius enim pars quædam terrena est quædam velut fuliginosa, tenuium valde partium, vt quæ macerato aqua cinere & percolato vna abeat. Verum non omnis cinis eadem temperatura præditus est, sed varius pro combustæ materiæ diuersitate, vt nō temere Galenus Dioscoridem reprehendisse videatur, scribentem omnes cineres adstringendi vim habere, cum ficulneus expers sit omnis eiusmodi qualitatē, sed contra multum acrimoniam habeat, obtineatque plurimum adurētis facultatis cum absterfione. Verum Dioscorides cineris potius naturam quam materiæ respexit. Quanto enim vnumquodque magis terrenum est, tanto etiam videtur esse adstringentius.

*Τίρεπος*. sic dicuntur certi generis collyria, quæ & *αμύγδα* appellantur. valent ad dolores demulcendos, refrigerant & morfu carent.

*Τίρεπος*. collyrii nomen sic dicti à cinereo colore, quod quidam *κίνας* appellant, vt scribit Celsus lib. 6. cap. 6. vbi eius descriptio habetur. Meminit & Aetius lib. 7. habetque eius compositionem, sed multum à Celso diuersam.

*Τίρεπος*. donec, tunc, prius, vt explicat Gal. in lexico Hippocr.

*Τρίκρινος*. lapis qui & *κίνας* dicitur apud Dioscoridem, sic vocatus quia lapidem comminuat & veluti liquefaciat.

*Τρίκρινος*. liquabile. Est passiva qualitas secundi generis, de numero earum quæ secundum naturalem potentiam vel impotentiam dicuntur. Significat autem id quod in liquorem solui potest. Id autem prius concreuerit necesse est. Cum autem concretio duobus modis contingat, humidi scilicet vel calidi absentia, liquationis duo similiter erūt modi, humor atque calor. Quæ igitur humoris absentia concreuerunt, liquantur humore, vt aqua, aceto, vino, veluti ammoniacum, sagapenum, sal & nitrum: nisi forte concretio densatioque tāta sit, vt in angustiores poros aque moles subire non possit, sicut in lateribus accidit. Nā quia paulatim resiccati sunt calore qui omnem eorum humorem in aerem conuersum vacuauit, ita sunt adstricti in iis pori, vt per quos aer exiit, per eos non possit aqua immitti. Quæ vero caloris priuatione concretionem adeptæ sunt, calore liquantur, vt glaciēs, plumbum, æs, & reliqua metallica, ad hæc propolis, cera, resina, ladanum, seuum, galbanum, vide *πύρεπος*.

*Τρίκρινος*. Telephium vlcus. Sic dicitur malignum, inueteratū, & quod vix cicatricem recipit. Sic dictum est à Telepho, qui in tali vlcere

vicere consensuisse fertur. Idem vero etiam *χαρυνός* appellatur. Est & *πάλειος* herbæ nomen portulacæ similis & caule & foliis. ea alas binas in singulis foliorum geniculis annectit. ramuli à radice seni septennive produnt, foliis referti cœruleis, crassis, lentis, carnosis, flore luteo aut candido. Nascitur in cultis & maxime inter vites verno tempore. Galenus in lexico Hippocratis scribit *πάλειος* esse herbæ speciem, quod semperuium agreste, & portulacam agrestem vocant, Romani autem illecebram. Alii vero mercurialem intelligunt.

*Τηλίη*. sic dicitur à quibusdam *ὁ κύππος*.

*Τηλός*. sic à quibusdam dicitur sœnum græcum.

*Τήρησις*. observatio. Vocabulum est Empiricæ sectæ proprium. Quicquid enim Empirici aliquando observassent fieri in morbis, *τήρησιν* vocabant: quorum cum magnam haberent copiam, eam omnem *ἀφροισμα* nuncupabāt: & ab observatione quidem memoriam, à memoria vero experientiam manare dicebant, & ab ea proxime artem constitui, dum meminimus quid cum quo, quid ante quod, quid post quod observauimus, atque id quidem vel semper, vel plerunque, vel vtrouis modo: semper, vt vulnerato corde mortem sequi: plerunque, vt scammonia ventrem purgari: vtrouis modo, vt percussa superiori membrana cerebri mortem sequi: raro, vt vulnerata cerebri substantia salutem contingere.

*Τιδυμάλος*. planta est cuius septem produntur genera: quorum masculus *χαρυνός* & *ἀμυδαλοειδής* appellatur. Huius caules supra cubiti altitudinem sunt, rubri, lacteo succo atque acri madentes. folia oleæ circum ramos, angustiora & longiora, radix crassa, lignosa, pender in cacuminibus caulium coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur.

Secundus forma est, quem *μυροντίων* & *χαρύντιον* vocarunt, similis suapte natura daphnoidi, foliis myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis & pūgentibus. ramulos ab radice mittit dodrantes. fructum fert alternis ramis nuci similem, mordaci gustu.

Tertius est *ἡδονός* ἢ *πιδυμάλος* dictus atque etiam *μύκων*, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque senisue ab radice exeuntibus, foliis lini, angustis, parvis, oblongis, in versus quosdā digestis, capite in cacumine orbiculari, in quo semē, vt eruum, vario colore emicat. flos albus, frutex totus cum radice lacteo succo turget.

Quartus *ἡλιοκόπις*, nūcupatur, foliis portulacæ, tenuioribus rotundioribusque, ramulis prodeuntibus à radice quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis, capite anethi semine velut in capitulis incluso. Comas cū sole circumagitur.

Quintus *κυμαίνος* est, exiens in caulem dodrantalem vel maiorem, subrubrum, ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur,

molliora tamen & tenuiora. In totū nascentem piceā æmulatur. Cádido succo madet.

Sextus *δεδρονός* frondosam in cacumine comam spargit succo lacteo prægnans, cauliculis rubētibus, foliis myrti tenuioris, fructu characiz.

Septimus *μαύριμος* vocatur, verbasco similis. Omnes acrimoniæ & magnæ amaritudinis participes sunt, & calidæ præterea facultatis.

*Τήρησις*. dicta sunt à recentioribus medicis *τὰ ἀσκήματα*, hoc est vulsiones factæ in fibris musculorū, dum nimis distentæ interdum rumpuntur, vt annotauit Gal. comment.

4. *εἰς τὸ κατὰ τὴν ἑρῆσιν*.

*Τηλόν*. genus linamenti concepti, de quo vide *μητρίον*.

*Τιμορήσας*. apud Hippocratem & veteres Græcos sæpe significat *βοήθησας*, hoc est auxiliari & iuuare: vt annotat Gal. comment. 1. *εἰς τὸ πρὸς διαίτης ὀξέων*.

*Τιτανός πικρός*. pessus Titianus. Describitur ab Aetio lib. postremo ad vterum scirrho induratum.

*Τίση*. herba est quæ folio exit cyperidis, albido caule, læui, æquabili, enodi, cui summo in capite flos obducitur densus, euadens in lanuginem pappum vocatam. Nascitur in palustribus & circa stagnantes aquas. Est & cœrealis tipha sine geniculis scirpi modo nascentis radicibus multis vt triticū hordeumque, folliculo multiplici, leuissima frumentorum, solo etiam gracili facile proueniens, tritico persimilis.

*Τόκος*. Partus. actio est partum quidē vteri, partim vero ipsius fœtus. Vteri quidem, quoniā ille offensus grauitate iam multum adaucti fœtus & excrementorū redundantia, atque ob eam causam distētus, vi propria expultrice fœtū in lucē eūcit. Fœtus vero tum quod auctior, satis alimentum à matre non accipiat, tum quod partitionis tempore plus calidi naturæ habēs, magis quoque refrigerari postulet. Quamobrē quum non sufficiat spiritus maternus, quē illa per arterias subministrat ad exitum concitatur. Id autem nō vno certo statoque tempore contingit. nam multis septimo mense, plurimis nono vel decimo, fœtus in lucem editur, cum tamen sint statim in aliis animalibus pariendi tēpora. Homo autem solus nō vno, & incerto gignitur spatio. Cuius quidem varietatis causam aliqui ad vim imaginatiuam, quæ homini per quā varia est, retulere: alii ad motū fœtus primū qui fit in vtero: alii vero ad formationem, quæ infantibus quibusdā celerius, quibusdā tardius perficitur. Nā prout celerius vel tardius fœtus conformatus est, etiā tēpestiuus aut serius mouetur: ac demū tēpore bis tanto, à quo moueri cœpit, accedere, vt author est Auicēna, in lucē venit. Et de his quidem tribus mēsis, scilicet septimo, nono & decimo, inter medicos omnes philosophosque conuenit: an vero aliis etiā mēsisbus nasci possint, magna est controuersia. De sexto

quidem mense nemo vnquā scripsit visum à se fœtū, qui in illo natus, diu superstes vixerit. Siquidē illi omnes abortiui sunt, ac paulo post pereunt. De septimo nemo vnquam dubitauit, quin frugifera in eo partio cōtingeret. Sempronii Corbulonisque exemplo, vti refert Plinius, vtriusque consulis, quos Vestilia mater septimo mense genuit. De octauo melior authorū pars scripsit vitalem in eo fœtum non nasci, quamuis ab Aristotele scriptū aliter esse videatur. Eius autem verba non grauior hic ascribere, quā lib. 7. de natura animal cap. 4. habent hunc in modum: Cum cætera animalia omnia singulari ac simplici modo partum suum perficiant (vnum enim pariendi tempus statum omnibus est) homini vni multiplex datum est. Nam & septimo mense, & octauo, & nono parere potest, & (quod plurimum) decimo. Nonnullæ etiam vndecimum tangunt. Fœtus qui maturius quā septimo mense prodeat, nullo pacto vitalis est: qui septimo, vitalis hic quidē primus exiit, sed magna ex parte infirmior. Qui autem mense octauo nascitur, viuere ac adolescere in terra Egypto possunt, & quibusdā aliis locis vbi mulieres fertiliores sunt, multosque simul & ferūt & pariunt, etiā si mōstrosi sint. sed locis Græciæ multi intereunt, nec nisi per pauci seruantur. vnde fit vt si quis seruetur, non octauo mense natus existimetur, sed mulierem sui conceptus initium latuisse. Hæc Aristoteles: cui etiam Plinius fert testimonium, scribens Cæsoniam Cæii principis coniugē Vestilia matre mense octauo natam fuisse. Quin & Cæcilius poeta vetus sic ait:

*Insolente mulier decimo mense parere?*  
*Pol nono, etiam septimo atque octauo.*

Quod non inconsiderate Cæciliū scripsisse, M. Varro vti credam? facit. Nam mense nonnunquam 8. editum esse partum, in lib. 14. rerum diuinarum scriptum reliquit. Præterea 9. mense & 10. natos viuere nemo vnquam negauit: imo mēlib. istis partiones sunt frequentissimæ. Eamq; ob rem Varro duabus Parcis ab his duob. mēlib. inditum esse nomen perdidit. Parca enim, inquit, immutata vna litera, à partu nominata est. Sunt autem tres, Morta, Nona, Decima: quarū quidem prior sic dicta est, q̄ qui 8. nascitur, non diu postea moriatur. Posteriores autem duæ à partus tempestiui tempore nomen acceperunt. Nam & apud Virgiliū legitur,

*Matri longa decem tulerunt fastidia menses.*

De 11. autē mense quæritur non inter philosophos modo & medicos, verū etiam inter iurisperitos magna olim sub duobus Imperatorib. fuit dissensio. Siquidem partū in mensem vndecimū differri, & decimū excedere, plane hoc loco quē enarramus, Hippocrates inficiatur. Aristoteles v. vt supra retulimus, nonnullæ, inquit, etiā vndecimum tangunt. Præterea scriptū est ab Aulo Gellio, fœminam bonis atq; honestis moribus, nec ambigua pudicitia, in vndecimo mense, post

mariti mortē peperisse, factumq; esse negotiū propter rationē temporis, quasi marito mortuo postea concepisset, quoniam decem in decem mensib. gigni hominem, nō in vndecimo, scripsissent. Sed diuū Adriānum causa cognita decreuisse in vndecimo quoq; mēse partū edi posse. Cui tamē decreto contrariū factū est aliud ab Imperatore Iustiniano, qui epistola quadā quæ in nouis ipsius cōstitutionib. habetur, scribit idem suis accidisse temporib. natumq; mulieri filiū anno post mariti mortē, nōdū quidē cōfecto, sed affecto, sub finē videlicet vndecimi mensis. De quo quā apud eū quæstio esset instituta, pronūtiavit partū illū nō esse legitimum, nec dici posse ex defuncto viro susceptum, quoniam fœturā in tam longū tempus trahi posse nō existimaret. Quinetiā de duodecimo dubitatio est. Nam q̄ omnes fere negāt, ad eum vīq; fœtum geri posse, visum fuisse Homero, summo non solum poetæ, sed etiam philosopho, permulti dixere. Scripsit enim Neptunū dixisse puellæ à se recens compressæ,

*Χαίρεται φίλητα, σκεπτομένη δ' ἑαυτῇ*  
*Τέχης ἐγλαῖα πνίγναι ἢ ἀποφύγειν οἶον*  
*Ἀθανάτω.*

Hoc est,

*Gaude hoc cōplexu. Nā quā se volueris annis,*  
*Formosum puerum paries. haud irrita diuum*  
*Connubia.*

Quid q̄ Plinius secūds scripto mandauit, Lucii Papyrii prætoris edito bonorū possessionē infanti datā esse cōtra secūdū heredē, cum tamē mater partū se tredecim mēlib. diceret tulisse. Ita multiplex perficiendū tēpus, pariendiq; diuersum homini datum est. Verum nō decet, vt arbitror, quæstionē istā de partu, tā multiplicē, tamq; ambiguā, & altis submersam tenebris, istis authorib. explicare & definire: imo ex intima philosophia & pbatissimorū philosophorū scriptis, eruēda eius solutio est. Quæ qm̄ habet fuit semp difficillima, eā ob rem pleriq; quo magis ingenio pollebant, eo quoq; libētius in ea exercitati sunt. Neque se ab ea Mathematici, qui proprie Genethiaci dicuntur, nec ipsi adeo Arithmetici abstinerūt. Quorum sanē rationes hoc loco, antequā ad eas veniā quas Hippocrates attulit, adscribere nō grauior. Placuerūt enim illæ summis etiā viris. Itaque, vt ab Astrologis incipiam, habet hoc illi axiomatis loco. Corpora inferiora à superioribus affici, septemque planetas in hominem nō modo iā natū, sed etiā quādiu in vtero est, imperiū obtinere, nō simul quidem, sed suo quemq; ordine. Incipiunt autem à Saturno, tamquā à summo, eoque qui optimē cū principiis nostri ortus cōueniat. Flamida enim est liquidaq; hominum genitura, quā tamen coagulari decet & inspissari antequā hominē queat generare. Hoc autē illi facile Saturnus suppeditat, quippe qui frigidus siccusque est: eamq; ob rem ipsum facultatis retentioræ, quæ siccitate perficitur, authorem posuere. Secundum eum vim suam Iupiter in semen exiit. Ille namque


que augmentum præbet & calorem, vt qui calidus sit & humidus: quibus duabus qualitatibus incrementū maxime contingit. ob id ipsum Iouē augmento præesse dicit. Post Iouē Mars puerū veluti in vlnas accipit: qui quoniā calidus & siccus statuitur, foetus motum cōcedit istamq; ob causam tertio mense infantē moueri solitum. Quarto loco succedit sol, eiusq; beneficio tum ossa excauantur, tum meatus corporis euadūt ampliores & singulis membris sua perfectio accedit. Est enim calor solis ζῳπνώτερος, hoc est viuuior, magisq; viuificans. A sole foetus Venus frigida humidaq; inuisit, deque eo tam bene meretur, vt calorem siccitatemque à superioribus planetis impressam, mitiget atque corrigat: atque insuper venustatem illi decoremque conciliat. Ad foetus vero sexus velut è choro prodir Mercurius, qui operi ab aliis inchoaro veluti colophonē addere dicitur. Superiores enim initia tantum motionis dederunt, ne nihil, credo, superesset quod ageret Mercurius, & ne sine muneribus solus infantem salutatū veniret. At ea ipse perficit, & non modo firmiorē motum largitur, sed motus etiam instrumēta expolit, & accuratius absoluit. Tandem vero ad lunam vices redeunt: cuius plurima sunt in foetus merita. Nam quia frigida est & humida, adipem illi dat, & pluribus in partibus reponit. Quin & maiori quā ceteri liberalitate excellens, matrem insuper ipsam donis cumulat. Siquidem eius matricem humiditate sua relaxat, & quo pariat facilius, distendit. Sic foetus numeris omnibus absolutus & tot muneribus grauis, exitū affectat. Atque si exeat, salubriter degit. Exit autem, si robore polleat, seque ipsum possit ex vtero præcipitem dare. Sin autem aliter cōtingat, & cogatur octauū mensem expectare, iterū proculdubio reuertentem ad se Saturnum sensurus est, & episcopum habiturus, sed non tam mitem placidumque, quam mense conceptus primo. Namque multam ille in eum spirat frigiditatem, quā non modo natium pueri calorem imminuit, sed etiam ad motū reddit magis tardum: matremque præterea dono quo eā luna ornauerat, spoliat. Sua namque siccitate, quæ illi plurima est, os vteri constringit. Qua de causa, si aliqua forte extrinsecus pariendi occasio accedat, tam mater quā foetus magno in discrimine versabuntur: nec viuere partus solet: aut si fortassis huius sideris malignitatē superare possit, vitam plane deget laboriosam & ærumnarum plenam. Quod si nihil eo mense matri acciderit eiusmodi quod partū in lucem prodire cogat, sed in nonum vsque mensem foetura differatur, iam multo magis serenam Iupiter faciem ostendit. Eius enim aspectu omnia Saturni maleficia protinus aboleantur. Siquidem suo calore & humore vitam (quæ duobus istis potissimum consistit) puero instaurat atque conseruat. Quāobrem si isto nascatur mense, vitalis esse ma-

xime poterit. Nam & ζῳνὴ eam ob causam Græci appellant, tum quod sub eo partus maxime contingat, tum quod ipsius merito vitalis sit. ζῳν enim Græcis viuere est. Quia vero & qui Ioui succedit planeta, nō est maleficus, sed suo calore cum vita nostra facile cōspirat, ideo si quis etiam in decimum vsq; mensem protrahatur, vitalis plurima ex parte est. Hæ quidem sunt Astrologorum de partu rationes: à quibus non videtur auersa fuisse Procli inter philosophos haudquam postremi, sententia. Scripsit enim nō modo infantibus, dum gestantur vtero, præfici planetarum (vt sic dicam) vultus, sed etiam ætatum ordinem sequi ordinē vniuersi. vtrumque tamen fieri disparili ratione. Nā quæ vires suas postrema in partū exierit luna, eadem iam natum infantem non relinquit, sed primam eius ætatem moderatur, argumento nutritiæ vegetaliſque potentiæ: quarū vtraque humido perficitur. Post eam vero Mercuriū regendi gubernādique pueri prouinciam accipere: eoque fieri vt & litterarum & citharæ & consimiliū nobis studium ea ætate ingeneretur, & Arithmetices in primis: quæ omnia olim Mercurio veteres tribuere, & negotiis similiter lucroque illum præesse dixerunt. Ac quemadmodum inconstans Mercurii sidus dicitur, ac omnino eiusmodi quale id cui adhæserit, nempe cum benignis benignū & exitiale cū exitiis: sic & puerilis ætas facile eos promptequē sequitur, quibuscū consuetudinem habuerit. Sed & reliqua quæ de eo ab antiquis prodita sunt literis, consentiunt. Atque vt ille secundæ ætati præficatur, sic Venus tertię, sol quartæ, Mars quintæ, Iupiter sextæ, ac postremæ Saturnus, qui frigiditate siccitateque, quibus senilis ætas definitur, ad cœlestem tandem vitam abducit. Verum Arithmetici ex numerorū paritate imparitateque id ipsum demonstrare conātur. Imparē enim perfectū, parē vero imperfectū esse dicit: & parē quidē formæ, imparē vero rationē materiæ obtinere: & imparē numerū maiorem, parē autem feminā vocari. namque illi imparem patris, & parē matris appellatione venerantur. atque ideo dixisse Virgilium numero deum impare gaudere. Itaque cum septenarius & nouenarius impares sint, & proinde perfecti, nasci in illis & edi perfectos vitalesque foetus. Quia vero octonarius sit par, hinc fieri vt octauo mense natus non viuat. Cum vero de mense decimo illis obiicitur, eū quidem parē esse, attamen in eo nasci sæpissime foetus, & perfectionis numeros omnes obtinere: respondent denarium ex paribus solum perfectum esse, quoniam ipse numerorum omnium perfectio sit & complementum. Neque enim omnes qui antecedunt numeri, denario maiorem perficere possunt: sed qui denario succedunt, omnes ex decem, & præcedentium aliquo constituuntur. siquidem omnes tam barbari quam Græci (excepta,



vt author est Aristot. vna Thracum gente, quæ ad quatuor modo numerandi seriem terminat, eo quod meminisse ritu puerorū non potest, neque vsum habet rerum multarum) enumerant, statuto termino denarii numeri. Quod non forte casuque fieri semper omnibusque in rebus putandū, cum non fortuna, sed naturalis res sit, quæ semper atque vbique fieri solet. hoc autem sit, q̄ perfectus numerus denarius sit. Continet enim omnia numerandi genera, vt par, impar, quadratum, longū, primum cōpositum, & si quæ præterea sint alia. Sed & eius perfectionem hinc maxime dicūt videri, quod quatuor cubales numeri, è quibus vniuersum cōstare Pythagoreis placet, proportionibus decem constituuntur. Sed quæso cur tam male & sinistra de octonario sentiunt & loquūtur? cur eū imperfecti insimulant, cum iisdem ipsis authoribus solidū ex eo corpus & vere perfectum, cōponatur? Ergo singulariter quoque plenus p̄fectusque iure diceretur, propter corporeæ soliditatis effectum. Est enim ille de his, vt ipsi dicunt, quæ nec generatur, nec generant, scilicet ex monade & septē constitutus: aut ex eo quod tū generatur, tū generat, nepe quaternario duplato consistit. Quinetiā octonariū Pythagorici iustitiam vocauerunt: quia primus omnium ita soluitur in numeros pariter pares, hoc est in bis quaterna, vt nihilominus in numeros æque pariter pares diuisio quoq; ipsa soluat in bis bina. Eodem etiā modo contexitur, id est, bis bina bis, octo componunt. quare cum & contextio ipsius pari æqualitate p̄cedat, & resolutio æqualiter redeat vsque ad monadē, merito, p̄pter æqualem diuisionē iustitiæ nomen accepit. Qui ergo tā iustus est, non cōuenit, p̄fecto fœtui iniquū esse. Sed & ad ipsam etiam cœli harmoniā continendā firmandamq; hunc numerū magis aptū esse, nō dubium est, quum sphæræ ipsæ octo sint quæ in cœlo mouentur. Hæc quidē sunt à me adducta, quo docerem ex numeri paritate non recte imperfectū demonstrari & ineptū ad vitam fœtus tuendam atq; cōseruandā. Qua in re nō existimo me à Galeni sententiā discedere, q̄ paritatem atq; imparitatem à vitæ criticorū dierum similiter reiciit atque excludit. Cur vero septimo quidem nonoq; mēse vitales sint partus, octauo autē nō vitales, aliā

Pythagorici ex ipsa arithmetica magis p̄babilē adferunt demonstrationē. Est autē ea eiusmodi. Sit triagulum scalenum, hoc est trib<sup>9</sup> liēns in æqualib<sup>9</sup> constitutum, A.B.C.



cuius latus B.C. sit vnitarum 4: latus autem

A.B. sit vnitarum 5. Perspicuum est ex disciplina Pythagoricorum, 3. & 5. esse masculos, vt impares: sed 4. fœminam, vt parem. Multiplicentur itaque 4. per 5. fient 20. sed 5. per se multiplicentur, consurgent 25. simul iuncti numeri facient 45. Hæc rursum si per medium spatii trianguli, id est per 6, multiplices, fient 270: quæ nouem menses constituunt. Rursus multiplices 4. per 5. fient 20: & similiter 3. per 5. fient 15: simul iuncta erunt 35. Hæc per mediū spatii trigoni multiplices, hoc est per 6: fient 210. quæ septem menses complent. Iterum ducas 3. in 5. fient 15. Ducito in sese, emergunt 25. si simul componas, erunt 40. Hæc multiplicata per medium spatium, hoc est per 6, fiunt 240. quæ tempus octo mensium continent. Itaque quoniam in nouem & septem mensibus duntaxat per naturalem coniunctionem masculi & fœminæ, quæ 5 & 4 & 3. numeris significantur, numeri dierum proueniūt qui nouem septemque mensibus continentur: merito, qui istis mensibus eduntur partus, sunt vitales. In mense autem octauo non est vlla masculi cum fœmina coniunctio. neque enim 5 neque 3 ducūt per 4 quod fœminam repræsentat. Quamobrem cum eiusmodi copulatio præter naturam sit, merito partus isti non sunt vitales. Hæc quidem ex arithmetice attuli, non quod tā magnam vim inesse illorum numeris existimarem, sed vt potius legentes intelligant quæ fuerit illorum de hac re sententiā. Omnia enim quæ de numerorum virtute nugantur, tam facile absurda esse deprehenduntur, vt doctissimis plerisque viris & Galeno Pythagoras ille vir tam sapiens omnibus fere seculis habitus, magnam admirationem excitari quod numeris tantum tribuisse videatur. Neque enim ex illis vlla demonstratio scientifica haberi potest. Siquidem omnia illorum placita plane incerta sunt. Cur enim monadem formam, dualitatem vero materiam quandam infinitam appellent? cur parem fœminam, imparem masculum statuunt? Quin & numeris quibusdam Mineræ, Dianæ atque Apollinis nomen tribuunt, prout quemque minus magisue laudare, etiam vituperare libitum est. Quod sane volenti per facile est: atque ideo parum firma sunt, imo vero ineptorum dogmata. Quamobrem illis relictis veritatem ipsam meliori ratione modoque exploremus. Recte, vt mihi quidem videtur, philosophi omnes hunc orbē inferiorem à superioribus corporibus moueri dirigique statuerunt, & cūctas quæ hic contingunt mutationes, à cœlestibus pēdere. In quibus cum nihil sit quod non maiori quam hæc terrena, facultate polleat, præcipue tamen duorū nobiliū siderum solis atq; lunæ vim potentiamque experimur: illius quidem, per se & primario, huius vero quaten<sup>9</sup> à sole aspicitur & illucescit. Eius namq; vel accessio vel recessio vt diuerfas sustinet

mutationes, sic varia in nostro orbe operatur, suntque eius opera tanto quam reliquorum planetarum magis conspicua, quanto huic orbi vicinior est. Quamobrem quum illa singulis illustretur mensibus, & cum sole congregiatur, quæ maxima illi mutatio est, quumque plena multum à se ipsa cum sole congregiente diuersa sit, non est dubium quin & maxime hic orbes noster pro lunæ in ipsum imperio immutetur. Ac rursum cum inter extremas illas lunæ mutationes alix quædam mediæ intercedant, scilicet tū quum *dyemius*, tum quum *apiximus*: certum quoque est, mutationes his etiam duobus temporibus, quāuis minores magisque obscuras, contingere. Apparet igitur quatuor esse lunæ mutationis momenta. & ea septimo quoque die enenire. Nam & post septem à prima apparitione dies, *dyemius*, hoc est per medium secta: & septem postea diebus orbe pleno visitur, quod die contingit decimoquarto. Si vero quemadmodum aucta est, ita diminui intelligas, duas pariter habebit septimanas: quarū prior die vigesimo secundum Hippocr. & Gal. nō (ut voluit Archigenes) vigesimo & primo, posterior autē vigesimo septimo concludetur. Sed quū dixerimus vim omnem lunæ à sole proficisci, nemo certe dubitabit quin insignes etiam ab eo mutationes pendeāt, præsertim quum quatuor anni tempora ab eo fieri videamus. Ambo igitur, & sol & luna, vires magnas obtinēt, easque in corpora inferiora exerūt, nō morbos tantum. Absurdū enim esset in hos quidē aliquid posse, in cæteris autē viribus destitui. Imo vero & haberi possunt ex iis præsgia nō modo in ægrotis, sed etiam in sanis, quemadmodum scripsit Gal. ab Ægyptiis astronomis se verissime cōperisse. Itaque in ipsum etiā sortū, quem mensium quoque tertis spatiis Hippocrates scribit iudicari. Quāuis autē nulli inconueniēs videri potest, eē eandē à duobus illis sideribus affici, attamen Hippocr. & Gal. existimārūt in illis quidē mutationibus quæ breues sunt & paucis diebus definiri solēt, negotiū omne ad lunā deferri: in aliis vero quæ non nisi longo iudicari possunt tēpore & perfici, ad solis cursum maximē attendendū. Eā namque ob causam acutos morbos, qui breues esse cōsueuerūt, decē & quatuor diebus iudiciū subire statuunt: quattanas autē febres nō diebus quidē, sed mensibus sex iudicari. Rerū enim circuitus qui diebus aliquot cōcludi possunt, septimani sunt, & lunæ modo circūaguntur: sed qui mensibus, illi ad solē referūtur, eandemque quam septimanæ rationem sortiūtur. Quū enim à mensis principie vsq; ad pleniluniū, quatuordecim ppe dies sint, qui lunaris circuitus dimidiū complent, ita ab hyeme ad æstatē, quæ sunt duæ anni totius extremæ mutationes, sex mēses sunt, anni dimidiū. Quinetiam à plenilunio vsque ad occultationē, tempus sex aliis mē-sibus respondet, qui sunt ab æstatē ad hye-

mem. Quod si etiam pertrunque diuidas, lunæ quidem cursum per septimanas diuides, quibus eas quas ante recensui mutationes efficit: solis vero iter in quatuor anni tempora secabis, quorum singula singulis etiam lunæ septimanis proportionem respondebunt. Quo quidem modo sicut dies septima, quæ pars quarta est totius mensis lunaris, morbos, exempli gratia, acutos iudicat: sic anni temporis mutatio diuturnos affectus discutit, adeo ut hyeme genitum, ver dissoluatur: in vere excitatum, æstas: in æstate, autumnus: in autumnus vero ortum, hyems. His in istum modum definitis facile est videre quid de partu dici oporteat. Est enim partus crisis quædam, cuius eodem plane modo inire rationem conuenit, quo & morborum & sanitatis. Sic namque visum est Hippocrati, ad hunc modum libello *de ætiâ mulierum* scribenti: τῆς ὅλης γυναικὸς αἱ συντάξεις τῆ ἐμ-  
βρυῶνος. Οἱ περὶ αὐτῆς πέντε οἱ χρόνοι, ἐν πέντε τοῖς χρόνοις  
κεῖσθαι τὰς αἰτίας τῶν νοσήσων. Αἱ ὅλεις αἱ καὶ οἱ ἡμέτεροι  
τοῖς συντάξεσι αἰθροῦσι οὖν. ταῦτα δὲ πάντα τὰ μὲν καὶ  
ἡμέτερας, τὰ δὲ καὶ μὴ αἰθροῦσι, τὰ δὲ καὶ πάλιν  
ἐκ τῶν αἰθρῶν ἡμέτερας, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῶν αἰθρῶν. hoc est,  
Mulieribus autem & foetuum conceptus & abortiones & partus eodem tempore iudi-  
cantur, quo & morbi & sanitas & mors cū-  
ctis mortalibus. Sed omnium istorum alia  
quidem diebus, alia mensibus, alia dierum  
quadragenariis, alia vero annuo spatio eue-  
nire videntur. Hæc Hippocrates. Itaque si  
partus non tam diebus quàm certis mensibus  
geri solet, perspicuum est in tempore ipsius  
definiendo solis cursum maxime obseruan-  
dum esse, sed lunam tamen interim non ne-  
gligendam. Ergo iam de ipso partu videamus  
quo vel dierum vel mensium circuitu le-  
gitimo absolui possit. Sed melius fortasse  
fuerit de mensibus ex ipsis diebus ratiocina-  
ri, quoniam quibusdā forte magis sunt cō-  
gniti. Ex diebus primus septenarius decer-  
nendi vim habet maximam. Illo diximus an-  
tea tempus vnum anni, hoc est menses tres,  
respondere. Ex quo aliquis fortasse inferat  
tribus etiam mensibus vim & facultatem es-  
se ducendi partus legitimam atque natura-  
lem. Nec ego quidem dubito. Immutatur e-  
nim manifesto foetus eiusmodi spatio: quod-  
que post tres menses ille exciteretur mouea-  
turque, ab illa certe mutatione quam sol tri-  
mestri spatio sustinet, euenire magna ex par-  
te existimandum est. Quod si quæras, Cur er-  
go foetus in lucem non edit, perinde ac septi-  
mus dies morbum iudicat & soluit? Respon-  
debo & septimum illum plerumque diem non  
soluere morbos, etiam si magna illi sit eam  
in rem propensio. Siquidem ut ad crismis op-  
timum & perfectam præter diem decre-  
tortium accedere etiam oportet humoris iam  
cōcocti facilitatem, atque virium robur: sic  
in edendo partu præter legitimum tempus adesse  
oportet foetus ipsius dispositionem firmita-  
temque, quæ trimestri tantum intervallo  
vel omnium sententia in foetu esse non po-  
test. Rursus quemadmodum alii à septimo

ad decimū quartū dies nullā habent ad iudicādos morbos authoritatē, sic quartus quintusque mensis, qui diebus illis similes sunt ad fortū promēdum nullas vires possident. Quamobrem si qua occasione illis mēlibus prodeat, violenta proculdubio cēsenda est, non aliter q̄ diebus nō de cetero excretionibus symptomaticz, non criticz, proueniūt. Quodnam ergo est primū illud pariendi tēpus, in quo & dies legitima & fortis etiā dispositio concurrunt? Audi Hippocratē cum tibi enumerantem & designātem. Sic enim libello *de impulsu* scripsit: *οι εν μηνι των εναντιων ημερων, ης εναντιον ημερων, hoc est, Septimestres* dimidia anni parte nascuntur. Item in tituli belli *de impulsu*: *οι εν μηνι των εναντιων ημερων, ης εναντιον ημερων, hoc est, Septimestres* nascuntur centesimo octogesimo secundo die, & aliqua insuper particula. Habet enim tūc fortis pfectionē, tantumq; roboris quātū expedit ad tolerādas partionis molestias, & vitā postea salubriter degēdā, praeferim si ex valentiore semine procreatus est. Præterea & tēpus illud vehementer obtinet in decernēdo facultatē, Quippe simile est diei quarto & decimo: quorū hic vt est mēsis lunaris dimidiū, ita illud totius anni. Nāq; annus integet trecentis sexaginta quinq; dieb. & sex horis componitur: quos si in duas partes diuiseris, habebis centum octoginta duos dies & horas quindecim, quas Hippocr. per *μεσότης μηνος* manifesto videt significasse. Porro illi dies sex tātum mēses solares absoluūt. Cur ergo qui hoc diēū spatio editur in lucē, septimo mēse natus dicitur? Facilis sanē responsio est. neq; enim veteres illi medici nec astrologi mēsem aliū q̄ lunare nūcupabāt, nec ipsum annū vniuersum ex aliis mētib. q̄ lunariū cōstituebāt, qui omnes certe solaribus sunt minores. Dicitur autē mēsis solaris, spātium illud temporis quo sol in vtroquoque signo zodiaci circūfertur: quē quoniā sunt duodecim, menses quoq; totidē in anno numerātur. Menses vero lunares triplices statuūtur, omnes tēporis duratione differentes: inter quos ille maximus est qui Latinis dicitur ciuilib. Constat autem ex diebus viginti nouem & horis propemodum tredecim. Tot enim dies medii sunt inter vnum & alterum lunā cum sole congressum. Ex quibus mēlibus si annum, quemadmodum olim Palestini, cōstituas, centum illi & octoginta duo dies in septimum mensem incident. Namque centum septuaginta & septem dies, sex eiusmodi mēntes componunt: & quinque qui super sunt reliqui, cū aliquot horis, iam septimi mēntis erūt. Proinde qui septimum intra mensem natus erit, iure poterit septimestris appellari. Ac multo magis, si mēsem qui proprie Lunaris dicitur, intelligas. Is autem dēnotatur lunā à zodiaci pūcto in idem pūctum pfectione & reditur: in quā viā Luna viginti & septē dies cū horis octo infumit. Ex quibus mēlibus si annum cōficiās, cen-

tesimus ille octogesimusque secundus dies, erit septimi mēntis decimus octauus. Quod si tertiam mēntis lunaris differebiam, quā fit à primo exemptis tribus diebus coniunctionis lunā accipias, iā propemodum absolutos ex 182. diebus septem menses comperies. Continet enim ille sex & viginti dies & horas duodecim. In sex autem eiusmodi menses, dies tantum centum quinquaginta nouem absumuntur. Sic ex illo superiori diērum acervo viginti & tres dies supsunt, qui septimum fere mensem concludunt. Ex his igitur perspicuū est, quod quū septimo mēse editus in lucē fortis dicitur, de lunā mēlibus, non autem solis, intelligendum sit. Si quidem septimus atque octauus solares, ad partum sunt infelices. Quamobrem nihil hic contra Hippocratē dixisse videor, relictis septimum solis mensem extra *μεσότης μηνος* menses, quamuis ab illo scriptum sit in libro *de aëre*, vitam hominis diērum septenario constare, & legitimum partū esse septem mēsum, propterea quod ex tribus hebdomadarum decadibus consistet, quarum decadam singulā septuaginta dies continent. Est autem diērum numerus decē & ducentorum. Hoc enim de mētribus lunaribus intelligit, quos ciuiles ante diximus appellari, quorū septē ad eū numerū diērum perueniūt, exceptis tribus cum dimidio: quod parum certe refert. Neq; enim tam exacte dies mensesq; numerari præcipit Hippocrates, vt parum vltra citraque partio non possit optima contingere. Namque libello *de aëre*, posteaquam fortis cōformationis partionisque tempora distinxit, subiungit: *οι εν μηνι των εναντιων ημερων, ης εναντιον ημερων, hoc est, sunt verō hæc & diebus pluribus & paucioribus, nec multo tamen pluribus aut paucioribus. Verum opinor, libuit potius Hippocrati numerum illum trium decadam hebdomadarū adscribere, quam illum tribus fere diebus cū dimidio minorem, quod eo loco docere veller æuum hominis *εναντιον μηνος* esse. Quamquam quid opus est mutationes lunā quæ per septimanas fiunt, expectare, si illæ adfint quæ initio cuiusque mēntis eueniunt, præferim cum septimanæ ipsæ ex numeri ratione nulla polleant facultate, sed duntaxat quatenus tāto diērum intervallo mutationes magnæ excitantur. Nec vero velim inficiari præter solem à luna quoque mutationes accidere: sed si illæ quidem paucis aliquot diebus oriantur, considerandos censeo diērum circuitus septimanos. Sin autem secundum menses incidunt, frustra dico eos obseruari. Nam & secundi, tertii, quarti, quinti, sextique mēntis initio tanta fit in luna mutatio, quanta potest tum in fine septimi, tum singulis mēntium septimanis prouenire. Verum si ab eā sola mutationes illæ in fortu fiant, minus habent virtutis. Quod si simul eodemque tempore mutatio tam in luna quam in sole contigerit, hæc quidem est*

aliarum omnium efficacissima. Contin-  
git autē tum septimo tum octauo eum no-  
no mense lunari: sed *νῦν*, quidem est in  
septimo atque frugifera, quoniam ab ea nō  
longe absit solis mutatio, quæ centesimo  
octogesimo secundo die contingit. Non est  
autem octauo nonoque mense lunari tan-  
ta, vt fœtum deicere possit, & proferre in  
lucem: aut si tanta illi commotio acci-  
dat vt prodeat & nascatur, admodum  
imbecillum necessario putare oportet,  
qui tam leuem lunæ mutationem sustine-  
re non potuerit: & idcirco minime vira-  
lem esse. Est autem illa imbecillitas vel  
natura fœtui, vel ex aliquo accidente  
(quæ multorum fuit opinio) contracta.  
Aiuunt enim, & recte quidem, embri-  
on septimo mense ab vteri conceptabilis  
exitu affectare, ac in id colluctari pluri-  
mum (tunc enim, vt ostendimus, eodem fe-  
re tempore sol & luna mutationem sub-  
eunt) verum conatu aliquando excidere at-  
que interim fatigatum effici imbecillius.  
Quod si nec dū reffectis viribus octauo rur-  
sum eundē petat conatum (namque ad hoc  
mutatio quæ lunæ singulis mensibus acci-  
dit, irritare potest) oblatum frequēter inter-  
mori. Ac de octauo quidem mense genitis  
sic scripsit Hipp. libello *ἐν τῷ ὀκτώτῳ*: *ἐστὶν ἡμέραν  
ἐν ἧ ἡμέρᾳ ἐστὶν*. hoc est, ad partū ducenti qua-  
draginta dies, non est, & est. Quibus ver-  
bis tam obscuris, præcisatis atque aduersis, in-  
dicat, eum qui natus est mense octauo,  
(nam 246. dies menses octo consiciunt) a-  
liquo quidem modo esse atque natum vi-  
deri, sed reuera non esse, quoniam paulo  
post intereat. Superest iam nobis expenden-  
dus inter lunares quidem decimus, ex sola-  
ribus verò nonus mensis, quo partus emer-  
gunt frequentissimi & maxime vitales.  
In quo quidem quod pertinet ad solem,  
multum ipsa & aerem & hominum corpo-  
ra immutat dimensis iam nouem zodia-  
ci signis: quod verò ad lunam spectat,  
ipsa quidem eodem illo die quo sol, tres zo-  
diaci quarras confecit, & ad reliquā prope-  
rat, vehementer immutat, & orbem suo  
iam decies confecto, vndecimum aggredi-  
tur. Quod facile intelliges, si supputes dies  
quibus tum decimus lunaris, tum nonus so-  
laris constituuntur. Nam quum certum  
sit, dimidium anni 182. diebus, & horis  
præterea 15. constare, si numeri istius  
dimidiam partem adiungas, scilicet 91. di-  
es, consurgent 273. eum aliquot horis,  
ex quibus nouem menses solares constan-  
tur. Similiter si 27. cum tertia dici parte,  
quod spatium est vere lunaris mensis, quo  
luna zodiacum dimetitur, decies multipli-  
ces, reperies totidem dies & horas octo.  
Coeunt igitur, inque diem vnum conue-  
niunt decem lunæ menses, qui vulgo per-  
agationis dicuntur, & nouem solares: e-  
amque ob rem illo ipso die corpora hæc  
inferiora, præsertim quæ aliquo modo af-

fecta sunt, à tam insignibus maiorum isto-  
rū principumque planetarum mutationib.  
vehementer commoueri necesse est. Acce-  
dit vero vna infantis robur iam hoc tempo-  
re magnum, & naturale quoddam ex vte-  
ro prodeundi desiderium, ad hæc vteri mu-  
liebris mole & pondere iam grauati irrita-  
mētum: quibus omnibus efficitur partionē  
isto tempore facilem esse & salutarem. Que-  
cum ita se habeant, neminem latere potest  
Hippocratem in libello de natura pueri  
scribentem decimo mense fœtum affectare  
exitum, & membranas quibus concluditur,  
disrumpere: de mense illo lunari, qui cum  
nono solari incidit, intellexisse, & Virgili-  
um ad eundem modum quum dicit matri  
decem menses longa tulisse fastidia. Sic  
enim libello *ἐν τῷ δέκατῳ* scriptū est ab Hip-  
pocr. *οἱ δὲ δέκα μῆνες ἔστι τῶν καὶ ἐν δέκα μῆσι,  
ὡς ἂν ἐν τῷ ὀκτώτῳ μῆσι τὸ αὐτὸ γένηται*. hoc est, qui decimo & vndecimo mense  
edantur partus, ex septies quadragenis eo-  
dem modo constituuntur. Continēt autem  
illæ ducentos octoginta dies, qui septē mo-  
do diebus ducentos septuaginta tres exce-  
dūt. Qui quoniam non longe absunt à 10.  
mense, & iam pars sunt. Et idcirco eum ter-  
minum pariendi tam decimo quam vndeci-  
mo mense communem esse dixit. Quod si  
solarem mensem intellexisset, non est dubi-  
um quin maiorem numerū dierum, ex qui-  
bus tam decimus cōstaret, q̄ vndecimus ipse  
participaret, fuerit additurus. Essent enim  
proculdubio alii quadraginta adiungendi.  
Huic namque numero quadragenario ma-  
gnas vires in corporibus hominum assignat,  
propterea q̄ bis viginti eū cōponant, & ma-  
gnam facultatē decernendi semper vigesi-  
mo tribuerit. Quanquam sic ab eodem  
Hippocrate libello *ἐν τῷ δέκατῳ* scriptum  
animaduertimus: *ὅτι τὰ δέκα μῆνες ἔστιν ἡμερῶν  
ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, καὶ ἡμέρας ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, καὶ ὥρας  
ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, καὶ λεπτά ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, καὶ χιλιάδας  
ἑκατὸν ὀγδοήκοντα*. hoc est, nouē vero mē-  
sib. & diebus decem nascitur partus, atq; vi-  
talis est: quippe qui legitimū hebdomadarū  
numerū sit consecutus. Namq; quatuor de-  
cades hebdomadarum, dies sunt 280. (quo-  
modo obiter hoc monere possum, videri mihi  
deprauare scriptū esse *ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, p̄ ὀγδοήκοντα*)  
Ecce autē secundū hanc supputationem no-  
uimestres sunt, quantea eodem plane dierum  
numero decimestres atq; etiam vndecime-  
stres erāt. Cuius quidem diuersitatis causam  
ad diuersos lunæ menses referre oportet.  
Namque hoc loco, quem ē libello *ἐν τῷ δέκατῳ*  
postremo annotaui, menses qui proprie ci-  
uiles appellantur intellexit: qui ab vno lu-  
næ cum sole congressu ad alterum vsq; per-  
durant, constantque paulo minus q̄ tricenis  
diebus. Quod si lunares propriē dictos in-  
telligas, quod Hippocrates fecisse videtur  
eo loco quem paulo antē citavi ex libello  
*ἐν τῷ δέκατῳ*, nō est dubium quin is qui sup-  
putare voluit, reperiat ex ducētis illis & octo-

ginta diebus decem integros menses. constitui, & septem præterea alios superesse, qui vndecimi mensis partem aliquam componant. Quod si rationem quæras, & mireris mēsum lunarium numero potius quam solarium definita esse pariendi tempora, defines protinus mirari percontarique, si aduertras, antiquos, Græcos præsertim, annum totum ad rationem lunæ subduxisse, & alios menses non habuisse quam lunares, nōdum scilicet reducto in eam formam anno, quæ nunc vsui nobis est. Hæc quidem de nono decimoque mense, atque etiam vndecimo breuiter & quantum potui dilucide dicta sunt. Cæterum de aliis qui sequuntur, plerique dubitant, vtrum in eos partus differri possit. de quo sic mihi sentiendum videtur. Diximus antea, vt ad crīsim morborum præter diem decretorium concurrere oportet humoris aptitudinem, & virium robur, sic ad partum præter legitima illa pariendi tempora etiam pueri vires & matris vterique cōsentire debere. Nam si fœtus debilis est, & ne tēter quidem exitum, nec interim vlla offensione vterus irriteretur, etiā in vndecimū vel duodecimū forte differri fœcturā poterit. Verum id rarissimum profus est, vt quātam habet 273. dies, tanta laborē imbecillitate, vt egressum non affectet. Quod tamen si aliquando contigerit, non est dubium quin ille parum materni alimentī infumat (cuius tamē penuriam parturitioni præbere causam scribit Hippocr.) & illi abunde vel in duodecimū vsque mēsem sufficiat. Qua de causā nec commouebitur, nec membranas suas tentabit rumpere, quasi plus alimentī efflagitans. Sed hoc, vt dixi, rarissimum est, magisque monstrificum: ac proinde Iustiniani Imperatoris decretum de ea quæ parit in vndecimo mense, cōsultissimum mihi videtur esse & equissimum.

**Τομῆς.** incisō. & *τομῆς* ferrum instrumentū bilabrum quo fabri ferrarii & ad alia multa, & ad tollendos & commouendos clauos vtuntur. vt annotat Galenus in lexico Hippocratis.

**Τομῆς** siue *τομῆς* dicitur.

**Τομῆς.** incisores dentes. sic appellantur octo priimi dentes, in vtraque scilicet genā quatuor lati, acie prætenui in modum gladiorū, quā cibos molles mordendo abscindunt diuiduntque. Alii plures, alii pauciores habet. Omnes autem vna radice in suam genam infixi sunt. Valent non modo ad incidendos cibos, verum etiam ad pronunciationem. vide in dictione *ὀδόντος*.

**Τόνος.** apud Hippocratem significat neruum, siue is à cerebro, siue à spinali medulla oriatur, vt annotat Galenus Aretæus *ὁ τόνος*, *ἡ τόνος*, inquit *ἡ ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήθι*, quasi non neruum modo, sed etiam ipsam neruorum contentionem designet. Vsurpatur etiam ab eodem *ὁ τόνος* *αὐτῶν τῶν σπονδυλικῶν ἰσχυρῶν*, hoc est, pro vehemēti desiderio magnoque

conatu, qualis esse solet per dyspnoas & tenebrosos; vt docuit Galenus comment. *τῶν* *πρὸς* *τῶν*.

**Τόξος.** apud antiquos terra quædam species venenifuit reterrimi, nec tamē quid esset constare adhuc arbitror. Plinius lib. 16. cap. 10. scribit auctores esse qui à *ταξο* arbore, quam venenatam esse certum est, *ταξικα* appellata dicunt venena, quæ nunc toxica dicimus, quibus sagittæ tingantur. Quod tamen vtiplē non affirmat, sic ipse dubito an verum sit. Sunt enim hæc duo venenorum genera manifesto distincta apud Nicandrum & Dioscoridem, suntque tam sibi aduersa vtriusque symptomata, vt iure dubitare liceat. Taxus vniverso corpori frigus infert, cui eadem quæ cicutæ conueniunt medicamenta, videlicet calefacientia: toxicum vero inflammationes & furorem. Calidum enim & siccum fuit, vt plane præter symptomata indicat ipsa curatio quam Nicander adhibet. Dioscorides in præfatione libr. 6. toxicum recenset inter herbas & olera, quæ exitiosam vim habent, & Galen. lib. 2. Antidotum Asclepiadē sequutus, inter simplicia venena ipsum annumerat. Certum est sic dictum esse, quod barbari sagittas suas olim eo tingerent. Nam vt cecinit Nicander in Alexipharmacis:

*Ἰστο Γερραῖ Νόμαδα, populusque ferocem*

*Qui colit Euphraten, armani suatela veneno.*

*Quæ postquam haeserunt & non sanabile vulnus*

*Infixere, caro linet, virusque putrescit*

*Viperent, atque cuius se tabo facta resoluit.*

**Τόξον** etiam dicitur à quibusdam ladani species in Syria & Aphrica nascentis, quia incolæ ad detergendum ladanum foliis cisthi adhærescens, neruos in arcu lana circumdatos trahunt per sylvas. Sed hoc grauissimū odore est & durissimum tactu. plurimum enim terræ colligit.

**Τόξος.** à quibusdam dicitur *ἡ ἀπὸ τοῦ τοῦ*, vt habetur apud Dioscor.

**Τόμος.** pars corporis à veteribus medicis. vnde *ὁ τόνος* *φάρμακον* dicta sunt, quæ locis affectis adhibentur.

**Τοξόλον.** herba quæ & seseli Creticum vocatur.

**Τοξόλον.** ramenta, apud Hippocr. vt explicat Galen. in lexico suo.

**Τοξόλον.** frutex est cuius radix lata & lignosa summo cespite nititur, vnde furculos humiles, robustos latissime fundit, in quib. minuta folia multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Ab eius radice vulnerata manat lacryma pellucens, gracilis, lauis, syncera, subdulcis, quæ etiam *τοξόλον* dicitur, arteriacis medicamentis accommodatissima.

**Τοξόλον.** sunt qui *τοξόλον* hoc modo appellant, vt author



author est Dioscor. Ἀρβαρῶνα vocari à nōnullis λυγρίδα τὴν ἀρίαν, testatur idem.

**Τερίον.** frutex est in Crera insula tantum nascens, lentisco semine, folio & ramis similis, singulis tamen minoribus: succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Calfacit tertio ordine, attrahit, discutit: est enim tenui substantia. Est & alterum βάριον, quod βαρῖον aliqui vocant, cui folia scolopendrii, radix sylvestris thaphani tenuis, candida, cui vis magna est adstringendi.

**Τερίονιστος.** sic à quibusdam dicitur τὸ βάριον, ab aliis autem ἡ ἀλόν, vt habetur apud Dioscoridem, forte quod eius folia quantitate, longitudine, figuraque hircorum cornibus non inepte respondeant.

**Τερίονιστον.** vide in βάριος paulo ante.

**Τερίονιστον.** barbula hirci. herba est breui caule, foliis croci, radice longa, dulci: magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Hæc ab aliis κάμη vocatur.

**Τερίονιστον.** frutex est sylvestri serpyllo aut origano similis folio & ramulis. Quibusdam in locis lætius virentiusque inuenitur, & latioribus foliis, satis glutinosum. Alterum autem ex exilibus surculis, ac tenuibus foliis, quod aliqui παράσιον vocauerunt. Omnia excalfaciunt, vrinam cient, aluo accommodantur, decoctoque potu bilem deiciunt.

**Τερίος.** inter fruges numeratur, alicæ figura. multum autem aceris habet, ideoque parū nutrit & ægre concoquitur. dicitur σιτώδης ad differentiam plantæ quæ etiam βάρος dicitur, quæ provenit in maritimis (ob id herbarii iuncum marinum vocant) palmū alta aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine foliis, pusillis circa ramos acinis rufis, multis, gustu multum adstringente. Eam aliqui σκορπίον vocant. Quidam etiam duriores è spongiis, τερίος nominarunt, vt author est Dioscor.

**Τερίος.** dicitur à quibusdam ea linea quæ medium scrotum diuidit in duas partes.

**Τραυλός.** blæsus.

**Τραυλότης.** blæsitās. Est vitiosa literarum & rerū pronuntiatio. Symptoma est affectionis lingue aut eius musculorum, aliis quidem natura aliis vero externam aliquando ob causam comparatur. Affectio autem varia esse potest. Primum quidem breuitas lingue, quæ tamen rarissima est. Deinde eius intemperies humida & mollities. Hæ namque sunt naturalis balburiei causæ, à quibus fit vt lingua prioribus dentibus male innitatur, breuior quidem propter breuitatem, humidior vero propter imbecillitatem. Humidiores enim lingue musculi non possunt firmiter stabiliri, quod est tamē necessarium ad harū duarū literarum pronuntiationem. Itaque eas tanquam t & l pronunciant, pro τραυλός dicentes τραυλός. Plurimi quoque balbutiunt ab externa causa, vt qui plurimum dicēdo aut tibia canendo, & ex febre vehementem lingue siccitatem contraxerunt. Lingua enim

his euadit imbecilla, nec propter siccitatem dilatari potest. Balbutiunt etiam aliquando ebrii, lingua & cerebro humore nimio perfusus & prægrauatis. Itaque patet præcipuā fere balburiei causam sitam esse in superflua humiditate: propterea scripsit Hippoc. Balbos alui profluvio maxime corripit. In cuius Aphor. comm. quoniam τὸ ψαλλέειν mentionem Galen facit, hoc vnum monendum, quod illic male Latini interpretes ψαλλέειν & τραυλίζειν eiusdem significationis verba esse scripserunt. Id enim neque in Græco habetur, neque verum est. Sunt enim ambo quidem vitia pronuntiationis, non vocis: nō tamen idem in voce vitium significant. Si quidem differentiam eorum Aristot. in problematis explicat scribens τραυλότης esse, quum litera quædam certa exprimi non potest: ψαλλότης vero, cum inter pronuntiandū aut litera, aut syllaba aufertur & eliditur. Scio quidem Latinos interpretes πὶς τραυλός balbos, πὶς ψαλλός blæsos vertere. ego cōtra vertendum puto: blæsi enim proprie illi sunt qui à Gallis vulgo dicuntur habere linguam pinguem: balbi vero quos iidem appellant begues. Cæterum Gal. comment. 2. in lib. 1. τὸ ἑπιδιμαῶν annotauit ἰσχυροφώνους ab Hippocrate eo loco intelligi qui alio nomine τραυλοί appellantur, non ita tamen vt idē sint, sed vt τραυλοί inter ἰσχυροφώνους contineantur. vide ἰσχυροφώνους.

**Τραύμα.** est solutio continuitatis in carne, non ex distentione, sed ruptura proueniens. Sic definiuit Galenus libro de constit. artis medicæ.

**Τραυματικὰ φάρμακα,** dicuntur à quibusdam, inquit Galen. τὰ κολλητικὰ, hoc est glutinatoria medicamenta, quæ & ἑναιμα appellantur, de quibus vide κολλητικὰ φάρμακα.

**Τερίλος.** collum. ceruix. Idem prorsus quod ἀνχλῶ, vt annotauit Galenus. Est autem pars τῆς ῥάχης capiti proxime subdita & annexa, spondylis septem constans. Eiusdem quidem illi naturæ sunt cum spondylis dorfi & lumborum: siquidem forati sunt: spinam, quam ἀγκυρῶν vocant, omnes (excepto primo cui nulla est, sed soli anteriore parte apophysis exigua) habent: tum apophyses trasuersas, apophyses obliquas ascendentes & descendentes, vinculum membranosum intus (exceptis duobus primis spondylis) duas τῆς ῥάχης meningas ambiens, & foris alterum, spondylos vndique colligans: articulationes præterea sex, duas suo corpori, duas apophysibus descendantibus, & duas ascendentibus: habent tamen quædam sibi peculiaritatem, quibus à reliquis discernuntur. Nam omnibus colli spondylis apophyses trasuersæ in rectum perforatæ sunt. Propria quoque sex inferioribus spondylis colli spina aperte bifida. Propriæ etiam quinque inferioribus apophyses trasuersæ, leuiter velut bipartitæ, & decliniter exanatæ in modum canaliculi per quod nerui ad brachium & diaphragma descendunt. Pro-

pria vero primo spondylo est corporis latitudo & tenuitas & foraminis amplitudo, rhachitidi & dēti destinata, cavitās quoque apophyseon tam ascendentium quam descendendum, quibus cum condylis articulantur per diarthrosim, illis quidem occipitis, his vero secundi spondyli. Siquidem primus duas occipitis apophyses coronoidēs cavitatibus duabus excipit, & secundi dentem transmittit: secundus vero condylo duplici, sed minus extrante primi cavitatēs duas γλυνος δέτς excipit, & suo dente occipiti inter apophyses κορωνος δέτς anterius valido ligamento affirmatur. Proprius autem secundo spondylo dens est (à quo totum etiam ipsum secundum spondylum Hippocrates ὀδόντα appellauit) per quem cum primo spondylo & cum occipitis cavitatē inter suas coronoidēs apophyses diarthrosi iungitur. Sunt autem hi septem colli spondyli magnitudine inæquales. Primus enim & secundus longe maiores sunt tertio, quarto & quinto: sed quintus tertio & quarto maior est. Sextus non modo his tribus maior est, sed etiam septimo, qui quoniam sex alios superiores sustinet, ἄτλας καὶ ἀτλαΐπιν à Græcis vocatus est. Sunt autem numero æqualia cum ipsis spondylis neruorum paria quæ à ceruice proficiuntur. primū per foramina primo spondylo & occipiti communia egressum in huius spondyli musculos, omoplatam & musculum œsophago substratum caput & collum flectentem absumitur. Secundum in totam cutim capitis. Tertium in musculos ceruicem extendentes, genam mouentes & collum totum caputq; retro erigentes, cutim capitis vna cum secundo. Quartum in ceruicis musculos & musculum longum & in diaphragma cum portione quinti & sexti paris. Quintum in diaphragma cum aliis, & in musculos brachium tollentes & omoplatam. Sextum in diaphragma cum aliis prædictis, & in brachia cum septimo & octauo pari & ad musculos leuantes omoplatam. Septimum in musculum latum reflectitur, & in thoracem, brachiū manumque absumitur, & interdum cum prædictis in diaphragma. Sic quidem se habet nodorum seu vertebrarū colli constructio, à qua quamuis proprie collum dicatur, attamen colli nomine cōmuniter vocatur quod inter caput & humeros interiaceret, vnaq; cum ipsis nobis, tum gulæ, tum arteriæ portio cōtineretur, per quam cibus & spiritui via est. Trāsata inde τὸ βράχλου vox est etiam ad vesicam, cuius osculum ita appellatur.

**Τεχρότης.** asperitas. Est vitiosa cōformatio partī cui accidit, inæqualitatem absumpto humore inducens. Huic contraria affectio, λεύκότης, id est læuitas, dicitur, suntque primi generis morbi qui in formatione consistūt, & à causis contrariis proficiuntur. Exasperantur enim quæ prius erant læuia, & læuigantur quæ prius erant aspera. illa quidem ab humorum acrimonia, aut medicamentis

adstringentibus resiccata (sunt enim & actria & adstringentia potestate sicca) hæc vero à pingui & lento humore madentia. Præcipue vero in ossibus hoc malū apparer, cum non recte à medicis curantur, sed aliquando ex humorum natura qui in animalium corporibus inueniūtur, habet originem, sed maxime per morbum Gallicum ex Venere contractum. Oculorum autem (quod malum βράχωμα appellant) & gutturis asperitates, non ex his tantum, sed ex acris vaporibus, aut puluere, aut fumo contingunt, sicuti & stomacho & ventriculo & intestinis à materia inutili quæ in ipso corpore gignitur, atque ex eorum quæ eduntur vel bibuntur qualitate. Inter quæ etiam venena enumerātur. Perspicuum autem est quod asperitas aliquando, si eius causæ inualuerint, aut in exulcerationem, aut corrosionem in partibus carnosīs, aut in ossibus vertitur in cariē, sicut sæpe videmus accidere in morbo Gallico.

**Τράχωμα.** est asperitudo palpebræ interna parte. Prouenit sæpe ex mala curatione, affusis nimium diu collyriis. Nam sicut in vulneribus aliarum partium illira pingua carnis excrecentiam inducunt, sic etiam in palpebra. Potest etiam ob diuturnam defluxionē excitari, sed non mordacem: humor enim mordax non palpebram sed oculum potius ipsum infestat. Hoc vitium sunt qui δαύσιμμα, siue δαύσιττα appellant. Attamen ea distinguit Aetius, scribens, δαύσιττα esse inæqualitatem quandam palpebræ interioris superficialiam & cum rubore: βράχόνττα vero siue βράχωμα, esse palpebræ internæ inæqualitatem & asperitatem multo maiorem, adeo ut intra eam emineat veluti milii grana, aut erui semina cum dolore & grauitate. Malum autem vtrumque oculos habet humidiores. Idem vero si intendatur magisque promineat, σκωσις vocatur: tandem vbi ad extremum peruenit, τύλωσις.

**Τραχωματικὸν κολλύριον.** est collyriorū certa species, tollendis oculorum asperitatibus efficax. Eius plures differentię describuntur ab Acrio lib. 7. quæ & peculiaria nomina habent, vt φοινῖξ, θεοφρίλον, ξυστήρ, &c. Τραχωματικὸν autem pharmacum dicitur quod deterget ea quæ adhuc mollia sunt, nec adhuc chirurgiam videntur postulare.

**Τειβόλιον ἢ πεπόδιον.** dicitur à quibusdam λωπὸς ἡμερος, vt habetur apud Diosc.

**Τρίβολος.** genus vnum terrestre, foliis ad effigiem portulacæ tenuioribus: viticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis præduris. iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum genus aquis familiare, quod in fluminibus natum comā exerit, aculeos condens: foliis latis & pediculo longo: caule parte summa quam ima crassiori. adsunt ei & capillamenta quædam spinacea, semē durum. Vterque refrigerantis & inspissantis est naturæ.

**Τελός.** significat apud Hippocr. partem eam cōr

corporis cui infistimus siue stantes siue ambulantes, siue sedentes, siue alio quouis modo iacentes: vt plantæ pedum stantibus atque ambulantes, nates sedentibus, spina tota supinis, cubito innitentibus ipse cubitus *τεῖχος* appellatur, sicut Galenus annotauit comment. 2. *εἰς τὸ κατ' ἰσθμῖον*. Sic etiam, vt idem author est, dicitur apud Hippocr. locus tritus & callosus.

*Τεῖχος*. Dioscor. scribit sic vocatum à quibusdam fuisse τὸν ἀστερεῶνα.

*Τεῖχος*. pastillus. in medicina olim celebris ad sistendos dolores. Est enim stupefactorius, Sic dictus fuit à figura qua fingebatur, non à numero medicamentorum. Constat enim quatuor medicamentis, semine apij, semine hyoscyami, aniso & opio, sed quorum pondera non sint eadem Galeno, Paulo & Actio.

*Τεῖχος*. sic à quibusdam dicitur ὁ ἄγρος, id est vitex, auctore Diosc.

*Τεῖχος*. sic dictum est à quibusdam primum mespili genus, quod ἀρώνια Dioscorides vocat, quoniam tria intrus grana siue ligna seminis loco fructus eius contineat. Galenus vero lib. 7. simpl. medic. non ipsam arborem, sed eius modo fructum ita appellat. Est & tricoccon Plinio genus heliotropij, vbique nascens.

*Τεῖχος*. sunt qui περὶ στέρνα, hoc est cristam gallinaceam, sic vocent.

*Τεῖχος*. sic quidam τὴν μέλιαν, hoc fraxinum dixerunt, quasi trinodem, quod ramos habeat prægrandes, ordinatos, paresque numero.

*Τεῖχος*. sic dicitur à Plinio tertia species Centaurii: quoniam qui ipsum erunt, iubentur buteonem, quem τεῖχος appellant, accipitrum generis auem, cauere, quando non raro vulnerantur ab alite qui legunt: ea enim defendit & impugnat legentes. Verum nō fuit propterea necesse Plinio constituere tertiam Centaurii speciem, quoniam id Theophrastus de Centaurio maiore recenset, quod propterea τεῖχος posse dici perspicuum est.

*Τεπιδιον* vide in βιβάλιον.

*Τεπιδιον*. herba est in marinis nascens locis quæ allidit vnda & recedens dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti crassiore, palmeo caule in mucrone diuiso. Eius, vt tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero puniceo conspiciuntur. Eius radix alba est odorata, gustanti acris, & calida tertio gradu.

*Τεπιδιον*. cataplasmatum nomen est, sic dictum à tribus feminibus quibus componitur, cumino, baccis lauri, apij semine. Valet contra colicium dolorem.

*Τεπιδιον*. est dentium inuita concussio. Vel est musculorum mandibularium conuulsio. Morbus hic sonitum edit, sed remuem ex instrumetorum angustia. Ex flatuoso autem spiritu cum exiguo humore efficitur. Tradit

autem Galenus & per, & per v scribi.

*Τεπιδιον*. est frutex qui supra cubici altitudinem attollitur, virgas habens tennes, iuncas & nigras, vnde ramulares nascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loro herbe similia. quibus receter enaris rutæ odor inest, vbi autem adoleuerunt, bitumen olent. florem edit purpureum, semen quadantenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculam gerens, radix tenuis, longa, valida. Vis plantæ calida est & sicca, vt bitumen. cui odore est similis vtrinque tertio ordine. Sic etiam à quibusdam dicitur λωπὸς ἄγρος, atque etiam ὁ κύπρος, vt habetur apud Diosc.

*Τεῖχος*. pili, capilli. omne quidem pilorum genus ὅτι τεῖχος nomine designatur, sed κατ' ἐξῆς qui in capite oriuntur, quos peculiari vocabulo Latini capillos vocant. Sunt autem τεῖχος partes corporis terreæ, sicca, longæ, exiles è summa cute prodeuntes. Hæ, inquit Galenus, in eo partium genere sunt quæ, quemadmodum & vngues, nullam gubernationem habent, sed ortum tantummodo. Neque enim corporis substantiam constituunt, neque principia sunt virtutum, neque principiis subserviunt, neque ex se ingenas vires possident, neque ab aliis vires accipiunt. Siquidem motum & sensum non habent, non vitam, non naturales facultates attrahendi, continendi, concoquendi & expellendi: quare neque hæc aliis possunt suggerere. Generantur autem duntaxat, hoc est coagmentantur & crescunt, non in omnem dimensionem, quemadmodum reliquæ corporis partes, sed in longitudinem solum. Neque enim nutriuntur, sed noua fuligine subinde ad cutem expulsa, & priori adhærente, eamque, vt clauus clauum, trudere producantur. Ortum namque habet ex fuliginosis, crassis & terrenis vaporibus qui in corpore à calore suscitantur, qui dum exitum moliantur, totam cutim perforant. Verum foramina hæc in humidioribus & mollioribus non persequuntur, & partes quæ prius abscesserant, rursus facile coalescant. Sicciscentem vero corpore & duriore effecta cute manent aperta, non ita ramen vt fuliginosus ille vapor totus per ea abeat, sed prodeat tantum & exeratur: hæret enim & stipatur in illis meatibus, & subinde alio atque alio vapore accedente eique per humorem quem secum ducit agglutinato, traditur, atque sic prodit pilus crassus aut exilis pro materiæ quantitate & viarum amplitudine, passus aut crispus, prout viæ sicca aut humidæ, rectæ aut obliquæ sunt, niger, ruber, flauus aut albus pro fuliginis adustione & humoris quem secum è profundo adfert colore, vide scholium 34. quod nos in lib. Hippoc. de natura veri scripsimus.

*Τεπιδιον*. est oculorum à pilis offensio. Ea autem dupliciter contingit. Siquidem sæpe in palpebris sub pilis naturalibus alij exoriuntur,

qui intro spectantes tunicas pungunt, & oculorum fluxiones concitant: qui affectus *διὰ τῆς πίστεως* nominatur. Aliquando vero ipsæ palpebræ relaxantur, eæque laxatæ antipsum extremis intro vergit, nec pili facile apparent, nisi quis distendat ac disparer palpebras: idque mali genus *παλάρωσις* vocat. Introductorii seu Medici author tres differentias *τῆς τετρακτίας* constituit, quemadmodum & Aetius. Prouenit malum hoc ex superflua humiditate, ex qua pili, tanquam herba in humida terra, luxuriant, vel palpebræ ipsæ resolvuntur, nimio humore redundantantes.

*Τετρακτία* etiam dicitur authore Galieno symptoma renum, ex quo per urinam produnt veluti capilli albi. Siquidem talia quædam corpora in renibus possunt concrescere ab humore crasso & viscoso, vsto à calore, vt docet Galen. comment. in aphor. 76. lib. 4.

*Τετρακτία* etiam, hoc est pilare malum, vocatur mammarum dolor, quem pilus aliquando mouet in pogulo forte haustus. is autem non sedatur donec pilus vel pressus sponte exeat, vel cum lacte exugatur. Id mali genus etiam *τετρακτία* vocant.

*Τετρακτία* est species fracturæ tenuissima & sensum latens. quæ quia non facile se prodit, mortis sæpe causa est, vt ait Paulus libri 6. cap. 90.

*Τετρακτία* vocatur pars ea capitis authore Arist. quæ capillis regitur.

*Τετρακτία* frictio. Motus est extrinsecus, qui à Galieno in faciendorum genere comprehenditur lib. 1. sanit. tuen. Duobus modis vsurpatur: vno quidem pro omni motu qui extrinsecus tam sanis quam ægris corporibus adhibetur ad cutem; quouis tempore: altero vero vel pars est exercitationis, vel potius, vt ait Galenus, exercitationi subseruit. hanc gymnastæ, vt refert Galenus, duplicem fecerunt, *παρασκευαστική* & *ἀποδραστηριαν*, hoc est præparatoriam & recuratoriam. Præparatoria dicitur quæ corpus ad exercitationem præparat, ne quid in ipsa exercitatione vel rumpatur vel obstruatur: id quod præcaueretur corpus sensim prius calefaciendo; & solidas partes præmolliendo; & humores tenuando; & exiguos meatus laxando: hoc autem præstat primum frictio per lintecolum, mox per oleum: sunt enim hæ duæ partes præparatoriæ frictionis. præcedit autem per lintecolum frictio. paucis omnino per manum circumactibus, qui nullo compressu sint graues & modice celeres; quibus citra compressionem corpus cutisque calefiant, meatus laxentur & præparentur aptumque corpus sit ad oleum capiendum. tunc enim oleum inducendum, & nudis manibus, quæ medium inter molle durumque modum ferunt in fricandum, quatenus neque coactum constrictumque corpus sit, neque ultra quam par est laxum resolutumque fiat, sed legitimum naturæ mo-

dum seruet. Tota ipsa frictio præparatoria huc spectat, vt corpus molliat: quod tamen non omnes præstant frictiones. Nam cum sex omnino sint frictionum differentiarum, molli, dura, & inter eas media, multa, paucæ & in eo genere mediocris, dura ligandi, mollis soluendi, multa minuendi, mediocris carnem augendi vim habet, vt scripsit Hippocr. *ἐν τῇ κατ' ἰσχύειν*. Sunt autem hæ propriæ frictionum differentiarum, non item aliæ quæ ab externis rerum circumstantiis sumuntur, vt à loco vel anni tempore in quo quis fricatur, quodque aliæ cum oleo vel sine oleo fiant, idque vel manibus tantum, vel etiam cum puluere, vel per lintecum. Harum tamen ratio etiam habenda est. Siquidem ab his varie corpus afficitur. Altera frictionis species, quæ & ipsa exercitationibus subseruit, *ἀποδραστηριαν* dicitur: Latine recuratoriam ad verbum appelles. Recentiores gymnastæ, vt ait Galenus, eam etiā *ἀποδραστηριαν* vocauerunt, quod totius apothepiæ præcipua portio sint frictiones quæ post exercitationem adhibentur. Earum vsus est vt quæcunque excrementa per exercitationem calefacta extenuataque in corpore adhuc manent, foras euocentur, ipsæque partes solide per exercitationem tensæ & induratae emolliantur, & lassitudo præterea tollatur. Id quod fit tum frictionibus cuique corpori conuenientibus, vna cum partium ipsarum quæ fricantur tensione, & spiritus cohibitione, tum plussculo etiam oleo, sicut à nobis suo loco dictum est cum de *ἀποδραστηρία* egimus.

*Τετρακτία ὀργάνων*. attritio instrumentorum. dicitur ab Hippocrate lib. 6. *ἡ ἐν τῇ δυνάμει* exolutio, infirmitas & imbecillitas instrumentorum, per translationem à vestibus & vasis attritis. Nam & hæc post diuturnos vsus seipsis aridiora euasisse cernuntur, vt annotat Galenus comment. 3. in eum librum.

*Τετρακτία*. pondus trium obolorum. *ἡ μὲν δραχμή* hoc est dimidia drachma: drachma enim in sex obolos diuiditur.

*Τρέμος*. tremor. est motus deprauatus facultatis animalis partim à voluntate partim ab onere partus editus. Neque enim motus simplex est, sed geminus, vnus qui deorsum, alter qui sursum tendit. Hic secundum naturam est & à voluntate perficitur, ille vero præter naturam, & à partis quæ tremore agitur, onere atque grauitate. Facultas enim animalis cui mouendi munus natura demandauit, membrum ita tremulum sursum attollere nititur, quod tamen ea inuita inferne labitur & concidit propter grauitatem: fitque concertatio quædam naturæ atque morbi, quando non permittit facultas membrum laborans deorsum ferri, nec tamen patitur eius grauitas vt natura ipsum sublime diutius teneat, sicuti per sanitatem consueuerat. Itaque vicissim facultas nunc vincit, nunc vincitur, fitque contrariorum

motuum perpetua quædam successio. Huius symptomatis causa duplex est: una obstructio nervorum à succis multis, crassis, lētis, ita ut exigua facultas motrix in partē affluat, nisi confertim irruens illos excusserit: altera vero facultatis motricis imbecillitas contracta ex frigida intemperie, vel corporis uniuersi, vel principii nervorum, vel aliarum partium natura imbecilliorum & ad morbum propensarum, quam vel senectus frigida & sicca, vel Venus immodica & interpestiua, vel timor, vel dolor, uterque magnus longusque, vel frigidus aer, vel balnea vel potus largior vini meracioris aut aquæ frigidæ, vel ignauia, diuq; omīssa post multos cibos exercitatio inuexerit.

**Τρόπος.** modus. Duobus modis, inquit Galen. eo verbo veteres utuntur. uno pro animi moribus, altero pro differentiis aut formis eius de quo sermo habetur. Exempli causa, si sermo fiat de victus ratione, & τῆς διαίτης πρὸς τὸν τροπὴν dici audias, tunc differentia aut species intellige. τροπὴν enim significare εἶδος, διαφοράς, οὐσίας ἢ ἡγή, Galen. annotauit comment. 3. in lib. 1. τῶν ὁπιδιμῶν.

**Τροφή.** alimentum. nutrimentum. Est quicquid substantiam corporis augere potest. Nam cum plurima quotidie è corporibus diffulant, nisi in eorum quæ effluxere locum alia subinde restituantur, breuī corpus concidat necesse est. Itaq; tale tantumque reponi oportet quale & quantum deperit, si eodem in statu corpus seruare volumus. Ergo substantiæ nostræ, quia illa est quæ contabescit, prorsus simile esse nutrimentum debet, & in eius quæ perit locum succedere. Quare si triplex in nobis substantia quotidie dissipatur, solida, spiritalis & carnosa, conuenit etiam alimenti triplicem esse differentiam, quod non nisi similitudine totius substantiæ nutriet. Itaque ut caro carnis nutrimentum est, sic spiritus spiritum alit, eiusque τροφή dici debet. Est autem nomen alimenti ὁμῶνυμον, quod Hippocrates in opusculo de alimento distinxit his verbis: Alimentum aliud est quod nutrit, aliud quod quasi est nutriendum, aliud quod nutriturū est. In prima quidem significatione, iam substantia corporis nostri factum est: in secūda vero, sanguinem sub se comprehendit, & qui propius ad substantiam nostram accedit, rorem per carnem dispersum: in tertia vero cibis intelligitur recēter deuoratus, vel integer etiam, & chylus ex eo genitus in ventriculo. Cæterum cum multæ sint & differentes alimentorum facultates, illæ quidem in tertia significatione evidentes & infractæ manent, calefaciendi, refrigerandi, humectandi & siccandi: in media paulo obfusiores sunt: in prima vero, præter caliditatem & humiditatem, vix sunt superfluitates. Si quidem quod proxime alimentum est, quatenus tale est, omne calidum humidumque est, ut quod caloris nostri substantiam augeat, & corpora fictari veter.

**Τρόφης.** bene nutritus, pinguis. ut annotat Galen in lexico Hippocr.

**Τροφιδόνης.** apud Hippocr. significat eum qui illata quædam habet infixæ. Dicitur παρὰ τὸ βρέφειναι, quod significat πῆγνυθαι, hoc est infigi & hære. ut annotat Galenus in lexico Hippocr.

**Τροφός.** nomen est ἐμὲν τοῦ φαρμάκου, quo Paulus lib. 4. cap. 40. implet caua vlcera quæ pura sunt.

**Τροχάρτηρες.** sunt apophyses duæ in ceruice superiori femoris, una externa, & omnium corporis processuum, nulli alteri ossi commissorum facile maxima, altera interna, multoque inferior, sed magnitudine nequaquam externæ comparanda. Sic dictæ sunt ἀπὸ τοῦ τροχάειν, quod significat δίστρεχειν, propterea quod cruris motus cursusque per musculos his apophysibus insertos perficiatur. In hoc enim à natura comparatæ sunt, ut collis ritu musculorum insertionem probe admittat. Anatomici vulgo rotatores appellant: ego potius cursorias apophyses nuncuparem. verum externam, quod ampla sit multumque gibbosa, quidam peculiari vocabulo γλουπὸν, id est natem, vocarunt, siue à similitudine, siue quod muscoli nates ipsas constituentes inde maxime prodeant.

**Τροχίσκος.** pastillus. medicamenti nomen ab formationis figura: fingitur enim in orbiculos, ex quibus etiam κυκλίσκος à quibusdam vocatur. Est autem triplex eorum genus, sicut ex Anryllo Oribasius & Paulus tradiderunt. Alii sunt potabiles, alii in aluum iniiciuntur, alii illinuntur. Eorum qui bibuntur, alii comprimunt aluum, aut sanguinem, aut aliam fluxionem refrigerando, adstringendo, opplendo vel deficcando: alii dolorem sopiunt obstupesciendo, vel humores diffundendo: alii renes, lienē aut iecur obstructione liberant. Eorum autem qui in aluum immittuntur, alii acrimoniam obtundunt, alii adstringunt, alii sistunt sanguinis profluvium, alii adurunt. Similiter vero & qui oblinuntur, ad vsum ex iis aliquem adhibetur. Compositionis eorum ratio nota esse potest ex Gal. lib. 5. τῶν κατὰ τὴν φύσιν. ex omni genere medicamentorum quæ tria humore aliquo excipi possunt & in umbra deficcari. Sic autem facile asseruantur, cumque iis vtendum est, humore aliquo conuenienti diluuntur ad vsum prædictos.

**Τρόχοι.** cursus, apud Hippocratem, ut annotat Galenus in lexico suo. At τροχός, Rota est, item Turbo, & Orbis.

**Τρυβλίον.** idem quod κατύλη in medicis auctore Cleopatra his verbis: τὸ τρυβλίον τὸ αὐτὸ μέτρον χωρὶς τῆς κατύλης. ἔχει γὰρ μέτρον κνάρους ε'. hoc est, tryblion eandem mēsuram habet quam & cotyle. continet enim eius mensura cyathos sex. vide in dictione κατύλη. In georgicis vero eiusdē capacitatis est cuius ὀξύβακρον, sesquicyathum cōtinens, siue κατύλης partem quartā. Eius nota fuit τρ, superimpositio desuper u. **Τρίχνη.** nunc triticum significat nunc hordeum,



nunc fructum quemlibet tam est incertæ & ambigua significationis.

*Τρυφιδες*. est species collyriorum ἧς μνημέραν magna ex parte acacia constar, vt author est Galenus lib. 4. ἧς καὶ τόπος, agens de ophthalmia. mista namque plurima acacia cum reliquis quæ τὴ μνημέραν collyria constituunt, efficit totum collyrium quodammodo feculentum. Idem alio nomine πηλέιον appellatur, quasi cœnolum siue lutosum, ἀπὸ τοῦ πηλοῦ. Cuius aliquot differentias exponit Aetius: vnum describit Celsus lib. 6. quod ad Euelpidem medicum authorem refert. In quibus omnibus plurimum succi acaciæ inest.

*Τρυφία* tria significat apud Græcos. primum quod crassum in visis subidet fecem nominant. deinde *τρύπα*: quæ sunt vuarum partes solidæ, quæ multo expresso superflunt. tertio vinaceorum dilurum, quod ab Articis *δευτερία*, ab Asiaticis *σεμφυλίτης*, id est lora, appellatur. Coniectis namque in parua dolia vinaceis, tantum aquæ super affundit, quoad omnia permadeant. Quod vbi satisfactum videtur, in dolii fundo foramen aperiunt, vt dilurum effluat, idque pro vino bibunt.

*Τρυφερά*. est genus medicamenti caustici cuius formulæ duæ habentur apud Scribonium Largum, vbi docet curare hæmorrhoidas. Si quando (inquit) exulceratas eminentias tollere sine ferro voluerimus, vt verrucas, næuos, aliaue eiusdem generis, hoc medicamento, quod *τρυφερά* dicitur, vtimur: facit enim ad omnia quæ ferro debent tolli, sine magno dolore. Ex quo apparet *τρυφεράν* esse medicamentum causticum & acre, & sic appellari quod non nisi delicatis hominibus cōueniat, quodque molliter & sine dolore vratur & exedat.

*Τρυφερόν*. est collyrium αἰπλόν καὶ ἀδύκνον, ad multa utile, maxime in delicatis qui nullam mordacitatem ferre possunt. describitur à Galeno lib. 4. ἧς καὶ τόπος, & ab Aetio lib. 7. eodem prorsus modo.

*Τρυφερόν*. est pastillus ad hæmoptoicos utilis, descriptus ab Asclepiade, & à Galeno expositus lib. 7. ἧς καὶ τόπος.

*Τρύφωνος ἐμπλαστῆρος*. Tryphonis emplastrum. Tria huius authoris describuntur à Scribonio Largo, subuiride, nigrum, quod βασιλικόν dicitur & viride, quod aliter *εὐχρόον* dicit nuncupari.

*Τρύχον*. neutro genere à Galeno & Aetio dicitur qui masculino *τρύχυνος* est Dioscoridi: hoc est folanum.

*Τρύχονον*. domare, attenuare. vt annotat Galen. in lexico Hippocr.

*Τρωγλοδυτική*. species est myrrhæ omnium primæ, à loco in quo puenit, accepto cognomine, splendens, subuiridis & mordens. Sed & legitur tenuis quædam quæ à troglodytica secunda est, bdellii modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens.

*Τρύειον*. vulnerare, secare venam: vt in 2. de morbis mulierum Gal. annotat in lexico Hipp.

*Τρώμα*. nomen est Ionicum, inquit Galenus, significans quamlibet corporis offensam à causa externa inductam, vt habetur apud eum côm. 3. in prorrheth. Idem vero scribit côm. 5. εἰς τὸ ἐπὶ ὀφθαλμοῖς, Hippoc. nominare magnas noxas ab aliquo extrinseco, etiam citra vulnus illatas. vnde Hippocr. *τρώμενον* vocat eum qui quouis modo offensus sit.

*Τρώξιμος*. seris & intubus sic dicta sunt Didymo Constantino Cæsari & Aetio. Cruda enim ex aceto & oleo eduntur. Sunt vero qui existiment sic appellari omnem fructum quicumque crudus editur, velut est vna, ficus, vna passa, & quicquid eius generis secunda mensa absuntur. Eadem *τρώξιμα* dicuntur: quæ Galenus in glossis Hippocrat. exponit ὡς ἐσθιόμενα, quæ cruda vel immatura eduntur.

*Τρώσκεσαι*. ἐκ τρώσκειν. parere abortum. vt explicat Gal. in lexico Hippocr.

*Τυλοῖδες*. callosum. Est corpus durum ex cerebri anterioris substantia durata coactum, cerebrique ventres duos anteriores separans. Longum est, sed arctum: extremis partibus crassum est, in medio tam tenue vt pelluceat. Ex eo anteriorum cerebri ventriculorum sextum producit. quod calli instar durum sit, ita vocatum est.

*Τύλοι*. dicuntur à quibusdam pili ipsi superciliorum.

*Τύλωμα*.

*Τύλωσις*. est magna & inueterata internæ palpebrarum faciei asperitas, quæ callum iam contraxit. Species est τὸ τραχώματι, vt habetur apud Paulum lib. 3. capite 22. Aetius lib. 7. ex Seuero scribit esse asperitatem quæ inæquale quid habeat, durum & callosum.

*τύλωμα* etiam dicitur à quibusdam pars pedis inferior & carnosa quæ solum attingit, quam alii *πύλωμα* vocant.

*Τυμπανίας*.

*Τυμπανίτης*. species hydropis, de quo vide ὕδρωψ.

*Τύειον*. emplastrum sic dictum à colore purpure Tyria quem post cocturam adipiscitur. Descriptionem eius habet Aetius lib. 15. cap. 12.

*Τυρός*. caseus. non aliud est quam lac coagulatum, à quo serum omne expressum est. Non est autem omnis casei eadem natura, quod non paruum discrimen sit tum ex lacte ex quo fit, tum ab animalium ex quibus colligitur natura, tum vero à pabuli varietate, non nihil ite à præparationis modo: præterea quod alius mollior, alius durior, aut densior, laxiorue, glutinosior aut friabilior sentitur. Sapor deinde alius salis, alius acidus, alius acrior, alius dulcis. Inter hos qui in omnibus differentiis mediocritatem seruat, præferendus est. Numerantur à Plinio varia caseorum genera, sed præstantissimus habitus fuit *ἔτυλα κτύπος*. qui etiam *ἔτυλα* dicebatur.

*Τυρίλων*. nomen emplastrum cuius sunt immensa apud Aetium laudes. 15. c. 14. Dicitur alio nomine *παμπανίας*.

*Τύφη*. perperam sæpe scriptum occurrere pro *τύφη*.

*Τυφλόν*

*Τυφλόν έντερον.* cœcum intestinū. Est intestinū à ventriculo ordine quartum, primum autem crassorum, desinēs qua τὸ κώλον incipit. Principium est crassi intestini. Vbi enim reneue intestinum desinit, illinc ad dextrā quidem cœcum, ad sinistram autem colon emergit dextra prius ilia præteruectum. Est autem cœcum prorsus velut venter quidam crassus excrementis recipiendis appositus, cui ad portionem colon respōdet. Accum auibus fere omnibus cœcum intestinū duplex sit, homini tamen vnicum est. Situm autem est in dextris ilibus, quod locum ibi idoneū haberet vacuum, rene scilicet dextro altius appenso. Hæc quidem de cœco Galen. lib. 4. vsus part. Itaque si cœcum velut venter quidā est, patet ipsum figura à reliquis differre, nec vt reliqua oblongum esse, sed plane, in modum ventriculi, rotūdius. Ex qua figura efficitur, vt vna tantum parte pertusum videatur, & vno foramine tanquā oculo præditū esse, vt inde veteres τυφλόν appellarint. Peruium tamē est, quodque ad ipsum extenui intestino descendit, facile in colon delabitur. Gibbosum enim cum sit, vnum foramen habet à latere, cui iunguntur duo foramina duorum proximorū intestinorum, quorum vni infra, alteri supra, continuū est. Id propter magnitudinem aliquando absolute έντερον appellatur, vt scribit Galen. comment. 4. in l. 6. ἡ δὲ ἐπίδημιον. quamuis alii eò nomine absolute posito τὸ κώλον intelligi velint. Cum autem reliqua omnia intestina lactibus alligētur, solum cœcum omni vinculo solutum est, ideoque descendit in scrotum per enterocelen.

*Τυφλόν ὄμμα.* cœcum foramen. Est in osse lapidoso foramen, per quod neruus à quinta cōiugatione foras post aures excidit in musculum latum præcipue, tum in crotaphitas masseterasque omnes. Non tamen reuera cœcum est, vt dicitur, sed veteres anatomici sic videntur appellasse, quod injecto funiculo aut seta porcina exitum non reperirēt. Anfractuosum enim est, nec recta perforatum. Meatus autem eos & flexus natura eò in foramine molita est, quo neruus ipse, qui per illud foramen excidit, longiore via excicaretur atque obduresceret.

*Τυφομανία.* morbus est ex phrenitide & lethargo mistus, sicut explicat Galenus in lexico Hippocratico. Vel à quibusdam medicis sic vocata est phreniticorum affectio quum in somniculosum coma inciderunt, ita vt oculos tollere nō possint, sed lethargicorum more semper eodem in loco permaneant: vt scribit Galen. lib. de comate, & commēt. 1. in prorrhē.


*Τυφώδης πυρετός.* nomen est febris continuæ & ardentis, non per se quidem natæ & essentialis, vt vocant. sed symptomaticæ & à iccineris erysipelate excitatæ. Vbi enim viscus id erysipelate afficitur, febrem inde ortam τυφώδη veteres appellarunt, sicut à ventriculi erysipelate λεπτέραι, & ab eo qui pulmōnē infestat πυριώδη. Sic quidem Gal. comment. in aphor. 42. libr. 7. & Aetius lib. 5. cap. 89. Eam præterea Galen. lib. aduersus Lycum dicit esse de genere humidarum febrium, quod à primo statim die ægroti sudent, sudoreque ipso aut parum aut nullo modo leuentur.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

T O

r.



*Ἑλκυστός.* hyacinthus folia habet bulbi, caulē dodrantalem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris, comam procumbentem, florum purpureorū plenam

incuruam, radicē bulbaceam. Radix siccat primo ordine, refrigerat secundo.

*Ὀνυχίτις.* dictum est à quibusdam τὸ δακτύλιον, vt Dioscor. author est.

*Ἰάκυνθος.* gemma purpurea, nitore diluto, qui primo quoque aspectu gratus euāescit, vt scribit Plinius, antequā satiet, adeoq; non implet oculos, vt penē non attingat, marcescens celerius nominis sui flore. Est autem duplex, nigrior qui mas est, candidior qui femina.

*Ἰαλός.* vitreus humor. Est humor oculi à tergo crystallini humoris situs, vitro fuso similis. Hic nō ambit vniuersum crystallinū

sed dimidium tantum posteriore parte, vt qui eius diametrum nō excedat, qui à dextra eius parte in sinistram ducitur. In eum vsū à natura comparatus est, vt crystallino humori alimento esset, eamque ob causam inter eum & sanguinem prope medius factus, vt qui quanto crassior & candidior sanguine est, tanto à crystallino humore humiditate & candore relinquatur. Hic enim perfectē albus est & mediocriter durus. Vitreus verò humidus quidem est, instar vitri cuiusdam, à quo nomen habet, igne liquefacti, & tam albus quam cum minimum nigri multo albo permixtum est. Sed cum neutri horum humorum vena insit, per diadēsim crystallinus à vitreo, & vitreus à tunica ipsum ambiente quam ἀμφιβλεστροειδῆ vocant, nutritur, quæ non est aliud quam nerui optici substantia in mucum cerebro similem soluta.

*Ἰάλος.* dicitur à quibusdam succini species fului & vitri instar pellucidi. vide ἡλεκτρον.

ἡ βοῦα. curuamen. gibbositas. hoc est κούρτια.  
Vox generalis est apud Hippocr. significans  
omnem vertebrarū euerſionem præter na-  
turam, vt annotat Galen. comment. 3. ἐς τὸ  
κατὰ ἀρθρῶν.

ῥυθμῶν. nomen est collyrii quod ad Ammonium auctorem quidam referunt. Eius descriptio habetur & apud Paulum lib. 6. & apud Aetium lib. 7. Paulus lib. 3. cap. 22. eo utitur ῥυθμῶν ἰσχυρῶν vimque illi tribuit rumpendi vomicam & vehementius expurgandi.

**T**riax emplastrum cephalicū est: quod & Pan-  
aceum, & Triumfratrum vocant: Heras i-  
mper. facit ad nomas & omnia vlcera mali-  
gna. valet ad plurima ad quæ commendat  
ipsum Aetius. lib. 13. cap. de emplastris ce-  
phalicis.

2<sup>a</sup> pars est medicina, cui tuenda sanitas  
cura incumbit. Ea ceteras dignitate ante-  
cellit, duobusque summis præceptis conti-  
netur. Optime valentia corpora similibus  
conseruanda esse: quæ parum ab optima cõ-  
stitutione desciscunt, aut quodammodo ad  
neutrum statum accedunt, modico contra-  
riorum vsu esse reuocanda ad mediocrita-  
tem. Itaque ad eam pertinent aeris, cibi, po-  
tus, exercitationum, somni, vigiliarum, ex-  
cretionum atq; affectuum animi discrimi-  
na: de quibus Galenus cum in libris de sani-  
tate tuenda, tum in libris de alimentorum  
facultatibus, & boni malique succi cibus co-  
piosissime disseruit.

**T**erminus salubre. Tripliciter dicitur apud medicos. vt corpus, vt causa, vt signum. Salubre autem corpus tripliciter dicitur : aut simpliciter, quod ab ipso natura ortu bonâ habet temperaturam in simplicibus & primis particulis; atq; in his quæ ex ipsis componuntur, est commensurarum aut, vt nunc, quod in presenti est sanum. Est vero & hoc ipso tempore quo sanum existit, si nō optimam, ac sibi propriam habens temperaturam. Vt multum autem, quod à constitutione optima non admodum deficit: sicut explicat Galen. in Arte medicinali.

τ'χα.liquida,fiuè

Ἰχθὰρ ἐκ τοῦ κεραμίον. dicta est veteribus resina  
 pinea quæ liquida esset. Eius enim duas dif-  
 ferentias, vnam frixæ tostæque, alteram li-  
 quidæ siue humidæ; φρυκτῆς & ὑγρᾶς nomini-  
 bus, citra resinæ adiectionem designabant  
 κατ' ἔχον, quod pinea resina, vt ait Dioscori-  
 des, omnium præstantissima haberetur, vel  
 quod esset omnium maxime parabilis, vt a-  
 it Galenus. Cæterum humida in Græciam  
 apportabatur fictilibus & doliis ( vnde ἡ ἐκ  
 τοῦ κεραμίον ὑγρὰ dicta est ) ex Colophone, &  
 Gallia, & Tyrrenia, viresque habuit non  
 valde à terebinthina differentes, Galeno il-  
 lam pro hac substituente lib. methodi med.  
 sexto his verbis : καὶ μὲν τοὶ καὶ μὴ παρόντες περ-  
 μωδῶς ἢ τ' ἐκ τοῦ κεραμίον ὑγρὰ καὶ ἡ φρυκτὴ χειλὺς  
 αὐτοῦ μὲν, id est, quod si nō adsit terebinthi-  
 na, cōmode miscbitur resina pinea ἑ fictili-

bus detracta, tum quæ liquida est, tum quæ  
vsta. Item lib. 4. sanis. tuende. *ἡμεῖς δὲ μὴ  
ἴμεν τὸν ἐκ τοῦ ἀρκυμίου πυρρῶναι πρὸς τὸν ἡμεῖς τὸν  
φρὸν τὸν ὀνομαζόμενον.* hoc est, in eorum autem  
penuria, miscere oportebit resinam pineam  
ē siccilibus sumptam, vel eam quæ vsta di-  
citur.

ῥηκολλήνιον. est collyriū ex humidis medica-  
mentis magnz ex parte constans, cuiusmodi  
sunt mel, opobalsamum, oleū, succi herba-  
rum, fel animalium, liquor Cyrenaicus, &  
alia eiusdem generis. Inter quę tamen etiam  
pleraq; sicca medicamenta ammixta repe-  
rius apud medicos veteres, ob quę tamen ῥηκολλήνιον nomen non amittit, propterea  
quod a præpollente materia denominatio-  
nem sortitur. Sed quę tamen sicca miscen-  
tur, non multum diuersas à prædicta mate-  
ria vires habet: sunt enim moderatiora, vel-  
uti myrrha, thus, crocum, galbanum & alia  
huiusmodi quę cutem rarefacere, crassitiem  
humorum & spiritus tenuare, humorē no-  
xium discutere, & partibus robur addere  
possunt. Eorum plures sunt compositiones  
à veteribus celebratę, quę ab Aetio descri-  
buntur lib. 7. vide ῥηκολλήνιον.

**Υγρόμωρον.** compositio est vnguenti humidi odorati. Habetur apud Aetium l. 16. c. 114.

ῥ' ἔσθ' ὄνομα κολλύνῃ, quod describitur à Scri-  
bonio Largo.

**R**egio *pneum.* humida febris, in qua ægri à primo statim die sudant, sed sudore aut parum aut nullo modo leuantur. Huic opposita est febris sicca, cui sitis vehemens, lingua arida, cutis dura in modum corii, & squalor plurimus toto corpore, vt scribit Gal.lib. aduersus Lycum. Alia est quæ *pneum.* dicitur Hippocr. vide *pneum.*

ῥ' ὑποσπασμα. dictum est ab Hipp. in progn. cer-  
pus modice & leniter inflexum nec veluti  
rigidum, ex opposito δὲ πᾶν τὸ πῆλα γινώ-  
σκει, ut Galen. illic explicauit.

**Τ** *Διαιτησιον*. id est hydropelaborantibus. in  
aquam mutantibus sanguinem, & aquosa  
tollentibus purgantibusque, vt explicat Ga-  
len. in lexico Hippocr.

**T**ercius. aquula. Est pinguedinis superiori palpebra substrata extrema parte incrementum. Nam cum palpebra superior duabus membranis conficitur, quas <sup>in oculis</sup> reuertens creat, earum medium viscosa quaedam atque vinctuosa occupant, quæ palpebras alioquin siccas sua pinguedine emolliant. Pinguis autem ea substantia palpebræ cuti naturaliter substrata in aliquibus, & præsertim pueris, ceu natura humidioribus, augefcens supra modum <sup>videnda</sup> patit, quæ oculum pondere suo grauans, fluxionem in eo excitat, facitque ut ab oculis humor præter naturam stillet. Palpebræ igitur hoc vitio detentis infra supercilia aquam intercurrentem repræsentant, nec sursum attolli possunt: si vero digitis ipsas deprimamus, inde digitos, quod medium intercedit inflatur. Horis autem antelucanis potissimum deslu-

xione tentantur, neque contra solis splendores cernere sultinent, sed illacrymāt, conruiusque lippitudinibus infestantur. Si magna *ὕδατος* est, non nisi manu curatur: quæ parua est, siccantibus remediis inuatur.

*Υδατόχροα* ἢ

*Υδατόχροα*. verbum est ab Hippocr. vsurpatum lib. 3. comment. 3. *ὅτι δὲ μυστὶν*. Sunt excrementa alui tenuia vt aqua (nam tenuē virtūque nomen indicat) sed colore diuerso. Siquidem *ὕδατόχροα* graminis colorem refert: *ὕδατόχροα, δ' χολῆς*, id est bilis, significant.

*Υδατώδες*, aqueum. Id dicitur quod aquæ modo insipidum est. Est autem saporis differentia quem aquosus humor admixtus rebus inducit. Est autem is valde obscurus, & velut aqua ipsa in medio saporum omnium. Itaque eū qui calamis viridibus inest & graminis, non recte aqueum velut ex antiquis non pulli, sed dulcem appellandum esse Galenus censet lib. 4. simplic. med. Qui enim vere aqueus est, perinde atque aqua fere *ἀπὸς* est. Ob id quæcunque acris, acida, austera vel salsa sunt, aqueis commode admiscuntur, si modo in cibos admitti debent & suauiua sunt futura. Siquidē aquei admixtio qualitates omnes exoluit. Sunt autem hæc fere aquei vires: omnia æqualiter penetrat & peruat, pauci alimentis est, stomachum offendit.

Dicitur & alia significatione aqueum id quod à mediocritate sui generis deficiens ad aquā proximè accedit, vt in vinis id quod imbecillimum est & minimā sustinet aquæ mixturem, quod Hippocrates *ὁλκρόφρον* nominauit: & in vrinis alba & valde tenuis: & in humoribus qui plurimum serij habent. Est enim certum non ab aquæ sapore, sed ab aliis aquæ qualitatib. eiusmodi omnia aquea nuncupari. *ὕδατώδες* etiam Hippocr. dixisse pro *ὕδρατικός*, testatur Gal. in lexico.

*Υδατωδὲς ἢ*

*Υδατωδὲς ἢ ὕδρ*, aqueus humor. Vnus est ex oculi humoribus, crystallinum anteriore parte circumdās & medium complectens. Hic totum illud spatium, quod inter crystallinū humorem & pupillam intercedit, replet, sectaque cornea tunica primus effluit. Censetur autē verus humor, vt qui aquæ modo effluit & pellucidus sit. Inde *ὕδατώδες ἢ ὕδατωδὲς* dictus est. Alii vero ipsum *ὠσίδες*, hoc est ouo similem siue albugineum, nuncuparunt, vt scripsit Aetius lib. 7. cap. x. quod magnam gerat cum oui humore albo & tenui similitudinem. Cæterum cum eo humore permixtum etiam spiritus inest, qui oculi tunica ita distendit, vt nulla vsquam parte laxæ aut corrugatæ videantur. Magno vsui est, nō modo replens spatium inter corneam & crystallinum medium, sed vetans etiam ne ab externo aere & ipse crystallinus humor & vicia tunica exsiccentur, simulque colorum discrimina primus excipiens, ne primo statim eorum obiectu crystallinus perculsus laderetur.

*Υδρὸς*. idem prorsus quod *ὕδωρ*.

*Υδρὸς εἰς ἀμύδα*. hydrops ad matellam. sic dicitur à quibusdam renum morbus quem *ἀμύδα* appellant. de quo vide suo loco.

*Υδραργύριον*. sic dicitur à quibusdam *ἡ χάμας δάκρυον* vt habetur apud Diosc.

*Υδραργύρος*. argentum viuum. metallum est in argenti fodinis nascens, album, aquæ instar liquidum, & valde mobile. Chymistæ Mercurium vocant, definiuntque esse aquam viscosam, tenuem, albā tetræ permixtam temperatamque exquisitissime, quā & alterum, hoc est fœmininum, principium generationis omnium metallorum statuunt, vt sulfur masculinum, propter exuperantem in eo frigiditatem & humiditatem, vt & in omnibus fœminini sexus contingit, eamque causam esse cur nunquam addensari & coire possit. Certe negari non potest argētum viuum aptissimam esse gignendis reliquis metallis materiam, sed iis maxime quibus facile adhærescit, vt argento, atque in primis auro, deinde reliquis quo quæque perfectiora sunt. Sed ea tractanda Chymistis relinquamus. Duo sunt eius genera: vnum naturale, alterum factitium est. Naturale tamen si Galen. lib. 9. simpl. medic. nullum esse existimauerit, scribens argentum viuum ex sponte nascentibus non esse, sed ex iis quæ præparantur, velut cerussa, ærugo, psoricum, lithargyros: experientia tamen & veterum autoritas astruit, atque in primis Dioscoridis, qui ipsum in argenti fodinis cameratis earum tectis pendens & in stillas concretum reperiri scribit. De eo scripsit Plinius, in argenti venis lapidem esse, cuius vomica liquoris æterni argentum viuum appellatur. Lapis quidem ille minium est, *ἀμμιον* Græcis dictum, quod Vitruuius *ἀνθρακας* vocari scribit, Plin. ipse interdum venam minii appellat. Peculiaris ille est omnibus argenti viui fodinis, inque ipsius vena reperitur totus scatens argento viuo, crebrasque per se etiam sine igne, emittens lacrymas argenti viui, veluti è fonte quodam aut vomica scaturientes, quæ ab ipsis fossilibus statim colliguntur. Tale quidem est argentum viuum fossile seu natiuum, nimirum liquidum, aquæ modo fluens, colore argenti, liuescente, pellucido, substantia vero lenta, tenui, graui, frigida & humida. Factitium autem ex minio paratur hunc in modum. In patinam fictilem minium inditur, atque vbi diligenter luto circumlita est, accensis carbonibus superponitur, postea quæ opercula adhæserit fuligo deradenda: hæc enim postquam refrigerata coierit, argentum viuum est. Natura vtrique eadem: ideo & *ὕδραργύρος* vtrumque à Græcis dictum, & à Latinis argentum viuum: quorum hi quidem in iudendo nomine mobilitatem eius contemplantur, hi vero eam quam habet cum aqua similitudinem. Nomen enim ex aqua & argento ductum est, quod argenti quidem colorem referat, nec tamen

ut argentum vno loco consistat, sed aqua modo diffuset. ob id ab Aristotele ἀργυρὸς χυρὸς, dicitur, quod nomen Alexander Aphrodisiensis ὑδραργυρὸς interpretatur. Verum Plinius purum illud & nativum nominat argentum vivum, fictitium autem illud ex minio, hydrargyrum, diversis verbis diversas res significari putans: quem errorem Leoniceus non præterit silentio. Certe Dioscor. eodem nomine utrumque appellat, quod non natura modo, sed etiam facultas utrique par esse videatur, utrumque album liquidum, in plano diffuens, nec per se con- crescens, quoniam plus aeris, ut ait Aristoteles, quam aqueæ substantiæ continet. Ignem in tantum refugit, ut vase conclusum superiora petat & operculo adhæreat. Dioscorides porum vim perniciousam habere dixit, quod suo pondere interna exeat, cuius sententiam sequutus Galenus, ipsum recenset in eorum numero quæ erodendo in- terimunt, nec tamen ullum se periculum viri- tati eius fecisse prodidit. Certe corpora nostra nedum exedit, sed etiam multo solidiora & duriora. Nullo enim metallo concludi posse expertum est, quin omnia corrodant. proptereaque necesse habet vitreis in vasis aut fictilibus vitro contextis asseruari, quod soli vitro maleficium eius cedat. Nunc ipsum Venerea illa lues quam plerique morbum Gallicum appellat, in cuius curatione usum aliquem præbet, notissimum reddidit. Si- quidem vnguentis exceptum & corpori illi- tum, caput & nervos petit, & pueritias distillationes in os & gingivas cõcit, quas manifesto & tumefacit & exulcerat. Ve- rum quali sit præditum temperamento non bene inter omnes convenit. Sunt enim qui calidum & humidum quarto ordine statu- ant. Ego illis assentior qui quarto recessu frigidum esse dicunt, proindeque narcoti- cum. Cæterum ex argento vivo ignis calo- re in altum sublato, chymistæ argentum vi- vum machinantur quod sublimatum siue concrematum appellant, argenti vivi puri & atramenti futuri æqualibus portionibus cum aceto tritis donec argentum vivum pe- nitus disparuerit. Ex quibus conflata massa resiccatur, deinde in fictilibus patinis luto diligenter obturatis trium fere horarum spa- tio coquitur, mox auferitur, & cum patinæ refrigerint, quicquid liquidi solidique in iis est eximitur, rursusque teritur, aceto subin- de aspersum, & coquitur. Id quod tam sæpe fieri debet, donec omne argenti vivum in operculum sublaturum ignis calore concre- rit. Id insignem erodendi vim habet, & po- tum non aliter quam calx viva interficit.

ῥ' δεσιν. dicitur à quibusdam ἰσχυρὸς ἀγρία, sicut habetur apud Dioscor.

ῥ' δρέλαιον. aqua oleo mista: incerta autē & mul- tiplex mixturæ ratio est. Refrigerat, ideoque à Galeno adhibetur ad dolores capitis ex febre, & ciendis vomitionibus convenit si tepida detur.

ῥ' δερματὸν. herniæ species composita, quan- do videlicet una cum intestino aquosus hu- mor in scrotum descenderit.

ἢ δ' ὑδρίας. nomen est collyrii, quod describitur apud Paulum lib. 7. cap. 16.

ῥ' δελαν, sine (ut quidam manuscript. cod. habet) ὑδρίας. ἢ ὑδρία, parva hydria, seu parva si- tula: diminutive apud Hippocr. ut annotat Gal. in lexico Hippocr. Apud Herodot. eo- dem significatu est ὑδρίων, Ionice pro com- muni ὑδρίων.

ῥ' δερδρον. garum aquosum, hoc est garum aqua dilutum. minus calefacit & siccat quam ga- rum simplex. vide ῥδρον. Aetius libro tertio: cap. 84. habet descriptionem ὑδρόρου καὶ ὑδρόρου.

ῥ' δροκίον. est tumor capitis aquosus. Colli- gitur enim aliquando in capite tanta humo- ris copia, ut eo caput supra modum intume- scat. Is ut plurimum quidem aquosus est, ali- quando tamen sæculentus aut sanguine di- lutus. Est autem omnis piger & deses, tri- busq; in locis colligitur, ex quibus totidem ὑδρόκιστον differentiz existunt. Aut enim inter cutem & pericranium, aut inter crani- um & pericranium, aut inter cranium & cerebri membranas coaceruatur. Addi- dere & veteres, inquit Aetius, quartam dif- ferentiam, inter cerebrum & eius membra- nas, sed quæ nullam recipiat curationē. Mul- tis autem de causis aquosus ille humor col- ligitur, quarum aliz evidentes, aliz internæ sunt. Interna quidem est cum sponte sua va- sa capitis rarefunt, & aquosam illam substā- tiā, quæ sanguini mista est, in locū aliquem effundunt, unde totum caput intumescat. Externa vero evidensque causa est plaga aut contusio, nō omnis quidem, sed quæ infan- tibus præsertim ab obstetrice infertur in pa- erperio, rarius cõrectato, appressoque eo- rum capite. Ob id puerilis maxime mor- bus hic innascitur, estque eorum proprius. Singularum eius specierū discrimina à Pau- lo & Aetio explicantur.

ῥ' δροκίον. ramex aquosus. Est tumor aquosus corporum scrotum implicantium. Galenus in lib. de tumoribus præter naturam, scribit aquosum eum humorem in tuniceis quæ te- stes ambiunt coaceruari: Paulus vero gene- raliter, ἐν δὲ πλεονεξίᾳ τοῦ ὕδατος σπέρματος. hoc est, in corporibus scrotum convolventibus, fieri scripsit. Cæterum humor hic colligitur, ut Celsus ait, integris testium eiusmodi mem- branis, quavis iis quoque ruptis vel laxatis interdū colligi possit. Sunt autē duæ species ῥ' ὑδρόκιστος, authore Celso. Nam vel inter tu- nicas is humor increfcit, vel in mēbranis quæ ibi circa venas & arterias sunt, ubi hæc grauata occalluerūt. Ac ne ei quidem humori qui inter tunicas est una sedes est. Nā modo in- ter summā & mediam, modo inter mediam & imā consistit. Verum Paulus hanc secun- dam differentiam non expressit, dixitque col- ligi magna ex parte in tunica erythroide cir- ca anteriore testiculi regionem, quæ potis- simum



finum membrana illa à testiculo separatur, alibi autem rarissime. Aliquando vero, ut idem Paulus docet, peculiari quadam tunica humor ille comprehenditur, vocantque hoc malum chirurgi *ὁ ὄγκος*, quod in membrana supernascente, & quæ prius non erat, ille continetur, veluti atheroma quoddam aut steatoma, speciemque aliquam tertii testiculi præ se fert. Sciendum autem est non semper aquam colligi in eo morbo, sed humorem sanguineum interdum vel sæculentum. Meminit & Aetius *ὁ ὄγκος*; inter morbos mulierum, Aspasiamque auctorem sequutus scribit circa pudendi alas consistere, inflationi similem, debili ac molli tumore, & aliquando alteram tantum, quandoque utramque partem occupare, & ad contractum exhibere speciem quandam fluctuantis humoris.

*ἡδρόμεν*. aqua mulla, aqua melle mista, sed mitionis & conditura variæ reperiuntur differentia. Alii duabus pluviæ aquæ veteris ad unam mellis partem additis ita insolant. Alii fontanam aquam adiiciunt & ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt, aquam ad tertias decoctam pluviæ æquiparantes. Alii ex aqua niuali conficiunt, ad maiorem refrigerationem: & *ἡδρόμεν* appellant, quasi è nive factam. Columella lib. 12. cap. 12. parandæ aquæ mullæ rationem apertissime explicat his verbis, Per se facienda erit optimo melle aqua mulla. Hæc autem non vno modo componitur. Nam quidam multos ante annos cœlestem aquam vasis includunt, & sub dio in sole habet: deinde cum sæpius eam in alia vasa transfuderint & eliquauerint (nam quoties, etiam per longum tempus diffunditur, aliquod crassamentum in imo simile faci reperitur) veteris aquæ sextarium cum libra mellis miscent. Nonnulli tamen cum austeriorem volunt efficere gustum, sextarium aquæ cum dodrante pondō mellis diluunt, & ea portione repletam lagenam, gypsaramque patiuntur per Caniculæ ortum in sole quadraginta diebus esse, tum demum in tabulatum, quod fumum accipit, reponunt: nonnulli quibus curæ non fuit cœlestem inueterare aquam, recentem sumunt, eamque usque ad quartam partem decoquunt: deinde cum refrigerit, si dulciore mullam facere volunt, duobus aquæ sextariis sextarium mellis permiscent: si vero austeriorem, sextario aquæ dodrantem mellis adiiciunt, & his portionibus factam in lagenam diffundunt, eamque, ut supra dixi, quadraginta diebus insolatam, postea in tabulatum quod suffumigatur reponunt. Hæc quidem Columella, cui non dissimilia Palladius tradidit. Sed animaduertendum est id *ἡδρόμεν* esse conditium & inueteratum, quodque ad usum familiæ confici & seruari cōsueuerat. Eadem enim quas mullum, vires possidet, & verustate saporem vini assequitur, usumque præstat, ætate media adynamo vino aut loræ in recreandis viribus

respondens. Id proprie *ἡδρόμεν* vocari Dioscorides scripsit, itemque Plinius, qui vinum etiam appellat, propter saporis & virium similitudinem. Sola verustate differt *ὁ ὄγκος*, quod aqua mulla est subita & recens, cum utriusque eadem mitionis ratio fuisse videatur, impares autem vires & usus diuersus, id quod ex Dioscoride perspicuum est. Nec desunt, inquit Dioscorides & Columella, qui *ἡδρόμεν* appellent quod à melle elutis aqua fanis confici seruarique solet. Verum id *ὄγκος* est, de quo supra suo loco.

*ἡδρόμεν*. hydromalum. Genus potionis est sic dictæ à malis cotoneis quæ Græci *μήλα* vocant. Sed non vna conficiendi ratio traditur. Dioscorides fieri dicit duabus mensuris aquæ coctæ & sub Caniculæ sydus insolatæ, additis ad unam melomelitis facti ex cotoneis. Oribasius parari scribit succi cydoniorum sextariis quatuor, mellis octo, aquæ duodecim simul mistis & insolatis sub Caniculâ. Paulus duas habet cōpositiones, unam quæ recipit succi cotoneorum exemplis nucleis cōtusorum sextarios duos, mellis tres, aquæ quatuor: incoquantur despumando ad tertias. Alteram vero quæ fit hoc modo: malorum cotoneorum frustulatim incisorum nucleis ablatis pondo quinque, in aquæ fontanæ sextariis decem coquantur dum intabescant, deinde refrigerata eximuntur, expressoque succo proiciuntur: aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, iterumque incoquitur despumando, quoad octaua portio absumpta fuerit. Aetius cydonia contundit, & colati succi sextario adiicit mellis sextarios duos, aquæ pluviæ ad tertias coctæ sextarios tres, sed eo ordine, ut primum aquam decoquat, deinde mel adiiciat, cumque simul efferbuerint spumaque omnis adempta fuerit, & ab igne remota refrigerari cœperint, malorum succum adiiciat. Postea fistilibus excipit, oblinat, & in cella vinaria reponit, eoque vitur post dies quadraginta. Paulus monet etiam ex malis dulcibus à quibusdam parari, Aetius vero ex crustuminis quoque & aliis pyrorum generibus, & quandoque etiam rosas ammisceri relectis vnguibus, inque eo per noctem & diem macerari, deinde excolatum asservari, nec aescere. Cæterum proprie dictum *ἡδρόμεν* refrigerat, adstringit, prodest stomacho, dysenteria, hepaticis, renū vitiis & urinæ difficultatibus.

*ἡδρόμεν*. est supernacui humoris circa umbilicum collectio. Continetur interdum humor hic sub umbilico, indeque in tumorem attollitur.

*ἡδρόμεν*. hydropiper. planta est apud aquas nascens stagnantes, aut pigro lapsu repetes. Caulem edit geniculatum, solidum multis alis concavum: folia menthæ, maiora, molliora candidioraque, gustu piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam: fructum acré, in surculis parvis, ppe folia racematim co-

harentem. Ruellius eupatorium esse arbitrat. alii persicariam esse putant. Scribit Galenus hydropiper à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cum pipere in gustu est, nomen sortitum esse. Cæterum calidum est, sed non tantum ut piper.

*Υδροπόδιον*. aqua rosaceo oleo mista. Sumpta refrigerat cietq; vomitionem. Datur à Galeno iis qui pharmaca deleteria hauserunt, si post vomitus ventriculus videatur vti.

*Υδροπόσσον*. potio est ex rosis facta. Conficitur autem apud Paulum ex libris  $\text{xx}$  rosarum à quibus vngues fuerint exempti, aquæ sextarius  $\text{v}$ . mellis sextarius  $\text{xx}$ . Aliter Orbasius, miscens mellis optimi libras  $\text{xx}$ . foliorum rosarum libras  $\text{x}$ . aquæ fontanæ libras  $\text{xx}$ . Coquit aquam donec ferueat, & exempto ab igni vase rosas iniicit, tum vas occludit donec perfecte cocta sint, postea defæctis rosis mel seorsum coctum despumatumq; earum decocto infundit. Acrius in eò cõficiendo aquæ pluuiæ sextarios  $\text{xx}$ . coquit donec tres super sint, in quos rosarum per diem noctemque præficcatarum libram vnã coniicit, & vas pluribus operimentis probe contextum asseruat. Sequenti die aquam excolat, & rosas non expressas abiicit, & mel in mortario contritum aquæ immiscet, totumq; fistilibus valis recetibus crudisq; exceptum, paucorum dierum spatio insolat, & in cella vinaria reponit. Hoc multo efficacius quam mel rosaceum frigefacere scribit. Sed omnium delicatissime Aëtuarus *υδροπόσσον* componit, aquæ libris  $\text{x}$ . zachari libris  $\text{v}$ . Coquit donec spissa euadant, deinde addit succi rosarum libram vnã. Sic febribus apprimè vtile esse scribit.

*Υδροφολία*

*Υδροφολος*. aquæ metus. Symptoma est morsus rabiosi canis. Aliis statim, aliis quadragesimo die, aliis etiam serius superuenit. sed nemo eorū qui à rabioso cane demorsus fuerint immunis ab ea affectione est, qui neglexerit aut male subierit curationem, idq; maxime si corpore fuerit cacochymo & melancholico. In tantum autem aquam (nec eam modo ut fertur, sed omne etiam liquoris genus) metuunt, ut ea visa animo vehementissime perturbentur. Res quidem admiratione digna, cum ita affecti canibus fere similes euadant non modo rabie, latratibus & moribus æque pestiferis, quibus obuiam factos petūt, sed calida etiam siccaque intemperie & siti. Huius causas qui inuestigarunt, existimant eos aquam tantopere auersari, quod in ea, tanquam in speculo, intueantur se rubetū facie, toruis oculis, & supra humanum morem efferatis. Vnde non aquam modo, sed quicquid etiam pellucidū est, abhorrent. Alii dicunt fieri in iis hydrophobiā quo canis à quo demorsus sunt, imaginem in aqua cernere sibi videantur. Nam, ut fertur, cum philosophus quidam eo affectu laboraret, & falso, sicut cæteris, canis species ante oculos obuersaretur, & ppter-

ea à bibendo detereretur, animum fortiter recolligens, secumque reputans quam absurdum sit canem in balneo versari, aquam intrepide bibisset, sitimque expleisset, curationem est consequutus. Alii metum aquæ gigni docent ex immodica siccitate, quasi in cotarium habitum mutata penitus humida eorum substantia. Sunt qui vanam esse huius rei causæ inquisitionem dicant, ipsamque *υδροφολία* nihil aliud esse quam insaniz extrabile genus. Est enim magna huius venenici cum eo humore similitudo, notumque est valde differentes esse melancholiz differentias, cumque omnium melancholicorum communis sit metus, alios tamen alia timere.

*Υδρω*. morbus est in tumorum genere præter naturam. Verum tumor alias totius corporis est, interdum autem ventris. Ille perpetuo ab humore, hic etiam aliquando à flatu excitatur. Quo fit ut triplex sit omnis hydrops. Alius enim fit humore per totum corpus effuso, qui *αἰσασίς*, & *ὑποσφιδίος*, & *σφιδίος*, & *λευκοφλεγματίας* dicitur: alius solo ventre aqua distento, qui *ασίς*: alius vero solo ventre flatu pleno & tumente, qui *πυπανίς* siue *πυπανίος* appellatur. Sed omnium quidem communia fere sunt ista, quod ieiunore vehementer refrigerato oriatur, sintque deprauatæ sanguificationis symptomata siue primario propter phlegmonem, aut scirrhum, aut aliud vitium iecur male affectū sit, siue lege consortii quod illi cum aliis partibus intercedit, quodque omnis à cachexia initium sumat. Fieri quidem non potest ut hydrops vllus citra hepatis refrigerationem gignatur: id quod illi contingit tum per se, tum etiam liene aut ventriculo refrigerato. Cõpatitur præterea aluo & intestinis, maxime ieiunio, pulmōni, renibus, & septo transuerso. Sed & immodica per hæmorrhoidas, aut vterum, aut dysenteriam sanguinis vacuatio hydropem gignit, sicut & consuetæ vacuationis suppressio. His enim de causis refrigeratur hepar, post vero aliquando & durum fit. Quamuis autem frigida intemperies hydropem pariat, omnes tamen hydropici & febricitant & sitiunt, quod humor circū viscera deses nec perflat, falsedinem putredinemque colligat. Sed febris quamuis assidua, lenta tamen est, cum pulsu paruo. Ad hæc omnes spirandi difficultatem, tumorem, grauitatem, colorem vitiosum, cibique fastidium incurrunt. Cæterum tres illæ hydropis species manifestis ab inuicem distinguuntur differentiis. *Ανασφικία* toto corpore ex æquo tumet, reddique corpus laxum, pallidum & emortuo simile, & si digitum in carnem paulo altius adegeris, cavitatem ibi impressam diutissime retinet. Causam habet proximam aquosum humorem, partim à iecinore manantē, partim à tota carne corporis veluti in aqua resoluta. *Ασίς* est abdominis ab aquoso humore distentio. Colligitur ille inter peritonæ-

tonzum & intestina veluti in vtre quodam, unde morbo nomen. Habet autem nonnihil spiritus secum admistum. in eo cum venter supra modum intumescat, reliquū corpus alimentum non sentit & consumitur. Aliquando tamen inualecente morbo tumor ad femora vsque pcedit, & pedes scrotumque inuadit. Occupat nonnunquam & thoracem, id quod fit non tam ex propria ascitis ratione, quam ex complicatione hydropis anasarca cum eo. Hæc enim iam sunt illius rudimenta. Sed qua ratione humor eo loco colligatur, video dubitari. Mihi quidem videtur is & à iecinore & ab intestinis & ab omento reliquisque partibus non nisi aquam loco sanguinis habentibus in eam capacitatem exudare & sensim colligi. quod non debet magis mirum videri quam eius humoris portionem nonnunquam in femora & in pedes, maxime post inambulationem, interdum in scrotum, veluti euniculis sibi inusitatam viam parare, & nonnunquam in thoracis spatium atque in vterum irrepere. *νιμμητις* abdomen multo flatu distendit, nō tamen sine vllō prorsus humore, cuius etiam aliquid omnino remissum est. Initio inflationis cuiusdam species tantum apparet, postea vero flatus inspissatur & veluti nubilus euadit, vnaque cum flatu humor etiam quodammodo nubilofus coaceruatur. Totus venter circumquaque tensus est, & percussus tympani modo sonat. Hic hydrops ab Hippocrate siccus nominatur. Omnium autem periculosissimus perhibetur à Græcis medicis, quod, vt arbitror, maior iccinoris siccitas eum pariat, quæ imbecillima omnino qualitate tollēda curandaque venit. Auicēna vero nescio quam rationem sequutus ascitem cæteris periculosiorem esse pronunciauit.

Apud Hippocr. libr. 2. Epidemion Dioscorides oxytonas legit *ὀξύτων*: eoque vocabulo significati dicit *ὀξύτων* eum qui hydropis speciem præ se fert.

2<sup>a</sup> *δύψ* aqua. Est corpus simplex omnium humidissimum & frigidissimum: (nec tamen aqua, vt nec aliud vllum elementum, ita simplex est vt ad amissim sincera sit, sed ad sensum duntaxat cōparata.) tam enim pura est, vt nemo alterius cuiusvis reimisturam in ea deprehendat. Accum aqua quidem simpliciter dicitur, eam intelligere oportet quæ reuera dulcis & insipida est, & quam *ἀπύου* Græci appellant, hoc est, quæ nec gustu nec olfactu alienam vllam qualitatem præ se fert, scilicet quæ nec salsa, nec acida, nec acris, nec male olēs, nec putris, nec alio quouis modo insuauis est, sed omnis penitus qualitatis est expers, & omnis alterius rei mixtione caret, quæ gustu aut olfactu deprehendi possit. Est autem etiam pellucida, minimeque cœnosa, sed veluti diligentissime colata, & ab omnibus quæ innatare solent ramētis liberā. Huimodii igitur aqua secundum naturam suam humida frigidaque

est, & potui iucundissima, atque omnium gustabilium qualitarum media & veluti regula: facile coquitur, nō obstruit viscera, sed per ea celeriter transit atque in vniuersum corpus distribuitur, & quia dulcis est, nullaque qualitate maligna prædita, non potest esse insalubris. Eius documentum nobis dedit Hippocrates, scribens aquam quæ cito calefit & rursus cito refrigeratur, leuissimā esse, leuitatem quidem non pondere æstimans, sed partium potius tenuitate, quodque in seipsam contrarias qualitates facile recipiat. Siquidem aqua quemadmodum & cibis, quanto facilius alterari potest, tanto habetur præstantior. Talis autem aqua sicut cito alteratur, ita si quid in ea calefiat, cito calefit, si quid incoquitur, cito coquitur: in qua enim tardius aliquid coquitur, crassa, frigida crudaque est, & in præcordiis diutissime moratur, & fluctuationes excitat, & in flarum maturatur & corrumpitur, & ita ventriculi robur dissoluit, vt deterius proinde concoquat: sed nec digerendo per corpus alimentum aliquid magnopere conducit, diciturque à veteribus *ἀπὲς γυμνόν* siue *ἀπὲς γυμνόν δωρ*, hoc est indomita atque incoctilis aqua, perinde atque ipsa legumina quæ difficulter elixantur. Aqua igitur quæ *ἀπύου* & tenuis est, aqua propriè & simpliciter nuncupatur, omni vitio carens à quo aliæ non sunt immunes. Sunt autem aquarum duæ summæ differentię, vna potabilium, altera earum quæ bibi non possunt. Earum quæ bibuntur, quinque sunt in vniuersum species, *ὀμβρῶν*, *πηγαῖον*, *φρεάτιον*, *ποταμῶν*, *λιμναῖον*: hoc est, pluuia, fontana, putealis, fluuiialis, palustris. Est autem aqua pluuia auctore Hippocrate libr. de aere, locis & aquis, leuissima, dulcissima, clarissima & tenuissima, quicquid leuissimum tenuissimumque est, à sole sursum trahitur. Attrahit autem sol nō ex aquis modo, sed ex aliis etiam corporib. Quo fit vt ea aqua omnium facillime putrescat, vt quæ differentibus admodum qualit. prædita sit: nec tamen propterea damnanda venit. Siquidem prompte alterabile esse plus habet laudis quam vitii, si modo non desint alia bonæ aquæ indicia quæ paulo ante explicauī. Est autem statim vt decidit excipiēda colandaque. Galenus tamen libr. 4. sanitatis tuendæ aperte scripsit se aquam pluuiam non probare, sed fontanā præferre: nisi quis velit id Galeni dictū non ad quemlibet aquę pluuię vsum, sed ad folius apomelitis confectiōem referendum esse, quod præter cæteras dotes extergendi, vrinas mouendi, & biliosa per aluum deiciendi facultatem habere debet. At vero aqua pluuiā neque extergit, neque concoquit: modice autem adstringit atque excretionē cohibet: eadem etiam facile in bilem vertitur. Sunt autem aquę pluuię tres differentię, vt habetur apud Hippocr. libr. 4. *ἡ ἐπιδυμῶν*, *ἡ ἐκ τῶν βροχῶν*, *ἡ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ*, id est, æstiuā, tōnitruālis & procellosa. Harum

æstinam cæteris profert, quod, vt annotat Galenus, humor per æstare calore attenuatus, & in halitus inuisibiles dissipatus, atque idcirco clam nobis in aerem subuolans, ac deinde propter mediæ regionis frigiditatem, ventosque resistentes & densatum aerem iterum crassescens eam pariat. Id quoniam æstate cõtingit, cuius mediam partem *ἡ εὐχρηστὴ ἐξ ὧν* veteres nuncupabant, *ὑπερὶ τὴν ὑδρῶν*, aqua eo tempore delapsa, ab Hippocrate appellatur: quo nomine idem quod *ἡ εὐχρηστὴ* significat. Secundum eam *τὸ βροχιαλὲν*, id est tonitru excussa aqua, habetur, quia per tonitru nubes impelluntur, colliduntur inter se, ignis & fulmina emicant, vnde tenuior & leuior aqua redditur. Quorum nullum quia in nimbose aqua inest, ideo eam malâ esse Hippocrates asseuerauit: siquidem eo cœli statim continua attraque nubes totum aerem occupat, quæ nec concurrat & decerat cum aliis nubibus, nec aerem calidum intra se inclusum continet.

*ἡ πηγαία*, hoc est fontana, optima est iis qualitatibus quas initio exposui prædita, præsertim cuius fons ad orientem solem erumpit, quæque per meatum aliquem mundum aut puram colatur terram: sicut è contratio mala est, ægre concoquitur tardique transitus est, cuius fons è petra scaturiens contra septentrionem fluit, solemque auersum habet.

*ἡ πρῶτη*, hoc est putealis, frigida, crassa, terreaque est, difficulter excernitur, & ægre digeritur.

*ἡ ποταμιαία*, siue *ἡ ποταμιαία*, id est fluminalis, omnis perhibetur mala, excepta Niliaqua, quam omnibus bonæ aquæ donibus insignitam esse veteres commemorant, cum aliorum fluminiarum aquæ ægre concoquantur, siccant & siticulosæ sunt, nisi flumini ipsi per fontes perpetuos fluant, & aliis fluminibus non miscantur.

*ἡ παλυστρία* autem, hoc est palustris aqua, quoniam eorum in alueto continetur, limosa & grauis est, & quia nõ agitur, velut mortua & semiputris. Possunt tamen in melioris aquæ inopia vitia hæc coctione emendari, sicut Galenus docuit comment. 4. in libr. 6. *ἡ ἐπὶ τῷ ὕδατι*.

His addi possunt *ἡ ἐπὶ τῷ κρυσταλίνῳ καὶ χιόνι*, id est, aquæ à glacie & niue manantes, quas deterimas esse Hippocrates eodem libro scriptum reliquit. Cum enim, inquit ille, semel concreta fuerint, non amplius in pristinam naturam redeunt: sed quod in iis clarum, leue, dulceque est, excernitur & dissipatur: quod vero graue & turbidum est, relinquitur. Cuius rei hoc argumentum est, si aquam certo pondere frigoribus exposueris & post die congelatam calido in loco reposueris quo liquecat, eam ubi liquata fuerit, multo pauciorẽ reperies. Quæ vero bibi non possunt aquæ, multorum generum sunt: *ἡ ἀλάτινη*, *ἡ συγγιγνόμενη*, *ἡ ἀσπιδιόνη*, *ἡ δακρυόνη*, *ἡ ὑπερὶ τὴν ὑδρῶν*, *ἡ ἐπὶ τῷ ὕδατι*, hoc est, marina,

aluminosa, bituminosa, atramentosa, nitrosa, sulphurea. Harum marina propter falsedinem bibi non potest, atque si bibatur non concoquitur, hæret præcordiis, incendit viscera, sitim ingentem excitat. Neque enim veluti aqua dulcis frigida humidaque est & partium tenuium, sed tantum ab ea distat, quâto plus salis habuerit. eam enim ob causam aqua maris mortui longius recedit à facultatibus aquæ dulcis quam aqua marina, quod multo plus salis contineat.

Similiter de reliquis aquarum differentiis iudicandum est, quæ pro mistionis qualitate & modo plus minusue à facultatibus aquæ dulcis & potabilis recedunt, nouæque comparant. Siquidem aqua per loca aluminis, bituminis, atramenti, sutorii, nitri sulphurisque plena permeans, huiusmodi substantiæ aliquid abstergit secumque trahit, à quo ipsa inficitur, & naturis qualitatibus exarta alienas acquirit. Quamuis autem hæ omnes aquæ bibi non possint, sunt tamen magni in medicina vsus, siue siccandum, siue calefaciendum, siue etiam adstringendum est, vt in singularum rerum explicatione videre licet.

*ἡ μεμβράνη*. Est pars corporis simplex, alba, nervosa, lata, plana, valida, tenuis facileque dilatabilis. Hanc Græci nunc *ὑμὴν*, nunc *χρῶμα*, nunc *μεμβράνη* indifferenter appellant. Res enim eadem est sed rationes diuersæ. Nam cum partem aliquam vestit, *χρῶμα*, cum cerebrum foris integit, *μεμβράνη*, alias *ὑμὴν* dicitur. Est autem omnium corporis membranarum amplissima cutis, partium subiectarum tegumentum, munimentum, ornamentum: quanquam composita sit ex nervo, carne, venulis, & alicubi arteriis: sed ante curim *ἐνδερμὶς* sensu destituta, ex cutis excremento producta & tota cuti superposita. Præter hanc autem singuli etiam musculi suas habent membranas siue tunicas, ex nervorum tunica exortas, aut etiam ex periosteis ligamenta in musculos deducuntibus. habet & cranium membranarum suam dictâ *μενιγκεαία*, quæ ex meninge crassa confata totum cranium ambit. Insunt & oculis suæ membrana, *ἐπιπεφυκία*, *μεγεθυμένη* καὶ *χρῶματις* siue *παρρητις*, ex cerebri meningibus efformata: ad hæc *ἀμφιβλεστροειδής*, & quinta candidissima, humorem crystallinum vndique ambiens. Habet & palatum & os suam à nervo quartæ coniugationis contextam. Habent & fauces & epiglottis & larynx & aspera arteria suam, cū interna œsophagi & ventriculi tunica continuam, tenuem, densam modiceque siccam, villis rectis constantem. Habet & tota rhachitis productam ab utraque meninge. Spondyli vero ex seipsis membranam tertiam habent crassissimam, ex ipsorum ligamentis natam qua aduersus omnes iniurias communiantur. Similiter & ossa reliqua membranam suam vel ex suis ligamentis producent, vel ex pericranio huiusque continuato, à quo etiam

etiā *πελαγίος* & *θερύναιος* proficisci possunt videri. Habent vero & proprias membranas singula viscera, quas & tunicas appellare licet. Sunt autem & in membranarum numero *νύμφη*, quæ pudendo muliebri inest, & *χοεῖον* & *ἀμνός* & *ἐνάρτησις*, & præterea in toto corpore quam plurimæ: Ex membranis autem quædam villos habent, vt venarum, arteriarum, œsophagi, ventriculi, intestinorum, vteri, ambarum vesicarum tunica propria, cutis, membrana carnosa, tunica interna asperæ arteriæ, epiphyses membranarum in orificiis vasorum cordis, tunica tertia & extrema rhachitidis: & harum quidam villorum genus vnum longum, transfuersum, obliquum, vel solum habent vel præcipuum, quædam duo, alia etiam tria. Aliæ vero villis carent suntque in omnem partem papyri modo diuiduæ & simplices & vnde quaque araneis figura similes vt meningis, pericranios, periosteos, subcostalis, peritonæos, & quæ ab his duabus plurimæ nascuntur, & quæ tres foetui sunt destinatæ, licet harum non pauca colliguntur tum sibi tum vicinis partibus per villosa quædam aut membranosa ligamenta tum cuti tum intercedenti passim adipi, tum musculis, tum partibus aliis subiectis. Quin & ipsa membrana alicubi carnosa magis effecta fit musculus, vt in musculo colli toti & faciei lato.

*ῥαισίδες*. est os bicornæ pluribus officulis contextum, in similitudinem literæ *v*, ad radicem linguæ situm. Nomen habet ab hac similitudine, à qua etiam quibusdam dicitur *ὑψαισίδες*. Sunt etiam qui *λαμβοειδές* appellant, communi cum capitis sutura nomine, à litera *λ*, quæ inuersa non est valde dissimilis ab *υ* psilo. firmamentum est musculorum linguæ & laryngis. Os namque eius maximum, quod totius ossis velut basis est, anteriore parte ad securitatem gibbum est, posteriore linguam spectante cauum, ad continendum. Huic autem alia duo vtrinque officula, velut duo cornua, vniuntur: vnum breuius & inferius, osse vnico constans, in thyreoidis (est autem laryngis cartilago) apophysim prælongam inserto: alterum gracilius, longius, rotundius, officulis tribus vel quatuor colligatis inuicem, ad styloidis radicem ascendētibz conflatum. Quo loco quibusdam præsertim mulieribus ligamenta sunt tantum sine officulis, ab osse hyoide ad styloides ascendētia. Est autem os hyoides quadrupedibus multum diuersum ab humano.

*ῥοσάριον*. Apollinaris herba & altercum, vt ait Scribonius Largus. frutex est caulibus crassis, foliis latis, oblongis, concisis, nigris. flores emittit à latere caulis, ordine prodeūtes, tanquam puniceorum cytinis, scutulis septos, seminum plenis vt papaueris. Tria huius genera: vnū floribus pene purpureis, folio similis, nigro semine, cytinis duriusculis & spinosis: alterū floribus effigie mali, semine subflauo, vt irionis, floribus luteis,

foliis & folliculis simplicioribus. Ambo infania, capitis vertigines & soporem gignunt, ideo in communi vsu damnantur. Tertium genus, vt quod mitissimum esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisque, in maritimis ruderibusque nascens. Cuius occasio si non adsit, rufum vsurpari oportet: nigrū, vt deterrimum, improbat. *ροσάριον* Græci vocant, quasi fabam suillam, quod pastu huius herbæ resoluantur & conuellantur apri, vt prodit Aelianus. Illi vis est refrigerandi ad tertium vsque gradum.

*ῥόσθαμος*. dicitur auctore Diosc. & Apuleio, aster Articus, quasi suis oculis: quod totus eius flos animalis huius oculum referre videatur.

*ῥόσθαμος* est etiā gemma ex specie *ῥόσθαμος*, sic dicta quia intus suillum oculum exprimat.

*ῥάλαττιον*. dicitur omne medicamentū quod illini potest: vt explicat Gal. in lexico Hipp.

*ῥάλαττιον*. est instrumentum chirurgicum quo significatur id omne quo ad illinendum vtimur, qualia sunt specillum, spathe, & quod *διπύρρυν* dicitur, quæ omnia in summo capitulum habent rotundum. Annotauit Galenus comment. 2. eis τὸ πρὸς ἀφρόν.

*ῥέζυρται*. *ὑπέζευκται*, id est subiectum est: vt explicat Gal. in lexico Hippocratis.

*ῥέζυκός ὑμῶν*, *ῥέζυκός*. succingens membrana seu tunica: vtrāque enim sortitur appellationē, sed membrana quidē ab essentia, tunica vero ab vsu nuncupatur. Siquidem araneæ modo prætenuis, ac ex toto sibi similis, costas succingit: indumentū vero est, ceu tunica quædam omnium spirationis instrumentorum. Siquidem costas omnes, musculos intercostales internos, phrenas, sternum subungit & subregit, & tunicam largitur pulmōni, asperæ arteriæ, vti & œsophago, externā pericardio, arteriæ magnæ ascendenti & descendēti, & venæ cavae ascendēti, quādiu scilicet vasa hæc per thoracem ferūt. similiter quoque neruis tū à collo in phrenas, tum à cerebro in vētrem infernum descendētibz. Est autem ea tunica gemina, dextra ac sinistra, & vtrāque dū sibi in medio thorace contigua est, cohærens & vnita à mediis thoracis spōdyliis ad medium sternū fertur, thoracemq; in duas partes æquales, dextram ac sinistram, diuidit, ceu diaphragma quoddam & paries medianus. Qua autem costas succingit simplex non est, sed connata periosteō costas ambienti, vt alia ossa vestire solet. Oritur autem vtrāque succingens tunica à ligamentis spondylorum thoracis, & mox parte suā altera inuicem connectuntur, & per thoracem medium, quem, vt dixi, in duo æqua diuidunt, feruntur ad sterni medium: inde vero vtrāque ad suas costas & suam originem recuruat, & vtris speciem refert. Verum eam aliqui à pericranio huc vsque continuato exoriri volunt, inter quos fuit Herodotus in libr. qui dicitur medicus, vt annotauit Galenus commentario in libr. 6.



*ἡ δὲ βενδυμὴν*. Venas & arterias ab azygo, arteria magna, mammalibus & phrenicis valis parte sui his propinqua recipit: nervos autē à partibus dorsalibus quidem qua costas tegunt, phrenicis vero qua phrenas, septis è cerebro ortis cetera. Dicitur alio nomine à quibusdam *ὑποπλευρῆς*, quasi dicas subcostalem.

*ἡ περιηθίωσις*. *ὑποσυσφαισμός*. hoc est, in se subuoluantur, vt annotat Galenus in lexico Hippocratis. Sed obseruandum quosdam codices habere *ὑποπλευρῆς* significatione non diuersa.

*ἡ πικαίματις*. Hippocrates sic appellauit *πικρὸν* Aphor. 14 libr. 1. suum sequens dogma, & omnium fere nobilissimorum Philosophorum, qui eorum, quæ animalia constituunt, elementorum ignem maxime vitę esse causam existimarunt, sicut Gal. in comment. annotauit.

*ἡ πλάτη*. laurus Alexandrina.

*ἡ ρευὼν*. frutex ferulaceus, dodratalis, rubens, folio rutæ, flore albæ violæ, luteo, qui digitis tritus sanguinem succum remittit, ex quo *αὐτὸν ὀνόμαζον* cognominatur. subhirsuta illi siliqua & rereti hordei magnitudine, semine intus nigro, resinosi odoris. vulgo herbā sancti Ioannis appellant. A quibusdam *κόρη* etiam hypericum dicitur. Fit ex hyperico antidotus quædam sanans podagras & coxendicum morbum, aliaque multa præstās, quæ describitur ab Actio libr. 12. capite de antidotis podagricis.

*ἡ πέλως*. dicitur ab Hippocr. & ὁ ὑπερκαθαυρόμενος ἄνθρωπος, & ipsa *ὑπερκαθάρσις*. id est, & homo supra modum purgatus siue vacuatus, & ipsa purgatio siue vacuatio modum excedēs. sic enim quidam enarrarunt istud, *ὑπερκαθάρσις*. Similiter & *μακρόνους* & *βραχύνους* videtur dici bifariam. Author Gal. in lexico Hippocratis. Erotianus habet *ὑπερκαθαυρόμενος*, quod itidem exponit *ὑπερκαθαυρόμενος*, qui supra modum purgatur. à verbo *ὑπερκαθαίρειν*, de quo supra suo loco.

*ἡ πικράδαρις*. est purgatio immodica ex medicamento. In causa est vis nimia medicamento, quod vasa ad ventrem attinentia mordēs, & aperiens, & continenter irritans atque conuellens corpora, vasorum vires dissoluit. Sed cum initio vasa modice pateant, nec multum imbecilla sint, nō nisi quod tenuissimum est minimeque naturæ familiare excernitur. Tandem vero vasis tum multum dehiscenribus, tum imbecillioribus redditis succedit eorum vacuatio quæ sunt naturæ charissima. Quamobrem flaua bilis primo, deinde pituita, demum atra bilis, postremo sanguis, quem natura habet familiarissimū, excernitur, primum quidem tenuissimus, deinde vero crassissimus. Itaque medicamento dato pituitam ducente, si immodica fiat purgatio, primum flaua bilis, mox atravltimo loco sanguis excernitur. Si vero quod flauam bilem ducat exhibitum sit, pituita sequetur, tertia atra bilis, quartus tan-

dem sanguis. Quod si medicamentū datum sit atram bilem purgans, eam quidem primum vacuabit, deinde flauā, postea pituitam, postremo sanguinem, tanquam exinanitis iam vasculis effluetem. Cum enim ea non amplius in se continere alios succos præ imbecillitate possunt, eorum vero ora aperta fuerint, nec irritare medicamentum desinat, nec familiarem præterea succū possit attrahere, necesse est reliquos eo ordine quem diximus, excerni.

*ἡ πύρος*. idem quod *καρμῆς*, id est pistillum: quod saepe & *διδυλξ* appellatur.

*ἡ σφύρισις*. carnis excrescentia. Est carnis inutile incrementum in quacunque corporis parte. Neque enim in vlceribus solum, verum etiam in oculis, auribus, gingiuis, naso, testiculis, & aliis plerisque partibus caro supercrescit. est igitur morbus in incommoderatione magnitudinis, siue ex eo genere quod in quātitate magnitudineue partium spectatur. Itaque vel excindi debet, vel medicamentis catharteticis absumi. Huiusmodi incrementi præcipua causa est boni sanguinis in carnem vberior affluxus. Quare curatio eius perficitur iis quæ contrariam sarcoticis habent facultatem: vocantur autem ea *κατασφύρικα*, de quibus suo loco dictū est.

*ἡ σφύρις*. ultra modum extenditur. vt annotat Gal. in lexico Hippocratis.

*ἡ πέρυδρον*. valde plenum infusa aqua. vt annotat Gal. in lexico Hippocratis.

*ἡ σφραλίσσει*. id est, *πλήρης πληρωθεὶς χολῆς*, multa plenus sit bile, vt refert Galenus in lexico Hippocratis. vbi quidam codices habent, *ὑπερκαθάρσις*. *πλήρης πληρωθεὶς χολῆς*. id est, multa replebit bile.

*ἡ πύχνη*. mediocriter remissus est à febrili calore. vt annotat Galenus in lexico Hippocratis. à verbo *ὑποψύχειν*, modice seu leniter refrigerari. at *ὑπερψύχειν* esset supra modum refrigerari.

*ἡ πέρωα*. est pars oris superior, modice concava, foraminibus pertusa, quibus à cerebro pituita in os descendit. Extenditur à faucibus ad dentes vsque, & in fornicis aut cameræ modum concava est, sed leniter nec supra modum, vt iis accidit qui sunt acuto capite, quemadmodum initio libr. 6. *ἡ βενδυμὴν* Hippocrates annotauit. Est autem palatum veluti cerebri basis, firmata osse sphenoide, quod propterea Gal. πρὸς τὴν ὑπερκαθάρσιν ὅταν αὐτὴ aliquando appellat. Per id multa cerebri incrementa in os descendunt. Est enim multis pertusum foraminibus, sed crassa membrana intrinsecus obductis, quam & ventriculo & gulæ & vniuerso ori communem esse anatomici perhibent.

*ἡ πύκων*. frutex est nascēs in segetibus & aruis, foliis rutæ, exilibus ramis. Natura illi eadem quæ papaueris succo. refrigerandi vim habet tertio fere ordine: adeo vt parum absit à papauere.

*ἡ πύλη*. est, vt scribit Homericus interpres, πρὸς τὴν

*παρὰ χείλους ἀφ' οὗ ἀναστάνη ὑψηλὰ πύχνης*, hoc est, superius labrum ubi primum lanugo oritur. Caelius tamen barbam circa utrumque labrum fruticantem ita vocari scribit.

*ῥῥῖον*, muscus auctore Aetio: qui & *αἰχάριον* & *βρίον* appellatur, ut prodidit lib. 12. cap. de vnguentis & acopis diuersis ad podagricos. canabacula id parua est ex arbore quæ Damascena dicitur, itemque ex ea quæ rhodacinea appellatur, exorta, ut est apud eundem lib. 13. cap. 118. de Mnasaphii confectione.

*ῥῥῖον*, Epithema est hepaticū, cuius descriptionē vide apud Aetium cap. de cura splenis indurari.

*ῥῥῖον*, pubes. Dicitur, ut ait Pollux, pars ea ventris quæ ab umbilico ad pilosas vsque genitalium partes pertingit. Alio nomine *ῥῥῖον* vocari idem author est. A Latinis imus venter rectius forte dicitur quam pubes, quam peculiari nomine *ῥῥῖον* appellant.

*ῥῥῖον*, dicitur à quibusdam *ῥῥῖον* siue secundum maius, quoniam in suggrundis fere nascitur quæ *ῥῥῖον* Græci vocant.

*ῥῥῖον*, dicitur ab anatomicis carnosæ ea pars quæ sub natibus deorsum versus ad femur pertendit.

*ῥῥῖον*, sic à quibusdam dicta est *ῥῥῖον* ἡ ἀλλὰ ἀνδρῖνα, ut habetur apud Diosc.

*ῥῥῖον*, genus arteriaci medicamenti, constans fere iisdem ex quibus & arteriaca medicamenta inflammationes arcentia. Facultatem autem habet leniendi, læuigandi, simulque remittendi asperitates, & si quid reliquum est inflammationis, id concoquit & persanat. Eiusmodi pharmaca parantur ex passio, gummi, tragacantha, glycyrrhiza quibus si liber addere detergenzia, conuenient mel despumatum, amygdalæ, resina terebinthina, ficus, vua passa, semen iridis & alia eiusmodi. Ex his paratur pharmacum quod linguæ subditur. Sic enim eo paulatim liquescente, asperæ arteriæ summum maderescit & irrigatur. Oportet autem reniti tussi & ne exciretur cauere. Obiuctantes autem ut ne tussiant, quod ex pharmaco defluit, in asperam arteriam excipient. Multa huius generis pharmaca describuntur à Galeno lib. 7. *ῥῥῖον* *ῥῥῖον*.

*ῥῥῖον* etiam dicitur à quibusdam inferior linguæ pars, quæ subiectam attingit maxillam.

*ῥῥῖον*, vltima colli anterioris pars cui proxime subest iugulum.

*ῥῥῖον*, subligatio. Ea in causa est ut quæ vel abscesserunt attrahantur, vel quæ expansa sunt contrahantur, vel quæ contracta sunt, distrahantur, vel dirigantur distorta, vel contraria. Sic Gal. comm. 2. *ῥῥῖον* *ῥῥῖον*.

*ῥῥῖον*, appellantur ab Hippocrate binæ fasciæ quæ priores fracturis adhibentur, & obuoluantur antequam panni iniiciantur, ut annotat Gal. quæ verò iniectis pannis fasciæ superdantur, eas Hipp. *ῥῥῖον* vocat.

*ῥῥῖον*, trochiscus, sic dictus quod anō subiiciatur ad intestinorum tormina & ani do-

lores. Compositio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 12.

*ῥῥῖον*, dicitur quod sub cistho ad radices nascitur, malo granato immaturo simile, unde & à quibusdam *ῥῥῖον* vocatum fuit. Eius tria genera Dioscorides facit, rufum, herba-ceum, candidum, cui succus exprimitur ut acaciæ. Plinius rufa & candida hypocisthidae contentus est. Nascitur sub cistho, unde & nomen habet, sub quo profilit sicuti sub arboribus fungus. E radices fere medio velut infixæ pullular. Sunt autem qui *ῥῥῖον* & *ῥῥῖον* differre velint, dicentes *ῥῥῖον* id vocari quod ad radices cisthi subnascitur: succum vero ab eo expressum, *ῥῥῖον* appellari: quod & videtur Paulus Egineta existimasse. Virm habet *ῥῥῖον* valde adstringentem, & est efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, ut reiectionem sanguinis, profuuiam muliebriam, coeliacos dysentericosque affectus. Quin & si quam partem robore cōsiliū est, quæ plūsculo humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem non parua addit.

*ῥῥῖον*, sic dicitur pars *ῥῥῖον* ἡ ὀφθαλμῶν, hoc est cavitati oculorū, subiecta. vide *ῥῥῖον*.

*ῥῥῖον*, *ῥῥῖον*, hoc est, vacuus, latus, cuique nullus tumor est in hypochondriis, apud Hippocr. lib. 1. *ῥῥῖον* *ῥῥῖον*. sect. 3. ut illic Galenus annorauit.

*ῥῥῖον*, destillat, defluit, ut refert Gal. in lexico Hippocratis.

*ῥῥῖον*, subhumidum, subpingue. ut annotat Gal. in lexico Hippocr.

*ῥῥῖον*, inespiligenus quod *ῥῥῖον* dicitur: vel, ut aliis placet, pomum sorbo simile.

*ῥῥῖον*, male olentia & digna quæ omnes abominentur, ut annotat Galen. in vocibus Hippocratis.

*ῥῥῖον*, quæ subnatauit, quæ subiuit, ut refert Gal. in lexico Hippocratis.

*ῥῥῖον*, cuniculosum, seu cuniculatim depascēs vlcus, quod scilicet pluribus transuersisq; itineribus sub cutem serpit: *ῥῥῖον* enim, à quibus *ῥῥῖον* dicuntur, Græci subterraneos canales, & opertas fossas siue cloacas appellant.

*ῥῥῖον*, appellantur ab Hippocrate partes copiosæ quæ in extremitate tenuantur.

Cuiusmodi brachium est iuxta primam palmæ partem & crus iuxta pedem, & nasus sicut Galenus annotauit comment. 3. *ῥῥῖον* *ῥῥῖον*. In Hippocratico eiusdem Galeni lexico penultimam huius vocabuli syllabam manuscripti etiam codices dupliciter exarant habent, per *η* & per *υ*, nec diuersa tamen expositione: nam *ῥῥῖον* interpret.

*ῥῥῖον*, *ῥῥῖον*, caua humiliora. & *ῥῥῖον* in maiore Prothetico de vtriusq; dici pro *ῥῥῖον* & *ῥῥῖον*, humiliores & adductas seu contractas. Ad hæc *ῥῥῖον* exponit *ῥῥῖον*, aduncum habens nasum. quia humiliora sunt quæ circumcirca sunt quam ipsa sublimitas. Priore scripturam Erotianus etiam habet, *ῥῥῖον* interpretans quæ ex lato in angustū (*ῥῥῖον* ipse

dicir) coacta seu contracta sunt. Alias *ὑπο-  
χρως* est Subaridas, Aliquarulum siccus. *ὑ-  
χρως* enim Aridus est & Siccus.

*ὑποχρωματις* *ὑπὸ τοῦ* *ὑ* *χρῶμα*. subcostallis membra-  
na seu tunica. vide *ὑποχρωματις*.

*ὑπόπυον*, est collectio puris copiosi sub cornea  
oculi tunica. Aetius speciem esse *πυόσιν* sta-  
tuit vti & *ὑπόπυον*, sed hunc quidem in circulo  
iris similem videri vagui relecto, *ὑπόπυον*  
autem abundare multo pure, & dimidium  
nigri occupare, aut per totam corneam tu-  
nicam pellucere. Docet autem fieri citra ex-  
ulcerationem post dolorem capitis aut lip-  
pitudinem, & aliquando post phlegmonem  
accidere, effuso sub corneam sanguine & in  
pus versio. Sunt autem *ὑπόπυον* sympto-  
mata dolor pulsatorius vehemens, rubor  
totius oculi & temporum dolor.

*ὑπόπυος*, hydropsis species qui & *ὑπόπυος* &  
*αἰσάρινα*, & *λευκοφλεγματις* dicitur. vide *ὑπόπυος*.

*ὑποπυόσις* *ὑπὸ τοῦ* *ὑ* *πυόσις*.

*ὑποπυόσις*, dicitur cui glans non recta sed sub  
cane perforata est. *ὑπόπυος* autem siue *ὑπόπυος*,  
hoc est canem vel caninum vinculum  
vocant id quo cutis membri genitalis cum  
glande colligatur. Vitium id à prima origi-  
ne contrahitur. Quia autem glans non re-  
cta forata est, sed sub eo vinculo, qui sic af-  
fecti sunt, urinam antea facere non pos-  
sunt, nisi pudendum ad pubem relectant,  
neque liberos generare, quod semen ipsor-  
um non possit recta ferri in vterum. Diffe-  
runt *ὑπόπυος* *ὑπὸ τοῦ* *ὑ* *πυόσις*, quod hi neque in glande  
ipsa neque in eius vinculo foramen habeant.

*ὑποπυόσις*, est incisio tribus diuisionibus su-  
pra frontem facta ad pericranium vsque.  
Nec tamen tribus illis lienis frontem inci-  
disse satis est, sed subiicienda etiam est spa-  
tha, vnde sectioni huic inditum nomen fuit,  
& per subditas partes transmittenda, totum-  
que id spatium ad membranam vsque cal-  
uariæ excoiandum, eo modo quem docet  
Paulus libr. 6. cap. 6. Sic enim & caro &  
vasa quæ illic habentur omnia cicatricem  
callumque contrahent, minusque per ea pa-  
tebit via humori in oculos & subiectas frō-  
ti partes stillanti. Adhibetur enim id sectio-  
nis genus fluxioni multæ & calide ruenti in  
oculos, ex qua tum rubet facies, tum in frō-  
te sensus quidam & veluti motus vermium  
aut formicarum oboritur. Aetius tamen id  
curationis genus inefficacius esse *ὑπόπυος*  
existimat, & ab iis tantum vsurpari qui  
alterius deformitatem refugiunt.

*ὑπόπυος*, Generaliter quidem dicitur quicquid  
subsider, atque in imo cuiusque liquidioris  
excrementi subsistit. Neque enim urina tan-  
tum hypostasis est, sed etiam alui deiectionū,  
ex medicorum prope omnium sententia qui  
Hippocratem interpretati sunt, vt ex Gale-  
nio constare potest commēt. 3. in prorrhēt.  
aphor. 63. vbi enim illa liquidiores sunt, a-  
liquid fere semper facies deponit quod ima  
valis petit, variumque apparet pro variis cor-  
porū affectionibus, ad morborū cognitio-

nem & prælagia nō contemnendū. Verum  
medici in eo præcipue quod in urinis subsi-  
det cōtemplando atque diiudicando studium  
impēderūt, quod ex eorū sententia definitur,  
Crassior urina portio secreta & subsidens.  
Partē quidē esse urina patet quæ & à renibus  
per emulgentes venas trahitur simulque cū  
reliqua urina excernitur, quodque omnis ur-  
ina eā, licet aliquando tam tenuem & ob-  
scuram, vt nulla fere appareat, confusam vel  
secretam contineat. Sicut autem serosa uri-  
na portio, ita id etiam quod post in ea sub-  
sider, mutationem concoctionemque; aliquā  
tum in renibus tum in vesica adipiscitur ca-  
loris natui beneficio qui iis in partibus i-  
psaque etiam urina continetur. Siquidem p-  
eius modo perfectæ vel imperfectæ conco-  
ctionis signa in urina cernuntur. Est autē uri-  
na eius caloris particeps nō modo quamdiu  
in nobis ea cōtinetur, sed postquam etiā ex-  
creta est, donec putrere & fœtere incipiat.  
Hic igitur calor, cuius vis est separare ea quæ  
sunt diuersorum generum, si optimus est &  
robustus, crassiorem illam partem vndique  
secer nit, & in mediam propellit. Cum enim  
æquabiliter per totā urina sit diffusus, nulla  
ratio est cur ea magis in dextrā partē aut si-  
nistram inclinet. Descēdit autem infra pro-  
pter crassitiem & grauitatem, quodque flatu-  
lento spiritu careat, quia optime concocta  
sit. Quoniam vero nō omnibus sui partibus  
æque grauis est, quod est grauissimū, matule  
fundū petit, deinde quod paulo minus ha-  
bet grauitatis, deinde sensim quod mini-  
mum graue est: ita vt gradibus quibusdā py-  
ramidis speciem repræsentet. Cuius quidem  
figuræ causa, vt dixi, duplex est, tum insiti  
caloris vis eam vndique & veluti circulo (sic  
enim eiusmodi motus peragi solent) depel-  
lētis, tum in æqualis partium eius grauitas.  
Talis quidem est hypostasis figura situsque.  
Iam quod pertinet ad eius substantiam, eā &  
consistentia & copia mediocrem esse oportet,  
præterea quæ omnium maxima laus  
est, albam, læuem, & æqualem. Horum e-  
nim trium signorum in hypostasi tanta vis  
est, vt iis tantum tribus optimam urinam  
medici definiērint. Si enim hæc adsint, re-  
liquorum nullum omnino defuturum vi-  
detur. Sunt namque perfectæ concoctio-  
nis indicia, ex qua reliquæ omnes notæ de-  
pendent. Nec tamen vlla hypostasis perfe-  
cte cocta est, sed cū sit ex genere excremen-  
torum, aliquid præter naturam in se conti-  
near necesse est. Quicquid enim alimenti in  
sanguinem conuerri non potest, subsider in  
urina. Itaque prout concocta apparet, san-  
guinem etiam, vnde manauit, tantum con-  
coctum esse declarat. Crassa enim crassum,  
sublimis flatulentum, flaua biliosum, liui-  
da vel nigra melancholicum aut corruptum  
significat. Ex concoctione persequitur, vim aut im-  
becillitatem denotat. Cæterum albedo,  
quæ ex bonis notis prima est, in ea contra-

hiritur,

hitur, quod solidæ partes, cuiusmodi sunt vasorum tunica, primum quidem conatae sint eam, ut & reliquum sanguinem, sibi assimilare: deinde vero renum interiores membranae, vterusque, & postremo atque etiam præcipue, vesica, cui maxime facultas inest urinam concoquendi, sicut & renibus attrahendi. Ex quo fit ut optima urina vesicæ quoque optime se habentis indicium primo sit, secundo renum, tertio sanguinis & vasorum quibus ipse continetur, quarto iecinoris, deinde vero ventriculi. Sic enim urinae concoctio procedit, nec potest subsequens præcedentis vitium omnino corrigere & abolere. Quamobrem si optima est hypostasis è vesica prodiens, omnibus in partibus optime factam esse concoctionem testatur, & proinde partium solidarum robur, vimque caloris nativi ostendit, sicut è contrario mala, partium solidarum & caloris imbecillitatem, à quo certum est omnia naturæ opera perfici. Ad hunc modum in mammis lac, in testibus semen, in abscessibus pus album euadit, ex continua vasorum, nervorum, ligamentorum, membranarum, cartilaginum, ossium & reliquarum solidarum partium quæ sunt in sede affecta, alteratione. Quo fit ut aptissime hypostasis puri comparetur, non quod illa puris modo computruerit in venis, aut aliquid omnino purulenti habeat, sed quod perinde atque pus alteretur, quodque iisdem notetur qualitatibus. Male enim si mihi videntur sentire, qui partem eam sanguinis quæ per febres putredine tetrata est, iam coctam lecretamque & à natura cum urinis depulsam, definiunt hypostasim esse. Quod si verum esset, oporteret profecto hypostasim eiusmodi non modo putredinis participem esse sed reuera pus esse, cum tamen sola maxime putredine pus ab hypostasi differre Galenus extremo primo comment. in prognost. annotauerit. Quod si in febrib. verum sit, quid iam dicetur de sanorum hypostasi, in quorum corpore nulla omnino putredo est? Sic fiet ut aliam necessario ratione materiamque hypostasis in sanis & in agris statuere oporteat, cum tamen nullo alio quam perfecta, debili vel deprauata concoctione differant. Itaque bona hypostasis nec pus est, nec aliquid purulentum, etiam si candore, æqualitate lauitateque, perinde atque pus, optima iudicetur. Ac de candore quid dictum est. æqualis autem ea dicitur quæ sibi omni ex parte similis existit, nec dissimilibus vllis partibus constare, hoc est, cuius partes omnes æque remues sunt & albæ. Sicut è contra in æqualis quæ tota similis non est, sed variis constat partibus, & consistencia coloreque dissidentibus. Lævis vero intelligitur quæ continua est nullaque ex parte diuisa, sed sibi vndique coheret, æquabili superficie. Sunt autem hæc omnia intelligenda de perfecta hypostasi, quæ talis euadit à robusto calore nativo. Ab his vero notis

quantum quæque recedit, tanto plus minusue calorem validum esse, & humorem vitiosum concoquere demonstrat. Est autem immensitas ea latitudo, inque ea innumerae particulares differentiae pro probitate concoctæ materiae vitioque non concoctæ existunt. In colore quidem hæc fere sunt, rubra, nigra, liquida, flaua: in consistentia, crassa, tenuis, maioribus vel minoribus portionibus inæqualis, adhæc *κρίνωδης, πεπλωδης, πτυρωδης*. Quas quidem tres postremas differentias hypostasis mala Hippocrates recenset. *κρίνωδης* autem dicitur quæ crassiori farinæ parti, quæ Græci *κρίμα* appellant, similis est. Talis fit vel vehementer vsto sanguine crassiore, vel carnibus inæqualiter cōtabescentibus, hoc est, parte sui tenera & molli in aquam liquata calore febrili parte vero duriore resiccata eorum in morem quæ in sartagine friguitur, atque per urinas excrera. *πεπλωδης* autem efficitur ab eadem quidem causa, sed vehementiore. Nam si febris tanta est ut non modo carnes, sed partes etiam solidæ inæqualiter colliquantur, tunc *πέπλις*, hoc est foliis vel laminis, similia subsident. Verum aliam etiam causam habere potest, nempe vesicæ erosionem & resolutionem, ut Gal. commet. aphor. 76. lib. 4. annotauit. Quod si etiam magis intēdatur calor, partesque solidas in tantum vrat & deficcet, ut iam non *πέπλις*, sed *πύρων*, hoc est furfurum, qui multo sunt propter maiorem resiccationem minores, speciem acquirant, *πυρωδης* appellatur. His autem tribus differentiis, ut Galenus scribit, aliam Hippocrates adiecit, *λεπλή και λευκή*, quam Gal. *πύσσω*, hoc est spumæ, comparat: non enim vllam habet crassitiem. Fit à spiritu flatuoso tenacius remisto humori excrementitio & semicocto.

*ῥ' ὁσσεως*. significat aliquando apud Hippocratem humorum statum & consistentiam siue cōcretionem, hoc est, cum humores intus manent quos vacuari oportebat, ut annotauit Galenus comment. 2. *εἰς τὸ πῶς ἔσσω*. Idem vero *εἰς τὸ κατ' ἰνερτίαν* scribit interpretes Hippocratis non de humidis, sed de siccis & de solidis animalis partibus subsidentiam nomen esse accipiendum contendere, qui subsidentiam quidem, suspensionem ac subleuationem vel partium, vel totius corporis, dici opinentur.

*ῥ' ὁσσεως*. dicitur ab Anatomicis, ut ait Rufus, *αἰδίου τὸ μὴ ἐκπερμεῖν*: hoc est, pudendi virilis pars ea quæ minime pendula est: quam alio nomine *ὀσσεωγον* vocari scribit. *ῥ' ὁσσεως* autem idem dici testatur partem eam pudendi quæ propendet: inde quod ei subest, *ὑπόσσεως* nuncupatur.

*ῥ' ὁσσεως*. est suffusio sanguinis in oculo ex ictu. species est *ῥ' ἐκ χυμώσεως*. Est autem cum ruptis aut contusis ex plaga vasis quæ in oculorum tunicis habentur, sed iis maxime quæ sunt in adnata membrana, sanguis sub eam subit. Ac primum quidem is rubet, postea vero liuēscit. Eorum qui sic affecti

sunt hoc vnum symptoma esse dicunt, quod quæcunque videant, rubra esse putent, vt Galenus lib. de sympto. causis annotauit, sed præsertim recentemalo: ob id etiam ab Archigene αιμαλωτα dictum esse putat. Sed tamē αιμαλω generalius dicitur quam αιμοσπρῆμα.

Υποθυμια. Placentarum generis est ex caseo, vel ouis, vel alio & cepis & oliuis præparatarum: inde ducto nomine quod reliquis cibariis adderentur & intererentur.

Υποπτι. significat nō solum reuerfionem, sed eam etiam quæ vicissim fit mutationem: vt cum dicitur υποπτιδιον υποπτι. Gal. in lexico Hippocratis.

Υποπυλα έλκη. dicuntur vlcera quæ sub cicatrice latent, nec extra vllum sui indicium præberit.

Υποπυλας. sic dictus est à quibusdam mandragoras albus qui & mas vocatur.

Υποχονδριακή μελαγχολία. vide μελαγχολία.

Υποχονδριον. appellatur tota illa corporis humani regio quæ à mucronata cartilagine vtrinque ad ilia vsque protenditur. Nominis ratio est quod υποτιν χονδριον έστι, hoc est, cartilagini subiacer, postque eam sit. Nec vero musculi tantum, sed & interna subiectaque illis viscera eo pariter nomine appellantur, quod sub notharum costarum cartilaginibus condita sint: itaque υποχονδριον ab hypochondrio non distinguitur. Galenus lib. 3. επί επιδημιών comment. 1. vbi Hippocrates hypochondrium simpliciter nominat, dextrum interpretatur propter excellentiam qua præstat alteri.

Υπύχμα. suffusio. Est crassi humoris in cornea membrana iuxta pupillam concretio: vel, est affusio humorum concrefcentium inter corneam tunicam & crystallinum humorem. Ea quidem sedes est humoris suffusionem committentis: ibi enim situs impedit ne crystallinus humor, qui solus à coloribus alteratur, res oculis obiectas præterquam seipsum admittat, simulque pupillam obscurat. Quia in re τὸ υποχύματος καὶ τὸ γλαυκώματος differentiam iuniores posuere dicentes τὸ υποχύμα non aliud esse quam humorem concretum illic, vbi diximus situm γλαυκώμα autem alterationem esse humoris crystallini in glaucum colorem à humiditate quadam intra ipsum contenta, cum tamen veteribus medicis idem esset vterque affectus: quanquam non eo tantum discrimine separentur, sed etiam quod omnes suffusione laborantes lucem videant aut multam aut paucam: qui vero γλαυκώμα, quique ἀμείωρον patiuntur, lucem omnino nullam cernant. Est autem suffusio duplex. vna proprie dicta, quæ est oculorum per se suffusorum morbus ab humore crasso pupillam obscurante: altera vero improprie, in qua oculi non primo & per se patiuntur, sed visa quædam visis proprie suffusorum similia repræsentant. Verum facilis distinctio est. Siquidem in proprie dicto

hypochymate visa alteri tantum oculo non vtrique simul per initia apparent, eaque in oculo perpetua sunt, etiam si cibos pauciores & euchymos æger sumplerit & probe coxerit, vel humorem aliquem ex stomacho vomitu aut deiectione reiecerit: præterea pupilla paucis admodum post initium visorum diebus euadit tenebrosa & impura, vel sub rhagoide, si pupillæ figura retinetur, vel supra rhagoidem, si vitata est. Quod vero improprie dicitur hypochyma, in oculis quidem accidit, sed per consensum aliarum partium, à quibus tres eius differentie produntur. Prima ab ore ventriculi est in quo biliosus humor redundat, à quo in oculos per sextæ coniugationis nervos sublatu vapor falsas quasdam visorum species producit. Verum visa ea vtrique oculo simul & eodē modo tunc apparent, propterea quod vapor ille biliosus à stomacho in cerebri ventriculos ascendit, & per neruum opticum intra oculū subit, visaque illa mentitur, præsertim quibus humor aqueus est exacte purus, aut visifica facultas facillime sentit. non tamen perpetuo visa illa oculis apparent, sed solum quando ventriculus male concoxerit, aut natura crisi per biliosum vomitum molitur. Pupilla autem per eiusmodi suffusiones nihil habet initio tenebrosam, sed multis etiam mensibus pura cernitur. Secunda suffusionis per consensum genitæ differentia est à cerebro, læsa deprauataque imaginatione (vt cum quis floccos vellit aut festucas carpit) vel cogitatione, vel vtraque simul. Id quod euenit per febrium ardētium vigorem & phrenitidem fumis ab vltio humore elatis, & per venas arteriasque in oculum cum spiritu visorio ductis, pupillamque opplentibus atque obtenebrantibus. Tertia est ex consensu cum toto corpore, vt in febribus, crisi instante, per sanguinis fluorem è naribus. Quo quidem tempore obscura visa non apparent, vt in futura per vomitum crisi, sed splendida quædam, & caligant oculi, aliaque permulta fiunt annorata ab Hippocrate lib. 3. prognost. & à Galeno explicata lib. 3. criseon. Sciendum autem est alias præterea duas esse summas suffusionis proprie dictæ differentias. Alia namque recens est & quæ nondum radices egit, alia vero confirmata est & ex toto concreuit: quas quomodo ab iniuicem distinguere oporteat, Paulus lib. 6. hūc in modum explicauit: Oculus suffusione tentatus cōcluditur, & palpebra magno digito ad oculum premitur, eique adducitur, simulque hac illac exprimitur, deinde oculo aperto perattente suffusionem contemplantur: in iis enim quibus humor nondum coaluit, fusio quædam ex digiti impressione oboritur, ac primum latior apparet, rursus in suam & figuram & magnitudinem recurrit. At in confirmatis suffusionibus, nulla immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impressura obuenit. Quoniam vero commune



mune hoc est signum & eorum in quibus modice & illorum in quibus supra modum humor cōcreuit, colore ipsas discernemus. Nam si ferri aut marinæ aquæ aut plumbi colorem suffusio habeat, moderate coaluit, & ad educationem idonea redditur: si vero gypso aut grandini similis color suffusionis est, supra quam par est concreuit.

**Υπερσπασμα**. asperiora. siquidem *ὑπερσπασμῶν* nomē & significatio vocabulo inest: inquit Gal. in lexico Hippocratis.

**Υπερσπασμα**. caliginosa, subobscura. ut refert Galen. in lexico Hippocr.

**Υπερσπασμα**. vide supra in *ὑπερσπασμῶν*.

**Υπερσπασμα**. significat apud Hippoc. lib. de fract. *χρονίαν μολίον πινός ὀφθαλμῶν*, hoc est, cum pars diu veluti supina iacuit, ut annotat Gal. cōment. 2.

**Υπερσπασμα**. sic potest dici id quod pertinet vel ad superhumeralē vel ad humerum, ut annotauit Gal. in lexico Hippocratis. In quibusdam codicib. sine diphthongo legitur *ὑπερσπασμα*.

**Υπερσπασμα**. sugillatio sub oculo. Species est echymomatis. Fit ex plaga sanguine sub oculum effuso. Contusus enim venulis sub cute tenuibus sanguis per fissuras sub cutem effunditur & in grumos primum coit, deinde liuet, tandemque nigrescit. Hic non oculi, sed potius faciei morbus est, & à Paulo lib. 3. inter faciei vitia relatus, quamuis nomen illi ab oculis inditū sit, quos Græci *ὀφθαλμῶν* vocant: perinde enim valet *ὑπερσπασμα*, ac si dicas *ὑπερσπασμα*, Iulius Pollux definit *ὑπερσπασμα* esse τὰ ὑποπινῶς ὀφθαλμῶν, ἢ πλινθῶν ἵχνη, hoc est, quæ sub oculis apparent percussionum vestigia. Differt *ὑπερσπασμα* à *ὑπερσπασμα*, quod hoc oculi sit vitium, illud vero palpebræ inferioris: in reliquis nihil fere discriminis.

**Υπερσπασμα**. dicta fuit à quibusdam eo nomine ὑπερσπασμα, ut habetur apud Dioscor. forte quod sugillationibus & contusionibus medeatur.

**Υπερσπασμα**. hyssopum. herba est pedali altitudine, fruticosa, folio cunilæ, floribus purpureis, thyrsos spicæ modo vestitiibus. hoc nomine Gallis nora est in condimentario vsu. calfacit & extenuat. Reperitur & ὑπερσπασμα.

**Υπερσπασμα**. medicamenti nomen est quod ex sordida lana præparatur, ut habetur apud Paulū lib. 7. cap. 17. quo loco omnes ὑπερσπασμα habent, cum tamen *ὀφθαλμῶν* legendum videatur. Qui error nō illicitantum admissus est, sed multis aliis locis apud authores tam Græcos quam Latinos.

**Υπερσπασμα**. vterus. vide *μύβα*.

**Υπερσπασμα**. secundæ. vide *χρῆμα*.

**Υπερσπασμα**. suffocatio vteri. vuluæ strangulatus. Est vuluæ ad superiora recursus, principalissimas partes in doloris consortium perducens: hoc est arterias quas vocant carotidas, ut & cerebri membranas. Cum enim vterus secundum omnes positionum differentias loco moveri possit, attamen nisi sursum feratur suffocationem non inducit. Nō

enim aliud suffocatio est quam respiratio-  
nis defectus. Itaque supperna artes respira-  
tioni inservientes affici necesse est, sursum-  
que ferri ab vtero suffocationis causam. Sūt  
autem inter omnes præcipue, cor, diaphrag-  
ma & cerebrum ad quas affectionis noxa  
peruenit: ad cor quidem per arterias, ad ce-  
brum vero & diaphragma, per spinæ mē-  
branas & nervos. Causa mali vterus humo-  
re aliquo aut semine vitioso aut putri refer-  
tus, retro, maligno, acri, mordaci aut frigido  
aliquo vapore nobiles partes offendēs. Cō-  
sequitur sic affectus, accessione quidem iam  
propinqua, torpor mentis, pigritia, crurum  
imbecillitas, pallor faciei, aspectus oleosus.  
Cum instat strangulatio, sopor gravis pre-  
mit quem cataphoram vocant, mens desi-  
pit, sensus intercipiuntur, vox perit, crura  
contrahuntur, malæ rubent, facies intume-  
scit. Pulsus parvus & debilis euadit, vel pe-  
nititus etiam aboletur. Aliquæ vero sine re-  
spiratione iacent, propter insignem refri-  
gerationem, à qua & spiratio & arteriarum  
pulsus sensu deprehendi non possunt. Sunt  
autem quæ aliis actionibus integris manen-  
tibus magnam respirationem habeant; id  
quod accidit cum illæso corde & stomacho  
causa morbi partes respirationi dicatas pul-  
monemque inuasit. Cum autem inclinat  
strangulatio, humiditas quædam è locis mu-  
liebribus prodit, ventris strepitus cietur, &  
ipse vterus paulatim laxatur, atque sic mens  
& sensus redit. Morbus hic p circuitus mo-  
uetur, sicut comitialis, hyemeque & autū-  
mno magis infestat iuueniculas ad Venerem  
proclives, steriles & infecundas præsertim  
ex medicamento, vel quibus vterus aliqua  
de causa refrigeratus est. viduas tamen po-  
tissimum infestare Galenus scribit lib. 6. de  
locis affectis, sed eas maxime quæ antea pro-  
be purgarentur ac parerent, atque virorum  
concubitu gauderent.


**Υπερσπασμα**. retardatio accessionis. Est mo-  
tus accessionis tardius, quam præcedens ac-  
cessio inuaserat, recurrens: vel, ut diffinit  
Gal. *ὀφθαλμῶν πρὸς τὴν μέμνην χρόνου*, id est a-  
liquid futuri temporis assumens. Hic vel  
morbi proprietatem, quam ἵσος appellant,  
consequitur, maxime quidem si proportio-  
nem per singulas accessiones seruauerit, vel  
declinationem (mitiori facto humoris fe-  
brem committentis feruore, cuius propriū  
est prompte & celeriter moveri) significat,  
si tardior multo fiat quam proportio prius  
seruata videatur exigere: vel si accessiones  
quæ tardare antea non solebant, tardari &  
subsequi cœperint. Hoc enim modo facta  
retardatio, declinationem morbi ostendit,  
sicut & accessionum anticipatio, quæ *με-  
μνην* πρὸς dicitur, incrementum: cum quo  
recte cōsentit Aphor. Hippocratis, quo do-  
cet longam fore febrem quæ eadem semper  
hora inuadit.

**Υπερσπασμα**. aqua inter cutem laborantes, ut expli-  
cat Gal. in lexico Hippocratis.

## IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

T O Φ.



**P**hagedæna. quandoque generis nomen est, & designat omnia vlcera quæ semper maiora & deteriora fiunt, cuiusmodi sunt Telephia & Chironia, simulq; subiectam carnem cum cute corrumpit, vt ab herpetibus phagedænæ distinguantur, qui summam tantum cutem infestant. Ea omnia vlcera *phagedænæ* appellantur ab antiquis. iuniores tamen (inquit Galenus comment. aphor. 45. libr. 6.) quædam vlcera speciatim *phagedæna* vocant, eamque ab aliis distinguunt. Est autem vlcus tumidum, profundum, vicinas partes erodens. Est enim in phagedæna vlceri tumor coniunctus, qui vlceris labra circumstat, eoque differt inter cætera *phagedæna*, quæ sine tumore exedit. Profundum autem est, hoc est, cum cute subiectam etiam carnem attingit, eoque ab herpete distinguitur, qui solius cutis exulceratio est. Id quia pergere pascendo ab ægris particulis ad eas quæ integræ sunt soleat, atque harum semper aliquid ægris adicere, *phagedæna* nomen sortitum est. Nascitur à bilioso humore vsto & ad melancholicum iam vergente, non tamen valde crasso, qualis cancerorum est, nec tam tenui quam est erysipelatum atque herpetum. hic copia sua vlceris ora replet & in tumore attollit, malignitate autem & acrimonia partes vicinas erodit. Nec vero oportet cum humorem putrere, sicut in *phagedæna*, quæ erosionem habet cum putredine coniunctam. Siquidem in phagedæna erosio contingit à maligna qualitate, non etiam à corruptione totius substantiæ.

Ab vlcere vt arbitror, translata *phagedæna* vox est ad stomachi affectum. Eo enim nomine *phagedæna* vocatur, hoc est appetentiam caninam, quidam appellant, cum stomachus vehementer appetens cibum immodice sumit, nec satiari vorando potest. De eo Plinius lib. 26. cap. 11. Phagedænis, inquit (quod nomen sine modo edentium est, & alias vlcerum) tithymalli medetur cum sesamis. Itaque aliquando distinctionis gratia vlcerum phagedænæ dicit. De hoc stomachi vitio legitur & apud Cælium Aurelium lib. 3. de morbis diuturnis: similiter apud Galenum comment. 3. in lib. 6. *phagedæna*, aphor. 37. his verbis: *πρὸς γὰρ μὲν πρὸς τὴν φάγεδαίναν τὰς τῶν πολλῶν βρωμάτων ἐκδοὰς, αὐτὴ καὶ αὐτὰς τὰς καλοχολίας γίνεσθαι ἀμέβους ὀρέξεις σπάνον. ὁμογενεῖται καὶ αὐτὴς ἡμῶν.*

hoc est, quidam igitur phagedænæ nomine intellexerunt multorum ciborum ingestionem, sed quam à maligno succo provenire, vt & appetentiam ciborum immodicam, etiam ipsi confitemur. Atque etiam in libello medicarum definitionum vbi scribit, *phagedæna* est, κατὰ τὴν κατὰ τὴν ὀρεξίαν τὴν πολλὴν βρωμάτων καὶ λαμβάνοντες ἀμέβους, οὐ κρατῶσιν αὐτῆς, αὐτὴ ἐκείνη τὴν πάλιν ὀρεξίαν. hoc est, Phagedæna dispositio est per quam multum cibum appetentes & sumentes immodicum ipsum non euincunt, sed eo sumpto rursus appetunt. De quo stomachi vitio vide *κατωδὴς ὀρέξης*.

*phagedæna*. transparentes in igne fiat vt in secundo de morbis mulierum. Galenus in lexico Hippocratis.

*phagedæna*. apparens. duobus modis dictum est apud veteres Philosophos: vnum, quod sensu aliquo noscitur, vt album, nigrum, durum, molle, calidum, frigidum: alterum inde demonstrabile, ex eorum videlicet numero quæ intelligentiæ primo occursum patent: veluti, quæ eidem sunt æqualia, ea etiā inter se esse æqualia: & si æqualibus æqualia adduntur, tota etiam æqualia fieri: & quod nihil citra causam fiat: & quod ex eo quod omnino non sit nihil fiat: aliaque id genus non pauca. Non sic autem Empirici, qui *phagedæna* ea tantum dicunt, quæ sub sensum cadunt, γινώσκοντες vero quæ memoria tenentur. *phagedæna* vero simul & γινώσκοντες quæ & ante aliquando sub sensum venerunt, & nunc simili modo veniunt. Methodici vero, vt scripsit Galenus lib. de optima secta, *phagedæna* appellant, non vt sensu perceptibile, sed quod ex seipso percipitur, etiam si sub sensum non veniat.

*phagedæna*. fuscum. dicitur quod colore inter rubrum & nigrum medio est, quem, cum in corporis partibus sæpe incidat, plurimi medicorum *phagedæna*, hoc est liuidum, vocant, vt scribit Galenus lib. 14. meth. med. Idem vero lib. 1. de sympt. causis fuscum fieri dicit ex albo & nigro simul mistis, quemadmodum & medii omnes colores fiunt. Vtraque quidem sententia vera est, sed illa fuscæ coloris generationem magis propriè designat. Is visum languidum & dissipatum mire reficit, ideoque pictores subinde eum intuentur, quo oculos recreant & cõfirmant. In hominum corporibus aliquando à contusione, interdum à caloris natui extinctione, sæpius ab humore melancholico provenit.

*phagedæna*. id est fuscum, Appellatur collyrium cuius compositio varia est apud medicos. Ipsum enim aliter Galen. ex Asclepiade, ex

Orbasio Actius; Paulus, & Scribonius Largus describunt.

**Φακία ἀγρία.** lens sylvarica. lentis palustris genus non in aqua, sed dilutis & viginosis nascentes, carens folio.

**Φακίη.** lenticula. **Φακίς** enim lentem significat.

**Φακιοειδής ὄζον.** sic dicitur crystallinus oculi humor, ut scribit Aetius lib. 7. à figurâ. Est enim lenti similis, rotundus quidem sed oblongus. Idem author est etiam **δισημίδης** à quibusdam vocari. vide **κρυσταλλοειδής**. Significat & **φακιοειδής** idem quod **φακίωτης**, hoc est lenticulatum, de quo infra.

**Φακοπισσίονη.** edulium est ex lente & prifana cōcinnatum, ita tamē ut plus lentis quam prifana habeat, quod hæc valde intumescat, illa autem minimum. Coquitur eodem quo prifana modo, nisi quod saturēia & pulegium induntur, quo & suavior & concoctu facilius reddatur: prifana enim anetho porroque solo contenta est. Sapæ mitione in respuit: quod sic magis incrasset atque obstruat. Amat autem suillam recens sale conditam, siue suauitatem siue concoctionis facilitatem spectes. Verumtamen nulla arte fieri potest, quin & obstruat & melancholicum succum gignat.

**Φακίωτης.** lenticulatum, siue in lentis modum cōformatum, ut apud Hippocratem **φακίωτης πυελίτης**, vas in lenticulæ similitudinem factum, quo ad ignem calente, vel aqua aut oleo calidis pleno foras fiunt. Latine vaporarium lenticulatum dicere possis. quamquam non solum **φακίωτης** fomenta fuisse dicta, sed etiam **φακίωτης** substantiue, id est (ut Celsus dixit) lenticulas, Galenus ostendit in glossis Hippocraticis, his verbis: **ἀποκίς, κρομμύς, οὐκὶ καὶ πυελίτης καὶ φακίς ὀνομάζονται.** id est utres appellat tegulas, quas etiam lateres & lenticulas vocant, nisi apud Galenum eo loco legendum sit **πυελίς φακίωτης**, id est fomenta lenticulata.

Dicitur & **φακίωτης** de scalpri quodam genere, quod & **φακιοειδής** Galenus appellat lib. 6. methodi medendi. Habet enim in imo lenticulæ speciem, atque hanc hebetem, in longitudinem vero aciem acutam, eoque chirurgus utitur, cum vel cauo scalpri os excidens, vel forcipe quod valde comminutū est attollens, aut conuertēs, aditum facit per quem lenticula immitatur. Hanc enim super cerebri membranā collocat, sic ut latera sui parte ipsam attingat, deinde malleolo scalprium ferit. quo fit ut membrana intumescat, ut ferueretur, cum protegatur à lenticula, quæ in excidendo præit, & membranā sicubi adhæret, ab osse innocentē resoluūt: acies vero scalpri, quam esse in longitudinem diximus, ipsam insequitur.

**Φάλαγγις.** internodia digitorum. Sic dicuntur digitorum ossa terna, mutuo colligata & ordine sibi succedentia, & velut in acie disposita. Ac quamvis **φάλαγξ** agmen militum significet & non singulos milites, di-

gitorum tamen singula ossa à medicis **φάλαγγες** appellantur, ut cum Galenus primam pollicis phalangem nominat, scribitque priorem semper phalangem subire in cauitatem suam in principio sequentis phalangis. Ratione eadem etiam **συνταλίδες** vocantur. Sunt etiam qui phalangis nomine metacarpi ossa comprehendant, ordine etiam eodem velut in acie constituta, quo ossa digitorum.

**Φαλαγγίον.** herba est ramulis duobus vel tribus pluribusve in diuersa tendentibus, flore candido, lilio similis, multas incisuras habens: semine nigro, lato ad lenticulæ dimidiatæ figuram multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. Facultatis est tenuium partium & desiccantis. Sic dicta est quod demorsis à phalangio auxilietur. Dicitur alio nomine **φάλαγγις**.

**Φαλαγγίσις.** Oculi affectio est, inquit Paulus, cum cilium intro spectat, pilorum acie simul cum eo inuersa. Sic enim pili oculum compungunt. Aetius vero ex Seuero scribit **φάλαγγισον** dici palpebrarum **χάλασιν**, cum videlicet illæ relaxatæ, aut earum extremitas intro vergit, ut pili inde non facile appareant, nisi quis distendar ac dispartet palpebras: scribitque eam affectionem **πλωσιν** etiam vocari, & differre **ἀπὸ τῆς διατρίχσεως**, quod in hac noui & non naturales pili succrescant, in illa soli naturales pili sint, qui inuersi negotium oculo facessunt. Paulus vero lib. 6. videtur palpebrarum relaxationem alium à phalangosi affectum statuere. Tamen Galenus **ὡς τῇ εἰσατρίχῃ** definiens phalangosim esse, cum pilorum subnascensium duplex triplexve acies in inferiore aut superiore palpebra prouenit, eandem prorsus facit cum distichiasi, manifesto errore. Species enim **τῆς περὶ τῆς αὐτῆς ἢ φάλαγγεως**, ut & **ἡ διατρίχσεως**. Dicitur enim **περὶ τῆς αὐτῆς** noxa oculi à pilis proueniens: ea autem contingit duobus modis, vel nouis pilis exorientibus, vel naturalibus pilis in bulbum (sic enim eo loco Paulus vocat ipsum oculi globum bulbi modo tunicatum & capillarum) conuersis: utroque enim modo contingit oculum pungi & male habere. Dicitur hic affectus **ἀπὸ τῆς αὐτῆς περὶ τῆς αὐτῆς φάλαγγεως**, hoc est à pilorum acie.

**Φαλακρόν.** vocatur ab Hippocr. ferramentum quod est in extremo rotundum, cuiusmodi sunt capitulara illa quibus ad alas chirurgi utuntur, quæ **πύρωνα** & **διπύρωνα** nuncupant, atque item spathæ capitularæ. Quæ vero his contraria sunt & oblonga, **περὶ μύκην** ab eo appellantur, quorum extremitas non est rotunda sed acuta, illis quodammodo similis quæ ad perforandum accommodantur. Annotat Gal. comm. i. **εἰς τὴν πύρωνα**. Gal. in lexico Hippoc. **φαλακρόν** interpretatur rotundum cum leuitate.

**Φαλακρόσις.** caluitium, seu caluities. Est defluuium pilorum capitis propter humoris penur-

riam. Nam cum duabus de causis pili decidere soleat, scilicet vitio humoris pilos corrumpentis, & alimentii defectu, à priori quidem causa *ῥαλακρωσις καὶ ἀλακρωσις*, ab altera *φάλακρσις* prouenit. Deficit autem pilis alimentum propter siccitatem cerebri, quæ vel à senio est, vel maturius etiam accidit propter calidum & siccum hominis temperamentum. Eam ob causam Hippocrates scripsit mulieres & eunuchos non fieri caluos, quia natura humidiores sint. Fiunt autem calui homines à sincipite magis, cum senescunt, quoniam illud omnium capitis partium est siccissimum. hæret enim cutis illic ossi nudo. verum Hippocrates caluitiem oriri dicit à cerebri consumptione lib. 6. *ἡ δὲ βλάβη μὲν ἐστὶν*, id quod Galenus comment. in eum librum tertio explicans scribit ætatis cursu cerebrum siccari & seipso minus euadere, potissime parte capitis anteriore quam *βρέγμα* appellant, & sic ab ea parte recedere, atque inde fieri ut ea destituta cerebri humiditate siccior euadat, neque ut ante, pilis alimentum subministret. Cæterum quamvis proprie *φάλακρσις* de capite intelligatur, sunt tamen qui ad mentum etiam pertinere dicant, inter quos est introductorii seu medici author. At si rem diligentius consideremus de mento improprie *φάλακρσις* dici videbitur, ex quo non nisi vitio humoris defluere pili solent, cum illa propter solam, ut Galen. ait, alimentii penuriam eueniat. vide scholium 39. quod nos in librum Hippocratis de natura pueri scripsimus.

*Φάλακρσις*. cauliculos emittit & culmis similes, à minutis & nullius usus radicibus, multos, dum palmarum geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milii magnitudine. Galenus *φάλακρσις* vocat, nisi mendosus est codex, aitque tum semen tum succum tum folia potu auxiliari vesicæ doloribus, seu in se habeant quiddam tenuium partium & calidum.

*Φαρίον*. hoc est lampas seu facula. Medicamenti compositi nomen est, duplex eo nomine inscriptum. Vnum Neapolitæ ad maximas epiphoras & doloris molestias. Alterum autem Serapiacum dictum. Describuntur à Galen. lib. 4. *κῆρ τόποις*.

*Φαρίον*, ut legitur apud Athenæum, vel

*Φαρίον*, ut scriptum inuenitur apud Nicandrum, Dioscoridem, & Plinium, est veneni deleterii genus, verum quid sit non certo constat. Nulli enim eorum qui de venenis scripsere, de eo quicquam præter veneni sumpti notas & curationes tradiderunt. De hoc modo constat ex procæmio Dioscoridis in librum sextum, arborem, fruticem, aut herbam esse. in horum enim censu ab eo reponitur. Nec Galenus ipse quid sit docet, sed ipsum inter simplicia venena lib. 2. *ἡ ἀντιδότης* enumerat. Quidam existimauere nardi speciem esse aut aliquid in nardo nascens, præterea quod *τὸ φάρικον* nardum respere dicatur, quodque nonnihil veneni vi-

cem gerens in nardo gigni scriptum legent, ex quo pilon illud vulgo nuncupatum, tamque celebre ut iam omnia venenorum genera vno eius nomine apud Gallos designetur, Indi consiciant, exitiale non potu modo sed & in sudore corporibus admotum. Quorum quidem opinioni non reclamatur quod *τὸ φάρικον* nardum aut nardi spicas aduersari Nicander prodiderit. Multa namque & venenū & suas secū antidotos ferunt.

*Φάρικον δὲ*, hoc est *ῥυτίδων*, rugosum. ut interpretatur Gal. in lexico Hippoc.

*Φαρμακίον*. usurpatur sepe ab Hippoc. *αὐτὸ ἐκασταίρεν*, quod est medicamentum purgare, ut Gal. prodidit comment. 2. in prorrhet.

*Φαρμακοντικόν*, pars est *τῆς θεραπευτικῆς*, quæ medicamentis intro sumptis forisque admotis medetur.

*Φαρμακίτις ἡ*, eadem est quæ & *ἀμπικίτις ἡ*, de qua vide suo loco.

*Φάρυγξ*. sic dictum est os hyoides, ut scribit Galenus, quod sit portio maxima pharyngis. vide *ὑοειδές*. Reperitur tamen apud Galenum in Isagoge pro pharynge dici. & Hippocrates initio fragmenti *ἀπὸ ἀντιπνεύματος* usurpat.

*Φάρυγξ*, duo significat, fauces & asperam arteriam. Fauces dico regionem intra os, ubi tum gulæ tum asperæ arteriæ extrema concurrunt. Grammatici genere distinguunt, ut *ἡ φάρυγξ* proprie dictam pharyngem, id est fauces, significet (hæc autem est *ἡ τῆς λάρυγγος περιεμένη εὐρυχωρία*, hoc est, amplum illud spatium inter laryngem gulamque medium) sed *ὁ φάρυγξ* genere masculino laryngem, quod est asperæ arteriæ summum, vel ipsa arteria. *ἀπὸ τῆς φάρυγγος*, fauces significante, Hippocrates dixit in Prognost. *φάρυγξ ἐλκευμένη σὺν πυρετῇ θνήσκει*, hoc est, fauces ulceratæ cum febre, malum. quem locum exponens Galenus, ait: *ὅτι φάρυγξ τὴν περιεμένην χύσσει τομάχου τε καὶ λάρυγγος ὀνόμαζε, δηλονότι*, hoc est, quod pharyngem intelligat spatium illud positum ante stomachum & laryngem, manifestum est. Et rursus, *καλὴ δὲ φάρυγξ τὴν ἐν τῇ θλάσει τὸ σῶμα καὶ πλεονα τὴν γλῶττιν, κατὰ φαρμακίον εὐρυχωρίαν, ὅτι τὰ δύο σωματὰ ἐστὶν, τὸ πρὸ τομάχου καὶ τὸ τῆς λάρυγγος*, hoc est, appellat autem pharyngem latum illud spatium quod, dum aperitur os & deprimitur lingua, inferius apparet, ubi gemina ora sunt, videlicet stomachi & laryngis. Verum tamen pro summo arteriæ capite aut ipsa etiam arteria indifferenter utroque genere usurpari reperies, ut apud Galenum lib. 2. de placitis Hippocr. & Platonis, *τὸ μὲν δὲ τῆς τραχείας ἀρτηρίας, ὑπὲρ δὲ καὶ φάρυγγα περιπαρῶν μόνον*, hoc est, caput enim asperæ arteriæ, quam etiam pharyngem appellamus. Et lib. 8. de usu partium, *καὶ τῆς περὶ τὴν ἐκ κυρτώσεως ὀργάνου τῆς φωνῆς, ὡς λάρυγξ ὀνόμαζε, αὐτὰ πέρα δὲ τῆς τραχείας ἀρτηρίας, ἢ δὲ καὶ φάρυγγα καλοῦσιν ὁμωνύμως, τῇ περὶ τῆς λάρυγγος*, hoc est, primum quidē & præcipuum instrumentū vocis, cui larynx nomen, summa extremitas est asperæ arteriæ: quam quidem

dem & pharyngem appellant, nomine con-  
simili & eadē significatione qua & id quod  
præcedit laryngē. Praxagoras etiam ἐν τῇ αἰα-  
πμῇ, vt testatur schol. Homeri, sic scriptum  
reliquit: ἐστὶ δὲ ὁ μὲν φάρυγξ ἐκ τοῦ ἐμπεσέειν, ὁ δὲ στόμα-  
χος ἐκ τοῦ ἐπιπίου· καὶ ὁ μὲν φάρυγξ ἐμφύεται εἰς τὸν  
πνεύμονα, ὁ δὲ στόμαχος εἰς τὸν καλάρην. hoc est, Pha-  
ryn timer quidem est ab anteriore parte, stoma-  
chus autē à posteriore: & pharynx quidem  
inseritur in pulmonē, stomachus autem in  
ventrem. Ex quib. liquido apparet φάρυγξ, p  
laryngē & aspera arteria sumi. Quod autem  
sic appelletur, partium, vt opinor, vicinitas  
effecit. Aristoteles vero lib. 3. Ethicorum  
φάρυγξ collum vel potius œsophagum ap-  
pellauit his verbis: διὸ καὶ ἡ ἕλκωσις τοῦ Φιλόξενος ἐ-  
ρίχθης, ὁ ἰσφάγος αὖν, τὸν φάρυγξ αὐτοῦ μακρότερον γε-  
γένηναι φησὶ, hoc est, quamobrē optauit qui-  
dam Philoxenus Erixius, quod helluo esset,  
pharyngem sibi esse grue maiorem. Item A-  
thenæus, οὗτος ἡλκατὸ πτερεῖον τὸν φάρυγξ  
χεῖν. hoc est, ille optauit vt haberet collum  
gruis. quo loco aduerte foeminino genere  
dici quot Aristor. masculino dixerat. Præ-  
terea Oribasius docet φάρυγξ apud Hippoc.  
aphor. 15. sect. 2. labia, palatum & vnam si-  
gnificare, alii vero glandulosa omnia circa  
fauces corpora.

Φάρυγξ. dicitur à nonnullis ὁ ἀσπιδόσ, vt ha-  
betur apud Dioscor. dicitur & à quibusdam  
τὸ ἔριον, vt idem author est.

Φατρία. dicuntur ossa dentes continentia, vt scri-  
bit Gal. lib. de ossib. Rufus autē in partium  
hominis onomasia definit esse cavitates in  
quas dentes infixi sunt, atque alio nomine  
ὀδοντοκλεις dicit vocari. Verum Galen. loco ci-  
tato dicit dentes contineri ἐν τοῖς τῷ φατρίαν το-  
θρίοις, scribitque φατρία ossa esse dentes conti-  
nentia, βοθρία vero cavitates in quas dentes  
inerti sunt. ex quo patet vel easdem vel val-  
de affines esse istas voces. Apud Rufum et-  
iam φατρίαν legimus: apud Pollucem & φα-  
τρίαν & φατρίαν.

Φαῦλον. apud veteres Græcos non solum fig-  
nificat vitium, sed etiam simplex. vnde &  
Hippocrates libro de fractur. dixit κατὰ τὴν  
φαῦλον τήν, id est extensionem simplicio-  
rem & quæ non magno negotio perficitur,  
vt Galenus annotauit. Vocat & multis in  
locis Hippocrates φαῦλον διαίτην, eodem au-  
thore, victus rationem quæ exquisitæ con-  
traria est.

Φαῖος. proprie quidem ab igne in æturibus  
exorientes circuli rubri. abulue autem et-  
iam reliqui circuli, vt explicat Gal. in lexico  
Hippocr.

Φαυσινοὶ προχέοντες. sunt pastilli admodum acres  
& exedentes, qui vel maximas carniū ex-  
crescentias ad vsque penitiōra adurunt,  
crustisque obducunt. Descriptio habetur  
apud Paulum lib. 7. cap. 12. & apud Actium  
lib. 9. cap. 49.

Φέλιον. vide φέλιον.

Φελιδόριον. herba est nascens in palustribus, fo-  
lio apii. nec de eo veteribus quicquam aliud

proditum intuenio. nisi forte vera sit eorum  
sententia qui idem esse cum eleosclino ex-  
istimant.

Φελιδόριον. quidam φῶν τὸ φελιδό, hoc est pro sube-  
re, accipiunt.

Φελός. suber. arbor est caudicosa, parumque ra-  
migerā, admodum procera, auctuque insi-  
gnis, ligno robusto, cortice vnice crasso, fo-  
lito dirumpi, fraxini folio, sed oblongiore,  
perpetuo virenti. fructu glandoso, nec aquif-  
olia glandi longe dissimili. Ex eo fit trochi-  
scus dysentericis conueniens qui describi-  
tur ab Actio lib. 9.

Φέρεται. Exest, consumit, vt interpretatur Gal.  
in lexico Hippocr.

Φέρομενον. sic dicitur à quibusdam ὁ οἶνος ἀγχιός,  
vt habetur apud Diosc.

Φηδός. fagus. arbor est quæ quercus generi assi-  
gnatur, & cui simile munus obit, vt prodi-  
dit Diosc.

Φημός. est medicamentum Martiano auctore.  
Refertur ab Actio cap. de cōmunibus reme-  
diis dysentericorum quæ supernè exhiben-  
tur. lib. 9.

Φηρεα. habetur ea vox apud Hipp. l. 6. τὸ φη-  
ρημα. significat autem, vt ait Gal. comm. 3.  
neruorum tumores & tensiones oblongio-  
res, præsertim autem sub auribus. sic autem  
nominauit à Satyris, quos Iones φηρεας vo-  
cant, & pingunt finguntque habere oblon-  
gas qualdam eminentias in auribus. Sunt  
autem qui φηρὰ τὸ φηρὸν deriuant, quod ἐν ταῖς  
φηραῖς (est autem ciuitas in Peloponneso) tu-  
mores ii frequentes sunt. Sunt etiā qui φηρεας  
scribāt φηρὰ τὸ φηρὸν, quæ ciuitas est Thessaliæ.

Φηρὰ τὸ φηρὸν. vide φηρὰ τὸ φηρὸν.

Φηλαίος. pedicularis morbus. Est in quo pedi-  
culi acerrimè per cutē erumpunt. Is & toti  
corpori & singulis partibus accidere potest.  
Pediculi autē, vt scripto prodidit Gal. l. 1. τὸ  
φηλαίον, prodeunt ex multis humoribus, ca-  
lidis quidem, sed non vsque adeo vt acres  
ichores. Gignuntur vero non in superficie  
cutis, vt furfures, sed in eius profundo, ideo-  
que medicamentis indigent valde exiccanti-  
bus, & quæ ex alto trahere possunt.

Φηνός. significat apud Hippocr. colliquefit, at-  
tenuatur, minuitur, non nutritur. vt explicat  
Gal. in lexico Hippocr.

Φηνός. autumnus. Est tempus anni inclinā-  
tis maxime in æquale Arcturo oriente in-  
cipiens, & Vergiliarum occasu definens.  
Nam cum annus, vt & reliqua fere omnia,  
quatuor temporum differentis quasi æta-  
tibus constet, qualis in hominum vita est  
ætas ἀσθενεστικῆ, hoc est inclinans, talis in  
anno autumnus est, æstati, quæ anni vere  
vigor est, succedens. Est enim inter æsta-  
tem atque hyemem medius, nō ordine qui-  
dem tantum, sed etiam temperie. Etenim vt  
quàm æstas minus calidus, sic vtique quam  
hyems minus frigidus est. Quare hac ratio-  
ne nec calidus absoluto sermone est, nec  
frigidus, quippe cum ambo sit, ac neutrum  
ad summum. Similiter de reliquis duabus



qualitatibus, humiditate & siccitate statuen-  
dum. Itaque non recte frigidus siccusque  
dicitur. Non enim frigidus est, si ipse per se  
spectetur, ut hyems est, sed ubi cum æstate  
confertur, utique illa frigidior. Sed nec æ-  
quabiliter temperatus est sicut ver, imo in  
hoc maxime à vere dissidet, quod mediam  
temperiem & æqualitatem quam ver ha-  
bet, perpetuo parem non seruat. Quippe  
meridie multo est calidior quam mane, aut  
vesperi. Nec vero in humido & sicco medi-  
um omnino statum obtinet, quemadmodum  
& ver, sed ad siccius deurgit. Ab æstate ve-  
ro etiam in hoc vincitur, non tamen tanto  
intervallo quanto in calore. Itaque nec au-  
tumnus absoluto sermone citraque excep-  
tionē frigidus & siccus est, cum neutrum  
ad summum sit, sed vincat in eo siccitas hu-  
miditatem. Qua quidem ratione merito  
siccus appelletur. In calore vero & frigore  
mixtus quodammodo ex ambobus est & in-  
æqualis. Ceterum ea inæqualitas non mo-  
do toto eius curriculo spectatur, sed vno et-  
iam die, quo eodem nunc calor nos afficit,  
nunc frigus vrget. Atque ea inæqualis tem-  
peries & inconstantia in causa est cur maxi-  
me autumnus morbiferus sit, & morbos si-  
militer inconstantes & *δυσκρίτους* gignat. Siqui-  
dem ut ipse inæqualis est, sic humores in-  
æquabiliter temperatos producit, nulli cer-  
ta legi addictos. Bilis atræ in eo maximus  
præuentus est, non illius quidem quæ sim-  
pliciter inter humores frigida siccaque est,  
sed quæ perinde ut ille inæqualis est in frigo-  
re & calore, & in qua siccitas superat humi-  
ditatem. Est autem veri maxime contrarius  
non tantum temperamenti inæqualitate,  
verum etiam insalubritate, & reliquis effe-  
ctis, sic ut quos morbos eorum alterum ex-  
citarit, alterum dissoluat. Totum autumnus  
tempus duorum mensium esse multis in lo-  
cis Galenus prædixit. Arcturi enim ortus se-  
cundo fere Septembris die paulo ante æqui-  
noctium contingit. Vergiliæ autem occidit  
quinto vel sexto Novembris die, cum sol suo  
cursu ad vigesimam secundam vel tertiam  
Scorpii partem deuenierit: tunc enim sol di-  
recte Vergiliis opponitur, quinquagesimo  
circiter die, ut scribit Galenus, post æquino-  
ctium. Sed licet, uti & reliqua tempora, in  
duas treiseve portiones secare, differentes  
etiam non nihil temperamento, prout ma-  
gis vel minus ab æstate recedunt & ad hye-  
mem accedunt. Videretur autem autumnus à  
Græcis dictus *φθινόπωρον*, quod desinente τὸ  
ὀπώρην (sic autem appellatur postrema pars  
æstatis) incipiat: *φθίνω* enim desinere signifi-  
cat, qua ratione etiam quidam *μετέωρον* eum  
vocant, quasi τὸ μετὰ τὸ ὀπώρην.

*φθισίς*, qui iam phthisi correptus est & conta-  
buit. quanquam non eum modo Hippocr.  
ita appellat, sed qui quauis ob causam te-  
nuis & macilentus euaserit: ut Galen. com-  
ment. 2. in lib. 1. *τῆς φθισίδος*, annotauit. Vete-  
res vero medici, ut idem scripsit comment. 1.

eiusdem libri, eum etiam ita vocarunt, qui ad  
phthisim natura procliuus est, ut quæ tam an-  
gusto adstrictoque thorace est, ut ætergo o-  
perta scopula instar alarum promineant: unde  
*ἀπὸ τῶν ἀλῶν*, hoc est alarum, nominantur. Præ-  
terea cui caput facile impletur, quodque re-  
spiratoriis organis multas destillationes de-  
mittit. Nam si hæc duo simul coeant, tho-  
racis figura & capitis imbecillitas, eius-  
modi natura, tibi valde obnoxia est. Vide  
*φθισίς*.

*φθίνω*. Generaliter quidem dicitur omnis exte-  
nuatio, & rei cuiuslibet imminutio, ut apud  
Hippocr. lib. de nat. hum. *ἀπὸ τῆς φθίνου*  
*δὲ αἵματος* & *ἐκ τῆς φθίνου* & *ἐκ τῆς φθίνου*. Ve-  
rum medici ad certum morbi genus eā vo-  
cem reuocarunt, qui tabes Latinis dicitur.  
Est autem extenuatio totius corporis cum  
febre parua propter pulmonis vlcera infan-  
nabilia. Vel, est pulmonis exulceratio fe-  
brem parua & totius corporis extenuatio-  
nem inducens, utroque modo apud Galen.  
definiri comperio. Si nominis rationē spe-  
ctemus, extenuatio est, quod *φθίνω* τὸ πρὸς  
φθίνω dicatur. Sed cum plarique morbi à sym-  
ptomate nomina sortiti sint, ea dici potest  
pulmonis exulceratio esse. Et reuera *φθίνω*  
pulmonis affectio est, quæ si non sit exul-  
ceratio, certe eam omnino comitē habet, &  
tātam ut qui ea laborat, *σκαλεῖν*, potius quam  
homo videatur, colliquatis absumptisque  
non modo carnibus, sed solidis etiam parti-  
bus supra modum reficcatis. Crebra enim  
desudationes, aliusque persape liquidior  
humorem omnem exhauriūt, ipsaque len-  
ta febris qua nulli phthisici vacant, corpus  
paulatim absunt. Est autem ea omnino  
putris, & symptomatice, ut quæ nascatur ab  
ulcere pulmonum purulento & putri, cor-  
di admodum vicino, estque de genere, ut scri-  
bit Galenus in Aphor. 12. libro 1. febris  
quotidiana, nocturneque magis quam inter-  
diu affligit. Hæc quidem proprie dicta *φθί-  
σις* est, quamque proprio vocabulo Græci &  
præsertim Athenienses *φθίσιν* appellant. Im-  
proprie autem dicta *φθίνω* est, cum corpus si-  
ne pulmonis ulcere extenuatur, à calida &  
sicca pulmonum intemperie aut febre eius-  
dem hectica, quam se aliquando vidisse Ga-  
lenus memorie prædixit, nos autem sæpe  
vidimus.

*φθίνω*. dicitur etiam pupillæ affectus, cum  
ea angustior, hebetior, obscurior, rugosior  
que euasit. Tunc autem maiora quam sint  
apparent ea quæ videntur, propter pupillæ  
angustiam. Causa huius mali densatio est,  
quam siccitas potius quam quidvis aliud  
parit. Differt τὸ πρὸς τῆς φθισίδος, (quod reuera nō  
est aliud quam oculorum imminutio ab a-  
limenti penuria) quod hæc oculi totius, *φθί-  
σις* autem pupillæ tantum sit.

*φθίνω*. proprie dicitur à Græcis & præsertim A-  
theniensibus quam omnes medici *φθίνω* ap-  
pellant, ut scribit Galen.

*φθίσις*. pastillus. Galen. enim in lexico suo *φθίσις*  
inter-

interpretatur *Εχέσποις*. Apud Aristophanem quoque placentē genus est. Inde *Φείσποις* per diminutionem legimus apud Hippocr. rursus lib. 1. de muliebrib. morb.

*Φοβία* dicuntur medicamenta quæ valent ad abigēdos ex utero fetus seu viuos seu mortuos. alio nomine *οφβία* appellantur, *ὅτι φοβάνται*, hoc est ab eiciendo.

*Φοροποιόν φάρμακον*. corrumpens medicamentū. vide *διηγησιον*.

*Φιάρλι*, id est *λαμπρόν* *ὑγρόν*, splendentē ob humiditatem, ut scribit Gal. in lexico Hipp.

*Φιβάλιος*. est genus fici, apud Hippocr. ut scribit Galen. in suo lexico.

*Φιλαγάρων*. nomen est malagmatis, cuius descriptio habetur apud Paulū lib. 7. cap. 18.

*Φιλάδελφος*. fruticis genus est quod in Parthis nascitur adit Apollodorus, sic dictum quod rami eius ex intervallo sponte coeant. ceu animantes, post digrediantur, concipiant & pariant. Ex cuius tenuissimis virgis reticulatim compositis atque ita confitis hortorum septa impenetrabili compage fieri scribit.

*Φιλαίθρωπος*. dicitur *ἡ ἀπαείνη*, quia velut amici folent, sua renaci asperitate commecantium laciniis obhæreat. Eam ob rem officinis & herbariis vocatur aspergula, licet rectius asperulam dicerent.

*Φιλαιρίων*. dicitur *ἡ ἀπαείνη* ab Hipp. ut Galenus putat, eandem ob causam quæ & *φιλαίθρωπος* nuncupata fuit, quasi *φιλοδοσῶν* *πρὸς ἐπείρους*, quod sodales & amicos diligat. Sic etiam dictam fuisse à quibusdam *πρὸς πολέμους*, Dioscorides author est.

*Φιλίππου ἔγχυστος*. est pastillus aduersus dysenteriam valens, cuius descriptio habetur apud Paulum lib. 7. cap. 12.

*Φυσιον*. dicitur ab Hippocr. *ἡ ἀπαείνη*, ut Galen. putat *ἐν τῇ φύσει* *ἔχοντος*, deriuato *φύσις* vocabulo. Namque sua renaci asperitate commecantium vestibus & laciniis adhærere solet: *ἵστα* namq; apud Ionas idem quod *ἵστα* siue vestis, est.

*Φυλέρια*. arbor est ligustri magnitudine, foliis oleæ nigrioribus & latioribus, fructu lentiscoli, nigro, subdulci, & racematim coherēte. nascitur asperis. Adstringit. Diuersa est *ὅτι πρὸς φύλεις*, quam tiliam plerique interpretantur, ut prodidit Matthiopolus.

*Φυλοκώλη*. nomen est emplastri, cuius compositio habetur apud Paulum l. 7. c. 17.

*Φυλοράτης ἐμπλαστος*. describitur à Cello l. 5. c. 19.

*Φυλοτόφου ἐμπλαστος*. emplastrum est ad calcitratus vulneraque tumida. Rumpit enim ea, pulsque mouet, & cicatricem inducit. Describitur ab Aetio terr. 4. sem. 3. cap. 24.

*Φυλοφυλον*. dicitur à quibusdam *ἡ ἀπαείνη*, ut habetur apud Diof.

*Φυλόδης*. dictus est à quibusdam *ὁ ἀπαείνης*, ut author est Diof. & Apuleius.

*Φιάλη*. dicitur à nonnullis *ὁ* nomine cauitas quæ superiori labro inest, vallecule similis, quæ non illepide à quibusdam Latinis lacuna nominatur.

*Φιλανον*. medicamentum est anodynum, omnium eius generis celeberrimum, si quis eo commode vtatur. Eo autem vti oportet in maximis doloribus, in calidis fluxionibus, & robustis ægri viribus, non recenti quidē, sed post tempus compositionis annum, aut saltem semestrem. Quod si duorum triumve aut quatuor annorum sit, multo sane est melius, sed nec inutile tamen sequentibus annis ad decimū vsque, ut docet Gal. l. 12. meth. med. Sic dictum est à Philone Tarsensi philosopho ac medico vetere eius authore. Costat autem, Croci drachmis v. Pyrethri drachma 1. Euphorbii drachma 1. Piperis & Hyoscyami, singulorum drachmis xx. Spicē nardi drachma 1. Opii drachmis x. Hæc tenuissime trita melle Attico excipiuntur, Madauit autem Philo eam compositionem versibus eiusmodi:

Ταρότος ἐν τῷ μέγα θηπῶσι Φίλωνος  
Εὐφρομα πρὸς πικρὰ ἐμὰ παρὼν ὀδυῶν  
Εἴτε κόλον πάρα πρὸς, ἀπὸ δὲ διδῶ, εἴτε πρὸς ἥπαρ  
Εἴτε δυσουρῆν ἴσχει, εἴτε λίθον.  
Γόμας καὶ ἀπὸ λίνου, ὁρδοπνοίας ἀντὶ τῶν  
Καὶ φθίσιν ἰσχυρὰς ἀποσπῶν ἐπισπῶμενος,  
Καὶ σπασμὸν πλευνεῖν ἀπὸ τοῦ ὄντος ἐν αἵματι  
ἢ ἐμῶν, ἔχει μὲν ὁ πικρὸς δασυῖς.  
Γαῖαν δὲ τοῦ ἀσπιδίου οὐκ ἀντὶ τῶν ἀλλὰ, πῶς  
Βῆχας ἐπὶ πύκνους, λίγους πικρὰς.  
Γέγραμμαι ὅσοι ποῖσι μάθων δὲ πρὸς, ὅτι βραχὺ μὲν ἔχει  
Δάρον ἐν ἀσπιδίῳ, ὅτι ἐν πύκνῳ σπῶν.  
Σαύην μὲν πρὸς βάλλει μὲν ἐπὶ τοῦ ὄντος,  
Οὐ λυθὸς ἐμῶσι λυμπεῖται ἐν βρογχίταις.  
Κρῖν καὶ τὸ σάβον φρίνας αἰέρος (ὅτι δὲ δασυῖς)  
Βάλλει δὲ ὁ δρασχυλὸν ναυτίλιν ἐν τοῖς αἵματι  
Καὶ τοῦ πρὸς ὁρδοπνοίας μὲν οὐκ ἀπὸ τοῦ  
Δρασχυλὸν, ὅτι μὴ λανθῇ σπῶν ἐμῶν.  
Φυλοκώλη δὲ ἀρῶν τοῦ πυρῶτος οὐκ ἀπὸ τοῦ  
Εἴκοσι ἐκινάμενος πρὸς ἀπὸ πικρὰς.  
Δρασχυλὸν ὁρδοπνοίας φρίνας μὲν αἰέρος  
Χαρί, ὅτι πύκνῳ λυμπεῖται μὲν  
Πρὸς γὰρ βάλλει, ἀπὸ τοῦ βάλλει πρὸς πύκνῳ αἵματι  
Ἀρῶν, ἐν δὲ δρασχυλὸν πύκνῳ δις ἐκινάμενος.  
Μάμα δὲ δις πύκνῳ πύκνῳ ἐκινάμενος  
Συγγῆς, οἱ περὶ τοῦ αἵματος ἐκινάμενος.

Quos Philonis versus ego hunc in modum Latinos feci.

En ego languores multos mortalibus ægri  
Nobile Tarsensis pello Philonis opus.  
Si colon aut hepar lapis aut vrina retenta  
Infestat, satis est exhibuisse semel.  
Est splenem, & recta statum ceruice trahentia,  
Spasmodum, & quæ languent corpora tabe leuio.  
Pleuritim nocuam, vomitus & sputa cruentis  
Si quis habet, morti potius hostis ero.  
Quæ mala visceribus latitat, iussim atq; catarrhus,  
Singultus, & quod strangulat omne fero.  
Me scripsit doctus, si quis me non erit ingens  
Donum habet: in stolidas nolo venire manus.  
Spirantem & rutilum pueri crinem accipe, cuius  
Mercurii in plantis sanguinis unda micat.  
Pondus erunt sensus hominis, notissima res est.  
Naupliis & una simul drachma sit Enboici:  
Quig, Menetia dem letho dedit, illius unam  
Drachmā, quam clausam seruat omnis vici.

*His albi igniti bis denas adice drachmas,  
Atque fabæ totidem sint suis Arcadice.  
Drachmas, radicis falso dictæ unica, nata  
In Pissa Iouem ubi delinxisse ferunt.  
Cumque pion scribis, Graium præpone virilem.  
Articulum: drachmas quinque bis illud agat.  
Tum laticem tauri natatum, Cecropidarum.  
Affinem, ut Tricacelara propago docet.*

Talis quidem Philonii descriptio apud omnes in vsu fuit, iisdem ex rebus constans, nisi quod apud Aetium & Mesuë loco euphorbii Castoreum habetur. Sed & Aetius Philonis successores florem iunci odorati, cassiam, amomum & costum, alios myrrham & castoreum, plurimos vero semina apii, cumini, anisi, dauci & petroselini admiscuisse scribit, quibus vis opii hebetior redderetur. Alii vero varie permutarunt, atque adeo deprauarunt, inter quos fuit Serapio tract. 7. cap. 8.

*Φίλωνος καλλύμελον* describitur à Celso l. 6. c. 6.

*Φιλότης ἐμπλαστος*, describitur à Celso l. 5. c. 19.

*Φίμος ἦ*

*Φίμοσις*, est meatuum naturalium præclusio.

Duabus potissimum de causis accidit, cicatrice quæ in illis concreuerit, aut carnis incrementum quæ una in parte redundans cum opposita coaluerit: sit & propter inflammationem, ut scripsit Galenus comment. 2. *ἐκ τοῦ κατὰ τὸν ἰσθμίου*. Nascitur in omnibus meatibus & locis quæ natura diduci possunt, ut oculis, labiis, ano, præputio, utero. Quorum omnium eadem causa est, ut eo loco Galenus explicauit. Verum de præputio frequentius dici consuevit sic glandem regente, ut ea nudari non possit. Proprie namque *φίμος* significat nexum summi oris perarum & sacculorum, cum toto superiore eius ambitu in angustum collecto funiculo religantur. Nonnulli capstrationem conuerterunt, Quod si è contratio non præputium modo, sed quæcunque alia naturales meatus occludunt, ita rorsum deducta sint, ut reduci nequeant, *ῥαφίμοσις* appellatur.

*Φλάσιον*, hoc est obscure & indistincte loquuntur. Fictitium nomen est. Galen. in lexico Hippocr.

*Φλάσιον*, dicitur ab Hippocr. Ionum lingua per φ, quod ab aliis per θ *θλάσιον* vocatur, hoc est contusio, ut annotauit Galen. comment. 3. *ἐκ τοῦ κατὰ τὸν ἰσθμίου*.

*Φλεβοδυνδής*, venas agitans & conturbans. nomen, inquit Gal. nouum & peregrinum, quo vsus est author prorrhethici sect. 3. quo tamen loco quidam *φλεβοπνιδής* legunt, hoc est venas distendens.

*Φλεβορραχία*, ἢ *ρῆξις* ἢ *φλεβῶν*, hoc est ruptio venarum: apud Hippocratem *ἐν τῇ σπλῆνι* *ὁρῶν*, sectione 4.

*Φλεβετομία*, venæ sectio. Est sanguinis detractionio incisa vena. Remedium est in medicina, si quod aliud, nobile, valens non tantum ad demandam plenitudinem nimiamque sanguinis etiam optimi copiam, sed

etiam ad vitia eius tollenda. Nihil enim æque plenitudinem demit, siue ea simpliciter & ad vasa dicatur, siue ad vires tantum. nihilque perinde vitia sanguinis emendat, as venæ sectio. Quod si verum est, quid est cum eo remedii genere æquiparandum? Si vitæ plenitudo adsit, nemo dubitat eam sola venæ sectione curandam. De vitiosa autem sanguinis dispositione, aliquis forte instare possit eam non necessariam videri. Attamen Galenus sequutus autoritatem veterum medicorum, eam adhibet cum & pituita, & flaua bilis atque etiam atra in sanguine exuperant, si modo ætas & vires cum magnitudine morbi consentiant. His ad hunc modum habentibus, non dubitabis incipiente anasarca siue leucophlegmasia sanguinem detrahère, neque vbi sanguis feruidior est, & febrem committit, vel tertianam vel continuam, neque in elephante, febre quartana, & in omnibus lienosis affectibus. Similiter in phlegmone, oedemate, erysipelate, & scirrho, vel simplicibus vel complicatis atque inter se coniunctis. Quod tamen ita accipi debet, non ut intelligamus humorem qui manabit incisa vena, esse vel omnino album, vel valde flauum, vel exquirit nigrum. Neque enim is sanguis esse potest: cum phlebotomiam, sanguinis detractionem esse dixerimus: hoc est eius humoris qui modice calidus sit atque rubicundus. Quare cum præcipuè mittendi sanguinis indicationes sint virium robur & magnitudo morbi (etenim sub virium robore ætas comprehenditur) quanto hæ maiores valentioresque fuerint, tanto maiorem vacuationem faciendam esse indicant: sicut è contratio euacuationis quantitatem minuire oportet, in quantum hæ fuerint minores. Secari autem vena debet, eaque varia, siue vacuare, siue reuellere, siue deriuare volumus. Hisce enim tribus de causis omnis vena secanda suscipitur, quorum consilia habentur varia pro diuersitate locorum à quibus sanguis fluxurus est. De quibus remediorum generibus plura dicturus essem, nisi abunde de iis omnibus scriptum esset à Martino Acacia doctore medico, initio commentariorum suorum in artem medicinalem, à quibus omnia qui vult repetat in hunc locum pertinentia.

*Φλέγμα*, pituita. Est omnis humor in nobis frigidus humidus. Eius differentie sunt tres, dulcis, acida, salsa. Dulcis sola, ut saporis dulcis natura ostendit, naturalis est, benigna, minimum frigida, salutaris animanti, & facillime in sanguinem vertitur. Dicitur autem dulcis non quod dulcedinem eam possideat quam habent mel, saccharum & maturi fructus, sed altera dulcis significatione, quæ dulce dicitur *ἀπὸ τοῦ* quidem & qualitaris expers, sed quod tempore dulcem qualitatem facile assumit. Sic enim aqua optima dulcis aliquando dicitur: quam tamen saporis, odoris &

ris & coloris expertem esse oportet. Sic quidem pituita dulcis, *ἄμιος* & insipida est, talemque esse oportere Galenus initio libri de atra bile prodidit. Gignitur pituita ab imbecilla coctione secunda, quæ in iccinore & venis peragitur, non autem à prima, quæ fit in ventriculo, nisi forte per accidens, quod primæ concoctionis errorem secunda emendare non potest, ut nec tertiæ secunda: verum mora spatiique temporis aut calore mediocriter aucto in sanguinem tandem mutatur. Ob id natura nullum ei proprium receptaculum tribuit, ut reliquis humoribus & excrementis, sed in venis & habitu corporis eam relinquit, quia fit ex dimidio coctum alimentum, debeatque non secerni aut vacuari, sed in corpore manens alterari. Sunt autem huius pituitæ duæ differentiæ. Alia enim crassior lentaque est, alia vero in modum aquæ liquidior, & ob id *ὑδρ* dicta veteribus, quod aquæ similis sit colore, sapore, odore, consistentiæ & viribus. Pituita autem hæc naturalis, mutata benigna & naturali qualitate, tum acida, tum salsa euadit: vtrique enim præter naturam est. Sed salsa quidem computruit ab externo calore, acida autem omnino cruda est in venis à vehementi frigiditate. Hæc quidem sunt pituitæ differentiæ, quas, si lubet, ista methodo potes distinguere. Pituita alia naturalis, alia non naturalis est: Naturalis est humor frigidus & humidus & sapore dulcis. Non naturalis vero quæ ab ea degenerat. Id quod bifariam fieri potest. Aut enim per se desiscit à sua natura, aut per alterius humoris admixtionem. Per se quidem, ut cum in aquosam substantiam conuertitur, & *ὑδρ* dicitur, aut in flatuosam, aut in tenuem, aut in crassam & viscosam, diciturque tunc non simpliciter pituita, sed aquosa, flatuosa, tenuis, crassa, mucilaginosa, vitrea, gypsea, atque aliquando etiam salsa, nitrosa, acida, cum per putredinem alterata est, & externam qualitatem induit. Per admixtionem vero, cum alius humor & coniunctus propriam eius temperiem immutat. Misceri autem potest sanguis aut flava bilis, aut melancholicus succus: vnde *οἰδήματα* etiam *φλεγμονώδη*, *έρυσιπλάτωνα*, *σκιρρώδη* compositis nominibus appellantur. Sub acida comprehenditur humor ille crudus, quem Praxagoras *βλαστόν*, hoc est vitreum, appellauit, crassus & frigidissimus. Est & aliud pituitosi excrementi genus, quod à cerebro proficiscitur. Id enim quia refrigeratum non potest alimentum concoquere, ob id pituitam generat. Verum forte nec pituitam quis recte appelleret, sed mucum & coryzam. Quin & succos crudos à pituita vitrea, & vtrunque à pituita vulgo vocata Galenus separat lib. 4. fanitatis tuscendæ. Nam crudi succi quanquam de genere sunt pituitæ, tamen ea minus sunt humidi, & plerumque carent lentore:

qui si adest, succus fit vitreus Praxagoræ dictus, insigniter frigidus, sed minus crassus quam crudus, per eminentiam dictus, qui colorem in cute nunc plumbeum, nunc liuidum, nunc ex albo & liuido mistum exhibet. Succus ergo crudus proprie dictus est frigidus & crassus: pituita autem quanquam succus est crudus & frigidus, non tamē crassa est, quia humiditatem multam habet & spiritum flatulentum. Potest autem & ad pituitam reduci *ἔχρη*, id est serosum & aquosum excrementum, quod per vrinas sudoresque vacuari debet, & misso sanguini supernatat pro humorum natura varium. Dicitur *φλέγμα* *ἀπὸ τῆς πεφλέχθαι* contrario sensu, quasi minime vsum. Hippocrates tamen alicubi in propria significatione *τῆς φλέγματος* nomen vsurpauit, ut in fine sect. 2. progn. scribens, *οἷσι δ' ἂν πεφλέχθαι τῆς φλέγματος πῆλινιται*. Neque enim putandum est eo loco humorem phlegmaticum intelligi, sed potius calorem quendam & æstum præter naturam in hypochondriis conceptum, ut in eius loci explicatione Galeno visum fuit.

*Φλεγμαίνοντα*, vri, incendi, ardere, inflammari, apud Hippocratem, sicut explicat Galenus comment. 1. in prognost. Inde *τῆς φλεγμαίνοντα*, ut idem docet comment. 4. *εἰς τὸ πεφλέχθαι* dicitur *ὀξέων*, ex Hippocratis consuetudine dicuntur morbi omnes quibus ardor & calor inest. A quo tamen loquendi more deflexit ille qui in libro *πεφλέχθαι* dicitur *ὀξέων* ea scripsit: quæ post habitum de balneo sermonem addita sunt, *φλεγμαίνοντα* *ὑποχόνδρια* appellans quæ in tumorem sublata sunt.

*Φλεγμοναίαι*, æstus, ardores, inflammationes. Vsurpatur hoc nomen ab Hippocrate, siue eo nomine, inquit Galenus, intelligat *τῆς ἰδίας ὀνομαζομένης φλεγμοναίαι*, siue vna cum iis comprehendat etiam febres pro veteri huius nominis significatione.

*Φλεγμονή*, inflammatio. Duobus modis dicitur. vno quidem generaliter omnis ardor citra tumorem, vel etiam tumor cui dolor & ardor, qui proprie *φλόγσις* dicitur, inest, siue is à sanguine, siue à bile, siue ab humore melancholico gignatur. Hæc fuit apud Hippocratem & veteres *τῆς φλεγμονῆς* significatio: qui non aliter quam *αὐτῇ τῆς φλογώσεως* eā vocem vsurpauit. Altero vero specialius dicitur, & ab Erasistrati seculo coepit vsurpari ad illos tumores significandos quibus non modo calor accedit, sed renixus etiam & pulsus & rubor: ii enim quia frequentius contingunt, iccirco totius generis appellatione sibi vindicantur. quos tamen Hippocrates non *φλεγμοναίαι*, sed composito nomine *σκληρὰ καὶ ἐπώδυνα οἰδήματα*, hoc est duros & dolorificos tumores, vocare consuevit, ut docet Gal. comm. 1. & 2. in progn. Est autem huius phlegmones specialiter dictæ continens causa sanguis, subiectum autem musculus. Quippe calidus & copiosus sanguis, ubi in musculum procubuit, feruorē inducit alia-

que plurima symptomata, appellaturque morbus ipse *φλεγμα*. Ac primum quidē maiores arteriæ venæque opplentur atque distenduntur, ut quæ abundantiz non sufficiant, ab his deinceps minores, atque ita res procedit, donec ad minimas sit peruenitum. Mox, si fluxio non sistitur, sed in iis valēter impacta est, nec in iis satis cōtinetur, partim eius per ipsarum ora, partim per tunicas veluti colatum foras in ea spatia quæ inter vasa sunt, transmittitur, sic ut etiam omnia loca spatiaque ipsa vacua, quæ inter primasunt corpora, fluxione impleantur. Sic omnia ab humore omniq; ex parte incalescūt ac perfunduntur. Ea sunt nervi, ligamenta, membranz, caro ipsa, antequæ hæc arteriæ & venæ, quæ scilicet & primæ & præter cætera vario dolore afficiūtur. Quippe interius à fluxione tum exalfiunt, tum distenduntur ac diuelluntur: exterius non modo exalfiunt, sed etiam premuntur ac degrauantur. Reliquæ particulæ aliæ comprimendo solum vel incalescendō, aliæ utroque genere laborant. Sic fit ut omnem phlegmonem ardor, dolor, tensio, renixus, pulsus ruborque consequantur. Nec tamen eorum symptomatum perpetuo æqualis vehemētia, sed, p qualitate & copia sanguinis influentis, quæ admodum nec omnes phlegmonæ pares existunt. Earum enim aliæ non modo maiores minoresue sunt, sed aliquæ magis minusue exquisitæ. Sed exquisita quidem synceraque est, quæ fit ex optimo sanguine & mediocri consistentiæ: non exquisita vero quæ fit à sanguine cui aliquis alius humor admixtus sit. Illa *φλεγμα* simpliciter dicitur, hæc nō absolute, sed vel *φλεγμα* *έρυσι* *λαπιδος*, vel *οιδηματιδος*, vel *σκιρσιδος*. Cæterū omnis phlegmone contrahitur à fluxione quam vel manifesta causa vel etiam occulta excitat. Manifesta quidem, ut quum offenso pede glandulæ inflammantur: occulta vero quando aliqua parte delegante, aut toto corpore transmittente, & affecta parte ob debilitatem recipientis aut propter dolorem vel calorem attrahente, sanguinis copia affluerit. Verum omnis phlegmone quæ sanescit, aut digeritur aut cōcoquitur: si digeritur, ex toto caratur: si vero concoquitur, in abscessum transit qui *πύσιμα* dicitur.

*Φλεγμώδης*. ignitum & urere valens, ut exponit Gal. in lexico Hippocr.

*Φλεδονώδης*. hoc est *φύλαρον*, nugacem. *Φλέδωνες* enim nugas significant, ut exponit Gal. in lexico Hippocr.

*Φλέων*. herba est non solum caulem habens aculeatum, sed & folium quoque hispidum, iuxta cuius spinas aculeos etiam condit: tam foliō quam caule aculeatis: radice non in profundum acta. Nonnulli stœben appellant, ut Theophrastus auctor est. In Orchomenio lacu copiosum haberi scribit. à quo nomen *φλέων*. etenim Græci *φλέων*, pro eo quod est fecundum esse, capiunt. Est autē

stirps verbasco similis & papyracea quæ terra circumponitur oleariis fictilibus, ut annotat Gal. in lexico Hippocr.

*Φλέψ*. vena. Est vas spermaticum, una constans tunica fibris triplicibus contexta, & sanguinem largiorem continēs. Venæ nomine etiam arteriam comprehenderunt veteres, quo sensu Plato in Timæo venas à corde producit, ut scribit Galen. lib. 6. de placitis Hippocr. & Plat. Prodir autem vena omnis ab hepate, quæ modo vere & simpliciter vena dicitur. Nam si quis contēdat venam arteriosam à dextro cordis vētre nasci, ut certum id est, sic ea non simpliciter vena dicitur. In vniuersum autem duæ ab hepate oriuntur, una à sima eius parte, altera à gibba. Quæ ex sima oritur, variis nominibus appellatur, *μεγάλη ὁπὶ τὰς πύλας*, *μεγάλη ὁπὶ πύλας*, & *σπληνική*, quod sit aliarum velut quidam truncus. Vulgo vena porta dicitur. Hæc in sima parte hepatis quinque, interdum pluribus paucioribusue radicibus actis & postea in vnum truncum coalescentibus, iecinoris portis una amplexu egre ditur: pauloque postea in duos maiores ramos diuiditur, quorum vnus lienem petit, alter fertur in mesenterium, vterque in quamplurimos ramusculos diuisus. Ante autem quam magnus ille trūcus in duos ramos scindatur, venulas aliquot emittit, duas quidem *κυσίνας* dictas in collum & corpus vesicæ bilem continentis: vnam *σπληνικήν*, quæ in pylorum & posteriorem ventriculi partem illi propinquam distribuit: vnam *σπληνικήν* *πλοῖδα*, quæ in totum dextrum fundum ventriculi & totum dextrum epiploon inferitur variis sarculis: vnam similiter quam *σπληνικήν*, hoc est intestinalem, potes vocare, quæ ecphysim, & ieiuni initium & glandulosum eius corpus petit. Cæterum rami illi duo maiores (quorum qui splenem adit, splenicus, qui mesenterium, mesentericus doctrinæ gratia appelleretur) in quos magnum truncum secari diximus, varias habent propagines, splenicus quidem antequam in lienem intromittatur aliquot, quarum aliæ in gibbam ventriculi partem, aliæ in simā bipertita fertur, ramuloque suo maiore ceu corona stomachum totum cingit, ramulis sursum ad œsophagi finem & deorsum in ventriculum dispersis, minore autem ad pylorum descendit, ramulis communiter ante & post distributis: aliæ vero in epiploon & coli partem dorso commissam disseminatur. Mesentericus vero ramus in mesenterium & pancreas descendens, in venas multas, tres tamen præcipuas, mox totus diuiditur, quæ postea multipliciter sectæ, & inter duas mesenterii tunicas vectæ, in simam partem reliquorum intestinalium ramulis quamplurimis absumuntur, suis orificiis in illorum cavitatem vndique incidentes, quibus & chylum sugunt, quem in iecur deferant. Sæpe etiam sanguinem & harum non modo partium, sed corporis etiam



totius excrementa reuehunt. Huius quoque portio vna colo sinistro & intestino recto inseritur, & in sedem ramulis aliquot descendit, qui venas αἰσθητοῦς constitunt. Talis quidem est venę quam portam appellant distributio. Quę autem à gibba parte iecinoris proficiscitur, pluribus similiter nominibus vocata est ab ipso Galeno, μασίς, καὶ δὲ, ἡπατις. Ea venarum omnium capacissima est, sparsisque aliquot radicibus intra iecoris partem gibbā, similes venę portę radices spectantibus & propemodum tangentibus, mox ceu truncus vnus emergit, nec multo post in ramos duos scinditur, quorū vnus in superiores, alter in inferiores partes fertur. Qui superiores petit, is vnus & integer ad clauēs vsque peruenit, venulas tamen interea quasdam partibus nonnullis imperit, duas quidem σπληνός toti diaphragmati, vnā cordi, σπληνίαν dictā, quę basim cordis coronę modo cingit, inque partem cordis externam distribuitur: vnā præterea αἰσθητοῦς vocaram inferioribus costis, ortam ex ipsius trunci latere dextro deorsumque descendente, & octo vel pluribus ramulis sparsa septem inter costas inferiores, interdum vero etiam omnia vtrinque nutriendam. Adhęc aliam μεσασπληνίαν dictā, hoc est intercostalem, quę tria superiorum quatuor costarum sparsa nutrit. Cæterum magnus ille truncus sursum conscendens vbi clauiculas attingit, sub ipsis in duos ramos finditur ὑποκλαυκίαν dictos (à quorum vtroque venulę mammarie vtrinque singulę sub sternō descendunt in mammas & pectoris musculos: fere vsque ad vmbilicum) sed breues admodum. Siquidem vterque ilico diuiditur in duas insignes venas ὑποκλαυκίαν appellatas, quod clauiculas supergressę sint, quarū vna μαχαλνία dicitur, hoc est axillaris, altera caret quidē nomine, sed mox diuiditur in alias duas venas, quarum superior σφαγίς, hoc est iugularis, inferior ἀμμοία hoc est humeralis, vocatur. Est autem iugularis duplex, interna & externa. Interna secundum latus asperę arterię ascendit ad fauces & inde in cranium: externa vero per collum latus ascendit & in musculos laryngis, linguz, oris, & in cutem faciei, frontis capitique absumitur. Sic quidem habet venę cauz sursum ascendentes series. Quę vero deorsum descendit, ea vna & indiuisa vsque ad initium fere ossis sacri descendit: in paulo supra eius initium in duos ramos diuaticari incipit qui in crura deferuntur. Media tamen via & antequam separaretur, quatuor vtrinque propagines emittit, quarum vna & ea quidem suprema in tunicā renū externā à peritonæo natā & partes conterminas spargitur, adipem multum eo loci gignens. Ab ea deinceps alia est propago venarum quas renales siue emulgentes appellant, quarum dextra quidem superior, sinistra vero inferior fere semper est. Earum

autem vtrique multis venulis in renū corpus distribuitur. Est & ab eodē trunco venarum propago quas αἰσθητοῦς appellant, quarū dextra quidem ab ipso trunco, sinistra vero à media emulgente vtplurimum nascitur. Quarta propago est venarum lumbarium, quę multiplex & vnaquęque bipertita in lumborum medullam per nervorum foramina, & in eius loci musculos cum arteria similiter diuisa distribuitur. Porro vbi truncus hic inferior venę cauz initium, vti dixi, ossis sacri prope attingit, in duos ramos finditur in crura descendentes, quā quidem diuisionem Gal. lib. de anat. ven. Græcorum elemento comparat. Actuarius autem à figurā à literę λ α μ β δ γ δ η rectius videtur appellare. Vtramque earum venarum cruralem vocant. Vtrique autem simul atque è peritonæo elapsa est, ramū insignē producit, qui super os ilchii in inguina descendit, & in anteriore internāque femoris partē, vbi in multos ramos facit diuisionē, multis & magnis eius loci glandulis firmatā, quę cum arteria & nervo simul descendētib, cavitatem illā inguinum opplet: peruenit autem is ramus vsque ad pedem. Reliqua autem venę cruralis portio etiam ad summum vsq; pedem descendit, propagines quoque nonnullas interim emittens ad coxendicem, ad popliteum, ad suram, & ad malleolos.

Φανία. hoc est φανία, nugans. & φανία φανία nugaces. vti explicat Gal. in lexico Hippocr.

Φανία. postes vocantur ab Hippocr. quatuor ligna, quatuor angulis scamni sui sita, axes cōtinētia & firmantia, hoc est, vti ait Gal. πέντε λ α μ β δ γ δ η πέντε αἰσθητοῦς σπληνίαν. Nec vero eos tantum quatuor postes ita vocat, sed etiam alia duo ligna, in medio eorum sita, quę aliud lignum transversum tanquam scalę gradum continēt. vide βάρβαν.

Φανία. est linimentum oculorum quod recipit zris vñi ac loti drach. x i i. ctoxi drach. v i. pipetis drach. i i i i. myrrhæ drach. i i i. opii drach. i i i. gummi drach. x i i. Teruntur cum vino veteri odorato adstringente. Galeni lib. 4. πέντε λ α μ β δ γ δ η ex Aesclepiade, & Aetius lib. 7.

Φανία. φανία. viola flammea. viola est coronari generis, folio & ramulis odorata, flore inodora, sed colore flammeo coronis adoptata, colore commendabili, odore nullo, semine proueniens coronis. Prima se inter flores ostendit.

Φανία. idem prorsus quod φανία fuit apud antiquos. Nunc autem video proprie φανία dici eum tumorem, cui non modo calor, sed etiam fenixus, pullus, ruborque inest: φανία vero omnem feruorem, inflammationique similem affectum significare. vide φανία.

Φανία. verbascum differentias summas habet duas, hoc tigrū, illud albu: in quo mas & femina intelligit. femina folia sunt brassicę, pilosiora multo & latiora, candida: cau-

his albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallescens: semen nigrum: radix longa, gustu acetba, crassitudine digiti. nascitur in campestribus. Qui mas est, oblongius, foliis albis & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreque constaret folio. Sylvestre folia fert saluix, altas virgas & lignosas, & circa eas ramulos quales marrubium: flores luteos, auri amulos. Sunt & phlomidis duæ hirsutæ, rotundis foliis, humiles. Tercia lychnitis appellatur, ab aliis autem thryallis: foliis ternis aut quaternis, vel paulo pluribus, hirsutis, crassis, pinguibusque, apta ad lucernarum lumina. Acerba est, & digerendi vim quandam habet, & folia desiccandi vim quandam obtinent.

*Λυδά. ὀρχαίρεται, μωδά.* hoc est humectatur, putrescit, vt explicat Galenus in lexico Hippocratis.

*Φλὺκταιον* idem prorsus quod *φλυκταίνα*, vt scripsit Galenus comment. 4. *εἰς τὸ ὅσα δαίτη ἐξέει.*

*Φλὺκταιναίη*

*Φλυκταίνα*, genus pustularum, inquit Celsus, cum plures similes variis oriuntur, nonnumquam maiores, liuidæ, aut pallidæ, aut nigrae, aut aliter naturali colore murato: subestque is humor: vbi hærupta sunt, infra quasi exulcerata caro apparet. fiunt autem, vt scribit, vel ex frigore vel ex igni vel ex medicamentis. Quidam vesiculas interpretantur, oriuntur maxime à feruentibus & acerrimis humoribus, iis, quæ ab igne aut feruenti aqua gignuntur, similes. Toto corpore nascuntur, sed nullibi periculosius quàm in oculi membrana cornea, quæ primum quidem vesiculæ in morem attollitur ab acri quodam humore, deinde vero excoriatur & oculum purulentum reddit. Quidam putant idem esse *φλυκταίνα* atque *ψυδραίων*: alii vero exigua quadam differentia distinguunt, scribentes *ψυδραίων* affectum esse capitis proprium, & ab humore frigidiori quam *φλυκταίνα* excitari. Certum vero est *φλυκταίνα* cum *φλυδαίνα* eandem esse, & vtrumque à verbis *φλυ*, *φλυζω*, seu *φλύω* deductum esse.

*Φλυκταίνωδης ἔρπης*. idem quod *ἐρπης κεχρηίας* dictus, de quo vide suo loco.

*Φλύσιος*. id est eruptionis pustularum, quæ fit ex superabundantia humoris in corpore nostro, vt explicat Galen<sup>9</sup> in lexico Hippocratis.

*Φόβος*. timor. Est subita & vehemens animi perturbatio à re quapiam, ceu sibi noxia. *ἔκπληξ* Græci vocant. Hic non intelligimus timorem qui fit abducendo & contrahendo ad principium suum cum sanguinem cum spiritum, iræ contrarium, quæ & foras agit & fundit & calefacit: sed eum qui fit ex melancholia, & quem indu-

cunt tenebræ: de quo scripsit Hippocr. Si timor & mœstitia longo tempore perseuerent, melancholicum est. Talis enim timor fit per melancholiam, eosque nunquam deserit qui melancholici sunt: adeo vt & virtutem deiiciat & corpus mutet, animique deliquium pariat. Huic contrarium est *μεγαλάρεια*, quasi excessum gaudii dixeris. Vocatur alio nomine *δύς*.

*Φονήσις*. rubrificatio. Est ruboris per medicamenta excitatio in aliqua parte. Quidam enim medicamenta eam vim habent, vt cuti admota ruborem caloremque accendant, atque etiam si diutius immorentur, vesiculas creent, tandemque exulcerent. Ex quo patet ea vehementer calida, sicca & acria esse oportere. Eiusmodi sunt sinapi, thapsia, simus caprarum, nasturtium semen, helenii radix, scilla, simus columbinus, staphis agria, cantharides, & reliqua id genus. Est autem praesidii genus à veteribus usurpatum maxime ad eas partium imbecillitates, quæ velex frigore vel plurimo humore citra manifestum calorem accidunt. Quippe eiusmodi medicamenta omnia calefaciunt, desiccant, & cucurbitula ritu humorem altius insidentem attrahunt.

*Φονήσιον*. nomen emplastri est à Galeno compositi, glutinandis vlceribus, cicatrice obducendis, & phlegmonis curandis accommodum. Nomen autem indidit à palma, quæ *φονήσις* vocant Græci. Aliter *δὲ χαλκίπιος* dicitur. Eius descriptio habetur apud Galen. lib. 1. cap. 4. de compositione medic. secundum genera. Vide similiter Aetium lib. 15. c. 12. de emplastris ad cruenta vulnera glutinandis.

*Φονήσιος*. sic à colore dicta elephantiasim suspicari vtique possit aliquis. Sic etiam *φονήσιον νόσος*: nisi morbum in Phœnice & aliis partibus orientalibus prouenientem intelligamus: vt scribit Galenus in lexico Hippocratis.

*Φονήσις*. lapis sic dictus à figura quam habet similem cum fractu palmarum. *ινδαίνωδης* dicitur apud Diosc.

*Φονήσιος ἄκων*. fructus est palmae Aegyptiae quæ peculiari nomine *αδύφος* dicta est, collectus post maturitatem. Tunc enim nigrescit, puniceoque colore rubet, vt plerique maturi fructus, quod Græci *φονήσιον* & *φονήσιον* appellant.

*Φονήσις*. planta est foliis hordei, sed breuioribus & angustioribus. spicam habet folio similem, calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasue spicas. In aruis rectisq; recenter illitis nascitur.

*Φονήσις* est collyriū *πράχματιον* ab Hierace conscriptum, de cuius descriptione inter Galenum & Aetium conuenit, exceptis admodum paucis usq; leuibus.

*Φωλός*. strabo. cui obliqua est oculorum acies.

*Φωλιδία*. quæ veluti folliculosa sunt & laxa.

**laxa.** vt explicat Galenus in lexico Hippocratis.

**Φύκος.** dicitur à quibusdam *ἡ ἀσπράγγος*, vt scriptum est libro 6. apud Theophrastum, eadem ratione qua & *ἀσπράγγος* eadem dicta est, quod scilicet eius folium autulum carniq; confricatum sanguineum reddat succum.

**Φοειμυρνήσια.** aluminis genus est quod proprie liquidum dicitur, sicut à Galeno & Plinio proditum est. Hodie alumen rochæ appellatur.

**Φορμ. δέψμα.** id est cutis. vt explicat Gal. comm.

*4. ἐστὶν ἀπὸ δαίμωνος ὀφείων.*

**Φόδ. φν.** aliqui syluestrem nardum appellant. folio est olusatri aut elaphobosci: caule cubitali aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis interceptis: floribus narcisso proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villota in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum æmulantibus. Excaesfacit & vrinam mouet.

**Φόδρα.** dicitur ab Aërio potus in quo ebur aliquandiu maceratum ceræ instar emollescat, flexileque in opus quodcūque domito rigore tractetur. Quem tamen puto id nomen pro posca v'surpasse, quam aliqui Romanum nomen imitantes *φύσαν* appellant. Parabatur diuersis modis, plarumque simplex, aliquando purgatoria, vt apud Paulum lib. 7. cap. 5. & apud Aetium lib. 3. cap. 80. & 81.

**Φεμύτης κάλαμος.** species est arundinis, quasi vallatoriam appelles. gracilis est & candidans. vt author est Diosc.

**Φεμύτης.** sic dicitur ab anatomicis totus dentium ordo atque acies.

**Φρένις.** proprie mentem significant, quam *νοῦς* & *διδνοῖαν* etiam Græci appellant: ad quam quoniam aliquid conducere videtur diaphragma, aut quia eo inflammatione affecto, mēs quoque lædatur, & continuū prope delirium excitetur, à Platone & reliquis veteribus eodem nomine donatum est: vt nihil interfit *φρένας* & *διδφρέμα* dicere. Præcordia à Latinis dicta sunt, quia cordi prætenduntur.

**Φρενικὴ φλέξ.** dicuntur propagines duæ venarum è trunco venæ causæ superioris orientes, insertæ in diaphragma, ipsumque totum nutriendes.

**Φρενίτις.** est inflammatio membranarum cerebri, febrem acutam & mentis perturbationem inducens. Sic quidem proprie dicta phrenitis definitur, eamque omnes vel simplicem inflammationem esse statuerunt à copia sanguinis, vel erysipelatofam à flaua bile, aut humore biliōso v'sto & in atrum versō. Ex quo consequitur eiusmodi phrenitidem propriam & primarium cerebri affectum esse. Consistit autem ea inflam-

matio in meningibus, & in ipsum etiam cerebrum aliquando peruenit, adeo vt inflammatione simul laboret: aliquando vero feruet duntaxat, & calorem præter naturam concipit. Inde febtilis acuta propter affectæ partis dignitatem, eximium sensum, & coniunctionem quæ illi cum corde maxima est, inducitur, & perpetua deliria succedunt. Sunt enim hæc duō pathognomonica phrenitidis signa, vt quæ nunquam ab ea abesse videantur, & eius, vt ita dicam, essentiam constituent, possitque optime iis duobus *ἡ φρενίτις* definiri, esse perpetuum cum febre acuta delirium, sicut Galenus initio Prothet. annotauit. Delirium voco *τὸν ἀσπράγγυν* quam phrenitidis aliarumque omnium animi perturbationum genus esse, ex Hippocrate & Galeno apparet. Sic phrenitis *ἀπὸ τῆς μανίας*, discrepabit, quæ nullam habet adiunctam febrem, & ab eo delirio quod in vigore vehementium febrium excitari solet, quia perpetuum non sit, sed declinante febre soluatur. Verum præter hæc duo, etiam alia quædam phrenitidem consequuntur, signaque apparent; quæ medici assidentia vocant, perpetua fere vigilia aut somnus admodum turbulentus, ex quo surgunt, exiliunt, vociferantur, & (si à sanguine morbus est) vident, aut si à bile flaua est, ferociunt, vel si atra vitium fecerit, tam immaniter læuiunt, vt coerceri nequeant. Oculos præterea habent rubentes, alii aridos; alij lacrymis aut lemis persufos. Aliis memoria, aliis ratio, aliis imaginatio deficit, vnde varia insaniz genera oriuntur. Est vero & alia non proprie dicta phrenitis, vt quæ tum à ventriculo, tum à diaphragmate per consensum gignitur, tum quæ per ardentissimæ febris vigorem prouenit, quas plarique phrenitidis nomine non dignantur, sed *παράφρενίτις* modo vocant. Item quæcunque sine febre est, quam *μανία* rectius quam phrenitidem appelles. Sic Hippocrates communi quadam & non propria significatione phreniticos aliquando vocat omnes quibus mēs, quam *φρένας* Græci nōminant, oblata est, etiam si perpetua cataphora teneantur, quales ii sunt qui *φρενιται*, *ἀσπράγγες* in prothet. appellantur. Sic enim eo libro dicuntur, qui ita desipiunt, vt tamen eos desipere nemo intelligat. Vultus enim eos solos phrenitide teneri arbitratur qui vociferantur aut in alios insiliunt, tum tamen Hippocrates, vt eo loco scribit Galenus, omnes quibus mens non constet, phreniticos appellet, etiam si perpetua cataphora laborent.

**Φρίν.** horror. quid sit ex rigore discendum, de quo ante in dictione *πρύος*. Fit. p. eodē modo, & ab iisdē causis, à quibus rigor. Sed horrore causa mitiores, pauciores, quiescentes & minus motæ sunt quam rigoris. Nam ex cremētum mordax, erodens, nitrosum, salsum, amarum in cute vel subdita illi carne

motum vt intensiōe qualitatis & motus rigorem vel maximum vel medium vel minimum excitat, prout causę magis vel minus erodunt, abundāt, mouentur, ita paucitate, tenuitate & motiōis imperi inferiorius, horrorem tantum mouet. Vt autem horror minus quiddā est quam rigor, sic maius quiddam est refrigeratione & inæqualitate. Qui enim refrigerationem committit humor frigidus est, crassus & immotus: qui vero inæqualitatem, minimum calidus, tenuis, motusque, vt in easere non motus sed sensus tātum, q̄alis in vlcerosa lassitudine vel pruritu, sentiatur. Vt autem medius est horror inter rigorem & refrigerationem; ita fit extremis eorum causis inter se contemperatis. Sunt autem ex quas diximus causę, videlicet qualitas praua & mordax magis minusve, quantitas multa vel pauca, motus velox, tardus, validus, languidus. per sentientes corporis partes non per vasa factus, quibus etiam accedit corporis robur facilisque sensus. Nam qui corpore sunt robusto & vix patiente, horrore vel rigore minus tentantur quam qui sunt corpore imbecillo & sensu facili præditi.

*Φεικνός*. significat apud Hipp. *πράχρη* & *πικρόδης*, hoc est asperum & rugosum. Dicitur de cute, cuius asperitas & inæqualitas *φεικνός* & *φεικνός* appellatur. Ei contraria est *λεπτός*, hoc est leuitas.

*Φεικνός παροξυσμός*. horrida accessio. Sic dicitur proprie accessio febris semitertianę, propterea quod cum horrore inuadat. Vt enim ipsa febris medię cuiusdam est naturę inter exquisitam tertianam & quotidianam, ita horrorem inducit inter rigorem & refrigerationem medium, vt docet Galen. lib. 2. de crisibus cap. 9. & lib. 2. de differentiis febrium cap. 7.

*Φεικνός πυρετός*. horrida febris. Dicitur apud Hippocratem libr. primo *πρὸς τὸν Παννύμιον*, non simpliciter quę cum horrore inuadit, id enim innumerabilibus accidit febribus, sed exquisitus hemitritæus, in quo videlicet magnam accessionis partē horrores occupant, eo maxime die in quo tertiana & quotidiana cōtinua simul concurrunt, vt explicauit Gal. 2. de differentiis febrium. Eam biliosus pituitosusque humor ex æquo mixti committunt, itaque confusi horrorem mouent non per initia modo accessionis, sed etiam per totam propē accessionem. Tunc autem duobus modis horror iste cōmouetur, per reduplicationem & per inæqualem incrementi motum. Hoc breuioribus horrores interuallis, illud longioribus distinguitur. Vtrumque autem febri semitertianę proprium est propter humoris a quo gignitur inæqualitatem, vt docet Gal. comment. 1. *εἰς τὸ ἀπὸ τῶν πυρετῶν*.

*Φρονέω*. cura. Est anxietas mēis ad rem aliquam valde attentę. Quod enim in ventriculo *ἀλνύει*, id in animo *φρονέω* est. Atque vt nulla in se conquiescunt quos *ἀλνύει* male habet, nul-

loque possunt loco consistere, sed subinde decubitus mutant: ita per vehementes curas animus æstuat, non consistit, non quiescit. Ideo curę vigilias inducunt, corpus siccant, fuliginosa excrementa gignunt, cutim densant, vnde febres primum ephemerę, postea putridę accenduntur.

*Φρυγία λίθος*. est gleba quędam pumicosa, pallida, modice grauis, non solida, intercedentibus albis segmentis, vt in Cadmia. his quidem notis optimus distinguitur. Hunc aliqui hodie pro lyncurio vendunt, sicut alii pro eodem belemnitem. Exiccat, adstringit, expurgat, vlceribus crustas quādātenus inducit. Eo infectores in Phrygia vtuntur, a qua nomen accepit. Nasitur autem in Cappadocia.

*Φύμα*. fricta. et si adiectiuum nomen sit, absolute tamen & simpliciter citra *πρὸς τὸν πυρετόν* adiectionē posurum, resinam pineam siue Colophoniam significat, quod ceteras antecedit, sitque omnium maxime parabilis. Sic autem dicta est ad liquidę differentię, quam Gręci etiam simpliciter *ὄζον*, vel *πᾶσι δὲ καὶ ἐκ μίαν ὄζον* appellare solent. Huius vtendę torrendęque differentiam Diosc. libr. 1. explicauit.

*Φύμα*. panus, seu panis. vtroque enim modo Latine dici potest, vt Hermol. Barbarus annotauit. Dicitur & a quibusdam panicula. Quid sit, Celsus aperte explicauit libr. 5. c. 25. Est tumor non altus, latus, in quo quiddam pustulę simile est. Dolor distentioque vehemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris. interdum etiam febricula: idque tarde maturęscit, neque magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in vertice, aut in alis, aut in inguinibus. Panē ad similitudinem figurę nostri vocant. Ex quibus Celsi verbis apparet manifesto *φύμα* esse phlegmonem erysipelatodem, vel erysipelas phlegmonodes. Quod enim hic tumor multę bilis sit particeps, ideo non alte assurgit, neque in profundum valde subit, sed erysipelatis modo latior est. occupat tamen & subiectę carnis aliquid, quod aliqua ex parte phlegmone sit. Propter eandem bilem etiam pustulę quędam, vt & in herpete, excitantur, & dolor distentioque maior est q̄ pro magnitudine tumoris, tarde etiam maturęscit eandem ob causam, neque magnopere in pus conuertitur. Addit vero & Galenus id tumoris genus præditum esse summo calore, & citissime generari, iisque duobus quosdam ipsum ab aliis phymatibus & tuberculis distinxisse. fit maxime, vt scribit Celsus, in vertice, alis aut inguinibus, nec tamen in iis tantum, sed in omnibus etiam glandulosis partibus, vt Galenus auctor est. Figura illi pano similis est, quę textores vtuntur, atque etiam pani. quam figuram quāuis *φύμα* habeat cum phymate communem, multis tamē nominibus ab eo differt. *φύμα* enim verior phlegmone est, magisque exquisita, proindeque facilius in pus con-

conuertitur, præterea tanto minus doloris adfert, minusque calidum (nisi dum suppurar) sentitur, quanto bilis flaua sanguisue biliosus syncero sanguine plus doloris mouet, calidiorque est. Differt autem *φύβλος* à bubone, auctore Galeno, vt scribit Paulus libri quarti capite 22. quod bubo phlegmone sit: *φύβλος* vero, vt dictum est, sit *φλεγμονώδης, έρυσίπelas, ή έρυσίπela τώδης φλεγμονή τή αίδένος*.

*Φύκος θαλάσσιον*. fucus marinus: quoddam latum est, alterum sublongius & rubens. tertium candidum, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habet refrigeratorem ordine secundo.

*Φυκοτόμη*. nomen est emplastri ab Actio descripti ferm. 3. tetr. 4. ad omnia vlcera, præsertim in sede, commodum est.

*Φυλάνης*, herba est quæ folia promittit rumici similia, longiora & viridiora, fena aut septena, recta, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem penfiles quasi vermiculos tenues ostendunt. In ymbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbis. Neque caulem, neque semen, neque florem profert.

*Φυμυρέα*. reperitur alicubi pro *φυμυρέα*. quod vide.

*Φύμα*. duum generum est. quorum quod in saxosis nascitur, *ελαόφυλλος* vocatur. quod autem *θηλυχόνον* appellant, prouenit musci modo, folio olæ, sed colore magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili. florem albū profert, sed papaueris, maiusculum.

*Φύλλος*. etiam vocat Hipp. herbaceum & hortensium viride condimentum vel odora-mentum, quæ ementibus olera addunt, vt coriandrum, mentha, ruta, apium. Dicitur & *φύλλον*. vt annotat Galen. in suo lexico. Significat etiam (vt ibidem scriptum est ab eo) sulphurii semen, eo quod latum est: vt secundo de morbis mulierum. addit autem & ipse in sermone aliquando Libycum, aliquando Æthiopicum.

*Φύμα*. tuberculi genus est, sic dictum *ἀπὸ τῆ φύσεως*, hoc est ab iis quæ sponte ex terra nascuntur. Est autem eius significatio duplex, sicut Paulus l. 4. c. 22. scribit. Vna generalis & communis, qua, vt multorum sententia est, omnes æque tumores *ἀποσηματώδεις*, qui præter naturam oborti sunt, in quacunque corporis parte, *φύματι* appellantur, quod Hippocrates scripserit, Quibus phymata in vrinario meatu excitata sunt, abscessu suppuratione ruptoque liberantur. Addit vero Galen. comment. 1. in lib. 6. *τῶν ὀδημητῶν* sic vocari eos præter naturam tumores, qui prorsus sine causa aliqua externa proueniunt, maxime si extra corporis superficiem extuberent. Qua quidem significatione *δοξιλῶτες, ἀπρόχορδοι, πατωμαστοί, χοιράδες*, & id genus quamplurimi tumores, qui per se nullamque externam ob causam excitantur, in extremis corporis partibus *φύματι* vocantur, siue lati sint nec multum alti, cuiusmodi sunt *φύβλος*, siue

etiam elatiores & paulo magis extuberantes. Altera vero specialis propriaque significatio est, secundum quam *φύμα* dicitur phlegmone quæ in adnosa carne sponte oborta statim augetur, atque ad suppurationem cito peruenit. Quo modo neque *δοξιλῶτες* phymata sunt, vt qui magis scirrhioli sint quam phlegmones natura ferat, neque etiam *χοιράδες*, tum eandem ob causam, tum quod non facile in pus vertuntur. Duri præterea hi tumores sunt, cum *φύμα* mollius sit atque calidius, tanquam è sanguine genitum: quo autem differat *ἀπὸ τῆ φύβλου*, suo loco dictum est.

*Φύον*. nomen est collyrii apud Celsum libr. 6. cap. 6.

*Φύεσμα*. genus vnum est ammoniaci thymiamatis. sic dictum est quod cum terra, arenis & calculis mistum sit. vide *ἀμμωνιακόν*.

*Φύσα*, flatus. Est spiritus crassior. Refertur ad spirituosam substantiam vt qui in spirituum genere sit, estque humorum veluti vapor quidam, sed fere impurius, crassior, turbidior. Eius generatio in ventre fit, quemadmodum & nebulae in aere, à cibis vel humoribus quibusdam pituitosis à debili calore in halitum solutis. Quippe syncera frigiditas prorsus halitum non facit, quod nullo modo attenuet, conficiat, aut dissoluat alimentum: fortis autem calor cum multo superior sit alimentis, tantum abest à generando flatu, vt genitum etiam attenuet atque dissipet, nisi alimentum ipsum natura flatuosum sit. Tunc enim gignitur quidem spiritus aliquis turbidus & quodammodo nebulosus, sed qui facile vno aut altero ructu vacuetur. Itaque calor qui in cibos quidem agit, sed diminuitur, quod eos aliqua ex parte dissoluat nec tamen prorsus conficiat, flatum siue spiritum flatuosum parit. Gignitur autem tum à materia quauis calfacta, tum ab externo flatu, tum ab alimento flatulento, non in ventriculo modo & intestinis, sed in reliquis etiam cavitatibus tam sensui manifestis, vt cerebri, cordis, pulmonum, vesicæ, vteri, renū, scroti, venarum & arteriarum, quam sensui occultis, vt quæ sunt in spatiis inanibus inter partes similes, & neruorum spiraculis, atque omnibus illis in locis mouetur. A quo quidem motu fiunt in ventriculo ructus, in inferno ventre sonori vel sine sono flatus, adhuc murmurilla, strepitus, crepitus, efflationes sedis, vteri, vesicæ, cordis & partium aliarum quarundam palpitaciones.

*Φύσημα*. sic proprie dicitur *ή πύνη ή πύνη*, hoc est picea resina, vt scripsit Galen. l. 7. *τῶν κτ' ἔχον*. Ea valde exiccat.

*Φύσιχα*. hoc est *τὸ καλέμενον ὀκαυλήμα*, qui vocatur caulium exortus: & maxime pars eius concava, vt explicat Galenus in lexico Hippocratis.

*Φύσις*. natura. Varie hoc nomen à veteribus acceptum fuit & definitum. Sed omisissis iis quæ Aristot. & reliqui Philosophi de ea differunt, ea tantum persequemur quæ ad medi-



cinam pertinent, primum tamen proponētes à Galeno naturam quandam vniuersi constitutam fuisse lib. 17. de usu partium, quam ille definit esse Mentem admirabili virtute præditam quæ omnia peruadat. Ab ea singularum rerum naturam propriā manare consentaneum est: quodque ab ea sit, *ἡ φύσις* fieri dicitur, hoc est, vt Galenus interpretatur, *ἡ αὐτῆς τῆς φύσεως ἡ δύναμις*, hoc est, secundum ipsam rerum veritatem. Eam in hominē varīe medici definiunt. Sed maxime ea definitio mihi probatur, quæ dicitur Natura vis esse quæ ex se ipsa nostri sit opifex & conseruatix, vt *ἡ αὐτῆς ὁπὸς ἰατρικῆς*, scriptum est. Ea namque est cui & generationem debemus, & quæ genitos conseruat: itaque naturæ nomen ab Hippocrate sumptū fuisse, quo loco scripsit *ἡ φύσις τοῦ σώματος ἡ δύναμις*, Galenus auctor est, scribens per Naturā intelligi Vim quandam corporibus insitam & inhabitantem, per quam ea reguntur, siue vt idem scripsit initio lib. 2. de sympt. caus. Omnem facultatē quæ animal siue voluntatis nutu siue citra hunc, regit. Itaque natura est quæ animal ab initio conformat, auget, nutrit, & omnia in corpore munia exercet. Quæ cum pariter caloris natui opera sint, (est enim secundum Hippocratem omnium operum naturalium auctor) necesse est vel naturam esse ipsum calidū innatum, vt Gal. lib. 1. *ἡ παρὰ φύσιν* & alibi sæpē prodidit, vel id primum esse naturæ instrumentum, vt Galeno pluribus in locis placuisse video. Sed citra controuersiam omnino est, cum natura pluribus modis dicatur ab Hippocr. eum cum sæpissime, tum toto libro de natura humana, Naturæ nomine temperamentum intellexisse, atque id esse præcipuum & maxime propriū Naturæ significatū, ab ipsa naturæ substantiā desumptū, vt Galenus in Aphor. 2. lib. 3. annotauit, quo scripsit Hippocrates, naturarum has quidem æstate, has vero hyeme bene maleue se habere. Quod si quis contendat naturam non satis temperamenti nomine explicari, definiat si volet, naturam esse vniuersam substantiam ac temperiem quæ ex primis elementis constat, vt & Galenus lib. 3. de temper. definiuit. Est vero & alia licet minus propria Naturæ significatio, qua sumitur *αὐτῆς τῆς φύσεως*, vt vbi scripsit Hippocrates, maxime moriebantur quibus Natura vergebat ad phthisim. Hic namque Naturæ nomine ipsam partium structuram compositionemque intelligit. Est quando etiam Natura significat idem quod genus vel species vel forma, vt cum dicimus hanc febrem huius vel illius Naturæ esse.

*ἡ φύσις τοῦ σώματος*. naturalis facultas. Distinguitur bifariam à Galeno, in primas siue principes, & in secundarias siue ministras. Primæ statuuntur triplices, generatrix, auctrix, nutritrix. Nam & totidem sunt naturæ opera, quæ primum quidem in vtero fingit animal, & omnes corporis particulas effor-

mat, deinde eo in lucē edito omnes ad perfectam magnitudinem perducit, postea vero etiam vt omnes quātum fieri potest perdurent molitur. Sed formatrix quidem primas absolute partes sustinet, eique in ipso vtero auctrix & nutritrix famulantur. Vbi vero formatum animal est, vsque ad ætatis vigorem auctrix virtus dominatur, auxiliatrices & veluti ministras habens alteratricem & nutriticem. Nutrix vero à prima formatione ad mortem vsque actionem suam exerceat. Itaque generatio, auctio & nutritio prima naturæ operum ac veluti capita sunt, proindeque tres facultates primæ atque principes horum effectrices, quæ tamen tum ipsarum inter se tum aliarum ministerium desiderant, quas secundarias possumus appellare. Harum numero sunt quatuor, vna attractrix, altera retentrix, tertia concoctrix, quarta expultrix dicitur, quæ non in iecinore modo, sed in omnibus vel minimis etiam corporis partibus insunt, genere quidem plane eadem, sed numero valde differentes. Et carnes & nervi & ossa pariter ad sese alimentum attrahunt, sed multum ab inuicem dissimile: & concoquunt quidē omnia, sed varia admodum concoctio est, pro cuiusque partis natura, & tamen omnes eas vires atque facultates quamuis tam differentes à iecinore sortiuntur, à quo tanquam à fonte in vniuersum corpus illæ deriuantur. Est enim principium vegetabilis facultatis, qua non animalia modo, verum stirpes etiam & quæcunque alia viuunt, gubernantur. Ac quanquam natura per vniuersum corpus sit diffusa, & omnes actiones ab ea proficiantur, & nullum opus non possit naturæ tribui, adstringitur tamen à medicis facultatis naturalis nomen ad eas actiones, quarum principium & sedes iecur est. Nam sicut rationalis & irrationalis animæ vim & quæ ad sensum motumque pertinent in cerebro statuerunt, & in corde irascibilem atque pulsificam, sicut iecinore concupiscibilem & quæcunque nutriendo corpori conueniunt, tanquam in suo fonte collocarunt. Nec interest, vt scripsit Galenus, eamne appetitricem seu naturalem seu altricem voces, veluti nec si animam aut facultatem.

*ἡ φύσις τοῦ σώματος*. pars est medicinæ quæ naturam hominis vniuersam à conceptu ad extremum vsque senium disquirat. Ad eam pertinet omnis de semine deque menstruo sanguine, de partium conformatione & principatu, de fœtus perfectione, similitudine cum parentibus, de anatomia singularum partium, earumque differentiis, & temperamenti, de ætatibus, de calore natui & spiritibus, de tribus facultatibus nostrum corpus dispensantibus, de humoribus, aquis, aere, locis, consuetudine & cæteris id genus disputatio. In qua communibus quidem naturalis scientiæ principiis atque theorematibus utitur, sed quatenus hominis cognitioni inferuire

uireatque accommodari possunt. Eam quidem medicinæ partem Empirici atque Methodici aspernati sunt, sed Dogmatici, quorum princeps fuit Hippocrates, plurimi fecere.

**Φυσαλίς.** halicacabo similis, paulo tamen maior, vesicaria, siue *ελυκαχάβος*, appellatur. Fit ex ea pastillus, ut tradit Eras. valet ad renum & vesicæ affectiones, etiam si pus aut sanguis, aut corpuscula mucosa, aut fibris similia, aut crassa per urinas exeant. Idem bibitur & in vesicam iniicitur, ut prodit Aetius lib. i. i.

**Φυσώδες νόσημα.** flammofus morbus, qui & hypochondriacus dicitur. Species est melancholiz, de qua vide suo loco.

**Φυτάρια.** postrema hyemis pars, sic dicta à veteribus quod eo tempore infusiones optime fierent, vide *χρυσόν*. At *φυτάρια*, locus est vitibus aliisque arboribus constitus, hortus, apud Homerum & alios poetas: apud quos etiam pro plantatione accipi volunt nonnulli.

**Φύπτον.** sic dicitur ab Hippocr. ipsum ferendi tempus, ut explicat Galen. in lexico Hipp. secundum quam significationem dicuntur ab Hippocr. & *φύπνιμελα*, ligna quæ in terram panguntur ferunturque.

**Φύπνιμα.** herba est folio struthii, sed minore.

fert copiosum semen perforatum, radicem parvam, tenuem, per summa terræ nitentem.

**Φαίδης.** ab igne in curibus exorientes circuli rubri, quos diximus ante *φαιδίστας*, ut explicat Galeus in lexico Hippocr. Apud Erotianum contracte *φάδης*, quod Doricum esse scribit, & à nonnullis exponi *φαιδίστας*, pustulas.

**Φανατοί.** dicuntur qui vocis curam habent, etiamque magno studio exercent, quales sunt tragædi, comædi, præcones, citharædi.

**Φῶς.** dicitur circulus subniger qui papillam ambit. Sic etiam, ut scribit Oribasius, vocatur medium transversariorum quæ in Nilei machinamento sunt, quod plinthium appellatur.

**Φωσφόρος.** est collyrium *φάσφορον*, quod à Galeno libro quarto *πρὸς τὴν πύξιν*, & ab Aetio libro septimo describitur. Recipit glaucii drach. xxi. i. i. sarcocollæ drach. v. i. i. croci drach. viii. opii drach. viii. myrrhæ drach. viii. misyos vsti drach. viii. gummi drach. x. i. i. Excipiuntur aqua pluvia. valet ad dolorem & omnem inflammationem & vehementes epiphoras. Est autem aduertendum, male apud Galenum legi *κρίμμεως* < id est enim scribendum *κρίμμεως* < id est. error facilis est.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

### T O X.



**Χειρὸν.** gingidium. erraticæ pastinacæ folium æmulatur, aliquanto tenuius, radícula candicante, subamara. Apud omnes manditur & crudum ex aceto & iuribus inco-

ctum. dictum à Græcis est quod foliis luxuriet. Chærefolium à multis nuncupatur.

**Χαίτη.** quanquam proprie iubam significet in quadrupedibus, qualis est leoni mari, dicitur tamen & in homine *χαίται*, *αἱ ὀπίσθεν καὶ τὸ πρὶον ἀφαιρέμεναι τεύχεος*, hoc est, pili qui à parte posteriore secundum occiput prominēt: sicut scripsit Rufus: ut & *ἰουλοι, αἱ ὀπίσθεν καὶ τὸ πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν τεύχεος*, hoc est, pili circa tempora oriundi.

**Χαλαρά.**

**Χαλαρά.** sunt tubercula quædam pellucida grandini similia, per cutem sparsa. Author enim introductionis seu medicæ *χαλαρά* recenset inter eos affectus qui in quacunque parte corporis consistunt. Inuadit tamen præcipue oculorum palpebras, si quando in ius lentus quidam humor concreuerit. Sunt

autem, ut ait Celsus, tubercula parua in palpebris mobilia simulatque digito huc vel illuc impelluntur, condunturque aliquando sub cute, nonnunquam sub cartilagine, non dissimilia *κρίστας*, sed non figuræ eiusdem. Sunt autem rotunda & pellucida, ideoque grandini similia, iisque dissectis humor manat candido oui similis. Dicitur & hic affectus *χαλαράσι ἐν τῇ εἰσαγωγῇ*.

**Χαλαράσι.** grandinatio. Sunt eminentiæ quædam intra palpebras grandini similes. vide supra *χαλαρά*.

**Χαλαρόν.** laxum. dicitur apud Hippocr. pars recti intestini laxior, videlicet ad differentiam oræ eius infimæ quæ sphinctere musculo adstricta est, ut scribit Gal. initio libelli de dissectione vuluæ.

**Χαλαστικά φάρμακα.** relaxantia medicamenta. Dicuntur medicamenta quæ tensioni medentur. Itaque cum tensio, multis modis contingat, non videtur vna esse laxantium species, sed alia humectando laxant, alia calfaciendo, alia molliendo, alia vacuando, alia tumores præter naturam purgando, alia aliud quiddam faciendo. Attamen si vniuersalem quædam horum omnium substantiam constituere licet, ea certe erit ex genere mo-

dice calfacientium: sic enim & conpuiencia corporis laxantur, & flatuosi spiritus tenuantur, & quod phlegmones iam conflatum est digeritur. Præcipuas in eorū ordine partes tener oleum chamæmelinum, item adipēs, butyrum, cæsyus, & reliqua quæ intra secundum gradum calfaciunt. Verum Methodici multo longius *ἡ χαλκήνη* nomē extendunt, vt docet Galen. ad omnia remedia significanda quibus adstrictus affectus, quo vna cum fluente humore omne morborum genus comprehendebant, curaretur. Itaque & venæ sectionem *χαλκήνη* esse præsidium dicebant, & omnia similiter purgantia medicamenta.

*Χαλβάν*. galbanum. Est succus e planta ferulacea. Nascitur in Syria Dioscoridi, & *μαύρον* aliqui vocant. Maxime probatur cartilaginolum, pingue, similitudinem thuris præferens: item purum minimeque lignosum sed in quo non nihil seminis ferule sit admixtum. præterea graui odore, neque humidum, neque reorridum. Vi emolliendi & digerendi præditum est. Excalfacit tertio ordine incipiente, aut secundo completo: desiccatur vero secundo incipiente.

*Χαλκήνη*. sic dicitur à quibusdam *μαύρον* *Σύρι*.

*Χαλκήνη*. atramentum sutorium. Est succus concretus, ex chalcitide genitus & efflorescens. Ac cum quinque species sint eiusmodi succorum concretorum, scilicet, melantéria, chalcitis, misy, & de quo nunc agimus atramentum, in coloribus præsertim differētia est. Cum enim quatuor priores species coloris sint vel cinerei & nigri, vt sory & melantéria, vel rubri & aurei vt chalcitis, vel lutei & aurei vt misy, atramentum sutorium alterius est coloris & varii. Nam & candidum est albæque violæ simile, quod *λευκόν* vocant: & pallidum, & viride, & cæruleum, & omne præterea perspicuum & nitens, vnde superior ætas vitriolum appellauit. Differunt quoque prædicti succi eam re, quod priores illæ quatuor species naturæ semper sint, atramentum vero sutorium & natium & factitium habeatur. Natium quidem quod & fossile dicitur, ex chalcitide, vt dictum est, efflorescens & concretum, & natura tam simile chalcitidi, vt in hanc tandem per se redeat annorum spatio, sicut se vidisse Galenus memoriæ prodidit. Id aliquando quidem pendet ex metallorum cameris stitiarum instar, aliquando vero in terram deciduū est & iacet humi: quorum vitrunque quoniam distillando concretit, *χαλκήνη* *ἐπὶ χαλκῶν* Græci nomināt. Id vel simile est capillis & plumis, vel habet stitiarum aut glebæ figuram, quæ etiam factitia est, cuius glebæ ex cubicis quibusdam corpusculis coagmentantur, perinde atque vna ex acinis. Factitium vero duplex etiam est. Alterum proprie *πικρὸν* vocant Græci, id est concretum, quod e terræ cuniculis aqua atramentosa vel elata & in piscinas ef-

fusa, quemadmodum narrat Galenus, vel inde corruata, frigore aut calore solis con- crescit in chalcanthum: alterum vero *ἰσθύν*, id est coctum, quoniam aqua atramentosa in ahenis decoquatur: est autem ea aqua, vt ait Galenus, viridis, chalcitidis & æruginem redolens, & gustus quoque eiusdem. In medicina vsu præstat fossile, cæruleum, graue, spissum, pellucidum: secundas tenet quod *πικρὸν* diximus vocari. Adstringit vehementissime & valde calefacit & siccatur, quare sanguinem profluentem e vulneribus sistit, vlcera sordida purgat, & minuit excrescentia.

*Χαλκήνη*. est medicamentum metallicum, colore æris, intercurfantibus oblongis venis splendentibusque. Nascitur in iisdem metallis in quibus *σῆρον* *καὶ μέσον*, mediumque inter ea non tantum loca, sed etiam viribus. Primum enim *πικρὸν* solet occurrere, deinde *ἡ χαλκήνη*, postremum *πικρὸν*. Est enim *μέσον* tenuissimū, *σῆρον* crassissimū, mediam vero rationem *ἡ χαλκήνη* habet. Sed & temporis spatium in se inuicem transeunt, quemadmodum narrat Gal. *πικρὴ χαλκήνη* per triginta fere annos domi suæ asseruatam, in *μέσον* versam se vidisse. Ex quo apparet hæc tria specie eadem esse, solaque naturæ concoctione & perfectione ab inuicem differre. Cæterum *ἡ χαλκήνη* missim adstringit & acris est: sed vincit acrimonia, quæ tanta est vt carnem vrat & crustam inoueat. Itaque eam vrere præstiterit, quod & ipsa mitius vrat, desiccet, adstringat, minusque acris sit atque mordax. Inter venena numeratur quæ rosione interimunt. Hippocr. *χαλκήνη* vocat. quam eandem esse cum chalcitide, Galannorat in lexico Hippocr.

*Χαλκήνη*. æris squama quæ & *χαλκήνη* simpliciter dicitur. Sunt tenues & squamosæ æris particule, quæ vel de æreis panibus, vel de clauis malleolorum ictibus excutitur. Hanc *ἰσθύν* appellant, id est clauarem, cui & primas tribuit Dioscorides. Itaque in hoc squama differt à flore, quod illa vi excutitur, hic sponte ab ære refrigerato excidit. Probatur squama quæ crassa est & æris modo rubens, & quæ, cum aceto aspergitur, æruginem ducit. Vehementer siccatur, præsertim *ἡ χλῆς*. Nam & subtilissimæ omnium substantiæ est, vt quæ nonnohil æruginis assumpserit. Detrahit similiter & liquat carnem & acriter mordet, ex quo perspicuum est non admodum tepuis esse substantiæ sed potius crassæ.

*Χαλκήνη* *αἰθρῆς*. æris flos. Sunt minutæ æris particule à reliquo eius corpore resolutæ, milii specie, breues, ponderosæ, friabiles, in attritu fuluescentes, in modice splendentes, atque constringentes. Fit autem duobus modis, vno cum æs e lapidis panibus in fornace excoctum fusumque in receptacula delabatur per colla fistularum ad ea pertinentium: altero vero cum in singularis foci receptaculo æs, à quo plumbum & argentum fuerint separata



quem *ῥῖον* siue *αὐλίσσον* nominant, lethalis prorsus & venenatus, nisi eum aliquis putet albi speciem esse, quod de albo scripserit Dioscorides, ipsum *ῥῖον* ideo aliquibus vocari, quod quibusdam in locis viscum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche vti- tur mulieres. Sed vide num hæc appellatio ad nigrum magis pertinere debeat, cum Galen. ipseque Dioscorides chamæleonem album propinantes, vt dictum est, non distinxerint an viscum necne fundat, cum tamen *ῥῖον* deleterium esse constet si bibatur.

*χαμαίριον* etiam dicitur à quibusdam à *ῥῖον*, vt habetur apud Diosc.

*Χαμαίριον* vocari à nonnullis hierobotanen, tradit Apuleius: pro quo Dioscor. codices habent *χαμαίριον*.

*Χαμαίριον*, dicitur à *αἰθέρις*, ab odore mali, vulgo camomilla. vide *αἰθέρις*.

*Χαμαίριον*, aiuga siue abiga, siue thus terræ, vt ait Plinius. Nunc ab officinis & herbariis iua molchata dicitur. Est herba per humum serpens, incuruæ similis, foliis semperuiui minoris, sed multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis, odore pinus, flore tenui, luteo vel candido, radicibus cichorii. Est & altera eius species eiusdem nominis, cubitalibus ramis, anchoræ modo incuruis, minutis crinibus, coma supradictæ, flos candidus, nigricans. semen oler pinum vt superior. Tertia masculus dicitur, paruula, lauior, foliis exilibus, candidis, pilosis, coliculo crasso & albo, flosculis melinis, semine pusillo secus alas, eodem odore quo cætera item species. Habet autem à *χαμαίριον* & amarorē & acrimoniā, vimque abstergerē expurgandique maiorem quam calfaciendi: itaque iecinoris obstructions pcommode soluit, menses & vrinas mouet. Siccat tertio ordinē, calefacit secundo. Dioscorides scribit hypericum etiam *χαμαίριον* à quibusdam vocari, quoniam semen odore resinam imitetur.

*Χαμαίριον*, dicitur à quibusdam à *χαμαίριον*, vt Apuleius tradit. Apud Diosc. est *χαμαίριον*: minus recte. nam *χαμαίριον* significatiōnem habet illud compositum.

*Χαμαίριον*, herba est ramos habens digitorum quaternum, teretes, succosos, per terram sparsos, folia lentis effigie, peplo similia, parua, tenuia, quæ à terra non attolluntur, semine sub foliis rotundo, vt in peplo. neque caulem neque florem promit. radice tenui & superuacanea est. Est autem à *χαμαίριον* acris & abstergens.

*Χαμαίριον*, oleago, vel olæastellum. Est frutex furculosus, foliis olæ similibus, tenuioribus, gustanti amaris & mordacibus ita vt linguam vellicet & arteriam exulcerent: officinæ mezereon appellant. Detrahit pituitam bilemque, foliis præsertim in cataportio deuoratis: namque duæ absinthii partes, vt scribit Dioscorides, adiecta chamelææ vna, hydromelitis excipiuntur, & in cataportia

coguntur. Ea autem in ventre non lique- scunt, siquidem quotquot fuerit deuorata regeruntur.

*χαμαίριον*, dicitur à quibusdam à *χαμαίριον*, vt habetur apud Dioscor.

*Χαμαίριον*, dicitur primum genus tithymalli. Est autem tithymallus masculus, caules habens supra cubiri altitudinē, rubros, lacteo succo atque acri madentes, folia autem olæ circū ramos angustiora & longiora, radicem cras- sam & lignosam. Pendent in cacuminibus caulium comæ iūci, sub quibus caneolæ foliis balnearum similes, in quibus semen continetur. Nascitur in asperis & monti- bus. Dioscorides aliis nominibus à quibus- dam *χαμαίριον* & *ἀμυγδαλοειδές* & *κωβιον* tradit appellari. Gallis nunc magna ex parte expurgia nominatur. Eius enim succus aluium purgat, trahitque pituitam & bilem binis o- bolis in posca sumptis, & cum aqua multa vomitiones mouet.

*Χαμαίριον*, id est *ὀξύμηνον* ὑπὸ τῷ *χαμαίριον*, exacer- bato & vehementer offenso ob chara- cterem, vt annotat Galenus in lexico Hip- pocratis.

*Χαμαίριον*, id est in diuersum trahens, vt Dioscorides legit, & sic dici vulgas ait, ex eo quod aperiuntur, vt annotat Galenus in le- xico Hippocr.

*Χαμαίριον*, coloris albi genus, sed paulo plus ab albo quam glaucum declinans. Est enim glaucus color veluti cornu pellucidū, charo- pus vero similis est pilis subalbidis cameli, vellapidi quem *ὀνυχίον* appellant: vt scriptū est ab Aetuar. lib. 1. *περὶ ὕψους*, cap. 8.

*Χαμαίριον*, oscitatio. Symptoma est facultatis seu actionis animalis motricis. Est enim deprauatus maxillæ inferioris motus. Fit propter humiditatem flatuosam vel spiritum vapo- rosum contentum in musculis maxillam in- feriorem aperientibus: frigida autem pror- sus causa est, eoque fit vt & pinitia accessio- num & somno maxime appetente crebræ fiant oscitationes, vtque illæ etiam tum vi- no, tum magna raraque spiratione discuti- antur, vt docuit Hippocr. aphor. 1. 6. libr. 7. & libr. 6. *περὶ ὀσμῆων*, scribens Medicatori- um oscitationum continuarum longum an- helitum esse. Eum autem humorem natura dum conatur expellere, maxillam mouet & agitat, hiatumque oris inducit: sic vt ab aliis partibus excrementa depellat, eadem mo- tus alios exercet, vt pandiculationem, tus- sim, singultum, vomitum, horrorem & alios iis similes. Sed vomitio quidem & tussis & horror validi omnino motus sunt: pandicu- latio vero & oscitatio, mediocres, inter quæ aliud etiam discrimen est à Galeno pro- ditum, quod cum eiusmodi omnium sym- ptomatū alia naturæ sint opera, à morbo- sa tamen causa coactæ, alia morbosos comi- tentur affectus, nil contra moliente natura, alia vero fiât natura & morbo ad actionem simul concurrentibus, oscitatio gignatur so- la facultate natura que agente, velut & tus- sis &



sis & pandiculatio & singultus. Hæc enim solius facultatis opera sunt aduersus causam morbosicam insurgentis.

*Χαῦνον*. molle & digitis cedens, apud Hippocr. lib. 1. *ἥν δ' ἀνδρῶν*. vt Gal. explicauit.

*Χείροψ*. dicitur speciatim id leguminis genus quod manu capitur, vt scribit Gal. lib. de attenuante victu. vide *δημιτεια ἀνδρῶν*.

*Χείρα γυν.* nomē est emplastri purgatorii quod sibi in vsu fuisse Aetius scribit. Impositum vmbilico mouet inferiorem ventrem. Est & apud Paulum vnguenti nomen, quo peruncta sedes aluum mouet & subducit. Sic dici potest quicquid affert cacandi necessitatem.


*Χείλος*. labrum. Sic dicuntur oris extremitates musculosæ, ipsum vicissim claudentes aperientesque. Labrorum quidem substantia carne quodammodo fungosa cōstat, & ipsa tota labrorum cute, & oris amplitudinem succingente tunica & quatuor musculis cōfusa. Est autem ea valde mobilis in omnem partē: sursum quidem à binis vtrinque musculis qui à malis descendunt, quorum duo supernum, totidem infernum sursum attollunt: deorsum vero à binis similiter, qui vtrinque à menti lateribus in labrum tum supernum tum infernum ascendunt. Horum autem congeneres duo, dum simul agunt, labrum motu recto mouent: dum alteruter tantum obliquo. Ad hæc fibræ eorum qui labrum supernum attollūt, & infernum deprimunt, internæ quidem intro versus dentes, externæ vero foras versus cutim labra euertunt. Sic quatuor habentur in labris muscoli, à quibus octo motuum differentiæ perficiuntur, quemadmodum lib. 11. de vsu part. Galen. demonstrauit. Sed hos prope omnes labri vtriusque motus nō parum iuuat musculus latus, ab aurium radice, occipite, spinis omnibus ceruicis, spina omoplatæ, acromio, clauī, sterno exortus, torusque tenuissimus in faciei partes pene omnes, fibris à tam diuersa origine variis insertus, easque ob id in omnem prope partem mouēs. Dicitur *χείλος παρὰ τὸ χεῖν λόγος*, hoc est, quod sermonē emittat & fundat. Cæterum quod in labiis prominet, *πρὸς χείλον* dicitur: ipsa autem labiorum sectio quæ τὸ σῶμα efficit, *μαύρα* & *λογοῖν* vocatur, auctore Polluce: *πρὸς σῶμα* autem siue *πρὸς σῶμα*, labiorū murus congressus: *φίλτρον* vero, cavitās quæ superiori labro inest, vt alia quæ in inferiori est, *πίπος* & *νύμφη*.

*Χειμερῆν*. dicitur à quibusdam τὸ αἰεῖν, siue secundum minus, quod hyemes toleret neque vnquam moriatur.

*Χεῖμῆν*. ἡ ψυχρός, ὀργῆς. hoc est frigus, rigor. vnde *χεῖμῆν*, in frigidata, gelu correpta: vt annotat Gal. in lexico Hippocr.

*Χεῖμῆν*. hyems. Est tempus anni frigidum & humidum, Vergiliarum occasu incipiens, & æquinoctio desinens. Est enim per se ea temperie prædita hyems, nec ex comparatione cuiusquam talis dicitur, sed quod in ea humiditas superet siccitatem, & frigiditas calorem. Initium sumit quinto vel sexto circiter Nouembris die, cum scilicet Vergiliæ occidunt, duratque ad æquinoctium quod mense Martio contingit. Itaque tota hyems plusquam quatuor mensium est apud medicos. Quod quidem spatium plærique sequunt Hippocratem lib. *πρὸς ἐξορμάδων*, in tres partes diuidunt. ac mediam quidem eo tempore comprehendunt quod circa solstitium est, nec alio, opinor, quam *χειμῶνος* nomine designant: primam autem, ab initio hyemis ad hoc vsque tempus, quam *σπορῆν*, hoc est sementem, vocant: postremam autem, à medio illo tempore ad finem hyemis, quam *φυτῶν*, hoc est inferendi tempus, appellant.

*Χεῖρ*. manus. brachium. Geminam habet significationem. Nam & totum brachium ab humero vsque ad digitos, & extremam brachii partem significat, qua aliquid comprehendimus. Neque enim quæ Latine manus dicitur, nomen habet proprium apud Græcos distinctum à toto brachio. Itaque si quando alterum designare Græci volunt, sæpe addunt quo distingui possit. vt Hippocrates *ἐν τῇ πρὸς ἀρμῶν* manum significare volens, non *χεῖρα* simpliciter, quod brachium etiam significat, sed *χεῖρα ἀκραν* dixit, & Galenus lib. de Ossibus, *ἑλὼ τὴν χεῖρα*, designans totā partem brachio, cubito & manu constantem. Vsus tamen videtur obtrivisse vt simpliciter *χεῖρ*, manum Latinis dictam significet: si vero totum quod ab humero est, designare velimus, *ἑλὼ τὴν χεῖρα* vel aliter dicamus. Sunt autem totius manus, siue brachii (quo nomine nanque voces, parum interest, modo intelligas ita nūc appellari membri superioris τὸ ἀνωτερόν, vt ait Aristoteles, hoc est, bipartitam compactiōnem à thorace dependentem, quomodo sepius Gal. vsurpauit) partes sex, sed quas propriis nominibus non sit facile distinguere, propter eorum cōfusionem tam apud Græcos quam Latinos auctores. Vt autem eorū facilis sit explicatio, libuit omnes eas partes hoc diagrammate designare, & singulis quæ quisque nomina dederit exponere. Primum quidem totum id membrum variis nominibus appellatum est. Namq; ab Aristotele *βραχίον*, à Galeno sæpissime *χεῖρ*, & aliquando tamen *βραχίον* dicitur. A Latinis Celso quidem brachium, Gaza vero tum brachium tum vlna vocatum est. Partes vero ad hunc modum se habent.



**A.** Articulust est, ὄμος ab Aristotele dictus, ὠμοπλάτη à reliquis. Celsus & Gaza scapulas vocarunt. Celsus item scapula, vel, vt alii legunt, scapula operata. Plinius humerum vocauit, humerum pro ipso articulo aperte intelligens. Celsus vero humeri nomine alia, vt dicitur, partem designauit.

**B.** Pars est totius brachii maxima, terminos habens superne quidem A, inferne vero C. Hæc ab Aristotele ἀγκὼν vocatur, à Galeno βραχίον. Celsus humerum, alii lacertum dicunt. Gaza apud Aristotelem videtur lacertum agilem vertisse.

**C.** Articulust est, duo magna totius membri ossa coniungens, estque ea pars qua totum membrum flectitur, cuique innititur. vocatur ἀγκὼν ab Hippocrate, ὠλέκρον ab Arist. & Articis, vt testatur Gal. A multis cubitus, à Gaza gibber Latine dicitur.

**D.** Altera pars totius membri nō minima, imo secundum lacertum iam explicatum maxima, sita inter duos Articulos per C & E designatos. πῆχυς dicitur ab Aristotele, ab aliis ὠλήνη. Celsus brachium vocat, eodem scilicet cum toto nomine, Gaza vero cubitum vertit. Cuius pars superior ἐπὶ πῆχυ, inferior ἐξ ὠλῆς appellatur.

**E.** Articulust est, quo manus cum proximo offe iūgitur. καρπὸς à Græcis, à Latinis brachiale nominatur.

**F.** Χεὶρ à Galeno interdum, sed ἀκρὸς χεὶρ sæpius dicitur: ab aliis composito nomine ἀκροχείρον siue ἀκροχείρις. Latini manum vocant. Sic quidē se habent totius manus siue brachii partes, earumque nomenclaturæ, quas non inconcinne videtur Onidius expressisse lib. i. Metamorph. his versibus:

— laudas digitosque manusque,

Brachiaque & nudos media plus parte lacertos.

• Sed quoniam χεὶρ etiam manum Latinis proprie dictam significat, eius quoque partes sunt explicandæ. Aristoteles quidem in duas summas particulas diuidit, εἰς τὸ θῆναρ καὶ πρὸς δακτύλους, hoc est, in palmam & digitos. Palmæ duas partes facit, internam & externam. internam θῆναρ σαρκώδες appellat, hoc est volam: externam autem quæ nervosa est, dicit nomine carere. iuniores μετακάρπιον dixerunt. Digitorum etiam duas partes statuit, κότυλον καὶ φάλαγγα, hoc est, nodum & internodium. Alii vero aliter distinxere, primam quidem manus partem vocantes, καρπὸν, non nodum quidem illum quo cum brachio manus iungitur, sed eam palmæ particulam, quæ ex multis minimisque ossibus constat, nodo illi proximam. Al-

teram vero carpo annexam latamque, & ex rectis quinque ossibus constantem ad digitos tendentibus, & ex quibus ipsi digiti oriuntur, quam Aristoteles proprio nomine carere dixit, ex ipso situ μετακάρπιον vel ὀπιθῆναρ vel περὶ κάρπιον nuncupantes. Quibus duabus partibus tertiam Pollux addit, περὶ κάρπιον vocatam. Quæ vero metacarpio opposita pars est, lata & concava, & scissuris, vt scribit Aristoteles, vitæ indicibus distincta, θῆναρ, vel, vt ait Aristoteles, θῆναρ σαρκώδες nuncupatur, à Latinis vola, cuius pars, quæ digitis proxime subest, σῆθος χεὶρός, vel, vt aliis placet, ὑποθῆναρ nominatur. quantum sunt qui σῆθος γειρός ipsum metacarpium interpretentur. Ab his digiti consequuntur, de quibus suo loco agitur.

χεὶρ. emplastri nomen est, quod quinque pharmacis, vt manus digitis, constat, inæqualibus etiam ponderibus. Recipit autem Colophoniz libras v. ceræ lib. i i i i. resinae pinus lib. i i i. adipis taurini lib. i i. butyri lib. i.

χεὶρ etiam à quibusdam dictus est ὀδύλας, vt habetur apud Dioscor.

Χειράρα. dicitur arthritis, quæ manuum articulos occupauit. nec vero morbus ipse tantum sic appellatur cum viget & dolorem facit, sed ipsa etiam articulorum contorsio & imbecillitas post morbum relicta. Tophis enim articuli manent intercepti. Id enim significat ἡ ἀρα τῆς γειρός, hoc est manus captura. quamuis alii χειράρα quasi χειράρα, hoc est manus dolorem, τὸ πᾶν ἀλγῆμα πρὸς deriuari malint.

Χείρεις. significat apud Hippocr. idem quod ἡ χειρουργία, vel vniuersa simpliciter rerum omnium admotio, quæ manu perficitur, quæ & χειρομὸν appellant.

Χειρουργία ἢ

Χειρουργική. pars est τῆς θεραπευτικῆς, morbos, qui in solutione continui aut in partium externarum immoderatione consistunt, tollens sectione, vstione, restitutione in naturalem situm, & medicamentis foris apposis. Sectione enim & vstione tollit quod redundat, luxata & fracta ossa reponit in locum naturalem. Vlcera medicamentis deterget, carne implet, & cicatrice obducit. Quibus in rebus tria sibi maxime proponere debet chirurgus, tum vt breui curet, tum vt curet citra dolorem, tum vt maxime tuto. Ac rursus, vt tuto curet, tria potissimum cōsiderabit. Vnum primūque vt absolutionem operis consequatur, alterum vt sicubi hanc non consequatur, saltem cubanrem non lædat,

tertium vt vitium nō facile reuertatur. Hæc enim qui præstiterit, merito optimus chirurgus censetur.

**Χειρώνιον ἕλκος.** Chironium vlcus. Sic appellatur vlcus malignum inueteratum, quod & magnum est, & oras habet duas, callosas, tumentes. Exit ab eo sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neque in vlcere, neque in eius humore est: nulla inflammatio, dolor modicus est. Nihil serpit, ideoque nullum periculum adfert, sed non facile sanescit. Interdū tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, vlcusque renouatur. fit maxime in pedibus & cruribus. Sic dictum est hoc vlcus à Chirone, vt ab eo, inquit Galenus, qui primum id sanauit. Idem etiam *πυλῆριον* vocatur.

**Χειρώνιον.** dicitur à quibusdā Centaurium maius, vel quod Chiron Centaurus id primum inuenerit, vel quod ipse Centaurio, vt tradunt, curatus fuerit, cum illi Herculis sagitta excidisset in pedem. Ac quoniam Gentiana à quibusdam alio nomine Centaurium dicta est, factum est vt quidam eam etiam Chironiū appellarint, vt habetur apud Dioscoridem.

**Χελῶδες. πύχελος,** hoc est labia, apud Comicos veteres, teste Polluce.

**Χελιδόνιον.** herba est, cuius duæ dicuntur esse differentiae: vnum enim maius, alterum minus dicitur. Maius caule est gracili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis, foliis ranūculi, multis, mollioribus tamen & colore cæsiis, flore violæ albæ secundum singula folia prodeunte. In eo succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauiter olens. Radix superne singularis, inferne in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa; in qua semen papauere maius recluditur. Hæc officinis suum retinuit nomen, Gallis eclera dicitur. Minus vero pingitur à Dioscoride herbula sine caule, foliis hederæ rotundioribus minoribusque, pediculis quibusdam à radice dependentibus, item teneris & aliquatenus pingnibus. Radices habet pusillas, frequentes ex eodem callo prodeuntes, in tritici modum acervatim congestas, quarum tres aut quatuor tantum in longitudinem progrediuntur. Iuxta aquas & lacus nascitur. Calfacit & siccatur quarto ordine etiam absoluto, præsertim minus, quod acrius est maiore. Magnam vtrumque vim habet extergendi, maxime si quis humor crassus in pupilla collectus est, qui oculis officiat.

**Χελιδόνιον.** dicitur à quibusdam *ἡ ἀμπρολεῖον*, id est vitis alba, vt habetur apud Dioscoridem.

**Χελιδόνιον ξηρόν.** per diminutionem dictum est *χελιδόνιον*, πύβραχυν καὶ ὀλίγον βηχίον, id est parua tussicula quæ arida est, cum nihil humoris qui excreetur, in os affluit. vt explicat Galenus in lexico Hippocratis.

**Χελιδόνιον ἡ**

**Χελιδόνιον.** pars gibba dorſi, quæ collo proxime subiaceret: sic dicta à testudinis figura. Vide in dictione *ὀμπηλάται*.

**Χελιδόνιον.** testudo. est instrumentum organicum, quod in organis ad id collocatū est vt corpora quæ restituantur, paulatim & minime concussa extendantur, quemadmodū enim testudines animalia lento gradu procedunt, ita machinationes quibus illa referuntur, ex testudinibus autem nonnullæ transuersariis similes sunt, aliæ oblongæ: aliæ cubi speciem repræsentant. transuersariis similes sunt in organo Andree, fabriue: oblongæ in quadrata columna, quæ appellatur Hermes: cubum referunt in rotunda figura Heraclidæ Ephesii. Præterea testudinum aliæ cubitos & spatham attollunt, aliæ cuneatam & lunatam appendicē. quædam nihil attollunt, sed solum sunt ad extendendum inuentæ. Cubitos attollit testudo quæ sursum fertur, & cætera quæ pulchre enarrat Oribasius libro de machinamentis Ceterum testudo cōficiēbatur ex robustiori materia, vtrūta ilignea vel fraxinea, quæ secundas obtinet.

**Χήλαμα.** Galenus in lexico Hippocr. interpretatur bifidam cavitatem sagittæ qua parte in sagittando sagittam nervo applicant.

**Χήμη.** mensura est liquidorum apud Atticos, sed ea duplex. Maior / quæ est vigesima pars *τῆς κοτύλης*, pēdens drachmas tres minor, quæ est tricesima, pendens duas: sicut Cleopatra docet his verbis *χῆμη μεγάλην ἔχει δραχμὰς γ' & ἡ μικρά δραχμὰς β'.* hoc est, cheme maior pēdit drachmas tres: minor, duas.

**Χηλαί.** sic dicuntur, vt ait Rufus, ciliorum extrema per somnum sese contingentia, quæ alio etiam nomine *σεφαίαι* vocantur.

**Χήμωνις.** affectus albi oculi. Dicitur autē cum album oculi ita supra nigrum intumuit, vt nigro subsidente & albō eminente hiatus cuiusdam similitudo oriatur. Siquidem album nigro supereminet, ipsumque multis partibus longeque excedit. Id enim significat quod dixit Paulus Aegineta lib. 3. *καὶ πολυμερῶς ὀφθαλμοὶ τῶ μέλει οἱ*, hoc est, *ὀφθαλμοὶ* & *ὑπεραιεῖται* nō autem occupat, vt vulgus interpretum conuertit. Ergo cum nigrū cauum sit & subsidat, album vndique tumeat & attollatur, non inepte veteres medici malum hoc *τῆς χήμης* nomine designarunt, siue illi eo animal intellexerint q̄ inter ostrea numeratur hiatque semper, siue simpliciter hiatum qui *χῆμη* & *χάσμα* dicitur. Cæterum affectum hunc duo maxime symptomata consequuntur: vnum, rubor oculorum propter inflammationem: alterum vero, palpebrarum, vt ait Paulus *ὁφθαλμὸς*, hoc est peruersio siue contorsio, ita vt oculos tegere claudereque nō possint. Tumor enim oculi impedit quo minus palpebræ adduci committique possint. Itaque laborantes oculi perpetuo manent aperti. Est autem scribendū *χῆμωνις* per *η* non per *υ*, deriuatur enim, vt dixi, *ἀπὸ τῆς χήμης*, quemadmodum scribit Galen. *ἐν τῇ ἱατρικῇ*, seu quicumq; alius author

est. Notandum hoc loco censui, apud Galenum extremo secundo comment. *εις τὴν κατὰ ἰσθμὸν*, vbi de contractis & hiantibus agitur, male scribi *χρησιστὶ αὐτὴ τῆς φημώσεως*, & negligentius à Vidio interprete animaduersum fuisse hunc locum, idque duobus argumentis: primum quod affectus hic de quo ibi Galenus agit, ad palpebras non ad album oculi pertineat: deinde quod scribat oculum per eum affectum aperiri non posse. quod ut τῇ χρημώσει contrarium est, sic est τῇ φημώσει proprium.

*Χηρυμώσι*. sic dicuntur duo linguz sinus caui. Poll.

*Χηρία*. Latini armoraciam vocant. sylvestris est raphanus, frōde copiosior quam corpore, folio læui, rotundo ac brēni, radice tenera, exili, longa, saporis acuti. Hodie feritur ad deturbandos calculos, & vrinam ciendam.

*Χία γῆ*. Chia terra. est gleba terræ quæ in Chio insula prouenit albicans, & pollens vi adstringendi, purgandi, extenuandi. Pulcherimum est ad ambusta remedium. vide Gal. lib. 9. simpl. medic.

*Χιακὰ*. sunt species collyriorum cuius differentes habentur modi apud Aetium lib. 7. Habet & vnam τῇ χιακῷ καλλυνεῖον descriptionem Paulus Aegineta lib. 7. Idem vritur τῇ χιακῷ lib. 3. cap. 2. *τῇ φλεγμονῇ σφαιρῶν* scribens vim habere fundēdi atque humectandi. Sic autem appellantur quod vino Chio materia eorum læuigatur aut alio consimilis facultatis, nimirum austero & aquæ marinæ experte.

*Χιακὸς*. laquei nomē apud Oribasium. sic dictus est quod habent capita ad similitudinem litteræ χ aduersa inter se sunt.

*Χιλοδωάμης* ἢ

*Χιλοδωάμων*. dicitur à Cappadocibus τῇ πολυμῶν, ut habetur apud Dioscoridem.

*Χιλοφύλλον*. dicitur à quibusdam ἀχίλειος σιδιρίτης, ut habetur apud Diof.

*Χιμῆλον*. pernio. Est vlcus quod ex frigore hyberno in digitis manuum pedumque contrahitur. Oritur vero & in talo frequentissime. Sic dicitur ἀπὸ τῇ χαιμῶνι, quod hyeme maxime proueniat: vnde & χιμῆλον quidam scribunt.

*Χιον*. medicamentum est ophthalmicum, vires habens repellendi & obstruendi. eius meminuit Paulus l. 3. c. 22. *τῇ περὶ πρὸς τὴν ὄψιν*.

*Χιονόβυ*. vide supra in ὑδρόβυ.

*Χιτὼν*. tunica. Est pars corporis simplex, alba, nervosa, lara, plana, valida, tenuis facileque dilarabilis. Hæc Græci nūc ὑμένα, nūc μίλην γὰ indifferenter appellant. Res enim eadem est, sed rationes diuersæ. Nam cum partem aliquam veltit, χιτὼν: cum cerebrum foris integit, μίλην γὰ: alias ὑμὴν dicitur. verum τῇ ὑμένι nomen à substantia, τῇ χιτῶνι vero ab vſu inditur. Siquidem membrana costas succingens vtroque nomine vocatur: membrana quidem ab efflētia, tunica vero ab vſu, ut docet Galenus initio lib. 7. de anatomicis administrationibus.

*Χλωροῦται*. dixit Hippocrates, perinde ac si dixeret *χλωροῦνται*, id est vireſcunt. vt annotat Galen. in lexico Hippocr. nam χλωρῖ, pro quo communis lingua χλωρὴ dicit, virentiæ germina significat. Sic & χλωρὸς, & contracte χλωσ, est viror, seu viriditas: interdum etiam pallor. Ab eadem origine χλωρὸν & χλωρῶδες dicitur τῇ χλωρῶν, viride seu virens, ut idem Galen. ibidem docet. Erotianus vero χλωρῶν exponit non modo χλωρῶ, sed etiam ἰκτεράδην. Eidem Hippocrati *χλωροῦσθαι* est viriditas clare fulgens, pellacens, & in aequum colorem vergens, ut idem Gal. author est.

*Χλωρὸν*. duo significat, interdum quidem viride, ut cum brassicam χλωρὰ dicimus. Quod coloris genus, ut scribit Galen. comment. 1. in progn. rubro nigrius est, & veluti principium quoddam nigri & liuidi. Prouenit à frigiditate, ut & color niger, sed longe minori. Interdum vero pallidum, quod proprie ὤχριν dicitur, ex loquendi quadam consuetudine Asianis Græcis familiari, qui aliquos pallore suffusos videntes, quætere solent quæ de causa χλωροὶ euaserint, non arbitran- tes χλωρὸν atque ὤχρον ab inuicem differre, ut annotauit Gal. cōm. 2. *εις τὸ πρὸς διαφύτης ὕψιν*.

*Χοανόν*. nomen est emplastri quod describitur à Celso l. 5. c. 19.

*Χοάνη*. est cauitas in cerebro membranosa, ex portione meningis tenuis siue χοροῖδης facta. Hæc incipit vbi meatus duo coeunt, vnus ex fundo medii ventriculi, alter à meatu in ventriculum postremum. desinit autem in glandulam cerebro & crassæ meningi inclinoide subditam, quæ pituitam ex medio ventre per hanc choanā, id est ductum & canalem, influentem transcolat in palatum & nares. à quibusdam πύλος dicitur.

*Χοδὲς* ἢ

*Χοῦ*. est mensura liquidorum apud Atticos, capiens ζέτας, id est sextarios, sex, siue libras nouem, siue καπύλας Atticas duodecim. Plinius vertit congium, habetque ad stipulatorum Fannium his versibus:

*Heminas recipit geminas sextarius vnus:*

*Adde duos chus, sit vmlgo qui est congius idem.*

Eius nota apud Græcos fuit χ cum • desuper imposito.

*Χοίνη*. est mensura aridorum Attica, continens καπύλας treis siue sextarium vnum & dimidium, siue duas libras mensurales & quadrantem. Eius nota fuit χ, desuper imposito.

*Χοιρὰ*. struma. Est tumor durus glandularum quæ in ceruice, alis & inguinibus sunt. Oritur non ex calida quidem materia, neque ad suppurationem tendente, sed pituitosiore & frigidiore, qui subinde affluens strumam non modo duram, sed miræ etiam magnitudinis aliquando excitat. Omnis autē struma includitur membrana quemadmodum steatoma, atheroma, & meliceris, & nascitur plarumque in priori ceruicis parte aut in altera, aut vtrinque vna, aut dua, aut plures. Accidit vero aliquando, licet raro, ut

non

*corallina, f. corallina corallina. hoc cũ i facode*



videtur esse eadem. Est enim isatidis color huiusmodi.

*λευκόδις*. vitellina, hoc est onorum et idorum vitello colore & consistencia similis. Crassa est & summe flaua. fit ex flaua bile impensius digesta & discussa ab immodico calore, & proinde spissescente. Media fere est inter naturalem bilem & eam quæ ad summam malignitatem peruenit. generatur intra vasa, vt scribit Galen. lib. de atra bile: sæpe tamen vomitu & deiectione reddi solet.

*μυκάρα*, nigra. hæc genus bilis iam excessit & in alia humoris specie continetur, de qua separatim suo loco agitur.

*ζαυρί*. flaua. hæc proxime ad naturalem bilem accedit, quam mediam esse oportet inter pallidam & flauam.

*ορειάδις*. obscura. hoc bilis epitheton habetur apud Gal. comm. 4 in libr. 6. *πύρρην*. videtur autem designare *πύρρην* & *πύρρην*.

*πορραειδής* & *μεγαστήρις*. porracea. hæc in ventriculo sæpe gignitur ob ciborum quorundam cruditatem, aut etiam his non sumptis prouenit interdum a morbo seu calore præter naturam in venis, a quibus in ventriculum & intestina comineat. Nec tamen fit a vehementi calore, vt *ισαδής*. Nam virides quidē ambæ sunt, sed *ισαδής* a vehementiore calore acrior, mordacior, crassior: *μεγαστήρις* vero multo minus acris, mordax crassaque est. Galenus libro 3. de aliment. facult. scripsit biles quidem omnes in morbis grauib. præter porraceam excerni, flauam vero & pallidam & porraceam etiam sine morbis eueni sæpe numero & deici, quod est argumentum porraceam ab æruginosa caloris excessu differre.

*πύρρα*. rufa. fit a calore quam flaua minus intenso. Vt enim color rufus inter pallidum & flauum medius est, sic & ipsa generandi causa. Itaque propter horum colorum vicinitatem sæpe nomina ipsa confunduntur, vt scribit Galenus lib. 1. de crilibus cap. 12.

*υγεία*. liquida. hoc est multo sero, aut alio humore perfusa.

*υδατώδης*, aquosa. Eadem cum *πύρρα*. *υπερουβρός*. subrubra. quæ cum sanguinis sero aut tenuiore sanguine mistam habet substantiam alterius a sanguine coloris.

*φαία*. fusca. eadem quæ & *ορειάδις* & *μυκάρα* dicitur.

*χλωρός*. viridis vel pallida. Vtrūque enim *πύρρην* significat, vt multis in locis Galen. annotauit. Sed quæ proprie viridis est, bile pallida & crocea tingitur.

*αχρός*. pallida. hæc omnium moderatissima & minimum calida, amara mordaxque est. gignitur intra venas in corpore secundum naturam se habente. Humidior minusque flaua est, vt quæ permixtum habeat pituitosum humorem tenue vel aquosum aliquod excrementum. Hæc nomine bilis cum

absolute & sine alia adiectione dicitur, frequentius quam flaua intelligitur, quoniam minorem caloris excessum, qui omnis contra naturam est, significet.

*Χολή*, *χολής* & *χολή*. quod bilem ducit & vacuat, vt annotat Galenus in lexico Hippocr.

*Χολή μέλαινα*. bilis atra, dicitur quidem communis significatione omnis humor crassus & niger, siue sanguinis limus fuerit, siue sanguis vltus, siue bilis supra modum torrida, siue alio quouis modo genitus: verum proprie appellatur humor præter naturam ex vltione redditus mordax, acidus, acerbus, splendidus, exedens, malignus, qui effusus in terram ebullit, eamque fermenti & aceti modo attollit, & vlcera insanabilia excitat, tamque insauis est, vt eam nec musca, nec mus, nec aliud quoduis animal degustare velit. Huius generatio duplex est. Nascitur quidem præcipue ex humore atro & feculento supra modum exulto & putrescente: sed longe malignior ex flaua bile vehementer vltis, quanto ipsa bilis flaua humore melancholico seu sanguinis fece malignior est. Aliquando vero & ex vitellina bilis vltione prouenit. Talis autem mutatio contingit a calore præter naturam & putredine, a quibus actimoniam acquirit, & velut cinis quidam redditur, sicut vini fæx ante vltionem frigida & sicca, post vltionem tam calida est vt carnem vrat, liquet, corrumpat. Hanc nunquam nisi in perniciem excretam fuisse Galenus se obseruasse memorie prodidit. Talis quidē est *πύρρα* & *μελάνα*, manifesto distincta *πύρρα* & *μελάνα*. Hic enim inter elementa corporis censetur cum sanguine confusus ad generationem nutritionemque animalis, nihil habens acidi, nihil acris, nihil erodentis, sed veluti sanguinis limus, fæci vinorum crassorum proportionem responderet. Eum lien ad se trahit, iecur & sanguinem expurgans, eoque ad sui nutritionem alterato vtitur, eiusque reliquias ad ventriculum expellit, vna cum aliis excrementis vacuandas: huius namque atri humoris excretio siue per vomitum, siue per aluum fiat, non raro salubris est, significans corpus nulla intemperie vexari, sed naturam robustam, sola copia grauata, eo se ornare expedire. Verumtamen si diutius in corpore retinetur, nec vacuatur per meatum aliquem sensibilem aut occultum, iecur grauatur & debilitatur, atque etiam transmutatur & putrescit, & a febre inflammante vtitur, fitque bilis illa atra exquisita, de qua modo diximus.

*Χολή*. dicitur a quibusdam *πύρρην*, vt habetur apud Dioscor.

*Χονδρίλη*. chondrilla. Sunt qui *αχρός*, qui etiam *αχρός* appellant. Herba est, vt placet Dioscoridi, folium, caulem, flosculum, cichorio similem edens, & a ramulis mastichen fundens tuberculo fabæ. Hanc *αχρός* speciem esse, & *αχρός* a quibusdam nominari scribit Gal. & eisdem prædictam esse viribus, paulo

tamen amariorem, & ideo maiore vis-  
candi præditam. Describit & Dioscorides a-  
liud chondrillæ genus, folia habens intubi,  
circumrosis similia, oblonga, humi substra-  
ta, scapum lacte madentem, radice tenui, in  
mucronem turbinata, flavescente, succosa.  
de hoc intelligenda sunt quæ Galenus scri-  
psit lib. 2. de aliment. facult. Esse aliud olus  
lactucæ sylvestri simile quam *χόνδριον* ap-  
pellant, quæ citius in caulem assurgit, ama-  
ritudinemque habet magis perspicuam, &  
lentum quendam succum albumque cui-  
usmodi est tithymallorum succus, non ta-  
men perinde acrem. Est autem dicta *χόνδριον*  
ab rei euentu, quod callum quendam tu-  
berculo fabæ, gummi mastiches aut nucleo  
thuris, quem Græci *χόνδριον* vocant, similem  
imis ramulis ostendat: ex quo patet per  
scribendam esse. Notandum tamen & hoc;  
apud Galenum & Paulum simplicem, apud  
Dioscoridem & Aetium gemino scriptum  
legi.

*Χόνδρος*. communi significatione dicitur gra-  
num, & quod seorsum ex aliquo concreuit,  
ut salis frustum aut grumus, & thuris mica  
seu granum, quod *χόνδρος* *ἀλκατον* à medicis  
appellatur.

*χόνδρος*, quod à Latinis alica dictus sit, ne-  
mo doctorum ignoravit: tam consentiunt  
omnia inter se quæ Græci *ἀλκατον* *χόνδρος*, Latini  
de alica prodiderunt. Hoc vnum tantum de  
utroque dubitatur, an cetera quedam frugum  
species sit, quam his nominibus veteres de-  
signarint. *χόνδρος* tritici speciem esse Gal.  
videtur innuere lib. 1. de facult. aliment.  
scribens, *τὸ χόνδρος* *τὸ ἀλκατον* *τὸ χόνδρος*. Plinius  
lib. 18. cap. 11. alicam palmam frugum ap-  
pellat. Et eiusdem lib. cap. 7. alicam inter  
fruges non obscure enumerat, eamque si-  
milem facit milio, panico, lenti, ciceri, fru-  
gum hæc genera verna, quod vere serantur  
appellans. & paulo post scribens: tunicas  
frumento plures esse, hordeum maxime nu-  
dum & alicam, sed præcipue auenam. Qui-  
bus testimoniis plerique conuicti *χόνδρος* si-  
ue alicam tritici genus esse, ceteræque frugis  
nomen arbitrantur. Verum quæ nam ea sit  
interrogati non possunt respondere, quod  
nec Theophrastus, nec Diocles, nec Diosco-  
rides vel nominis solius mentionem fece-  
runt, nec Plinius & Galenus quid sit dixisse  
videantur. Est enim rarissimum nomen *τὸ*  
*χόνδρος* apud medicos, ut memoriz Galenus  
prodidit. Alii vero in media quodammodo  
sententia sunt, dicentes *τὸ χόνδρος* & alicam  
fruges quidem esse & pro frugibus accipi  
dicique apud authores non proprio quidē  
nomine, sed mutuatō ab ea re in quam pro-  
tinus transire debent: itaque alicam pro zea  
dici, ex qua alicam fieri notum est. Quibus  
non obest quod Galen. ait *χόνδρος* genus esse  
tritici, non zea, quoniam zea pista saraq̃ue  
dicatur tertio fere anno in frumentum de-  
generare, ex quo, præsertim in Africa, alicā  
fieri Plinius auctor est. Cæterum *ἀλκατον* *τὸ*

*χόνδρος* *ἀλκατον*, id est, de alicæ confectio-  
ne, nemo ambigit in modum bromi, tragi  
aut psisanæ præparari, inuentumque id esse  
non pridem excogitatum, ut Plinius refert.  
fieri *τὸ χόνδρος* ex zea quam *σύντριον* appellant  
Dioscorides scripsit. Est autem zea tritici  
species (Itali hodie speltam, Galli espeltram  
vocat) ex qua confectum *χόνδρος* non zea  
nomine, sed potius *τὸ χόνδρος* id est tritici, vete-  
res designarunt, veluti Diocles & Philori-  
mus qui eum *σύντριον* *ἀλκατον*, id est psisanam  
triticeam, appellauere. At eius parandi mo-  
dum nemo Græcorum, quod sciam, prodidit,  
præter vnum Constantinum Cæsarem,  
qui tamen Latinus à Latinis eam videretur ac-  
cepisse. Is lib. 3. de agricultura his verbis eū  
aperit: zea decorticatā in feruentem aquam  
immittitur atque exprimit: deinde gypsum  
candidum contusum & arcetore cribro trās-  
missum, arenæque candidissimæ & tenuissimæ  
quarta pars cū portione gypsi paulatim  
admisceatur, zea denuo probe repurgata. Id  
agendum sub Canicula, ne acescat. Vbi tota  
repurgata fuerit, angustiore cribro cerna-  
tur. Idem quoque Plinius docet de alica, &  
præterea eam adulterinam fieri maxime, ex  
zea quæ in Africa degeneret, vel ex granis  
etiam tritici quæ candidissima atque gran-  
dissima deliguntur, & semicotta in ollis, post-  
ea arescunt sole ad initium, rursusque leni-  
ter aspersa molis franguntur: additque aliud  
mirum dictū, alicæ admisceri cretam quæ  
transit in corpus, coloremque & tenerita-  
tem adfert, negareque Campanos, apud  
quos præstantissima conficitur, alicam  
confici sine eo metallo posse. Attamen  
Constantinus, uti supra retulimus, non  
cretam sed gypsum iniicit, quod etiam  
in alica adulterina inspergi postea declarat:  
de quo tamen mirandum Græcos medicos  
alimentorum facultatem studiose perscu-  
tantes tacuisse. Nam ut forte creta ad deter-  
sionem glutinosi lentique humoris, quem  
*χόνδρος* habet, eōtulerit, at gypsum vehemē-  
ter nocere videbitur, quod obstruat & em-  
plasticum sit, & ventriculo eiusque ori val-  
de aduersum. Propterea dubito plurimum  
num simplicior fuerit Græcorū *χόνδρος* Ro-  
manorum alica, eoque inuicem discrepa-  
rint, quod hæc gypso constaret, ille nihil gy-  
psi haberet. Siquidē nonnihil discriminis  
inter hæc fuisse Paulus Aegineta declarat,  
non ita tamen ut genere & materia doceat  
discrepare. Neque enim dixisset alicā chon-  
dro in aliis per similem esse, si diuersa mate-  
ria constare credidisset, sicut bromum, tra-  
gum & psisanam. Dicit tantum ab alicā al-  
iū magis adstringi: cuius forte causa ad gy-  
psum admixtū his facultatibus quas modo  
recensui præditum, vel etiam ad cretā quæ  
magnam siccā vim sine mordacitate pos-  
sident, referri potest. Quod si *χόνδρος* metalla  
eiusmodi in consortium admiscisset, vix pos-  
sum credere tam celebrem apud omnes fu-  
turum fuisse, ut alimentum nullum esset in

arte medica tam multis abundante & luxuriantem remediis quod in febribus tertianis & continuis, in calidis & siccis naturis, atque etiam stomachicis frequentius exhiberetur. Nectamen discrimen hoc tanti faciendum fuit, ut *χόνδρος* alio nomine quam alicæ apud Latinos diceretur, quod alia prope infinita sint, quibus diuersissimæ parandi rationes manente semper primaria præcipuaque materia nomina non immutauere. Itaque *χόνδρος* siue alica non aliud est quam zea, eo modo quem declarauimus concinnata. Cuius tamē differentias treis Plinius, & post eum Constantinus Cæsar annotauit: primam quidem, quæ minima ab eo vocatur & cribraria; alteram vero quæ secundaria; tertiam quæ grādiſſima est, & excepticia atque *ἀκρίβεια* appellatur. Omnes autem eiusmodi farinæ aqua asperse postea exiccabantur, & in grumos granæque concreſcebant quæ ad vſum reponerentur, à quibus *χόνδρος* nomen inditum fuisse arbitror. *χόνδρος* enim granum significat, & quod ex continuo aliquo seorsum cōcreuerit. vt salis frusta & thuris micæ seu grana, quæ *χόνδρος* *καβαίου* à medicis nuncupantur, & de qua nunc agimus alica, quam & granum ob eam causam Plinius videtur appellasse. Scribit enim lib. 18. cap. 1. de alicâ differens: ex zea pulchrius quam ex tritico fit granum, quamuis id alicæ vitium sit. Quod quidem nō potest aliter quam de chondro intelligi: vitæ enim verbum Græcū, granum, Latinam vocem vsurpauit. Ac quamuis quicquid in granum coaliuit, *χόνδρος* vocari possit, velut *καρπός* & *σπόρος*, ex zea tamen granum id sibi peculiariter nomen vendicauit, sicut hordei apparatus *καρπός* nomenclaturam, quamuis *καρπός* multis frugibus commune sit, quæ perinde atque hordeum, tundi & deglubi solebant. Cæterum duobus modis veteres *χόνδρος* utebantur, interdum integro, interdum loto. Illud *χόνδρος* simpliciter, vel *χόνδρος* *καρπός*, id est chondrum ptisanæ modo comparatum; vel, vt Diocles & Philotimus, *καρπός* *καρπός*: hoc vero, *χόνδρος* *καρπός* appellabant. Coquebatur granum ipsum in aqua vsque dum intabuisset, adiecto etiam per initia oleo, deinde adiecto sale modico percolabatur, atque ita ptisanæ similis euadebat. Aliquando vero & acētum admiscebatur, quo facilius per habitum digeretur. Et hæc quidem fuit simplex cōquendi ratio. Valenter is cibus alit (vnde & alica dicta est Sexto Pompeio, quod corpus alar) adeo vt victus plenus dici mereatur, vt Galenus scripsit in Aphor. 4. libr. 1. Succū bonū quidem, sed lentum & obstructionibus aptum gignit. Quod tamen vitium veteres vt emendarent, eum vario modo condiebant, multum frequenter admiscētes, interdum vinum dulce, vt esset arteriacū medicamentum & tabidis vtile, aut adstringens, ad compescendas alui fluxiones, aut punci etiam grana, vt in lib. meth. med. habetur. Inter-

dum vero cum oleo & sale frugebatur. Ac quoniam *χόνδρος* nihil in se habet detergens & tenuē, si ex eo sorbitionem attenuantem & detergentem cōficere volebant, non anethi modo, sed & porri quidpiā vel pullegii vel calamathi vel hyssopi incoquebant. de sorbitione autem ex alicâ vide apud Orisium extremo lib. 5. At *χόνδρος* *καρπός*, id est alica elota, est ipse succus alicæ cum aqua mixtus. Plurimum autem is coquendus erat, alioqui permultum lædebat concreſcens & densatus in ventriculo: Itaque plurima illum aqua perfundebant, tum super prunas coquebant, assidue agitando, donec coctus esse videretur: deinde salis aliquid addebatur & interdum oleum per initia. Non multum *χόνδρος* veterum diſſidere videtur à nostra frumentacea, si ab illo cretam aut gypsum exemeris. Fiebat autem & ex chondro panis *χόνδρος* dictus, plurimum nutrens nec facile per aluum descendens. Porro quod apud Aetium aliquādo legitur cōiunctim *χόνδρος* *καρπός*, non aliud quam *χόνδρος* simpliciter significat. ideo autem videtur vtrumque nomen conianxisse, ne quis de re ipsa ambigeret: vel quod ita forte Græcorū vulgo suis temporibus diceretur: siquidem tum is tum Paulus multa nomina scriptis suis inseruerunt, veteribus prorsus inusitata, commoditati potius quam vocabulorum proprietati & elegantiz inseruientes.

*Χόνδρος*, cartilago. Est pars corporis omnium, post os, maxime terrea & solida, sensus experta. Est igitur cartilago post os siccissima & durissima: siquidem osse minus sicca duraque est. Quamuis autem diuersa sit ab osse cartilago, sæpe tamen ætatis spatio in os degenerat, imo vero nulla fere sunt ossa, quæ ante cartilagineſ non fuerint. Ossa namque omnia & dentes genis adhuc conclusi infantibus cartilago sunt, quæ tandem in ossa duratur, vt cartilagineſ quæ inter sterni ossa continetur: *ἐξοσθίς*, quod Galeno propterea nunc os nunc cartilago dicitur: costarum fines coccygis extremum: acromium, quod ob id Hippocrati os, Galeno cartilago nominatur, & quod in cordis basi media situm est, vnde arteria magna & vena arteriosa emergit: id enim minoribus animalibus mollius, grandioribus durius, maximis vel os plane est vel ossea cartilago. Ob id videtur recte scripsisse Arist. cap. 1. lib. 1. de hist. animal. Cartilaginis & ossis eandem materiam esse, sola siccitate differentem. Sunt autem multæ cartilaginum differentiz, sicut & ossium, à substantiæ consistentia, magnitudine, numero, figura, situ, connexionē, actione. Cæterum omnis cartilago vel ossibus connascitur, vel parrem per se constituit. Quæ ossibus connascitur, nunc ossa inuicem cōnectit, nunc ossibus tantum appenditur. Quæ ossa coniungit, vel per se coniungit, vt in ossibus sterni, pubis, osse sacro, spondylis, hyoide & epiphysibus nondum inueteratis, vel communium articuli liga-

mentorum interuentu, vt in costis septem veris cum sterno, in sinibus omniū ossium diarthrosi aut synarthrosi iūctorum vbi ossium articulis superlita est, & quæ articulis quibusdam velut innatat. Quæ vero ossibus appensa est, aduersus externas iniurias & ossa & subdita partes communiter, & eas modice cedendo euitat. vt quæ costas septem veras perficit, vt multo magis quæ costis quinque infernis accreuit, & quæ imo sterno, *ἑρποειδής* dicta, & quæ in imo naso vtrinque & in medio multiplex, & aures ipsæ, & coccygis pars multa, & spondylorum spinæ, & apophyses transtueris, & hyoidis latera præcipue in mulieribus, & quæ omoplatæ basi & coracoidi & acromio & aliis partibus nudis accreuit: cartilago autem per se partem constituit in vtriusque ciliis tarso in quo sunt palpebræ, & in epiglottide & in larynge, & in totius asperæ arteriæ bronchiis omnibus, & in cordis basi media, vnde arteria magna & vena arteriosa emergit. Porro cartilagines & secum & cum ossibus ossium modo articulantur, vt quæ in imo sunt naso, quæ in coccyge imo, quæ in laryngette, quæ in fine costarum septem verarum. Ex his cartilaginum vsus duplex præcipuus apparet: vnus vt partes quasdam leues ac politas ad motuum promptitudinem efficiant, in articulis scilicet: alter vt violentiæ foris occurrentium mediocriter cedant. Cartilaginis enim substantia maxime idonea est ad tegendum & defendendum partes subiectas. Non enim potest comminui & frangi, vt dura & friabilia, neque incidi & contundi, vt mollia & carnosissima. Vfus alios cartilaginū cum ossibus communes, vt sustinendi, fingendi partis appositus, ex ipsarum natura & forma cogitādos relinquimus.

*Χορδα φάρυγγος*. Est tumor tenuis intestini, vt videatur intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum, vt scribit Galen. lib. 6. de locis aff. Archigenes, vt refert Aetius lib. 13. *χορδα φάρυγγος τῆς εἰλεῖος* speciem esse dicit, cum vno in loco circa tenuia intestina dolor cōsistit, vt ad motum manu durities & tumor tactui succubat: ex eo subitum periculum creari scripsit, atque vt plurimum intra tertiam vel quartam horam: quod si ad suppurationem inflammatio vergit, aut in longius tempus trahitur, ne tum quidem abesse periculū, quāquam exiis aliqui euadant. Celsus scribit Dioclem Carystii tenuioris intestini morbum *χορδα φάρυγγος* nominasse, à plarisque vero suo tempore *εἰλεῖος* nominari. Dicitur autem *χορδα φάρυγγος*, quod qui manum loco dolenti ad-mouerit, is veluti *τῆς χορδῆς ἀπὸ τῆς πίπτει*, id est, videtur sibi chordam tangere, propter magnam ex intestini inflammatione tensionem.

*Χορδή*. idem quod *πέναν*, id est tendo.

*Χορίον*. est extrema foetus membrana, ipsum totum inuoluens. Est autem chorion duplex, hoc est membranis constans duabus, inter-

naterrima, externa aliquanto crassiore, sed molliore, & cruentatæ papyro bibulæ crassitie, mollitie & colore sublimili, inter quas feruntur ad foetum nutriendum multæ tum venæ, tum arteriæ nascentes ex congenerum vteri vasorum oribus numero & magnitudine paribus, quæ *καυλιδόνας* Hippocr. vocant. Nascitur autem *χορίον* quæ quidem vteri superficiem subungit totam, ex virili semine: quæ vero tangit cornua, ex muliebri. Siquidem toti internæ vteri & cornuum eius superficiem subtenditur, & omnibus vteri & cornuum eius cotyledonibus adheret, alicubi etiam ipsi vtero inter cotyledonas, sed leuiter. Augetur vna cū foetu, cumque vtero extenditur ac foetum totum inuoluit, etiam quæ os est vteri, vt scribit Gal. lib. de anatome vteri, de foetus formatione, de semine, & lib. 15. de vsu partium. Dicitur *ἀπὸ τῆς χορῆς*, quod in eo vasa veluti in choro disposita sunt. Sunt tamen qui *χορίον* per se scribant, quod foetus veluti domicilium & sedes sit: vel quod vna cum foetu *χαρῆς*, id est procedit. Dicitur alio nomine *δευτέρειον*, id est secundæ, vt scribit Paulus lib. 6. cap. 75. quo tamen nomine non extrema modo foetus membrana, sed totum etiam foetus inuolucrum tribus membranis compactum significatur.

*Χορειοειδής*

*Χορειοειδής*. De trib. dicitur apud anatomie professores. Primum quidem significat implexum arteriarum in ventriculis cerebri anterioribus factum in modum *τῆς χορῆς*, hoc est membranæ foetum inuoluentis, quam secundas appellant. Hic geminus est, dexter & sinister, in vtroque scilicet cerebri ventriculo anteriore vnus: similis autem est *τῇ χορῆς*, non modo varia atque implicata vasorum textura, sed substantia etiam quadam subrubra & glandulosa quæ per medios vasorum anfractus cernitur, non ei dissimilis quæ *τῇ χορῆς* vasa amplectitur atque sustinet. Secūda significatione *χορειοειδής* dicitur tenuis membrana quæ cerebrū inuoluit, eo quod cerebri vasa non aliter sustineat quam *τῇ χορῆς* vasa ad foetum pertinentia complectitur. Rufus vero non totam eam membranam sed *τὴν καλὴν πὸντὴν τῆς καλῆς ἐσθλῆς χετῶνα*, hoc est, internam membranam, quæ ventriculos contegit, scripsit vocari *χορειοειδή*. Id quod ego esse suspicor & Gal. lib. 8. de vsu part. dicit se mirari, cur aliqui non omneis tenuis membranæ partes *χορειοειδής* velint appellari. Verum Herophilus, vt ait Rufus, etiam meningem *χορειοειδή* vocabat. Tertia significatio est, quæ *χορειοειδής* membrana oculi dicitur, quæ alio nomine *παρειοειδής* nuncupatur, vel quoniam nascitur à cerebri membrana tenui, quæ *παρειοειδής* diximus vocari, vel quod pariter atque *χορίον* venis intertexta sit: quāquam videretur Rufus sentire nō totam eam tunicā *χορειοειδή* dici, sed ea tantum parte, quæ albo oculorum subiecta est, vt & *παρειοειδής* ea parte qua subest *αγγειοειδής* tunica.

Xods. vide *χρῶς*.

*Χρῆς*. vltus seu vilitas. vide *ἐρίφεια*.

*Χρῆσον*. à singulari vtilitate sic appellatum est cichorium. Sic dicta etiam est à quibusdam ambubcia.

*Χρυσάειμον*. herba est tenera, fruticosa, laeues proferens caules & folia multifida: flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes: vnde etiam *βοῖφθαλμος* quidam appellauere. Galli margaritas albas vocant.

Dicitur & *χρυσάειμον* à nonnullis τὸ αἰείων siue sedum maius, ab aureo seminis colore. Dicitur & *χρυσάειμον* à quibusdam τὸ εἰχρυσόν, vt scribit Dioscorides: atque etiam *χρυσόσχημον*, vt idem refert. Est etiam species *αἰθιδιμίδος* dicta *χρυσάειμον*, reliquis vehementius vrinam ciens.

*Χρυσῆρος βοχίος*. pastillus Chrysermi, splenicis & hydropicis vrinā ciens, aluumque emolliens. Describitur à Galeno lib. 9. τὸ 13. τόμος.

*Χρυσόν*. nomen est medicamenti compositi, glutinatorii, quo Paulus vtitur ad glutinanda vlcera, libr. 4. capit. 37. cruentisque vulneribus ob id conuenit. Describitur apud eundem lib. 7. cap. 17.

*Χρυσὴ γῆ*. aurea terra. Terra est, vt ait Galenus, quæ ex metallis sumitur, auri plurima frustra habens, non quidem per totam ipsam terrā immista, sed contigua coniunctaque paruis terræ particulis, quæ ab igne in fornacibus fusa secum coeunt.

*Χρυσῆς*. species argenti spumæ. vide in dictione *αἰθιδιμίδος*.

*Χρυσῆς*. vocatur à quibusdam *χρυσόσχημον*, vt auctor est Galenus.

*Χρυσῆς*. sic dicitur à nonnullis τὸ αἰείων siue sedum maius, vt habetur apud Dioscoridem, ab aureo scilicet seminis colore.

*Χρυσόκλαρος*. quid sit, non animaduerti fuisse explicatum. Galenus libr. 8. τὸ 15. πῦρ, dicit ei vim esse discutiendi & roborandi, damnatque medicamenta *σφμαχικὰ* ex eo composita. alii *βόκλαρος* *μυρεψκλῶ*; alii nucem moschatam interpretantur.

*Χρυσόχορον*. frutex est quernis foliis, flore coronarii verbasci. Radix illi vt rapum extuberrat, intus ruberrima, foris nigra.

*Χρυσόχαρπος*. à quibusdam dicitur τὸ χρῶς, vt habetur apud Dioscoridem, ab aureo acinorum colore.

*Χρυσόκωμα*. genus est medicamenti metallici. Est autem duplex, naturalis & factitia. Naturalis gignitur in fibris & venis ærariis, ac si quando in aliis metallis reperiatur, omnino & in illis æs est. Inuenitur autē aut sola, arenæ similis, aut metallicæ alicui materię adhærens, à quā vbi abrafa, aut affuso humore excussa secretaque fuerit, arenæ similiter aut pulueris speciē habet. Est autem omnis natia viridi colore, sed eo quidem alia saturo, vt ad smaragdi viriditatem accedat, quam longe optimam esse censent, alia vero valde diluto, quam vilissimam, alia vero medio quæ medium locum tenet. Facti-

tia autem duplex est, vnā herbaceam, alteram santernam appellant. Fit autem herbacea ex dura natia, tingiturque lutea herba, ob id herbacea dicta: atque ea laudatissima est, natiaque preciosior. Eius conficiendæ rationem exponit Plinius lib. 33. cap. 5. Natura, inquit, chrysocollæ est quæ lino lanæne ad succum bibendum. Tunditur in pila, deinde tenui cribro secernitur, postea molitur, ac deinde tenuis sic cribratur, quicquid non transmeat, repetitur in pila, deinde molitur. puluis semper in catinos digeritur, & ex aceto maceratur, vt omnis duritia soluat. ac rursus tunditur, dein lauatur in conchis siccaturque. tunc tingitur alumine schisto & herba lutea, pingiturque antequam pingat. Cum tñxere pictores, *ἀρῶβινον* vocant, quod eui colore sit. Verum nunc herbacea caremus. Altera autem factitiæ chrysocollæ differentia, quam Plinius santernam scribit vocari, temperatur, vt ait, ex Cypria æruginē & pueri impubis vrina addito nitro, teriturque Cyprio ære in Cypriis mortariis. Galenus Dioscoridem sequutus nitri non meminit: monuit tantum satius esse eam præparare tempore æstiuo, aut certe ære prorsum calido, vrinā in mortario terentes, præstareque æs ex quo mortarium pistillumque conficitur, rubrum esse. Nam quo æs mollius fuerit, eo plus circum agendo pistillo deteri. idque pluribus deinceps diebus faciendum esse, donec vrina mellis crassitiem adepta sit. Ea reponitur à Dioscoride in æruginum numero, & quia medicinæ inferuit, à medicis *ἀνδρῶν* nominatur, vt ait Plinius, quanquam & aurifices, vt ait Galenus, eandem sibi vendicant agglutinando auro, ex qua re præcipuam sortita est appellationem. Siquidem nihil chrysocollæ vox aliud quam auri glutinum indicat. Vires tum huic tum fossili chrysocollæ sunt digerendi, exiccandi, & carnes liquefaciendi sine vehementi mordicatione. Idcirco vtraque apriissima est vlceribus contumacibus. Verum factitia magis exiccat quam metallica siue natia, minusque mordet, & partibus est tenuioribus.

*Χρυσόκαρπον*. frutex est palmi altitudine, comantibus corymbis, figura hyssopi, radice veratri nigri, pilosa, tenui, gustu nō iniucundo, verum dulci ex austero, cyperi magnitudine, in opacis petrosisque nascens. Aliis nominibus *χρυσῆς*, *χρυσάειμον* & *ἀμυρεψκλῶ* dicitur. Plinio Latinam non habet appellationem. Olim tamen Iouis barbam dictam fuisse Dioscorides prodidit. Proxime ad eam accedit quam herbarii nostri pulegium montanum vocitant. Radix eius acris est & adstringens, nec multi vsus, decocta tamen in multa vtilis est peripneumoniacis & hepaticis, vimque aliquam habet prouocandi menstrua.

*Χρυσόκωμον*. à quibusdam dicitur τὸ χρῶς, vt habetur apud Dioscoridem.

*Χρυσόλαχαρον*. à quibusdam dicitur τὸ χρῶς, id est



est attrplex, authore Dioscoride. de quorū tamen utroque Plinius seorsum differit, tanquam ab invicem diffideant. Ruellius χρυσάχαιον id esse dicit, quod officinā minorem crassulam appellant.

Χρυσόμυλον. aureum malum. Genus unum est cydonii mali, incisuris distinctum, colore ad aurum inclinante.

Χρυσόσπερμον. sic dicitur à nonnullis τὸ χρυσεόν, siue sedum maius, ab aureo seminis colore, vt author est Dioscorides.

Χρυσόν. est collyrium ad incipientes suffusiones efficax. describitur ab Aetio libr. 7. inter collyria χρυσόματια. Est & huius nominis collyrium ὕμενον ad corrosos oculorum angulos & scabritiē, quod à Galenio & ab Aetio eodem modo describitur. Appellatur etiam hoc nomine pessus valens ad inflammationes vteri & inclinationes, & describitur ab Aetio libr. 16. cap. 83. quod est de vteri inflammatione: atque alius etiam eiusdem nominis vtero emolliendo conueniens, & ab eodē descriptus ad scirrhus vteri.

Χρῆς. vocatur apud Ionas quicquid in nostro corpore carnosum est, cuius generis præcipue sunt cutis & musculi, tū membranæ ac viscera: ossa veto, cartilaginem & ligamenta χρῆς nomine non significant, vt annotat Gal. comment. 2. εἰς τὸ σκληρὸν αὐτῶν. Idem vero comment. 3. quamlibet (inquit) carnosam partem Hippocrat. χρῆς appellat.

Χυλός. succus. generaliter quidē significat idem quod χυμός, tum apud Platonem & Hippoc. tum apud veteres omnes Comicos, vt Galenus prodidit. sic autem dicitur, ἡ ἐξ ὕχου καὶ ἐκ τοῦ σπλάχνου ἢ τοῦ σπυρμῶντος πρὸς τὴν πύλιν. hoc est, succus à calore ita concoctus, vt humidi sicciq; mediū sit consistentia. hic autem nō aliud est quam humor quidam incrassatus, tam in animantibus quam in plantis. Sed tamen in animantibus specialiter magis eum succum designat quem ventriculus è cibis per concoctionē elicit, & qui sanguinis materia est. Hic enim proprie à medicis χυλός appellatur, quamvis generaliori quodam significato non is modo, verum etiam & pituita & sanguis, & reliqua omnia humorū genera sub eo nomine comprehendi posse videantur. Eius generatio χυλῶσις dicitur, ventriculi propria actio, per quam cibus in chylum mutatur.

Χυμός. succus. sapor. Communi quidem significato omnem humorem designat coctione quodammodo incrassatum, tam in animantibus quam in plantis. Inde τὸ ἐν χυμῷ καὶ κατὰ χυμὸν nomina deducta sunt, quibus ea designatur, quæ humorem bonum malumve, hoc est, nutriendo corpori seruandoque aptum aut incommodum, continent. In quo nihil differt χυλός ἀπὸ τοῦ χυμοῦ, vt ante diximus. Verum peculiari quadam significatione ab Aristotele, Theophrasto, & Mnesitheo, vt refert Galenus, χυμός appellatur ipsa gustandi facultas siue qualitas, quam Latini saperem vocant. Hic autem non aliud est

quam partis siccae terrenæque in humore permistio, vel partis siccae per humorem vi caloris percolatio: efficitur enim sapor permistione quadā. Id quod eo argumento patet, quod elementorū nullum, vt aer, ignis, aqua, sibi saporem adsciuerit. Siquidem insipida est aqua, & vt veteres testantur, talis aqua creditur, qualis terra per quam influit. Sed nec terra etiā ipsa, nisi aliquam mistionem nata sit, alicuius saporis existimari potest, sed eam omnino humore aliquo diluī necesse est. Quod enim tā terreum durumque est, vt humore liquari nequeat, nullum gustu sapore inuehit: quod vero ita concreuit vt dissolui possit, id non aliter quam aliquo humore dilutum & liquefactum, gustu sensum mouēbit. Sic itaque χυμός non succum tantum, sed ipsam etiam succi propriam qualitatē & affectionem, quæ sapor est, significat. Est enim sapor non cuiusuis humoris (aqua enim & aquea omnia insipida sunt, & media inter gustatorias facultates) sed eius proprius quem χυμὸν ἢ χυλόν diximus indifferenter appellari. Vide χυλῶσις.

Χυμῶσις. numeratur à plerisque inter oculi affectiones, quasi ἀπὸ τοῦ χυμοῦ dicatur, verum ubicunque per ὁ scribitur, male scribitur: debet enim scribi εἰς τὸν χυμὸν τῆς χυμῶσις. vide supra χυμῶσις.

Χυμῶδες. significat ex aqua & oleo simul tutis mistisque diutius fricari. huic oppositum est ἐνεαλοῖσθαι. Est autem egregium ad tollendam lassitudinem remedium.

Χυρεῖδια. ἢ χυρεῖδιον, ἢ χυρεῖον. his tribus vocabulis Hippocrates τὸν χύτρυον, hoc est ollam appellauit, vt explicat Galen. in lexico Hippocratis.

Χαλάρμα. dicitur omnis distortio cuiuscunque partis ea sit. quo modo etiam Hippocrates dixit χαλεῖσθαι, pro mutilum aliqua corporis parte fecerit: vt annotat Galenus in lexico Hippocratis.

Χώρα. regio. Est pars terræ habitabilis, in qua homines versantur & viuunt. Eam autem Geometra & longitudine & latitudine definire solēt, vt intelligant omnes eius situm. Sed nos multo aliter, vt cognoscamus quā probe & integre homines ea vtantur. Ac primum consideramus, in qua orbis parte sita sit, an ad meridiē, an ad septentrionem, an ad orientem aut occidentem versa sit, vt inde queamus de eius temperie iudicare. Perpetuum enim est, vt frigida sint regiones ad septentrionem spectantes, veluti quæ ad Istrum & Mazotida paludē sunt sitæ. Calidæ vero, quæ in Æthiopia atque India habentur, & quæ ad meridiem pertinent. temperatæ vero, quæ ad orientem atque occidentem sunt sitæ. Verum aliud præterea spectandum est, ad iudicandam temperiem regionum, vt lutulenta stagna & aquæ palustres, quæ vel lapides in renibus gignunt, vel lienem adaugent: itemque venti, qui habitationib. familiares sunt, q. vel ex stagnis, vel ex fluminib. vel ex paludibus, vel ex sinu,

vel ex pelago exoriantur. Iam vero quæ ex terra exhalationibus excitantur, partim bona, partim prava sunt: qualia sunt quæ ex metallis afferuntur, & quæ à specu quod Charonium vocant, exhalantur. In frigidis vero quibusdam regionibus, ut in Thracia & Ponto, quoniam loca mari adiacentia humilia sunt, ob eam causam calidiores sunt temperatura: in calidioribus vero, quales sunt

Aegyptus & Libya, quoniam æstate à ventis ab Arcto flantibus refrigerantur, iccirco minus calida sunt iis quæ ad mediterranea recesserunt. Similiter & aquæ permultum faciunt ad regionum temperiem indicandam, siue illæ bonæ sint, siue malæ, itaque montes, atque alia quamplurima, quæ non est necesse describere.

Χαείον. vide χαείον.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

T O

Ψ



Α' γδης. εἰδὲς τὸ μύρον, id est vnguenti quoddam genus: ut explicat Gal. in lexico Hippocratis: itemque Suidas. Hesychius autem γαυδᾶς habet, & γαυδῆς.

Γαυδῶν, ἡγ' ὅτι, ut Attici, vel Γαυδῶν, ἡγ' ὅτι, ut cæteri omnes Græci scribunt, dicitur edulium vel aliud quidvis quod tenerum & friabile sit, quod in se, ut scribit Galen. l. 3. de aliment. nihil lentoris neque pinguedinis continet. Id Galen. etiam κραινῶν libr. 1. r. meth. med. appellat: Aristoteles autem Σπαισῶν libr. 4. meteor. Vulgo σαχῶν vocatur, ut ait Galenus comment. 3. in libr. 1. prorrh. Tale autem in ciborum genere maxime est, quod diem vnum vel duos à iugulato animali repositum est. ἑωλον id Græci vocare consueverunt, quasi bi-duanum vel tri-duanum: & ἑωλίζεν ita ante putrefacere.

Γαυρῶν, ἡγ' ὅτι, ut cæteri omnes Græci scribunt, dicitur edulium vel aliud quidvis quod tenerum & friabile sit, quod in se, ut scribit Galen. l. 3. de aliment. nihil lentoris neque pinguedinis continet. Id Galen. etiam κραινῶν libr. 1. r. meth. med. appellat: Aristoteles autem Σπαισῶν libr. 4. meteor. Vulgo σαχῶν vocatur, ut ait Galenus comment. 3. in libr. 1. prorrh. Tale autem in ciborum genere maxime est, quod diem vnum vel duos à iugulato animali repositum est. ἑωλον id Græci vocare consueverunt, quasi bi-duanum vel tri-duanum: & ἑωλίζεν ita ante putrefacere.

Γαυρῶν, ἡγ' ὅτι, ut cæteri omnes Græci scribunt, dicitur edulium vel aliud quidvis quod tenerum & friabile sit, quod in se, ut scribit Galen. l. 3. de aliment. nihil lentoris neque pinguedinis continet. Id Galen. etiam κραινῶν libr. 1. r. meth. med. appellat: Aristoteles autem Σπαισῶν libr. 4. meteor. Vulgo σαχῶν vocatur, ut ait Galenus comment. 3. in libr. 1. prorrh. Tale autem in ciborum genere maxime est, quod diem vnum vel duos à iugulato animali repositum est. ἑωλον id Græci vocare consueverunt, quasi bi-duanum vel tri-duanum: & ἑωλίζεν ita ante putrefacere.

Γαυρῶν, ἡγ' ὅτι, ut cæteri omnes Græci scribunt, dicitur edulium vel aliud quidvis quod tenerum & friabile sit, quod in se, ut scribit Galen. l. 3. de aliment. nihil lentoris neque pinguedinis continet. Id Galen. etiam κραινῶν libr. 1. r. meth. med. appellat: Aristoteles autem Σπαισῶν libr. 4. meteor. Vulgo σαχῶν vocatur, ut ait Galenus comment. 3. in libr. 1. prorrh. Tale autem in ciborum genere maxime est, quod diem vnum vel duos à iugulato animali repositum est. ἑωλον id Græci vocare consueverunt, quasi bi-duanum vel tri-duanum: & ἑωλίζεν ita ante putrefacere.

Γαυρῶν, ἡγ' ὅτι, ut cæteri omnes Græci scribunt, dicitur edulium vel aliud quidvis quod tenerum & friabile sit, quod in se, ut scribit Galen. l. 3. de aliment. nihil lentoris neque pinguedinis continet. Id Galen. etiam κραινῶν libr. 1. r. meth. med. appellat: Aristoteles autem Σπαισῶν libr. 4. meteor. Vulgo σαχῶν vocatur, ut ait Galenus comment. 3. in libr. 1. prorrh. Tale autem in ciborum genere maxime est, quod diem vnum vel duos à iugulato animali repositum est. ἑωλον id Græci vocare consueverunt, quasi bi-duanum vel tri-duanum: & ἑωλίζεν ita ante putrefacere.

Γαυρῶν, ἡγ' ὅτι, ut cæteri omnes Græci scribunt, dicitur edulium vel aliud quidvis quod tenerum & friabile sit, quod in se, ut scribit Galen. l. 3. de aliment. nihil lentoris neque pinguedinis continet. Id Galen. etiam κραινῶν libr. 1. r. meth. med. appellat: Aristoteles autem Σπαισῶν libr. 4. meteor. Vulgo σαχῶν vocatur, ut ait Galenus comment. 3. in libr. 1. prorrh. Tale autem in ciborum genere maxime est, quod diem vnum vel duos à iugulato animali repositum est. ἑωλον id Græci vocare consueverunt, quasi bi-duanum vel tri-duanum: & ἑωλίζεν ita ante putrefacere.

Χαείον. est nomen compositi medicamenti ficti, acris & exedentis, quo Paulus lib. 4. cap. 43. vitur ad vlcera in quibus caro supercrescit. eius descriptio habetur apud Aetium l. 14. cap. 36.

Χαείον. balbuties. est vitium pronuntiationis quo litera vel etiam syllaba saepe eliditur. Sic quidem definiuit Aristor. in problematis, scribens in eo differre ἀπὸ τῆς βαυλότητος, in qua commutatio fit literæ in literam, non etiam eliso. τραυλοὶ enim pro pronuntiant λαυλοὶ vero inter pronuntiandum literam vel syllabam perdunt. Cæterum Gal. multis locis annotauit χαείον vitium esse pronuntiationis καὶ διαφθοράς, sed non vocis nullibi tamen βαυλότητα καὶ λαυότητα idem esse dixit.

Χαείον. herba est anchusa onoclea similis, sed lanuginosior & minus pinguis, tenuioribus foliis & languidioribus, radice olei non fundente, sed rubentem succum, qui ab anchusa discernitur. hæc aliis nominibus & ἀγχούσι & δωείσι dicitur. Verum secundum Plinii descriptionem, χαείον videtur esse secunda anchusa species quæ ὀνόχελος & ἀλκυβιάδης nuncupatur.

Χαείον. frutex est in Creta, palmi altitudine, foliis napi acris.

Χαείον. frutex est multis in terris nascens, folio simili dictamo, sed ramulis minoribus.

Χαείον. est frutex ubique fere nascens, folio crassiore, carnosio, angusto, colore languido in candidum vergente, frequentibus spicis in aristas sparsis, flosculis purpureis. duorum est generum: vnum procerius, odoratius, vulgo Gallorū aspicum dictum: alterum minus odorum minusque altum, quod vulgo lauandula appellatur. Vtrumque perpetua coma canescit. vis ei calfactoria & resiccans secundo abscessu, tenuibusque constat particulis, non multum à natura Celticæ nardi dissidens.

Χαείον. hoc est tenebrosa & nigricantia. ἡφες enim tenebras significat. ut annotat Galen.

in

in lexico Hippocrati apud Helych. est *λεπτή*,  
tralato accentu.

*Τρυμα*. sic à quibusdam olim vocatum fuisse  
his florem Dioscorides auctor est.

*Τρυμα*. medicamentum depilatorium. Nō est  
vnguenti genus, aut certe cuiusdam com-  
positionis nomen, vt aliqui existimauerunt,  
sed quacunque medicamenta aut illita aut  
affricta pilos demūt, *τρυμα* dicuntur. Cum  
enim, vt ait Galenus, triplex sit eorum quæ  
pilos corrumpunt differentia, quod eos alia  
attenuent, alia auferant, alia penitus extir-  
pent, *τρυμα* proprie vocantur, quæ partem  
aliquam pilis ad tempus denudant, non et-  
iam radicitus eos extirpant. Omnia in ge-  
nere erodentem & vstoriā habent facul-  
tatem. sed erodentia quidem tutiora sunt  
minorique periculo adhibentur: periculo-  
siora autem quodammodo sunt vstoria,  
quod, si paulo negligentius admoveantur,  
bullas excitent, exulcerent, & cutem adu-  
rant. Eorum materiam Gal. l. 1. *τρυμα*,  
abunde explicauit. Huius generis est *αμυ-  
λοειν*, hoc est vitis alba, quæ ideo à quibus-  
dam peculiari nomine *αμυλον* vocata fuit  
authore Dioscoride & Plinio. Oribasius ex  
Menemacho refert, psilothrum à dropace  
differre, quod eius actio minor sit quam  
dropacis, quodque hoc carnem delicatam  
relinquat, dropax vero habituiorem, magis-  
que musculosam, additque psilothrum car-  
nem primo in superficie vellicare, ac tan-  
dem si diutius immoretur, cutem ulcerare  
pustulasque excitare.

*αμυλον*. cerussa. est medicamentum metalli-  
cum ex plumbo acris aceti vapore resolu-  
to. Fit hunc in modum. Primum in doli-  
um fictile farmenta imponuntur, deinde  
tantum aceti acris ininfunditur, vt altitu-  
dine palmi farmenta emineant: mox plures  
plumbi laminæ, tenues, libræ vnus ponde-  
re super ipsa collocantur, ipsumque doli-  
um operculo item fictili clauditur & obtu-  
ratur. Ac æstare quidē dolum in sole, hye-  
me vero super furnum collocatur, donec  
ipse plumbi bractæ totæ liquatæ sint &  
resolutæ. Tunc liquor purus qui supernat  
colatur, glutinosum vero quod in doli fun-  
do residet in aliud vas transfusum in sole  
succatur, deinde mola trusculi teritur aut  
alio modo comminuitur, postea cribratur.  
Similiter & reliquæ solidæ & duræ iterum  
& sæpius comminuntur, atque cribran-  
tur. Quondam cerussa, vt scribit Dioscori-  
des, primas tenebat quæ Rhodificabat, aut  
Corinthis aut Lacedæmone, secundas quæ  
Puteolis: nostris temporibus in omnibus  
Europæ regionibus conficitur. Ea quamuis  
ex plumbo acris aceto dissoluta paratur, at-  
tamen neque acris est neque mordax ne-  
que discussoria, sed & meatus obducit & re-  
frigerat. Verum vitæ cerussa pura in id quod  
vulgo appellatur transit, medici *αμυλον* no-  
minant. Est vero tenuiorum quam cerussa  
partium, nec tamen calefacit.

*τρυμα* emplastri nomen cuius descriptio ha-  
betur apud Paulum lib. 7. cap. 17. Refertur  
& ab Actio lib. 1. inter emplastria emolli-  
entia & discussoria. Est & collyrii nomen  
quod describit à Scribonio Largo, & quod  
Galenus lib. 4. *τρυμα* ex eius libris ad-  
scribit.

*Τρυμα*. sic dicuntur duo maximi musculi in in-  
terna lumborum regione sit, vt scribit Hip-  
pocrates *τρυμα* *απὸ τῆς ὀστέας*. Hi supra septum  
transuersum ad decimam, aliquando vero  
ad vndecimam thoracis vertebram inse-  
runtur, eamque partem spinæ quæ secun-  
dum ipsos est, inflectunt. Eadem vero &  
*τρυμα* *απὸ τῆς ὀστέας* etiam à quibusdam  
vocantur. Sunt vero & qui externos spi-  
næ musculōs *τρυμα* vocent, vt scribit Pol-  
lux: nec eos modo, sed totam etiam eam  
partem quæ lumborum nomine compre-  
henditur. Marcellus *τρυμα* lumbos proprie  
dici contendit, quod nomen à libidine me-  
rito deduci voluit. Nam illic libidinis pru-  
ritus excitatur maxime, quod iis renes sub-  
iacent. Suidas, *τρυμα* *απὸ τῆς ὀστέας* *απὸ τῆς ὀστέας*  
*απὸ τῆς ὀστέας* quibus verbis designat *τρυμα* partem esse cor-  
poris, quibus renes adiacent, per quos ve-  
neris appetentia excitari solent.

*Τρυμα*. murmur, strepitus. Dictio est quæ uti-  
tur Hippocrates lib. 6. de morbis vulgaribus  
comm. 3. quæ nonnulli murmur, hoc est *βρυ-  
γισμός*, significari dicunt: quidam *βρυγμός*, id  
est ructum: alii status per sedem exhalantes:  
alii quodlibet istorum simpliciter, qualiscū-  
que in intestinis motus sit auribus percepti-  
bilis. sunt enim & alii quidam præter mur-  
mur in intestinis motus & strepitus, non-  
nulli quidem sonis persimiles, alii vero sibi-  
lis aut alicui huiusmodi voci. Hæc Galen.  
comment. 3. in lib. 6. Epidemon. In lexico  
idem Gal. ex eodem Hippocr. affert *τρυμα* *απὸ τῆς ὀστέας*  
*απὸ τῆς ὀστέας*, pro strepitum facile sentientes, ac  
proinde expauescentes, veluti si *τρυμα* *απὸ τῆς ὀστέας* di-  
xisset, vel potius *τρυμα* *απὸ τῆς ὀστέας*, quæ ad quemuis  
strepitum expauescunt.

*Τρυμα*. pustularum genus est, authore Celso,  
paulo durius, subalbidum, acutum, ex quo  
quod exprimitur, humidum est. Verum à  
Paulo *τρυμα* inter proprios capitis affe-  
ctus numerantur, eaque definit esse *μακρὰς*  
*καρπὰς* *απὸ τῆς ὀστέας*, *καρπὰς* *απὸ τῆς ὀστέας*  
hoc est, paruas eminentias similes phly-  
ctænis, super cutem exerescences. Quæ cum  
dicat phlyctænis esse similia, patet non ea-  
dem esse cum phlyctænis, vt aliqui putave-  
runt. Differunt enim non eo tantum quod  
phlyctænz toto corpore, *τρυμα* capite so-  
lo (quanquam Introductorii author aliter  
videatur scripsisse) oriuntur, sed etiam quod  
illæ à calidiori acriorique, hæc autem à mi-  
nus calido minusque acris humoris gignantur.

*Τρυμα*. herba est foliis coronopo non dissimili-  
bus, hirsutis, longioribus, farmentosa scæni  
modo, tantis dōdrantalibus. Coma à medio

caule exoritur, duobus tribusue connolutis in cacumine capitulis, in iis semine duro, nigro, pulicum simili, vnde & pulicaris herba Latinis dicitur. Eius semen refrigerat ordine secundo, medium siccando humectandoque. Ex psyllio fiunt emplastra, numero tria, quæ recenset Aetius tetr. 4. ferm. 3. de emollientibus ac discussoriis emplastris.

**¶ Anima siue animus.** Cuius substantiam se ignorare Galen. multis in locis ingenue confiteretur, nec sane quid ea sit scire magni refert, siue ad sanitatē tuendam, siue ad morborum curationem. Satis est id vnum nosse, animā in nobis id esse quo viuim⁹, & omnes in vita actiones edimus. Hæ autem cum sint propemodū infinitæ, in treis tamē summas & principes differentias à philosophis distinctæ sunt, ita vt quicquid in animantium vita agitur, ad vnam earum referre oporteat. Sunt autem hæ concupiscere, irasci & ratiocinari. Quæ vtrum ab vna & eadem animæ substantia, an à diuersis procedant, non est præsentis operis definire: hoc modo sciendum, quibus hæc aguntur, & partes animæ & species & facultates & principia interdum nuncupari, atq; eam seu partem seu facultatem qua concupiscitur, dici animam vegetabilem ab Aristotele, concupiscibilem à Platone naturalem à Stoicis: eam vero qua concipitur iracundia, animosam & insensibilem & viralem: qua autem ratiocinatur, rationalem & *κατ' ἐξουσίαν* principem, atque etiam animæ nomine *ψυχῶν*, hoc est animalem, appellari. Est igitur anima in corpore primum agens, eiusque primaria actio vita est, ab hac aliz ad vitam pertinentes, quas omnis spiritus beneficio perficit, tanquam primo instrumento, in secundariis organa, vt venas, arterias, neruos & musculos permeante sine quibus anima nihil agere potest. Scio quidem Aristotelem multo accuratius animam definiuisse, & paulo supra medici contemplationem, quam tamen si cui curæ est, requirat in libris ab eo conscriptis de anima.

**¶ Anima diuina siue animalis facultas.** Est vis seu pars animæ in cerebro sita, sensus, motus & rationis auctor. Potest & principium sensus, motus & rationis dici. Hæc enim tria ab animali facultate proficiuntur, & in cerebro, quo illa veluti in arce residet, perficiuntur, & actiones animales *κατ' ἐξουσίαν* nominantur. Est autem ea facultas cerebro propria & inexplicabili ipsius temperie, ex qua spiritus animalis procedit, quò tãquam primario instrumento animæ triplices eas actiones exercet. Ad sensum quidem motumque spiritu per neruos transmissio edit, ratiocinatur autem & reliqua principis siue rectoris facultatis munia obit, eo rite in cerebri corpore temperato. Itaque facultatis animalis tres sunt actiones, quas etiam particulares eius facultates appellare possis, sensificam, motiuam & rectoriam; quarum prior quinque sensuum differentis, altera

motibus voluntariis, tertia imaginationi memoriz & rationi præest.

**¶ *ψυχῶν ἀνθρώπου.* animalis spiritus.** Est substantia omnium tenuissima, per totum cerebri corpus diffusa, primum facultatis animalis instrumentum. Sic enim qui in cerebro spiritus est animalis dicitur, non quod substantia animæ sit, sed quod sit primum eius ibi habitantis instrumentum. Differt autem ille quidem permultum tenuitate à reliquis spiritibus, quod & diuini⁹ sit, & ad sublimium rerum contemplationem destinatus. Itaque tantum abesse debet à corpore, quanto cœlestia terrenis puriora sunt. Eam ob rem non ex re qualibet, sed ex tenuissima quaque substantia producit, vt inspirati aeris parte ferenissima, sanguinis probe defæcati vapore, & ipso vitali spiritu. Sanguis enim ille spiritalis purus & tenuis qui à corde profectus in arteriis continetur, illi admodum familiare est alimētum, nec tamen tam propinquum, quin antequam spiritus animalis euadat, multum repurgari elaborarique debeat. In hunc autem vsum naturæ primum quidem nobilem illum plexum retiformem machinata est, eumque propterea tam multis arteriarum ambagibus implicauit, quo mora longiore vitalis spiritus per eum quasi varium quendam labyrinthum permeans, tandem tenuissimus purissimisque euaderet. Quò adhuc non contenta, alios præterea ex vario multarum venarum & arteriarum concursu implexuque sinus, quos *χρυσῆς* appellant, in duobus anterioribus ventriculis cerebri construxit, in quibus etiam perfectius & subtilius excoqueretur. Inde in medium postremumque ventriculum peruenit. Quamuis autem tam ventriculi omnes, tum totum ipsum cerebrum eo plenum sit, maximè tamen in postremo ventriculo continetur, in quo non plurimus modo, verum etiam ad animæ vsum præstantissimus habetur. quauis non contemnendus sit medius, qui est non est nobilissimus, multis tamen rationibus efficitur, vt eum duobus anterioribus præferendum esse existimemus. Eo autem anima, quæ in cerebri corpore sedem habere creditur, tanquam primo instrumento vtitur, tum ad sensum & motum, tum ad reliquas actiones quæ ratione & consilio administrantur: ad sensum quidem motumque, per neruos tanquam canales in organa sensus atque motus influente: ad principes autem actiones sic temperato, prout natura arcano quodam consilio expedire intelligit.

**¶ *ψυχῶν ἀνθρώπου* dicitur *ψύχρον*, id est betonica, vt scribit Dioscor. gaudet enim frigidis locis, inque iis læta prouenit, vide *ψύχρον*.**

**¶ *ψύχρον* scabies.** Est asperitas summæ cutis ex ea furfures eliciens, cum pruritu & colliquatione corporis. Asperitas quidem illi cum lepra communis est, vt & pruritus & colliquatio.

quatio corporis, differentia vero in eo est, quod in psora summam cutem potius occupet, in lepra vero altius descendat: quodque per psoram cutis fursuracea quædam corpora remittat, per lepram vero in squamas solvatur. Huius autem asperitatis causa siccitas est humoris, qui paucior quidem & tenuior pruritus movet, visus vero factusque crassior psoram inducit. Addit & Paulus alias psoræ lepræque differentias, psoram quidem varie figuratam videri, lepram vero circularibus magis erosionibus cutem depascere. Sed & fursures à siccitate proveniunt, iisque materia ex subiectæ carnis colligatione assidua quam calida parit intemperies, suggeritur. Ex melancholico humore nascitur malum, atque inter melancholicos affectus numeratur. Hæc quidem Græci de psora prodiderunt, & omnes quotquot mihi videre licuit interpretes scabiem sunt interpretati, Plinium credo secuti, qui lib. 20. cap. 1. scribit, radix cucumeris arida cum resina imperiginem & scabiem, quæ psoram & lichenas vocat, sanat. Idem tamē c. 17. eiusdem libri scabiem & psoram videtur distinguere. Verum si psora Latinis scabies sit, non videntur Græci de psora plene tractasse, totamque de ea commentationem absoluisse. Siquidem Cornel. Celsus rubicundum esse tumorem in scabiē prodidit, ex quo facile intelligitur non semper à melancholico humore nasci. Celsoque consentanea scripsit Auicennas. Præterea ex cute pustulas prodire per scabiem dicit quasdam humidiores, quasdam sicciores, & exire in quibusdam saniem, fierique ex his continuatam exulcerationem & serpere in quibusdam cito. quas tamen in psora differentias pustularum nemo Græcorum annotavit: non neglexit autem Auicennas, scabiem suam in excorticatā & non excorticatam, in humidam & siccā, in fœdam & non fœdam distinguens. Sed puto equidem Græcos de psora loquutos non tam nova & recentia ut pruritus adhuc esse videatur, quem à sanguine bilioso excitari manifestum est, sed nec tam multum à pruritu recedente, tamque longe progressa, ut proxime ad

ἀσπερ accedat, quo tempore non iam simplex ex psora, sed ἀγρία, quam feram scabiem Corn. Celsus vocat. Tunc enim in squamas resolvitur, exulceratur, serpit, pustulas & saniem emittit, supraque psoræ modum exasperatur.

Ψωρόν. nulla per se materia est quæ ita nominetur, nec nativum aliquid est, sed ex metallis factitium: nec simplex, sed compositum est. Dioscorides fieri scripsit ex chalcitide, duabus eius partibus cum vna cadmia additis, & ex aceto tritis, deinde in fictili positis, obrutisque fimo diebus quadraginta per Caniculæ ardore. Alii vero, ait, pares utriusque portiones in vino terunt, & eadē proseguunt. At Gal. ad eius confectionem nō cadmia sed lithargyro vitur, eaque tantum in re à Diosc. discrepat. Celsus lib. 6. c. 6. chalcitidis aliquid, & cadmiz dimidio plus ex aceto simul conteri prodidit, idque in yas fictile additum & contextum ficulneis foliis sub terra reponi, sublatumque post dies viginti rursus teri, & sic ψωρόν appellari. Hoc autem ei nomen à propria facultate est inditum, quod contra psoras prodest, & cutis asperitates emendat. Attrahit enim, deficcet, partiumque tenuitatem habet, simulque minus quam chalcitis mordet, citra manifestum calorem, etiam si ex putredine natum sit. Sed quamvis id medicamenti genus ψωρόν proprie dicatur, communi tamen significatione ψωρόν dici potest non id modo, sed aliud etiam quidvis eadem facultate præditum, à qua ψωρίδι δυνάμεις, uti & λεπορίδι, à Galeno appellantur. Inde etiam Scribonius Largus psorici nomen collyrio cuidam indidit, non tam forte quod psoricum recipiat, quam quod oculorum aspritudini medeat.

Ψωροφθαλμία. lippitudo scabra, aspritudo oculorum. Non aliud est quā oculi psoriasis. Causa eius est falsus quidā & nitrosus humor. Inde succedunt angulorum exulcerationes, rubores, pruritus. Rubent etiam palpebræ, & lacrymæ salæ nitrosæque ex oculis stillant. Differt autē τὸ ψωροφθαλμίας asperitate, & reliquorum fere symptomatum magnitudine.

# IO. GORRAEI PARISIENSIS

## DEFINITIONVM MEDICARVM

T O

Ω.



Κίμας πορὶ ἡ ἀμύγδαλις. dicitur à quibusdam chamæleo niger, ut habetur apud Dioscoridem, quod ocimum redoleat, ut testantur Dioscorides & Nicander scriben-

tes de ixia, quam chamæleonem esse non est dubiū. folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos, siliquas hyoscyamo similes, semine ut girh, nigro prægaues. Semen eius tenuium partium est & siccans citra mordacitatem.

Ωκίμας πορὶς. Dicitur à quibusdam τὸ κίμας πορὶς.



**Ἰμῖον.** pedali altitudine prouenit, furculosum, ramulis teretibus, folio muralis herbæ, vel mercurialis, aliquanto minore, diluci viro-  
ris, floret particulatim, primo parte inferiore, deum superiore, flosculo candido, femine vesco pulloque cui cortex obducitur. Radix vnâ descendit in altitudinem, crassa & admodum lignosa, cæteræ ab radicibus funduntur exiles & prolixæ. Galenus Paulusque ob humorem extremen-  
titiuum internis partibus vt officientem ci-  
bis abdicarunt, externis tamen proficere non inficiantur. Qui in contraria sunt opi-  
nionem, Plinius & Dioscorides, asseuerant & stomacho prodesse, quod inflationes ei-  
us discutiatur ex aceto sumptum, & insanos odoratu recreare. Ocimo tamen plerosque in opsoniis vti ex oleo & garo, Galenus tradit.

**Ἰλίκων.** pars brachii est: gibber à Gaza di-  
citur apud Aristotelem. Est autem articu-  
lus quo cubitus lacerto iungitur. ἀγκύων Hippocrates appellauit, eo nomine acu-  
tam & vere gibberam partem designans cui innitimur. Diores qui in Sicilia versaban-  
tur, κύβιτον vocabant, vt scripsit Rufus: est  
que apud Epicharmum κύβιτιον ἀπὸ τοῦ παλίου  
τῷ ἀγκύων. Sunt vero qui non ipsum totum  
articulum sic vocari censeant, sed existu-  
berculis & processibus, qui eâ partē siti  
sunt, quos κάρωνες vocant, eum proprie qui  
maior & posterior est, vide χεῖρ. Scribitur  
& ἰλίκων.

**Ἰλίον.** sic dicitur à quibusdam cubitus, siue os  
inter duos articulos, ἀγκύων & κάρων, medi-  
um. alio nomine πῆγος appellatur.

**Ἰκροίκερπος.** sic dicta est falx à veteribus, qua-  
si frugiperda, quod ocysime amittat semen,  
antequam omnino maturitatem sentiat.

**Ἰμῖλσις,** siue diuisis nominibus ἰμῖλ λῖσις: fa-  
rina hordeacea, quasi cruda farina, ad dif-  
ferentiam polentæ quæ torretur. Verum  
Latini interpretes crudam omittunt, lecto-  
ri id intelligendum relinquentes. Ac quan-  
quam id nomen cômune sit omnis farinæ,  
attamen κατ' ἐξοχὴν de hordeacea intelli-  
gitur, cui aliquando etiam ex superabun-  
danti additur κελθῖν, vt ἰμῖλσις κελθῖν. Quod  
si aliis farinis id nomen aptatur, tunc ap-  
ponitur frugis nomen, vt πρεῖν ἰμῖλσις ἢ  
νὸς κερμον.

**Ἰμῖα φλέψ.** humeralis vena. Est ramus ve-  
næ causæ clauiculas supergressæ per omo-  
platom in brachium descendens. Hic ra-  
mulum statim ab origine dimittit in cer-  
uicis tum cutim, tum musculos externos,  
deinde alium in partem gibbam omopla-  
tæ, sub qua postea in brachium fertur. Hoc  
quidem loco primum humeralis proprie  
dicitur: ante enim adhuc est τερνικλῖος, sic  
dicta quod super claues ferat. Procedit au-  
tem inter muscolum deltoide & tendonem  
musculi pectoralis, & super membranam  
carnosam recta & exterior paulo descen-  
dit, ad cubiti flexum sub cute conspicuus, in

maioris præsertim, & cum magnus est & tu-  
midus, furculis obiter in musculos brachii  
vicinos & cutim dimissis. Hic autem paulo  
supra brachii apophysim externam biper-  
titus, ramo interno, cum pari ramo venæ  
axillaris coit in venam communem, quæ su-  
per radii finem foras egressa, varic in ma-  
num externam absumitur: externo autem  
secundum radium descendit ad ipsius di-  
midium: hic deinde obliquus foras exit, &  
ad carpum axillaris ramo auctus, manum  
externam sæpe totam nutrit, præsertim è re-  
gione paruorum digitorum. Ramus autem  
interdum tertius cum dictis duobus natus,  
in flexum cubiti deflectens, in musculos ei-  
us loci absumitur, quibus etiam dicti duo  
rami numerose distribuuntur. Porro ean-  
dem venam Galenus sæpe τὴν ἐξω φλέβα vo-  
cavit, hoc est externâ, ad differentiam axil-  
laris quam τὴν εἰσω φλέβα, quasi internam, no-  
minant: vulgus nunc cephalicam appellat,  
quod ad capitis morbos magna vtilitate so-  
leat secari.

**Ἰμορῆς.** arbor dicta à quibusdam ἰμο-  
ρῆς atque ἀμιαμῆς, atque etiam ἑμιαμῆς  
de quibus vide suis locis. Sunt, vt refert A-  
thenæus, qui pyri genus crediderint. alii  
verò malum syluestrem & montanum in-  
telligunt quod Theocritus ἑμορῆδα appel-  
lauit.

**Ἰμὸν.** crudum. Dicitur proprie in fructibus,  
quod ad eos ἡ ὁμότης proprie pertineat, vt  
scribit Aristoteles lib. quarto meteor. quæ-  
admodum suo loco postea dicemus: per  
metaphoram tamen non modo fructus,  
sed cibi, humores & morbi à medicis ὁ-  
μῶς appellantur. Ac in ipsis etiam cibis ὁμῶς  
dicitur multipliciter, & primum quidem ci-  
bus ὁμῶς, id est crudus, dicitur, qui licet in  
suo genere perfectus sit, nullam tamen ab  
externo calore mutationem alterationem-  
que perpeffus est, vt cum carnem vel per-  
dicis vel galli, vel aliam etiam optimam cru-  
dam vocamus quæ nondum assa sit vel e-  
lixa. Aliter vero crudum cibum dicimus,  
qui quamuis optime ab externo calore al-  
teratus coctusque sit, à nostro tamen ca-  
lore difficillime concoqui potest, sed hu-  
mores omnino crudos generat. In humo-  
ribus vero crudum tribus modis dici inue-  
nio. vno cum crudus humor appellatur, qui  
manat cibo perfectam concoctionem non  
adepto, non quod illi vitium aliquod infit,  
sed propter sui copiam vel propter caloris  
natiui imbecillitatem: quomodo liquidam  
pituitam & bilem pallidam atque aliam quæ  
intra bilis fluxus naturam restiterit, crudam  
appellamus: hæc enim facile possunt per-  
fectâ concoctionem assequi, si calor mode-  
ratus adsit. hic proprie ἀπίος, ipsaque eius-  
modi cruditas ἀπίστα nuncupatur. Altero  
vero crudus humor vocatur crassus & frigi-  
dus, qui à cibis eiusdem generis, crassus & vi-  
scosis gignitur. Atque is est, vt ait Galen. lib.  
10. τὸ κατὰ φύσιν, & libro primo de aliment.

facult. quem proprie *αἷον χυμὸν*, hoc est, crudum succum siue humorem, nominare cōsueuimus. Is differt crassitie à pituitæ succo crudo quidem & frigido, non tamen crasso, vt qui humiditatem multam habeat & spiritum flatulentum. Crudus vero hic succus proprie nūcupatus, talis est quale id apparet quod in vrinis subsidet puri quandoque assimile. verum pus & graueolens est & lentum, crudus vero succus crassitie & colore illi duntaxat est similis, vt qui neque graueolens est neque lentus. hunc humorem *ιανρόν*, hoc est vitreum, Praxagoras vocauit: iuniores autem, & inter eos Philippus, simpliciter crudum, nullum aliud nomen adiicientes, vt exquisitius distinguerent. Coqui tamen & ipse tandem potest à robusto calore atque in alimentum conuerti, nisi aliam præterea maligniorem qualitatem errore aliquo nanciscatur, ob quam morbilicus euadit & febres præsertim epialas producit. Tertia vero significatione crudus humor dicitur, qui vitiosa qualitate & à natura aliena præditus morborum causa est. Secundum hanc pituita tum acida tum salia, sanguis in locum quendam præter naturam affluens, bilis vtraque quam calor immodicus adusserit, atque omnis adeo putris humor & naturæ molestus, crudus dicitur. Secundum eam etiam Hippocrates lib. *αἷος* *αἷος* *οἷον*, cruda tum à capite, tum à thorace attrahi biliosa dixit. In cuius loci explicatione Galenus, Biliosa, inquit, cruda ita appellauit, quoniam & excrementorum coctionem appellat, quanquam mutata nutrire non possint, vt bilis vtraque, & qui *αἷος* dicuntur. Veruntamen quoniam & talia euincit natura, Hippocrates cocta eiusmodi excrementa dicere consuevit quæ à natura euicta sunt, cruda vero quæ non sunt euicta. Ob id & pus in phlegmonis quæ concoquantur fieri ait, quâquam pars nulla pure nutriatur, sicuti ex crudis proprie vocatis humoribus & pituita, quæ reliquum perfectionis assequuta, & prorsus cocta corpus nutrire possunt. Sic igitur biliosi humores concoquantur, velut sanguis qui phlegmonem committit, in pus vertitur. Tunc autem coctionis nomen in suo vniuersaliore significato accipimus. Est autem vniuersalius cum natura causis fortior fuerit, permutaueritque eas suo robore. Hoc sane aliquando contingit aquosis etiam illis humiditatibus quæ per vrinas excernuntur, atque ob id crudas vrinas concoqui dicimus, quanquam corpus ex coctis vrinis alinon possit. Generali præterea hoc concoctionis significato vtimur, cum vel catarrhum, vel coryzam, vel fluentes ex his *ἰχθῆρες*, vel humiditates quæ ex oculis manant, aut coctas aut crudas esse dicimus. Ad hunc modum & bilem vel crudam, vel incoctam, vel coctam esse pronunciamus. Cruda quidem flaua admodum est & acris & male olens, cocta autem & pallidior & mini-

um male olens. Hæc Galenus; ex quibus colligi potest postremum hoc crudi humoris significatum vniuersalius esse, quemadmodum & *πῆσι*, cui huiusmodi *αἷον* opponitur. Ab hoc autem & morbus ipse crudus nominatur, quamdiu videlicet noxius humor resistit naturæ conanti ipsum mitificare, & in meliorem statum reducere. vide *πῆσι*. *ὀμοπλάται*. scapulæ. humeri. scopula apud Celsum, vel, vt alii legunt, scopula operta. Sunt ossa duo (vtrinque videlicet singula) post thoracem in dorso sita, clauibus & brachio inarticulara. Sunt autem hæc ossa, vt scribit Galenus admodum inæqualia, & omnibus suis partibus dissimilia. Foris enim gibba, intus lima existunt: item ima basi tenuia ac longa, superno sine crassa & parua. Vtraque autem omoplatæ duobus ossibus inarticulatur, summa quidem sua spina seu acromio clauis per synarthrosim, cavitare autem suæ cervicis (de qua mox) ipsi brachio per diarthrosim. Habent omoplatæ singulæ tres apophyses: vna *ράχις*, hoc est spina, dicitur, ab eius basi incipiens, primum humilis & depressa, deinde sensim elatior facta & amplior, donec desinat in acromion. Altera vero *αιχλή*, hoc est ceruix, à Galeno vocatur: est enim processus omoplatæ in cervicem admodum breuem, cui parum cavitare inseritur brachium. Ac quamuis ceruix proprie sit os paulo angustius, caput rotundum sustinens, dicitur tamen hæc apophysis etiam ceruix, quæ velut execto capite in cavitatem abiit: tertia vero apophysis interiore in parte est, cornicis & corui rostro similis, vnde *κροτήρ* siue *κροτήρις* vocatur, & à cavitare & mucrone anchoræ *αγκυροειδής*, & *εγχυμειδής* quod (literam Græcam curua figura repræsentet. Sed hoc loco operæ pretium est distinguere nomina multum sibi vicina, de quibus Rufus in partium hominis nomenclatura sic scripsit: *πῶς τὸ πῆσι πῆσι τῆς αἰχλὸς καὶ τῆς ἐπὶ τῆς αἰχλὸς κεφαλῆς τῆς βραχίονος ὀμοπλάτης*, *τῆς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς πῆσι πῆσι*. *αἰχλή* δὲ, αἰ κεφαλῆς τῆς βραχίονος ὀμοπλάτης, *αἰ κεφαλῆς τῆς πῆσι πῆσι*. *αἰ κεφαλῆς τῆς πῆσι πῆσι*. *αἰ κεφαλῆς τῆς πῆσι πῆσι*. *αἰ κεφαλῆς τῆς πῆσι πῆσι*. hoc est, quæ à tendine ad numeros perueniunt, epomides. humeri autem, capita brachiorum. scapulæ autem, ossa lata quæ dorso insident, quorum eminentia quæ per medium excurrit, spina acromia autem, copulæ clauium & scapularum ab his autem deinceps ea ossa quæ cataclides nominantur. Galenus comment. 1. *αἰ κεφαλῆς τῆς πῆσι πῆσι*, inquit, appellatur quicquid in articulo scapulæ cum brachio apparet sensibus: *ἐπὶ τῆς αἰχλὸς* autem pars est τῆς αἰχλὸς superior, quæ ad collum vergit. Quod autem sensui non est manifestum parte postica, os est *ὀμοπλάτης* dictum. Theodorus apud Aristotelem scapulas vertit quas Græci *ὀμοπλάτης* dicunt. Cæterum ex qua parte in spinam deuexe latiores sunt & tenuiores, *τῆς αἰχλὸς*

apud Pollucem appellatur: vbi autem crassiores factæ coarctantur, & tandem acutiores prominent, *πρωγία* ab alarum similitudine vocantur: qua vero parte dorso insurgunt iuxta primas vertebrae *κωλύσφα*, Latini caninas prominentias appellant. *χελών* autem pars gibberosa scapularum dicitur, tegmini *πρὸς χελόν* persimilis. In cuius medio humilis vallecula secundum spinam decurrit, quam Hyginus interscapilium appellat: nam veteres scapilium pro tergo usurparunt. Pollux id spatium inter scapulas cauum, quod secundum longitudinem ad lumbos porrigitur, *χελών* nuncupat, dicens, *τὸ μέσθον ὑπὸ μῆκος ἀχρὶς ὀφθαλμοῦ ἐν τῇ νύκτι καλαρόμενον, χρίσις καλεῖται*. hoc est, quod medium secundum latitudinem est usque ad coxam in dorso cauarum, crisis vocatur. forte quod dextram partem à sinistra *διακρίνει*, hoc est discernit & determinat.

*ὤμος*. humerus. Proprie dicitur id totum quod in articulatione brachii cum omoplatâ apparet sensibus: Rufus *καρπάλω τῷ βραχίονι*, hoc est caput brachii, appellauit. apud Aristotelem fere pro humeri articulo accipitur quem Celsus scapulam vocat. Reuera autem *ὤμος* non est aliud quam articulus ipse brachii cum omoplatâ.

*ὤμοπιχος*. falsa, siue sale condita thynni caro, vt scribit Dioscorides. Nomen habet ex crudis thynnorum carnibus & falsamento compositum. De thynni autem carne dicitur *κατ' ἔχον*. Reliquarum enim carniū falsamenta simplici nomine *πιχος* dicebantur.

*ὤμιος*. cruditas auctore Aristotele lib. 4. meteor. Est *ἀπὸ τῆς ἐν τῇ ἀναισθησίᾳ πρὸς τὸν*. hoc est, alimenti in fructibus inconcoctio. Est enim eo auctore species *τῆς ἀπείρας*, contraria *τῇ πεπρωμένη*. Inconcoctio vero illa non est aliud quam humor fructuū indefinitus. Facit autem *ὤμιος* duplicem, *ἀνομαλὴν* & *ὀδυνην*, pro rerum videlicet quæ coquuntur differentis: potest vero & ex vtriusque mista esse. Pronenit ob defectum caloris natui, aut huius quod in fructu coqui debet imensam copiam. Et hæc quidem est propria auctore Aristotele *ὤμιος* significatio. Verum, vt idem ait, quemadmodum *ἡ πύκνις*, sic etiam *ἡ ὤμιος* multipliciter dicitur. Nam & alui excrementa & vrinæ & catarrhi *ὤμιος* dicuntur, quod à proprio calore non vincantur neque consistant. Sed & testa & fictile etiam dicuntur cruda, quod ab externo calore non sint euicta. vide *ὤμιος*.

*ὤμοτιον*. crudum foetum parere. Non est autem idem prorsus crudum & abortiuum parere. Dicitur enim *ὤμοτιον* de iis tantum quibus per vim sollicitatur partus, quod maiora pericula vitentur, nimirum quum mater sic habet vt conceptum perficere non possit, aut perfectum citra vitæ discrimen edere non valet. Tunc enim præstat foetum immaturum corrumpere, ante legi-

timum pariendi tempus.

*ὤμαμα*. significat crudum abscessum & nondum maturum secare. Declarat id manifeste, simulque causas reddit Paulus libro 6. cap. 34. his verbis: *ἵνα ὅταν ἀποπνεύσῃς τὸ πῦρ τοῦ πυλῶντος ἐπὶ τὸν ὄμαμα μὴ κατὰ τὴν ἀφροίτην, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀφροίτην, ἢ κατὰ τὴν ἀφροίτην, ἢ κατὰ τὴν ἀφροίτην, ἢ κατὰ τὴν ἀφροίτην*. hoc est, scire conuenit quod ante perfectam in pus versionem aliquando crudos abscessus secamus, quod proximi sint vel articulis vel principibus partibus: ne longiore putredine vna corrumpatur iunctura aut aliquid necessariū corpori. Idemque paulo postea tradit Hippocratem vicina digitis apostemata ante perfectam maturitatem cruda secare præcipere, quod metuenda sit perforatio.

*ὤμοτεχὺς ἔλαιον*. crudum oleum, hoc est, ex crudis & nondum plene maturis oliuis expressum. idem etiam *ὤμαμα* vocatur, hoc est acerbum. Refrigerat & adstringit.

*ὤν*. ouum. Id vocamus quod vbi in fortura perfectum est, eius ex parte principio animal consistit, reliquum vero alimento ei quod gignitur est. Constat enim ouum duabus maxime partibus, lutea & alba, per membranam inter se discretis: ex quarum alba pullus initium suæ generationis accipit, perinde atque homo ex semine, ex lutea autem nutritur & incrementum sumit, non aliter quam humanus foetus ex sanguine menstruo, sicut pluribus verbis atque apertius Aristoteles libro sexto de histor. animal. demonstrauit. Et habent quidem omnia oua duo ista partium discrimina, nisi vel incubatu vel aliter vitium traxerint. Sunt autem præter hæc & quæ *χάλαζαι*, id est grandines, dicuntur, vitelli initio adherentes, quæ nihil ad generationem plarisque videntur conducere. has duas esse certum est, alteram parti superiori iunctam, alteram inferiori. Umbilicus etiam ouis, inquit Plinius, à cacumine inest, cetera gutta eminens in putamine. Non est aliud, inquit Alexander, quod orbis vniuersi, quem mundum vocamus, speciem euidentius quam ouum demonstret. Nam & in sphæræ faciem conglobatur, & vitalem potentiam obtinet, & ex quatuor constat elementis. Ouum quippe qualitates elementorum omnes complectitur, & quatuor illarum primordia plane in se sibi ostendit. Tegmentum enim testaceum, terræ proximum est, siccum namque & frigidum: albumen aquæ cognitionem gerit, humidum enim & frigidum: spiritus in albumine contentus pro aere est, calidus enim & humidus: vitellus ignem repræsentat, plus enim calidus, minus siccus, neque colore igneo vacat. Ita ergo temperatum ouum alimentum corpori præstat temperatissimum & optimum, præsertim si coctione non deprauetur: facile cōcoquitur, cito digeritur, multum nutrit, & pene nihil ex-

crementi relinquit, nec vilis est alius cibus, qui in agritudine alar, neque oneret, simulque vini vsum & cibi habeat. Id quod de recentj intelligi debet, quod vt optimum est, ita vetus habetur deterrimum. Spectantur autem in ouis duæ maxime differentia, quarum vna circa substantiam, altera penes cocturæ rationem est. Propria quidem substantia gallinarum ac phasianarum oua præstantiora sunt, deteriora vero anserum & struthocamelorum. Quin etiam tum gallinarum tum anserum reliquæ volucres minime volaces, vt perdices, columbæ, pationes, substantiis diuersa pariunt: alia quidem ex coitu, alia vero sine coitu, quæ *ἐκ σπέρματος* & *ἐκ σπέρματος*, Latinis subuentanea & irrita appellantur. Ea minus incundi saporis esse & magis humida perhibentur, quam quæ fecunda gignuntur. Sunt etiam sterilia, quod humor eorum crassescere incubatione non potest, sed tam candida, quam lutea eius pars similis sibi perseverat. Ad eam differentiam reduci possunt tum quæ *ἄγρια*, tum quæ *οἰκίαι* vocantur. Ac *ἄγρια* quidem vocant, quæ cum triduo incubata fuerint, tota lutea euadunt. Cuius nominis ratio in obscuro adhuc est. Credo autem ita dici ea oua à quibus pullus excludi incipit, vt quæ findantur atque rumpantur exeunte pullo. Alii autem non *ἄγρια* sed *οἰκίαι* malunt appellare, forte quod intus ficibus similia sint. *Οἰκίαι* vero, quæ & *κινδύου* dicuntur, hoc est canicularia, sunt oua deprauata, corrupto intus vitello: id quod æstate & alio quouis tempore calido solet contingere, vel vt Plinius vult, incubatione derelicta. Multiplex quoque est quæ ex coctionis modo sumitur ouorum differentia. Eorum alia *ῥομπυλά*, alia *ῥομπυλά*, alia *ῥομπυλά*, alia *ῥομπυλά* dicta sunt. Vocantur autem ea *ῥομπυλά*, hoc est tremula, quæ exemplo putamine in aqua coquantur eatenus vt non dureseant. Sic enim cocta vbi ab aqua exemeris, si dimoueas, manifeste tremere videbuntur. si facta sunt duriora, *ἰσχυρά* dicuntur. *ῥομπυλά* vero, hoc est sorbilia, sunt quæ simul cum putamine anteignem coquantur, eatenus vt liquida adhuc & minime coacta densataque maneant, & facile sorberi possint. eadem si duriora euaserint, *ἰσχυρά* sunt. Sed præstant tremula sorbilibus. Multum enim tremula nutriunt, sorbilia minus quidem nutriunt, sed aluum magis mouent, & gutturis asperitatem lauigant. In vtroque genere quæ plus æquo cocta sunt quam vt tremere vel sorberi facile queant, duriora sunt, crassiorem procreant succum, difficilius concoquantur & tardius permeant: quæ tamen vitia magis insunt iis quæ in calidis cineribus assantur: *ἰσχυρά* vel *ἰσχυρά* *ὠία* dici possunt. Cæterum cum tremula sorbiliaque bona sint, mala vero elixa atque assa, medium locum inter ea obtinent quæ *ῥομπυλά*, hoc est suffocata, veteribus dicta sunt, si modo medio-

crem nacta fuerint coctionem. Hoc autem modo parati solent: Oua vbi oleo, garo, ac vino modico conspersa erunt, in vase duplici coquantur, prius obturato eo quod ipsa continentur, donec modice crassescant. Tunc enim & melius quam dura concoquantur, & alimentum corpori præstantius præbent. Quæ vero supra modum induruerunt, elixis assisque similia sunt. Meminit & Galenus alterius coctionis ouorum, quæ superne caldarii infunduntur. Sed ea vel sunt cum sorbilibus eadem, vel eo tantum differunt quod hæc igne sicco, illa autem in calore humido coquantur. Sunt qui ea *ἰσχυρά* nominent. Omnium vero pessima habentur *ῥομπυλά* siue *ῥομπυλά*, hoc est frixa, sic dicta quod in sartagine quæ Græcistum *ῥομπυλά* tum *ῥομπυλά* vocatur, eorum coctio perficiatur. Ea dum coquantur, nidorem acquirunt, & non modo crassum, sed prauum etiam atque excrementitium succum subministrant.

*Ἄνδρ. ὄφθ.* humor oculi albugineus, quem magis vsitato nomine anatomici *ιδιόματις* appellant, de quo vide suo loco.

*Ἄνδρ. ὄφθ.* tempus anni dicitur & *καρπός*. Est pars anni insigni quadam temperie prædita. Proinde cum annus multifariam diuidi possit, non dies, non mensis tempus anni dici potest, sed vt sunt quatuor summæ temperamentorum differentia, ita æstus in quatuor tempora genere siue specie differentia distinguitur, quæ veteres ver, æstatem, autumnum & hyemen nuncuparunt. Ac quæquam in circulo motus principium nullum esse videatur, sed à quolibet puncto incipere possit, quia tamen anni singuli humanæ vitæ cursum videntur imitari, quodammodo repuerascens, rursusque senescentes, ideo à vere totius anni exordium sumendum esse veteres recte statuerunt. Est enim pueritiæ simile, sicut etiam ætas ætati florenti, autumnus declinanti, hyems autem senio. Sed & quam hæc temperiem habent, eandem & ipsa anni tempora sortiuntur. Horum autem author sol est, hunc maxime orbem exornans & concinne disponens. Siquidem eius accessione decessuque aer eas quatuor generales mutationes experitur, & ordinatas quidem semper, si solis modo motum consideremus: inordinatas vero variasque, si alia spectemus quæ necessario cum solis motu concurrunt. Sunt enim rerum omnium duo principia, ordinatum quidem quod à cælo est, à quo omnia decus & ornamentum capiunt, inordinatum autem quod ex hac mundi materie proficiscitur. Hæc quia inconstans est, etiam inconstantem annum & inconstantia eius tempora plerumque facit, nec permittit eandem semper temperiem seruare. Quo fit vt æstate quæ calida & sicca esse debet, pluuia aliquando & frigora sint, hyems sicca aliquando euadat, & veris temperies autumno similior existat.

Sunt autem hæ mutationes particulares, & *transiens* proprie appellantur. Quas tamen nonnulli non tam ad materię indefinitio- nem atque *transiens*, quam ad varias astrorum motiones & coniunctiones referendas cē- sent: inter quos est & Hippocrates: adeo multa syderum ortui & occasui tribuit. Si- quidem iis anni tempora distinguere vide- tur non minus quam solis motibus, Vergi- liarum ortum statuens initium æstatis esse, non aditum solis ad eandem: & similiter hyemis principium; non quando sol in capricorni signum ingreditur, sed cum Vergi- liz occidit. Aliter enim medicos, aliter as- trologos distinguere æquum est, hos qui- dem mortum modo solis spectantes, illos ve- ro temporum potius affectiones & tempe- riem considerantes, tanquam causas magis propinquas sanitatis atque aduersę valeru- dinis. Fuerunt autem ex antiquis aliqui qui septem anni tempora statuerent, vt anno- tavit Galenus commentar. in lib. de morb. vulgar. Veruntamen quatuor modo sunt, auctore Hippocrate, quæ *ἄρῃ* proprie ap- pellantur. Inter quæ quoniam æstas donec declinare incipiat & in autumnum vergere, iucundissima placidissimaque est, *ἡ ἐξ ἁρ- ἔχου* aliquando dicitur, vt scribit Gale- nus, duratque diebus quadraginta, quorum viginti ante Canis exortu sunt, reliqui post eius ortum, ita vt in eius temporis medio Caniculæ ortus contingat. Cuius etiam rei hoc argumentum est, quod reliquum pos- tremumque æstatis tempus *ἡ πύξις*, quasi *ἡ πύξις ἄρῃ*, vocetur. vide in dictione *ἡ πύξις*, & in dictione *Σίσις*.

*ἡ ἄρῃ* tempestiuum. quod cuique anni tem- pori conuenit dicitur. aliter ab Hippocrate *ἡ ἄρῃ* Aphot. 8. lib. 3. id est, constans & q̄ propriam seruat temperiem, quemadmo- dum in commẽt. Galenus explicauit. Sicut autem *ἡ ἐξ ἁρ- ἔχου* æstatem significat, ita aliquando *ἡ ἄρῃ* dicitur quod peculiari- ter æstate accidit, eaque maxime parte quæ *ἡ ἐξ* vocatur. In hac significatione *ἡ ἄρῃ* dixit Hippocrates libro 6. *ἡ ἄρῃ* *ἡ ἄρῃ*, vt comment. in eun. quarto Galenus anno- tavit, aquam quæ eo æstatis tempore de- scenderit, non autem vernam vt quidam in- terpretati sunt, quod nemo veterum ver- num tempus peculiari nomenclatura *ἡ ἐξ* appellauit. Ab eo quoque significatū fru- ctus *ἡ ἄρῃ* appellantur, quod eo fere tem- pore omnes fructus existant, alii declinan- tes, alii incipientes, alii in suo vigore, aut vl- tra citraue consistentes. Quos tamen Gale- nus non ob id solum *ἡ ἄρῃ* à veteribus nuncupatos fuisse credit, quod eo tantum tempore sint, sed quo ipsos ab iis qui reponi atque asseruari possunt, distinguerent. Nam & triticum & hordeum & pleraque legumina æstiuam atque annuariam ha- bent generationem, sed non facile citroque corrumpuntur, veluti cucurbitæ, mora, pe- pones, melopepones, persica & id genus

alia, quæ ob id fugacia Latini appellant. Ac quamuis cucurbitæ caro, vacuato eius se- mine in hyemem reponatur & sicca asser- uari possit, fieri tamen non potest quin eius natura in contrarium immutetur, cum tri- tici, hordei, atque aliorum eiusmodi cerea- lium seminum natura semper vna & eadem perseueret, maneatque substantiis talia, qualia erant cum iam inde ab initio ætate fuerunt perfecta. Sunt autem omnes *ἡ ἄρῃ* fructus humidi, prauis succi & corruptibilis, frigidi atque flatulenti, atque vbi corrupti sunt, similes venenis deleterijs euadunt.

*ἡ ἄρῃ*. collyrium est *ἡ ἄρῃ*, cuius descri- ptio habetur apud Galenum libro 4. *ἡ ἄρῃ*.

*ἡ ἄρῃ* *ἡ ἄρῃ*. genus salamenti inter macra præstantissimi. Fiebat autem ex pelamide minore sale condita.

*ἡ ἄρῃ*. id est *ἡ ἄρῃ*. nam & cura *ἡ ἐξ* di- citur, vt explicat Galenus in lexico Hippo- cratis.

*ἡ ἄρῃ*. id est *ἡ ἄρῃ*. anno. vt explicat Galenus. Manuscriptus codex in expositione habet *ἡ ἄρῃ*. vnde suspicari aliquis possit legendū *ἡ ἄρῃ* pro *ἡ ἄρῃ*.

*ἡ ἄρῃ*. collyrii nomē perutilis ad tenues fluxiones inueteratas, & myiocephala de- scriptio habetur apud Aetium lib. 7. cap. 33.

*ἡ ἄρῃ*. id est *ἡ ἄρῃ*, impetum fecerunt. vt ex- plicat Galen. in lexico Hippocr.

*ἡ ἄρῃ*. aures. vide *ἡ ἄρῃ*.

*ἡ ἄρῃ*. aurium dolor. non omnis quidem, sed is proprie, vt veteres appellare consueuerat, qui in profundo ad meatum auditorium mouetur, sicut Galen. comment. in progn. annotauit.

*ἡ ἄρῃ*. instrumenta sunt chirurgica, qui- bus aliquid in aures infunditur. Aurisuforia specilla dici possunt. Celsus alias strigiles, alias auriculares clysteres appellat.

*ἡ ἄρῃ* apud Hippocrate significat recens vul- nus, & aliquando cicatricē, vt annotat Ga- lenus comment. 1. *ἡ ἄρῃ* *ἡ ἄρῃ*, itemque in lexico Hippocratis.

*ἡ ἄρῃ*. quod ad aures pertinet. vt *ἡ ἄρῃ* *ἡ ἄρῃ*, auricularis clyster, cuius Galenus libro 3. *ἡ ἄρῃ* *ἡ ἄρῃ* aliquoties facit mentionem, & *ἡ ἄρῃ* *ἡ ἄρῃ*, auriculare medicamentum.

*ἡ ἄρῃ* *ἡ ἄρῃ*. auricularis digitus, minimo proximus.

*ἡ ἄρῃ*. effluxiones & exitus habet. vt anno- tat Galenus in lexico Hippocratis. à verbo *ἡ ἄρῃ*, quod significat Deriuari.

*ἡ ἄρῃ* terræ species est colore luteæ, à quo no- men habet. Duorum generum est, vna na- tiua siue fossilis quæ ex Attica olim defere- batur præstantissima, nunc autem ex Da- cia atque Hungaria: altera factitia quæ ex plumbo adusto fit, aceto extincto, & no- minatur vsta. pictoribus magis vsurpata. Vri tamen potest & natua, atque lauari cadmiæ modo, vt scribit Dioscorides, qui ochram commendat leuissimam & omni- no luteam, saturatam, non lapidosam, fria- bilem



bilem. Tribuit ei vires adstringendi, erodēdi, collectiones & tubercula dissipandi, ex-  
crescentias in carne reprimendi, caua cum  
cerato explendi, & articulorum tophos cō-  
minuendi. Paratur ex ea emplastrum quod  
si *ἄχρεα* dicitur, valens ad vibices flagrorū,  
excoriationem & collisā, & describitur ab  
Actio lib. 15.

*ἄχρον* luteum, pallidum. Colore ignem omni-  
no refert, esseque reuera tale, qualis ea terra  
species quam *ἄχρεα* vocant. Medio colore  
est inter flauū & album. Quippe si flauum  
albo miscere libeat, quod ex ambobus con-  
fit, pallidum euadet. In vinis id experiri li-  
cet, sicut Galen. lib. 5. sanī. tuend. annora-  
uit. Aquæ enim admistum flauum vinum, e-  
iusmodi colorem reddit. Licet vero & in hu-  
moribus: misto namque aquoso excremen-  
to cum flaua bile, pallidus humor nascetur,  
quem tamē non sub alio humoris genere q̃  
bilis medici comprehendunt, sed pallidam  
bilem vocant. Ac si amborum quidem æ-  
qualis mistio est, vere *ἄχρον* fiet, quod tanto  
candidius est flauo, quod *ξανθόν* Græci vocāt,  
quanto flauū rubro. Sin autem plus aquosi  
humoris est, *ἄχρὸ λευκόν* euadet siue ex palli-  
do albicās: si vero flauus aquosum exuperet,

*ἄχρὸ ξανθόν*, hoc est ex pallido flauum, appa-  
rebit. Abutuntur tamen interdū Græci pro-  
pria τὸ *ἄχρὸν* καὶ τὸ *χλωρόν* significatione, vo-  
cantes aliquādo *χλωρόν* eū hominem q̃ pro-  
prie *ἄχρὸς* dici deberet. Siquidem videntes  
aliquos pallidos, qui *ἄχροι* vere dicuntur, in-  
terrogant causam, vt scribit Galen. ob quam  
hi tam repente *χλωροὶ* facti sint, non existi-  
mantes differre *ἄχρὸν* ἀπὸ τοῦ *χλωροῦ*. Ex qua  
loquēdi consuetudine idem scripsit aliquot  
locis τὸ *χλωρόν* duo significare, *ἰώδι καὶ ἄχρὸν*,  
hoc est æruginosum & pallidum, æruginoso-  
sum pro viridi accipiens, quali præditam es-  
se lactucam omnes nouerunt, & qui longe  
magis ab albo distat quā pallidus. Est enim  
nigrior quam rubidus, & initium quoddam  
nigri liuidique, cum pallidus ad album pro-  
xime accedat. vide *πυρρόν*.

*Ὀχρος*. leguminis genus est, folio vt cicercula  
oblongo, vermiculis vt item cicercula ob-  
noxio, sequutis post imbres caloribus. Ga-  
za modo cicercam, modo eruiam interpre-  
tatur. Columella tamen cicercam nō tam le-  
guminibus quam pabuli generibus annu-  
merat. Sunt qui ochros etiam phaselos ap-  
pellari scribant. De his apud Galen. lib. 1.  
de aliment. facult.

## F I N I S.

Σ Ι Μ Ω Ν Β Α Α Δ Ι Χ Ι Ο Ζ

ἰατρὸς εἰς τὸ ἱππίατρον λαμπρότατον Γορράϊον.  
Ὅσος, ἑμαρτον Γορράϊος ἐν ἱπποκράτους λαβυρίνθοις,  
καὶ τὸ Γόλυμνὸν ἀχλὺν δέντα πάρος  
οὐ γὰρ κρύψας ἐθελόνος ταῦτ', ἀπὸ πλεονηθείης  
ἀλλὰ νέος δαπανῶν πόνους παροτρύνους ἐδέξατο.

## L E C T O R I S.



VONIAM fieri potest vt plerique Græcæ lingue imperiti cupiant a-  
liquid ex præcedentibus libris discere, quod tamen vocis locique in  
quò de eo agitur ignari inuenire non poterunt: ideo visum est nobis  
Lexicon hoc Latinogræcum contexere, vt ex eo discētes quomodo  
Græce Latinum quodque nomen dicatur, protinus ex isto ad Græ-  
cum transfiliant, vocemq̃; illic naçti intelligant quid sit de quo dubitāt. Verbi gra-  
tia si quis quid morbus sit aut causa, intelligere ex nobis cupiat, indicem sequen-  
tem adeat: in quo postquam compererit morbum νόσον dici, causam autem αι-  
τίαν, eas voces in libris præcedentibus inuestiget, vbi eorum  
significationem interpretationemque  
assequetur.



**Abdomen.** ἄβδωμ. *agrimonia.* εὐκατέλιον  
 ἄβδωμ. ἡβδωμ  
*abies.* ἐλάτη  
*abiga.* χαμαίντις  
*aboma sum.* λῶν  
 ἄβωμ  
*abortus.* ἀμβλωσις. ἐκβλάσις  
*abortire.* ἀμωπικεῖν  
*abrotonum.* ἀδρόνιον. ἀδρόπικον. *αβροτον.*  
 χαμπύκων.  
*abscessus.* ἀπόστασις. ἀπόστημα  
*absinthium.* ἀψίνθιον  
*Acacia.* ἀκακία  
*accessio.* παρέρυσις  
*accessionis retardatio.* ὑστερησις  
 τύπος  
*accidens.* συμβεβηκός. συμπίπτω  
*accipiter.* ἰεραεξ  
*acer.* σφένδαμνος  
*acerba vna succus.* ὀμφάκων  
*acerbum.* στυφόν  
*acerbum oleum.* ὀμφάκων ἔλαιον  
*acetabulum.* ὄξυβάφος  
*acetum.* ὄξος  
*acetum mulsum.* ὄξύμυξ  
*aciditas.* ὄξύτης  
*acidum.* ὄξύ  
*acre.* δριμύ  
*acrium esus.* δριμυφαγία  
*actio.* ἐνέργεια  
*acus pastoris.* γεσνίνιον  
*acuta spina.* ὄξύακανθα  
*acutus.* ὄξύς  
*Adamus.* ἀδάμας  
*additamentum.* ἀπόφισις  
*adeps.* πηλὴ  
*adherentia.* προσφύσις  
*adiantum.* ἀδιδαν  
*adolescens.* μετὰ τὴν ἡλικίαν  
*adstrictio.* σύψις  
*adstringens.* σύψων  
*adurentia medicamentu.* καυστική  
 καυτήρια  
*Aequabilitas.* ὁμοχρόνιον  
*aqualis pulsus.* ὁμαλὸς σφυγμὸς  
*aer.* αἴθρ  
*aer inspiratus.* πνεῦμα  
*aeolum.* χαλκός  
*aris squama.* χαλκοῦ λεπὴς  
*aris flos.* χαλκοῦ αἶθος  
*arica.* ἰός  
*aruginosus.* ἰώδης  
*arugo.* ἰός  
*astus.* δίερος  
*astus.* καύμα  
*etas.* ἡλικία  
*etas declinans.* ὁρμημαστική ἡλικία  
*etas florens.* ἀκμή  
*Affectio.* ἀφύψις  
*Agallochum.* ἀγαλλόχον  
*agriticum.* ἀγρικόν  
*agglutinamenta.* ἀνακολληματὰ  
*agglutinamenta squamosa.* ἀνακολληματὰ λεπτοδενδρῆ  
*agglutination.* προσφύσις

*agrimonia.* εὐκατέλιον  
*agripalma.* χαλκός  
*Aiuga.* χαμαίντις  
*Ala.* μαχαλὶς. πτερύγων  
*alatus.* πτερυγῶδης  
*albaras alburn.* λεύκον  
*albaras nigra.* λέπτα  
*albicum.* αἰδέικος  
*albugo oculi.* κηλὴ ὀφθαλμοῦ  
*albus color.* χαροπὸς  
*alcaquengi.* ἀλκακάκος. σπύρχος  
*alga.* βρύον  
*alica.* χυδρός  
*alimenta mali succi.* κακὸν γυμνα  
*alimenta stomacho aduersa.* κακὰ  
 σίμαχα  
*alimentum.* τροφή  
*alimentum boni succi.* εὖ γυμνον  
*allii capita.* δακτύλιδες  
*allium.* μόνυλα. σκίροδον  
*allium vspicum.* αἰπασκίροδον  
*alvus.* κλῆθρον  
*alquequengi.* σπύρχος  
*alteratio.* ἀλλοίωσις  
*alteratrix facultas.* ἀλλοιωτική δύ  
 νاميς  
*altercum.* ὑοσκύαμος  
*althia.* ἰβίσκος  
*altix facultas.* ἀπλητική δύναμις  
*alveorum crusta.* ποσάκρος  
*alui profluvium.* διάρροια  
*alumen.* συπληρία  
*alugna.* ἀψίνθιον  
*Amaracum.* σάμψυον  
*amaritudo.* πικρότης  
*amarum.* πικρόν  
*ambidextra.* ἀμφιδέξιος  
*ambubia.* κηλὴ ὀφθαλμοῦ  
*ambarum.* ἀμβάρ  
*ambustus.* πυρκαϊσμός  
*ambrosia.* βότρυς  
*amentia.* αἰτία  
*amphora.* ἀμφορεύς  
*amuleta.* ἀποβότα  
*amuletum.* ἀλκιζήτιον. ἀλκιζφαρ  
 μακόν. θεῖον μύημα  
*amurca.* ἀμύργη  
*amydum.* ἀμύλον  
*amygdale.* αἰπάδες  
*amygdalus.* ἀμυγδαλὴ  
*Anagallis.* κολλαρίον  
*anchora similis processus.* ἀγκυρο  
 εἰδὴς ὀπίφισις  
*anchusa.* ἀγκύσον  
*anetum.* ἐλάτη  
*anethum sylvestre.* μύρον  
*angina.* καυαχόν  
*anguli oculorum maiores.* παρτήρες  
*anguli oculorum minores.* παρὸπται  
*angulus oculi.* κατὸς  
*anhelosi.* πνευματικὰ πνευματὸν  
 μόνον  
*anima.* ψυχή  
*animalis facultas.* ψυχικὴ δύναμις  
*animalis spiritus.* ψυχικὸν πνεῦμα

*animosa facultas.* θυμώδης δύναμις  
*animsculus.* σπικτήρ  
*annus.* ἐνιαυτός  
*annuum.* ἐνιαυσίον  
*anticipatio accessionis.* προληπτικὸς  
 τύπος  
*anus.* ἑδρα. ἀρχή  
*anxietas.* ἀλύκη. ἀλυσμός  
*Aperire.* σπικεῖν  
*aplastum.* μελοσφύκτον  
*apum.* σελινον  
*apum montanum.* ὄρεοσέλιον  
*apollinaris herba.* ὑοσκύαμος. συμ  
 φωνία  
*apparens.* φαίνόμενον  
*appetentia.* ὀρέξις  
*appetentia canina.* ὀρέξις καυώδης.  
 φαρμάκων  
*appetrix facultas.* ὁρμημαστική  
 δύναμις  
*appetitus.* βελβός  
*appositio.* προσφύσις  
*Aqua.* ὕδωρ  
*aqua metus.* ὑδροφοβία  
*aqua mulsa.* μελικερατὴν. ὑδρόμυξ  
*aqua oleo mista.* ὑδρόλειον  
*aqua rosae mista.* ὑδρορόδιον  
*aquum.* ὑδατῶδες  
*aquus humor.* ὑδατῶδες ὑγρὸν  
*aquifolium.* ἀγρία. χερατρυγόν  
*aquila lapis.* ἀέτης  
*aquilo.* βορρᾶς  
*aquosus rament.* ὑδροκήλη  
*aquila.* ὑδατὶς  
*Aranea similis tunica.* χιτὼν ἀρά  
 χνιδης  
*arbutus.* κήμπος  
*arcturus.* ἀρκτεῖον  
*ardens febris.* καύσις  
*ardores.* ὀρθρολογισματὰ  
*area.* ἀλωπεκία. ὀφθαλμοί  
*argentea terra.* ἀργυρένιος γῆ  
*argentina.* ἀργυρόν  
*argenti spuma.* ἀργυρῶς  
*argentum vivum.* ὑδράργυρος  
*argumentum.* πημύειον  
*aridum medicamentum.* ξηρὸν  
*armela.* μύλον  
*armoracia.* χελία  
*aquatus morbus.* ἰκτερός  
*arsenicum.* σενδαχόν  
*arteria.* ἀρτηρία  
*arteria aspera.* φάρυγξ  
*arteria dissectio.* ἀρτηριόμυια  
*arteria magna.* ἀόρτη  
*articulis.* κινάδες  
*articularis morbus.* ἀρθρίτις  
*articuli canitas seu sinus.* γλάνη  
*articulorum contractio.* ἀγκυλὴ  
*articulus.* ἀρθρον  
*arundo.* καλάμος  
*Ascia.* σκίαπρον  
*aselli.* ὄνοι  
*astaragus sylvestris.* λιβυκόν  
*aspera arteria.* βρόγχος

[illegible]

<i>catheter</i> . καθετήρ	<i>cichorea lutea</i> . ιεροχόμο	<i>concoctio</i> . πύψις, πεπομαίνω
<i>caucalis</i> . καυκαλός	<i>cichorium</i> . κικυρίον	<i>concoctio depravata</i> . διαφασία
<i>caucus</i> . αἰθυσίς	<i>cicuta</i> . κίκυτις	<i>concoctio tarda</i> . βραδυπύψια
<i>cauda equina</i> . ἑταυρεὺς	<i>cicuta</i> . κικυρίδις	<i>concoctrix facultas</i> . πεπικνιδία
<i>cauda muliebris</i> . κέρκωσις	<i>cilia</i> . βλεφαρίδες	<i>concoquens in medicamentis</i> . πύψις
<i>causitas</i> . καυσίτης	<i>cimicaria</i> . κινύρα	καὶ φάρμακα
<i>causitas oculi</i> . γλήων	<i>cimolia terra</i> . κινωλία γῆ	<i>concretile</i> . πύψις
<i>caulis</i> . κάρυβη	<i>cinnamomum</i> . κιννάμωμον	<i>concretio</i> . τῆξις
<i>causa</i> . αἰτία	<i>cinnamum</i> . κιννάμωμον	<i>concupiscibilis facultas</i> . ὀρεξίσις
<i>causa euidens</i> . ὁρατὰ πύχνα αἰτία	<i>cinnamum</i> . κιννάμωμον	καὶ διὰ τὴν
τις, ὁφθαλμὸς	<i>cincinnalis</i> . ἱεροβοτάνη	<i>concurfus</i> . συνδρομή
<i>causa externa</i> . ὁρατὰ πύχνα αἰτία	<i>cinerum colligium</i> . ἀσβέστης	<i>concurfus dentium</i> . τρισμαίνω
<i>causius</i> . καυσιώδης	<i>cinerula</i> . ἀσβέστης	<i>condensatio</i> . πυκνότης
<i>cauterium</i> . καυστήρ, καυτήριον	<i>cinnabatis</i> . κιννάβαρις	<i>condimenta</i> . ἐμβάσματα
<i>cedria</i> . κεδρία	<i>circaea</i> . κίρκαια	<i>conditum</i> . κόνδιον
<i>cedri fructus</i> . κεδρίδις	<i>circinus</i> . ζώνη	<i>conditum rosaceum</i> . ροδάκνιον
<i>cedrinum oleum</i> . κεδρίδιον	<i>circutis</i> . ὀφθαλμὸς	<i>conditura supersua</i> . χερυμνία
<i>cedri oleum</i> . κεδρίδιον	<i>cirri</i> . κίρκαια	<i>confusio oculi</i> . ὀφθαλμὸς
<i>cedrium</i> . κεδρίδιον	<i>citrato</i> . κιννάμωμον	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cedrula</i> . κεδρίδις	<i>clausum</i> . κλειστόν	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cedrus</i> . κεδρός	<i>clausula</i> . κλεισίς	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cedrus maior</i> . κεδρίδιον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>centauria minor</i> . κενταύριον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>centaurium</i> . κενταύριον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>centaurium maius</i> . κενταύριον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>centinodia</i> . κεντινόδιον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>centrum gallinae</i> . ὄρνιθος	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>centum capita</i> . κενταύριον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>centunculus</i> . κενταύριον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cera</i> . κέρως	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cera</i> . κέρως	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cera facta</i> . κέρως	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cerasus</i> . κερσός	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>ceratum</i> . κεράτιον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cerealium semina</i> . δημητέα σπέρματα	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cerebellum</i> . κερκεβέλλιον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cerebrum</i> . κερκεβέλλιον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cerinthe</i> . κερίνθη	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>ceruix</i> . κέρως	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cerussa</i> . κερύσις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>ceratob</i> . κεράτιον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cheresfolium</i> . κερήφυλλον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chalcitis</i> . χαλκίτις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chamaleo</i> . κίχας, χαμαλίων	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chamaleo albus</i> . κίχας	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chamaleo niger</i> . κίχας	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chamalea</i> . κίχας	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chama</i> . κίχας	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chironium vulcus</i> . κίχας	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chirothece diua Maria</i> . κίχας	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chirurgia</i> . κίρουργία	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cholago</i> . κολάγις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cholera</i> . κολέρα	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chondrilla</i> . χονδρίδιον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>Christi palma</i> . βασιλική	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>chrysocholla</i> . χρυσόχολα	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicatricosum medicamentum</i> . κίκαριον	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicatrix</i> . κίκαρις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicatrix oculi</i> . ὀφθαλμὸς	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicer</i> . κίκαρις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicera</i> . κίκαρις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicercula</i> . κίκαρις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicercula</i> . κίκαρις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ
<i>cicer rusticum</i> . κίκαρις	<i>clausus</i> . κλειστός	<i>congruus</i> . ὁμοῦς, ὁμοῦ

D		
<i>costus. ὄσος</i>	<i>Date. δάκτυλος</i>	<i>doracia mala. δόρακια μάλα</i>
<i>cotricula. ἀκρίων</i>	<i>daucus sylvestris. καυκαλὶς</i>	<i>doronicum. μαμυράς</i>
<i>cotonea malus. κωδωνία</i>	<i>Declinatio. ἀβασμὴ</i>	<i>dorsum. ἀνίστημι, μεταφρεσθ. ὄπισ</i>
<i>cosonium. γροσπίον</i>	<i>decoloris. λεῖψαιμι</i>	<i>Drachma. δραχμή. ἰσκή</i>
<i>costula maior. ἐλγυρπύ</i>	<i>decreescens pulsus. μῖνους σφυγμὸς</i>	<i>dracunculus. δρακόντιος</i>
<i>cotyla non fetida. βύφθαλμος</i>	<i>decretorius dies. χειρὶς ἡμέρα</i>	<i>dropax. δρόπαξ</i>
<i>coxendix. ἰχθὺς</i>	<i>decurtatus pulsus. μῖνους σφυγμὸς</i>	<i>drupus. δρυπίς</i>
<i>Cranii fractura. κρανίου ρήξις</i>	<i>defectus animi. λειποθύμια</i>	<i>dulce. γλυκύ</i>
<i>cranium. κρανίον</i>	<i>defluxio. κατάρρεσις</i>	<i>dulcedo. γλυκύτης</i>
<i>crapula. κραταιή</i>	<i>defrutum. ἱσάμα. σίραγον</i>	<i>duodenum. δωδεκάδακτυλος</i>
<i>creta. λιπυρήμιον</i>	<i>deglutitio. κατάποσις</i>	<i>durum. σκληρόν</i>
<i>crepido. ἄμβη</i>	<i>delactymatima. ἀποδακρυγία</i>	<i>Dysenteria cuncta. αἱματηρὴ δυσεντερία</i>
<i>creta. κρηπίς</i>	<i>delectatio. ἡδονή</i>	
<i>crista alioquin ὀφθαλμῶς</i>	<i>deleterium. ἀπονηλέον</i>	<b>E</b>
<i>crista gallinacea. ἱεροβοτάνη. ἀβελή</i>	<i>delirare. ἀνοφάσσειν. ἀβελήσασθαι</i>	<i>Ebenus. ἔβενος</i>
<i>crocini unguentis restrimenium.</i>	<i>delirium. λῆρος. ἀφροσύνη</i>	<i>ebrietas remedia. αἰμύδωτα</i>
<i>κροκίωμα</i>	<i>densantia medicamenta. πικνωτικά</i>	<i>ebulus. ἀκτὴ. χαμαίακτις</i>
<i>ctosis. χρόσις</i>	<i>dens canis. ἄχρσις. κυρσίτις</i>	<i>Eclera. χελιδόνις</i>
<i>ctetion. κίτις</i>	<i>densitas. πυκνότης</i>	<i>Efflatio. ἐκφύσησις</i>
<i>cteniciata. γασφάλιον</i>	<i>densum. πυκνόν</i>	<i>Elaterium. ἐλατήριον</i>
<i>ctiditas. ὀμότης</i>	<i>dentes. ὀδόντες</i>	<i>elementum. ἀρχή</i>
<i>ctudum. ὀρυσί</i>	<i>dentes genuini. κερνῆρις. ὀδόντιος</i>	<i>elixatio. ἱσάσις</i>
<i>cruentum medicamentum. ἱσάμιον φάρμακον</i>	<i>dentes molares. γόμφος</i>	<i>Emplastrum. ἐμπλάστριον</i>
<i>cturum resolutio. σκελετορῆσις</i>	<i>dentes primores. κτίτις</i>	<i>Englantierium. κυνιόδακτις</i>
<i>ctus. κτήμα. μῦθος. σκέλος</i>	<i>dentifricium. ὀδοντοφύμα</i>	<i>eniformis cartilago. ἐνιόμοις ὀστία</i>
<i>ctus galli. ἄχρσις. κυρσίτις. δάκτυλος</i>	<i>dentiscalpia. ὀδοντογλυφα</i>	<i>enula campana. ἐλάνη</i>
<i>ctusta. χέλας</i>	<i>dentitio. ὀδοντομῖος. ὀδοντομῖος</i>	<i>Epiala febris. ἐπιόλος πυρετός</i>
<i>ctustificum medicamentum. ἱσάμιον φάρμακον</i>	<i>dentium alucoli. φατρία</i>	<i>epilepsia. κενεχλία νόσος. ὀσμάνη</i>
<i>ctustula. ἐφύλησις</i>	<i>dentium stictor. αἰμύδωτα</i>	<i>Equisetum. ἱπποκρίσις</i>
<i>ctustallus humor. χρυσάμονδες ἰχθὺς</i>	<i>depilatorium. ψιλοτόριον</i>	<i>Erosio. ἰσχυρότης</i>
<i>ctustallus. χρυσάλλος</i>	<i>derinatio. παροχέτις</i>	<i>erratica febris. ἀτακτός πυρετός</i>
<i>Cubeba. καρταίσις</i>	<i>desipititia. παραλογία. παραφροσύνη</i>	<i>erratoria medicamenta. πικνωτικά</i>
<i>cubicum os. κυβιστῆς ὀστέον</i>	<i>destillatio. κρούα. σκευή</i>	<i>erubilia. ἄχρσις</i>
<i>cubiti os. κυβιστῆς</i>	<i>detergens medicamentum. καθαριστικόν</i>	<i>erum. ὄρεος</i>
<i>cubitum. ἀγκύλιος. ἄρσις. ὀλίγαρον</i>	<i>detractio. κατάρρεσις</i>	<i>Esula. πύτυσα</i>
<i>πύτυς ὀλίγη</i>	<i>denoratio. κατάποσις</i>	<i>Etesia. ἐτοσία</i>
<i>cucurbitis. ἀγγυρία. σίκυς</i>	<i>Diagredum. δακρυόδιον</i>	<i>Evaporatio. ἀεφύρσις</i>
<i>cucurbita. κολοκυθία. σίκυς</i>	<i>diarria febris. ἐφ' ἡμέρας πυρετός</i>	<i>eufasia. εὐφασία. εὐφροσύνη</i>
<i>cucurbita sylvestris. κολοκυσσός</i>	<i>dies. ἡμέρα</i>	<i>eunichus. δούλος</i>
<i>cucurbitula. σίκυς</i>	<i>dies index. ὁπιδόλος ἡμέρα</i>	<i>Excaldatio. αἰθυσίς</i>
<i>culeus. κύλιος</i>	<i>disflatio. ἀεφύρσις</i>	<i>excrementum. ἀποβόμα</i>
<i>cuminum. κύμινον</i>	<i>digestio. αἰσθήσις. ἀεφύρσις</i>	<i>exercitatio. γυμνάσιον</i>
<i>carnesformis. σφουροειδὲς ὀστέον</i>	<i>digiti. δάκτυλοι</i>	<i>exolutio. ἀφίσις</i>
<i>cunila θυμβος. ὀδύραρον. πύλας</i>	<i>digitorum articuli. κύνδυλοι</i>	<i>expansa. ἐκτεταμένη</i>
<i>cunilago. κύνδα</i>	<i>digitorum callus. κύνδυλωμα</i>	<i>experientia. ἐμπειρία. πύξις</i>
<i>cupressus. κυπρίσις. σφαγίτις</i>	<i>digitorum internodia. φάλαγγες</i>	<i>expiratio. ἀπνοή</i>
<i>cura. φρονίς</i>	<i>digitorum ossa. σφυρῶδες</i>	<i>explantatio. ἀπώσις</i>
<i>cuticula. ἀνδριανόνησις</i>	<i>digitus pro mensura. δάκτυλος</i>	<i>expulsiu facillitas. ἀποκρίσις δύναμις</i>
<i>cutis. δέρμα. χροῖς. φρενὴς</i>	<i>digitus medicus. ὀδοντομῖος</i>	<i>expurgia. χαρμῖς</i>
<i>cutis a sole vsta. ἐφύλησις</i>	<i>digitus medius. μέσος δάκτυλος</i>	<i>extensio. ὀρέσις</i>
<i>Cyathus. κύαθος</i>	<i>discolor a sole cutis. ἐφύλησις</i>	<i>extenuatio. λεπύτης</i>
<i>cyperus. κύπερος. ἐλάνθησις</i>	<i>dispergere. ἀπείρεσις</i>	<i>extenuatio corporis. ἐμύλησις</i>
<i>cyperus babylonicus. γάλαρα</i>	<i>distensio. ἀπώσις</i>	<i>extrema. ἔσχατα</i>
<i>cypris. κύπρις</i>	<i>distensio nervorum. ἀπώσις. πύξις</i>	<i>exufflatio. ἐκφύσησις</i>
		<i>exupera. ἱεροβοτάνη. ἀβελή</i>

F

*Faba. κύβητος*  
*fabae Aegyptia. κολοκυσσός*  
*fabae freja. ἐρεχθίς. ἔτος*  
*facies. πρόσωπον*  
*facilis. ῥητός*  
*facula. φανός*



facultas diuina	(μὴ) ficus. οὐκ. οὐκ.	furfuracea hypostasis. πτερύδα
facultas secretrix. ὁρμητική δύναμις	ficus Egyptia. συλμαρὸς	ὑποστατική
fama. λόγος. πύλη	ficus subterculum. σύμπος	furfures. πτερύδα
famei ingens. βέλμιος	filicula. ἀνυψίσις. πλοπιδίον	furot. μαρία
farsugium. χαμαίμυλα	filix. βλάστησις. πυλιδίσις. τίλις. τίς	furunculul. δόλιον
farina. ἀλεύριον	filum lingue. ἀγκυλόγλωσσον	fuscum. φάινον
farina bordeacea. ὀρύζις	simbria. ὄξυριμα	G
farina bordei. μέλα	fissura. ραχιδίς	Gagates. γαγάτις
farrago. σικαλὴ	fistica. πικρία	galacum. ἱβνός
fastidium ciborum. ἀσάτης	fistula. οὐρῆς	galbanum. μελίτιον. χαλβάς
fatuitas. μύρωσις	Flamma. αἶμα	galanga. ἄνθος. γάλαγγα
fauces. ἀνὰ δὲ. ἀσπράγλας. φάρυγξ	flammea. λυγίς	galla. καπὶς
fauns. κελίον	flatulenta febris. πύλινος δὲ πυρετός	gallitricum. ὄρμιον
Febris fugia. κωλύειν	flatuosus motus. μελαγχολία	garum. ἄρον
febris. πυρ. πυρετός	flatus. πνέμα. φῖον	garum aquosum. ὑδρὶδρον
febris ardens. καύσις. ἀεὶ καὶ πυρ.	flatus ventriculi. πνεύματος γὰρ	(σπός) gangraphyllum. καρποφυλλόν
febris aspectu gravis. διπλὸς ἰδὲν	flexilia. χαμαίλα	Gen. γένος. ἡνός. μέλιον. πύρριον
febris colligata. σπασμὸς	flos. ἄνθος. ἄλγος	gena. βλάφα
febris continua. σπασμὸς πυρετός	fluxio. καπῖρος. ῥέμα	genicularis herba. λυγίς
febris decrescens. παραμεινὸς πυρ.	fluxus. ῥέμα	genistella. ἱβνός
febris erratica. ἀλάτης πυρετός	Foeniculum. μέλας δρον	genitura. γονή
febris homotonos. ὁμοπύρετος	foeniculi erraticum. ἰππύμαρδρον	gentiana. ἡνὰρ
febris horrida. φρενὸς πυρετός	foenum Burgundense. μινδικόν	gens. ἡνός
febris humida. νοσηδὲς πυρετός. ὑγρὸς πυρετός	foenum Gracum. ἀγρίος. βίαιος. κακός. τίλις	gestatio. αἰσθήσις
febris increscens. ἀνὰ δὲ καὶ ἰππύμαρδρον	folliculus fellis. κύστις. χαλδὸς	Gibber. ὀλίγος
febris intermissa. ἀσάτης πυρετός	fons capitis. βρύχια	gibbositas. κούρσις. κούρσις
febris intermittens. ἀσάτης πυρετός	formica. μυρμηκία	gingedim. γαγγιδίον. χαρῖφιον
febris mitis. ὀρενός πυρετός	formicans pulsus. μορμυκίζον σφυγμὸς	gingina. ἔλα
febris mordax. δυνάμεις πυρετός	fornix. φάρονδὲς σῦμα	ginginatum caro. ἔλα
febris pusilla sicca. βλαχρὸς. ξηρὸς	fossula oculi. βόσπιον	ginginatum inflammatio. πύρριον
febris quartana. ἡπέρτις πυρετός	foetus. πορῖμα	ginginatum pruritus. ἰδὲν ὁρμὸς
febris quotidiana. ἀμεινὸς πυρετός	Fractura calvaria. ἀπὸ χυμῶ. ἐκ πίσημα	ginginatum tuberculum. ἰππύδα
febris salsa sine falsuginosa. ἀλμυρὸς πυρετός	fractura capitis medicamenta. ἡπέρτις φάρμακα	ginstea. ἰππύδα
febris sicca. ξηρὸς πυρετός	fractura cranii. ὑποκεφαλική	gith. μελαχρὸς
febris synochus. σπασμὸς	fractura ossis. ἰδὲν	Glabella. μεσέφρον
fel. χολή	frambosia. βάνος	gladiolus. κούρσις. ἔριον. ἔριον
fel terra. κωλύειν	fraxinus. μύρα	glandula. ἀδλὸν
femur. μῦρος	friabile. ἀπὸ τοῦ κρούειν. ἡπέρτις	glandula faucium. ἀπὸ τοῦ
ferrum. μέλιον	fructus. ἀπὸ τοῦ φέρειν. ἡπέρτις	glandula herba. ἀσπράγλας
fermentatio. ὑμωσις	fructio. ἀπὸ τοῦ φέρειν. ἡπέρτις	glandula parastata. ἀδλὸν ἰδὲν
fermentum. ὑμωσις. σῖπ. σῖπ	frigidissima aqua. ἀπὸ τοῦ ὁδῶν	ὄξυριμα
ferrum. αἰδύς	frigus. χύμιν	glans. βάλανος
ferrum purgatum. ὄξυριμα	frons. μέτωπον	glans icilis. ἀλγος
ferula. νάρθηξ	frontis ruga. γλῆς	glans tinguentaria. βάλανος μεσέφρον
ferulago. δολιχία	fructus. καρπὸς	ἡπέρτις
ferula hyemalis. ἡπέρτις	frugiperda. ὀλίγος	glans. βάλανος
feruor. ὁρμητικότητα	frumentum caudatū. ἀλγος	glans. βάλανος
fistula. αἰχμή. βρύχια	frumentum Tureicum. ἰππύμαρδρον	glans. βάλανος
festucas colligere. χαρῖφιον	Fucus marinus. φάκος θαλάσσιος	glans. βάλανος
fec vini. σπῆμα	fuligo. ἄλγος	glans. βάλανος
Fibra aurium. ἄσπις	fulvum. κούρσις	glans. βάλανος
fibra. ἰβνός	fulva. ἡπέρτις	glans. βάλανος
fibula. πύρριον	fungi. μύρα	glans. βάλανος
ficatio. αἰδύς	fungus. ἄλγος	glans. βάλανος
ficatum iecur. σπῆμα ἡπέρτις	furete. ὄρμιον	glans. βάλανος
fici gratia. ἡπέρτις	furfuracea olia. ἡπέρτις ἰδὲν	glans. βάλανος

<i>granum</i> . χένδρος	<i>hydroper</i> . ὑδροπέρι	<i>instita</i> . ἱμαθες
<i>granum cnidii</i> . κνιδεύς κόνιος.	<i>hydro</i> . ὑδρῶν	<i>instrumentum</i> . ὄργανον
<i>vide etiam</i> κόνιος κνιδεύς	<i>hyblum</i> . ἀκτία	<i>integritas</i> . ἀποριζία. ἀγλαίμμη
<i>granum paradisi</i> . καρδάμωμον	<i>hyems</i> . χιμῶν	<i>intemperies</i> . δυσκρασία
<i>granum tinctorii</i> . κόνιος βαφικῆ	<i>hystericus</i> . συμφορικός	<i>interanea</i> . ἀσάργα
<i>gratia Dei</i> . ἐλεφόςου	<i>hypochondrium</i> . ὑποχόνδριον	<i>interfemineum</i> . ἀσείμαον
<i>gravedo</i> . κόρυς	<i>hypocisthis</i> . ὑποκισθίς	<i>intermissio</i> . ἀγλαίμμη
<i>grossi vel grossuli</i> . ἄλυσος	<i>hypostasis</i> . ὑπόστασις	<i>interna vena</i> . μαχαλαία φλέψ
<i>gremius</i> . στήθος	<i>hysorism</i> . ὑσώριον	<i>internodia digitorum</i> . φάλαγγες
<i>grunda</i> . γέστομα	<i>hysorius humida</i> . ὑσώριον ὑγρόν	<i>internallum</i> . ἀσείμμη
<i>Gula</i> . οἰσφάγος		<i>intestina</i> . ἀσείμμη ἔντερα
<i>gummi</i> . κόμμη	<b>I</b>	<i>intestini prolapsus</i> . ἐντεροκήλη
<i>gurgulio</i> . λίαν	<i>Iarus</i> . ἄρον	<i>intestinum cecum</i> . τυφλὸν ἔντερον
<i>gustus</i> . γέστος	<i>Ibicus</i> . ἀνδαία	<i>intestinum tenue</i> . εἰλεόν
<i>gutta</i> . ἀμμοκιστὸν	<i>Ictus</i> . πληγή	<i>intestinum rectum</i> . ἀρχίς
<i>guttur</i> . ἀσφάδερος. βρόγχος	<i>Iecur</i> . ἥπαρ	<i>intinctus</i> . ἐμβάμματα
<i>gutturis rānæ</i> . βρογχοκήλη	<i>iecur figatum</i> . συσπῶν ἥπαρ	<i>intubus erraticus</i> . κυχάριον. τραχὺς
<i>gutturis</i> . ἐξέχθρογοι	<i>ieiunium</i> . ἱστῆμα	
<i>Gypsum</i> . γύψος	<i>ignis</i> . πῦρ	
	<i>ignis sacer</i> . ζώνη. ζωστήρ	
<b>H</b>	<i>Ile</i> . κενόν	
<i>Hæmatites</i> . αἱματῆς	<i>ilex</i> . κερταγῆς. σφινός	
<i>hemorrhoids</i> . αἱμορροΐς	<i>ilia</i> . ἱλῆς. λαγόνες	
<i>hæmel</i> . μῶλον	<i>illaqueatio</i> . αἰσθητοχρημῆς	
<i>bastula regia</i> . ἀσπράδλος	<i>illecebra</i> . ἀδίσω	
<i>habitus</i> . ἔξως	<i>Imitatio</i> . μίμνησις	
<i>habitus bonus</i> . εὐχία	<i>impetigo</i> . λοιχλή. λέπρος	
<i>habitus malus corporis</i> . καχχία	<i>impetum facientia</i> . ἐνορμούμη	
<i>Hæctica</i> . ἐκπικία	<i>Inæqualitas</i> . αἰσθητοχρημῆς	
<i>hedera</i> . διονυσία. ἱλῆς. κισσός	<i>inæqualis pulsus</i> . αἰσθητοχρημῆς	
<i>hedera terrestris</i> . χαμαίμοσος	<i>inappetens</i> . ἀσπῆς	
<i>helenium</i> . νήπιος	<i>inappetentia</i> . ἀσπῆς	
<i>helxines lacrymæ</i> . ἀλυσήκη	<i>incarnans medicamentum</i> . σκληρὸν φάρμακον	
<i>hemisrania</i> . ἡμιπράνι	<i>inciso</i> . ἐγχοπή	
<i>hemina</i> . κοτίλη	<i>incisores dentes</i> . πικασὶ ὀδόντες	
<i>herba catorum</i> . καλαμίνθη	<i>incolium</i> . ἀσπῆς	
<i>herba dina Maria</i> . πικρὴς	<i>incrementum</i> . αὐξησις	
<i>herba dini Ioannis</i> . ἀσπῆς	<i>incubus</i> . ἐφιάλης. πηγάριον	
<i>herba lactis</i> . ἑλκός	<i>index</i> . ἀρχαίς	
<i>herba Maria</i> . κισσός	<i>indicatio</i> . ἐνδείξις. πικρὸς	
<i>herba sancti Ioannis</i> . πικρὸς	<i>indurantiæ medicamentæ</i> . σκληρὸν φάρμακον	
<i>herculana urtica</i> . ἀλυσήκη	<i>infans</i> . νήπιος	
<i>herculeus morbus</i> . ἡσυχία νόσος	<i>infibulatio per acm</i> . αἰσθητοχρημῆς	
<i>hermodactylus</i> . ἐφῆμερος	<i>inflammari</i> . φλεγμαίνεν	
<i>hernia</i> . κισσός	<i>inflammatio</i> . φλεγμονή. φλόγος	
<i>hernia varicosa</i> . κισσοκήλη	<i>inflata febris</i> . πυρετός	
<i>hernia xirbalis</i> . ὀμφακήλη	<i>inflatio</i> . ἐμφύσημα	
<i>herpes</i> . ἔρπης	<i>infundibulum</i> . χοάνη	
<i>herpes miliaris</i> . κερχίαις	<i>infusio</i> . ἐγχύμα	
<i>Hippace</i> . ἵππικη	<i>inguen</i> . βυβών	
<i>Hippocraticum</i> . κισσός	<i>inguinalis</i> . ἀσπῆς	
<i>Homo</i> . ἰανθρῶς	<i>inguinalis herba</i> . βυβών	
<i>hordeacea farina</i> . ὁρδεακίς	<i>inguinis rānæ</i> . βυβονοκήλη	
<i>hordeaceum vinum</i> . πικρὸν	<i>inquietudo</i> . ἀσπῆς	
<i>hordeolum</i> . κισσός	<i>inquiniatio</i> . μολυσμός	
<i>hordeum</i> . κισσός	<i>insania</i> . φρενίτις	
<i>hordeum mundatum</i> . γυμνωθέν	<i>insania</i> . μανία	
<i>horrida febris</i> . φρενίτις	<i>insania ferina</i> . μελῶδης φρενίτις	
<i>horror</i> . φρενίτις	<i>insestus</i> . ἐνδοσπῆς	
<i>Humeralis vena</i> . ὁμῆα φλέψ	<i>insicium</i> . ἱσθίος	
<i>humeralis luxati</i> . ὁμῆα φλέψ	<i>insolatio</i> . ἡλιώσις	
<i>humeralis</i> . ὁμῆα φλέψ	<i>inspersilia medicamenta</i> . ἐμπόσια	
<i>humeralis</i> . ὁμῆα φλέψ	<i>inspiratio</i> . ἀσπῆς	
<i>Hyacinthus</i> . ὑάκινθος		
<i>hydrocephalum</i> . ὑδροκέφαλον		
<i>hydromalum</i> . ὑδρομυλόν		
	<b>L</b>	
	<i>Labor</i> . πόνος	
	<i>labrum</i> . χείλος	
	<i>labrum Veneris</i> . διδάκτυλος (χείλος)	
	<i>labrusca</i> . ἀγλαίμμη. ἀμπελός	
	<i>lac</i> . γάλα	
	<i>lac acidum</i> . ὀξύγαλα	
	<i>lacca</i> . κίχκα	
	<i>lac coagulatum</i> . μέλας	
	<i>laceratus</i> . ἀγλαίμμη	
	<i>lacryma</i> . δάκρυον	

- lac in mammis concretum.* γαλακτὶς  
*lac scissile.* γάλα ῥιζόν, ῥιζόν γάλα  
*lac sumosum.* ἀφρόγαλα  
*lactes.* μασσότητες  
*lactis spuma.* ἀφρόγαλα  
*lactuca.* μυκηθῖς  
*lada, siue ladum.* κιδός  
*ladanum.* λάδανον  
*laue.* λείον  
*leuitas.* λειότης  
*leuitas intestinorum.* λειωτερία  
*lagopus.* λαγώπις  
*lana.* ἑλκον  
*lampas.* φανίον  
*lana sordida siue succida.* οἶοντος  
*lanceola.* λογχίς  
*lanugo arundinis.* ἀδάρκη, καλαμύχος  
*lappatum acutum.* βρετανική  
*lappa.* ξαύσιον  
*lappago.* ἰπποφαές  
*lappa minor.* ἀρχτείου  
*lappula.* ἰπποφαές  
*lapsana.* λαμλάση  
*laryngis cartilago.* ἀρυταροειδής  
*laser.* σιλφίου  
*laserpitium.* μαγδαλίς  
*lassitudinem tollens medicamentum.* ἄκοπον  
*lassitudo.* κόπος  
*lateralis morbus.* πλευρῖς  
*lavendula.* λανδονόρφος  
*laureola.* δαφνοειδής, χαμαιδάρη  
*laurus.* δάφνη  
*laurus Alexandrina.* χαμαιδάφνη  
*laxum.* χολαρόν, σοεγυδός  
*Lectiformes processus.* κληνοειδής, ὑποφύς  
*legitimum.* γήσιον  
*legumina.* ὀσσεα  
*lenia emplastra.* λιπαρὰ ἑμπλαστρά  
*lenia medicamenta.* ἀδύκτα φάρμακα  
*lens.* κόνις, φακός  
*lens sylvestris.* φακία ἀγρία  
*lenticulatum.* φακωτών  
*lepidium sylvestre.* καρδαμάνκη  
*lepra.* ἐλεφαντίασις  
*lepra alba.* κεύκη  
*lethargus.* λήθαργος  
*lenificum.* λυγιστικόν, ἰπποπέλνον  
*lex.* νόμος  
*Libra.* λίτρα, μῶα  
*lien.* σπληνῷ  
*lienoſi.* σπληνικοί  
*ligamentum.* συνδέσμος  
*lignum Rhodium.* ἀσπλάγος  
*ligula.* ὀπτηλωτής, κοχχιδέον  
*ligustrum.* κύπερος  
*lilaceum unguentum.* κρίνον, κρίνον  
*lilium.* κρίνον, λείον  
*lilium coeleste.* ἱεὺς  
*lilium consallium.* ἐφήμερον  
*linamentum.* μωτός  
*lingua.* ἀκρογίς, γλῶττα  
*lingua avis.* ὀρνέογλωσσον  
*lingua bouis.* βούγλωσσον  
*lingua canina.* κυνέογλωσσον  
*lingua hesitantis.* ἰσχυροφάνια  
*linguistum.* λυγιστικόν  
*linum.* λίνον  
*linum sylvestre.* θυμελαία  
*lippitudo.* λήμη, ὀφθαλμία  
*lippitudo dura.* σκληροφθαλμία  
*lippitudo scabra.* ἰσοροφθαλμία  
*lippitudo sicca.* ξηροφθαλμία  
*lippyria febris.* λειπυρίας πυρετός  
*liquabile.* τηκτόν  
*liquefactio.* ὀξέχυσις  
*liferon.* ἰασιόννη  
*litri spuma.* ἀφρόλιθον  
*liuidum.* πηλιδόν  
*lixivium.* κονία, σακτὴ  
*lixivium lanarium.* πλοσπητικὴ κονία  
*Lobos.* ἐκλειγμα  
*lolium.* ἀγρία  
*longanon.* ἀπυθωσμένον ἔντερον  
*longina.* λογχίς  
*lora.* δυντεία, πόμπυς, τρυβί  
*Lumbi.* ἱξός, ὀσφύς, ῥόα  
*lumbrici.* ἑλμυνθες  
*lunaria minor.* Herba est veteribus incognita, dodrantali fere altitudine, caule simplici, rotundo, lento ac gracili, è cuius medio in latus exit ramusculus, costæ effigie, cui folia sunt utrinque septem annexa, lunata, marinum vixum. crassa firmaque, brassicæ marina modo. flores profert in summate caulis, oxalidis minoris instar, semine rufo, rotundo minutoque, in vna modum racematim coherente. Magnificum hanc chymici, pluriſque æstimaunt quam aurum.  
*lupinus.* ἑρμύς  
*lupulus.* βρύον  
*lupus salutaris.* βρύον  
*lusciosi.* μύωπις, νυκτελωπῖς  
*lutum.* ὠχρόν  
*luxari.* ὀλιδαίνεσθαι  
*luxatio.* ὀξέσπρισμα, ἐκπλοσις, ἔξρσημα  
*luxatio parua.* ὀξέσπρισμα  
*luxatio, spina.* λόρδωσις  
*Lycium.* λίκιον

## M

- Macer.* μακρ  
*macies.* λεηθισμός  
*madescere.* βρέχεσθαι  
*magdaleo.* κολλέον  
*magnitudo morbi.* μέγθος νόσος  
*magnus pulsus.* μέγας σφυγμός  
*maiorana.* σάμνυρον  
*maiorana Anglica.* οείρανον  
*mala.* μήλον, παρειά  
*malacia gravidarum.* κίττα  
*malagma.* μάλαγμα  
*malicorium.* σίδον  
*malignum.* κακόνδεσ  
*malleoli.* σφυγές  
*malleoli vena.* σφυγίτις φλέβη  
*malua.* μαλάχη  
*malua terrestris.* ανάρμυς  
*malum.* μήλον  
*malum granatum.* ροιά, ἑξοειδής ὀπιφύτις  
*malum medicum.* κίτειον  
*malum Punicum.* ροιά  
*malum terra.* ἀετολογία  
*malus canina.* μαδραγυγές  
*malus habitus corporis.* καχεξία  
*malus sylvestris.* ὠμομηλὶς  
*malus terrestris.* μαδραγυγές  
*mamma.* μαστός  
*mammarium incrementum.* γυναικομαστόν  
*mammillaris processus.* μασσοειδής ὑπόφυτις  
*mandibula inferior.* ἀνδερειόν  
*mandragoras.* σπιδάκας  
*mandragoras albus.* ἀρτίω  
*manipulus.* διοριδίων  
*manna.* δροσίδι, ματθα  
*manſorii muscoli.* μασσητήρες μύες  
*manus.* χεὶρ  
*manus summa.* ἀκρογίς  
*marchesita.* πυρίτις λίθος  
*marcidum.* σαφές  
*marcor.* κόμα, μαρσατός  
*margarita alba.* χρυσάδεμον  
*que septem annexa, lunata, marinum vixum.* θαλασσίτης αἶψος  
*crassa firmaque, brassicæ marina modo. flores profert in summate caulis, oxalidis minoris instar, semine rufo, rotundo minutoque, in vna modum racematim coherente.* Magnificum hanc chymici, pluriſque æstimaunt quam aurum.  
*marmor.* ὀπίτης λίθος  
*marro.* διός βάλανος  
*marrubiastrum.* βαλλωνί  
*marrubium.* πορείον  
*marrubium nigrum.* βαλλωνή, μέλας πορείον  
*marum.* βερνίς  
*masliche.* μασίχη  
*matricaria.* παρθέλιον  
*matutatio.* πέπαισις, πεπασμός  
*maxilla.* γνάθος  
*maxima vena.* μέγιστη φλέβη  
*maza.* μάζα  
*mazaranis.* κοτίον  
*Meatus.* πόρος  
*mediastinum.* ἑξοφασίοντες ὕμνες  
*medicamentum cruentum.* ἑλαιον φάρμακον  
*medicamentum purgans.* καθαρτικόν φάρμακον  
*medicina.* ἰατρική  
*medicū malum.* κίτειον, κεδρόμυλον  
*medicus.* ἰατρός  
*medicus unguetarius.* ἰαβαρείτης  
*medimnus.* μέδιμνος  
*medism.* μέδιον  
*medulla.* μυελός

<i>medulla spinalis</i> . μυελὸς ραχίτης	<i>mordacitas</i> . δακνῶδες	<i>nitrum</i> . ἀλμύραξ, νίτρον
<i>mel</i> . μέλι	<i>morella</i> . σπύρεος	<i>Nocturna febris</i> . νυκτερὸς πορεπὴς
<i>mel acutum</i> . δροσὶ μέλι	<i>mors</i> . βίβασις	<i>nome</i> . νομή
<i>melancholicus succus</i> . μελαγχολικὸς χυμὸς	<i>mors vermicum</i> . ἀλυσίδων	<i>nox</i> . σῆτος
<i>melanteria</i> . μελαμψία	<i>morsus gallinae</i> . ἀγρῶν	<i>Nubecula</i> . νεφέλη, νεφέλιον
<i>melca</i> . μέλας	<i>mortificatio</i> . γάγγραινα	<i>nubes</i> . νεφέλη
<i>meliceris</i> . μέλικρις	<i>morus</i> . συκῆ μῆτος	<i>nubes in urina</i> . εἰσάδημα
<i>melilotus</i> . μελίλωτος	<i>moschus</i> . μύσχος	<i>nuscitiosus</i> . μύσχος
<i>melissa</i> . μελισσόφυλλον	<i>motus</i> . κίνησις	<i>nutrimentum</i> . τροφή
<i>melopepones</i> . μηλοπέπωνες	<i>Mucor</i> . μύξα	<i>nutritio</i> . θρέψις
<i>melroridum</i> . μαύρα	<i>micronata cartilago</i> . ἑξοφειδὴς ὀπὴ φουσ	<i>nutrix facultas</i> . τροφικὴ δύναμις
<i>melrosacem</i> . ροδόμελι	<i>micus</i> . βλέννα, μύξα	<i>nux</i> . κάρυον
<i>melroscidum</i> . δροσὶ μέλι	<i>mulsa</i> . μελικρατὸν	<i>nux moschata</i> . κάρυον μυρεψικόν
<i>membrana</i> . ὑμὴν	<i>mulsum</i> . οἶνόμελι	<i>nux muschata</i> . βάλανος μυρεψικὴ
<i>membrana spinalis medulla</i> . ἐννο- βα, vel potius ἐλῖβα	<i>mulsum acetosum</i> . ὀξύμελι	<i>nux pinea</i> . κόκκος
<i>memitha</i> . γλαυκίον	<i>multipeda</i> . πολύποδες	<i>Nympha</i> . νύμφη
<i>mendesium unguentum</i> . μενδεσίον	<i>multitudo</i> . πλῆθος	
<i>meninx</i> . μενίγγις	<i>muria</i> . ἄλμη	<b>O</b>
<i>mens</i> . φρένες	<i>muris auricula</i> . ἀλυσίτη μῦς ὠτι	<i>Obliuio</i> . λήθη
<i>mensis</i> μέν	<i>murmur</i> . ῥόφος	<i>obolus</i> . ὀβολός
<i>mensurus sanguis</i> . καταμύσιον αἷμα	<i>muschetum</i> . ἐφήμερον	<i>observatio</i> . πῆρισις
<i>mensura</i> . μέτρον	<i>muschetum minus</i> . γάλλον	<i>obsidianus lapis</i> . γαζάτης
<i>mentagra</i> . λειχίον	<i>musculi intercostales</i> . μεσοπλευρικοὶ μῦες	<i>obstipitas</i> . σκολίασις
<i>mentha</i> . ἡδύοσμον	<i>musculi manfortii</i> . μασητήρες μῦς	<i>obstructio</i> . ἐμφραξις
<i>menthastrum</i> . ἡδύοσμον (φροσῶν)	<i>musculus</i> . μῦς	<i>obstruens</i> . ἐμφρακτικόν
<i>mentis abalienatio</i> . ἑκστασις, ὠρε- σις	<i>musculus latus</i> . μυῶδες πλάτυσμα	<i>obstruentia medicamenta</i> . στεγν- πικὰ
<i>mentum</i> . ὄχιον	<i>musculus</i> . βρύον, ὕπνον	<i>Occasio</i> . ἀφορμή, κενός
<i>meon</i> . μέον	<i>musculus marinus</i> . βρύον	<i>occiput</i> . ἰνίον
<i>mercurialis</i> . λιγύστασις	<i>musteum unguentum</i> . γλεύκων	<i>occludentia medicamenta</i> . στεγν- πικὰ
<i>mercurius</i> . ὑδράργυρος	<i>mustum</i> . γλεύκος, ὠρεσπον	<i>ochra</i> . ἄχρα
<i>mesenterium</i> . μεστέριον, μεσεντέριον	<i>mutilum</i> . κολλῶμα	<i>ocimum</i> . βασιλικόν, ἄμικρον
<i>mespilus</i> . ἀμαμνήλις, ὀπμνήλις, μέ- λος, ἀρβύνα	<i>mutilus pilus</i> . μῦκος σφυγμὸς	<i>ocimum aquaticum</i> . ἑλκνός
<i>mespilus sylvestris</i> . κερατῶν	<i>mutus</i> . ἀφωνος	<i>ocinum</i> . ὄνυχιν
<i>methodici</i> . μεθοδικοί	<i>Myrobalanus</i> . μυροβάλανος	<i>oculi perturbationis</i> . τρέξις
<i>metreta</i> . μετρητὴς	<i>myrrha</i> . σμύρνα	<i>oculi prolapsus</i> . ἐκπεσὺς
<i>men</i> . μέν	<i>myrtus</i> . μυρσίνη	<i>oculis nitare</i> . καρδαμύσσειν
<i>Miliaris herpes</i> . καρχείας	<i>myrtus sylvestris</i> . ὀξύμυρσιν	<i>oculorum anguli</i> . ῥανήρες, παρωπία
<i>milium</i> . κέρκος, κέρκος, πάσπαλος		<i>oculorum aspruendo</i> . φεροφθαλμία
<i>milium agreste</i> . ἰαμίων	<b>N</b>	<i>oculus</i> . ὀφθαλμός
<i>millefolium</i> . ἀχιλλεύς, μυελόφυλλον	<i>Naphtha</i> . νάφθα	<i>Odoratus</i> . ὀσφρησις
<i>millepeda</i> . ὄνοι, πολύποδες	<i>napus</i> . βυνιάς	<i>Oedema</i> . οἰδήμα
<i>mina</i> . μινᾶ	<i>napus sylvestris</i> . λαμψαίν	<i>Offa</i> . μάξα
<i>minii vena</i> . αἷμα	<i>nares</i> . μαστήρες	<i>Olea</i> . εἰαία
<i>minium</i> . κοκκία, αἷμιον	<i>nardus sylvestris</i> . ἄσπερον	<i>olea Aethiopica</i> . ἀγελαία
<i>miscere</i> συγχέειν	<i>nasturtium</i> . κάρδαμον, στυρίδιον	<i>oleago</i> . χαμελαία
<i>misg</i> . μίσγ	<i>nasturtium orientale</i> . δεσβή	<i>oleastellum</i> . χαμελαία
<i>Modius</i> . μόδιος	<i>nasturtium tectorum</i> . θάλαττα	<i>oleaster</i> . ἀγελαία
<i>modulus</i> . ρυθμός	<i>nassus</i> . ρίν	<i>oleum</i> . ἔλαιον
<i>modus</i> . ἔπος	<i>nates</i> . γλένα, γλέτος	<i>oleum Aegypti</i> . αἰγύπτιον ἔλαιον
<i>mola</i> . ὀπρυνάτις, μύλη	<i>natum gibba</i> . σφαιρόμακτα	<i>oleum cedrinum</i> . κεδρέλαιον
<i>molaris dentes</i> . μύλοι	<i>natura</i> . φύσις	<i>oleum cicinum</i> . αἰγύπτιον ἔλαιον
<i>molarium dolores</i> . γροφίαισις	<i>naturalis facultas</i> . φυσικὴ δύναμις	<i>oleum crudum</i> . ὠμπεπιδὸς ἔλαιον
<i>molle</i> . μαλακόν	<i>naniculare os</i> . σκαφοειδὲς ὄσσω	<i>oleum fumosum seu suffumigabi-</i> <i>le</i> . καπνιστὸν ἔλαιον
<i>mollificabilia</i> . μαλακτά	<i>nausea</i> . ναυτία	<i>olina furfuracea</i> . πιττεύς εἰαία
<i>moly</i> . δωδεκάθεος	<i>Nectar</i> . νέκταρ	<i>olina muria condita</i> . κολυμβάδες
<i>morbi dispersi</i> . αποειδὲς νόσοι	<i>nenuphar</i> . νυμφαία	<i>olinella</i> . θυμελαία
<i>morbilli</i> . ἐκθύματα, ἐξαιθήματα	<i>nepeta</i> . καλαμίνθη	<i>olus</i> . λάχανον
<i>morbosum</i> . νοσῶδες	<i>nerui recitantes</i> . νερεα παλινδρο- μουῦντα	<i>olus atrum</i> . ἱπποσίλον, σμύρινον
<i>morbus</i> . νόσος	<i>neruorum resolutio</i> . ὠχέλις	<i>olus rubens</i> . βολίτιον
<i>morbus communis</i> . κοινὸς νόσος	<i>neruosum</i> . νευρώδες	<i>Omasum</i> . ἐχίνος
<i>morbus patris</i> ἔσ <i>vernaculus</i> ἐν- δημος νόσος	<i>neruus</i> . νεύρον, τόνος	<i>omentum</i> . γαστράμιον, ὀππιδιον
	<i>Nigella</i> . μελαίνθη	(ματὰ <i>Orobalsamum</i> , ὀροβάλσαμον)
	<i>nigra deiectiones</i> . μέλαινα ἐκχωρή	<i>Ordo</i> . λόγος

- origanum*. ὀρίανον  
*origanum sylvestre*. κονύλη. παρις  
*oris distortio*. κωικός πατισμός  
*oris medicamenta*. σμαλτά  
*oris ventriculi dolor*. καρδίαλγία  
*orthopnea*. ὀρθόπνοια  
*Os*. σῆμα  
*os bicornis*. ὀσείδης ὀσῶν  
*oscitatio*. χέσμη  
*oculi vene apertio*. αἰσθησις  
*os iugale*. ὕψωμα  
*ossa*. ὀστῆ  
*os sacrum*. ὀσῶν ἱερόν  
*ossis extuberatio*. ἑξέστασις  
*ossis fractura*. κλάσμα  
*ossum dolor*. ὀσῶν πόνος  
*ossum membrana*. περιόστις ὕμνη  
*ossum unio*. σύμφυσις  
*ossum unitio*. ὀμφίσις  
*os ventriculi*. καρδία. σῆμαχος  
*Othonna*. ὀθοννη  
*Oium*. ὠϊόν  
*Oxilla grandis*. ὄξυλάπαρον  
*Oxena*. ὄξυνα
- P
- Peonia*. γλυκυῖδη. παμνία  
*palatum*. ὤφθα  
*pallacana*. γέφυρα  
*pallidum*. ὠχρόν. χλωρόν  
*palma*. θέναρ. μεταάρπινον  
*palma pars prima*. κάρπος  
*palma egyptia*. ἀδύλος  
*palma christi*. κίμιν  
*palma sylvestris*. ὄξυφοῖνις  
*palmula*. δάκτυλοι  
*palmula passa*. πατισσις  
*palmus*. δάκτυλον  
*palmus rectus*. ὀρθόδακτυλον  
*palpebra*. βλέφαρον  
*palpebra innerio*. ἐκέσπιον  
*palpebrarum coherentia*. ἀγκυλω-  
 βλέφαρον  
*palpebrarum ornamenta*. κελ-  
 βλέφαρον  
*palpitatio*. παλμὸς  
*pallidarium*. ἐλεοσέλινον  
*panaces*. λυγισκόν  
*pancreas*. πάγκρεας  
*pandiculatio*. σφοδρήσιμα  
*panicula*. φύθελον  
*panicum*. ἑλνός  
*panis*. ἄρτος. φύθελον  
*panis acidus*. ὄξυλεπὴς ἄρτος  
*panis confusianus*. συγκυμωτός ἄρτος  
*panis porcinus*. κυκλάμνος  
*pannarium*. παρωνύχια  
*pannus*. φύθελον  
*parauer*. μύκων  
*paraueris caput*. κώδεα  
*paraueris lacryma sine succo*. ὀ-  
 πνον  
*paraueris succus*. μυκωτικόν ὀπνον  
*papilla*. θηλή  
*papula*. ἐκβεβημένα. ἐκδύματα.  
 ἐκδμήματα
- pars*. μέρος  
*partes dissimilares*. αἰσμομερῆ  
*partus*. τίκτος  
*passio*. πάθος  
*passum*. γλυκὺ  
*pasta regia*. κρόνον  
*pastilli*. κάλλικες  
*pastillus*. ἑξίσκος. φθῖς  
*pastinaca*. δαυκος. σαφυλῖνος  
*patella*. ὀμφηγοπίς  
*Pecten*. ἥδη. ἥδης ὀσῶν  
*pectus*. θώρεξ. ἑρπον. σῆθος  
*pedicularis herba*. σαφίς ἀγρία  
*pedicularis morbus*. φθειρίασις  
*penis*. αἰδοῖον. καυλός. ὠδοναίον. σῆμα  
*pepo*. πέπων  
*peracutus morbus*. κἀποξυτόσημα  
*perfusio*. καταπόνησις  
*peritoneum*. περιτόναιον  
*pernio*. χιμῆλον  
*perpensa*. ἀστρον  
*per serrat dissectio*. ἀκρωτηριασμός  
*personata*. ἀρκεῖον. περσωνίς  
*perspiratio*. ἀετοπνῆ  
*pes*. πούς  
*pes alexandri*. πύρετρον  
*pes columbinus*. κερκινον  
*pes coruinus*. κορώνοποις  
*pes gallinaceus*. καυκαλός  
*pestarium seu pessus*. πασός  
*pesti*. πῆσδετα. πασσί  
*pestilentia*. λοιμός  
*pes vituli*. ἄρην  
*petroleum*. πετρίλαιον  
*petroselinum*. σέλινον  
*petrosum os*. ἁρσείδης ὀσῶν  
*Phagedena*. φαγέδαρνα  
*pharicum*. φαριχόν  
*phaseoli*. δόλιχοι. ὠχρος  
*philonium*. φιλώνιον  
*phlegm*. σπιγῆ. φλέων  
*phrenitis*. φρενίτις
- Pica*. κίττα  
*picatio*. κίττα. τίττωσις  
*picatum vinum*. κινία  
*picea*. πίπης  
*picinum oleum*. πιπιδαιον  
*picis flos*. πιπιδάκος  
*pila marina*. αἰκωνίον. σφαίρα θα-  
 λαπία  
*pilaris morbus*. τειχίασις. τειχισμός  
*pili*. τριχες  
*pili euulsio*. αἰαβροχισμός  
*pilorum acies*. φαλαγγισσις  
*pilorum defluuium*. πλῖσις  
*pilula*. καπαπτόνον  
*pilus*. τρίξ  
*pimpinella*. ἐλαπίνη  
*pingue*. λιπαρόν  
*pinguedo*. πημελή  
*pinguitudo*. λιπαρότης  
*pinifructus*. πιτῦδες  
*pinus*. ὁρβίλος  
*piper*. πῖπερ  
*piper agreste*. ἄγριον
- pistacia*. πισάκια  
*pistillus*. κερκίς  
*pituia*. φλέγμα  
*pix*. ἀπόχημα. ἑσπασία  
*pix arida*. παλίμπτωσις  
*pix cedri*. κεδρία  
*Planci*. λειόπιδες  
*planta*. πιδίον. πέσμα  
*plantago*. ἀνθῆρα. ἑλάνθη. ἑλάνθη. ἑλάνθη.  
 κυανόλατον  
*plantago aquatica*. ἄλσος  
*platanus*. πλατάνος  
*plenitudo*. πληθύνει  
*plumbago*. μολύβδαρνα  
*plumbarius lapis*. μολύβδαρις  
*plumbum*. μολύβδος  
*Podex*. ἄρχος. ἑδρα  
*polenta*. ἀλφιτὼν  
*pollen*. ἄλφις. σῆμα  
*pollex*. αἰτήχρ  
*polyus*. πολίτις  
*potum dulce*. μέλιμιλον  
*poples*. ἀγκυλή. ἱγίς. καμπή  
*popularis morbus*. ὀμφημὸς νόσος  
*populneum unguentum*. αἰγείακον  
*populus*. ἀγρίος. λεύκη  
*populus nigra*. ἀχραις  
*porcellina*. αἰδράχη  
*porea*. πιδίον  
*poreta rubens*. βλίτον  
*poros expurgans*. ἐκκαθαριτικόν  
*porrigo*. πιπιδάσις  
*portum agreste*. ἀμπελόπετρον  
*portum capitatum*. περσωνίς  
 λατόν  
*porta hepatis*. πύλαι ἥπατος  
*portulaca*. αἰδράχη  
*portulaca sylvestris*. πεπλὶς  
*posca*. ὄξυλεπὴς φῆσις  
*postbrachiale*. μετακάρπιον  
*postes*. φηδὴ  
*potentia*. δύναμις  
*potestate esse*. δυναμει εἶναι  
*potio*. ποῖσις  
*Pracautio*. προφυλακία  
*pracognitio*. προγνώσις  
*pracordia*. ἀετοπνῆ  
*pranestina nux*. κάρπον ἱρακιδάκων  
*pranorio*. προγνώσις  
*praprium*. ἀκροποδία. πόδι. ἐπα-  
 χῆρον  
*praprium reductum*. ἀειψιμωσις  
*prela*. αἰθάσις  
*principium*. ἀρχή  
*processus*. ἀποφυσις  
*procidencia*. πρὸς πῶσις  
*profluuium alui*. ἀετοπνῆ  
*prolapsus*. πρὸς πῶσις  
*propulsoria facultas*. προωσις δύ-  
 ναμις  
*prostratio*. ἐρεθισμός  
*proserpinaca*. πολύρον  
*prostratio corporis*. ἐρριψις  
*providentia*. προνοία  
*pruna Damascena*. βερέβουλα  
 πρηνις.



<i>prunus</i> . κακυμυλλέα. μυλλέα	<i>pustula nocturna</i> . ὀνιτυκίς	<i>repletio</i> . πληράσις. πληρομένη
<i>prurigo</i> . κνησμός	<i>putredo</i> . μύδησις. σήψις	<i>resina</i> . καπνέλαιον. αρωματώδες. ῥη- νίνη. φρυκτὴ
<i>pruritus</i> . κνησμός. κνηστικός	<i>Pylorus</i> . πυλωρός	<i>resina cedri</i> . κεδρία
<i>Prisana</i> . πρισάνη	<i>pyrafter</i> . ἀχράς	<i>resina pinea</i> . καλοφάνια. ὑγρὰ. ὑγρὴ ἢ ὡς τὸ κεράσιον
<i>Pubertas</i> . ἔβη	<i>pyrethrum sylvestre</i> . πικραμύδι	<i>respiratio</i> . αἰσπνοή
<i>pubes</i> . ἵβη. ὑποέρσιον	<i>pyrites lapis</i> . πυρίτης λίθος	<i>respiratio abolita</i> . ἀπνοία
<i>rudendum</i> . καυτός	<i>pyrus</i> . ἄπιος	<i>retētrix facultas</i> . κατεκτατικὴ δύναμις
<i>ruegium</i> . γλῆχρον	<i>pyrus sylvestris</i> . ἀχράς. ὄχνη	<i>retiformis plex</i> . διχνοειδὲς πλέγμα
<i>ruegium montanum</i> . κρηνοπίδιον	<b>Q</b>	
<i>ruegium sylvestre</i> . χαλαμύδιον	<i>Quadrans</i> . πεντημόδιον	<i>retiformis tunica</i> . ἀμφιβληστροειδὴς
<i>publicaria</i> . κόρυβα	<i>quadrantal</i> . ἀμφορεύς	<i>retrimentum</i> . τίσιμα
<i>publicaris herba</i> . ψύλλιον	<i>quadratus homo</i> . εὐόδρος	<i>reverti</i> . παλινδρομεῖν
<i>pulmo</i> . πνεύμων	<i>quartana febris</i> . πεντηγὸς πυρετός	<i>renulso</i> . ἀνίστασις
<i>pulmonis inflammatio</i> . φλεγμονή	<i>quartarius</i> . πέντηνον	<i>Rhaponticum</i> . ῥά
<i>pulsus</i> . σφυγμός	<i>quercula</i> . χαμαιδρυς	<i>rhus</i> . ῥῆς
<i>pulsus equalis</i> . ὁμαλὸς σφυγμός	<i>quies</i> . ἡσυχία	<i>rhythmus</i> . ῥυθμός
<i>pulsus amplius</i> . ἀδρὸς σφυγμός	<i>quinquefolium</i> . πενταφυλλίον	<i>Ricinus</i> . κικυρόσω
<i>pulsus annuens sine innuens</i> . ὀπι- νευενκὸς σφυγμός	<i>quintana febris</i> . πεμτηγὸς πυρετός	<i>rigari</i> . πύχισται
<i>pulsus bis feriens</i> . διχρὸς σφυγμός	<i>quotidiana febris</i> . καθημερινὸς πυ- ρετός. μετήμενός πυρετός	<i>rigor</i> . ῥίγος. τίσιμα
<i>pulsus calidus</i> . θερμὸς σφυγμός	<b>R</b>	
<i>pulsus caprizans</i> . δορυκαλίζων σφυ- γμός	<i>Rabies</i> . λύσσα	<i>risus</i> . γέλος
<i>pulsus circumnuens</i> . ἀπενευενκὸς σφυγμός	<i>radicula</i> . ῥάφανος	<i>Robia herba</i> . ῥοβία
<i>pulsus coincidens</i> . παρεμπίπτον σφυγμός	<i>radius</i> . ακτίς	<i>robur</i> . ῥυς
<i>pulsus creber</i> . πυκνὸς σφυγμός	<i>radix</i> . ῥίζα. ῥάφανος	<i>rosa</i> . ῥόδον
<i>pulsus durus</i> . σκληρὸς σφυγμός	<i>radix dulcis</i> . γλυκύριζα	<i>rosa Græca</i> . λυγρίς
<i>pulsus frequens</i> . πυκνὸς σφυγμός	<i>radix sylvēstris</i> . χαμαιβάλανος	<i>rosa transmarina</i> . μαλαχὸ
<i>pulsus inordinatus</i> . ἀτακτὸς σφυ- γμός	<i>ramex aquosus</i> . ὑδροκλήνη	<i>rosmarinum</i> . ῥοσμανός
<i>pulsus intercidens</i> . παρεμπίπτον σφυγμός	<i>ramex callosus</i> . πυροκλήνη	<i>rosmarini semen</i> . ῥαχρύ
<i>pulsus intermittens</i> . διαλείπων σφυ- γμός	<i>ramex carnosus</i> . σφοκλήνη	<i>rotatores</i> . τροχαστῆρες
<i>pulsus languidus</i> . ἀμυδρὸς σφυγμός	<i>ramex inguinis</i> . βυβωνοκλήνη	<i>Rubia</i> . ἐρυθρόδανον
<i>pulsus magnus</i> . μέγας σφυγμός	<i>ramex varicosus</i> . κισσοκλήνη	<i>rubaminor</i> . ἄλυστος
<i>pulsus mollis</i> . μαλακὸς σφυγμός	<i>ramex ventosus</i> . πνευματικὴνη	<i>rubrica</i> . ῥυκτός
<i>pulsus ordinatus</i> . τακτικὸς σφυ- γμός	<i>rancidum oleum</i> . παλιὸν ἔλαιον	<i>rubrificatio</i> . ποικιλμός
<i>pulsus parvus</i> . μικρὸς σφυγμός	<i>ranunculus</i> . ῥανούνα	<i>rubus</i> . ῥάβδος
<i>pulsus plenus</i> . πλήρης σφυγμός	<i>rara</i> . ῥαγυλός	<i>ructus acidus</i> . ὀξύρεμία
<i>pulsus rarus</i> . ἀραίος σφυγμός	<i>rapistrum campestre</i> . ἐλαπύνη	<i>rufum</i> . πυρρόν
<i>pulsus ferratus</i> . ἱμωρὶον σφυγμός	<i>rarum</i> . ἀραίον	<i>ruga frontis</i> . ῥυτίς
<i>pulsus tardus</i> . βραδύς σφυγμός	<i>rationales Medici</i> . λογικοί	<i>rugas tollentia medicamenta</i> . ῥυ- τιώματα
<i>pulsus vacuus</i> . κενὸς σφυγμός	<i>rancitas</i> . βερίχτος	<i>rumex</i> . λάπαθον. ὀξύλαπαθον
<i>pulsus vehemens</i> . σφοδρὸς σφυγμός	<i>Reciprocatio aqua</i> . ἀμύπη	<i>rumex acetosus</i> . ὀξάρις. ὀξίς
<i>pulsus velox</i> . ταχὺς σφυγμός	<i>rectitudo</i> . εὐθύπεια. ἴσις	<i>ruptio</i> . ῥήγμα
<i>pulsus vermiculans</i> . σκαλαμύζων σφυγμός	<i>rectum intestinum</i> . ἀκνυσομένον ἔσπρον	<i>rufus</i> . ὀξύμυρτον
<i>pulsus vibratus</i> . κλονέδης σφυγμός	<i>recurtere</i> . παλινδρομεῖν	<i>ruta sylvestris</i> . ῥούτα
<i>pulsus undosus</i> . κυματώδης σφυγμός	<i>recurrens pulsus</i> . παλινδρομῶν σφυ- γμός	<i>Ryzum</i> . ῥυζα
<i>pulsus insperfilis</i> . σμηγμα	<i>reduplicatio</i> . αἰαδιπλοῦσις	<b>S</b>
<i>rumex</i> . ἀλκυρίον. κίσπη	<i>reduntia</i> . παρυνυχία	<i>Sabina</i> . βερίδω
<i>ruptio</i> . ῥήγμα	<i>refectio corporis</i> . ἀνάψις	<i>saccharum</i> . ἀσίνδιος. μέλι. σάκχα- ρον
<i>rupilla</i> . ῥυλὴ. κόρη	<i>refrigeratio</i> . ἀψύψις	<i>sacco excolare</i> . σάκκιστον
<i>purgamenta</i> . λόγια	<i>regio</i> . χώρα	<i>sacerdotis virile</i> . ἄρρον
<i>purgare</i> . φαρμακεύειν	<i>regius morbus</i> . ἱερός	<i>sacer morbus</i> . ἱερα νόσος
<i>purgatio</i> . καθάρσις	<i>relaxantia</i> . ἀραιωτικά	<i>sagapenum</i> . σαγαπένιον
<i>puris in oculo collectio</i> . ὑάτιον	<i>relaxantia medicamenta</i> . χαλα- στικά	<i>sal</i> . ἅλς
<i>purs</i> . πύον	<i>reluunt</i> . παρυνυχία	<i>salis flos</i> . ἅλς αἶθος
<i>pustula</i> . ψυδράκισ	<i>remollientia medicamenta</i> . μα- λακτικά	<i>salis spruta</i> . ἅλς ἀχρὴ
<i>pustula</i> . φλύκταινες	<i>renas</i> . νεφροί	<i>salina</i> . σιανόν
	<i>renitens</i> . ἀντίτυπον	<i>salinatio</i> . σιτισμός
	<i>renum medicamenta</i> . νεφρικά φάρμακα	<i>salix</i> . ἱτιά
	<i>renutritio</i> . αἰσάνψις	<i>salix americana</i> . ἀχρὴ
	<i>repellentia medicamenta</i> . ἀπαρυ- στικά φάρμακα	<i>salpetrum</i> . ἀλνίσις
	<i>repercutientia</i> . ἀπαρυστικά	<i>salsa sine salisugina</i> febris. ἀλμυ- ροῦς πυρετός
		<i>salsamentum</i> . πικρὸς. ὁμοπικρὸς
		<i>saltilago</i> . ἀδάρην
		<i>salsum</i> . ἀλμυρόν

salubre. ἰσχυρὸν	sene. καλὴτις	specillum. μίλη
salvia. ἐλεῖσσομαι	senectus. γῆρας	sphincter. σφρυγίτης
sambucus. ἀκτὴ	senex decrepitus. πύμπλος	spina. ῥάχης
samiaterra. σάμια γῆ	seniores. γερῆτες	spina acuta. ἄχυνάκη
sampfuchinum unguentum. σάμ- φύχον μύρον	sentis canis. κυνὸς βας	spina alba. ἀκακία λευκή. ῥάμνος
sampfuchum. σάμφύχον	septum transversum. διαγόμεν. δια- φράγμα	spina cernalis. ῥάμνος
sandaracha. σανδαράχη	sericum crinale. κάπια	spinaceum. σπυρομάλαχον
sandyx. σάνδυξ	seris. τρεῖς μῆνες	spinachia. ἀπὲρ ἀφάξης
sanguinaria. κορονόπος	serpentaria. δρακόντιον	spina dorfi. ἀκνίς
sanguinaria herba. πολύγονον	serpentaria minor. ἄρον	spiniuinetum. ὄξυάκακτα
sanguinem è pectore reiciens. αἷα φερέων	serpyllum sylvestre. ἑρπυλλίς ἀγρία.	spirandi difficultas. δύσπνοια
sanguinem sistens. ἰσχυρὸν	serratula. κίστρον. χαμῆδες	spiritus. πνεῦμα
sanguinis effusio. ἐχέχυμα	seria Campanica. μελίλατος	spiritus asper. δασύ πνεῦμα
sanguinis profluvium. αἱμορραγία	seriola Campana. μελίλατος	splenium. σπληνίον
sanguis. αἷμα	serum. ἰχθὺς	spongia admodio. ὑποσπληνίον
sanguis draconis. κωνάβαρι. αἷμα	sessio in aqua. ἐκβάδισμα	spontanum. αὐτὸματον
dracōnis	seum. σίαρ	spuma. ἀφρός
sanies. ἰχθὺς	sextarius. ἕξας	sputum. πτύον
sanna. λαμψάνη	sextula. ἕξάχον	squalor. αὐχμὸς
sapa. ἑψάμα. σίραμον	Siccitas. ἔνεστια. ἔρημος.	Squama eris. χυμὸς λεπὶς
sapinus. ἰλάτη	siccum medicamentum. ἔρηκτον	Squarlatum. κακὸς βαφικὸν
sapo. σάπων	ficla. πύλον	Squinanthus. ῥοῖος ἀφραματίος
saponalis. κλύμενον	figillum diue Maria. μαλακίοντος	Staphylinus sylvestris. δαίμων
saponaria. κινερία γῆ	figillum Maria. κινερίον	stella. ἀστὴρ ἀήλιος
sapor. χυμὸς	figillum Salomonis. πολυγύνατον	stercus. κοπρὸς
satureia. θυμύλεγε	figna assidentia. συνεισπύοντα σημεῖα	stercus ferri. σκωρία
saxatiles pisces. πύβαιοι ἰχθῆδες	significatio febris. ἔνσημασία	sternutatio. ἰαρυμὸς
Scabies. ἀγρία. ψύεα	siligo. σιλήγης	sternutatorium medicamentum.
scalpellum. σκίπλον	siliqua. κρεῖσσον	ἰαρυμὸν φάρμακον
scalper excisarius. κινερίων	silique. κρεῖσσον. ἔνσημασία	stertor. ῥέχης
scammonia. σκαμμωνία	siliquastrum. πύβειος	stibium. σίβι. σίμμι
scamnum Hippocratis. βάδρον	similago. σιμιδαλὶς	stillicidium urinae. σπυρογία
scapula. ὀμωπλάται	similares partes. ὁμοιομερῆ	stipantia medicamenta. στυπνὰ
scarificatio. ἐχάραξις	simplex. ὡκίτης	stecchas. σόχης
scirrhus. σκίρρος	sinapi. σίνιπτι	stoliditas. μωροσύνη
scissima. ὄξυα	sinapi rusticum. ἀλάσμι	strabo. σπείβλις. φολλίς
scortula. ὀμωπλάται	sinapisimus. σναπίσιμος	strepitus. ὥφος
scripulum. χάμμα	sinciput. βρέγμα	strigmenia. ἔνσημα
scrotum. ὄρχον	singulifosa febris. ἀνυπόδης πυρε- τός	strobilus. κινερίε
scrupulus. χάμμα	singulifosa febris. ἀνυπόδης πυρε- τός	struma. χυμὸς
semitiformis cartilago. θυρεοειδὴς	sinus. κόλπος	stultitia. μωροσύνη
Sebesten. μύξα. σιβάσσιον	sinus brachii. βραχίμειος	stupescientia medicamentis. ἀδρ- κονία φαρμάκων
sebum. σίαρ	siphia. μυστιέριον	stupor. νάρκη
secretrix facultas. διακρίτικὴ δύ- ναμις	sisara. ἰεῖον	styrax. στέαξ
secunda. δεύτερον. χοεῖον	situm extinguentia. ἀδιψία	Suber. φελίς
securidaca. ἰδύοδρον. πελῆωνος	sitis. δίψα	subligatio. ὑπόδεσις
sedes. ἀρχὸς. ἰδρα	sinetta. σίβετιον	sublimatum. ὑπεράρπυρος
sedimentum urinae. ὑπόστασις	Smegma. σμήγμα	sublime. μακρόν
sedum. αἰζών	Solanum. ἀλκαλάκος. σπύρεος	subfidentia urinae. ὑπόστασις
sedum maius. κρεῖσσον	solatrum. σπύρεος	subtransversum. σιμὸν
semen. σπέρμα	soldana. κρεῖσσον	succingens membrana. ὑπόστασις
semen contra lumbricos. ἀψιδόν	solis inustio. ἰσχυρὸς	ὕμνι
sementis. σπορῆς	somnolentia gravis. κατὰ φρεῖ	succinum. ἀπὸ χύτης. ἰσχυρὸς.
semicarpium. ἐκβάδισμα	somnolentia sine somno. κάπνιος	ἀνυπόδης
seminalia vasa. σπέρματις ἀήθεια	sopor. κάρπος	succus. ὕψος. χυλὸς. χυμὸς. στέα- σις
seminalis herba. πολύγονον	sorba. ὄα. ὕα	sudamina. ἰδρῶα
seminis profluvium. γονόρροια	sordes. γαῖος. ῥύπος	sudor. ἰδρὸς
semitertiana febris. ἡμῆρτιας πυ- ρετός	sordes oculorum. λάμψ	suffocatio uteri. ὑστερίαν πύξ
semper nitens. αἰζών	sory. σῶρυ	suffusio. ὑπόχυμα
sena. δελφίνιον	souchetum. κῦπρος	suffusio sanguinis in oculo. ὑπό- σφραγμα
	Spatula foetida. σπαργάνιον	sugillatio. ὀρχίμωνος
	species. εἶδος	sugillatio oculi. ὑπόπνο

<i>sugillatio oculorum.</i> ὀφθαλμοὶ	<i>Tonsilla.</i> ἀμυγδαλῆς	<i>ventriculus.</i> γαστήρ
<i>sulfur.</i> θείον	<i>torcular.</i> ἀλών	<i>ver.</i> ἔαρ
<i>sumach.</i> ροῖς	<i>tormentilla.</i> πορφυροῦς	<i>veratrum.</i> ἐλεβορος
<i>sumen.</i> ἡδύ	<i>tormenta.</i> δυσωπεία	<i>veratrum nigrum.</i> μελαμπίδιον
<i>supercilium.</i> ὀφθαλμοῦ ἑστῆς	<i>torpor.</i> ἀδράνεια	<i>verbascum.</i> φλόμος
<i>supercilium terre.</i> ἀχάμενος	<i>toxicum.</i> πικρὸν	<i>verbena.</i> ὠσεύρεον
<i>supercilium Veneris.</i> μυρϊσφόρον	<i>Tragacantha.</i> τραγάκανθα	<i>verbena.</i> ἰεροβοτάμν
<i>superfœtatio.</i> ὀφθαλμῶν	<i>transpiratio.</i> ἀποπνοή	<i>vermicularis processus.</i> σκολιὰ
<i>superpurgatio.</i> ὑπερκαθάρσις	<i>transversaria.</i> διαγνήματα	<i>vermix.</i> ἡδύ βερμίκιον
<i>suppuratio.</i> ἐμπύημα	<i>tremor.</i> τρέμος	<i>verpus digitus.</i> μέσος δακτύλος
<i>suppuratorium medicamentum.</i> ἀποπνεύον φάρμακον	<i>tribulus.</i> τριβόλος	<i>verruca.</i> ἀποχόρδον
<i>sura.</i> ἀντιπυμῶν	<i>tridui inedia.</i> ἀσπείκτος	<i>verrucosi tumores.</i> ὄχθοι
<i>sorditas.</i> κρόφωσις	<i>trifolium.</i> ἀσπράχον	<i>vertebra.</i> σπονδυλός
<i>sutura.</i> ραφή	<i>trifolium minus.</i> κύνιστος	<i>vertebra luxatio.</i> οἰσῖς
<i>sutura recta.</i> ὀρθή ραφή	<i>trifolium minus.</i> κύνιστος	<i>vertebra prima.</i> ὀπισθοφύς
<i>Syderatio.</i> σπράκκος	<i>tritico.</i> πύρος	<i>vertex capitis.</i> κορυφή
<i>symptoma.</i> σύμπτωμα	<i>triticum.</i> σιτάριον	<i>vermilo.</i> κόκκος βαφικῆς
<i>syncerus humor.</i> ἀκράτος κατάρσις	<i>triticum tostum.</i> σιτάριον	<i>verruca.</i> σκωτόδοντος
<i>syncope.</i> συγκοπή	<i>triticum trimestre.</i> σιτάριον	<i>vesicaria.</i> ἀλκαχολός
<i>synochus febris.</i> σινοχὴ	<i>trixago palustris.</i> σικάρδιον	<i>vestis.</i> χιτὼς
<i>syssole.</i> σισυλή	<i>trixalis.</i> σικάρδιον	<i>veterinus.</i> κῶμα
<b>T</b>		<i>Viburnum.</i> ροῖς
<i>Tabes.</i> ἀσθενία	<i>trocha.</i> τροχός	<i>vicia agrestis.</i> ἀσπράχον
<i>tania.</i> τενία	<i>tuberculum.</i> ῥόμα	<i>victus ratio.</i> διατροφή
<i>talus.</i> ἀσπράχος	<i>tumor.</i> κίρκη	<i>vigor morbi.</i> ἀκμή
<i>tamarice.</i> μυρϊκή	<i>tumores pericorunt.</i> φέρεα	<i>viti.</i> ἡδύ
<i>taxis.</i> τῆξις	<i>tunica adnata.</i> ὀπτακίος	<i>vitis peruviana.</i> κόκκος
<i>telephium ulcus.</i> τριφύλλον ἔλκος	<i>turbare.</i> πειράζειν	<i>vindicta.</i> ὀπτακίος
<i>temperies bona.</i> εὐταξία	<i>turbet.</i> πειράζειν	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tempestivum.</i> ἑρπύων	<i>turbidum candidum.</i> ἀλμπόν	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tempora.</i> κρόταφοι	<i>turgere.</i> ὀρᾶν	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tempus.</i> καιρός	<i>tussilago.</i> βήχων	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tempus anni.</i> ὥρα	<i>tussis.</i> βήχης	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tendo.</i> ἀποπνεύω	<i>tuiss medicamentum.</i> βήχων φάρμακον	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tenebrosa.</i> σκία	<b>V</b>	
<i>tenebrinus.</i> τενεβρινός	<i>Vacuatio.</i> κενώσις	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tensor recta.</i> εὐταξία	<i>valgus.</i> βλαχός	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tenigo.</i> ὀπτακίος	<i>varices.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tenne intestinum.</i> ἀκρόν	<i>varicosus ramex.</i> κροτάφον	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tenon.</i> τενόν	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tepidum.</i> μελαγχολία	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>terebra immerfabilis.</i> ἀβυσσός	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>terra aurea.</i> χρυσός	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>terra merita.</i> κροτάφον	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>terra Samia.</i> ἀσπράχον	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tetradix.</i> ἡδύ	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tetrapharmaceutum.</i> τετραφάρμακον	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>testes.</i> ὄρχις	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>testiculi.</i> ὄρχις	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>testudo.</i> χελών	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>Theriace.</i> θηριακή	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>thuris grana.</i> μαίνα	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>thuris mica.</i> μαίνα	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>thurs.</i> ἡδύ	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>thusterra.</i> χαμαίη	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>thymelea.</i> κίρκη	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>thymus.</i> θυμῶς	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>thymum.</i> θυμῶς	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>Tibia.</i> κνήμη	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>timor.</i> φόβος	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>timor subitus.</i> ἐκπληξίς	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία
<i>tithymallus.</i> πικρὸς	<i>variosa.</i> ἡδύ	<i>vitis herba.</i> ἀμφοβία

<i>Vmbilici egressio, prominencia vel</i>	πλον μύρον	<i>urinarius meatus.</i> ὑρήρα. ὑρητήρ
<i>ruptura.</i> ἔξομφαλος πάθος	<i>unguentum siccum.</i> ξηρόμωρον	<i>urtica.</i> ἀδίκη. ἀγγελική. ἀκνητα
<i>umbilicus</i> ἰμφαλός	<i>unguis.</i> ὄνυξ	<i>Vstio.</i> ὀθικαυμα
<i>umbilicus Veneris.</i> κοτυλαδών	<i>Vociferatio.</i> αἰαφώνησις	<i>Vteri cornua.</i> πλευράται
<i>Ulcera capitis manantia.</i> ἀχῶρες	<i>vocis prunatio.</i> ἀφονία	<i>uterus.</i> μήτρα
<i>ulcera oris serpentia.</i> ἀφιδναί	<i>vola.</i> κατύλη	<i>vena.</i> σαφυλή
<i>ulcus.</i> ἑλκος	<i>vola manus.</i> ἀρσός. γένυρ	<i>vena passa.</i> ἡλαπεδευθεῖσα σαφυλή
<i>ulcus cruentum.</i> ἐναμυρὸν ἑλκος	<i>volubilis maior.</i> καλματίς	παπιδεῖσα σαφυλή. σαφίς
<i>ulcus depascens.</i> νομή	<i>voluptas.</i> ἡδονή	<i>vena tinnica.</i> ῥαροειδὲς χιτῶν
<i>ulcus lacrymosum.</i> δακρυάδες ἑλκος	<i>voluntus.</i> εἰκός. χορδαίος	<i>vulffones.</i> πύματα
<i>ulcus sinuosum.</i> ὑπόκαλον ἑλκος	<i>vomitus.</i> ἔμετος	<i>vultus.</i> πρόσωπον
<i>ulmus.</i> πτελέα	<i>Wrachus.</i> ὑεαχός	<i>vulua strangulatus.</i> ὑστεκλή πύξ
<i>Umbrosum.</i> σκιαδές	<i>ureteres.</i> ὑρητήρες	<i>vinula.</i> σαφυλή
<i>Vncia.</i> ὀνυία	<i>uri.</i> φλεγμαίνον	<i>vinularia.</i> δάφνη δι' ἧς αἰδρία
<i>unedo.</i> ὀθιμηκίς. κόμαρος. μαμμήκω	<i>urina foliosa.</i> πεταλάδες ὕρον	Ζ
209	<i>urina difficultas.</i> δυσουρία	<i>Zizipha.</i> σέλικα
<i>unguenti fax.</i> μάγμα	<i>urina stillicidium.</i> σπαραγρία	<i>Zirbus.</i> ὀθιπλοον
<i>unguentum.</i> ἄλειμμα. μύρον	<i>urina suppressio.</i> ἰσχυρία	<i>Zona.</i> ἑρπης
<i>unguentum Aegyptium.</i> αἰγύ-	<i>urinam mouentia.</i> διουρητικά	<i>Zythum.</i> βρώμη

## INDICIS LATINOGRÆCI

**F I N I S.**

IOANNES GORRÆVS IVNIOR  
LECTORI S.

**N** tibi, beneuole Lector, quod author morte præuentus edere non potuit, offerimus Definitionum medicarum opus ab ipso, vt in prima editione promiserat, recognitum & auctum. Nec dubita quin, nisi turbulentus nostræ Galliæ status obstitisset, si non emendatius, at certe multo adhuc auctius & amplius habuisses. Scio à doctis hoc seculo medicis obseruata nonnulla, quorum additione volumen augere & maioris molis reddere potuisssem. At id si fecissem, veritus sum ne, quod in reliquis verborum commentariis fere vsuuenire video, idem etiam in hoc opere tandem cōtingeret, vt non solum meo exemplo quispiam à primo authore omissa vocabula adderet, sed etiam non pari mecum erga authorem affectione ductus, iam optime explicata pro suo arbitrio immutaret atque peruerteret. Malui igitur quæ cum scripsisse comperi, syncera & impermixta tibi offerre, quam aliquid in hoc opere innouandi exemplum præbendo, celebre authoris nomen in tantum famæ discrimen fortasse iniicere. Deceui vero omnia mea studia (si Deus annuerit) ad huius operis illustrationem non minus quam ad agri paterni culturam ita componere, ea quæ deesse animaduertero artis vocabula adiiciendo, vt aliquid in posterum addendi vix locus esse possit. Vale.

FRIDE-



V. v. m. inter corrigendum in dubiis aut suspectis authores à quibus desumpta viderentur, consulerem: quædam esse mendosa, quædam à suis fontibus discrepare, non usquam ipsos etiam fontes aliquid habere vitii deprehendi. Officium igitur meum postulare censui, ut quæ reperissem, breuiter hic in calce libri notarem: præsertim quum ea ex re nihil ad autorem detrimenti, & aliquid ad te commodi redundare videretur. Tu ea velim à candido animo profecta candide interpreteris.

- P**agina 2. columna 2. v. ἀγυρ.] & Galen. in Basil. edit. est ἀδαγς, ferramentis quibus aratra præf-  
apud Symeonem Sethum plus itemq; ζωαδαγς, sectione 2. li-  
rali numero ἀγυρ legimus, bri ἀδαγς. aphor. 12. alibita-  
& πέρυρ. Ibidem paulo post men etiam per e, quomodo & apud  
in ἀγυρ forsan legedi Euryclei. Erotianum est. firmat, quæ παγς τὸ ἀμφιδέον, à cir-  
P. 4. v. ἀγυρ.] in lexico Galeni cum ligando deductum nomen tra-  
omnes editiones habent ἀγυρ, à dicitur proprie enim ἀμφιδέον & ἀμφι-  
v. imbecilla, infirma. ad imbecilli- dicitur orbis, circuli, annu-  
tatem igitur significandam legen- li, ex ære aut ferro: nec non armil-  
dum esset ἀγυρ. Dicuntur autem la, ut quæ brachiis vel tibiis cir-  
hec ex prinatione vel infirmitate cum dentur. Ibidem pro postero-  
ἀγυρ, id est artuum seu membro- re ἀδαγς hac re pone ex aduersa-  
rum. riis autoris: Α' δαγς est etiā stir-  
P. 5. c. 2. v. ἀδωοδῆ. ] scribendum pis nomen, quam & caucum &  
potius ἀδωοδῆ. nam ἀδω in de- ephedran appellant. Ea scandere  
clinatis & deriuatis à se longam solet arbores & ex ramis pro-  
uertit in breuem. sicq; apud Ru- pendere: folio nullo, cirris nu-  
sum ἀδωοδῆ ἀγυρ legimus. merosa, qui sunt iunci genicula-  
P. 6. v. ἀδιδῆ. ] pro διὰ δῆτον a- ti, radice pallida. A reptili fruti-  
pud Dioscor. lib. 1. c. 19. est διὰ δῆ- cum scanfu cognomē istud ad-  
τον. sed forsan legendum διὰ δῆτον. epta est. Galli prelam vocant.  
P. 8. v. ἀδιδῆ. ] lege δῆτον ex Aetio  
& Paulo. Paulo ante pro ἀδιδῆτον  
apud Paulum legitur etiā ἀδιδῆ-  
τον: quod malim. deriuatum enim  
ab ἀδιδῆ. Col. seq. pro ἀδιδῆτον ma-  
lim Α' δῆτον, ut est apud Galen.  
lib. 4. v. δῆτον.  
P. 15. v. ἀδιδῆ. ] apud Theophr.  
lib. 6. cap. 3. & 4. est ἀδιδῆ: at lib.  
1. c. 16. ἀδιδῆ: quam posteriorem  
scripturam apud Plin. habes. Apud  
Hesych. Α' δῆτον ἀδιδῆτον, plā-  
ta spinosa: Α' δῆτον, δῆτον, laurus.  
P. 16. c. 2. v. phites ] forsan  
legendum χῆτον & χῆτην, vel χῆ-  
σπον, ut infra.  
P. 19. v. ἀκτῆ. ] apud Dioscor. &  
Aetium est ἀκτῆ, apud Gal. & Pau-  
lum ἀκτῆ. Ibidem pro Α' λαβανδῆτος  
apud Stephanū est Α' λαβανδῆτος,  
& Α' λαβανδῆτος apud Aetium, pro  
Α' λαβανδῆτος. Ibidem post ἀλῆα  
tollendum φῆτος. est enim interpre-  
tamentum. Ibidem pro ἀλεκτορία  
foran legendum ἀλεκτορία. apud  
Plin. enim aleatoria femininum  
est, subaudito substantiuo gemma.  
P. 20. v. ἀλῆα. ] apud Hippoc.
- P**. 21. v. ἀλῆα. ] apud Dioscor.  
est ἀλῆα.  
P. 22. v. 1. manuscriptus codex  
habet ἀλῆα: quod verius est.  
P. 24. v. nardi ] legendum vi-  
detur, vnam superaddidit, ut in  
seq. sectione de theriacō sale. Ibi-  
dem col. seq. scribe Γαυδῆτον, ex  
Suida. Ibidem pro Πόλῆτον forsan  
scribendum Πόλῆτον, à nominati-  
uo Πόλῆς qui apud Paulū & Sui-  
dam legitur, nisi forte malis Πόλῆ-  
τον, Politi, ut est apud Nicolaum  
Myrepsum.  
P. 26. v. ἀμαμνῆ. ] scribendum  
ἀμαμνῆς & ὁμομνῆς: quippe qua  
dicantur παγς τὸ ἀμαμνῆ ὁμομνῆ-  
τον, ex eo quod una cum ma-  
lo floreant, ut Pausanias apud  
Eust. testatur, qui tamen ficus spe-  
ciem esse vult. Rursum pro ἀμαμνῆ-  
τος Galeni lexicum habet ὁμο-  
μνῆς. quo nomine quosdam ac-  
cipere dicit poma quadam parua  
& sylvestria: forsan quia post cate-  
ra poma maturescant, eiq; veluti  
succedant. Eadem etiam ὁμομνῆ-  
τος vocat, quasi cruda nec matu-  
rescentia mala. Apud Hesych. ve-  
ro ἀμαμνῆτος legitur pro ἀμαμνῆς.  
nisi forte scribendum est ἀμαμνῆς,  
ut apud Eust. est ex Pausania. A-  
pud Palladium in Decembri, tit.  
4. hypomelidas legimus: quæ poma  
esse dicit sorbo similia, quib. dulce-  
do cum acuto sapore commista sit.  
P. 29. v. ἀμνῆ. ] ἀμνῆς χῆτον  
Ruso dicitur, pag. 33. & 34. at  
Polluci, Hesychio & Eustathio ἀ-  
μνῆς, paroxytonos, substantiue &  
genere neutro.  
P. 32. v. ἀμφιδέον ] Rursus ἀμφι-  
δῆτον habet, sic nominatum scribens  
à circularibus seu orbicularibus
- P**. 33. v. ἀμνῆ. ] apud Dioscor.  
dit. proprie enim ἀμφιδέον & ἀμφι-  
δῆς dicuntur orbis, circuli, annu-  
li, ex ære aut ferro: nec non armil-  
la, ut quæ brachiis vel tibiis cir-  
cum dentur. Ibidem pro postero-  
re ἀδαγς hac re pone ex aduersa-  
riis autoris: Α' δαγς est etiā stir-  
pis nomen, quam & caucum &  
ephedran appellant. Ea scandere  
solet arbores & ex ramis pro-  
pendere: folio nullo, cirris nu-  
merosa, qui sunt iunci genicula-  
ti, radice pallida. A reptili fruti-  
cum scanfu cognomē istud ad-  
epta est. Galli prelam vocant.  
P. 34. v. ἀμνῆ. ] apud Dioscor.  
Paris. & Colo. edit. habet ἀμνῆς.  
P. 37. v. ἀμνῆ. ] forsan legē-  
dum ἀμνῆς, ut supra. nisi forte  
breuem hic per compositionem pu-  
tes in longam versam esse, sicut in  
ἀμνῆς, nam ut hoc ex α' prinatione  
& ἀμνῆ, sic illud ex α' prinatione, &  
ἐμνῆς, sive ἐμνῆς, deriuatum est.  
P. 38. v. ἀμνῆ. ] in omnibus  
Hippoc. lexicis editionibus inuenio  
ἀμνῆς, à nominatio ἀμνῆς, ut ἐμ-  
νῆς, s. ὁμνῆς. Ibidem cum augmento  
legendum ἰνδισμῆς, (ut apud A-  
postolum σῆμαρον μετὰ τοῖς ἰνδισμῆ-  
σιν) vel potius αἰδομῆς. nam αἰδο-  
μῆς, quoque dicitur vinū cui flo-  
ribus iniectis odor conciliatus est:  
ex αἰδῶς & ὁμνῆς. Observandū ve-  
ro & hoc, per i scribi αἰδῶς apud  
Hesych. & Suidam, pro paroxytono-  
nas: oxytonas autem αἰδῶς, per  
diphthongum, sicut ὕμνῆς.  
P. 39. v. ἀμνῆ. ] cum augmento  
scribendum αἰμνῆς, ut omnes  
Hippocr. lexicis editiones habent.  
Sed miretur aliquis per i scribi.  
quum ab ὁμνῆς derinet Galenus.  
P. 40. v. Α' γῆ. ] scribe αἰτῶν



ab Antyllo medico, cuius mentio fit infra in §. 1. quia.

P. 42. v. ἀπὸν.] extat quidem haec scriptura apud Galenū comm. in Proorrh. lib. 4. sub finē. sed fortasse scribendū ἀπαπῶνα: quū Hefych. quoz ἀπαπῶνα exponat non modo παρῖον, vastare, sed etiā ἐκκεῖναι, emaciare, exinanire. ἀπαπῶνα certe apud ceteros autores longe diuersas habet significationes.

P. 45. v. ἀπομωλ.] sunt qui malint duplici ἀπομωλῶν, ut μωλῶς apud Hefych. & Eustath. unde hoc derivatum est.

P. 49. v. ἀρῖς.] In comm. Gal. legitur ἀρῖς, expositum ἀρῖς, σπῶν ἢ ἀνδρῶν, Immitius vel iniuncundius. Sed rectius in textu ἀρῖς, ἐξ ὧν ἐκκεῖναι. quasi Inamabilius ex a priuatio & σῖγῃ, quod est Amo, Diligo. Apud Erotianum est ἀρῖς, derivatū ab ἰρῖν, quasi Iratus vel Alienatus.

P. 51. v. ἀεῖ.] Apud Gal. in lexico scriptum oxyonous ἀεῖ, ubi & instrumenti & herba nomen esse dicitur.

P. 52. v. ἀρῖς.] variat hic Galeni codices. quidam ἀρῖς habent, quidam ἀρῖς. verum esse videtur ἀρῖς, quod cum alibi legitur, tum initio libri ἀρῖς ἀφῶν. Erotianus habet ἀρῖς, quod exponit μῦθος, ἢ ἀρῖς, Paululum, Sedate: sicut Hefych. quoque ἀρῖς exponit ἀρῖς, ἀρῖς, ἢ ἀρῖς, Modo, Recens, Sedate. Ibidem v. ἀρῖς.] in notis Dioscoridis est ἀρῖς & ἀρῖς, per diphthongum u.

P. 57. v. ἀρῖς.] scribe ἀρῖς, ut ἀρῖς, & similia. quare & apud Plinium est aromatis.

P. 59. v. ἀρῖς.] in Paris. & Colon. edit. habes ἀρῖς.

P. 60. v. ἀρῖς.] ἀρῖς Hefychio est planta unde viscum nascitur. at pro lactuce genere quod enunchion etiam vocatur, scribendum ἀρῖς, ut est apud Athen. lib. 2. nā ut ἀρῖς apud Eubulū comicum, sic illud ἀρῖς, dicitur ex a priuatio, & ἀρῖς, quod est prurire coeundi desiderio. ut ἀρῖς sit ἢ σέξαις ἢ σέξαις.

P. 61. v. ἀρῖς.] apud Diosc. & Theocr. gemino λ scribitur ἀρῖς.

P. 64. v. ἀρῖς.] in omnibus editionibus Hippoc. lexici est ἀρῖς. itemq. apud Suid. Pro ἀρῖς aut forsan legendum ἀρῖς, pro ἀρῖς certe scribendum παρῖον, ab aduerbio παρῖον, quo tamen significatur Anno superiore proximo,

Anno proxime elapso.

P. 66. col. 2. v. i. Venetus Aetii codex habet ἀρῖς, scriptura magis ad Latinam accedente. Paulus utrunq. agnoscit.

P. 69. col. 2. v. simil.] pro n apud Oribasium legimus Π.

P. 72. v. βαλῖς.] apud Stephanum urbs ista Macedonia βαλῖς est, & cinis βαλῖς.

P. 73. v. βαλῖς.] scribendum potius βαλῖς, ut ἀρῖς, δαῖς, χεῖς, πῖς, χεῖς, & similia. Paulo ante in Basilici emplastri compositione cypreū oleum videtur esse quod a Dioscoride κῖπρον appellatur.

P. 77. v. βυλλῖς.] Verius apud Paulum scribi videtur βυλλῖς, ut sit ex Latino Buccella, & subaudiatur substantivum Pastillus. Aetius enim in huius compositione fieri iubet ἀρῖς, id est panes paruulos.

P. 81. v. βυλλῖς.] Βυλλῖς non sunt vineae, σαφῶς, sed τὰ ἐπὶ τοῖς ἀρῖς, ut testatur Gal. lib. 2. de alim. facul. cap. 8. id est, solida expressarū vinarū reliquia, quae Latini Vinacea nominant & Vinaceos. Colum. seq. v. 4. pro ex obryza reperio apud Athenaeū ἐκ βυλλῖς, ex radicibus: lib. 9. Ibidem paulo inferius scribe βυλλῖς.

P. 84. v. Γαλακτῖς.] rectius fuisset, Γαλακτῖς dicuntur tithymalli. Sic enim apud Aetium legimus lib. 1. τῶν γαλακτῖς, ἢ γαλακτῖς, cuius singularis nominativus est γαλακτῖς. Ita Plin. lib. 26. cap. 8. scribit tithymallum a Latinis herbam lactariā & lactucam caprinam fuisse nominatum. Ibid. pro Γαλακτῖς apud Diosc. Paris. & Colon. edit. habent γαλακτῖς.

P. 86. v. vlt. scribendum fuerat γαλακτῖς, & γαλακτῖς col. sequ. & infra suo loco ponendum. Sic enim scribi debere docet alphabetica series apud Hefych. & Suid.

P. 91. v. Γαλῖς.] apud Oribas. inuenies Γαλῖς, Collect. lib. 24. c. 1. melius, ut videtur. solent enim παρῖον ista diminutiva.

P. 95. v. penult. legendum putato γαλακτῖς. Plin. enim feminino genere Gorgoniam dicit, subaudio gemma nomine.

P. 100. col. 2. v. u. &] scribe vuularia.

P. 102. v. dvt.] rectius δυνείας & δυνείας, genere masculino. subintelligitur enim substantivum δυνείας. Dioscor. lib. 5. manifeste dicit ἡ δυνείας δυνείας. Dicitur autem δυνείας ut αἰσθητός: συ-

στατός, ut αἰσθητός & alie infinitae similiter terminata.

P. 106. v. δγρ.] scribendum δγρῖς, ut non modo apud Hippo. sed etiam apud Diod. & Suidam legimus. Significat ab uno extremo usq. ad alterum pertransiens.

P. 107. pro δγρῖς & δγρῖς apud Eustathium & alios lexicographos per scribitur etiam δγρῖς & δγρῖς, a themate δγρῖς, quod exponunt δγρῖς, distrabere seu diducere. Sic etiam πρῖς & πρῖς, legimus. Quum vero Galen. dicit participium per χ quoz scribi posse, haud scio an intelligat praeteritū mediū δγρῖς, seu δγρῖς, quod Hefych. exp. δγρῖς nam in perfecto passivo ante terminationem μαι non admittit vsus aspiratam.

P. 110. v. δγρ.] Scriptura haec apud Erotianum est, sed mendosa. scribendum enim cum Hefych. δγρῖς: a quo itidem exponitur xon modo A loue impletus, sed etiam Puerus, Lymphidus, Pellucidus. Epitheum est fluminum apud Homer. Proprie significat A loue delapsus, vel expansus & dilatus. pro quo & δγρῖς inuenitur. At δγρῖς, quod col. seq. habes, apud Hipp. inuenio genitino casu positum, lib. de articul. & δγρῖς, super bi fore ianua.

P. 111. v. δγρῖς.] legendū δγρῖς, nautis curator, ut habet non Erotianus modo, sed etiam Hefych. & Suidas, a quibus exponitur etiam Inspector, Praefectus. Derivat autem non solum a δγρῖς, (unde est etiam δγρῖς apud Hefych.) hoc est, a disspiciendo seu perspiciendo: verum etiam a δγρῖς, quod est Administare. Aliquanto ante, v. nitri pro sexuncem in Latino Aetii codice reperi tescuncem.

P. 113. v. δγρῖς.] δγρῖς herba apud Diosc. & Gal. pro paroxytonas scribitur, apud Aetium & Paulum oxytonas.

P. 116. v. δγρῖς.] apud Diosc. Gal. & Paulum scribitur δγρῖς, oxytonas: iteq. ἡ δγρῖς. attamen non δγρῖς modo legimus, sed etiam δγρῖς, & quide frequentius.

P. 117. scribe δγρῖς.

P. 121. v. ἡγῖς.] per scriptum est apud Paulum: rectius vero per u apud Galen. in Definit. & lib. 6. Meth. medendi: metaphora ab a disspici, quibus proprie γῖς sine γῖς attribuitur, & γῖς.

P. 127. v. ἡγῖς.] scribendum ex vet. cod. ἡγῖς, δγρῖς, δγρῖς.

αἰμα. ut ἐκμαίνεσθαι proprie sit Ex-  
cretionem seminis se inquinare. Pau-  
lo post de ἐκπαίνεσθαι vide quae supra  
annotavi in ἡγεμεινία.

P. 133. v. ἐλκχ. ] scribendum  
ἐλεχλωσάμω, a verbo λεχλωσέσθαι  
quod est Sermocinari, Differere.  
In manuscripto cod. est ἐλκχωσά-  
μω, quod lucubrari significationem  
habet. Pro ἐλκχέσθαι vero ἐ-  
λκχέσθαι, quae mox seq. apud Hes-  
ychium habes ἐλκχέσθαι ἐλκχέσθαι  
derivata ab ἐλκχ, quod est Calor so-  
laris, ἐλκχέσθαι, Calefieri seu Torre-  
fieri. itemq. apud Suidam.

P. 135. col. 2. v. ἐλκχ. ] scribē-  
dum ἐλκχά simpliciter, ab ἐλκχ quod  
est Inuoluo.

P. 154. v. ἐπαθ. ] scribendum  
ἐπαθήμες ἐπαθήμες, ac suo loco  
reponendum ab ἐπ, Ver, ἐπ αἰθῶ,  
Floreo. ab ἐπ enim scribendum  
esset ἐπαθῶ.

P. 156. v. 1. ] eriphiam Plin.  
feminino genere dicit. ut scriben-  
dum potius sit ἐριφία ut ἀπρωσία.  
Apuleius eriphion habet, rutam  
agrestem sic dici tradens. Pro ἐρ-  
μεία apud eundem Plin. reperio  
Hermefias.

P. 157. v. ἐρρι. ] Extat hac  
scriptura in Basil. edit. Sed potius  
scribendum ἐρεψς, ab ἐρεψ quod  
est Decido, Delabor, ut liquet ex  
Erotiano.

P. 158. v. ἐμαπ. ] Duo reperi-  
untur apud Hip. verba ἐσὼ ἐσὼ  
significato affinia, ἐσὼ πῆδου ἐσ-  
μαπῆδου. Primum significat Immitte-  
re, seu immisso admonere, explo-  
rari scilicet causa. unde aorist. ἐσ-  
μαπῆδου apud Erotianum, quod  
exp. ἐμαπῆδου. Posterius simplici τ  
scribendum, a μαπῆδου quod est In-  
quirere: ut sit immisso digito per-  
quirere vel explorare. Priore uti-  
tur ὁ ἀφ' ὧν scilicet. 2. aphor. 24.  
πῶς ὁ πῶς γὰρ ἐσὼ πῆδου  
χρῆ. posteriore, aphor. 43. ἐσὼ πῆδου  
μενὲς τοῦ μῆδου, digito in naves  
immisso perquirentem: ut Hesych.  
enim exp. ἐρευνῶντα, ζητῶντα. Sic etiā  
ἐξαρύαται ἐξαρύαται legimus a-  
puđ eundem: quorum hoc singula-  
re est, illud plurale Ionicū ab ἐξ-  
ρύω quod est Exhaustio, Euacuo.

P. 160. col. 2. v. sus ] legendum  
videretur enrhythmus. id enim est  
generalius. Paulo infra pro εὐρυ-  
πῶν legendum forsan εὐρυπῶν, sci-  
licet ὁ εὐρύς: ut dicta sit ab eurypis in  
quibus proveniat.

P. 162. v. ἐχῆλ. ] Scriptura  
hac in manuscripto cod. est, in vul-  
gatis editionibus ἐχῆλως, forsitan

à cobibendis vulneribus. P. sequi.  
pro ἐχῆλως scribe ἐχῆλως, ex vet. cod.  
Vt sit genus piscium quod elixari  
soleret.

P. 170. v. ἡλίσθ. ] ut ἡλίσθρον  
ἐλίσθρον, sic ἡλίσθρον ἐλίσθ-  
ρόν διδύμι Graci, ut apud Diosc.  
ἐλίσθρον videre est: quorū ille  
ἡλίσθρον feminino etiam genere  
usurpat, hic ἐλίσθρον erraticā  
heliostraphon à Gracis nominari  
docet.

P. 175. v. ἡθῆς. ] scribendum po-  
tius ἡθῆς. Sic pag. sequi. scribe  
Θαῖς ex Paulo, apud quem ceratū  
non Thais dicitur, sed κυρτὴ Θαῖ-  
δος, Ceratum Thaidis.

P. 179. v. ἡλ. ] scribe ἡλ. Mox  
pro ἡλίσθρον ἐλίσθρον. ἡλίσθρον re-  
ctius fuisset θηλοπιδεύσας ἐλίσθ-  
ρόν, ut ex Hesych. et Suid. patet.  
Sed ἐλίσθρον origo sic scribendum do-  
cet. nam θηλοπιδεύσας ἐλίσθρον ἡλίσθ-  
ρος θηλοπιδεύσας, solum quod à so-  
lis calore torretur.

P. 185. v. lun. ] videtur legendū  
thymo. P. sequi. pro θυρεόν apud  
Diosc. est θυρεόν, proparoxytonas:  
qui non thymum modo, sed ἐλίσθ-  
τανανcen hoc nomine vocari à nō  
nullis docet. Apuleius vero ἐλίσθ-  
τανανcen sine arnoglosson sic appel-  
lati tradit. At θυρεόν dicitur à qui  
busdam ocimastrum, teste Diosc.

P. 186. scribe ἡλίσθρος, ex Sui-  
da, ut supra etiam monui. Et mox  
ἡλίσθρος, ut est apud Theophr. 1. 21.

P. 189. v. ἡλίσθρος ] apud Gal. et  
Hip. inuenies ἡλίσθρος, proparoxyto-  
nas. P. sequi. col. 2. v. 5. pro Pacchio  
scribe Paccio, ut est aliquoties a-  
puđ Gal. lib. 4. τ. 1. πῶς.

P. 191. col. 2. suspectū est ἡλίσθ-  
ρος, masculinum: quā feminino  
genere Plin. hieraciā lacūcā di-  
cat lib. 20. cap. 7. Apud Diosc. et  
Apuleium est ἡλίσθρος. At ἡλίσθ-  
ρόν, accipitripes, dicitur à qui-  
busdam lychnis agria, ut idem Di-  
oscor. autor est.

P. 193. v. ἡλίσθρος. ] Eustath. perispi-  
menas ἡλίσθρος dicendum tradit, ut  
παρὰ πῶν, contractum scilicet ex ἡ-  
λίσθρος. derivatum vero nomen ab  
ἡλίσθρος. vide ἡλίσθρος.

P. 195. v. ἡλίσθρος ] pro ἡλίσθρος existi-  
mo legendū ἡλίσθρος, Pressio seu Pres-  
sura. Alias pro muscipula reperi-  
tur usurpatum ἡλίσθρος, nec non pro in-  
strumento quodam fullonum et  
tortorum.

P. 200. col. 2. v. Orib. ] In La-  
tinis Oribasii editionibus scriptum  
inueni καρχήδω, ex καρχήδω καρχήδω  
Ibid. pro καρχήδω, quod apud Actium

et Paulum legimus, apud Diosc.  
et Gal. est καρχήδω per diphthong.  
P. 205. v. καρχήδω. ] scribendum κα-  
ρχήδω, a καρχήδω. nam καρχήδω vocant  
regulam: et inde καρχήδω dicitur  
qui regula modo rectus est et te-  
nuis. Confirmat eam scripturam  
veteris codicis auctoritas.

P. 206. v. καρχήδω. ] Scribendum  
potius καρχήδω, ut contractū ex  
καρχήδω. nam sic cetera etiam cō-  
posita a χῆδος siue χῆς, efferruntur.  
Paulo post suspectum est masculi-  
num καρχήδω, quum apud Dioscor.  
ambiguus sit accusativus καρχήδω.  
Sic col. sequi. malunt quidā καρχήδω-  
ρον et καρχήδωρον genere neutro.

P. 207. v. καρχήδω. ] Apud Pau-  
lum neutro genere et penult. pro-  
ducta inuenio καρχήδω, sed exposi-  
tione diversa. nam lib. 7. c. 3. καρχήδω  
esse dicit sambuci florem: at c.  
5 sambuci corticem.

P. 210. v. καρχήδω. ] In hac etiam  
significatione cum apud Homer.  
et Hip. tum apud alios reperio καρχήδω.  
P. sequi. pro καρχήδω in Basil. edit.  
est καρχήδω, itemq. in Galen. lexico:  
nec ulla in eius compositione sit καρχήδω  
mentio.

P. 214. v. καρχήδω. ] verius est  
καρχήδω vel potius καρχήδω.  
et per o. quomodo simplex καρχήδω  
apud Hesych. legimus, et καρχήδω  
apud Gal. sua serie. Est au-  
tem illi καρχήδω Paulatim marce-  
scere, huic Senescere.

P. 215. col. 2. v. καρχήδω ] pro  
καρχήδω scribendum καρχήδω,  
a verbo καρχήδω, quod significat  
Incumbere vel Irruere.

P. 216. v. καρχήδω. ] Opinor scri-  
bendum καρχήδω, nam ἡλίσθρος est  
Stringere, seu (ut Suid. exp.) Cōbi-  
bere: ἡλίσθρος verō Mittere. Paulo  
ante pro cataphrasta ligatura ve-  
rius Grate diceretur καρχήδω.

P. 225. v. καρχήδω. ] Scriptura hac  
apud Erotianum est: sed mendosa.  
vera enim est καρχήδω, ut ex He-  
sych. Suid. et Gal. lexico patet. In  
vulg. exempl. Hip. inuenies etiam  
καρχήδω lib. 2. De diata.

P. 236. v. καρχήδω. ] apud Theophr.  
inuenio καρχήδω: de priore c. 17. lib.  
3. de posteriore, eiusdem lib. c. 14.  
Diversam ab his καρχήδω facit e-  
iusdem lib. cap. 17.

P. 239. pro καρχήδω, quod apud Di-  
oscor. est, apud Nicand. inuenio καρχήδω,  
itemq. Cunila apud Plinium  
et Apuleium.

P. 241. v. καρχήδω. ] Hypericum nō  
καρχήδω sed καρχήδω vocant, ut in ἡλίσθ-  
ρος est: atque adeo per scriptum



*est in vetere Hippoc. lexici codice.*

P. 259. v. xlvia] for san xlvias, s.  
eivo; ut a' doo'ulas & similia. for san  
a picea conis seu nucibus.

P. 260. *υλαθ'υρος*] *apud Hippoc. inuenio λαθ'υρος, libro de ulceribus, πῶν ἢ (vel potius ἢ) λαθ'υρος οὐμῶνα. Et sic etiam ραγ'υρος est apud Theophr. l. 8. c. 8. Idemque forsan ζειγυρος & ισθ'υρος. apud Galen. tamen neutro genere εἰσάωξ, De aliment. facult. libr. 2. cap. 37.*

P. 272. v. λοφία] *Infra in vāp; masculino genere λοφία; dicit, forsan subaudito substantiuo ἀποδουλος. & Apud Suidam certe legimus λοφίας, ὁ φάγλος: apud Pollucem, vero feminino genere λοφία. Rursum pro λοφείῃ, quod apud Pollucem & Hesych. extat, apud Suidā reperio λοφάδῃ, neutrum plurale: forsan ex Homérico illo καταλοφάδῃ. Paulo post pro λοῖχα apud Dioscor. inuenio λοχα sine diphthongo: apud alios etiam λοχία. Ibidem col. seq. v. 1. rectius est κλέν. nam κλέν est clangere & vociferari.*

P. 275. v. λυαφ. ] *Varia est no-*  
*minis huius scriptura. apud Dio-*  
*scor. & Galen. est λυαφς; apud Ae-*  
*rium λυαφς, apud Paulum λυα-*  
*φς. Similiter varie scribitur quod*  
*pag. 276. se offert μαμακωνον. alii*  
*enim cod. μαμακωνον pro eo habet,*  
*alii μαμακωνον, alii μεμακωνον: alii*  
*aliter: quum vera scriptura sit μ-*  
*μακωνον, ut Eustathius & Athe-*  
*neus habent, & alphabetica seri-*  
*es Hesychiani lexici confirmat, in*  
*quo tamen sine diphthongo est μ-*  
*μακωνον.*

P. 285. v. ῥαῦρον.] rectius  
ῥαυροῦσιον, ut apud Plin. est. Di-  
oscor. διῖσι μάλιν ῥαῦσιον appellat.  
At de ῥαῦρον, quod sequitur,  
vide qua monui supra in λαῦρον.

P. 294. *μυκλῆα* } *μυκλῆα, malus*  
*est, ut μῦλου malum. fraxinus vero*  
*μυκλῆα dicitur.*

P. 296. v. *μειοχ.*] Sic apud  
*Erotianum* est, apud *Galen.* vero  
 quidā scribūt *μειοχάν*, ut sit ἡ *μ*-  
*ειος χαίνουσα* sine *χάινουσα*, innume-  
 ris modis hians.

P. 300. v. μολιω.] scriptura  
hac apud Gal. quidem est in cōm.  
sed scribendum μολιωέας vel μολι-  
ώσαι, ut est apud Hipp. de quo er-  
rore supra quosdam in καμολιωέσαι.

P. 301. v. 10925] Actiū pro Symeone Sethi dixit. ut supra quoque in A' r' u' o' e' i' a. Paulo post apud eundem Symeonem est Toupata &

Sinis pro Toupat & Seniris.

P. 304. v.  $\mu\upsilon\pi\eta$ .] forsan scribē-  
dū  $\mu\upsilon\pi\eta$  επον. a similitudine pinna-  
rum musca.

P. 314. v. Nix] apud Galen. &  
Paul. est Neix per diphthongum.

P. 321. v. ὁ γὰρ. ] apud Hesych.  
 & Suid. gemma scriptum ὁ γὰρ  
 λέγει. Paulo post distingue post ὁ γὰρ  
 nam φέρει est interpretamentū.

P. 328. v. δευτέρ.] *apud Diof.*  
*est δευτείας, ut supra monui. Col.*  
*seq. pro priore καλινος apud Strabonem est καλινός, itemq., Calennum*  
*apud Latinos: pro posteriore, ἑποιοῦν*  
*supra dixit.*

P. 330. col. 2. v. Alb.] scribe in  
Cilicia, ex Gal. Pag. 331. col. 2.  
v. Pucino pro non aquoso, apud  
Plinium est non alio vsq.

P. 337. v. ὄων. ] apud Dioscor.  
oxytonas legimus αἰῶνις & ὄωνις: i-  
temq; ὄωνις apud Theophr. l. 6. c.  
1. & 5. Apud Gal. vero & Paul.  
ὄωνις: itemq; in versu quodā apud  
Athen. & Plut. αἰῶνις ὄωνις.

P. 341. col. 2. pro *ōzū*; herba,  
rectius fortasse *ōzū* scribetur, ut su-  
pra. nisi forte à Plinio intelligatur  
ibiūci species alio nomine compo-  
sito *ōzū* *ovos* dicta.

P. 343. v. & subr.] ex Diosc.  
scribe, extra croceus, lauis, ping.

P. 346. c. 2. pro posteriore ὀρμη-  
 apud Hesych. & Suid. inuenio  
 ὀρμητος: apud Athenam ὀρμητος: sine a-  
 spiratione: apud Poll. utroq. modo.

P. 363. ὁ παῖς] apud Pollucē  
 & Hesych. invenio παῖς, à quibus  
 esse dicitur τὸ ὄζει τὸν ἄρτον ὡς αἰν,  
 rum illud quod circa pupillā est.

P. 366. v. πετρυ.] priore apud  
Paulum loco est πετρυας Εχλας:  
posteriore, σμῆμα πετρυαν, nō ser-  
uato eodem accentu.

P. 370. de spous. vide que an-  
notati in aut. in. Col. seq. pro puxi-

nam, quod apud Nicandrum & Ae-  
lium est, Dioscor. habet πεντάκων.

*Apud Paul. mutato accentu le-*  
*gimus πικράδα. sed ut ἐρσπιάδων*  
*ἢ μωρίδαων, ita etiam πικράδων*  
*videtur efferrī debere.*

P. 375. col. 2. v. differ. ] pro  
 peritias apud Dios. inuenio peritias,  
 apud alios peritias. Mox niazardos.  
 quod neutro genere usurpat, a Gal.  
 coniter masculino ut *γαιαρδος*.

chio, apud Hippiatros certe pro fe-  
rula chirurgica fracturis curadi-  
apialegitimus usurpatum diminu-  
tine, ὡς ἐπὶ Σί; πὲ πασι Σία. Ibidem  
col. seq. pro παπασού; quidam scri-  
bunt πατιασού; : apud Theocriti  
vero schol. legimus πατιὰς δούσαι  
Dorice pro πλατιάζουσαι, quod exp.  
πλατισοῦσαι.

P. 383, col. 2. pro πολύκρπν Ε  
 πολύκρπν *vetus Hippoc. lexici exē-  
 plar habet πολύκρπν, quod magis  
 accedit ad κερταγόνε Ε sonum Ε  
 significationem. Dios. vero Ε Α-  
 pulcius πολύζονα quibusdam ap-  
 pellari πολύκρπν tradūt. Mox pro  
 ἐνάπλευρος reperitur etiā ἐνάει-  
 ρος, quod πολωνείρω affinius est.*

P. 392. in *de nervis* pro *nervus*  
*nervus*, quod apud Aetium est l. 2. c.  
 99. apud Galen. in *nervio* *nervus*.  
 pro quo forsan existimet aliquis  
 scribendum *nervus*, ut sit compo-  
 situm sicut *nervus*. nam *nervus* &  
*nervus* eiusdem vel saltem cognate  
 significationis verba sunt. Hesych.  
 vero *nervus* habet, a *nervus*. sic  
 enim dicitur *nervus* in *nervio* & in  
*nervio*, teste Galeno & Aetio.

P. 39; v. 21p. ] apud Galen. & Paul. oxytropis in iunio nées, ut in compositis sponteas & in iunio: apud Dios. vero & Actium nées, ut nées: a quo est etiam genitivus nées apud Actium & Paulū. nées vero dicitur non modo nées, sed etiam dryopteris & trichomanus teste Dioscor.

P. 395. v. τοῦ πενίτου] ex interpretatione Galenica tollendum est. est enim affirmantis, non negantis, per se positum, ad verbum significans Funditus: id est penitus, omnino. Sic enim habet locus Hippocr. τοῦ πενίτου καὶ ἐκ τῶν οὐκ, & qua sequuntur. Id est, Penitus igitur non sunt.

P. 396. v. πατή] scribendum  
πατή, à verbo πήμι significans πίνω,  
quod est Coagula: ut apud Aetium  
quoque scriptum est l. 2. c. 100. Pro  
eo in Epigram. πατή legimus Do-  
rice ibi enim bubulcus Veneri &  
Paphia donaria offert πατήν καί  
μελά σμβλάν.

P. 399. v. πνῖα] Reperitur etiā  
πνῖα τρᾶσποσις vocalibus: sed hęc  
scripturam, πνῖα, veram esse osten-  
dit alphabetica series apud Paulū  
in simplici enumeratione: nemq;  
apud Hesychium. Apud Suid. ta-  
mē suo itē loco invenio πνῖα: quę  
scriptura ad originē vocabuli pro-  
prie accedit. Hesych. n. quasi πνῖ-  
ν dici vult. ὅθεν τὸ πνῖν, a coagu-  
ando.  
P. 401.

P. 401. v. eandid.] videtur le-  
gendum folliculari specie: quum  
Plin. lib. 24. c. 14. dicat eam ferre  
veluti folliculos.

P. 402. v. pluv. ] forsan legen-  
dum pluides, ut apuades, v. beides  
et similia.

P. 404. v. interfect.] malim in-  
terseptum. Ibid. col. sequ. v. fol.]  
ex Plin. pone colatis: et versu uli-  
mo, tres menses ap. Pag. seq. v.  
cum] videtur tollenda copula &c.

P. 408. col. 1. v. frond.] ex Di-  
oscor. repone, singulae portiones,  
quantum pro cuiusque viribus  
satis fore conieceris, vna tunc.  
Ibidem col. preced. v. 34. pro coc-  
co forsan scribendum croco.

P. 411. v. ἀρξίφ.] apud Dioscor.  
triplex est scriptura, ἀρξίφραγον,  
ἀρξίφραγον et ἀρξίφραγν. ex qui-  
bus dua posteriores Latinam ap-  
pellationem tibi representabunt si  
ex prima syllaba persisteris. nam  
saxifragam seu (ut apud Plin. est)  
saxifragum dixerunt Latini, non  
modo quod in saxis nascitur, ve-  
rum etiam quia calculos e corpore  
mire pellit frangitque, ut cum Di-  
oscor. tradit Plin. Ibid. col. preced.  
v. inest] forsa tollenda praepositio in.

P. 414. v. putr.] forsan legen-  
dum, interdum vero fieri p.

P. 419. v. οὐκίαν.] apud Ero-  
tianus est οὐκίανπος genere mascu-  
lino, itemque in lexico Hippoc. et a-  
pud ipsum Hipp. lib. De articulis.  
Paulo supra v. 10. planior erit sen-  
tentia si post sortito distinguas.

P. 433. col. 2. v. mulso] clarius  
ex Gal. sic, praeterea indigent ea  
quae iris nominatur, itemque  
anthera: hisque vel sic.

P. 435. v. σπύρι.] apud Hippocr.  
in Basil. edit. inuenio σπύρι, lib. 2. de  
dieta: quam scripturam Cornari-  
us etiam interpret agnoscit. Paulo  
post pro σπύριον scribendum σπύ-  
ριον, ut non modo Galen. habet  
in σπύριον, sed ipsa etiam origo decla-  
rat. nam σπύριον, eodem teste, di-  
citur quis furioso coeundi desiderio  
prurire: ἀπὸ τοῦ σπύρι, de quo supra  
in ἀνάλ. Mox pro σπύριον in  
vet. cod. est σπύριον.

P. 436. col. 2. ante σύρι, ex ad-  
uersariis auctoris hac inferre, Σύρις  
styrax: lacryma est arboris ma-  
lo cotoneae similis. Praefertur  
pinguis, flauus, resinofus, albi-  
cantibus grumis, quampluri-  
mum in sua odoris gratia per-  
manens, qui dum mollicur, mel-  
leum liquorem reddit. Excalfa-  
cit, emollit, concoquit: menses

seu potus seu admotus prolicit.  
Officinae storacem calamitam  
appellant.

P. 440. v. tali] forsan legendum,  
vires: vimincid.

P. 442. v. οὐκίανπος.] In princi-  
pio τὸ μὲν λέγεται pro hoc participio  
habet οὐκίανπος, significatione  
eadem, οὐκίανπος. Paulo post pro  
Pliniana οὐκίανπος forsan legendum  
οὐκίανπος, de qua infra.

P. 451. v. γαίης] Hec scriptura  
extat in vet. cod. in vulgatis γαί-  
ας est.

P. 454. v. dicitur] scribe, quasi  
ἰνδών, ex Gal. Definit. medicis.

P. 458. col. 2. v. Χαίρη] apud Ho-  
merum est, Χαίρη γυναικί.

P. 467. v. τερψών.] scribendum  
τερψώνιον: derivatum a turturibus  
quae τέρψονες dicuntur, et secundum  
Aristotelem sunt quinta species τῶν  
ἀετῶν, id est columbarum.

P. 469. v. τέρψον.] Scriptura haec  
apud Hesych est, qui praeterea her-  
ba cuiusdam nomen esse dicit. A-  
pud Hippocr. vero τέρψον in tali si-  
gnificatione legi. supra in σπύριον an-  
notavi.

P. 470. v. ὑγρόν] alibi ὑγρόν  
legimus sine v. apud Homerum et-  
iam ὑγρόν, inde in atterendi signi-  
ficatione.

P. 485. col. 2. v. quæ t.] malim  
tardare &c.

P. 489. v. pharyng.] rectius erit  
esse gruis pharynge longiorem.  
Paulo infra quidam malit φάρυ-  
γγον, alii φάρυγγον. Vide Her-  
mol. Coroll. in Diosc.

Pag. 491. v. animant.] Her-  
molanus habet amantes. Ibidem  
col. seq. v. Κρόκον] forsan legendum  
κρόκον: quum κρόκον nomen nec me-  
trum ferat, nec anigmatica descri-  
ptio. Vers. preced. pro Ερμεύς βο-  
τάνης scribitur etiam Ερμεύς πιδίος  
teste Gal. et mox μισγὰ βαλε.

P. 494. v. φλέων] apud Theophr.  
φλέων est l. 4. c. 11.

P. 499. v. φύσιν] scribendum  
φύσιν, a nominativo φύσις: ut vi-  
dere est ex initio lib. De fistulis, v-  
bi iubet accipere σπυρίον φύσιν ve-  
aplew, eaq; in fistulam demissa, pro-  
funditatem eius metiri. id est, re-  
centem alii caulem.

P. 502. v. γαλκάντος] apud Gal.  
Actium et Paulum est γαλκάντος:  
apud Diosc. γαλκάντος, quod sequi-  
tur Latini. P. sequ. chalcitidem  
Hippocrat. γαλκάντος vocat. nam  
Galen. in lexico Hippoc. tradit γαλ-  
κάντος apud Hippoc. nihil aliud  
significare quam τὸ γαλκάν.

Notari et hoc potest, παροξ-  
τονος apud alios legi γέρον, γέρον,  
γέρον, γέρον: παροξτονος  
γέρον, γέρον, γέρον, γέρον, γέρον.  
properissomenos παροξτονος, γέρον,  
γέρον, γέρον, γέρον, γέρον.  
denominatiua illa terrarum,  
plantarum et morborum vocabula in  
eis exeuntia, ut ἀμπλῆς, λουγῆς,  
πλευρῆς, οξυτονος vero γέρον. Pro  
Ionicis illis ἀρχῆς, γαλκάντος, γέρον,  
βοτάνης, visitatiore sunt communia  
ista ἀρχῆς, γαλκάντος, γέρον, βοτάνης  
itaque pro genitiuis in iis exeuntib. ut  
ἀρχῆς, γαλκάντος, γέρον, βοτάνης  
sinentes in eis. Verius etiam γαλκάντος  
et γαλκάντος quæ γαλκάντος et γαλκάντος.  
Verius γαλκάντος sine γαλκάντος quam γαλκάντος  
in γαλκάντος: verius γαλκάντος quam γαλκάντος,  
quum apud Paulum lib. 7. c. 15.  
legamus non modo genitiuum γαλκάντος,  
sed etiam dativum γαλκάντος, de uno eo-  
demque. Inueniunt etiam vocabula  
inter se commutata: ut vna pro oli-  
ui pag. 130. in εἰσάγω. vna pro mu-  
sto. p. 332. in εἰσάγω. antistropheon  
pro antiphrasi. p. 334. in εἰσάγω. pro  
quo (ut hoc quoque moncam obiter)  
apud Gal. et Paul. legimus ὁλοστόν.  
Videbis etiam properatum esse in  
nonnullis interpretandis. Inter alia  
αἰνιδικόν. et εἰσάγω. passiva, red-  
dita sunt actiue. Sic p. 350. σάβυρα  
ἔργα, ponderalis mensura: quum  
sit ponderalis vncia. Et p. 306. σ-  
αυρόν, relectum: quum sit cribra-  
tum. Et p. 299. ἀπὸ φάρυγγος, Di-  
serte scriptum est: quum sit, Dissen-  
sum est, Non idem scriptum est.  
Itē ἀνάλ. Blandum, Mite: quum  
sit Immite, Inclemens. et γαλκάντος  
vero, quod p. 351. suspectum habet,  
non apud Hipp. modo legimus, sed  
agnoscit etiam Erot. dum παρὲς ἔργα  
exp. παρὲς ἔργα. Occurrent etiam tras-  
posita, cum alia tum σπύριον p. 411.  
Itē repetita, ut in ἀπὸ φάρυγγος frutice  
videre est. p. 60. Sic quæ p. 409. in  
σπύριον inter docuit et Quidā  
sunt interiecta, verius ad sequentem  
σπύριον pertinēt. Pro αἰνιδικόν  
vero saepe putavi scribendum αἰνο-  
κάντος, ab αἶμα sanguis, et αἶμα σπύριον.  
itemque, εἰσάγω. pro εἰσάγω. quæ  
similiter ἐνιμάτω dicat Hip. de vl-  
ceribus, et alibi ἀπορίων, substanti-  
ue. ἀπορίων ante p. 325. inter doloris  
species, et ἐκώδης p. 397. inter spe-  
cies febris, et alia non pauca, de qui-  
bus nil habebam certi, reliqui do-  
ctioribus contentus hac paucula in-  
discientium gratiam monuisse. quæ  
Gorraus ipse pro singulari sua eru-  
ditione atque diligentia limatus pro-  
cul dubio tractauisset, si videret  
dixit licuisset.



